

GALENI OPERVM
QVINTVS TOMVS
 CLASSES DVAS QVINTAM ET SE-
 XTAM COMPLECTENS, QVARVM ILLA MEDICAMENTO-
 rum cum simplicium tum compositorum materiem, & eorun-
 dem compositionis rationem; hæc uarios detrahendi
 sanguinis modos tradit.



BASILEAE M D XLIX

2118

BIBLIOTHECA MUSEI HISTORICO-NATURALIS
 BASILIAE
 C. BUCHNERUS
 DON: Prof. Aug. Braca
 1926

QVINTA CLASSIS HOS

LIBROS HABET

De simplicium medicamentorum facultatibus libri undecim, Theodorico Gerardo Gaudano interprete.	columna 5
De substitutis medicinis liber, à Iul. Martiano Rota latinus factus	321
De purgantium medicamentorum facultate, eodem Iul. Martiano interp.	327
Quos purgare conueniat, quibus medicamentis, & quo tempore, liber, eodem Iuliano interprete.	335
De theriaca ad Pisonem liber, Ioanne Andernaco interprete.	341
De usu theriacæ ad Pamphilianum liber Galeni non genuinus, à Iul. Martiano Rota translatus	371
De antidotis libri duo, ab eodem Iul. Martiano latinitate donati	379
De compositione medicamentorum localium libri decem, à Iano Cornario medico primū uersi, ac uelut primum editi fuerunt, ab ipso interprete Cornario repositi	449
De compositione medicamentorum per genera libri septem, à Ioanne Andernaco latinitate donati	787
De ponderibus ac mensuris, Iano Cornario Medico interprete	1045

SEXTA CLASSIS HAEC

CONTINET.

De hirudinibus, reuulsione, cucurbitula, cutis concisione, siue scarificatione, Iano Cornario Medico interprete	1053
De uenæ sectione aduersus Erasistratum liber, Iosepho Tectandro Cracouiensi interprete	1057
De uenæ sectione aduersus Erasistrateos qui Romæ degebant, liber, eodem Iosepho Tectandro interprete	1075
De curandi ratione per sanguinis missionem liber, Theodorico Gaudano interprete	1101

Omnia per Ianum Cornarium Medicum recognita,
& innumeris locis emendata.

Cap. 1. Quid dicatur medicamentū, et quid facultas: & quomodo hæc quidē actū, illa uero potētia existat. Et ante hos libros tertius de tēperamentis legi debeat.

2. Quo pacto quæq; iudicare facultatē oporteat, ad id cui medicamentū esse dicitur aut alimentū, per se non per accidens: idq; ex propria eius potētia & substantia, nō ab accidentibus, ut colorib; &c.

3. Quo pacto discernatur quod ex accidente quid faciat, ab eo quod propria facultate.

4. De aquæ facultate.

5. Quo pacto iudicemus aquam puram.

6. Demonstratio qua ostenditur aquam frigidare, ex cerati, quod ex ea conficitur, effectu.

7. Quod aqua potabilis humida sit.

8. Quod aqua aduentitiū calorem naſta ſemper quidem humectat, non autē ſemper calfaciat: uerum in ipſo quidem perſuſione ſemper calfacere, poſtea uero frigefacere conſueuerit.

9. Si a rebus exteris de medicinarū facultate colligi quid oporteat, ex ignis cum illis commercio faciendū eſt iudicium.

10. Quor & quæ prædeſinari oporteat, ut liceat ex alicuius affectiōe quæ ad ignem eſt, quo pacto aduerſum nos id ipſum efficiatur, colligere.

11. Quod quæ ſubtiliorū ſunt partium, promptius propriam exerant actionē, quam quæ craſſiorum, tamen eandem cum illis facultatem obtineant. Multa ad ignem potētia eſſe calida; non item ad nos. Quod omnia pharmaca (excipe frigida tenena) principium mutationis à calore noſtro accipiunt.

12. Quod ut quodq; in minores partes ſolutū eſt, ita facilius mutetur, & promptius agat.

13. In cutim & poros multa uenarum & arteriarū oſcula terminari, quibus tenuiſſimæ pharmacorum particule attractæ, & ab ipſorum calore in actum productæ, mox toti corpori uim & actionem ſuam communicant. Craſſa autem tam anguſtiſſimis meatibus attrahi non poſſe, neq; à ualorum calore principium mutationis accipere.

14. Quod corpora rariora citius ab igne accēduntur q̄ quæ ſunt ſpiſſiora. Epilogus ſuperiorum.

15. Aquam tenuium eſſe partium nec unquam nos ex ſua natura calfacere.

16. Non ſimpliciter quod citius ab igne accenditur, id ad nos quoq; apparere calidius.

17. Non quod citius à frigore congelat eio quod tardius abſolute frigidum exiit mare licere, ſed interea quæ parē ſortita ſunt coſiſtentiam.

18. Quo differat congelatio à refrigeratione. Non ſimpliciter ab igne ad nos dicendū eſt aliquid calidū: multo minus ab alijs remotioribus.

19. De acetō, lacte, &c.

20. Perperam multos cauterij inſtar acetum

pronunciariſſe calidum.

21. Qua methodo cognoscere liceat an calidum ſit acetum.

22. Quibus rationibus ſint uſi, tum ij qui ſummè calidū: tum ij qui ſummè frigidum eſſe acetum pronunciant.

23. Acetum neutrum eſſe quod ad ſummè calida & ſummè frigida, quia neutrius extremorum eſt particeps.

24. Quo pacto aerem dicamus tenuiū eſſe partium: & nec omnē ignem eſſe tenuium partium: nec quicquid tenuium eſt partium eſſe ignem.

25. Non omne quod mordax eſt tenue eſſe aut calidum.

26. Quomodo acetum obſcure uideatur calfacere.

27. Veteres medicos perperam in deſinitam reliquiſſe facultatis eiufdem generis medicamentorum qualiſſe.

28. Perperam ſuperioris faculti homines à compoſitis medicamentis orſos, eorum quæ in illa ingrederentur ſimplicium pharmacorum iudicare facultates.

29. Quod & Empiricis contra dicēdi præbeant occaſionem, qui citra iudicium ac diſcrimen, ſimpliciter compoſitis omnibus facultatibus fidem habent.

30. Senſus haud contemneridos, tanquam ad explorandas ſimplicium medicaminum facultates ſint inſufficiens.

31. Vtrum in oxyerati potu acetum admiſtum ſit dūtaxat ut aquam deducatur, an etiam ut ipſum quoq; refrigeret.

32. Quæ ſit ſitis cauſa.

33. Medicamentum quod in iudiciū uenit nō mixtum, ſed ſimplex eſſe oportere.

34. Quod neq; aſtriſtoria omnia cogluſtinent, neq; cogluſtinatoria item omnia aſtringentia. Vnde etiā intra cap. 39.

35. Quod non omnia aſtringentia refrigerent.

36. Perperam Herodotum ac Dioſcoridem, quæcunq; aut proſtutis aut dyſenterijs medentur, aſtringentia cenſuiſſe. De caprino adipe.

37. De proprijs ſenſus cuiuſq; ſenſorijſ; præcipue de ſaporibus ex Platonis Timæo.

38. De proprijs linguæ ſenſorijſ; id eſt ſaporum differētijs: Et primum chymus & chylus quod differant: & quod ille ſit proprie calore ſiue qualitas guſtabilis: hic uero humidum à ſapore coctum in animalibus & plantis.

39. Qua differat aſtringens ab auſtero & acerbō. Item de reliquijs ſaporibus. Contra imperitos qui ſapores confundunt, omnia ferè aſtringentia appellantes, ut ſupra cap. 34.

40. Nō ad totam rerum naturam iudicandas medicamentorum facultates, ſicut naturales philoſophi faciunt, ſed ad noſtrā naturam. Argumentum ſecūdi libri: dein de tertij & quartij. Cur primos hos duos libros ſcripſerit: & quod in tertio demum rem ipſam aggrediatur.

CL. GALENI DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM FACULTATIBVS LIBRI VNDECIM.

Theodorico Gaudano interprete.

LIBER PRIMVS.

Quid dicatur medicamentum, & quid facultas: & quomodo hæc quidem actū, illa uero potētia existat. Cap. I



VANTVM cōferat ſimplicium medicamentorū exacte facultates cognoscere, quæq; neceſſariū ſit tum ad uariorū compoſitionē, tum ad inuētorum opportuniū uſum, non habeo nunc oſtendere: Nam id partim in opere de Medi-

Galen.

camientorū compoſitione, partim in Curādī methodo monſtrabitur. Verū quod deinceps ad temperamentorū ſequitur tractationē, id in præſentia dicetur, ubi uidelicet prius uocabulorū, quibus in hoc utemur libro, ſignificata definiērimus. Medicamentū, omne id dicimus quod naturā noſtram alterare poteſt: ſicut (puto) nutrimentū, quicquid ſubſtantia augere. Reſerui enim utruq; ad aliquid. Porro medicamentū ſimplex & ipſum per oppoſitionem ad cōpoſitum nuncupatū eſt. Eſt autem id, quod ſecundū naturam ſuam ſyncerum eſt. At Facultas, cauſa quædam eſt effectrix. Eaq; partim

actu siue energia est, alia in futuro tempore. Actus quidē, ut calefaciēdi in igne, refrigerandi in glacie. In futuro autē, ut calefaciēdi in pyrethro, & castorio, & similibus; refrigerandi, in alterco, mādrāgora, & id genus. Sanē quandā esse facultatē, in purgatorijs quidē medicinis purgatoriā, uomitorijs uomitoriā, sternutatorijs sternutatoriā, bechicis (hoc est, ad tussim paratis,) bechicā, & uno quoq; in opere alio peragendo, quæ denominetur ab eo quod ipsa efficit, ferē nō est qui ambigat. At quæ sit huius facultatis essentia, quidam certe nō posse cognosci existimarūt; quales sunt Sceptici philosophi, & qui inter medicos uocati sunt Empirici. Sed & qui nosci posse arbitranē, inter sese dissiidēt. Quidā em̄ ad magnitudines & figuras & situs corporis uel uiciorū ac meatuū, quos ὄψεις & ἴσως appellitant, referūt. Alij ad caliditatē, frigiditatē, humiditatē, ac siccitatē, pro sua uidelicet utriq; prima elementorū constitutiōe. Quare & nos, quia in libro de Elementis secundum Hippocratem, ex calido, frigido, sicco, & humido, cum aliorū omnium corpora, tum animantium constare ostendimus; has effectricium facultatū essentias tum in alijs omnibus, tum in medicamentis statuemus. Sic autē & in tertio De tēperamentis demonstratū est. Ac qui uolet quæ nunc dicenda sunt assequi, in eo tractatu se prius exerceat oportet; quippe cum illic quæ uniuersim, ac in genere de medicamentis nouisse cōueniat, exposita sint, nec hic toto utiq; in genere quicq; noui dicemus; uerū quæ illic generatim sunt scripta, ea hic speciatim elaborabimus.

Quo pacto quæq; indicare facultatem oporteat. Cap. 2
 In primis quidem, ac maxime sumendū est iudicandæ facultatis experimentū ab ea re ad quā dicitur. Siquidē non protinus si hominē refrigeret cicutā, et sturnū refrigerabit; aut si sturnū nutriet, nutriet & hominē. Eadem ratione neq; si hominem purget ueratū, cōtinuo purgabit & coturnices; neq; etiā si hos nutrire ualeat, cōsequens statim est, ut & homines. Proximum est, ut quod ex accidenti est, distinguatur ab eo quod primario ac perse. Nam aqua frigida calorē quādoq; reuocat, cutem refrigerandō, cōtrahendōq; ac condensando. Ad id enim calorē cōsequitur reuocatio, uelut in tertio de Temperamētis ostendimus. Rursum calida quoq; ipsa sepe numero refrigerat, excalfacitē nimirū humorem digerendo. Nam si his admodum distinctis, ad inquirendā facultatis explorationē accesseris, haud facile, mea quidē sententiā, falli queas. Cæterū a nullo alio desūmi iudiciū, q̄ ab eo ad quod dicitur, id quidē perfacile est; nō uidelicet an insecta animalia oleum interimat, neq; an pingue, aut lentū, aut leue sit cōsiderātes, cum calfacere, aut frigefacere, aut humectare, aut siccare corpus humanū ualeat, inquiri; eundem in modum neq; an colore sit rubro rosa, neq; an albo cerula; si quidē necessariū non est, quicquid rubrum sit, esse calidū, neq; quicquid albidū, esse frigidū, sed an admodum corporib; nostris primario ac perse excalfaciāt, ac nō interueniente quopiā, neq; ex accidente. Ac si ita quidē, facultate esse calida, ut si re-

frigerēt, frigida. Nam per deos immortales, unde nam dicere possumus, an calidum sit facultate album piper, granū cniidū, cnicus, calx & ueratrum albū; aut unde q̄ frigidus sit famius asfer, terra selsi nussa, cerussa, nix, & lac. omnia em̄ ea coloris sunt cādidi, uiribus uero uel maxime pugnat. Sunt ergo nix & calx colore simillima, uirib; autē pugnantissima, sed pugnantia sensus diiudicat. Siquidē niuem applicatā protinus ac primo statim occursum frigidam percipimus, & quoad tangat magis semper magisq; frigefacere sentimus. Videmus porro ipsam neq; durare, neq; seruari posse, si uel leuis calor occupet. At calx neq; primo occursum refrigerare percipit, & usq; dum applicata manet, percipit magis ac magis excalfacit. Ex quo constat ex eo qd̄ semper unū idēq; efficiat, qd̄ nos cōtingit medicamē, propria eius iudicandā esse facultate.

Quo pacto discernatur quod ex accidente quid faciat, ab eo quod propria facultate. Cap. 3

Etenim quod ab initio ad finē usq; dum applicatum est, magis semper calfacit; id nō ex accidente, sed ex sua natura est tale. Sic etiā quod a principio ad finē usq; refrigerat, ex sua facultate est frigidū, non ex accidente. At sanē si nihil moratus, atq; ex posteriore, ac post ablationē facultatē eius expendere uoles, sepe numero falleris. Ac forte nō nunquam aquā frigidam, nō frigidam modo, sed & calidā possidere facultatē dices; ubi uidelicet frigefacere semper dum nos cōtingerit apparebit, frigidā; ubi uero calorē reuocabit, calidā. Quare hæc indistincta relinquenda nō sunt. Dandaq; insuper opera, ut quodcūq; medicamentū in iudiciū uocare uelis (id quod in libris de tēperaturis monuimus) omnis sit expers alienę tum frigiditatis, tum caliditatis; ne uidelicet naturā eius facultatē adscititia qualitas adulteret. Ad hæc, quæ & ipsa præcepimus, nutrimentū a medicamento distinguo, atq; ea utraq; ad aliquid dici memento: tum circa eandē sepe substantiā cōsistere, uelut & id quoq; monstrauimus. Nec secius q̄ quædam tota substantia in sese mutuo & agant & patiant; quædam uero una duntaxat, aut duabus qualitibus. Super hæc, alia itidē esse tenuia, siue tenuiū partium (Græci λεπτωμόρη uocant) alia crassa, siue crassarum partium (πυκνωμόρη Græci nomināt.) Tenuia quidē, quæ facile in tenues cōminui partes possint; crassa, quæ cōtra. Atq; ut femel dicā, omnium meminisse distinctionū oportet, quas in tertio De temperamento posuimus, ut secundū illas medicamentorum omnium speciei facultas explorari ualeat.

De aquę facultate. Cap. 4

Esto sanē prima nobis in contemplationē posita aqua; q̄ nimirū ea & cōmunissima hominibus omnibus sit, tum sanis, tum ægrotis, & ad uitam maxime necessaria. Primūq; euacrat, siue tēperato corpori applicator ipsa neq; frigida insigniter neq; calida: Deinde ijs qui natura sunt intemperati: Tertio, his qui ex affectu intemperiam habent. Nam hoc pacto exacte in omnibus propria eius facultatē perpenderis. Igitur tēperato admodum plusculo tēpore, ipsum omnino refrigerabit; in

temperato uero, citius quidē refrigerabit id quod frigidius natura fuerit, tardius uero quod calidius. Semper autē omnia refrigerabit, etiā si nō multis deinceps diebus, sed uel una quis hora, aut pluribus ea utatur. Nec em̄ talis in ullo omnium calorē reuocare poterit. Nam quae summe frigida est, si quadrato ac iuuenili corporis naturā paulculo tempore adhibeat, calorīs molietur reuocationē: Sin aliter utaris, semper refrigerabit. Quin etiā si ijs quoque, qui simplici laborat morbo, siue calido tepere, siue frigido, eiusmodi admoueat aqua, hos etiā manifesto refrigerabit. Nam simplex sit affectio, oportet, quae admodū utiq; in tertio De Temperamentis definitū est, quō uidelicet quae adhibetur, ex sua natura refrigeret, nō ex accidente quopiam: quippe cum frequēter, ubi cōpositus fuerit affectus, aliud primario medicamento efficiat, aliud ex accidente eueniat: uelut in phlegmone. Est enim ea affectio calidae copiosē fluxionis soboles. At quae modicē exalfaciūt pharmaca, cū superfluitatē euacuat, protinus, opinor, & quod affectum est, frigidius efficiunt. Verū cum simplex unaq; fuerit affectio, quod ex accidente fit, in ea prouenire nō potest. Ergo si hac ratione expēdas, aqua potabilis undiq; uidebitur frigida. Nō est tamen eadem aliarū aquarū, quae sulfur, bitumē, aut nitrū qualitatibus suis referūt, facultas. Si quidem earū omnino nulla, ubi aliē tum caliditatis, tum frigiditatis natura adhibita fuerit, frige facere conspicit. Quin immo nec marinā ipsam priusquā adscititū frigus summū acceperit, admodū refrigerare apparet. Nam si quis in potabili aqua totum diem innatet, ut etiā non admodū sit frigida, sed uelut ex sole tepens, necessario tamen refrigerabitur. At mare cōplures iuuenū interdum pertulere nō per diem modo totam, sed etiā adiecta nocte. Ex quo liquet, aquā potabilem certe & dulcē, secundum naturā suam semper esse frigidā: mare uero non aequē. Quod si non semper in sermone adiciam, potabile, sed dicā simpliciter, quantum ex se est, aquā esse frigidā, haud calumniari oportebit, tanq; insufficienter & indistincte locutū. Nam quae exacte ac syncere aqua est, omnis alterius substantie mistione uacans, ea ex necessitate ex sua facultate est frigida. Si qua uero per bituminosa, sulfurosa, nitrosa, aut aluminosa loca distillās, substantiae eius aliquid absterferit, secūq; traxerit, mista iam ea est, non autē exacte aqua: uelut si ipse quoq; uolueris aut salem, aut alumē, aut aliud id genus affatim aquae miscere potabilis, sicut sanē sepe numero facere cogimur in marinā inopia, quādo muriam facere uolumus. tunc em̄ salem aque indimus: ac tantū ipsa facultate iam dissidet, ut si aqua dulcis, uidelicet quae neq; insigniter aut calida aut frigida sit, sed uelut ex sole tepida, erysipelati affundatur, noxā omnino nullā hominis corpori sit allatura. At si marinā aquā, aut muria, aut id genus aquam mistā, bituminosam uidelicet aut sulfurosam admoueas, usque adeo hominē offenderis, ut partē ipsam sis adurusus. Aqua igit ipsa ex se frigida est facultate. Porro si extraneā caliditatē adeptam

Galēn.

A corpori humano perfundas, putabis forsā simplex quoddā & naturae adhibitu medicamen: at ea quoddā utiq; modo cōposita est, aut ignea essentia partē aliquā nacta, aut certe omnino ipsam qualitātē. Ut em̄ si salem illi miscueris, ex cōfesso fuerit cōposita: sic multo magis si ignea aut essentiam aut qualitātē adieceris, cōposita quodammodo esse ceris. Est porro etiā aqua limosa quadantenus cōposita, uelut est aqua Nili, & quae in Aegypto efficit. Sed ea per fistula uasa per colata, planē per aqua efficitur. Oportet autē nō semel, aut bis, ter ue percolare, quando ne sic quidē forsā adamusim puram queas efficere: uerū quando qui aquae infertur limus, omnē effugerit sensum, satis tunc est ut queas dicere, tales, ut ad usum eiusmodi, puras esse aquas.

Quo pacto iudicemus aquam puram. Cap. 5

B Iudicatur autē haec tribus sensibus, nempe gustu, uisu, & odoratu. Gustu pura est, si nullam offerat qualitātē, sed exactē qualitatis experta appareat. Visu, cū syncera fuerit, ac plane perlucida. Sic nec odoratu ullā praese ferre qualitātē debet, ut sunt quaedā extranea prauitatis, quae aut aciditātē, aut acrimoniā, aut falsedinē, aut putredinē, aut aliud indicibile aliquid uisui praesertūt. Igitur aqua quae absq; his est omnibus, ut ad naturā suam certe, ne ipsa quidē adamusim syncera fuerit, sicut nec aliud ullū elementorū sensibilū, sed ut ad sensum & usum syncera est. Talis ergo, ut est propositum, secundum suam naturā frigida est. Quippe si ualde exalfacta non modo aqua, sed uel mandragorā, uel altercū, uel cicutā, uel meconiū admoueris, nō solum exalfeceris, sed etiā uiseris corpus humanum. Omnia itaq; quae examināda ueniunt medicamina, omīs extraneae ualentisq; tum caliditatis, tum frigiditatis, aliena sunt, nedum aqua.

Demonstratio, qua ostendatur aquam frige facere ex ceratū, quod ex ea conficitur, effectum. Cap. 6

C Porro quod aqua omnis dulcis perspicuo frige faciat, hinc quoq; didiceris. Ceratū liquidum si ex aqua frigida subactū accurateq; madefactū calido affectu imponas, protinus ipsum frige facies. Oportet autē quamplurimū admiscere ipsius aquae: mistioq; hoc maxime modo optime perficitur. Ceram quantum fieri maxime potest purissimā oleo liquante liquidum facere ceratū oportet: deinde refrigeratū, ac derafum, in mortario manibus subigere, aquam affundendo frigidam, quantum nimirum ceratum accipere ualet, ac nondum aqua distuat. Id refrigerat & eos qui in febre utuntur, si hy pochondrijs superponatur, & omnem phlegmonem: similiter herpes quoq; & carbūculos, tum erysipelata, & phygethla, ac breuiter omnes morbos calidos. Ergo si non aquā dulcē, sed marinam aut muria illi admisceris in uno praedictorū quouis uti uolueris, non parua omnino differentiā conspicies: quippe cum id medicamento adeo nullam propositarū affectionum amplius refrigerabit, ut insuper accēdat potius. Adeo multa est diuersitas potabilū aquarū, & muria seu maris: similiter uero & earum quaecunq; sulfur, aut bitumen, aut nitrū, aut chalcitū, aut

rom. 5

a 3 ut sim

ut simpliciter dicam, quæ calidorum natura medicamentorum gustu aliquod referunt. Inimicæ enim sunt omnes calidis corporum nostrorum affectibus. Ex quo claret, has omnes facultatibus esse calidas, solam vero aquam potabilem frigidam.

Quod aqua potabilis humida sit. Cap. 7

Cæterum quod hæc quoque propositarum omnium aquarum sola sit humida, planè ex eadem discis methodo. Nam ulcera quæ supra modum squamida siccaque sunt, si hac iriges statim admodum humida molliaque reddes, cum aliæ aquæ uniuersè ulcera deficiunt. Tum piscatorum ulcera adeo uidentur sicca, ac si forent salita. Contra eorum qui in balneis uersantur, humida apparent ac mollia. Quin si in butum linamentum ulceribus impone re libeat, humida quidem à potabili, sicca à muria marinaque reddi comperies. Aquæ quin etiam aluminosæ, quales sunt in Italia uocatae Albulæ, cum alijs ulceribus idoneæ sunt; tum uero quæcunque fluxionibus tentantur, ea per facile deficiant. Sic nec cæterarum aquarum ulla humectare potest, quod uidelicet non sint exacte aqua, sed mista & adulterata, accepto nimirum aut alumine, aut chalcitide, aut sale, aut id genus aliquo. Quo circa eorum nonnulla ulcera quoque exasperant, nempe quæ acres admodum sunt & mordaces. Quinetiam sitienti dulcis aqua remedio est: cæteræ uero acerbiores etiam sitim relinquunt. Tum aqua inter cutem laboratibus aduersissimè est & poculum, & lauari aquæ dulcis; salis uero, ac nitoris, & sulfuris, bituminosarumque omnium sanè perutile. Imitari autem potes sicut marinam, sic aliarum quamlibet, substantia uidelicet admista quæ in quæ uincere conspiciunt. Nam sulfure in aqua dulcem indito, sulfurosam effeceris; alumine, aluminosam; ac eodem modo aliarum unam quamque.

Quod aqua aduentitium calorem nascit, semper quidem humectat, non autem semper calcificat, uerum in ipso quidem perfusionis tempore calcifcere, postea uero frigidificare consuevit. Cap. 8

Hæc ergo propria aquæ natura humida est & frigida. Porro aliunde calorem adepta, ex calcificat quidè & humectat quibus est admoda: uerum haud similiter ambo præstare potest. Summe namque humectat seu tepida sit, seu temperata, seu etiam calidior. Summe autem non calcificat, nisi quæ extreme ferueat. Quod dico, in temperata primum explorems natura. Igitur si huic aquam afferas temperate calidam, eaque uel laues, uel partem aliquam identidem perfundas: in ipso quidem perfusionis tempore calidiorum simul & humidiorum efficies: quod si deinde quiesces, nec corpus frigidæ usu postea contrahas, conspicias ac densabis, paulo post seipso frigidius relinqui conspicias: quippe cum corpus rarefactum transpiratè immoderatus calore natiuo, frigidius efficiatur. Non tamen sicut frigidius postea calidæ usus corpus destituit, ita & siccus. Quamque profecto uideri id possit, tum ob spiramentorum raritatem, tum ob corporis mollitè, tum ob substantiæ fusionem: plusculum siquidem in ijs affectibus euaporetur necesse est. Atqui uapor

humor est extenuatus. Verum non ita habet rei ueritas. Nam mollities, quam calidæ aquæ lotionibus, acquirunt corpora, solius humiditatis propriæ ac inseparabile signum est, in animantis uidelicet corpore: uelut in opere De temperamentis est demonstratum. Sanè indicio esse potest ulceratarum partium caro, quæ id ipsum perspicuo ostendit, ut quæ in istis ex aqua calida perfusionibus, mollis atque algæritu fluida efficitur. Quamquam sanè corpus illiusmodi affectionibus inanitur, ut minus tunc in sese habeat humoris quam antea. Viderique uentia digni possunt, qui per calidas lotiones, atque aquæ moderate calidæ perfusiones siccati corpus existimant. Nam similis horum est error, atque illorum qui credunt senes adulescentibus esse humidiores. Pluribus namque senes excrementis redundant, sed similes ac genuinæ (quæ περιουσία μοιρα nuncupant) organicæque partes adulescentibus magis sunt humidæ: ut id quoque in secundo De temperamentis monstrauimus. Perinde se res habet in perfusionibus, ac laucris, omnique adeo ex aqua calida irrigatione. Si quidem humores qui in uasis alijsque communibus spatijs sunt, exhauriuntur omnes: at ipsa uasorum corpora, & uniuersum genus carnosum seipso sit humidius. Atque hæc solam facultatem nunquam aqua deponit. Neque enim cum feruens corpora exurit, quæ uita sunt redduntur sicca, uti quæ ab igne sunt assa. Rursum nec cum summam adeptam frigiditatem per diem totum, aut etiam longiori tempore parti cuiuspiam perfunditur, eam sicciorum efficiunt, tamen si rugosa atque admodum exilis relinquitur. Verum hæc eueniunt, quæ qui in uasis alijsque spatijs est humor, exhaustus sit, at partes genuinæ solidæque nulla sui partes sicciores euadunt. Huiusque semper meminisse oportet, tum toto sermone perpetuo obseruandum: ex euidenter apparentibus colligendum cuiusque medicamenti facultatem: Ac semper ad quod quid dicitur calidum, frigidum, humidum, aut siccum, ad id esse æstimandum.

Si à rebus cæteris de medicinarum facultate colligi quid oportet, ex ignis cum illis commercio faciendum esse iudicium. Cap. 9

Porro si quis uelit ex superabundanti à rebus externis probationes ducere, ne id quidè prohibeo: uerum animum diligenter aduertat consulo. Nam admodum lubrica res est, nec paucos obtinet fallendos modos. Sed has in consequentibus edisserat. Cæterum quod solū quis à rebus externis sumpserit, ut id quod iudicium subit medicamentum, aut ex calcificat, aut refrigerare probet, id in ignis commercio contactuque conspiciunt. Neque enim usque adeo absurdum est, quod facile in ignem uertitur, id calidum facultate putare. Memoria enim, opinor, tenemus omnia huius uocis Facultas significata, quæ in tertio De temperamentis definiuimus. Vnum igitur ex ijs erat & id, quod ex propria eius quod dicitur, materia, tale est facultate, siquid enim facile in ignem uertitur, id facultate est ignis, non actu scilicet. Nam hoc quod est Facultate, ex aduerso ei opponitur quod est actu. alterum uero quod est per se, ei quod est ex accidente. Hanc ergo iudicij

rationem considerare ac distinguere conuenit.

Quot & quæ prædesiniri oporteat, ut liceat ex alioquæ affectione quæ ad ignem est, & quo pacto aduersum nos id ipsum afficitur, colligere Cap. 10

At quibus consilium est tuto à rebus extraneis ad corpora transire animalium, uidere primū debent, an tenuis sit essentia, an crassa, quod explorandū uenit. Secundo, an sibi continuū, densumq; ac solidum, an interuallis interceptum, ac rarum. Quocirca his immorādum prolixius est. Videtur enim id quoddam esse principium, ac uelut elementum quoddam considerationem postulans.

Quod quæ subtiliorum sunt partium, promptius propria excitant actionem, q̄ quæ crassiorum, tamen si eadem cum illis facultatem obtineant. Cap. 11

Igitur eorum quæ in confesso est facultate esse calida nullum omnino apparet nos excalfacere priusquam in tenuia sit cōminutum. Nam si quis piper solidum cuti inspergat, nullam planè caliditatem percipiat: eadem ratione si quis uel linguæ imponat, aut deglutiat, aut alio pacto utatur integro, haudquaquam diligenter trito, & cribrato, ac nō adeo comminuto, ut pollinem tenuitate referat. Nam quod pollinis instar cuti inspergitur, excalfacit, ac maxime si affricaueris: præterea quod linguæ admotum fuerit, aut in uentrem deuoratum. At quod solidum integrūq; imponitur, nec cutem calfacit, & linguæ uentriq; exiguum duntaxat caliditatis sensum mouet. Itaq; cū tenuium esse partium dicantur quæ facile in tenues partes cōminuuntur, solidarū crassarumq; partium quæ contra: tum dura uiscosaq; ægre ac difficulter, aut omnino in tenues cōminui nō possint: fragilia uero, & quæ citra uiscolitatem mollia sunt, prompte in tenues foluantur: hinc consistat arbitror, multa esse facultate calida, ac facile accendi, uerū nos haud facile excalfacere. Nam ignis, ut qui omnī est tenuissimus, simulq; calidissimus, & in profundum facile penetrat, & cōminuit, & uincit, extenuatq; atq; in suam deniq; naturā cōuertit, unde quæq; scilicet cōtingens, & quod cōtingit exuperans. At nostra caliditas supra q; crasse sit essentia, & haliturosa, insuper infirma est, ut non facile mutet quod cōtingit. Ostēsum est autē in tertio De tēperaturis (quo sine, quæ hic dicunt, assequi est impossibile) nullum eorum quæ nos excalfacere apparent, perinde ut ignē posse calfacere, uerum ut materiam accendi facilem. Si quidem mutationis principium à nostra caliditate accipientia, ut calami aridi ab igne, nos contra recalfaciūt, & uelut partes sūt quædā caloris natui, sicut illi ignis. Nam quod prius erat calamus, id nunc sit ignis, ut etiam mutatis ipsum ignis essentiam totam adaugeat. Monstrauimus autem quædam ubi uel leuem fuerint mutationem adepti, secundum naturam deinde suam ad plurimam mutationem procedere. Quamobrem mirandum non est si quædam medicamenta primæ quidē mutationis principium à nostro calore nata, inde iam pergant eum quoq; qui mutabat superare. Nam cum corporis cuiusq; proprietates alia habilis sit ad suscipi-

endum calorē, alia inhabilis: sit ut paria principia non sequatur per incrementum.

Quod pharmaca, quæ paruum sortita sunt molem corpoream, magis agant quam quæ magnam. Cap. 12

Quinetiā q; corpus admodū exile facilius alteratur, mutatq; ab eo cui admotū est: qd autē grādius est, non nisi tēporis spatio, ac uix tandē etiam sensibilem alterationem sustinet: id cum non modo à physicis naturam scrutantibus sit demonstratum, sed euius etiam homini rei ipsius experientia notum, satis magnum adfert testimonium ijs quæ modo dicebamus. Quippe si piperis particula à nobis accipere debent mutationē, eoq; accipiant facilius, quod fuerint minutiores: mirandū non est, si eas tanto citius excalfacere experiamur, quāto accuratius in minimas fuerint comminutæ.

Medicamenta parum etiam sortita tum facultatem, tum constantiam, quanto rarioribus applicentur corporibus, tanto ocus actionem suam exercere. Cap. 13

Quinetiam quod extima cutis superficies callosa sit duraq; & frigida, tum quod sub ea est, quanto profundius subeas, tanto sit calidius, nemo ambigit. Huic sanè rationi si duo etiam principia in alijs à nobis tractationibus demonstrata adiecero, ita denique uniuersum possis colligere. Alterum quidem ad demonstrationem principiorū, siue lemmatum, siue axiomatum, siue propositionum, siue utcumq; nuncupare libebit, in commentarijs De tēperaturis demonstratum est: cutē uidelicet omnem in primo statim ortu sibi esse continuam, ac temporis spatio perforari, ac plurima nancisci spiramēta, ritu cribrorū. Altera utilium ad ratiōinationē propositionū est, corpus uniuersum expirabile esse ac inspirabile, ut inquit Hippocrates. Fusius autē de hac dictum est in libro De usu pulsuum, ubi monstrauimus artērias, ubi se dilatantes undiquaque, & per omnes meatus attrahunt, non aerem modo halitumq; attrahere, sed quicquid trahi etiā facile ac tenuē sit, ad spiritalis essentia motum impetūq; expedite consequi. Quibus sic se habentibus, multæ uenæ arteriaq; aperitūtur in cutis meatus & in ipsius superficie internam: ac in meatuum perforatiōes haud pauca peruenire uenarum arteriarūq; oscula existimandū est, nihilq; secius ad extimam superficie, ita ut ipsæ osculis ibi finiānt: tum quicquid piperis ad exactissimū redactum fuerit pollinem, simul cum ambiētē aere ab arterijs attrahit, ipsumq; protinus à calore natuo alterari, idq; tū ob paruitatem, tum ob ingenitam ut à calore alteretur aptitudinem. Si quidem haud aliud illi erat facultate esse calido, quam facile posse incalfacere. Quod si semel id illi insit, non mirū est, per omne corpus tēpore perlatur, ipsum recalfacere: ac proinde primum maximeq; ab id genus medicamentis incalfescere partes quas primum contigerint, deinde quæ hinc sunt proximæ, & continentes: ac sic deinceps tertio quartoq; loco, pro situs uidelicet uicinitate, cū ea quæ primo incaluerat, incalfescere. Hęc sciēntifica cōstant demonstratiōne, non tamen ijs satis credibili, qui in primis non fue-

rint exercitati. Oportet em̄ in ijs quæ De elementis sunt ratio cinationis esse uersatū, atq; in cōmentarijs De temperamentis, & usu pilosum, & ante hæc omnia in demonstrandi methodis peritum. Sanè paucis datum est omnia percurrere. Verum his quidem suffecerit (mea sententia) in euidentibus duntaxat uersari, paucis attachis cōmunibus rationibus siue epilogifmis. Itaque causam quam obrem non excalescunt corpora humana ea quæ crassa adhibentur, etiam si natura sint calida, ijs duntaxat qui rationē assequi ualeant, dictā esse reputent, sibiq; satis esse persuadent, quod euidenter sensibus apparet. Apparet aut̄ euidenter craforum omnium nullum prius quam ad unguē cōminuatur extenueturq; neq; ipsūm ad corpore nostro quicquid perpeti, neq; rursum in nos posse agere. Nec enim solum in pipere, sinapi, canchry, ceterisq; omnibus quæ nos excalescunt, ita se res habet, sed æque item in facultate frigidis. Nam si quis radicis mandragoræ corticem in magnas partes contra ctam cuti imponat, aut illinat, aut deglutiat, planè nihil efficiet: at si admodū sit cōminuata, refrigerare potest. Sic etiā papaueris semen, & cicuta (tametsi hoc sit cōminuatur refrigerantium ualentissimum) tamen antequā exacte cōminuatur cuti nostræ impositum, planè est imbecillū. Ne te ergo magna teneat admiratio, quod calami aridi pilisq; tametsi accendi promptissimi sunt, non tamen nos cōtactu excalesciant: quippe qui planè à nostro calore mutari nequeant, ut sic recalcifiaūt: q̄ uidelicet pollinis ritu cōminui non ualeant: quādoquid calamus Indicus, quem & odoratum appelliant, cū tundit, cribrari, ac planè magis quam qui apud nos nascitur cōminui ualeat, clare nos excalescere conspiciunt, sicut uno ore omnes qui ætate nobis maiores sunt medici, consentiunt.

Quod corpora rariora citius ab igne accenduntur, quam quæ sunt spissiora. Cap. 14

Porrò considerandū est (quemadmodum proposui) nō solum crassarū sit partium, an tenuium, explorandorum medicaminū substantia, uerum etiam rarane, an spissa densaue. Voco sanè rarum, cuius partes spatij inanibus intercepte sunt. Inteligentibus uidelicet nobis, ac semper recordantibus, quo pacto dicatur spatium inane ab ijs qui unitam esse dicūt substantiam: non quemadmodum Epicuro et Asclepiadi est uisum: Imo aere plenum est in raris corporibus spatium inane. Vbi ergo eiusmodi spatij multis corpus fuerit distinctum, facilius quam spissum accenditur, etiam si quod ad caliditatis frigiditatisq; attinet temperiem, similiter illi sit affectum. Nā qui in ijs spatij cōtinetur aer, cum sit ad patiendum promptissimus, primo statim ignis occurſu accenditur atq; inflammatur: unā uero secū corpus uniuersum accendit, unamquamque eius partem nimirum occupans. Ergo si parua corpora, cingente ea circumquaq; flama, promptè accenduntur (nam id clare conspiciamus) non sine ratione corpus rarū celeriter accenditur, utpote cum profundas eius partes omnes flama cōtingat. Sic itaq; calamos aridos ignis celeriter ex-

urit, tametsi minus sint alia substantia calidi, idq; ob meatuum multitudinem, quos aer quidem occupabat: ubi uero ignis contigit, flamma depascitur. Aer enim accensus, flamma est; terra uero, carbo. Porrò q̄ aeris plenus meatus multos aridos calamos obtineat, summū argumentum esse ipsius leuitas, Nam sicū natura corpus leue esse alioqui nequeat, nisi inanitate sit præditū. Eundē in modum pumex & spongia sicca, atq; omnia a deo quæcūq; fistulosa sunt, multumq; uacui obtinent, pondere sunt leuia. Sic sanè & calamus non eo duntaxat quod siccus est, sed quod plurimū aeris est: particeps, promptè accenditur. At à nostro corpore ægre profunde calferi potest, quod essentia sit crassa. Quando igitur medicamenti cuiuspiā ex ignis commercio temperiem colligentis, scrutari litatumus, an aduersum nos eodem modo se gerat, substantiæ eius respicienda constitutio est. Nam si tenuis quidem sit, sed cōtinua, eandem & in nos natura ostendit, quam prius in ignem. Sin autem rara sit & crassa, fieri potest ut ab igne quidem per facile alteretur, non tamen à calore nostro, ac proinde nec nos recalcifiaūt.

Aquam tenuium esse partium, nec unquam nos ex sua natura excalescere. Cap. 15

Posteaquam igitur hæc cum in modum definita sunt, rursum ad sermonem de aqua redeamus. Nam quod tenuis sit essentia, argumēto est quod promptissime per pilos & uestimenta persuat. Nam propter humiditatem molliemq; quæ nihil habet adiuctum uiscolitatis, diuisibiles partes obtinet, & quæ facile in minimas possint distrahi, Talis cum sit, tamen neq; nos ex sua natura calfacit, neq; propriū est ignis nutrimentum, immo omnino contra aduersatur, & dissidet, atq; extinguit, ut quod illi sit aduersissimum. Nec mirū est, si cum igne natura tum calidissimo, tum siccissimo, pugnet aqua, quæ frigida est & humida. Coniectura quidem igitur ex ignis sumenda commercio, quo pacto quodq; medicamentum in calore frigoreq; se habeat: non tamē protinus existimandum, tale ad nos uideri, nisi tenuium sit partium, & spissum. Sic oleum tametsi facile in flammā uertitur, non tamen admodum celeriter nos excalescit, nimirum lenta crassaq; substantia sua tenaciter ijs inhaerens quæ primum contigit. Proindeq; longissime omnibus perdurat quibus fuerit illitum, scilicet nec ab ambiente facile aut extenuari aut digeri potens, nec intro in corpus promptè transum. Aqua uero e contrario et celerissime in halitum soluitur, atq; expedite digeritur. Proinde etiam si in idem uas cōiectam aquam oleumq; decoquas, priōr tamen aqua absumitur. Sic item si lithargyro, aut cerussa, aut id genus aliquo cum aqua diligenter commisto simul ambo decoquere uoles, priōrem digeri aquam experiere.

Non simpliciter quod citius ab igne accenditur, id ad nos quoq; apparere calidius. Cap. 16

Non ergo simpliciter quod citius accenditur, protinus ad nos apparet calidius. Siquidem ante ostensum est, ut calefacientium aliud simpli-

citer erat calidum, ut ignis: aliud exsuperantia calidum, uelut qui in nobis est calor: sic eorum quæ facultate sunt calida, aliud esse eiusmodi, ut ad id quod primo et absolute est calidum, aliud uero ut ad id quod per exuperantiam dicitur. Quamobrem non absolute ab ea quæ aduersus ignem est in iudicium uenturum medicaminum dispositione, ad nos tranfire expedit, sed adiecta limitatione proposita.

Non quod citius a frigore congelasit, eo quod tardius, absolute frigidius existimare licere, sed inter ea quæ parent sortita sunt consistentiam. Cap. 17

Eadem hæc limitatio itidem necessaria est, quando ex eo quod quid facile congelatiatur, frigidum esse colligimus. Num in ijs quæ eandem habent aut tenuitatem aut crassitudinem consistentiam, quod ocyus a frigore congelatur, temperamenti est frigidioris. Nam si alterum sit tenuius, puta exempli causa uinum: alterum crassius, ut oleum: non est necesse aut citius, aut magis concrefcere quod est frigidius. Verum si quanto alterum est frigidius, tanto alterum quoque crassius sit: similiter ambo con crescent. Cæterum magis concretum uideatur, ipsa uidelicet consistentiam duritia; quod fuerit essentiam crassioris. Nam rationale est, reor, similiter congelatorum quod crassioris fuerit essentiam, itidem fieri durius. At si uel alterum plus sit frigidius quam reliquum essentiam crassioris, aut contra minus frigidius quidem alterum, sed alterum crassioris essentiam, haud etiam pari tempore hæc congelascere est possibile: uerum quod plus sit frigidius quam alterum essentiam crassioris, minori temporis spatio: quod uero minus est frigidius quam reliquum essentiam crassioris, maiori. Sic etiam magis minusque alterum uideri durius, id pro excessus portione euenire est necesse.

Quo differat congelatio a refrigeratione Cap. 18

Hæc ergo memoriam mandare oportet, tum quod non idem sint congelari & refrigerari, & quod illud maxime a refrigeratione proueniat. Nam refrigerari est frigidum accipere qualitatē. At congelari est durefcere præ frigore. Ergo quæ cuncta corpora tenuis sunt essentiam, cum facile per petiantur, prompte tum incalescunt, tum refrigerantur, at non æque prompte congelant, ut aer & ignis. Nam hic planè non congelatur: ille autem, nempe aer, non perinde ut uitrum, ut pix, ut cera, resina, bitumen: tamen si bitumen sit uel calidissimum: uerum essentiam eius crassities ac terrenitas, ad congelationis celeritatē adiuuat: ac si terigeris calidum etiam non planè tamē congelatum reperias: sicut (puto) & plumbum & stannum non aliter concreta sunt etiam non seruescentia. Sic a quæ Hippocrates, quæ celeriter & incalesceret & refrigeraretur, semper esse leuissimam reulit. Nam quanto tenuior fuerit, tanto pati promptior est. At qui quæ tenuior est, minimum habet limi terrestris. Non ergo absolute, nec temere ex materia passionibus ad ignem consistere eius ad nos facultatē oportet, uerum ad iunctis limitationibus suprapositis. Quare nec æque securum iudicium, quæ id quo ad nostrum corpus quid examinamus. At qui hoc etiam ulterius tran-

seunt, planè in multis errorum periculis uersantur. Quamquam id faciunt medicorum complures, alij omne quod uiscosum est, calidum afferentes, alij quæ quid adstringit, nonnulli quicquid est dulce, quidam uero etiam quod austerum acerbumque est. Sicut autem qui singulis illorum contraria defendant. Sed qui in istis errores comitantur, postea narrabo. Nunc autem presentem sermonem consilium est absolute re, nempe ut si quis ex ignis commercio materiam iudicare uolet, non absolute, neque citra limitationem id faciendum, neque perinde ad ignem & hominem habere quicquid iudicatur, putandum. Nam aqua igni aduersissima est, ut quæ facultatē sortita est frigidam & humidam. Muria uero, marina, bituminosaque & sulphurosa aqua, non æque: quippe cum id genus omnes ab aqua ad calidius recesserint. Verum de sponte natis aquis (Græci *αἰὲς* uocant) uel hæc sufficiat. Si quidem ubi medicaminum uisus fuerit, quorum qualitates accipere aquam ostensum est, sermonem singillatim tractabimus: si nunc aut obscurius quippiam aut imperfectius sit dictum, id tunc adijcietur.

De aceto.

Cap. 19

Sed ad reliqua nunc liquidorum medicaminum transibimus: inter quæ uel maxima est controuersia de aceto, alijs frigidum, alijs contra calidum adstruuntibus: nonnullis calorem quidem quandam illi concedentibus, sed quandam etiam aufertibus, uelut qui acetum uinum esse mortuum asserunt. Nam hi propriam uini caliditatem perdidisse quidem, uerum ex putredine assumpsisse aliam quandam contendunt. At ego sanè non multum abest, quin illorum laudem sententiam, in eamque prompte accedam, proque hac assertionem atque opinionem pericula omnia subeam, si quam machinam aut artem inuenire queam, sicut in lacte contrariarum partium separationis, ita hic quoque. Nunc autem quod lac uniuersum non sit homioemeres & similare, neque undequaque sibi idem, clare monstrat coagulatio, excogitata uidelicet multis hominibus. ratione, qua partes caseosæ a serosis separari possint. At qui neque tale quid reperitum est, neque manifesto demonstrare possit, quantum eius est tenue, atque exacte humidum, refrigeret: quod uero secundum fecis substantiam in eo defertur, uelut in uinis, caselesciat. Nam ea solum ratione aperte quis probauerit, ex contrarijs ipsum partibus consistere, sicut lac. Sanè in omnibus liquoribus, quos exprimitur, fructibus cõficiunt, crassum defertur quippiam, quod temporis spatio subsidit: fex uocatur in uino, in oleo autem amurca. Sed & in omnibus alijs inest quod illis proportionem respondet, tamen si proprium nomen sortitum non sit, quod uelut fex est in illis. Vtique & in aceto est eiusmodi quippiam, & forsitan ipsum est quod caloris est particeps: quod uero frigoris, id quod tenue est. Fortassis uero & in ipso tenui exiguum quiddam defertur multo tempore preparatum, alterius naturæ quam ipsum sit totum. Nam quod maiori parte frigidius sit quam calidius, liquido ijs apparere arbitror, qui uere facultatem eius expenderit.

Perperam multos cauterij instar acetum pronunciasse calidum. Cap. 20.

Nec satis mirari queo, qua ratione ducti quidam, usque adeo calidum esse acetum pronunciarint, ut cauterio ipsum assimilarent. Nam hac inquit, ratione sanguinis eruptiones (*αἰμορραγίας* Græci uocant) reprimunt. Primum enim tanta caliditas sensum nostrum non fugeret. deinde ad illorum calidorum imaginem omnino utiq; crustam efficeret, calidis medicinis similiter. Nam id planè cōspicuum, ubi per ea sanguinem sistere statutum est, crustam relinqui haud exiguam. Si quidem nisi crustam effeceris, sanguinem haud represseris. Nam ea uelut operculum fit corporibus sanguinem profundentibus. Proinde sanè etiam cauteria planè candentia illis applicare consueuimus: compertū nimirum habentes, quæ non sunt eiusmodi, præterquam quòd nihil proficiant, insuper lædere, ac sanguinis profluuium irritare. Nec sanè ignis ex sua ratione, aut quòd calfaciat, ipsum sistere potest: uerum idcirco, quia cū urit quæ congerit, quod ex uisione reliquum est, operculum subiectis partibus relinquit, id quod Græcis appellari consuevit *ἐγχερα*. [Latini autem crustam uocant.] At acetum haud perinde ut crustam facientia medicamenta, sed potius ut adstringentia citra crustam, sanguinis fluores cohibet. Itaq; hac quidè ratione nō excalfacere, sed refrigerare putetur. Prestat tamē, ut & supra monuimus, a talibus coniecturis recedere, utpote quæ iudicium ad sensum haud referant, neq; ex prope positis aut uicinis, sed è longinquo & longis lemmatis siue summionibus rationem colligunt. Aperiā autem copiosius illarum absurditatem in libris sequentibus.

Qua methodo cognoscere liceat, an calidum sit acetum. Cap. 21.

Nos autem secundum methodū, siue rationem ab initio positam, uim eius experiemur: primum in ijs quibus in culpa tanta constat sanitas, mox in intemperatis, deinde & in agrotantibus. Itaq; spongiam aut lanam aceto madentem cuius sani corporis parti superponemus: deinde, ut ante est positum, protinus rogabimus, id est uis scilicet, atq; ex plebe aliquem (nam illorum in istiusmodi incorruptum est iudiciū, quia nulli uidelicet dogmatis feruenter sunt addicti) nunquid calorem, an frigus percipiant. Id uero satis constat, qd illud nec summe frigidum, nec calidum admouebimus. Nam et de hoc supra uerba fecimus. Sanè si tale fuerit qd applicatur acetum, potissimum si non admodum inueteratum, neq; extreme acre, manifestum principio frigus percipiēt, itidem & post unam, duas, tresue horas: postea uero, post sublationem scilicet, sensum nascentis in parte caloris phantasiam ac opinionem habebunt. Porro si uehementer acre acetum extiterit, & hoc etiam refrigerari se principio dicent, celeriter tamen recurrentem calorem sentient, non autè longo post tempore, uelut in recentiore, ac non ualde acri aceto. Ex quibus constat, omnino frigidū quidem esse acetum, sed quēdam etiam obtinere calorem, qui acrimo-

nia ratione per accidens spatio temporis medio-criter corpora excalfaciat, tamen id non ubique, sed in quibusdam duntaxat possit efficere; nam laxis ac doloris expertibus tumoribus, neque protinus, neq; postea caloris sensum acetum usus commouet: mordacitatio tamen in illis quēdam percipitur, ob quam sæpenumero ijs qui diutissime utuntur, tenuis quidam recurrit rubor. Itaq; neq; primario, neq; proprio ordine excalfacere uideri possit, sed acrimoniæ morfu irritare. Porro quando quidem à sanis corporib. ad affectus semel delapsi fuimus, suggeramus quæ in calidissimis & frigidissimis affectibus efficere queat. Ergo si quis ab illita thapsia uratur, ardor aceto restingitur. Id quod, cui libitum est, experientia discere licet: uelut nos profecto fecimus in nobis ipsis, quòd accurate medicamenti potentiam experiremur. Illitis enim multis in locis tibij, ubi post quatuor, quinqueue horas inflammari cœpissent, huc quidem parti acetum, illi aquam inspersimus: alij uero oleum, alij rosaceū inunximus: & alij atq; alij alia atq; alia, quæ aut acrimoniam hebetare, aut calorem refrigerare creduntur: sed eorum omnium acetum compertum est efficacissimum. Quocirca manifestū est, non eo quòd acrimoniam, ac mordacitatem obtundat, sicut oleum & rosaceum (nam id præstare hæc possunt) sed quia refrigeret, tale esse. Quippe si excitata à thapsia phlegmonas aliter sanare nō liceat, nisi aut refrigerando, aut morsum siue acrimoniam obtundendo, nec alterū præstare ualeat, consequitur utiq; necessario reliquam uim sanasse. Alias porro reliquas calidas passiones omnes, phlegmonas puta, herpes, phygethla, erysipelata, carbunculos, aliàs plus, aliàs minus refrigerare consuevit. Quapropter nisi uehementia illi atque asperitas facultatis molesta inest, haud alio sanè utendum ad refrigerandum foret.

Quibus rationibus sint usi tum hi qui summe calidum, tum hi qui summe frigidū esse acetū pronunciarūt. Cap. 22.

Tametli quidam reperiantur, qui maximum id caliditatis eius argumentum constituunt. Non enim, inquit, neque acre, neque mordax, neque asperum, neque erodens foret, nisi affatim illi inesset caliditas. Nam sicut frigidū esse contrahere ac refrigerare, ita calidū secare atq; diuidere: id quod in primis efficere acetum ualeat: quippe quod secat atq; erodat, non modo animantium corpora, sed & grumos, callos, lapides, sicile, aes, ferrum, plumbum, ac tantum non uelut ignis cuncta peruat ac penetret, nec ulla possit ignis substantia penetrationis eius uehementiam aut sustinere, aut illi reluctari ac resistere. Nam subtile haud secum esse atque ignem, non leui testimonio illi talis esse: quin & gustantibus ita uideri, & per subtilissima uestimenta promptius aqua perfluere, omniaq; exedere, uti paulo supra diximus. Et quidnam, obsecro, aliud ipsum his uerbis quam ignem pronunciat? Non aliter quam qui frigore grumos ipsum soluere contendunt, premendo uidelicet, densando, ac omnia undequaq; stringēdo, ac si quis digitis amplectens cōpresserit. Nā hi rursus adeo ex-

cedunt

cedunt, ut & niue frigidius ipsum adstruant. Sed utrorumque castiganda immoderatio est. Neque enim ut frigidum sit, iam niue frigidius; neque ut calidum, omnium calidissimum pronūciandum est. Si quidem nisi iuxta medium foret, ac longe ab extremorum utroque dissitum, non tanta incidisset de facultate eius controuersia. Nam de cute aut mandragora uiribus nemo ambigit, neque de nasturcij, & canchryos, uerum illa omnibus medicis in consensu esse facultate esse frigida, hæc uerò calida. Eundem in modum altercum & meconium frigida, pipæ & sinapî calida. Ad hæc innumera sunt alia quæ aut esse calida, aut frigida, uino ore medicî omnes fatentur.

Quod acetum neutrum esse dicimus, ut ad summe calida, & summe frigida, quia neutrius extremorū est particeps. Cap. 23

Cæterum acetum, sicut utique & rosaceum, neque esse summe calidum, neque rursus summe frigidum, uel ex ipsa dubitatione satis constat. Neutrum enim horum sit necesse est. Si quidem cum neutra tripliciter dicantur, uti diuisit Herophilus, partim amborum extremorum participatione, partim neutrius, partim nunc illius, nūc huius, omnino & hæc aut aliquo significatorum, aut aliquibus, ex neutrorum natura fuerint. Mihi sanè magis uidetur utriusque extremorum participatione. & quòd nunc sensibilibus calfacere uideatur, nunc rursus refrigerare. Sic ergo neutra dici possint acetum & rosaceum. Quòd si quis ea neutra offendere conetur, quia neutrum participant, ne illi quidem etiā forte probabiles quædam rationes deerunt, sed non erunt demonstratorie ac scientificæ. Id me exacte compertum habere confido, & maxime de aceto. Nam quòd fugè utriusque sint rationes probabiles, tum ijs qui frigidissimum demōstrant, tum ijs qui calidissimum, non paruum iudicium est, ipsum utriusque esse particeps. Admodum tamen difficile est rationi, contrariorum participationem concedere, cum non liceat substantiā eius aut soluere, aut scindere, uelut in lacte facimus, & alijs compluribus, quæ omnia sermonis progressus aperiet. Proinde euidentius magisque periculo uacans principii optamum assequi. Porro ut mihi quidem uidetur, indagandum illud principium est ex natura tum tenuitate, tum crassitie, de qua dictum quidem supra est, uerum nunc quoque copiosius de illa differere expedit, quando quidem & Plato de principijs longum haberi sermonem oportere prodidit.

Quo pacto aerem dicamus tenuium esse partium, & nec omnem ignem esse tenuium partium, nec quicquid tenuium est partium, esse ignem. Cap. 24

Igitur nemo aerem nō dicit esse tenuem, quòd uidelicet in tenues facile partes comminatur, quòdque per corpora delissima expedite penetret; aut si ex alia re quapiam tenuitatis uocabulum illi attribuant, clare nos doceat. Nec em̄ ex corpusculis exilibus, tenuibusque, ut alterius sectæ principer asserunt, & nos quoque aerem constitui fatebimur. Nam continuus est, totusque unus, nihil in se uacui cōtinens. Porro in eiusmodi corporis

natura tenuitas intelligitur ex sola in tenuia diuisionis celeritate. Verū si ea ratioe ignis est tenuis, haud omnis ignis tenuis iudicabit; quippe quum æs, ferrū, lapis, lignum, atque ad eò quicquid in carbonem uerti potest, sit ignis, non tamen quàm aut tea tenuius; flammæ tamē, cū aliud sint ignis genus, re uera tenues sunt. Quocirca nō omnis ignis est tenuis, nec quicquid tenue, protinus & ignis fuerit. Si quidē & pruna ignis quidē est, sed nō tenuis; & aer tenuis, uerū non ignis. Quid ergo tam in pròptu habēt hæcæ propositiōes utraque tū medicî, tū philosophi paulominus omnes, omnē ignē esse tenuē, & quicquid tenue sit, esse igneū? Nam si aeris quis attēderit, animumque diligēter aduertit, haud quæque dixerit, prunā aere tenuiorē. Memoria namque repetamus ambicētis nos aeris puritatem ac partium tenuitatem in uehementi frigore & boreali constitutione, ipsamque cum ferro cōponamus ignito; manifesto enim ex illius modi exemplis cognoscemus, frigidū quid esse quod sit exacte tenue, & calidum quod sit crassum.

Non omne quod mordax est, tenue esse aut calidū. Cap. 25

Quocirca haud cōcedendum arbitror quibusdam, qui acetum ex tenuitate sua mordacitateque calidum esse colligunt. Nec enim quicquid tenue fuerit, id & calidum est; forte uerò nec quicquid mordax fuerit, & tenue. Verum in presens id illis detur; tametsi afferre liceret, niue, boreā, aquam frigidā, non oculis dūtaxat, sed & uulcerib. & raris corporibus omnib. mordacē: ut Hippocrates inquit, uulcerib. frigidū mordax. uerum etiā si quis et illud, ut dixi, cōcedat, quicquid mordax fuerit, esse tenue, non statim & calidū cōcesserit. Itaque nec acetū proinde quod mordax sit, calidum fuerit, sed tenue, uti aer borealis, non tamen calidum.

Quomodo acetū ob scure uideatur calfacere. Cap. 26

Vndenam igitur quibusdā ob scure cuiusdam caliditatis sensus oritur? Fortassis, ut ante dixi, ex contrarijs facultatibus compositum est, perinde ut lac. Forte uerò calor is ipsius reuocatione. Possit autē, cum asperū molestumque habeat transitum, dolorem inde cieri, atque eū in locū calidam elicere fluxionē. Siquidē id palam est, partib. dolentibus quippiam influere. uerum multū influere nequeat; quandoquidē acetum frigidū est, & proinde id quòd accurrit, repellens. At quòd plane tenue est, id medicamēti ansas effugiens, preterlabitur, neque in parte figitur; haud etiā retrorsum, sicut id quod crassum est, repulsum. Sanè ad unguem tenuis quidam efflorescere rubor in partibus ab aceto irritatis conspiciet. Forte uerò alia causa est, quæ comprehendî nequeat. Nam ob id ipsum quod ordinē facultatis explorationem prohibuimus, quia in naturalia incidere problemata necesse est, eaque nō leuib. ambiguitatib. perplexa. Nobis igitur haud statutum est, sicut ijs qui naturam rerum scrutantur, omnes omnium rerum causas exquirere, uerum medicaminū facultates cognoscere, quòd & illis dextre uti, & boni cōpositorū euadere artifices possimus. Nam quod sit impossibile aut probe ipsum medicamentum sit

ponere, aut eo quod ab alio compositum est, idonee uti, antequam simplicium medicaminum facultates pernoveris, abunde in libris tum Decurandi ratione, tum De medicaminum compositione conscriptis ostenditur. Cum ergo is nobis in hac tractatione propositus sit scopus, ubi primum quod ab illis utile est inuenerimus, à physicis problematis recedendum est, quæ innumeris dubitationibus sunt intricata; quippe cū in qua in uniuersum temperatura, aciditas, dulcedo, lētitias, amaritudo, falsedo, austeritas, acrimonia, & aliarum qualitatum singularū provenire sunt natæ, physici uiri scrutari nituntur, hasitationes tum plurimæ, tum maximæ in oratione existere assolent. Has ego non secus uitandas censeo, quàm quædam præcipitæ, cum præsertim ad manum sit uia regîa, qua medicamēta iudicari liceat. Primum quod paulo ante præcepi, perpendendum nullam in ambiguo esse facultatem eorum quæ uehementer aut excalescunt, aut frigescent: uerū de quibus ambigit, neutra sint necesse esse: Deinde pleræque, ut ad sensum simplicia, ex pugnantibus consistere facultatibus. Non enim solum lac, sed etiam sulfurosa, bituminosa, nitrofa, & quæcunque eius sunt generis sponte prouenientium aquarum, ex pugnantium facultatum mistura nascuntur. Siquidem aqua ex sua natura frigida est & humida: bitumen autē, sulfur, mify, chalcitis, & eius generis alia, calida. Meminisse uero etiā oportet, calidorū haud pauca crasse esse essentia, nec pauciora frigidiorū, tenuis: ac secundum hæc principia tutè de medicaminum uiribus pronunciare. Sat igitur fuerit, tenue, refrigeratorium, exiccatorium quæ acetum dixisse, omisissis super illis rationibus nimis physicis, quæque magis ad naturam rerum scrutantes attrinēt. Nam ex illorum scientia, quo pacto alijs medicamentis misceri ipsum licet cognoueris.

Veteres medicos perperam indefinitam reliquisse facultatis eiusdem generis medicamentorum qualitatem. Cap. 27

Quocirca non possum eos non culpare, qui de uiribus eius proluxa quædam nugantur & garrunt: magis etiam paulo minus medicos omnes, quibus curæ nō fuit simplicium omnium medicamentorum in maioris minorisque ratione uires discernere, sed satis eis fuit, hæc quidem, uerbi causa, cal facere dixisse, illa uero refrigerare: tum hæc humectare, ista exicare. Nec enim absolute sic nouisse expedit, sed quatenus phyllium refrigeret, quatenus solanum, aut scandix, aut cerussa, aut portulaca, aut lactuca. Tum quatenus excalescat calia, quatenus cinnamomum, aut amomū, aut cardamomum, aut maiorana. Sic & in humectantibus & exiccantibus pharmacis. nō enim utile est generale solum nouisse, uerum quid primum recesserit à symmetriæ & medio contrariorum facultatibus: deinde quid illi proximum: tum tertium, quartū, quia tumque, si fieri potest, recessum siue ordinē planis limitibus discernentem definire oportet: quando quidem in tali facultatum notitia tum artificialis simplicium usus constitutus est, tum à ratione proficiscens ac methodo compositio. Facitque præter

hæc, ut quæ composita iam sunt, rite usui accommodare possis. Sanè id quidem difficultatis atque laboris plenissimum est, multaque poscens tum diligentiam, tum usum. ab experientia uero auspicari in id genus omnibus necesse est, uelut iam compositum est: tum tutè ac diligenter colligere, ab ambiguis quaestionibus cauēdo. Eoque mirari quispiam possit eos qui talia exquirunt, cū illos implicates sese quaestionibus conscriptis animaduertat, quæ admodum consueuerit Herodotus.

Perperam superioris seculi homines à compositis medicamentis oros eos, eorum que in illa ingredere tur simplicium pharmacorum iudicasse facultates. Cap. 28

Siquidem ab omni uetustissima compositorum medicaminum historia orsi, ad expēdenda quæ in illis sunt simplicia transeunt. Ac quoniam his, exempli causa, calfacientibus medicamentis admissum inuenitur acetum, proinde & ipsum esse calidum contendunt. Neque enim an recte admittum fuerit, constare potest priusquam eius seorsum uim totam perspexeris. Neque si id detur, etiam nota est componendorum medicaminum ratio, per quam iudicantes inueniemus, quæ ratione multis excalescentibus medicamentis unum admiscitū sit frigidum, aut certe refrigerantibus quod calfaciat. Porro, ubi etiam latentes affectus memorant, ad quos congruere uideantur, ac deinde dogmaticis opinionibus paralogismos coniectunt, ex quaerendis quaerenda, ex obiculis obscura inuicem colligentes, tum profectio uel maxime alijs suas produunt ineptias ac nugas.

Quod Empiricis contradicendi præbeant occasionem, qui citra iudicium ac discrimen simpliciter compositis omnibus facultatibus fidem habent. Cap. 29

Dicere enim omitto eos Empiricis quoque reprehensionis locum exhibere, quod prompte compositis facultatibus fidem habeant, tanquam fieri non possit ut pars magna earum errore non uacaret, perperamque esset composita. Dicent enim, arbitrator, sicut sanè dicunt, frustra nos primas effectricesque cuiusque medicaminis facultates exquirere, cum ab experientia inuenta iam antea sit tum compositorum, tum simplicium medicamentorum innumera multitudo, quibus & ipsi fidem habent qui frustra primas facultates exquirunt. Quispe si particulares eorum usus omnes competi sint, eosque unanimiter omnes prædicent, ceterum de causis ob quas agunt nondum conueniant: liquet non ex primarum facultatum notitia, medicamentorum tum usum, tum compositionem esse inuenta, sed ea composuisse experientiam, à rationem nihil aliud quam probabiliter consequam. Hæc autem eiusmodi alia multa, qui experientiam ac usum profitentur medici, rite in illos dicere uidebuntur, qui omnibus quomodo cunque conscriptis pharmacis fidem habere non uerentur, causas tamen interim titulis uirium ac promissis eorum aptare nituntur. At ego nec illud quoque in illos ad dere grauabor: Herodotus alias sectas omnes prauas reputantem, præter eam quæ spiritibus omnia tribuit (πνευματικὴν Græci uocant) Metrodororum omnes

omnes præter Aſclepiadeã, & Zenonem præter quam quæ ab Herophilo inuenta eſt, & Hermonem præter eam quæ Eraſiſtratum autorem habet, & alium atque alium omnes damnantem extra ſuam: de compoſitis tamen medicamentis citra iudicium atque experimentum ſcriptis omnibus fidẽ tribuere, ſiue à ſectæ ſuæ hominibus ſint ſcripta, ſiue diuerſa, ſiue etiam à quopiam ex plebe: quin uero etiã cauſas ſubinde addere conantur probabiles medicamentorum peſſima ratione compoſitorum, & (quod hoc eſt mirabilius) etiamſi nullum eorum quæ laudant, fecerint periculum, ſed alijs duntaxat credant: quemadmodum cum quidam nuper mirificas multasq; podagrici medicamenti laudes iactaſſet, atque eo etiamnum loquente forte fortuna adueniſſet podagricus quidam, qui tam mediocriter laborabat, ut incedere etiam poſſet, noſq; iuſſiſſemus in illo primum præberet experimentũ, ille acquieſcens pedi pharmacum apoſſuit. At uir ille noctem totam inſomnem egit, ac poſtero die tantum abeſt ut commode ſicut antea incederet, ut ne geſtari quidem poſſet. Adeo citra ullam explorationem ac temere tum alijs quidem fidem habent, tum alios alijs ſcientes ac ſponte fallere gaudent. Porro etiamſi omnes medicamentorum quæ memorat, compoſitiones probe eſſent comparatæ, uerumtamen ſpeculationis eorum uſum ijs quæ faciunt euertunt. Aiunt enim ad præparanda medicamenta compoſita, eaq; rite utenda, ſimplicium facultates inſpicã cõſiderari, inq; eorum teſtimonium tantum non omnes ueterum citant, Eraſiſtratum, Herophilum, Philotimum, Dioclem, Praxagoram, & ipſum etiam Hippocratem. Porro ubi ad exploranda ea accedunt, ita nobiſcum agunt, ac ſi omnes perfectas iam haberemus facultates compoſitas. Atqui inquiet, opinor, ad eos quiſpiam: Quo pacto non fruſtra ſimplicium quaratis facultates, ſi omnes compoſitorum iam noſcitis? nam ſi quarum gratia ſimplicium facultates inquiritis, eas oẽs iam nouiſtis, ſuperuacaneum eſt illas exquirere. Cæterum ſi uel hoc quoq; quis illis concedat, falſe id quod & ſupra poſitum eſt quo pacto perferat, cum pugnantiã cũ rebus apparentibus, prolaxis rationibus aſtruerẽ conantur?

Senſus hauri cõtemnẽdos eſſe, tanq; ad explorandas ſimplicium medicaminum facultates ſint inſufficientes. Cap. 30

Siquidem in quendam etiam iam inciði tantæ ſtupiditatis hominem, ut contemnẽdos eſſe ſenſus exiſtimaret. Quem cum rogaiſſet quis, num ipſi piper album uideretur calidum, ita que ut par erat, annuiſſet, ruſſumq; que alter percontaretur unde id ſciret; ac ſille reſponderet, tale apparere, merito ab ijs qui præſentes erãt deriſus eſt, qui quod diceret non intelligeret. Ipſum enim hoc apparere, fidem haberi ab illo ſenſui indicabat, quæ paulo ante tanquam fallacem contẽperat. Nam, per deos, unde ignem ſcimus calidum? aut quo ſyllogiſmo docti, aut qua demonſtratione peruaſi? Tum unde glaciẽ frigidã eſſe didicimus quã in ex ſenſu? Ac poſtea reperiantur qui ipſo ſenſu ne-

Galen.

glecto phyſicis problematis libros impleant. At non illo ex genere eſt, quam ob cauſam acetum terram fermentat? Licet enim nobis dicere quod nos lateat, ſicut taliũ problematum pleraq;. Si uero quis prompte dicat, quia aut calidum ſit aut frigidum (utrũq; enim dicunt) in ambiguis obſcurasq; rationes ſeiſpum conſiſciat.

Vtrum in oxycrati potu acetũ admixtum ſit duntaxat ut aquã deducat: an etiam ut ipſum quoq; refrigeret. Cap. 31

Mecum certe probe actum putem, ſi quæ ſenſu apparentibus uicinia ſunt, atque in propinquo poſita, exacte inuenire poſſim, diſcernens in eis ac ſeparans quod ex ſe eſt, ab eo quod ex accidentẽ prouenit; uelut æſtuo tempore oxycrati potu quidam planẽ refrigerantur, atque expertes ſitis permanent: ſed nondum conſtat, an id acetũ gratia eueniat: pauculum ſiquidem eius copioſa aqua miſtum, non calidum, ſed quomodo fieri poteſt maxime frigidũ ebibunt. nam dixerit forte quiſpiam, quia tardiũſcula ſit aqua, & plurimum temporis moretur in hypochondrijs, nec deorſum cõcedens, nec in corpus ſe diſtendens, idcirco illi acetum miſceri tanquam in omnem partem ferenda futurum uehiculum. Sic etiam ſi cum uino bibatur aqua, ſitim efficacius extinguit quã ſi ſola, ſcilicet uino ipſam ad diſtributionem promouente. Itaque refrigerationem, ſitisq; ſanationem ab aqua prouenire, ut quæ frigidæ nature ſit & humidã: cæterum adminiculo eſſe, ac uelut alas illi ad omnes corporis partes permeandas addere tum uinum, tum acetum, quæ ipſa nequaquam frigida ſunt & humidã. Siquidem præſtare, ſic ſola exhiberi potius, quam cum aqua, quãdo ea facile præ tenuitate in corpus digerantur, & ab hypochondrijs recedant. Porro quoniam ſemel in hunc ſermonem deuenimus, nihil obſtat quo minus omnem exacte perficiamus. Nam quod fieri poſſit ut & aquam acetum deducat, nec tamẽ ipſummet refrigeret, & non deducat ſolum, ſed etiam refrigeret, certò certius eſt. Verũ utrum cum ueritate coniunctũ ſit, id conſiderationem poſtulat. Diſtingui autem id poſſit tantummodo, ſicut exhibeas acetum & uinum, utrũq; ſeorſum & per ſe. Apparet enim à uino homini ſemper ſitim increſcere, ab aceto uero epoto interim quidem augeri, interim uero ſedari.

Quæ ſit ſitis cauſa. Cap. 32

Quipe cum & ſitis duplici ratione prouenire ſoleat, partem humoris inopia, partim caloris copia. Quamobrem mirum uideri non debet, ſi priorem quidem ſanare nequeat, alteram poſſit. Siquidem humectare nequit, ac refrigerat non inſtrenue. Quapropter neq; a ſicca diſpoſitione prouenientem ſitim, neq; a calida & ſicca unquam ſanare queat epotum acetum. At ſi quãdo in unum coeant humiditas atq; caliditas, eiuſque quidem ſitis optima mediela acetum eſt. Rara ſanẽ eiuſmodi affectio eſt, in aqua inter cutẽ aſfuſionibus (περὶ ὄξυς Græci uocant) nonnunq; proueniens: cõgeſta nimirũ in uentre falſi humoris copia: tum etiam ſi quibus pituita falſa uentri illita in hæſerit.

tom. 5

b At

At qui aliter siti premūtur, puta in febrilibus ardentibus, & adustus omnibus, quiq; aestate laborāt, ac in graui aestu, cōposita ijs est affectio, ex caliditate uidelicet et siccitate: quare non iniuria composita illis medela est acetum, ut quod strenue refrigeret & quouis expedite permeet: & aqua, quæ supra q̄ quod refrigeret, omnīū sit uel humidissima: nihil est enim aqua humidius.

Medicamentum quod in iudicium uenit: non mistum, sed simplex esse oportere. Cap. 33

Quemadmodū ergo haud satis secura est procul a sensu ducta de explorando medicamento ratio cinatio, ita nec ipsius alteri cuiuspiam permisti usus. Siquidem ipsum per se solum quod iudicandum uenit, expendere oportet tum in sanis corporibus, ijsq; temperatis & intemperatis, tum in morbo alicui obnoxij. In temperatis quidem, uelut supra positum est: In intemperatis, sicut dixit Hippocrates, naturis picrocholis, hoc est, quæ amaræ bilis succo abundant, utilissimum esse acetum: qui uero temperaturam sortiti fuerint melancholicam, aduersissimum. Porro in morbo aliquo affectis, si simplex fuerit, in simplici exploret affectu: Sin mistum alicui, necesse est quod commiscetur, temperatura sit mediū, sicut in aqua & cerato simplici superius declaratum est. Rationabile quippe arbitror, quod nulli diuersi temperamenti sit mistum, sed q̄ fieri queat medio coniunctum, ipsum eorum quæ perficiuntur, causam existere. Nam simpliciter cerato quod neq; calfaciebat, neq; refrigerabat, aqua admista frigida, refrigerauit: quippe quæ temperiē habebat frigidā. Quod si ex calfaciētiū quippiam eiusmodi cerato commiscuisses, profecto calidū id medicamētū euasisset: quemadmodum in affectibus compluribus sæpenuero euphorbium aut castorium temperauimus. Sic si acetum simplici adamussim cerato cōmisceris, cerato ipso longe frigidius medicamen effeceris: tanq̄ nimirū quod admistum est, sit frigidum. Eritq; tibi id remediū uel optimū ad erysipelata, phlegmonas, herpes, carbunculos. Sin aut quod mistū est, tanq̄ simplex expēdas (nā id etiam moliuntur) longe maxime hallucinaberis. Nam ulcerum glutinatorium non acetum, sed oxycratum dicendum est, aliam multo naturā ab aceto obtinens. Siquidem quemadmodum carnem producere nequit ærugo, sed ceratum exiguum quiddam habens æruginis: ad eundem modū neq; acetū conglutināt, sed aqua acetū pauxillum accipiens. Ipsum uero per se ac syncerum acetum ulcera quæ glutinationē desiderant mirum in modum exasperat. utpote tenuitate erodens, ac dolorem excitans. Quam obrem haud merito, nec conuenienter talia dicitant, nec melius item faciunt, cū ignotis ignota connectunt.

Quod neq; adstrictoria omnia conglutinent, neq; conglutinaria item omnia adstringant. Cap. 34

Quippe cum nihil seorsum de glutinandis, aut carne implendis, aut cicatrice obducendis ulceribus demonstrarint, ex inductione tamen colligunt, adstringentia omnia dicentes glutinatoria.

A Oportet autē non ex inductione, sed per demonstrationem in genere talia accipere quemadmodum nos facturī sumus in curandī rationis commentarijs. Immo absolute quiduis tale dictum, nō modo indemonstratū est, sed etiam falsum. Neq; enim chalcitis, neque galla, neq; malorum punitorum putamina, neq; omphacium, neq; alumen, multoq; minus æs usum, neque eris squama, neq; misy, ulcera glutinare possunt: aliaq; innumera sunt inter adstringentia, quæ glutinare nequeant. Porro si quis non hoc, sed glutinatoria omnia adstringentia dixerit, proferentur & hic quoq; non pauca quæ citra adstrictionem cōglutinent. Neutra igitur uera oratio est, si simpliciter atq; indiscrete effertur: tum ea cum dicunt adstringentia omnia ulcers glutinatoria: tum ea cum aiunt, quæcunq; glutinantur, adstringentium beneficio glutinari. Porro multo sanè etiā magis tum absurda, tum falsa ac præter sensum asserunt, cum mordacia, acria, amara, salsa, ad hæc quæ mollissimas iucundissimasq; sortita sunt qualitates, adstringere dicitant: tanquam gustus non ad sensorium pertineat quod adstringit, sed ex illorum impositioe atque arbitrio debeat accipi. Malum enim granatum, & malum, uerbi causa, & mespilum, & pīrorum quædam genera, & myrta, & sorba, uinumq; tum aminaeum tum marsum, euidēter nos adstringunt. At triticum, & zea, & millium, Herodotum forsan adstringebant, aliorum autem omnium neminem. Sexcentos enim quandoque super his sum percontatus, & in primis super amylo, nam & ipsum adstringere ait Herodotus, sicut & piper, quod nec ipsum ullum omnino aliorum hominū qui syncere & incorrupte qualitates expendunt, adstringit. At Herodotus cuncta cōsumdere non est ueritus: aitq; & quæ acerrima sunt facultate, & quæ summe rodūt, & quæ mollissima sunt ac mitissima, omnia adstringere: tanq̄ in hoc ut quosdam in sensu defraudet, uictoriam statueret. Verum non ita se res habet, cū ea uel maxima futura sit prauitatis dīctorum eius probatio.

Quod non omnia adstringentia refrigerent. Cap. 35

Quin uero & Asclepiades Metrodoros tanquam illum etiam superare contenderet, adferendis de sensu mendacijs, cum alia quædam, tum resina & bitumen calfacere nos denegat, atque adstringentia omnia refrigerare dicitur: cum si nihil aliud, saltem chalcitis, chalcantothos, & misy, quæ ualenter adstringunt, tantā assecuta sint caliditatem, ut nos etiam exurant. Nihil est ergo mirandum, si proluxa quædam nugenē, seipsosq; nō nulli fallant, cum de manifesto apparentibus uerum fateri non audeant.

Perperam Herodotum ac Dioscoridem quæcumq; aut profluuijs, aut dysenterijs mederentur, adstringentia censuisse. Cap. 36

Itaq; ex eis quidam, puta Herodotus & Dioscorides, medicamenta quædam ex eo quod profluuijs aut dysenterijs medentur, adstringere eā colligunt: quanquam ne minimum quidem habeant adstrictionis, imò prorsum contra rarefacientia

entia nimirum sint & laxantia : cum alioqui quæ adstringunt, corpora contrahant, condensent, constipent, atq; constringant. Nam semel sensibus pro nihilo habitis atque contemptis, euerterunt confuderuntq; omnia que planè sensu digno scere est, hæc praua ratione asserentes. Nam adeps caprinus omnib. quæ aut gustu aut facultate sunt, adstringentia, aduersissimus est, uelut etiam farina triticea, & amyllum, & innumera quæ uim habent tum emplastica, hoc est illinendium mitigatoriam, atque acrimonias hebetandi, eaq; ratione ijs qui acria mordaciæque per alium excernunt, auxiliantur. Sanè esto & oleum ex adstringentium numero, quoniam sapius ijs qui grauius mordicabantur, infusum profuit. Esto uero etiam & cera, & adeps fillus, tum gallinaceus, & anserinus, chondri fragiq; succus. Nā hæc quoque infundimus, & ceratum quoadq; ijs qui mordicantur, sicuti & adipem caprinum. Verum efficacius auxilium affert caprinus : quia scilicet facilis & concrescit, & intestinis inungitur, plurimiq; tempore inhaeret. Porrò siue ob crassitinem, siue aliam ob causam celeriter concrescat, non est opus in præsentia inquirere, re ipsa euidenter apparet. Verum quemadmodum quòd ocyssime concrescat, atq; intestinorum morius obtundat, ex rei euidentiā credibilis est : sic sanè etiā quòd nulla inquit aut frigiditas, aut adstrictio. Atque hi quidem ex obscuris ratiocinantur de apparentibus : immo autem, si uerum fatendum est, se ipsos potius decipiunt. At nos tanto decet magis ad sensum accedere : tantoq; diligentius perpetuo illi ac tendere : quanto plura in eo peccent sophista omnes, falsaq; de eo asserant. Rursum ergo, ubi prius memorauerimus quæ idiotas non fugiunt, ipsisq; haud ignota erant, cum nondum contendendi libidine in sensus peruenerissent contemptum, postea autem per superuacaneā sapientiam amiserunt, ad id quod continuum orationi est, transibimus.

De proprijs sensus cuiusq; sensorijs. Cap. 37

Vnaqueq; sensibilibus natura priuatim subiecta est, tactui quidem caliditas ac frigiditas, durities ac mollities : albedo uero, nigredo, flauedo, rubor, atq; ut summam dicam, uniuersum colorum genus, uisui : amaritas, dulcedo, austeritas, acerbitas, aciditas, falsedo, acrimonia, gustui : planeq; demens uideatur, si quis gustu colores iudicare tentet, aut sapores uisu. eodem modo de tactu cognoscendum est, reliquisq; sensibus. si quidem tactu iudicandæ sunt differentia tangibiles, auditu audibiles, odoratu odorabiles. Quæ cum se sese habeant, audiamus quæso Platonem gustabiles differentias exponentem : Haud tamen animus ipsius physiologiæ attendendus est. Nec enim nunc tempestiue eius meminero, neque in hoc uiri testimonium cito : sed tantum ut dicā quæ de re quodq; nomen esse Græcis mos est. Ausculta ergo differentem Platonem : Quæcumq; enim ingressa circa uenas, quæ sunt linguæ ueluti probatrices, ad cor extenat, ea ad rariore ac teneras carnis partes illabentia, dum terrestres quæ

dam ipsorum partes colliquecunt, uenas contrahunt ac resiccant. Esti quidem asperiora fuerint, acerba : minus autem aspera, austerā appellantur. Quæ uero hæc extergunt, & quicquid circa linguam est eluunt, si quidem ultra mediocritatem hoc faciunt, & insuper quid assument, ad eò ut etiam de natura ipsius aliquid eliquent, qualis est nitrorum facultas, ea omnia amara nominata sunt. Quæ uero nitri habitu inferiora sunt, & exsertione moderatè utuntur, falsa, citra amaritudinem asperam, & magis grata nobis apparēt. Nam & secantia, & diffundentia, & calefacientia, & rursum uicissim incalescentia, dum præ leuitate sursum feruntur, calidæ utique facultatis fuerint. At quæ oris caliditate participauerunt, & ab ipso leuigata efferecunt, ac rursum uicissim id quod calcescit accendunt ac urunt, & præ leuitate sursum ad capitis sensus feruntur, secant quæ omnia quæ ipsis occurrunt : talia omnia propter has facultates, acria dicta sunt. Cæterum ubi hæc ipsa præattenuata quidem sunt à putredine, uerum in angustas uenas, & partes quæ isthic insunt terrestres, itemq; eas quæ moderatum aerem habent, ingreditur, ita ut motu suo efficiant, ut ille inter se misceantur : dum autem miscentur, inter se obuoluantur, & in alias ingredientiæ, alias cauas efficiant his quæ ingressa sunt circumtensas, nimis humi ditate circum aerem caua circumtensa, aliquando terrestri, aliquando pura, quò humida uasa aeris, aquæ caua ac rotundæ fiant, & quæ quidem ex pura humiditate sunt, pellucida consistant, bullarum nomine appellata : quæ uero ex terrestri, quæ simul mouetur ac eleuatur, ebullitionis & fermentationis nomine cognominentur : Harum affectionum causa aciditas appellatur. At uero omnibus circa hæc relatis, contraria affectio à contraria causa existit : quum ingressorum compages humida, linguæ habitui ex natura cognata existens, leuigat quidem obliuens exasperata, quæ uero præter naturam compacta sunt, laxat : & quæ diffusa, contrahit : & omnia quam maxime in unum naturam firmat, ita ut quicquid eiusmodi est, iucundum sit ac gratum, omnibus uiolentiarum affectionum medela fiens, dulce appellatum est. His uerbis Plato, quæ nos uocare solemus austerā, quæ acerba, quæ falsa & nitrosa, quæ amara, quæ acria, quæ acida, quæ dulcia, exposuit. Id uidelicet quod à nobis *sûpoy*, siue adstringens dicitur, ipse austerum nuncupans : nam sic à uetustionibus Græcis appellari solet. Non tamen omnia in unum confundit sicut ij faciunt qui & piper adstringere dicunt, cum nec acrium sit natura, & acetum quod ex acidis est : nec sanè etiam ueriti dulcissimorum quædam adstringentium numero adscribere. Ex quo fit, cum omnia confundant, ut protinus nec facultates inuenire omnino ualeant. Omnis enim inuentionis demonstrationisq; principia sunt, quæ sensui, atq; intellectui euidentiā sunt. At isti hæc ambo perturbant : atque omnes in unum confundunt cum sensuum actus & passiones, tum multo etiam mā

gis intellectus ac rationis: nimirū haudquaquam in speculatione logica uersati. Itaq; operepretium est, nugacem illorum loquacitatem omnibus modis effugere: nequid nobis quoq; affricetur uitij ex tam proluxa illorum futiliq; nugacitate. Porro haud leue negocium est, dedocere ac transmutare eos qui ab illis usque adeo peruersi sunt, ut & sensum contemnant & nequaquam in speculatione logica se exercuerint, planeq; rudes sint rationum quas de natura philosophi considerant. Omnino enim saltē uel id didicissent, quæ in illis sunt ambiguitates, fugiendas esse, cauteq; obseruandas: tum sensibus magis super simplicium medicaminum facultatibus, quam rationibus haud satis integris committendum iudicium esse.

De proprijs lingue sensorijs. Cap. 38

Verum tales dedocere, ac uelut transformare est impossibile. At aliorum tamē gratia, nimirum quos conatus noster iuuare poterit, resumenda est, diligenterq; definienda, tota de proprijs lingue sensorijs oratio. Nuncupatur igitur tū à Theophrasto, tum ab Aristotele, tum à Mnesitheo medico, gustandi facultas, græce *χυμός* (nos saporem dicimus) secunda syllaba à *μ* litera incipiente. At ex humido siccoq; consistentia, eorum uidelicet quæ à calore concocta sunt, *χυλός* (nos succum dicere possumus) à litera *λ* secunda incipiente syllaba. Tametsi ab ætate illis maioribus nō modo Atheniensibus, sed & Ionibus uirumq; per *μ* litteram scribi consueuerit. Siquidem & apud Platonem, & apud Hippocratem, ueteresq; comicos sic scriptum reperitur. Vocetur autem in præsentī quidem optere, clarioris doctriæ gratia, gustatoris facultas, siue qualitas, siue utcumq; cuiq; appellare libet, per litteram *μ*, *χυμός* (nos saporem nominabimus.) Humor autem incrassatus tum in animantibus, tum in plantis, *χυλός*, secunda syllaba à litera *λ* incipiente (nos, ut diximus, succum uertemus.) Sciendum ergo, sapores, qui tum in unoquoq; animalis ac planta, tum in terra inueniuntur, plurimos esse, nec facile specierum numero comprehensibiles, cæterum differentias gustabiles alijs octo uisq; alijs numero septem, nonnullis autem & his quoque pauciores. At Plato in Timæo in suā praposita dictione primū duos sapores memorat eiusdem speciei, sed in ratione maioris ac minoris differentes: Eorum alterum austerum, alterum acerbum nominat: Fuerit autem austerum, quem *σφόρον* (adstringentem uoco) nuncupamus: Porro acerbum huius intentione provenit, uelut & ipse Plato significauit. Atque hos sanè pro una specie numerabimus. Altera est eorum quæ illis opposita sunt, nitrosorum uidelicet, salforum, & amarorum: Et in his quoque amarus ex nitrosi provenit intentione: Salsus uero aut nitrosus imbecillior, aut adstrictionis quoque assumēs aliquid. Deinde à Platone acris oppositus est, mox acidus, postremo dulcis. At à Theophrasto additus est unctuosus, siue pinguis: à Platone quidem in sermone de proprijs lingue sensorijs præteritus, uerum paulo ante plantarum succis adscriptus,

ubi uinosum ab oleoso & melleo discernēbat. Porro in illo sermone unum adiecit succi genus una appellatione comprehendendum, *σνός* nominās: Vbi autem ad gustus sensoria trāsiit, protinus dulcem memorauit: nihil em̄ retulerit, dulce an melleum dicas, uelut nec pingue an oleosum: Omisit autē pinguem, ut qui ad gustum nihil attineret.

Quæ differat adstringens ab austero & acerbis. Cap. 39

Quale autem eorum sit unumquodq; exponere quidem exacte est impossibile, quādoquidem nec aliam ullam sensoriam passionem, uerum est qui eodem sensu communicat licet suggerere. Ergo si quis aut cydonia aut mala, aut mēspila, aut myrta gustauerit, proculdubio cognoscerit alium nobis ab his in lingua moueri sensum, alium ab adstringentibus corporibus. Nam quæ adstringunt, aut refrigerant, introrsum pellere contractam nostram partem ex omni parte apparent, idq; æquabiliter, uelut pellentia, ac stipantia, contrahentiaq;. At austera in profundum etiam subire uidentur, atq; asperum quendam inæquabilemq; mouere sensum, tanquam resiccantia, & humorem omnem corporum sensibilibium depascentia. Ex quo fit ut alia sit passionum proprietates, quæq; haud facile luideq; explicari possit, tum ab adstringentibus nos corporibus, tum ab austeris saporibus: Sed qui uis tamen qui homo est, facile quod dico comprehendit. Porro quando quod lingue nostræ admotum fuerit corpus, ualide delicatq; contrahit, & in multam profunditatem usq; illam exasperat, sicut pira syluestria immatura, & corna, eiusmodi omne acerbum appellatur, ab austeris intentione duntaxat diuersum. At quod nos adstringens uocitamus, haud temere à Theophrasto dictū reperias. Videtur autem idem significare quod austerum, aut certe commune esse genus tum huius, tum etiam acerbis. Quæcūq; uero linguam dum contingunt non contrahunt, neque constipant, uelut adstringentia, immo contra planè agere apparēt, nempe detergentia & abluentia, etiamli adstringentium quippiam adiunctum sit, hæc omnia falsa cognominamus. At quæ his etiam magis detergent, adeo ut etiam exasperent, amara nominantur. Porro quæ mordicant roduntq;, idq; cum ualida quadam caliditate, acria uocantur: sin hæc absint, acida: cæterum hæc fermentadi quoq; uim obtinent: At quæ uelut inungunt atq; implent, ac in statum suum restituunt exasperatas ac ueluti erosas lingue particulas, hæc si cum uoluptate manifeste contingant, dulcicia: sin hæc sine, pinguis uocantur. Atq; hoc quidē pacto, quantū in me fuit, res explicatu lōge difficillimas uerbis exponere sum annisus. Miror autem qui tam prompte omnia adstringentia nominent, siue acria sint siue amara, siue dulcicia, siue pinguis, siue acida: cum iam olim rebus ipsis imposita sint nomina, atq; affectuum sensibilibium non exigua in nobis differentia sit. Præstitisset fortassis, si quidem naturales scrutari rationes uoluerunt, apparentia non euertere, nec appellationes confundere: uerū inquirere cuius temperamenti, aut dispositionis, aut corporis constitutionis

tutionis, aut quomocumq; nominare uelint, soboles sit adstrictio, cuius falsedo, amaritas, acriditas, acrimonia, dulcedo, pinguitudo, quæ Platon, Aristoteles, ac Theophrastus conati sunt definire. Clarum quippe est si ex calido, frigido, humido siccoque coeuntibus omnia sunt mista, etiam dictarum quanque qualitarum ex horum constare mistura. Itaque si quemadmodum dictorum saporum quisque præueniat, exponere conarentur: lubens equidem auscultarem, gratiamq; haberem non exiguam. At si neque hoc efficiant, imo insuper sensorias omnes differentias in unum confundant, ut parum absit quin corpora omnia adstringentia nuncupent: sane nec audire ipse uelim, illosq; obsecrarem, ut inanem contentionem relinquunt.

Non ad totam rerum naturam iudicandas medicamentorum facultates, sicut naturales philosophi faciunt sed ad nostram naturam. Cap. 40

At nos equidem in consequentibus ostendere conabimur, cuiusnam temperamenti saporum quisque sit soboles. In presentia autem discipulos ad experientiam accessuros id modo assuescere uelim, ut quæ ad artem est utile, seligant, ubi iudicare uelint quo pacto unumquodque nos medicamentorum afficiat. Quippe non quale ex se sit, & ad totam naturam consideramus. Nam hoc pacto neque acetum, neq; marinam aquam nos exiccare posse, aut sicca esse facultate dici manifestum est. Si quidem utrunque illorum actum est humidum. Verum si nos exiccare appareant, sicca dicentur, ad nos uidelicet, & nostram naturam parem sicca di potestatem obtinentia. Quinetiam & calida, & frigida, & humida eodẽ dicentur modo, ubi nos scilicet calfaciant, refrigerent, atque humectent, eaq; ad nos, non ad totam naturam, nec ex se. Atqui si huius duntaxat meminerimus, certissima omnium erit iudicatrix experientia: Quam qui relinquant, atq; aliunde ratiocinantur, non solum falsa pro ueris ducunt, sed etiam tractationis uti-

litatem destruunt. Proinde nobis propositum non est, quale ex sua natura quodq; sit medicamentum exquirere, uerum quid in nobis efficere possit. Atqui hic primi libri finis esto. At in secundo deinceps, oleo ac rosaceo in sermone exemplorũ uice positus, prauas & inibi ratiocinandi uias monstrabimus. quibus cum medicorum complures utantur, in primis quidem seipos de capiunt, secumq; alios multos in errore pertrahunt. Porro ubi id erit absolutum, ad tertium cõmentariorum transiens, quæstiones logicas, quæ uniuersam de simplicibus medicamentis enarrationem antedunt, explicare conabor: Ut uidelicet in quarto ipsas iam facultates omnium definire liceat, quas protinus à principio uisum aggressus, nisi plena paralogismis atq; erroribus omnium propè iuniorum essent uolumina. Quos prius extergere, atq; ex animis discentiũ delere oportet, nequid ueritati obstat. Nã, ut Hippocrates inquit, sic etiam ait Platon, Non solum impura corpora quanto plus nutrias, tanto magis lædas: uerumetiam impuris animis si nutrientes sermones offeras, non modo nihil profis, uerumetiam magnopere obfueris. Itaq; his de causis, tum etiam quia amicorum plerisque uisum est, ut iuniorum medicorum argue remus erores, non tantum in cõsensibus, quos quotidie cum illis habemus, sed etiam hisce cõmentarijs: necesse mihi fuit diutius prioribus istis duobus immorari, quod uidelicet in tertio purum animi auditorem nactus, quiq; ueras asserat rationes possit, tum ea exponam, quæ de huius speculationis principijs nouisse oportet: tum deinceps omnes medicamenti cuiusque facultates enarrem. Id autem fiet in uniuersum, ut reor, libris undecim, ea ferme magnitudine cõstantibus, cuius est hic, qui est omnium primus, Qui cum conuenientem nunc nactus sit modum, finem per hanc dictionem accipiat:

ARGUMENTA CAPITVM LIBRI SECVNDI.

Caput. 1. Quod sophista, qui fidem sensibus arrogat, demonstrationis principia incertiora, quam quæ demonstrant, efficiant. 2. Quod abunde sufficit ad iudicandas medicamentorum facultates. quæ per sensum accipiunt experientia, iunctis duntaxat paucis epilogis suis rationibus cõmunibus. Et quo pacto rationem experientia scribere oportet.

3. Quod neq; à colore, neque ab odore, neq; à consistencia aut congelacione, neq; à duritate, neq; à leuitate ratiocinari de medicinarum facultate oportet.

4. Quod sophista rationibus haud usi sint scientificis ad ea lemmata siue sumptiones, ex quibus perperam de medicinarum facultatibus colligunt, sed aut ex inductionibus aut exemplis. 5. De oleo & Dioclis super eo uerba, ex libro ad Archidamũ.

6. Quod præterquam quod pugnantia de olei facultate Archidamus asserit, insuper impropris uatur exemplis. 7. Quomodo frigidum paremus

oleum. 8. De differentijs proprie uocati olei.

9. Quomodo cuiusq; medicamenti facultatem exprimit oportet. 10. Quod non solum in explorandis medicamentis medici hallucinentur, sed etiam in opinionibus quas habent de affectibus.

11. Quod ut quis probe de olei facultate ratiocinetur, debeat etiam affectionem hominis asstimare, & de ipso oleo quale sit præfinire. 12. Quod salugina & acria ex accidenti quandoq; morsui medeantur, nempe secum quod mordicat educencia. Dulcia uero & epicrastica contrã, morsum etiam ex accidenti aliquando exasperant. nimirum cum unã corrumpantur, & fouent alantq; cacochymiam.

13. De lacte. cohæret hoc caput cũ superiore: & diuelli non debeat. 14. Quomodo discernendum sit, à cacochymis ne mordacitate sanata sit, à ab epicrasticis, hoc est temperantibus.

15. De ratione abluendi; & candida facienti medicamentum.

16. Quòd nò colligatur, oleũ ex eo quod ad tũsĩm quendam cieat impetum, proinde esse mordax. Neq; enim omne quod ad tũsĩndum impetum ciet, mordax est: Neq; solum quod mordax est ad tũsĩm impetum mouet, sed & quæ pingua sunt.

17. Quo modo & per quæ ad tũsĩm impetum cieri contingat.

18. Quot modis aqueum & tenue excrementum, ab oleo separari queat.

19. Quod perperam Archidamus inæqualem ex oleo frictionem asseruit.

20. Redarguit prauam medicamentorum facultates inueniendi rationem.

21. Quæ sit recta experiundæ olei facultatis ratio.

22. Quod oleum ex eorũ sit numero, quæ ex æquo nos excalciant.

23. Quanam sint principia tantæ de medicamentorum facultatibus ambiguitatis.

24. Quod pluribus nos modis excalcifacere oleum appareat, nempe ut alimentum: ut medicamentum, ut tegumentum: Et quod excalcifacientium nos ac refrigerantium medium quodammodo obtineat.

25. Quod medium sit oleum inter humectantia nos & exiccantia.

26. Quod materiam rationem obtinet, in mistis mediam tenere temperiem debere: alioquin enim futurum ut mistum sibi aduerfetur actioni.

27. De rosaceo.

GALENI DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS,

Liber Secundus.

Quod sophistæ, qui fidem sensibus abrogant, demonstrationis principia incertiora quam quæ demonstrantur efficiunt. Cap. 1



PROLIXA nobis ut sit de simplicium medicaminum facultatibus oratio, limites suos excedentes sophistæ efficiunt. Nam cum procul principia ducant, sensumq; pro nihilo habeant, seseq; in illa coniiciant, quæ

philosophis etiam ambigua sunt: simul & ea quæ ipsi ignorant, & ea quæ aperte cognoscuntur subuertunt. Ea q; plerique eorum faciunt non modo naturalis speculationis, sed etiam logicarum methodorum imperitia, quibus utatur necesse est quisquis demonstrare quid aggreditur. Itaque cum nesciant tum ea quæ bene à phisicis sunt inuenta, tum etiam ea de quibus non iniuria illi dubitarunt, utrisque tamen contraria asserere sæpe numero non dubitant. Sed, Deum immortalem, age obsecro, si nunc ego sic orsus dicere, quòd cum quatuor sint elementa, aer, terra, aqua, & ignis, nulli tamen congenita sit albedo, ac splendidus color extra splendorem & ignem: ac deinde citato Empedoclis ac nonnullorum physicoꝝ aliorum testimonio, splendida corpora omnia plurimum in se ignis habere dicam, haud curans aut niuem, aut cerussam, aut glaciem, aut alia innumera tum splendidissima, tum frigidissima inspicere: ac mox suggerente quopiam procedentem à sensu con futationem tergaueratus, ad rationem accedi iubeam, ac per eam de rerum natura considerandum, haudquaquam sensibus irrationalibus uniuersum committendum censeam, nunquid mentem habentibus insanire uideat, haud intelligens unde rationis desumpsissem initium? Nam mea quidem sententia, ex sensu & per sensum omnia id genus sumuntur axiomata, nempe solem esse splendidum, flammam subfluas, carbones plerosque flauos. Ergo si à sensibus re

cedendum est, nulla suppetet demonstratio neque nobis eorum quæ modo diximus, neq; Empedocli cum ait:

Vndiq; splendidum solem, calidumq; uidere.

Quæ si uera sunt, perspicuum est, multo ante illa fidem habendam sensibus. Immo, inquirunt, mortales cum simus, à sensibus auspicemur necesse est: uerum illis haudquaquam perpetuo immorandum, sed ad partem diuiniore accedendum, nempe rationem: Nam sensum & animantibus rationis expertibus inesse, rationem solum hominibus esse cum dijs communem. Atq; hi in longum orationem extendunt. Quin etiam ex illis quidam & Anaxagorã in testimonium euocant, qui niuem pronũciarit nò esse albam. Hic, inquit, uir phisicus excelsior, ac supra sensum extitit, atq; eius contemnit phantasmata. Ad rationem ire pergit, ea q; duce rerũ naturam scrutatur. At si me quod in mentem uenit fari oportet, qui liber sim scilicet, & in tota adeo uita extrarritatem studuerim nihil: ad insaniam extremum, & ultra, peruenisse eos arbitror, quos talia nugari non dispudet. Nam si quæ per sensus euidenter apparent, euertant; unde fumant demonstrationum principia, non habebunt. Sin autem ab his tanquam à fide dignis exordiantur, quo iure isdem postea disident? Nam demonstrationum principia certiora sunt quam ea quæ per illa demonstrantur: quippe cum ista aliunde fidem mutentur: demonstrationum uero principia non solum ipsa per sese, uerum etiam ad querendum inuentionem, quibus credatur idonea sint.

Quòd abunde sufficiat iudicandis medicamentorum facultatibus, quæ per sensum accipiuntur experientia, iunctis diuina axat paucis epilogis, siue rationibus communibus. Et quo pacto rationem experientie subscribere oporteat. Cap. 2

Equidem optarim nullas non res clare sub sensu nostros cadere, nec quicquam esse quod illos fugeret. Hoc enim pacto nihil dubitũ, nihil

ambit

ambiguum aut anceps usquā foret. Verum quoniam illos quaedam effugiunt, rationem illis superinducere conandum est, sic tamen, ut nō procul, ut illi factitant, nec confusa & infinita colligamus. Verum ante omnia nominum significata diligenter definiamus, ne quis postea per æquiuocationem falli possit. Deinde quod ex se quid agit, ab eo quod per accidens, separatur. De quibus supra accurate differuimus, significata quoque eorum quæ facultate aut calida, aut frigida aut frigida, aut humida, aut quiduis aliud dicuntur, discernuimus. Tum quo pacto propriam cuiusque medicamenti facultatē ab ijs quæ ex accidente sunt segregans inuenire quis possit, generatim quidem in tertio De temperamētis expositum est, atque in hoc tractatu mēbratim enarrabimus, ceu in primo iam libro cœpimus; ut quæ ibi in aceto & aqua, ita hic in oleo & rosaceo facturi sumus, si modo prius ostenderit, quātum delinquant medicorū nonnulli, qui longe demonstratiorum ducunt principia. Nam quid oportuit orationem de se respexisse colorem, quando rebus ipsis uarie utilis liceat, nec in sanis solum corporibus, sed & ægrotantibus; quippe cum ipsas per se rosas, aut succum earū expressum corpori tunc sano, tum simplici affecto morbo, ut supra diximus, liceat imponere, atque oleo miscentes, corporibus aut ualenter refrigeratis, aut ex calcatis applicare, si ue affricādo, siue perfundendo, ac irrigādo, tum in corpus quoque assumere, idque aut superne per os, aut inferne per sedem, ac sic tandem quid ad unūquodque usum proueniat, inspicere. Nam hoc sanē nomine medicamentorum omnium uires contemplantur, ut sit quo uti liceat, hypochondrijs, aut capite ardore afflictis, aut refrigeratis, aut exulceratis, aut phlegmone occupatis, aut id genus aliud perpessis, tum ipsis, tum alijs omnibus corporis partibus. Ergo cum tam perspicua simul ac compendiosa adliu uia ad ea qua inquirimus, etiam ne colores æstimabimus, aut odores, aut consistentias, aut formas medicamenti cuiusque; perinde factitates, atque ij qui ex imagine aut ficta aut picta cognoscere queuntur uolunt, cum ipsam aspicerent non denegentur quem agnoscere cupiunt.

Quod neque, ac calore, neque ab odore, neque a consistentia, aut conglaciatione, neque a duritate, neque a leuitate ratiocinari de medicinarum facultate oporteat. Cap. 3

Atque hac utique parte non leuiter peccare mihi uidentur: multo etiam magis cum in conclusa atque indemonstrata nugantur, demonstrandi rationis planē imperiti. Nam donemus ignem aut flammam, aut rubrum esse aut utcumque uoluerint: nec enim refert: quid ergo id facit ad hoc, ut omne rubrum sit calidum? Nam omnis ignis, uerbi causa, ruber dicens est: at omne rubrum ignem dicere, ridiculum est: multoque etiam plus, si omne rubrum calidum quis dixerit. Nam si principio assumptum esset in oratione, omne calidum esse rubrum, licuisset fortassis mutua axiomatis con-

uersione rubrum omne calidum concludere: licet non obscure & illic peccetur. Nam quæ mutuo conuertuntur (quod *ἀντιστρέφειν* uocant) nō quæ simpliciter conuertuntur quod est *ἀντιστρέφειν* orationes, uere de se mutuo dicuntur. Veruntamen propinqua ea fuerit decēptio. Atqui quoniam nec illud orationis initio assumptum erat, nempe omne calidū esse rubrum: haud licet mutua cōuersione omne rubrum calidum esse colligere. Tribus ergo modis in sermone peccant, qui aiunt rosas temperatura calidas, quod sint rubra. Primum quod non demonstrata hac propositione, omnis ignis rubet, conuenter ex hac aliam, uidelicet, omne rubrum est ignis, tāquam ueram conantur. Secundo quod nesciunt propositiones quæ ex mutuo ueris cōuertuntur (*λογως ἀντιστρέφονται* uocant) non autē simpliciter conuertes (*ἀντιστρέφονται* nominant) esse ueras. Tertio quod etiam si mutuo cōuertentur, non tamen omne quod colore sit rubro, calidum esse, ex mutua illa cōuersione sequat: sed alia eiusmodi, rubrum omne esse ignem. Porro quod talia in rem præsentem non modo sunt inutilia, sed etiam palam falsa: cuius notum est, debemus enim, non an omne rubrum sit ignis, sed quod omne rubrum calidum sit, ostendere. Nam si quis quid rubet, ignis fuerit, erit nimirum & rosa nobis ignis. Cæterum lógicas methodos ignorantes medici primū in hoc maxime peccant, quod proprijs sensibus excedant, nimirum cum sufficiens sit experientia, iunctis saltem paucis quibusdam epilogismis, medicaminū uires exquirere. Deinde tam foede in rationibus allucinantur, ac pueri modo speculationem logicam ingressi. Eisdem erroribus tenentur, qui ex odoribus medicaminum facultates conijciunt. Nec enim quicquid bene reodet, calidum est (quod quidam dicunt, haud intelligit, quod pacto inaudire oporteat quæ ab Aristotele & Theophrasto super hac re sunt prodita, ea quæ nos in quarto harum commentationum definimus) neque quicquid calidū est, bene olet. Quinetiam neque si quid graue olens est, calidū etiā fuerit: neque si calidū, etiam graue olens. Sic nec si quis quicquid graui ter oleat, frigidū dicat, nec si quicquid frigidum sit, graui ter olere, uerum dixerit. Siquidem calidorū innumera sunt, partim bene olentia partim graui ter olentia, partim neutra: similiter quoque frigidorū. Quamquam quid calida dico ac frigida? cū debeam dicere calcificientia nos, ac refrigerantia, quæ utique inquirimus. Nec enim quod absolute calidum est, aut quod ad hoc expenditur, nunc considerare propositum est, sed quod corpus huiusmodi manū excalcifiat. Nec sanē etiam quod absolute frigidū, sed quod hominē refrigeret. Denuo ergo hic allucinatur in homonymia, haud distinctis nominum significatis, tanquam si quis de cane terrestri differēs, ad marinū se oratione transferat, existimans ut animatis utriusque nomē, ita & naturam quoque unam esse. At nobis demon-

stratum aperte est in commentarijs De tempera-
tura (quos & hancce antecessere tractationem
protinus in initio commonfecimus) aliud esse
facultate calidum, aliud actu: & huius quod ac-
tu uidelicet calidum est, aliud absolute dici ca-
lidum, aliud per exuperantiam, aliud ad symme-
trū sui generis, aliud ad quid uis obuium colla-
tum. Quin & hominem nō absolute calidum, ut
ignem, sed exuperantia calidum diximus. Siqui-
dem maiorem in eo calidi portionem inesse, q̄
frigidi. Ergo & quæcūq; ad hunc dicitur cali-
da potestate, illum excalescere dicuntur: faci-
leq; de illis innititur iudicium, & per experien-
tiam expenditur, paucis indigens (ut supra com-
monui) epilogismis. Quos cum sophistæ exced-
ant: & tempus adolescentulorū frustra terunt,
& sophismatis cauillisperq; homines seducentes eo-
rum soluentorū impios, falsis eos dogmatīs
opinioniūsq; implent. Debent enim neq; co-
lores memorare, neq; odores, imō neq; cōsisten-
tiam, neq; leuitatē, aut asperitatē, aut eius generis
quodcūq;. Nam quid refert oleum an lentum
sit, aut leue, aut splendens, aut liquidum, aut pal-
lidum, aut pingue, aut lubricum, ægreq; corpori
bus illitum exiccari possit? Quippe cum ex nul-
lo omnium eiusmodi colligere possis, ipsum esse
facultate aut calidum, aut frigidum, aut humi-
dum, aut siccum. Siquidem ex genere splenden-
tium leuiumq; & lentorum, partim sunt quæ pla-
nē nos calfaciant, partim quæ refrigerent, tum a-
lia quæ exiccant, alia itē quæ humectent, non
tantum in oleo, sed & in alijs omnibus. Neq; in
ullis adeo accidentium reperire est quicq; quod
solidum perpetuumq; sit, ut in eo generalem cō-
stituerē propositionem liceat.

*Quod sophistæ rationibus haud usi sint scientificis ad ea lem-
mata, siue suppositiones, ex quibus perperam de medicinarum
facultatibus colligunt, sed aut ex inductionibus, aut
ex exemplis. Cap. 4*

Nam omitto, quod non scientificis in omni-
bus id genus sint usi rationibus sophistæ ad inue-
niēda lemmata, sed ex inductione, & quod om-
nium pessimum est, quod nec quæ sit inductio-
nis natura unquā inspexerint. Quod si quis eos
in id prouocet, neq; sequi audent: & si de demō-
stratione quis quid agat, increpāt. Immo, quod
etiam deterius est, non ex inductione solum ra-
tio cinari allueuerunt, sed nonnunquā etiam ab
exemplis, tanquam rhetores. Nam qui frigidum
esse oleum asserit proinde quod lentum sit ut pi-
tuita, is per exemplum concludit, par robur præ-
bens demonstrationis, atq; is qui ipsum calidum
contendit, quia lentum sit ut uiscum. Nec secus
is qui calidum dicit, quoniam facile in flammam
uertatur uti bitumen, atq; is qui frigidum pro-
bat, quod facile cogatur ac conrescat ut aqua.
Nam differt ex exemplo aut exemplis quid sua-
deas, an ex inductione. Siquidem qui ex exem-
plis fidem facit: unum aut duo generis eiusdem
adsert, aut certe planē paucula, plerisq; scilicet

A præteritis. Qui uero ex inductione, omnia com-
prehendere nititur quæ per experientiā sunt cog-
nita: nec quicquā præterire, quoad eius fieri po-
test, quod apertum uulgo ac perspicuum sit, stu-
det, nisi quod occultū est & paucis comprehen-
sum. Quamobrem uiolenta est, & uehementer
persuadet quæ ab omnibus quæ experientiā sunt
cognita, ducitur inductio: solisq; ijs mendacium
perspicui potest, qui in demōstratorijs methodis
sunt exercitati. Quare nos de ea copiosius in de-
monstrationis libris disseruimus, ac forte etiam
seorsum de ea librum conuenemus.

De oleo aduersus Archidamum. Cap. 5

Palam autem fiet nihil osecius & nunc quoq;
inductionis natura, multoq; & magis exempli.
Nam omnia in summa percurrere statutus est quæ
B de olei facultate ad medicis sunt prodita, eaq; pro-
babilitate quidem, quod ita uiderentur: ac non ue-
re: ac primū illud quod ad Diocle in Archidamo
scriptum est, quod Archidamus durefcere urisq;
cutem ijs qui in eo fricarent existimari: quo pro-
pter etiam siccam frictionem pretulit. Oleum en-
nim accendi atq; exurere cum a frictione incale-
sceret, putabat: ac propterea admodum humo-
rem exhaurire atq; siccare, non secus atq; ea asfo-
rum quæ ungi solent. Nam & ipsa magis durefcere
quam si ea citra oleum afflaueris. Præstat autē
totam ascribere dictionē Dioclis. Habet autem
ea hunc in modum: At cum oleo fricare non per-
inde probabat. Primū enim inæqualē fieri eius-
modi frictionem putabat, quod manus laberen-
C ter scilicet, nec æque carnem apprehendere pro-
pter pinguedinem possent. Præterea durefcere
atq; aduri cutem in illis magis qui sic fricarentur
existimabat, quam qui sicca uterentur frictione:
oleum quippe accendi & urere a frictione incale-
lescens, quemadmodum in asis quæ uncta sunt,
magis q̄ non uncta, ubi oleo accenno incalescūt,
& ualde exiccantur, indurefcūtq;. Similiter quæ
in oleo coquantur, dura exustaq; effici eandem
ob causam. Ad hæc quemadmodum ligna & co-
ria, & alia cōplura quæ ex oleo fricantur, oleum
in trō imbibūt: ita putabat & corpora. Quod cū
fieret, multa quæ solita essent cum spiritu effluere,
ac foras prorūpere, tunc concludi arbitrabatur:
D ceu que cribris, linteis, lana; omibusq; adeo
per que percolari quæ affolent, perfundit ac inun-
gitur, nō æque liquores fluere per ea ualent. Por-
rō ubi ea excretio intercepta est, quædam in trō
recurrere, quædam acruata inuicēq; implicita
meatus opplere, retenta scilicet ab oleo, q̄ uisco
quid simile habeat: sicut in alijs omnib; apparet,
quod pingue est, pulueres ac festucas, omniaq;
eiusmodi consecrari. Denique ubi obstructi iam
meatus fuerint, perpetuo ac sensim omnia deterius
perfici esse necesse, q̄ in ijs quæ pro consueto
gerunt naturæ modo. Putauit quoq; oleo in-
esse mordacitatē, cuius uis oculi illachrymarēt, &
guttur in tussim cietetur (quod κῆρ' ἄνευ uocant)
tum alius radere, extremētaq; redderētur san-
guino-

guinolēta eo bibito: proinde qui citra frictionem ungerentur, nihil affligit: infirmiorē enim esse mordicationē, quā quæ sensum mouere possit. At si per frictionem carnē subintret, mordicationem molliori maligniorem: uelut multa medicamentorū. ubi enim illinūtur, minus ualent: ac compressa introque subeuntia magis agunt: sicut sanē si urticis, & alijs multis sensum quempiam contingas, nihil læseris: sin ferias aut premas, utiq; offenderis. Hæc ergo sunt quæ Diocles in Archidamo prodidit, quorū simul tum probabilitatem, tum prauitatem cōspicere est. Siquidem quod quicquid in oleo coquitur, propriam amittit humiditatem, ac friabile durumque celeriter reddatur, cū alioqui nihil in aqua tale perpetiatur: ipsa nos docuit experientia. Quāobrem hac utiq; parte nihil Archidamus mentitus est: debebat tamen, sicut Aristoteles & Theophrastus, alijsq; nō pauci philosophi eiusmodi problemata in physicis quæstionibus & proponunt, & solunt, ipse quoque (si quidem omnium rerum causas scrutari uoluit) perinde ut illi, uti proponere, sic quoque soluere. At cum id minus facere appareat, in hoc uel maxime mihi delinquere uidetur. Nam quod apparet euidenter, id semper primum ponendū est: ac deinde, sicut libeat, causam etiam inspicere debet, physica problemata hunc in modum componens. Cur oleum quæ in ipso coquantur, sicca & friabilia efficiantur: aqua uero, humida & mollia. aut, Quamobrem in oleo etia siccescāt: at quæ aliter in eo madidata sunt, magis propriam seruent humiditatem, quā si omnino non essent madidata. Qua ratione scyllæ & urticæ morsus sanet. Qua de causa his medeat, cum ipsum oculos mordicet. Qui fiat, ut reliquum corpus uniuersum non mordicet, sed oculos duntaxat. Quo pacto uentrem subducat. Quo modo lasitudines sanet. Quamobrem inunctos tueatur a frigore. Quare animalia insecta interficiat. Cur lora & coria emolliat: at quæ in ipso coquantur, duriora omnia efficiat. Atq; hoc unum est problematicū genus, ad physicum duntaxat attinens. Alterum uero, quod cōmune quoque eorum est, qui artem quamuis exercent, est tale. Quam ob causam carnes piscesq; assantes coci oleo prius illināt. Quid sit quod athletas oleo fricent gymnastæ. Quid etiam quod pueros pædotribē. Nam cuiusq; talium problematicum ab experientia profectam causam assignare liceat: coci nimirū responsuris, propterea se pisces ac carnes oblinere, quod sicca adustæque extimæ eorū reddant partes, si citra pinguedinem assentur, athletas uero se ex oleo fricare diciturū gymnastis, tum quod quæ ante inerat lasitudines ipsum exoluat, et quæ future sunt mitiget, tum q̄ frictionem æqualem & mitem planē efficiat, corpusq; ad motus futuros præparet. Eas ob res ipsi quoque pædotribē pueros se & ante, & post exercitia inungere dicent. Cur autem oleum lasitudinū medeatur, haud etiā nouit nec gymnastæ, nec pædotriba, nec medicus experientia curans; nec tamen quia id nesciant, ab euidenter apparen-

tibus recedent. Siquidem tamestī ignorant, quā obrē ueratrū albū sursūm purget, nigru deorsūm detrahat, neq; cōpertum habentes, quare cnicus pituitā ducat, atrā uero bilem epithymū: tamē medicamentis ad ea utuntur, ad quæ utenda docuit experientia: & eos quibus est opus curant, & euidenter apparentibus fidem habent, eosq; qui contraria rationi adstruunt, derident.

Quod præterquam quod pignanti de olei facultate Archidamus asserat, insuper improprie utatur excemplus. Cap. 6

At Archidamus supra quā quod in multis, quæ perspicuo apparent contemnit, insuper & hac quoque parte taxādus mihi iure uidetur, quod dicat meliorem esse frictionem sicca, quā quæ cum oleo adhibetur, quia corpus durius & siccius ijs qui unguuntur, efficiatur: mollius autem ijs qui fricantur sicci. Dicit porro nihil secius & in illa ipsa dictione paulum progressus, ligna, pelles, aliaq; quæ ex oleo fricantur, ipsum in profundum transmittere, idq; maximum esse testimonium, quod in corporibus nostris intrō subsiens meatus oblinat, ac humidorum prohibeat effluxus. atque ego quidem quomodo hæc consonent, nescio. si enim humorū effluxus prohibet oleum, haudquaquam siccum dicendum foret, ac proinde frustra id tanquā desiccans in frictionibus repudiat. Falli præterea in hoc mihi uidetur, quod similiter affici putet tum ea quæ in illo coquuntur, tum eos qui fricantur. Nec enim eadem agere dixerim oleum calidum, frigidum, temperatū, tepidum, aut feruens, sicut nec aquam ipsam. Apparet enim & ipsam, si frigida applicetur, cōdensare, constipare, contrahere, constringereq; & repercutere: sicut si extreme feruida, adurere. At si temperata adhibeatur & moderatē calida, laxare, rarefacere, fundere, digerere. Porro si nec insigniter calida nec frigida admoueat, sed uelut quæ fontana dicitur, tunc propolitorum nihil efficit: uerum propriam sui facultatem exeret. Sic si quis oleum expendere uolet, ab omni prius liberum alieno tum calore tum frigore ipsum efficiat, atq; ita demum ad explorandū accedat: quippe quod summe frigidum fuerit, non ex sua duntaxat facultate, sed ex aliene qualitatē excessu non nihil in contactis operabilis: Ita quoque quod magnopere calidum. At si utroque ipsum liberans, sic demum examinare uoles, hoc duntaxat pacto propriam olei uim inueneris. Quapropter cum quis ex more oleo fricat, sicut gymnastici omnes, in solo fricat oleo, quod nimirū absq; omni sit aliena qualitate: at si admodum ex calfacto, aut summe utatur refrigerato, iam compositam eide actionem necesse est, nempe ex propria olei facultate, & aliena qualitate. Saepē uero, propriam cuiusq; medicamenti facultatem oblectari necesse est, ubi ualentem aliunde qualitatē acciverit. Itaq; qui simile fuerit, herbam in oleo seruare coquere, ac exercitantium corpora fricare: Maxime siquidem, uti supra ostēdimus, extrinsecus ductas probationes fugere oportet, cum liceat nimirū propriam cuiq; adhibere experientia. Quod si quan-

si quando tamen id quispiam facere uolet, certe si milia cōparare conabitur, sicut in corijs faciebat & loris. Nec enim quispiam oleo in igne præcalfacto, neq; in niue refrigerato, sed obuio quoq; accepto coriū ac lora conficit. Ita puto & pædotri- bā faciunt, obuio oleo pueros fricātes, neutiquā aut in igne excalfacto, aut in niue refrigerato. Alioqui sanē & nos non raro caput ardore grauatū olei admodum frigidi perfusione refrigerauimus. Porro si salis nihil oleo sit inditū, tanto magis refrigerabit. Sin etiam omotribes, hoc est crudum fuerit, multo profecto etiam amplius.

Quomodo frigidum paremus oleum. Cap. 7

Porro præparare illud solemus non aliter atq; aquam, nempe prius excalfacientes, ac deinde aqua mergentes summe frigida: at si etiam fons in ipsum cum strepitu decidat, uasculo nimirum, cui inest oleum, ante diligenter ocluso, magis quoq; ac magis ita reddet frigidum. Multum item refrigereris, si præcalfactum in puteum ita demittas, ut aquam contingat, quanq; quod aquam nondū tangit, frigidū item euaserit, sed non perinde. Atq; hoc pacto præparandum frigidum reddimus oleū: contra, calidum. Quo sanē modo etiam utimur in refrigeratis corporibus, in alueum olei calidi demittētes, quibus pars quæpiam obstupuit, aut tremuli sunt, aut conuulsione tentantur, aut motu, sensu uel priuātur, aut etiam æge sentire possunt, aut eiuſmodi quippiam perpeſſos. Ergo si quis ex uniuerso usu de medicaminum facultate pronunciet, nunquid excalcare & refrigerare, tum exiccare & humectare nos oleum, uelut Dioclis Archidamus, siquidem pugnantias considerare animaduertēq; nesciat, putabit. Nam cum exiccare & fragilia effici quæ in oleo coquantur dicit, exicantem & digerentem eius facultatem offendit. At ubi intro in coria subire, porosq; nostros oblinire, ac naturales humorum effluxus prohibere, rursum sanē quodammodo cōtrariam eius facultatem demonstrat tum digerentibus, tum exiccantibus. Atque in istis uel adhuc quæ apparent proferens, de illis non recte ratiocinatur. At ubi de mordicatione agitur, non ea omnia cōmemorat. Nam quod oculus mordicet, quod guttur exasperet, siue ad tussim prouocet, quod uentrem radat, atq; secessus sanguinolentos efficiat: abunde magna testimonia sunt, mordacem illi inesse facultatem. At quod ulcera dolore liberet, & uētris mordicationes aut irrigatam, aut inſusum omnino sanet, quiq; morſu irritatur mitiget, cum & ipsa non parua sint contrariæ ipsius facultatis indicia: plane omiſſa sunt. Cæterum si utriq; propositis quis ratiocinari uolet, duorum alterum ueniet: aut enim id faciet Empiricus, qui experientiæ omnia tribuit, dicitq; se in collatione ad aliquid cuiusq; medicamento facultatem per experientiā cognoscere, ipsius autem per se propriam ignorare naturam: aut ut Rationalis, contrarias inesse medicamento facultates, mordicantem & lenientem; ac deinde ingenti tenebitur anxietate causam diciturus cur interim altera earum agat sensibilibiter,

interim altera reliqua aut perditā, aut nō clare apparente. Quorum omnium dubitationum solutiones, siquidem ut physica proponantur problema, sanē quā diffi- ciles sunt; sin ut ad usum referantur artis, multam requirunt experientiam: epilogifimos autem non ita multos, sed exactos ac de finitos. Nam primum, an omne oleum oculis mordax sit, nec ne, experientia incunctanter definire præstat, haudquaquā ex tempore in utranq; partem rhetorum more distingere: tum an omne eque guttur exasperet, aut uentrem subducatur at radat, ut nō nunquā cruentas moueat excretionēs: an oleorum hoc quidem hæc faciat, illud uero non: & aliud magis, aliud minus. Olei differentias nunc recensere, nequis heterogeneis, siue alterius generis existimet, sicut cicini, raphanini, caryini, balanini, ac similitum. Nam & horum uires medicus noscat oportet; sed in præsentia eas enumerare nō expedit. Satis est enim, mea quidem sententiā, principio propriissimum & quod maxime ab omnibus hominibus uocatur oleum, cōsiderasse: quando & ipse fructus ex quo fit oleum, solus ex omnibus oliuā nuncupetur, & arbor olea (græce utrunque *ελαια* uocatur, & ipsum oleū *ελαιον*) ipsumq; simpliciter primario oleum dicitur: at reliqua omnia per translationem & abusum.

De differentijs proprie uocati olei. Cap. 8

Huius sanē quod proprie oleum appellant, de quo omnis in præsentia sermo habetur, plures dico esse differentias. Secundum ætatem quidem, cum aut recens est, & uelut mustum, aut ætate uigente aut uetus. Secundum præparandi modum, cum aut simplex solumq; & impermixtum fuerit, aut cum sale præparatum. Secundū fructus ipsius diuersitatem, cum is aut immaturus, aut maturus extiterit. Secundum inductam arte alterationem, cum aut quomodo ab initio præparatum fuerit, ita seruetur, aut candidum efficitur. Scriptum uero est de abſicatione eius & ab alijs non paucis, & nos quoque in sequentibus de illo non nihil trademus. Horum omnium oleorum facultates ipse equidem experiri studui: quid autem in quoque fieri deprehenderim, postea exponam. At nunc absoluerē statim primum quod erat in manibus. Perperam enim mihi uidentur medicorum plerique tum experiri medicamenta, tum de uiribus eorum ratiocinari.

Quomodo cuiusque medicamenti facultatem experiri oporteat. Cap. 9

Quippe cum experiri solum oporteat quæ impermissa sunt, & ab omni extranea qualitate aliena: eaq; primum in optima corporis constitutione, deinde in imtempertis, demum in morbis simplicibus; sicut in libro hunc antecedente, & in tertio De temperamentis definitum est. Ratiocinari uero, id quod ex accidente est, semper ab eo quod per se est, distinguentem.

Quod non solum in explorandis medicamentis medici allucinentur, sed etiam in opinionibus quas habent de affectibus. Cap. 10

At nonnulli medicorum non in istis modo allucinantur

cinantur, uerū etiam in opinione quas habent de affectibus. Nam oleum quod lasitudinibus remedio sit, omnes propemodum fatentur: ceterū quis affectus sit lasitudo, non cōsentiunt. Hic em̄ articulorū esse ariditatem, ex motionibus deficitatorum: Alter & musculorū adicit: Alius porro contra q̄ hi, humiditatem multā, & tensionem, & caliditatem: fluxione nimirū partibus uehemēter agitatū effusa: Alius non humorum multitudinē, sed qualitatem solam caufatur: prouenire inquirēs in motionibus immoderatis pinguedinis carnisq; tenerā colliquationes quasdam, quarum pars foras transpiret, reliquum retineatur in corpore: & hoc cum acre mordaxq; sit, affectionē efficere ulcerosam. Itaq; etiā si in hoc cōueniatur, quod lasitudines sanēt oleū, attamē ob ancipitem atq; ambigū corporeis affectum, nihil queat certi de olei facultate colligi. Atq; id sanē non tantum in lasitudine usu uenit, uerum etiā ubi doloris causa, aut mordicationis, aut phlegmones gratia bibendum oleum exhibemus, aut per sedem infundimus, aut identidem perfundimus. Siquidē ulceribus phlegmone affectis non solum, sed & cum aqua moderate calida perfundimus, ut in lasitudinibus cum lauacro aquæ dulcis: sed nec quæ sit in phlegmone affectio, consentiunt. Porro ubi per sedē ipsum ingerimus, aut bibendum offerimus, ne tunc quidem cognoscimus euidenter, cuiā corpori ipsum applicamus, an pituita, an bilis, an aliorū aliquorum recrementorū pleno. Constat enim, nō perinde hominem affecturum, ubi pituita uiscosa intestinum omne simul cum uentre plenum offendet, atq; ubi biliosis excrementis refertum, aut alijs quibusdam acris humoribus, aut stercore multo, aut horum quidem nullo, sed incidet in uentrem intestinaq; undiquaq; pura: aut præterquā quod pura, etiam exasperata reperiat.

Quod ut quis probe de olei facultate ratiocinetur, debeat etiam affectionem hominis estimare, & de ipso oleo quale sit præfinire. Cap. II

Itaq; negligenter admodum & segniter de his omnibus medicorum pleriq; ratiocinatur, haud indicantes nec quo pacto affecto homini oleum exhibent, nec qualenam ipsum. Ac mox tamē dicūt, alij mordicare & radere prorsum partes corporis internas, alij uero etiam si præfuerit mordicatio, & huic mederi. Nec enim parum interest, an iniiciatur in uentrē pituita scatentē oleum expersalis (Græci *ἄκαλον* uocāt) & quod re uera oleum est: an quod plurimum accepit salis, in uentrē purum. Vtrunq; enim aluum subducit, diuersis tamē facultatibus. Nempe illud quod sale uacabat, in pituitoso uentre per lubricitatem, similiter maluis, blitis, moris: Quod uero sale habet, in puro per acrimoniam, perinde ut muria, & marina aqua. Et sanē hoc quidem radet, alterum non radet. Ergo nec absolute oleum quoduis interna omnino radere dixerimus, aut deiectiones moliri cruentas, neque mordicationes lenire, uerum id cui sal est inditus, in puro uentre radere: cui autem non, in pituitoso non radere.

Quod falsuginosa & acris ex accidente quandoque morsui medentur, nempe secum quod mordacit educuntia. Dulcia uero & epicrastica contra morsum etiam aliquando ex accidente exasperant, nimirū cum una corrumpantur, & foueant alantq; cacochymiam. Cap. 12

Nonnūquam uerō mordicationes ex accidente quod falsuginosum est, sanauerit, uelut melicratū, fallugo, serum lactis. Educunt enim secū hæc nonnunquam succum mordicationem facientem, ac mordacitatis redduntur medela, perinde ut cætera omnia quæ abluunt & abstergunt. Sed non statim ubi immissa sunt hoc genus medicamēta, morsum sanant, quā potius tunc etiam exasperat. Siquidem euacuationes, haud missionis ratione sanationem molistur. Quippe ceratum ex rosaceo & adipē aut pinguedine infusum, sæpenumero moribus cōtinuo succurrit, idq; missionis ac temperationis ratione. Sed & oleum ipsum solum, sed dulcissimū, id frequenter præstitit: sicut certe etiā adeps hirci, aut succus chondri, aut ceratum ex oleo dulci. Nos autem sæpenumero quibus ex frigore interna dolore torq̄uebatur, ingestū oleo calido dolore liberauimus: ac si maius esse frigus cōsiceremus, addidimus & anethum, oleum ex caliditate facientes: si uero adhuc etiam inanis, rutam quoq; & bitumē. Hismodi igitur auxilia omnia q; frigori medeant dolores mitigant, nō propterea quod lædentem humorem attemperant aut educāt. At in idem uniuersa confusa sunt pleriq; medicorū, qui nec norunt dolorem ab intemperatiā naturam, ab eo qui ex cacochymia oritur, distinguere: nec quod medicamentorum quæ doloris gratia iniiciuntur, alia excalfaciendo partem refrigeratā sanant, alia humorem mordicantem euacuando, alia miscendo. Sed & subinde mistæ existunt affectiones, ex intemperatiō uidelicet, & mordicationē. In quibus nos consueuimus anethinum, aut rutæ oleū infundere, anserino in eo liquato adipē: si si non adsit, saltē gallinaceo: si nec is quoq; uel aliorum aliquo: quod si horum nullus ad manū fuerit, ceram miscemus mordacitatis expertē (uocā autem sic eam quæ lota est) aut certe oleum ipsum quod effectum est candidū, infundimus. Nam id ceræ mordacitatis experti proportionale est. Temperaria itaq; pronuntiatio est atq; indefinita, tum eorum qui oleum omne omni tempore mordicās adstruunt, tum eorum qui leniens. Nam quod sale accepit, mordax est: quod autē eo caret & dulcere est, quod quidē ex se est, lenire potest. Nam uideri possit & ipsum quandoq; pro affectibus quibus applicatur, haud etiam esse eiusmodi. Vnum quodq; em̄ temperantiū medicamentorū (Græci *ἰσχυρῶν* uocāt, siue *ἰσχυρᾶσιν* nūcupant) ubi ualentius euasit humoribus mordicatis, morsum eorum retundit. Verum si aut ualentioribus facultatibus, aut multis paucum mistum fuerit, unā & ipsum corrumpitur, alitq; cacochymia, siue succi malignitatem. Quamobrem protinus euacuandi sunt qui ab ijs qui temperandi naturam habēt, irritantur atq; asperantur: utpote qui multa nec facile mobili corruptione sunt repleti.

De lacte. Cap. 13

Sic sanè lac frequenter simul atq; sumptum fuerit, alijs acefcit, alijs in nidore uertitur, prius q̄ probe concoctum corruptionē temperet. In quibus utiq; primum maxima cacochymia pars euacuari debet, atq; inde sumendum chondrus, & ptifana, & lac, & alia, quæ ubi probe fuerint cocta, conferunt ad euechymian, hoc est succi in corpore bonitatem. Non tamen quod ad hoc attinet, omnia existimare oportet, aut deteriores, aut contrarias in sese obtinere facultates, neque in sermone scientem eorum quæ eueniunt partem alteram omittere; id quod fecit Archidamus in oleo. Si quidem memorabar oculos ab eo mordicari, guttur ad tussim excitari, & uentrem radi. Cæterū quod stomachum sepe cum ualèter morderetur, oleum protinus dulcissimum sanauit, & iniectum totius uentris mordicationē leniit; & à thapsia, urtica, & scilla excitatas sedauit; eorum mentionem non fecit. Ego uero non ambigo, neq; fidem non habeo ijs qui aiunt, rebus propemodum omnibus multas ac diuersas inesse facultates: quin ostensurum me id ipsum polliceor in libro sequenti. Attamen non proinde adstruo eam quæ in quoq; exuperat, non posse cognosci. Verū si quod ex accidente est ab eo quod per sese, distinxeris, omnia clare cognoscēs. Contēplator enim utrunq; in exemplis, propositis uidelicet exempli causa duob. hominibus, quibus similiter os uētris mordicetur, & qui pariter aut succum ptisanæ, aut chondrū, aut panē lotū sumperint; deinde alteri mordicationē restinctam, alteri uero inauctam ponito; obsecro, nunquid succus ptisanæ, aut chondrus, aut panis ex se mordax est, per accidens autē in altero hominum morsum non modo non inauxit, sed mitigauit; an quod ex se quidem erat mitigauit, per accidēs uero in altero irritauit; Ego sanè ex sua natura epice rasti cum esse dico succum ptisanæ, & chondrum, & panem, & per louem lac quoq;: cæterū in altero homine morsum auxisse, q̄ properasset à corruptione superari. Atq; ea utiq; est (certo scio) ueterū omnium sententia, sed & recentiorū optimi qui que ita sapiunt. Verū si quis fuerit quem ego nesciam (nec enim quicquam est quod non audeant iuniorum medicorum quidam) qui cōtendat, ex sua natura corruptiones augere chondrum, panem, aut ptisanam, cæterum in quibusdam ex accidenti nimirum mitigare: is in quā qui talia facitabit, nullā assertionis suæ demonstrationem asserere poterit. At nos dicimus, q̄ si ptifana foret cacochymos mal' ue succi, haud unquam mordicationē mitigaret. Atqui cōspicitur frequenter tum superne sumpta, tum per sedē iniecta mitigare: Ex quo patet, per suam quidem naturam boni esse succi; uerū interdum unā cum ijs succis qui mordicationes excitant, corrūpi & ipsum augere symptoma.

Quomodo discernendum sit, a cacochymisne mordicatio sanata
sit an ab epice rasticis, hoc est temperantibus. Cap. 14

Fortè igitur nos roget quispiam, an nullum unquam cacochymorū mordicationem curauerit? Equidem id nō raro factum cognouit; uerum ea di-

A CO non temperando, uerū id quod mordicabat euducendo, mordicationes sanasse. Ac proinde & statim, & usq; dum euacuentur, hominē mordicare, & insuper euacuata asperum relinquere sensum in partibus, aliud medicamen requirētē. Quod non faciunt quæ boni sunt succi & dulcis (Græci ζύχμα & γλυκύχμα nominant.) Etenim & protinus mitigant, & absq; ut euacuationem efficiāt, tum sensum asperum nullum inducunt, quin potius ipsa cōtra sensum medentur asperitati. Itaq; chondrum, lac, ptisanam in eiusmodi affectibus & edenda præbemus, & per sedem iniicimus, ubi uidelicet melle, aut quopiam eiusmodi quod in se stabat extersimus; quo tēpore opportunus est & adeps, & ceratum inde dulce, & oleum dulce. Porro & in presenti & in sequēti deinceps sermo ne omnia me dulcia dicere existimato, tum ea quæ salem non sunt experta, tū ea quæ sunt elota. Quatuor itaq; indicijs ac notis, cum possis quod per se lenit distinguere ab eo quod per accidens, facile cuiusq; talium medicamentorum facultatem inuenies. Primum indicium est, an statim mitiget, an non. Secundū, an intus maneat sanando, an non. Tertium, an asperitatem quandam in corporibus relinquat, an non. Et quartum, an non ita affectis utile & commodum uideatur. Nam cum nec protinus mordicationem sanat, uerum maiore cū uehementia excernit, nec intus medendo remanet, & molestam corporibus asperitatē relinquit, quæ, si denuo offeratur, exasperat; argumentum est rodentis ac mordicantis esse naturæ, cæterū ex accidente quandoq; morsus sanare. At quod & continuo mitigat, et nullā excretionē prouocat, sed nec exasperat dum intus manet, imò exasperatum medela existit, ipsum quidem natura bonū est; uerum interdū à cacochymia, quæ ipsum alterat corrumptq;, mordax efficit. Atq; hæc ita à me dicta sunt, ut simul utriusq; medicamentorū generis & tempus, & utendū modū, simulq; facultatis inueniendæ rationē docuerit oratio, demōstraueritq; & ptisanæ succū, & chondrū, & tragum, & lac, & panem elotū, ex genere esse euechymorū; quin & pinguedinem, & adipem, & oleū dulce & ceram dulcem ex mitigantium esse natura. Fuerit autem cera dulcis, quæ & natura est talis (nam quædam gustantibus amaræ sunt) & quæ præterquā quod est talis, in aqua bona elota est.

De ratione abluendi & candida faciendi medicamenta. Cap. 15

Lauanda porro est non tantummodo cera, sed & pix, & resina, & oleum, & quicquid aliud aquæ misceri non patitur. Primumq; modice concalfactum, mox in uas lati oris ac magnū, cuiq; insita quæ copia purissimæ simul & omnis qualitatis expertis, infundito. Nam in ea quicquid id sit quod abluitur, acrimoniam suam exiit. Deinde contento, tundito, frangito, manibusq; impense subigito, ut unaquæq; uidelicet abluendi medicaminis particula aquam possit contingere. Deniq; effusa priore aqua, rursus quod lauatur ex calfaciens, in aliam aquam æque syncerā iniicito, rursusq; diu

uissime contundito, donec qualitate suam in aquam deponat. Id autem gustu datur cognoscere. Mox uero & tertio, & quarto, & sæpius deinceps idem faciendū, donec aqua nullam etiam ex abluo medicamento qualitate recipiat. Atq; hūc in modum omnia quæ exalfici & fundi sustinet, la uabis. At si qua sint lapidosa et dura, uelut cadmia & æris squama, & æs ustum, ea exacte in tenuia comminuētem, plurimum in aqua terere fontali purissimaq; oportet, subinde priore effusa, quoad nihil in aqua innatet, maneatq; aqua profumē a cō triti medicaminis qualitate immunis. Nam quandiu aut qualitas eius quippā in gustu appareat, aut aliquid innatet, tandiu terendum atq; effundē dum est. Nam si hoc pacto quiduis eorum quæ la uari possunt, abluas, mordacitatis expers euadet. Et sanè oleum non tantum mordacitatem exiit, sed etiam candidius interea efficitur. Oportet uero ipsum non perinde uehemēter uerberare ut pī cem, aut ceram, aut resinā, ne uidelicet adeo aquæ miscatur, ut egre postea separari possit, sed ita, ut ubi quiescere paulisper siueris, facile possis innatans detrahere. Sunt & alij modi quibus oleū efficiere possis candidū, quos scriptos inuenies apud eos qui præparationū libros conscripsere, & qui de materia prodidere, ut & apud Dioscoridem in primo. Verum pleriq; eorum consumentes quod in oleo aqueum ac rufum est, reliquum cādīdum efficiūt. At hic abluendo, ueluti ipsum abstergendō ac detergendō, candidum efficit.

Quod non colligatur oleum ex eo quod ad tulsim quendam ciet impetū, proinde esse mordacneq; enim omne quod ad tulsim quendam impetum ciet, mordax est; neq; solum quod mordax est, ad tulsim impetū mouet, sed & quæ pinguis sunt. Cap. 16

De medicaminum quæ lauari candidaq; effici solēt, dispositione, aliās dicit: nunc ad propositū reuertor. Oleum quod non sit omphacinū uocatum, hoc est, crudum (id enim astringit) neq; cum sale præparatum, neq; recens, ac uelut etiamnum feruens, ad hæc omnia accurate lotū, id neq; e potum, neque infusum mordicationem exercebit. Quod si guttur ad tulsis impetum prouocet, non idcirco mordax dicendū erit. Nam quicquid mordax est & acre, ad tulsim impetum prouocat; non tamen quicquid impetū ad tulsim prouocat, mordax est & acre; hoc enim duntaxat pacto mordax esse oleum conuicis, si quicquid ad tulsim impetum mouet, mordax esse confessum fuerit. Occurrit itaq; denuo hic error nō leuis, sed perniciosus, in conclusi conuersione commissus. Confessum enim est, omne mordax impetum ad tulsim mouere, & confessum est, oleum omne ad tulsim mouere impetum; uerum his suppositis non conficitur oleum esse mordax, neq; si categoricas, neq; si hypotheticas efficiamus propositiones; quod scilicet ex duabus uniuersalib. affirmatiuis nihil concludi in secunda figura possit, neq; conclusio ex necessitate sit uera. Fient autem in syllogismo categorico duæ propositiones istæ, Omne mordax ad tulsim impetū ciet: sed & omne oleum ad tulsim impetum ciet; quibus confessis nihil cōcludi

Galen.

poterit. Hypotheticam uero propositionē, quam Chrysippus *ἄφισιαμα συννημῶν* nuncupat, uerū accipere non licet, neq; a sensu, neq; ex sensu, neque ex consequentia rationali. A sensu enim, aut per sensum, aut ex sensu, aut utcumq; nominare placebit, id genus *ἄφισιαμα* desumpta sunt: nepe, Omne mordax ad tulsim impetū ciet; &, Siquid mordax est, itidem & ad tulsim impetum ciet; & non si omne mordax ad tulsim ciet impetum, propterea quicquid ad tulsim ciet impetum, mordax erit; neq; omnino ad hoc, Siquid mordax est, hoc & ad tulsim impetum ciet, sequitur in uniuersum istud, siquid ad tulsim impetū ciet, ipsum & mordax esse: sed id quidem, si non ciat ad tulsim impetum, hæudquaquam mordax esse, id inquam uerum est; quippe cum mutuo cōuertantur. Non tamen si quid ad tulsim impetum ciet, continuo & mordax est. simpliciter em hoc conuertitur, & nō mutuo. Demonstratum autem in methodis logicis est, quæ ex mutuo ueris conuertunt orationes, ipsas quoq; ueras esse, at quæ simpliciter conuertuntur, nō perpetuo esse ueras. Illas quidem *ἀντιπρόσφωτος* uocat, hæ uero *ἀντισπρόσφωτος*. Igitur si non ex necessitate uerū est, siquid ad tulsim impetum mouet, idem mordax esse, neque sanè oleum proinde quod ad tulsim impetū moueat, mordax esse cōcludi poterit. Hoc em duntaxat pacto, nemi pesi in confesso esset, omne quod ad tulsim impetum moueat, itidem mordax esse, uere talem cōfici conclusionē inueniretur, Si ad tulsim impetum mouet oleum, utiq; & mordax est; quō uidelicet ad hæc sequatur orationē, facta tali assumptione: Atqui ad tulsim mouet impetū oleū; sequitur ergo iuxta primā orationē in demonstratā, mordax igitur oleum est. Verum enim uero nō hoc pacto colligendū illis fuerat, quōd si quid mordax esset, continuo & ad tulsim moueret: sed quod sola mordacia ad tulsim impetū prouocant. ita enim concluderetur, quicquid ad tulsim moueret impetum, esse mordax. At hoc ipsum, sola uidelicet mordacia ad tulsim impetū ciere uideri, & aliene à sensu dicī (quippe cum & pinguis mouere ad tulsim impetū appareat) & quod quærīt, promptè assumptum est neq; ex sensu, neq; ex demonstratione. Præterea hominū id est ignorantium, quamnam sit ad tulsim impetum mouēdi affectio, quam fortassis ipsis exponere præstitit.

Quomodo & per quæ ad tulsim impetum cieri contingat. Cap. 17

Contingit autem ad tulsim impetum cieri inæqualitate quadam in gutture præter naturam proueniēte: quippe cum spiritus per puram leuemq; ferri uiam consuetus, si quando in eminentia quædam impingat, tumultum quendam ac uelut inæqualem concussionē in gutture efficit, atq; ita ad tulsim animal prouocat: nam ut alias quoq; multas natura hominib. salutis gratia ingentis indidit passiones, ad eundem modum & sternutationem, & tulsim: Sternutationem quidem, uti ea quæ in naribus infesta molestasq; sunt, propellerēt; Tulsim uero, ut quæ in gutture. Porro duplex ea

tom. 5

c affectio

affectio est, aut reficcata exasperata ue quæ in arteria est mēbrana; aut inæquali in ea corpore delato, siue id liquidum sit, siue solidum. Hinc seu panis micula, aut alterius cuiuspiam edulij, nobis inuitis in spiritus meatū decedat, tulsire adigimur, seu si bibētibus affatim ipsius potus quippiam eo influat, similiter irritamur, atq; ad tulsim cōpellimur. Percolatur enim perpetuo per asperam arteriam in pulmonē ipsius potus tam exile quippiā, ut protinus ab instrumētis raptum per facile quocunq; distribuatur, nec tamen uspiam acruatim in spiritu semita consistat, neq; animal ad tulsim irriter. At ubi uel id ipsum plusculū, uel aliud quodpiam seu liquidū, seu solidū corpus in aspera deferatur arteria, iam inde tulsire necesse est, donec à spiritus uehementia quod molestat propulsatum eiciatur. Proportionale quippiam huic accidit, ubi in membranam ipsam arteriæ exasperatā spiritus impingit, nisi quod hæc affectio alia à iam dicta sit. Nunc enim ab arteriæ membrana, aufertur abraditurq; quippiam: intus uero adheret aliquid in priore affectu. Porrò utriq; cōmunis est spiritus uia inæqualitas. De quibus fusius in causis symptomatū disseruimus. Cæterū impræsentiarū cognouisse sufficit, quod mordacia gutturis exasperatione, oleosa uero & pinguiā illitu inæqualitatē & ad tulsim impetū efficiant. Quicquid enim extra naturam in arteriæ incidit tunicā, tenaciterq; illi inhæret: tum organa ipsius, & qui per ea deferuntur spiritui insolens est, tum animanti quoq; molestum. Nec id nunc dico, quin pleraq; ex oleis mordicantia sint. Nam & quæ admistum habēt salem, & prorsus recētia sunt, ea omnino mordacia quoq; sunt: non propria sui essentia, sed quoniam omnibus plantarum succis geminum insit excrementum (quod abunde indicauit Theophrastus, & nos postea commonstrabimus) alterum crassius, ac uelut terrestrius, alterū tenuius, & uelut aquosius. Sanè & oleo ambo hæc insunt, ad cōcoctionem & discretionem tempus postulantia. Porrò tempore quidem alterum residet, alterū uero consumitur: ac primū quidem, quod uidelicet & terrestre est & crassum, subsidit amurca nuncupatū; alterum uero tenuius, ac uelut aquosius, quodam modo & ipsum compositum est, ex aerea scilicet essentia, & tenui serosa.

Quot modis aqueum & tenue excrementum ab oleo separari queat. Cap. 18

Cæterum serosum istud sului coloris est, à crasso illo terrestriq; subsidete scilicet qualitate absterfa. At oleum ipsum tum minime mordax, tum cādidum sua natura existit. Quapropter ubi tenue hoc excrementum separatam fuerit, candidius etiam dulciusq; efficitur. Separat uero multis modis. Aut enim in sole feruente lati oris uasculo olei pleno deposito, conchis in altum sublatis, subinde cum strepitu desuper conturbant: aut calidos uasculis oleum continentibus cineres subiiciunt, solarem quam fieri possit maxime calorem imitati (maiorē enim idcirco uitant, quod ipsum in qualitate alteret, prompteq; fumum excitet) aut nu-

A cleos oliuarum, aut frumētum circuncirca apponunt: aut medicamenta ualis ipsi iniiciunt. In summa, quod aqueum est, exigūt atq; consumunt, reliquum autem seruant. Itaq; si tam dulci cādidōq; accepto oleo, cuiq; ab initio sal inditus est, ipsum insuper, ut ante positum est, laues, id tibi medicamentorum omnium minime mordax erit. Ac nos quidem persæpe oleum eiusmodi bibendum non nullis exhibuimus, nosq; ipsi experimenti gratia sumpsimus, prorsusq; nullam intestinis mordacitatem attulit, gutturisq; minime ad tulsim impetū cōmouit, cumq; oculis esset insufum sensum mouit exiguum, ipsa potius nouitate atq; insolentia, quam acrimonia molestum. Atq; eiusmodi sanè oleum, ad unguem oleum existens, cuncta tum humectat, tum emollit, ubi nec summe (ut monuimus) frigidum, nec calidum applicetur. Porrò cui iniectus sal est, nonnulla quoque inest necessaria mordacitas. Verum mirer sanè si quis tantū indat salis, ut oleosam pinguemq; substantiā exuperet: utq; Archidamū scilicet referat, qui ait cutē adrihis qui in oleo fricantur: quandoquidem & id se penumero factum uidi, cum aliorum nonnullorū gratia, tum podagræ & arthritidis: fricant em partes affectas trito in pauculo oleo sale multo, idq; per intermissiones, haudquaquā in paroxysmis, tum ut superfluum omne exiccet atq; discutiāt, tum ut partibus infirmis bonam comparent habitudinem ac robur. Atq; in hoc quidem sal exuperat, in oleo uero superatur: potiusq; eorū quæ in oleo rigata sunt, faciēda cōparatio est, quam quæ in eo decocta, utpote qui hominē feruenti nequaquam oleo decocturi sumus, uerū temperato uncturi. Præstat enim, id quod aliquoties supra monuimus, ipsum rei euentum sensu perceptilem & exacte manifestū inspiciere. Neq; em sanè extrinsecus quæ sitis opus exemplis est, in rebus nimirū quæ tam clare cognosci possunt. Quin si quando forte obscurum sit quod queritur, adeo ut ex alijs sibi fidem poseat, neq; illic sanè remotissima distimillimaq; propinquis præteritis, accersenda sunt quærendæ facultatis testimonia. Sanè euidentis lucēq; clarius omnibus hominibus est, quod frictio ex oleo magis q̄ sicca lasitudinem aufert, corporaq; emollit, cohibēs occludensq; quicquid è nobis foras effluere est natum, haudquaquam digerens & exliccans. Idipsum & Diocles confessus est, ut qui oblinere poros oleum dixerit, quæq; effluit cohibere, tum coria emollire. Quod si rerū euidentia illi non sufficiebat, ac proinde extrinsecus adducere coniecturas potius illi uisum est, ea quæ in oleo frigidantur, memorare, non quæ in feruenti decoquantur afferre debebat.

Quod perperam Archidamus inæqualem ex oleo frictionem afferuit. Cap. 19

Quemadmodum in talibus rerum transgressus est euidentiam, ita illic quoq; dum ait inæquale esse ex oleo frictionē, manibus uidelicet lubricè labētibus. Nam cōtrarium omnes manifestò percipimus, nimirū cū quæ ex oleo sit frictio, æqualis existat, inæqualis uero sicca. Cutem enim in frictionibus

bus siccis manus coadducunt, ac uelut duplāt, uolenterq; ac præter naturā complicāt, Dein ubi nō amplius prior uelut duplatio labentes sequi manus potest: ipsa quidem recurrit, atq; ad continuū reuellit: manus uero semel ac uno impetu in alterā cutis partē transeunt, inferiorē transgressē duplationis partē. Ac proinde inæqualem, duram, laboriosam talem sentimus frictionem: duram quidem, quoniam cutis uiolenter & tenditur, & concutitur: eisdem de causis & laboriosam: porro inæqualem, quando quidē non in omnes cutis partes fricantes incidunt manus, uerū infernā duplationis partem perpetuo transiliunt: id quod sit tum ob naturales cutis asperitates, idq; potissimum in natu grandioribus, tum quod laxa est cū alijs prope omnibus cutis, tum gracilibus maxime & senibus. Quippe si leuis æquabiliter tota & tena exacte cutis foret: haud facile plitari posset, nec inæquales in se manuū efficere decurrus: uerū facile reor antorsum percurrerēt, à primis ad reliqua de labentes: nimirū cum nullam secum cutis partem ducerent. Atqui cum laxa sit & aspera, externo quopiam medicamēto indiget, quod & rugas eius impleat, & fricantibus manibus lubricitatem præbeat: quas ad res oleo nihil aptius inueni. Mirensq; profecto Archidamum, qui nec rei sit reueritus euidentiā, nec quæ eius sit causa inuenit, sed in utrisq; pronunciarit contraria: quippe cum inæqualis sicca appareat frictio, æqualis uero quæ administratur cum oleo: nec minime ea testimonio suo astruit ratio, quæ causam exponit.

Redarguit prauam medicamentorum facultates inueniendā rationem. Cap. 20

Verum de Archidamo & Diocle fati in præsentia. Volo enim (quadoquidē semel aggressus sum prauam facultatis inueniendæ uiam ostendere, oleo pro exēplo usus) omnē celerrime orationem absoluerē. Igitur cum ueteres philosophi calidum esse oleum asseruerāt, non paruo (ut putāt) argumento, quod celeriter scilicet in flammā uertatur: contradicentes quidā, id illi accidere aiunt, quoniā tenue est, & aerium: ceterū frigiditatem eius inde adeo monstrari, q̄ hyemē, ocyssime conrescat: nec enim uiuo solū acetosq; sed etiā aqua ipsa proptius à frigore deuinci. Ad ea rursus obijciantes alij, q̄ aerium quidem sit non negant, idq; ex leuitate perspicuo apparere dicunt: nō tamen frigidum esse fatentur: quippe cū aer omnis sit natura calidus, uti generatio quoq; eius indicio est: nimirum cum extenuata solutaq; calore aqua, aer efficitur. Constatq; iam inde maximā eos ingredi quæstionē clarissimis philosophis dubitatā. Si quidem Aristoteles, quiq; eum fecit, calidum esse aera existimant, at Stoici frigidum. Porro ad celerrimè olei cōgelationē, quod uisum est illis qui frigidum ipsum asserunt: hi qui calidū contra contendunt, non tam ualide cōcrescere utaq; contra opponunt: neq; em̄ cōgelationē in eo esse aiunt, si quis recte expendat, sed uelut cōsistentiā & incassationem, quia uidelicet crassum est & uiscosum, non quia frigidū. Itaq; rursus utrinq; in am-

Galen.

biguit oratio perducitur. Illis quidem, ex eo quod celerius à frigore uincatur oleum, q̄ aqua: his uero, ex eo quod aqua oleo plus congeletur, contraria adstruentibus. Ad hoc itaq; quod de his addubitent, neq; q̄ aerium sit omnibus confessum est. Etenim leuitas quidē, inquit, huius in dicitū foret: at crassities nō parua adfert coniecturā ipsum esse terreū. Porro quidā ambo cōponentes, aerē simul & terrosum constituunt. Sunt qui hos deridētes, id quod cū primis oleo inest, nemp̄ humiditatem, adimere ipsos oratione dicāt. Ad hæc non nulli ex eo quod uiscosum sit, frigidū esse contendūt, alij uero calidū, nōnulli siccū, postremo quidā etiā humidū. Etenim nisi contractæ cōpactæq; partes eius forent, & inuicem exacte adhererent, uiscosum haud foret: atqui illos oēs frigiditatis esse effectus. Nam fundere, extenuare, soluere, partes à se inuicem separare, eam uero esse calidi naturā. At alij contra, uiscosum nihil fieri pronunciant citra calidi uictoriam, ueluti in succorū omnium parte decoctione, tum eorū qui ex herbis exprimum tur, tū qui ex fructibus: quippe qui cū aquei principio sint, ac cōsistentia tenui liquidāq; ubi decocti fuerint, crassi uiscosiq; euadant. Quin et ex particularibus utriq; exemplis cōtraria probabiliter adstruunt: alij uiscum, mel, picem liquidam, resinam, & alia id genus quæ in professo & uiscosa sunt & calida, proponentes: alij cicutæ, psyllij, atriplicis, blitiq; succū memorātes, et ad hæc ueluti cōphonem quendam orationi pituitam proferentes: liquido enim ipsis ea & uiscosa esse & frigida uidetur. Quin & ex eo quod quibus uenæ sectione sanguis detrahitur, oleū in illatū fluidum reddat sanguinem, utrosq; cōtraria adstruere uidere est. Alij enim tanquā calore fundens, alij uero tanquam frigore lubricitatem præbens, non secus ac glaciem fluxibilitatem ipsum facere asserunt. Atq; inde aliō uersū, de lubricorū omnium natura disceptant, ad extremā usq; garrulitatem oratione prominentes. Porro horum errorem condemnantes quidam, ut ipsi aiunt, pinguitudinem proponunt, quæ proximè ad olei naturam accedit, & euidenter deprehēdi potest cuius sit tēperamētū: quippe quæ in nobismetipsis cōsistat, nec fallere nos quæ at. Nam in sanis, inquit, & bene curatis corporibus multa prouenit pinguitudo, quæ nec insanus quidem frigida dixerit: talia enim fieri robusta natura, quā omnes naturales philosophi calidam esse rem consentunt. Sed his ediuerso quidam in frigidis temperaturis pinguitudinem prouenire aiunt: uelut foeminae indicant, quiq; ociosam uitā transigunt. Iam uero & inter gentes ubi frigus quidem superat, pingues, ubi uero calor, graciles prouenire homines asserunt: proferuntq; exempla, Gallos, Thraces, Bithynos, Ponticos, Galatas, sicut frigida regionis incolas, ita quoq; in uniuersum pingues: Arabes uero, Libyes, Aegyptios, Aethiopes, quiq; terrā inhabitant calidam, graciles & aridos omnes. Nonnulli uero citra particularia exempla, uniuersali inter se ratione contendunt: partim pinguem in nobis succū prouenire nō posse,

tom, 5

c 2

tuti

nisi probe à natura cibi cōficiantur, asserētes, partim in cibis quidem contineri cōsistentes, à nostro tamē calore cōsumi, uelut à flamma oleū: qui ubi infirmior est redditus, in corpore aceruari. Sunt qui animātia quoq; in medium asserāt, ut quæ natura frigidiōra sunt, pinguiora omnia reperiātur, ut ursi, oues, sues, quæ calidiora, itidē & sicciora, gracilioraq; & pinguitudine uacantia, ut leones, pardales, canes. Præterea inde adeo, q̄ madefactē oleo apes, muscæ, uespæ, formicæq; intereāt; alij quidē calidum, alij frigidū cōprobare ipsum tentant, ac rursus alij humidū, atq; alij siccū. Etenim cum iam dictæ animātes exangues sint, ac proinde frigidæ, quidā eas celeriter refrigerari aiūt, atq; ita mori: quidā cōtra dum excalescunt, haud posse in cōtrariū mutationē proficere. Quin & q̄ immoderate exciccantur, alij: quippe cum natura iam antea exciccata sint, immoderationis ratiōe offendit; alij uero q̄ humectent, idēq; naturæ contrarietate. Atq; q̄ ex infectis animātib; cōtraria inuicem colligant, mirū fortassis uideri nō debet, sed q̄ ex ijs quæ nobismet ipsis accidūt, in utraq; parte distulerūt, id uero admiratione dignū est. Quippe alij plus, alij minus sudare nos inquit, si quis in balneo ungat. Nec tamē ij qui plus asserūt, de facultate eius uniuersali inter sese conueniunt, neq; ij qui minus: uerū ex ijs qui plus nos sudare asserūt, quidam calori acceptū referūt, quidā uero uiscositati: priores quidem calidū sudores prouocare natū dicentes, uiscosum uero alteri. Quippe uenādē & aceruādē eorū quæ hæcenus celeriter defluebāt, proindeq; sensum fallēbāt, facultatē obtinens, manifestā ita sudorū copā efficere. Porro qui minus sudare uolunt eos, qui aut in balneis, aut in exercitijs uolunt, alij quidē illinēdi facultatē, alij uero refrigerādī uim illi attribunt. Quinetiā ex apparentibus, alij resiccare, alij humectare ipsum dicūt: humectare quidē, quotquot plus sudare inunctos cōsent, resiccare uero alij. Quinimo & quod à frigore tueatur inunctos, alij quidē crassitudine uiscositatēq; instar uestimenti ac munimenti frigus arcere, alij uero per calorē naturæ cōtracta excalfacere referūt. Porro etiā ex eo quod quæ in libris atramento cōscripta sunt, nihil uitiet aut delectat, haud aliter q̄ arena cinisq; cum reliqua liquida omnia deleat: quidam siccā, & uelut exuocam eius naturam adstruunt, quidam uero partū crassiorum, ac minus elaboratarū. Sic & quod alijs nō cōmiscetur, hoc alij quidē leuitati, partūq; tenuitati, alij uero crassitudini uiscositatēq; adscribunt, cum succis suis similibus miscetur, aut malug decocto. Eadem asserunt & de hoc quod terra nō probe oleo irigetūr, tametsi alijs liquoribus madefcat, ut uino, aqua, aceto. Ac nonnulli quidem hic essentiaē causantur siccitatē, alij tenuitatē, sunt qui crassitudinem. Etenim qui tenuitatē pro causa asserunt, inunctos transire meatus aiunt, at qui crassitudinem, omnino ne ingredi quidem illos asserunt. Neutros uero arguere queas, cum utraq; de causa quædam ne propinquis commisceantur, prohiberi possint. Si quidem phycorum nō-

A nullis meatuum cōmoderatio, missionis esse causa uidetur. Atq; ego nunc sanē illa, in summa tantum relatis solis ratiocinationū occasionibus, cōmemorō. Quod si quis singillatim unumquodq; extendere uelit; atq; hincinde in utraq; partem differere, non unū ille uolument, sed etiā complura meo iudicio explebit. Licet enim uel iam nunc prospicere, q̄ non longus solum oratiōis hic euasurus sit error (nec em̄ tolerari posset) uerū quod summam etiā interim attinget physiologiā, sic ut diiudicare nonnunquam nequiret. Porro si cui constaret omnino in utilem esse medicis, longe etiam magis eam rationū uiam arbitror effugeret. Non enim absolute an calidū, frigidū, humidum, siccū uel unūquodq; medicamentorū sit, inquirimus, neq; an formicas, apes, uespas, aut aliud animalū humectare ualeat, aut resiccare, calfacere, aut frigefacere, sed quomodo ad corpus se habeat humanū. Cum liceat igitur in hominibus experimentum capere, non recte ad alia uertuntur.

Questi recte experiēdiæ olei facultatis ratio. Cap. 21

B At recte experiēdi ratio, in primis quidem ea est, quæ in corporibus habetur temperatis, deinde ea quæ in intēperatis, mox, ut sæpenuero ante ea monuimus, quæ in calidis, frigidis, humidis, ac siccis morbis. Vbi animū aduertere iulsumus, ut quod per sese quid ageret, ab eo quod ex accidenti distingueretur. Id quod futurum est, primū quidem si quā fieri potest simplicibus affectibus, admoveas: deinde si an protinus ab initio quod sensu possit percipi, suam uim exerat, consideres, an post temporis aliquantū, aut deniq; ubi ablatum fuerit, uelut aqua frigida, quæ calorē efficit repercussū: ad hæc alienæ qualitatē mixtura expers ut sit, danda quæ maxime opera est. Quomodo ergo oleū quis tale efficiat, supra positum est, uerū quomodo simplici morbo applicari queat, nūc dicemus: id modo prius commemorantes, quod in morborum differētijs ostensum est, corpora quedam ad calidius uersa uideri citra aut malū succū aut pectoris uisceris uel inflammationem, uelut in ingentibus exustionibus euenire assolent: Quædā uero ad frigidū, ut in uocatis iam passim consue to nomine perscriptionibus (*ἄνυμνος* Græci uocāt.) In talibus utiq; affectionibus si oleum adhibeas, manifesto cōperies, refrigerare nos an calfacere sit natum. Sed illud tamen consistet, ut omni prorsum aliena uacat qualitate uehementi. Id em̄ perpetuo in omni medicamēto memoria tenere oportet. Atq; hæc quidem summa est rationis. At opus ipsum quod perficitur, experientia commōstrat. Nam qui ardore tenentur, tantum abest ut à calore liberentur, ut etiam magis exarsuerint, & procedente tempore calidiores euadant. At algētibus, ex olei inunctione perspicua nulla aut noxa, aut utilitas affertur. Ex quo liquet, ut calfacere sit natum, certe non admodum id posse nec euidenter, sicuti resina, pix, bitumē. Inaudienda est nunc pix non sicca, itidem nec resina, nec bitumen siccum, nec enim ipsis inungi quis possit, neq; item quæ sol liquarit: quippe hæc nec simplicia, nec sponte

nata sunt medicamenta: uerum resina, quæ Græcè *ἀσπρόπιτον*, à spontaneo fluxu dicitur, quam in Laconia & Cilicia optimam prouenire nouimus, aut terebinthina, aut lentiscina, quæ liquida: etiamnum ac recens sit, aut ex pinea, quæ in fictili bus superne oleiritu innatat: pix autē liquida, aut potius quod oleosum in ea superne fluitat, quod utiq; *πίσος*, hoc est, picis florem nuncupant: est enim reuera tanquam picis flos: sic bitumē ad huc liquidum, quod ex Medea importatur: omnia enim hæc pingua sunt, plurimumq; oleosæ naturæ possident, ueluti myrrha, facte, & picinum, iurisperinum, cedrinum, laurinumq; oleum, & alia eiusmodi clarissime refrigeratos recalcaciūt, exaestuantes uero summe ex cruciant. Atq; hæc quæ uidē utriq; exalfacere, cōfessum est, at oleum neutris admodum, neq; refrigeratos scilicet exalfacere, nec exalfactos offendere. non tamen obscure ejs qui ex ardore febricitant, fastidij cuiusdam causa est, caloremq; augere apparet, quæadmodum in exquisitis erysipelatis, quippe quæ biliosæ sunt fluxiones: manifesto enim in his calore adaugēt, etiam si applicetur uel frigidissimum. Etenim in ardoribus si salis sit expers, & alioqui etiam candidum, nonnullum sanē solatium, si modo frigidum perfundatur, affert. In erysipelatis autem, quantumuis sit frigidum, nihil iuuerit, cæterum lædere omnes quæ ex pura bile sunt fluxiones, uel maximum est natū: at quæ ex sanguine constant illi permixto, has quidem minus, non tamen uulgariter. Porro istis etiam minus, sed tamen perspicuo affigit inflammationes etiamnum feruentes. Ex quibus omnibus coniecturam ducenti, uisum est tandem calorem partem eis quibus applicatur accendere. Apparet enim corporibus mediocriter calidis admodum, moderate illa exalfacere: quæ uero ualide, ualidum accendere calorem.

Quod oleum ex eorum sit numero quæ ex æquo non exalfaciunt. Cap. 22

Dictum est igitur, in tertio de Temperamētis, uenitq; nunc iterum dicendum, quod unūquodq; medicamentum quæ corpori applicantur, quæ quidem calida esse facultatibus diximus, caloris sui principium à nobis accipiēti, partim similiter nos recalcacit, partim ualentis. Atque ex ijs quæ nos æqualiter recalcaciūt, oleum mihi esse uisum est, particulares eius uires inspiciētī. cōperi enim perpetuo calorem efficere tepidum in ijs quæ mediocriter essent calida, feruentem in feruentibus: proindeq; mihi est uisum neq; conuulsiones, neq; tremores, neq; sensum tum difficilem, tum deperditum magnopere aut iuuare aut lædere. Quippe iuuare nequibat, cum ualenter exalfacere non posset, nec lædere item ualebat, cum omnino non refrigeraret. At ubi adsciticiū cōparasset calorem uehementem, multum prodesse: nempe ubi in alueolos olei calidi, in quo radices quædam aut herbe exalfaciēdi facultate pollentes incoctæ erāt, ita affectos demississemus. Vnde merito uelut materia quædam cæterorum fuerit medicaminum. Nam si frigida illi cōmiscæe, frigidum efficietur

Galen.

A quod mistum erit, sin calida, calidū (quippe quod ex media temperie est, utriq; summis inseruit) utpote quod si calido cōmiscetur, id quod ex ambobus mistum erit, frigidum efficere non ualeat, nempe cum ipsum non sit frigidū, neq; si frigido, calidum; quippe cum ipsum non sit calidum. Itaq; non immerito alij calfacere ipsum aiunt, alij uero negant. Calfacere enim uideatur, cum ad parem calfacienti corpori calorem peruenit; hac enim ratio ne recalfacere rursus potest. Quod uero quā acceperat augere caliditatē non potest, haudquaquam calfacere uideatur: quippe cum non quam accepit, seruare, sed augere, calfaciēdi sit opus.

Quenam sint principia tantæ de medicamentorum facultatis bus ambiguitatis. Cap. 23

B Eiusmodi porro ambiguitatum tria sunt principia. Quod nō distinguunt genera eorum quæ nos exalfacere dicuntur, & quod homonymijs siue æquiuocationibus utantur confuse, & quod nihil relinquunt medium. Itaq; calfacere nos dicuntur, & quæ energia siue actū sunt calida, ut ignis, & quæ potestate. Tum quæ potestate sunt calida, partim alimenta sunt, partim medicamēta, partim tegumenta. Porro calidum quocq; ipsum & quod actū est, ita nominare consueuimus, & quod potestate, uelut subinde ante monuimus. Sed & calidum actū est et qd simpliciter est calidū ut ignis: & quod per exuperantiam, ut animal: & quod ad sui generis symmetrum comparatur: & quod ad quiduis obuium. At quod potestate dicit, primū quidem distinguunt contra id quod est ex accidenti; deinde totidem habet significationum differentias, quæ actū calidū. Etenim cum sit uelut apra quædam materia ei quod est actū calidū, partim ad ea quæ absolute calida nuncupantur, partim ad ea quæ per excellentiā quandā, rū ad quiddā sui generis, ut speciei demiq; & ad obuiū quiduis collatum, propria utiq; fuerit materia. Quocirca cū ea cōsideremus calida, quæ referunt ad hominē, ut alia prorsum omittant, æquū existimamus. In istis ergo omnibus peccare solent qui de medicaminū uiribus cōsiderant: & præterea quod mediocritates tum in naturalibus nostris tēperaturis (ut in opere) De temperaturis ostendimus) tum in medicamentis expendendis prætereat. Siquidem tanquā necessario id cuius perpenditur facultas, medicamentū aut calidū, aut frigidū, aut humidū, aut siccū esse debeat, ita uerba ipsi faciunt, ac si nō fieri posset, ut in calfacientiū nos ac refrigerantium medio quiddam consistat, atq; aliud rursus inter exsiccantia & humectantia. Ad eō inuenire est quosdam stupidos, ut ne ubi audierint quidem ueritatem, assequi possint. Itaq; quosdam etiam noui, qui contra contendere adstruereq; conarētur, nihil temperamento esse medium.

Quod complexibus nos modis calfacere oleum appareat, nempe ut alimentum, ut medicamentum, ut tegumentum: & quod exalfacientium nos ac refrigerantium medium quocummodo obtineat. Cap. 24

Verum hos in libris De temperamētis iustis cōsutauius rationibus, nihilo secius idem in se-

quælibet facturi. Huic autem libro finem iam imponere studens, ad oleum reuertor. Accidit enim illi ut fortassis tanquam alimentum nos exalfaciat, ubi scilicet intrò in corpus assumitur: probatis enim quibusdã tum medicis, tum philosophis, si cut ex cibis, ita ex oleo corpori fieri appositionem trisum est. Accidit uero illi ut tanquã medicamentum sit nos calfacientium & refrigerantium, tum etiam uelut tegmen nos exalfaciat: naturæ eius uel maxime propria esse imago uidetur eiusmodi. Nam quemadmodum uestimenta à nobis ipsis exalfaciã, rursum nos recalfacere consueverunt, ita & oleum. Sed quemadmodum illa exalfaciente corpore calidiora non euadunt, ita quoque nec oleum. Recte autem perpendas rem totam, non ad præsens modo, sed & ad futura omnia utilem, si aeris nos ambiētis memineris: qui interim eo qui in nobis est calore usque adeo redditur frigidior, ut munimētis quibusdam aduersus eum tegminibusque sit opus: inter dum uero usque adeo rursum calidior euadit, ut ferre nequeas, fugiasque subtectum aliquod uel umbram: est autem etiam quando tanta est moderatione præditus, ut neque tepescientia, neque refrigerantia exposcas, sed citra omnem molestiam sensumq̃ in eo uerferis. Tertiam hanc temperiem quam modo dicebam, symmetram moderatamque, atque aliarum mediam esse statuo: ac corpus nostrum neque exalfacere, neque refrigerare: cum aliarum duarum altera nos exalfaciat, altera uero refrigeret. Simileque esse dico medice aeris nos ambiētis temperaturæ, tum qui à uestimentis, tum qui ab oleo prouenit, calorẽ. Porro si ne sic quidẽ etiã clarũ euasit quod indicare uolo at illo saltẽ modo apertius opinor intelliges. Durus mihi animo intelligigo homines corpore similitèr tẽperatos, mutuo sese cõtinentes uel pectore & uentre solo, uel manib. & crurib. Quod si eadem duobus istis hominib. nactus sit tẽperie aer illos ambiens, ut in trib. ijs corporib. par inest calor, neuter ab altero tũc exalfacieri dici queat. Nã quæ similia undiquaque corpora sunt, à se mutuo nullam accipiunt mutationem. At si frigidus sit ambiens, mutuo se calfacere ij homines dicentur, tametsi haudquaquam exalfaciant, sed frigus modo arcant. Vulgo itaque assueti abuti uocibus, id quod frigus arcet, exalfacere aiunt: haud sanẽ recte. At qui permittendum ipsis est, ut prout uelint appellent: ceterum per calfaciendũ uerbum in utraque dictione idem significari, id uero neutiquam concedendum: haud enim idem est, an ex se quid cuiuspiam calorem præbeat, an frigus prohibeat. Quibus sic se habentibus, quæcumque foris nobis iniecta eandem corpori caliditatem obtinẽt, siue à se se ipsis, siue ab alijs, siue à nobismet ipsis eã nacta fuerint, exacta loquendi ratione neque calfacere, neque refrigerare dicendum. At si cui abuti libeat, non repugnandum: modo in dictione significationum differentiam commemoret. Si quidẽ alio quodã modo calfacere nos dicitur aer calidus, atque alio modo qui sit moderatus. Responder autem proportione aeri calidiori, pyrethrũ, sinapi, pipere:

moderato autem, pinguitudo, & oleũ: acti enim aeres sunt calidit: potentia uero medicina. Aera enim calidum haud ipsi efficitimus, sed quoniam in eo uersando talem ipsum experimur, ita nuncupamus. At medicamentã, sicuti in tertio De temperamentis demonstratũ est, principũ exalfacientis à nobis accipientia, partim æque nos recalfacere sunt nata, partim plus, partim minus. Ex genere autem eorũ quæ æque nos recalfaciunt, oleũ est: Cui eidẽ quoque à uiscositate, ac quod difficulter item defluat, tum quod meatus infarciat, obstruatque, duplici ratione ut exalfacere uideat euenit: tum inde adeo quod instar uestimenti aut munimenti illinatur: tum quod meatus infarciat, prohibeatque foras effluere magnam uaporosi intus caloris partem. Eadem ratione nec ut resiccetur corpora nostra permittit, nisi sanẽ applicetur calidũ, idque plusculo tempore. Has itaque uires eius cum homines omnes experientia competas habeant, quos largius sudare uolunt, siue à balneo, siue balnei experies: ijs non protinus ab initio oleum admouet; uerum in ijs qui morbo laborarunt, ubi sudare inceperint, tum exalfactum perfundunt. In ijs uero qui etiamnum laborant, ubi abunde iam satis sudarint: Porro in sanis, si quidem ex longo itinere, aut exercitatione, alio uel quouis pacto corpus ipsis exhaustum est, eis inungi & ante sudorem permittunt: uerum quibus cruditas est, aut corpus habet plenum, quod *πληρωτικόν* uocant, his neque in balneo inungi concedunt.

Quod medium sit oleum inter humectantia nos, & exsiccantia. Cap. 25

Atque hic quoque mihi uidetur oleũ esse medium inter humectantia nos & resiccantia, uelut inter exalfacientia & refrigerantia medium consistere supra demonstrauimus: humectat enim aqua, exsiccatur uero tum laurinum, tum cedrinum oleum. At quod simpliciter sic admouetur, citra ullam uide licet ex arte conciliatam à nobis aut caliditate aut frigiditate (huius enim usque meminisse oportet) talem seruat nostrã temperie, qualem scilicet accipitque fieri possit maxime uaporosa omnes corporis expirationes prohibet. Porro si plusculum membra frices oleo, calorem ex frictione adficiendum comparabis. Atque hac interim ratione lassos non parũ iuuabis, partim quod in minutos corporis meatus pingue ingrediat, & que indurata sunt emolliat: partim quod humiditatem a crem ac subtilem, quæ in lassitudine ex colliquatione proueniens sub cute latebat, per halitũ digerat. Conspiciuntur enim exercitibus tum foras effluere sudores, tum intus in uentre non pauca defluere excrementa, quæ uelut liquamina sunt. Ex hisce autem colligendum est, cõplura toto in corpore eiusmodi relinqui, que euacuationẽ deposcant. Quippe duplex in lassitudinibus affectio nascitur, sicut albi ostendimus. Nam similes quidem animantis partes resiccantur, humectantur uero uacua spatiosa, non utilis & naturali humore (nam sic foret plethora, siue repletio) sed tenui & acri mordacique: proindeque remedijs indiget duplicibus, tum ijs quæ

quæ siccitatem corporis irrigent, tum ipsæ quæ humorem acrem euacuent. Itaq; ad hæc aptissima sunt dulcium aquarum lauacra, nimirum quæ humiditate sua instrumentorū corrigant siccitatem, & caliditate tenuem atq; acrem humorē eliciant. At si corporibus inhæreere possent aqua, nec facile deflueret, ipsa quidē per se sufficeret. Atqui cum ea quæ foris circumfunditur, facile defluat, & quæ in poros ingressa corporis nullam habens ansam præptam effluat, in hoc sanè ipsū utiliter miscetur oleum, maxime q̄ iuuat, si ex utroq; quis diutius fricetur, id quod ueteres Græci *χυλῶδες* nominabant: cui oppositum inposuerunt uocabulum *εμπαλῶδες*, quod est sicca uti frictioe. Est sanè & hoc quoque quodammodo lassitudinem sanare potēs, sed multum relinquitur ab eo quod *χυλῶδες* nuncupant. Nam ut reliqua taceam, ubi cum oleo aqua contunditur teriturq; , haud facile solubili missione coit, ut quibus ita corporibus inungatur oleum, necesse sit & plusculum inhæreere aquam. Quare hic item uelut materia est quedam oleum humectantium exiccantiumq; , sicut ante ostensum est, excalcificantium & refrigerantium. Quippe quod si exiccanti commisceas, totum effeceris exiccans: si humectanti, & ipsū humectans reddideris. Sæpeq; quod ex ambobus constat, maiorē adipiscitur humectandi facultatē, q̄ id quod primario est humectans: quod in aqua accidit. Nam ea primario madefacit: Verū cū haud ita diu inhæreat, nec actionē obtineat diuinam, leuiter utiq; prodest. Cum ergo illic uelut uincū lum fiat oleū, cogatq; plurimū quib. auxilio eius opus est, inhæreere, longe omnī optimū redditur remedium exiccatis squalidisque corporibus. Sed si exiccans oleo medicamē commisceas, puta chalcitū, pyrethrū, gallam, struthion, siccās erit quod ex utroque commissum fuerit. Itaque cum omnibus quæ sibi commiscetur, subseruiat, recta ratione uelut omnium existit materia: tamen si utique necessario propriam eorum actionem refundit quidem ac minuit, non tamen utilitatem: imò est ubi eam quoq; adaugeat. Haud est enim idem (quod forte quis autemet) actionem augere cuiuspiam, & utilitatem: quippe cum actio secundum propriam cuiusque facultatem, utilitas uero nonnunquam ex accidenti agat. Differemus autem postea ueribus de utilitate quæ per accidens euenit, & nunc quoq; hæctenus de ea dicetur, quatenus in præsentī est commodum. Quippe contra cum oleo aqua, quod hydrelæum uocant, magis auxilio est lassitudinibus, quàm si esset sola: nō quidem quòd suæ uires intendantur, sed quòd quibus opus est, diutius inhæreat.

Quod materia rationem obtinet, in mistis mediam tenere temperiem debere, alioquin enim futuram, ut misturam sibi aduersetur actioni. Cap. 26

Quòd autem nisi mediam habeat temperiē id, quod ea quæ primario quibus opus est auxiliatur uelut deuinat, sæpenumero ipsorū repugnat actionibus, ex ipsa medicaminum natura generatim ad discere liceat, speciatim autē ex medica

mentorum historia; generatim quidem, quoniam id quod miscetur, si in contrariū retrahat, admisti sibi facultatem medicamentū uincere interim poterit, & in alteram planè speciem quod ex ambobus miscetur transferre. Siquidem quod materiae rationem in mistura præstabit, nullam insignem neq; speciem, neq; facultatem exeret oportet. In particularibus uero experiendis hoc maxime pacto addices, non debere id quod materiae ratione obtinebit, aut excalcifacere, aut frige facere, aut humectare, aut resiccare, si primū quidem in memoriam reuoces quæ supra de resina, & pice liquida, myrrha, bitumine, tū cedrino, et laurino, cæterisque quæ excalcificant, commemorauimus. Hæc enim omnia in aqua trita ad modum olei, calcificant magis q̄ refrigerant, desiccāt plus quàm humectant: quamobrem lassitudinis sensus nō admodum sol uere ualent: haud enim eadem cum aqua uim obtinent, quò scilicet auxilio magis sint, q̄ aduersetur turineque mediam inter extrema naturam sortita sunt, ut uidelicet tanquā materia quædam inferuāt primario agenti: desiccant enim & excalcificant potius, non humectant ac refrigerāt, uelut aqua. Si uero excalcificantium admodum resiccantiumq; cuiuspiam aquam commisceas, nō modo nihil eorū quæ agere nata est, fieri uidebis, sed prorsum obscuratam, tanq; omnino admista nō esset. Siquidē chalcitis, sandarache, misy, cæteraq; quæ nos uehementer tum excalcificant, tum resiccant, ualidas etiamnum suas uires etiam aquæ permista obtinent. Omnino ergo constat, mediam obtinere temperaturā debere, quòd utrisq; extremis tanquam materia inferuiet: quem in ordinem oleū si statuas, nihil utiq; peccaueris, quippe cum omnia singillarim opera tibi cōsentiant. Et accusabis prolixitatis non nos utiq; , sed qui recta uia præterita prauam prolixamq; sectantur: quorum sanè causa hunc nos sermonem extendere sumus coacti. Ipsa enim ueritas celerrimam inuentionem obtinet: ut quæ ab euidenter apparentibus exoriantur. Haudquaquam tamē eousq; orationem prolongaui, quousq; licuerat omnia quæ prauæ ab ipsis prodita erant scripturum, causasq; errorum edociturum pollicito. Sanè causas dixisse necesse foretasis fuerit: nempe quòd qui ex ipsis proueniunt paralogismos in tota particularium medicamentorum iudicandi ratione cauere possis, ueramq; doctrinam cum maiorī scientia percipere. Crescit enim nobis de rebus fides, ubi non solum ipsam ueritatem cognouerimus, sed etiam paralogismorum omnium causas edidicerimus.

Dē rosaceo.

Cap. 27

Quod sanè in sequētibz efficiemus. Nunc autem ubi de rosaceo ad ea quæ ab initio sunt dicta adiecerimus, orationē hoc in loco sistemus. Igitur dictum est, q̄ neq; odoribus, neq; coloribus, neq; aliq; omnino accidentium animū adhibere in expēndendis facultatibus rationabile sit, sed ipsæ quæ perspicuo apparent tū in sanis corporibus, tum in ægris. Ostensum etiā est, oleū ubi falis expers putumq; ad unguē fuerit, ex media esse materia. Con-

ficiendū itaq; rosaceum, quod exactum simul ac simplex, recte vera rosaceum erit, ex hoc uidelicet oleo, dandaq; opera, ne quid in se medicaminosis cōtineat, uti apparare solent unguentarij, quod uidelicet tum magis duret, tum odoratius euadat, oleum uidelicet prius quam rosas iniiciant, odoramentis præcōdientes. Ac præstiterit fortassis, ipsis etiam nominibus ea distinguere: quod ueteres fecisse constat. Oleum etenim, rosaceum nominare adsolent, quod absq; odoramentis præparatum est: cui autem & horum aliquid inditum fuerit, non id etiam oleum, sed unguetum cognominant. Itaq; cum oleum uelut materia quædam sit excalfacientium refrigerantiumq; medicaminum, ex media uidelicet temperatura, cōstetq; ex oleo & rosis rosaceum, est utiq; & ipsum talis temperaturæ, qualis est rosarum succus. Sanè uero facillimū fuerit, non modo rosarum succi per se, sed

oleo quoq; rosaceo confecto, in sanis pariter atq; ægrotis (ut iam frequenter monuimus) uirū eius periculum facere. Experientis ergo eos qui adustionem tentantur, ab eo refrigerari, protinusq; utilitatem aliquā percipere: qui uero refrigerati sunt, omnes lædi, uti facile ex utroq; intelligas, uires eius refrigerare magis q; excalfacere. Non tamen ualida à rosaceo apparebit refrigeratio, sed quæ proxima uideat temperiei mediæ. Voco autē id genus medicamēta, lucidioris doctrinæ gratia, ex prima natura ordinēq; refrigerantium: sicut rursum quæ paululum à mediæ temperie ad calidiorem declinarunt, ex primo recessu & ordine excalfacientium: Atq; hæc quidem in presentiarum de rosaceo nouisse oportet. Necessè enim erit & in sequenti libro ipsius medicamenti meminisse, & quæ reliqua sunt, dictis adijcere.

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI TERTII.

Proœmium. Argumenta libri primi, secundi, & tertij. Cap. 1. Quot modis dicatur, calidum, humidum, frigidum, siccum. 2. Ad quid & quæ, nomen distinxisse significata conduxerit. 3. Quod cum duplicia sint genere quæ alterat, alia specifica, alia minime: in specificorum generē consistant medicamentorum facultates. 4. Quod solis philosophis conuenit de calido, frigido, humido, & sicco, ut ad totam naturam distinguere: medicis uero ut ad homines

5. Quod per exuperantiā dici bisariam apud philosophos accipiat: nempe ubi aut mole quid exuperat aut qualitate. 6. Quomodo iudicanda sint quæ ex mediâ sunt temperie, nempe si mediæ temperaturæ similem ipsa temperaturam obtineant. 7. Quod sæpe numero pro corporis nostri dispositione, quod per se calidum erat, refrigerare est uisum: quodq; per se erat frigidum, excalfacere. 8. Quod experientia cognosce re iudicareq; medicaminum facultates oportet.

9. De rosis, & quod ex eis conficitur rosaceo, tum chamæmelo, & lini semine. 10. Quod pro diuersis corporū affectibus aliâ aliter agere sunt nata, tum quæ mediæ temperaturæ medicamenta sunt, tum quæ paulum in alterutram partem declinant. 11. Quod ex æquo & quod curatur, & quod curat, à medio dissidere debeat, idq; utroq; in cōtrariâ recedente. 12. Quod generales medicamentorum facultates ad mediâ referendo temperiem, expendere oportet.

13. Quod quæ sensu simplicia uidentur medicamina, per sæpe compositas obtineat uires: imo uero etiam nonnunquam contrarias. 14. Quod & brassica duas, easq; contrarias in sese facultates obtineat: tum alia plurima. 15. Quamobrem lingua tangentibus ipsam dissimilariū corporibus, ac per diuersas eius partes simul agentibus, non quam in omnes illa partes inferunt, percipi affectionem: sed ea ex parte primo affecta in totam ipsius diffunditur substantiam. 16. Quod rosaceum (utpote olei rosæq; mediâ ad unguem natu

ram obtinens) inflammationum optimum in augmento remedium sit. 17. Quod quæ frigiditate interimunt deleteria, ex mutationis celeritate uti corrumpant euenit, ac proinde alienam requirant caliditatem, quæ uelut manu in torum deducat corpus. De lactuca, cicuta, & anu atticâ. 18. Quod medicamentorum quæ frigiditate sua interimunt, nullum prorsus genere letale sit ac deleterium, sed sola quâritate. 19. Quod medicamenta quæ natura sunt frigida, iure à ueteribus potestate frigida appellentur. 20. De actione medicamentorum, quæ putrefactione & erosione nos necant. 21. Quod rectè quæ erodendo putrefaciēdoq; interimunt medicamenta, genere, non qualitate, deleteria sunt dicta, & quod quanto in corpore morantur diutius, tanto & magis agere sunt nata. 22. Quia causa putrefacientia medicamina, licet genere letalia sint, non tamen perpetuo occidunt. 23. Quod in medicamentis dissimilariū substantiæ reperitur mistura: ac proinde ubi sine suo purgantia frustrantur, interim quidem extremè lædunt, interim nequaquam: quippe ubi deleterium in se uim permixtam obtinent, ad corrumpendum conuertuntur. Si uero uim non habeant deleteriam, concoquant, talemq; generat succum, qualem trahere nata erant. 24. Quamobrem, cum qualitatū proprietate attractiones perficiantur, purgantia medicamenta quidem perpetuo humores attrahant familiares, nec tamen unquam à familiaribus attrahantur. An quod efficaciora sint purgantia medicamina, sic ut attrahere potius quàm attrahi sint idonea? 25. Quod in purgantibus medicinis duplex insit familiaritas, nempe quædam acutæ, & quædam potētia. 26. De superpurgantibus, quas *ὑπερπυρρὰ ἄρτα* Græci uocant. 27. Quia causa in superpurgantibus humores minime purgant medicamento familiares, itidem euacuantur. Nempe propter uasorum infirmitatem, ofusolorum laxitatem, purgantibusq; mor

GALENI DE SIMPLICIUM

MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS

Liber quartus. tertius

PRO O E M I V M



VOD equidem nihil, nisi quod utile curandis morbis foret, hoc tractatu describere decreuerim, primo potissimumque deos huius rei testes habeo, deinde & amicos meos, qui me, tum ut hoc opus aggrederer, tum ut que ab alijs

perperam de medicamentorum facultatibus sunt prodita, quoad liceat commemorare, assidue hortari non destiterunt. At si quis erit qui orationis nimia graue prolixitate, non id mihi iure imputa uerit, sed ijs medicis quibus pro ueris probabilia potius scribere studium fuit. Nam & ego nunc quidem etiam magnopere uereor, ne quia nimis parcis illos confutauimus, sophismata quaedam conuersantes cum illis adolescentulos a recta opinione desiciant: quando quidem si in dialecticis methodis exercitati, aut captiuum soluendarum perit ad libris legēdos accederet, tum sanē & ab ijs qui falsis demonstrationibus utuntur, magis sibi cauerent: & nos qui ueritatem compendio tradimus, rectius intelligerent. Quoniam uero uel ipsorum medicorum plerique nequaquam in istis sunt exercitati, tum inter illos quoque nonnulli reperiri ingenio natura tardiusculo: si nisi nostris suppetijs, qui sophismata arguimus, iuentur, non aegre persuasi in sophistarum sententiam perducentur. Itaque quod ad istos atinet, deesse huic etiam operi quippiam uideatur. Verumenim uero quando ad omnes mihi oratione accommodare non licet, cum tanta sit eorum qui hanc legem, non modo naturam, sed etiam aetatis & habitum diuersitas: quod utique uisum est fore maximae parti utilissimum orationis genus, id superioribus duobus commeterijs secuti sumus. In quorum priore quidem de aequaeque uiribus contemplanti sumus. In secundo maximam partem de oleo peregrinus, pauculis postea de rosaceo adiectis. At in hoc tertio libro eiusmodi utemur oratione, qualem ab initio protinus habere institueramus, id quae definitis primum uocis cuiusque significatis. Deinde tractatus huius uelut elementa traditur, mox ad syllabas accedemus: ex quibus operis finis, ad quem contendimus, prompte sequetur.

Quot modis dicatur calidum, humidum, frigidum, siccum. Cap. I

Ceterum uocum definitio nihil accuratius edocebit, quam quae in tertio De temperamentis, simulque in primo commentariorum istorum sunt prodita: repetam tamen eam nihilo scius & impresentiarum. Corporum unumquodque aut calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum & dicitur, & apparet, interim quidem ex sua natura, interim autem aduentitia qualitate adsumpta.

A Consueuimus autem quod ex sua natura est, primario, & secundum se, & per se potentia tale & esse & uideri dicere: quod uero adscititiam acquiri fieri qualitate ex accidenti quopiam esse uiderique eiusmodi. Porro eorum quae propria sua natura aut calida, aut frigida, aut sicca, aut humida dicuntur: quaedam actu seu energia talia existunt, alia potentia: differente quidem hoc potentia modo, quem nunc dicebamus, ab eo quem paulo ante diximus. Illuc enim ex aduerso diuidebatur ei quod ex accidenti dicitur: hic uero ei quod actu. Sed & eorum quae actu dicuntur; aliud quidem absolute est calidum, frigidum, siccum, aut humidum, uelut elementa: aliud excessu, ut homo, equus, bos, canis, & uniuersa animalia: aliud ad symmetrum sui generis sui, seu speciei, ut uerbi causa, leo cum homine comparatus, homo autem aetate florens cum puero: aliud ad quiduis ob usum, ut Dion ad Theonem. Quin & corpora quae potentia talia, aut talia dicuntur, unumquodque ut ad id quod est actu relatum dici necessario monuimus. Id quidem quod facile acceditur, ad id quod actu est absolute calidum: hoc uero quod alia calfacit, ad id quod per exuperantiam: sic quod hominem calfacit, esse ut ad hominem potentia calidum: quod uero bouem, aut equum, ut ad bouem & equum: similiter hoc huic, uerbi causa, homini, illud uero illi calidum, frigidum, siccum, aut humidum est, illius unius naturae comparatum.

Ad quid, & quae nominum distinctio significata conduxerit. Cap. 2

Ex hac nominum discretione & ad assequendam iudicij cognitionem non parum sumus adiuti. Siquidem si ad hominem quid dicatur calidum, a ceteris omnibus recedendum, & in ipso duntaxat homine periculum sumendum explorandumque censuimus: Si uero quid ad equum, bouem, ceruum, aut aliorum animalium quoduis, in ipso rursum periculum faciendum erit. Interim uero & illos quoque castigauimus, qui ex consistentia, colore, odore, sapore, grauitate, leuitateque cuiusque medicamenti existentem in singulis facultate inuenire tentarunt. Atque haec utique rectae nominum distinctioni consentanea uidentur. At quae uelut elementa huius esse tractationis proposuimus, in primis consistere qualitatuum cognitione ostendimus. Quas quidem in lib. De elementis secundum Hippocratem, huiusmodi, siccitatem, caliditatem, frigiditatemque esse demonstrauimus: propeque harum quoque intentionem assequebamur ex significatis nominum recte distinguendis. Etenim cum medicamentum ab elemento discerneremus, quod medicamentum in qualitate alteraret, alimentum uero substantiae corporis adsimilaretur: recte hinc ad alterantium nos qualitatuum inuentionem perducti sumus.

Quod

Quod cum duplicia sint genere alterant, aliq̄ specifica alia minime, in specificorum genere consistant medicamentorum facultates. Cap. 3

Porro cum duplices sint in genere alterationes, aliæ specificæ, quæ proprie sanæ & primario dicuntur alterationes; aliæ uero quæ continentur & contrahuntur corporis nostri particulas, quas utique potius per abusionem quàm proprie ac primum alterationes cognominant: in primo genere medicamentorum contineri facultates censemus. Nec enim quicquam ex specie in speciem mutari queat circa excalfactionem, refrigerationem, humectationem, & resiccationem. Dico autem ex specie in speciem, uelut cum ex pane, tum a sana, lente, sanguis, pituita, bilis tum flaua, tum atra, atq̄ ex his iterum adeps, os, nervus, caro, arteria, uena, atq̄ adeo cæterarum animantis partium unaquæq̄ gignitur. At si secando nos quippiam, uelut uitrum & ensis: aut contundendo, ut lapis & plumbum: aut segregata coarctando, ut uinculum, quadam tenus partes alteret, ea haud pharmaca fuerint: quippe cum eiusmodi alteratione nulla rerum omnium ex propria recedant natura. Etenim siue minutim panem frangas concidasq̄, siue minutim concisum colligas, non tamen propriam ideo formam exuet, neq̄ caro ex pane fiet per confusionem, neque os, exempli gratia, per coarctationem. Verum dum in uentre uenisq̄ concoquitur, in sanguinem pituitamq̄ abit, atq̄ inde exiit in os, carnem & alias corporis partes tota sua substantia alteratur, ueteremq̄ naturam exiit, in aliam transiens speciem. Nec tamẽ ab alio quopiam quàm calore, frigore, humiditate, siccitateq̄ eas quæ sunt in aliam essentiam speciem alterationes mutationesq̄, singuli corporis affectus accipiunt, ut demonstratum est. Atq̄ hac ratione primas & elementarias specificas qualitates quatuor esse diximus, humiditatem, siccitatem, caliditatem, & frigiditatem: quærimusq̄ quam harum medicamentum unumquodq̄ in mistura pollentem possideat. At que protinus in hoc primum plerique eas inquirentium lapsi uidentur, quod uidelicet pollentem absolute tanquã naturales quidam philosophi considerarent. Præterea cõplures quoq̄ eorum decipi uidentur, quod sine certa methodo Aristotelis Theophrastiq̄ libros perlegant.

Quod solis philosophis conuenit de calido, frigido, humido, & sicco, ut ad totam naturam distinguere, medicis uero ut ad homines. Cap. 4

Siquidem permagni refert, an totius naturæ respectu, an hominum duntaxat, de calido, frigido, humido, siccoq̄ definiamus. Nam totius naturæ respectu bifariam horum unumquodq̄ dicitur, partim absolute, partim per exuperantiam. Absolute quidem unumquodq̄ elementorũ: homo uero, equus, & bos, per exuperantiam. Iam atit cum ad aliquid respiciendo exploratio fiat, illud modo considerandũ erit, quodnam sit illud ad quod dicitur. Nos uero medici non id querimus, an in aqua marina humidi simpliciter plus sit q̄ sicci (id em̄ clare conspiciamus) sed si ad hominẽ cõferendo; neq̄

tamen rursum ad hunc simpliciter, ac si leonem illi compares: quippe cum sic homine humidior marina fuerit. Quoniam igitur pacto scrutabimur an sicca sit facultate marina? Quoniam alio, obsecro, q̄ an corpus humanum in equalitate quadam resiccare ualeat? Itaq̄ in hoc unum modo cæteris relictis intendendũ. Atqui contra faciunt medicorum pleriq̄. Nam ad quiduis potius respiciunt q̄ ad hoc. Quomodo ergo ad hoc solum conuersi, reliquis prætermisiss, quanam in hoc agendi facultate polleat marina cognoscemus? An uidelicet corpori applicantes, sicq̄ eius periculum fumentes, lauando, rigando, fouendoq̄, tum subinde lanam, aut spongiam marina madetẽ partibus applicando, ad hæc emplastris ceratisq̄ miscendo, atq̄ in his omnibus, ab eo quod ex accidẽti quandoq̄ euenit, id quod à propria medicamẽti uir proficicitorum distinguendõ? Nam in hoc omnis inuentio nis summa consistit, quam uix quisquam illorũ attingit. Sed eos philosophorum uerba decipiunt, haud potes homonymiam percipere.

Quod per exuperantiam dici, bifariam apud philosophos accipitur, nempe ubi aut mole quod exuperat, aut qualitate. Cap. 5

Nam non solum, ut modo diximus, aliud simpliciter, aliud per exuperantiam ab ipsis dicitur (simpliciter enim ignis calidus est, per exuperantiam homo) uerum quod per exuperantiam dicitur bifariam quoq̄ dici autumã: partim secundũ substantiæ molem (uelut & nos quoq̄ in temperamentorũ cõmentarijs diuisimus) ut si cados duos aquæ summe feruentis uni cado aquæ maxime argentis infuderis: partim uero secundũ qualitatẽ esse cõstitit. Atq̄ hoc quod ad dogma cõsequitur, ita dicunt, non ex his quæ euidenter apparent, sed per syllogismum accipientes. Nam supponentes frigidum omne cõtrahere consistareq̄, & substantiam redere immobilem, aut ægre mobilem: calidũ uero rarefacere, fundere, coquere, mouere: rationabiliter in plantis omnibus uincere calidum pronunciant: si quidem haud aliter neq̄ nutrimenti ex terra digestionem prolixissimã, neq̄ alterationẽ eiusdem, neq̄ concoctionem, quin nec incrementum prorsum plantarum, neq̄ germinationẽ, neq̄ fructuum generationem perfici posse, nisi calidũ superaret: atq̄ ita rursum inter plantas, alias calidiores, alias frigidiores cõstituunt. Ex eadem ista hypothese si pendet ea ratio, quæ rosas esse calidas con tenderunt. Siquidem in illis, si in alijs uillis plantis, plurimum uincit caliditas. Ex altera rursum hypothese dependet quod de oleo & adipe adstruunt. Nam quod ocysime inflammantur, idcirco calida esse ea facultate iudicant. Et alio rursum modo quæcumq̄ dulcia sunt, calida esse dicunt: si quidem quæ familiarissima sint, simillimaq̄ naturis nostris quæ calida sunt, ideo & ipsa quoq̄ calida esse uolunt. Atq̄ philosophis quidem, utputa qui de tota natura scrutantur, recte talia & queruntur & dicuntur. At medicis, quibus alius est scopus propositus, haud perinde recte: quippe cum in rosarum effectibus calidum non uincat, neq̄ sanẽ quoduis aliud

aliud plantæ genus, eo quod plantæ est, calidū dici debet: qm̄ nos haud ita calidum quarimus, sed ut ad hominē: siquidē si quia in actiōnis superat caliditas, propterea calidum quid dices, planta unaquæq; calida erit, multoq; magis animalia omnia. Dicant igitur, si lubet, papauer, mandragorā, cicutam, salamandrā esse calida: uerum nemo id dicit, sed uelut uno ore omnes esse frigida pronunciant. At qui animal est salamandra, quod & nutritur & crescit, & mouet, quæ sanē calido in mistura uincente prouenire aiserunt. Quid ergo in istis quidem ad hominē respiciunt, in alijs uero ad totā naturā, aut primarū qualitātū actiōnes? At ego non salamandrā modo aut cicutā ut ad hominem frigida esse dici oportere cēseō, sed alia omnia ad eundē modum iudicanda. Siquidē cicuta sturnos non modo nō refrigerat, & enecat, uti nos, sed & alit quoq; & nimirū etiam calcificat. Quicquid enim substantiam alit calidam, calorē eius quadam tenus & auget & tuetur. At qui corporis sturnorū calida est substantia, nō modo qua animalia sunt, sed etiam qua sanguine prædita. Sanē subinde in alijs tractatibus demonstratū à nobis est, amicitias quasdā pugnantesq; qualitātū omnibus rebus inesse: ac quod familiare est, expedite assimilari: quod uero contrarium ad internectionem ducere tum animantia, tum plantas: Præterea familiaritates illas à totius substantiæ proprietate oriri: Id quod sæpenumero à me & dictū est, & ostensum. At isti cum ægre id capere possint, segniter & false de complurimū medicaminum uiribus pronunciant. Vna enim dumtaxat illorum examinandorum regula est, nempe ea quæ ad hominē fit exploratio, id quod secundū accidens, ab eo quod est per se semper distinguendo. Cui si quis animū intendat, is nec acetum, nec rosaceum calidum unquam dixerit: quippe cum utrumq; nos primario & per se refrigeret: acetum quidem ualide, leuiter autem rosaceum. Porro quidnam hoc sit Leuiter, ego exponā. Vna enim cū eo tota mediū temperamenti medicamentorū omnium ratio conspicietur, cuius & in præcedente libro mentionem fecimus, ubi de oleo disserabatur.

Quō iudicanda sint quæ ex media sunt tēperie, nepe si media tēperatūe similem ipsa tēperatūrā obtineant. Ca. 6

Si quippiam est ex applicatis nobis seu corporibus seu medicamentis, quod actu sic calidum sit ut nos, aut ex contactu similiter calidum euadat, id ex media est temperie, cum nobis nimirum colatum: siquidem secundum se queat per exuperantiam dici calidum, uelut & nos quoq;. At siquid nondū adeo calidum est ut nos, neq; admodū tale redditur, id temperie humana frigidius est, quantumcūq; in eo caliditas exuperet. Etenim admotū calorē, qui in nobis præerat, auferet detrahetq;: Quippe si datis duabus a quibus calidus, quarū altera plus, altera minus caleat, miscetas minus calentem magis calenti: huius certe feruorē extinxeris. Sic si in caliditatem rosacei, quæ tepida est ut ad temperiem humanā, caliditatē indideris humanam, prorsum ab hac quid detrahes, & refrigerabis.

Quod sæpenumero pro corporis nostri dispositione, quod per se calidum erat, refrigerare est usum: quodq; per se erat frigidum, excalfacere. Cap. 7

Non ergo stupenda magnopere res est, si quicquam eorū quæ proprie & per se sunt calida, cum calidiores cōmilitum, frigidius efficere ipsum queat. Ea est enim communis alterabilitum corporum omnium natura, uti in se & agant, & patiatur admotā: quodq; minus est calidum, à magis calido calidius euadit: quod uero magis calidum, à minus calido contrā afficitur. Nam id uel ex ipso tactu clarissime discas. Etenim eadem subinde illi tum calida, tum frigida esse uidentur: calidiori quidem factō, frigida: frigidiori uero, calida. Proposuit autē mihi dudum quispiā, quāobrem in balneis frigidū meamum, foris uero calidum: haud intelligens, in balneis urinam quidem perinde ac foris tepidam esse, uerum nos non aëque extrinseca corporis superficie, & dū lauamur, & ante affectos esse. Nam in balneo ipso calidior ea nobis est quam urina, extra autem frigidior. Quare & urina non abs re illi calida extra balneum apparet, in balneo autē frigida. Quod enim minus quam ipsa calidum sentitur, uelut refrigerans habet: quod autem magis calidum, tanquam excalfaciens. Liceat uero tibi, periculi faciundi causā, postquam abunde lauandū in calueris, pelui aëque modice tepide intrō iussu tuo allata, in eam manum aut pedem immittete: apparebit enim nō aqua tepida, sed admodum frigida. At si protinus balneum ingressus, aquam peluis tetigeris, minus uidebitur frigida: perpetuo enim quanto plus fueris percalefactus, tātō apparebit frigidior. Nec mirū uideri debet, si putealium aquarum plerūq; quæ uidelicet fontes profundos admodum habeant, contactū hieme uideantur tepida. At si à balneo manib. cōtingas calidus, multoq; magis si etiamnum in lauacro cōsistens, haud profecto apparebit tepida. Itaq; tactū calidi frigidiq; dignoscendi normam ponētes, ac eius dispositioni iudicium omne tribuentes, merito sanē crebro fallimur, ut qui quod haud ex se est frigidū, id frigidum esse dicamus: q; uero calidū ex se nō est, id esse calidū pronunciemus. Hinc fit ut dum lauamur, frigidam esse urinam credamus; eōntraq; frigore rigentes, aquam ē puteis haustam calidam existimemus. At si affectionū, in quibus eramus dum utraq; cōtingeremus, obliuiscamur, ac solius eius qui in nobis factus est sensus meminimus, periculum est, ne forte aquam aliquando absolute dicamus calidam, urinam uero absolute frigidā: At qui neutra absolute aut calida aut frigida est, sed ut ad nos: Nec ut ad nos rursum absolute, uerum hoc uidelicet pacto affectos. Absolute autem utraq; qualis ad nos est, dici possit, ad mediā, eandemq; optimam nostri temperiē collata: ut si ad hominē absolute expendat, omnino sanē ad temperatū & eucratum expendi oporteat. Sanē & hæc quoq; peccata omnia à nominū definitiōe dependent, quam paulominus omnes habent cōtemptui. Etenim cum calidum & frigidū partim absolute dicatur, partim per exuperantiam, partim

ut ad symmetrum sui generis comparatum, partim ut ad quidvis obuium collatum; iure optimo in hominibus identidem fallitur, necquid quidem quoniam horum modorum quid calidum iudicemus, ad alterum tamen transientes. Verum sexcenties nunc dictum est, diciturque, quod in quarto & ultimo eorum quae modo recensuimus significatorum, de medicamento-rum uisibus considerare oporteat.

Quod experientia cognoscere iudicareque medicaminum facultates oporteat. Cap. 8

Non enim an absolute unumquodque calidum sit, ut ignis (nam id omnino etiam quod impossibile) aut an per exuperantiam, ut sanguis considerare propositum est; neque an ut ad symmetrum sui generis aut speciei dicatur calidum, ut leo in animalibus, & quod florentis aetatis est in quauis specie ad aetate prouectum; sed an ad hominem sit calidum, frigidum, humidum, aut siccum medicamentorum unum quodque id uero inquirere statutum est. Neque rursus ad hunc, tanquam id quod ad aliquid aliud comparatur, sed si facultate, hoc est, si ad motum ipsi, eam partem quam tetigerit reddat aut calidiorē, aut frigidiorē, aut humidiorē, aut sicciorē. Itaque in experientia & iudicandi & dignoscendi consistet ratio. Licet reperiantur medicorum plerique, qui experientia posthabita, an rubra sit rosa, an bene olens, considerant, negligentes ubi caput ipsis exsultat, coronis ex rosa contextis, capitique impositis, aut succo eius, aut oleo rosaceo, sic uel ipsa experientia id quod res est discere. Nam si excalescat, magis etiam calida fuerit: sin refrigerentur, frigida, quod perinde est atque refrigeranda humanae naturae facultate pollere. Nam id perpetuo memoria tenere oportet, quod tamen sexcenties dicere non grauatissimum, tamen multum sic quidem id capiunt: atque ignoscendum sane illis est, ut quos philosophi prolixis suis nugis peruerterunt. Et profecto experientiae quidem ratio tam facilis est cum in rosis, tum in caeteris medicamentis omnibus. Nam rosis aut coronari liceat, aut eis contritis hominis estuantis os uentriculi illinire, aut succum earum expressum ebibere, aut oleo aquae uel mistis aliquam corporis partem conficere. Sed quid haec multis comemoro, cum nonnulli mistum quod obalsamo rosarum succum sub Canis ardoribus refrigerij causa corporibus inungant, usu uidelicet ipso docti cum hoc fecerint, abunde refrigerare? At Herodotus medicus praerximia uidelicet sapientia, ne mistum quidem acetum rosaceum, quod proprie oxyrhodonon uocant, refrigerare nos concesserit. Postea memor illo se uti in principijs morborum phreneticorum, nec ignorans quantam sibi contradicentium turbam indere cietur (quippe omnibus propemeditis confessum est, adeo ut uel Thesali sequaces, hominis impudentissimi, negare non audeant, repellendum refrigerandumque in principijs esse potius quam calfaciendum aut laxandum) non refrigerare ipsum inquit, sed adstringere. Atqui difficile sane illi ne utique fuisse, si quando est nimio affligebatur (nam & homo erat, opinor, eiusdem obnoxius passionibus quibus & nos) caput oxyrhodi-

A no perfundere, sicque experientia medicamenti effectum cognoscere. Immo facilis puto fuerat refrigeratum eo uti, caput perfundendo, auribusque instillando, ac naribus infundendo, totaque adeo frontem perfricando, quae admodum amaricino, irino, caeterisque eius generis unguentis calidis uti assueuimus, cum non medio critere quidem secundum eum calfaciat ad oxyrhodonon, ex duobus calidissimis: scilicet confectum medicamentis. Caeterum si Herodotus eo uti ausus non est, aequum arbitror, ut qui nunc uiuunt, eius in se se periculum faciant, ubi aut algē, aut aestu laborant, uel nos sepe in nobismetipsis experti sumus, aliorumque copulatum aestuantium caput perfundimus. Praestat enim ipsos prius in sese que profuderunt expertos, ita denique ea nobis confu-

B lere, ac literis posteritati prodere.

De rosis, & quod ex eis conficitur rosaceo, tum chamamelos, & lini semine. Cap. 9

Verumenimvero tametsi contradicere nemini staueram, tamen nescio quo pacto huc illorū me impudentia adegerit. Rursus itaque redeo ad id quod ab initio proposueram, nempe, experientia iudicanda medicamentorum potentias: idque tum in ijs qui inculpatam sanitate fruuntur illis utendo, tum in ijs, qui quoad fieri licet, quammaxime simplicibus tenentur aegritudinibus, aut calidis aut frigidis, aut humidis aut siccis. Ita enim si iudicaueris, oleum neque calidum, neque frigidum, ut ad hominem temperatum inuenies: rosaceum uero aliquatenus iam eo frigidius, non aut uehementer frigidum: uerum ut ego nominare cofueui, in primo ordine seu limite refrigerantium. Nam ut aqua, uerbi causa, alia ad unguem temperata est, alia aut calidior aut frigidior, non adeo tamen ut possis extreme frigidam aut calidam dicere: ita in medicamentis quoque oleum quidem ex frigida existit temperie: ut rosarum succus ex frigidiora quidem, sed non ita multo: uerum caloris est, ut diximus, tepidum. Eiusdem cum illo ordinis est, quod ad calorem tepidum attingit, linospermon quod uocant: uerum essentiae suae crassitudine non paruo discrimine ab illius natura recedit, cum rosarum succus exquisitae tenuis sit essentiae: cui rei indicio est, quod ad calorem arefcat, nec quicquam obtineat uiscositate, tum caeterorum unguentorum odores exoluat ac obscuret. Neque enim alia re efficere id uidetur, quod odoratus meatus opplere praecoepit. Nam cum transire ac penetrare illa cunctantur, ante ipse praecoepit, atque illos implet. Est & chamamelum tenuitate quidem rosae perfimile, calore uero ad olei uires magis accedens, hominum familiaris, tum temperatas. Quapropter lassitudinini, ut siquid aliud, cum primis confert, doloresque sedat mitigatque: praeterea tensa remittit & laxat: quaeque medio critere dura sunt emollit, quaeque constipata rarefacit. Ad haec febres quae circa uisceris alicuius inflammationem insistant, discutit dissoluitque: ac praefertim quae ex humoribus biliosis, aut cutis densitate proueniunt. Qua de re & ab Aegyptiorum sapientissimis Soli consecratum est, febriumque omnium unicum putatur remedium. Ve-

rum hac quidem in re a veritate aberrat. Solas enim quas dixi febres sanare potest, easque percoctas: licet sane pulchre etiam reliquas omnes adiuuet, quæ melancholicæ sunt aut pituitosæ, aut ex uisceris inflammatione prognatæ. Næ & harum remedium chamæmelum est uel strenuissimum, ubi cōcoctis adhibetur scilicet: quapropter & hypochondrijs, ut siquid aliud, gratum existit. Quin & tale quoque esse lini semen uetus sermo prædicat. Nam & ipsum quoque reuera quæ circa hypochondria sunt uisceribus gratum est, minus tñ chamæmelo, quippe cum & minus calidum sit, ut est dictum, & præterea essentia crassæ. Verum rosa illis nequaquam his in rebus propinqua est: tamen si quod ad caloris tepiditatem & essentia tenuitatem attinet, perquam sanè & ipsa inflammationibus in hypochondrijs consistentibus utilis esse possit, nisi adstrictio (quæ unà quoque illi inest) multifariam læderet, quæ maxime ijs obest, in quibus chamæmelum præcellit: ut in pe condensata corpora rarefaciēs, in durata molliens tensa relaxans. Nam ijs omnibus inimica adstrictio est. Attamē ad ascēsus augmētāq; inflātionū, ac potissimū earū quæ in exteriorib. membris extant, chamæmelo rosaceū præferitur: quippe cū hæc tepida caliditate cū leui adstrictione indigeant. In principio enim quæ refrigerant atq; adstringunt, per incrementa uero tepida, & mediocriter consringentia: at in uigore ac statu inflammationū quæcūq; tum moderate calfacere laxareq; per declinationes, quæ tum calfacere, tum ualenter discutere ualent, magis cōpetunt. Ac de istis omnibus suffus in libris De medendi methodo tractabimus. Nunc ad propositum conuertor.

Quod pro diuersis corporum affectibus diuersimodè agere sint nata, si quæ mediæ temperatæ medicamentis sunt, tum quæ paulum in alteram partem declinant. Cap. 10

Etenim quæ mediæ sunt temperatæ, & quæ utramuis in partem leuiter declinant medicamenta, interim calfacere uidebuntur, rursumque refrigerare: interim uero neque ex calfacere, neque refrigerare, sed sicuti corpora acceperunt, ita ea feruere. Nec id illis ab re accidit. Siquidem aqua tepida & urina in balneis quidem frigida, & argentibus uero calida nobis apparent. Cum ergo ex eo quod affecta corpora uarijs subinde modis disponantur, ipsum quod afficit, uariè quoque agere contingat: licet ex hoc, non rosam, non oleum, non chamæmelum, non lini semen, sed neque anethum, neque fari nam aut scenigræci, aut triticeam, neque alia sexcenta, quæ partim adamussim mediā temperiem sortiuntur, partim paululum ab ea recedunt, eandem ubique æditura esse actionem: quando nec sani eandem omnes temperaturam obtinemus, nec eisdem morbis affligimur ægroti. Iam rosaceum mediā inter oleum & rosarum succum temperiem possidens, (illo enim minus est calidum, hoc aut magis) refrigerat quidem exultos, idque caliditatis suæ tempore: algentes uero paulum etiam calfacit, quod uidelicet is quoque effectus caloris sit tepidi: quemadmodum balneæ rigentes quidem ex calfaciunt, æstuantes uero refrigerant.

Galien.

Quod ex aquo & quod curatur, & quod curat, à medio distindere debeat, idque utroque in contraria recedite. Cap. 11

Quocirca si aut refrigerantibus medicamentis, aut ex calfacientibus rosaceum indideris, sicut nec magnopere obfueris, ita nec admodum profueris. Nam caliditas tepida nec est sufficiens quæ refrigerata sunt lædere, nec eadem curare potens. Etenim quicquid curari debet, tanquam quod ab immoderatione seu amertia ad cōmoderationem seu symmetriam reducitur, non id quod bene temperatum sit requirit, uerum id quod contrariā habeat intemperaturam. Siquidem si aquam frigidam temperatam efficere studes, temperatam ei misce ri non oportet (sic enim tepidum euadet, quod ex utrisque cōmixtum erit) sed feruens petenda est, eaque frigida miscenda. Hactenusque moderata calidior esse debet ea qua frigidam temperare uoles, quatenus uidelicet & frigida ipsa symmetriā frigiditatis exuperat. Nam sicut quæ leuiter tantum symmetra frigidior est, ab ea quæ multo est calidior, mediā non recipiet tepere: sic nec quæ longe frigidior, ab ea quæ paulo calidior. Verū si quod curatio nō postulat, multo est frigidius, necesse est, quod ipsum curabit, multo quoque calidius existat: Sin paulo frigidius, paulo etiā quod curabit, calidius erit. Vt autem uo uerbo exprimam, tanto abesse à medio quod medebitur, quāto ipsum cui medela adhibetur, oportet: nimirum cū in contrarium utriusque uergat excessus. Nam quod eandem in partem cum corpore curādo, idque æquo temperamento recessit, id quidem idoneum non est quod alterationem ullam inuehat: quare affectum neque lædet, neque iuuabit. Quod autem minus aut plus recessit, alterabit quidem omnino affectū. Sed quod longe plus distat, protinus etiā nocebit. At quod minus est, iuuabit quidem non tamen perfanabit. Ergo si affectio quidem frigida sit, at calor medicamenti tepidus, omnino necesse est affectum iuuet quidem, uerū haud quaquā ad naturalem symmetriam reduceret poterit: quare nec perfanabit. Rursum si affectio quidem sit parua, nempe ut à symmetra naturæ caliditate ad tepiditatem declinet, sitque medicamen frigidum, omnino refrigera ri affectū, lædiq; à frigore necesse erit. Eodē quoque modo si calidior sit moderata temperatura affectus à similib. ipsius medicamentis in eodē statu seruabitur: lædetur aut à calidioribus. Porro iuuabit quidem ab ijs quæ se sunt minus calida, non tamē penitus perfanabit. Sanè & hic quoque rursum homonymia in totā extēsa uitā crebroque nos fallens occurrat. Etenim quod mediocriter est calidū, est subinde calidū appellatum, sicut balneū quod est eiusmodi, ac poculum: tū id quod ab hoc multū etiā distat: hæc quoque et quicquid calidius est. At si ex quibus nomina ueremur appellatiōe, quod symmetrū est, nō calidū, sed eucatū, hoc est temperatū nūcuparemus. Quod aut ab huius excederet modo, si ad calidius quidem immoderatione sua accederet, tum plus, tum minus calidum: sin ad frigidius, plus minusque frigidum. Sic opinor in medicamentis si ex quibus loqueremur, quiddam uocare-

tom.

5

d

mus

mus eucratū & medium, uelut oleum. Si quid autem eo esset calidius, calidum, ut fœnumgræcum: sin frigidius, frigidum, ut rosam. Cæterū huiusmodi nominū ab usus causa extitit, quod nō omnia corpora ab id genus medicamētis refrigerentur, quale est uidelicet rosaceum. Nam cum alia per eque illi frigida sint, alia etiam frigidiora: illa quidē profum ne alterat quidem, hæc uero etiam calfacit: sane quæ absurdum uideri possit, si cū quid ex calfacere fateamur, tamen frigidum uocitemus, ac si quis aquam putealem, quæ hieme manibus refrigeratis tepida uidetur, frigidam appellat. His ergo occasionibus perturbatus confususque nominū usus, rerū quoque unā confudit notitiam. Similiter uero & de sicco & humido, confusus ipsorum nominibus rerum quoque notitia confusa est. Ac tamen si ex ille uideat nominū significata probe distinguere, at tamen maximū habere momentū & facultatē ad rerū cognitionem deprehendit. Sed de humido & sicco paulo post dicetur, ubi uidelicet omnē de calido & frigido sermone perferimus. Nam non multum etiam reliquū esse uidetur, ubi uidelicet iam semel apparuit, nihil miri esse, ab eodem medicamēto corpora diuersa alia quidē ex calfacit, alia uero refrigerari, alia autem neutrum omnino perpeti. Etenim in eo quod ad aliquid, facillimum est ad particularia accedentem dicere, quod eiusmodi corpori admotum rosaceum, in qua ipsū temperie nactū est, in ea seruare potest: alteri uero illiusmodi applicatū, ex calfacere, alij autē, refrigerare. At in uniuersum de facultate eius pronuntiare, id uero difficile est absque ut nominā distinguas, atque de ijs conuenias. Fuerit autem tū distinctio, tū conuentio talis. Quando quidē corpora humana tū ijs quas ab ortu nacta sunt temperaturis, tū ijs quas ex ætate postea acquirunt, tum ijs quas ex uitæ cōsuetudine adueniunt, plurimum inter se differunt, ab iisdem ea medicamentis uariē alterētur necesse est. Quippe si iuuenem natura calidum, ex uitæ insituito artificij exercet, uetula mulierculæ eidēque naturæ frigide cōpares, non minus illum excellere cōperies, quā si ualide calfacientū medicamentorū quippiam cum refrigerantibus componas.

Quod generales medicamentorū facultates, ad mediā referentes temperiem, expendere oporteat. Ca. 12

Medium ergo horū mihi quempiam intelligas, qui et natura sit eucratū, hoc est temperatus, & moribus ac cōsuetudine cōuenientiam hanc tueatur eucrasiam: dein tres hocce tanquam temperaturæ scopos animo commendes, ac circumspicias, quod in genere calidum est & frigidum, & siccum & humidum, cuius ex ipsis temperie respectu tale appellare sit optimū. Nonne ad temperatissimā, quæ unica est, pariterque reliquarū mediæ an ad immoderatas & intemperatas, atque indefinitas, ac propemodum numero infinitas: Sane mihi ne cōferēda quidē distinctio uidetur, neque ulla propē cōsideratione indigere, sed hominī uel paulum etiā ingenij habentī perspicuū esse, corpus omnibus numeris absolutū & decorū, simplexque &

unum, uelut regulam quandā & scopum proponendum, ac ad ipsum alia omnia dirigenda esse. Esto ergo nobis corpus hoc medicamentorū facultatis regula: quodque similem illius temperiei caliditate accēdit, uocetur temperatū etiam uel maxime ex calfacere senem refrigeratū uideat. Quod uero calfacit aut refrigerat corpus eiusmodi, illud quidem calidū, hoc uero uocetur frigidū. Esto autem, quod hæc dilucidius tradantur, ipsorū excessuum ordo, ad frigidum quidem primum, cuius esse dicas rosaceum: secundus, cuius sit ipsa rosa: post hunc tertius & quartus, quoad sermone ad frigidissima pertingerimus, nempe cicutam, succum papaueris, mandragorā, hyoscyamum. Rursum ad calidum, anethum quidem, & fœnumgræcum, prima. Secunda uero deinceps, quæcunque uideatur secunda, tertiāque & quarta, donec ad exuerentia perueniam sit. Ad eundem modum in medicamentis humectantibus ac siccantibus rursus a symmetrio exorsit, ordines deinceps ad summa usque constituiamus. Nam huius notitiæ ad medendum methodum non paruus est usus: imō nisi quis hoc pacto definiat, officiet magis legentibus, quam proderit. Si quidem medici, qui nunc quidem simplicium medicamentorum uires exponunt, præter alia multa quæ delinquit, hoc maxime noxiū est cernere, nempe quod in calidis, uerbi gratia, anethum, & fœnumgræcum, & misy, & calcem, in differenter numerent: in frigidis rosaceum, mandragorā, & cicutam: tanquam scilicet propinquum sit aut calci fœnumgræcum, aut cicutæ rosaceum, ac non multis mediantium medicamentorum ordinibus distincta. Verum nos pro uiribus rem tam immensam tamque operosam in ordinem redigere tentemus, exponamusque quæ uiribus propinqua sunt, quæque longe distita. Atque id quidem efficiamus, non probabiles sermones, sed certam ac definitam experientiam pro iudice sumentes: uelut & id quoque superius sapenimero admonuimus. Enim uero eiusmodi iudicium ut tutissimū quidem erit, ita prolixum quoque, ac plenum laboris, dum propositi finem consequamur. Eos tamen qui hæc relegere uolent, hoc unicum ac solum efformare atque artificiosos redere poterit, ac uelut oculum quo ueritatem agnoscat, præbere. Ergo quæ adhuc reliqua sunt ad totam uelut elementarem cōstitutionem, postquam ea hoc libro confecerimus, in quarto de superiorū uiribus differemus: quando quidem & hoc quoque ita usum amicis est: in quinto autem de omnibus in genere simplicium medicaminum secundis quidem ac compositis facultatibus: atque ita ad particularia in ijs qui de hinc sequentur libris transibimus.

Quod que sensu simplicia uidentur medicamina, per sepe composita obtineant uires, imō uero etiam non nunquam contrarias. Cap. 13

Reliquum autem est id cuius subinde iam ante necessario mentionem quidem fecimus, uerum absolute nondum exposuimus. Est autem istud, nempe omnia propemodum medicamenta, licet sensu

sensu simplicia appareant, natura tamen esse composita: quin & subinde quoque diuersissimas in sese continere facultates, nempe excernendi & sistendi in crassandi & extenuandi, rarefaciendi & condensandi, obliniendi & diffundendi, contrahendi, & laxandi, cæterasque oppositiones uniuersas, ut in sequenti hunc libro patebit. At mirum hoc uideri minime debet in id genus facultatibus, cum uni & eidem medicamento uim calfaciendi & refrigerandi inesse appareat, aut excicandi & humectandi, aut tenuium partium & crassarum. Quippe nisi primæ efficacissimæque uirtutes hoc pacto complicarentur, haud sanè quæ ex illis sequuntur, simili ter complicatæ forent. Quin si nos ipsi rhu siccum uerbi gratia, melli commisceamus, quod ex ambo-
B mistis cõfectus est, non modo adstringendi, sed etiam abstergendi possidere facultatem concedemus: nec cohibendi solū uētris, sed & euacuandi. At in lacte duas contineri facultates, nempe excernendi, ac uentrem sistendi, haud itidem concedimus, tamen si id perfacile in serum ac caseum segreget, confessumque sit omnibus, illud quidem uentrem subducere, hunc eundem cohibere.

Quod & brasiica duas, easque contrarias, in sese facultates obtineat. Cap. 14

Quod uero & brasiica duas, easque contrarias, in sese facultates obtineat, neque id quidem etiam facile concedimus. Nam si succum eius expressum aut solum, aut cum melle hauserimus, expurgare ipsum cernimus; attamen quoniam quod reliquum est, edere nequeamus, adstrictorium esse diffidimus, sed si totam cõcoquas, primamque eius aquam, in quam succum deposuit, effundas, iterumque eam alteri aquæ puræ iniicias, rursusque cõcoctam eximas, succum quidem purgare offendes, brasiicam uero ipsam uentrem adstringere: multoque magis si non bis duntaxat, sed ter aut quater aquam effuderis. Nam quanto exquisitius in aquam succum suum deposueris, tanto & illi quidem maiorem purgandi uim adiciet, et reliquam sui substantiam, quæ uelut holeris ipsius caro est, restringentem efficiet. Eadem est ratio in beta, atque adeo in omnibus ferme quibus sapor aut acris, aut nitrosus, aut salus inest. Quippe & lenticula ipsa, tamen si satis magnam adstringendi potentiam gustu refert, tamen eiusmodi quid fortita est. Nam & huius decoctum, uentris soluendi uim obtinet. Verum hic succus etiam, si degustes, perspicuam misturam representat, tanquam si nitroso austerum quid commisceas. Sed et conchularum maris, cæterorumque ferè ostreorum succus planè tum salis est, tum uentrem soluendi uim obtinet: quamuis eorum quo uentrem reprimat. Verum quod dico deprehendes, si ea quoque quomodo brasiicam censuimus, præparare non graueris. Nam & gallorum ueterum uim uentrem ducit: tamen si caro eundem siterè potest. In aris autem squama sicut duplex qualitas, item gemina quoque facultas inest: nam & astringit & mordicat: quare adstrictione quidè siccitas ulceratum carnium cicatrices obducit, mordicatione uero præ-

Galen.

A humiditas colliquat. Quod si intro in corpus sumatur, purgat quidem uentrem, uerum non cohibet. Vincitur enim ea adstringendi facultas ab acri purgatoriamque potentia, tanquam si rhu succum scamoneæ commisceas. Nam quod ex ambo-
B erit, soluet uentrem, haud sistet, licet gustu austeritas exuperet. Sic autem non pauca purgantium medicamentorum cum carne mali cydonij exhibitæ, gustu quidem fallunt, ac effectui solo quid ualeant commonstrant. Dantur uero quædam cum palmulæ carne, alia aut cum myrtis, alia cum mastiche chia, aut alio quopiam eorum quæ tum grata sunt stomacho, tum adstringunt, quod scilicet gustu fallat, simulque stomachum minus euertant. Verum tamen si ea que gustu percipiuntur qualitate, expurgantia ab adstringentibus uincantur, alia tamen facultate ipsa uincunt: perasæ enim lingua à materia uicta est copia: cæterum actio pro facultatis uiribus ac robore perficitur. Itaque cum substantia exigua quidè, sed ualidis prædita uiribus, mista alteri substantiæ plurimæ, eidemque imbecillæ, in corpus intro peruenit, gustu quidem fallit, attamen effectum quam illa efficaciorẽ exhibet. Sanè permultos huius rei admiratio detinet, remque rationis expertè absurdamque existimant, si corpus quodpiam adstringere purgare queat, uelut aloë, & aris squama, atque aris ustum. Nam contrarium potius oportebat, nempe uentrem reprimere, haud quæque ciere. Cæterum quod malum, uerbi causa, cui indita est scamonea, adstringens purgat, nemo miratur: tamen si hinc oris facilius erat & in aloë mistam inesse facultatem colligere. Ac si quod ex ea purgat, ab eo quod non purgat, segregari posset; non etiam admiratione afficeret: quanquam id sanè quodammodo præstari queat. Nam si aloë accurate lauetur, aut debilitet, aut planè nihil uentrem subducit. Idem usu uenit aris squamæ, arisque usto: quippe quæ nos diligenter elota obscuram modo purgandi uim retinuisse sumus experti. Quin immo ipsius quoque qualitate medicaminosus sapor primo statim gustu facultatis missionem demonstrat. Nam si unica semper qualitas unicuique gustu adstringenti medicaminum inesse, haud sanè inter ipsa alia eius apta, alia medicaminosa forent, sed rantum in plus ac minus adstringendo differrent. At non ita se res habet. Nam hæc quidè, adstrictio mitis ac suavis apparet, alia molestè ingrataque, & medicamentosa. uelut piri quidem, mali, & mali punici, suauis: squamæ uero eris & aloës, ingrata atque medicamentosa: tamen si malo cydoneo aris squama minus adstringat. quam obrem nec adstrictionis uehementia eam qualitatis absurditate inuehit: quando innumera prope alia eorum que eius sunt, aloë, aris squamæ, & ipso etiam aris usto plus adstringat. Atque in hisce utique substantiæ mixtura clare perspicitur. At in alijs etiam si non appareat, tamen eam ratione colligere oportet, ac non putare aliud in aloë adstrictionem moliri, aliud in malo. Vnū enim in omnibus efficere pro sua natura non adstrictionem modo, sed & aliarum qualitatum unamquandam rationi consentaneum est. Cæterum quia nullum omnino ab alijs qualitibus

tom. 5

d 2 slynce

syacrum reperitur, idcirco diuersi effectus ab alijs atq; alijs adstringentijs edidi conspiciunt. Nam alius est effectus melsilij, alius aris, alius aloes, alius mororum, exempli gratia, aut gallæ, aut corticis mali granati, aut alutinis, aut rhu: præstitissetq; forsitan, qui de adstringentijs medicaminũ uiribus pronunciare sunt ausi, in genere de ipsa potius adstrictione, haudquaquam de adstringentibus dixisse. Nam quod adstringit, nõ adstringit modo, sed & præter adstrictionẽ acre est, aut pingue, aut dulce, aut amarum, aut saluum, aut acidũ. At adstrictio unum id solum perpetuo est quod est, uti & falsitas, & dulcor, & aliarũ qualitatum unaquælibet. Quod si ut adstrictio, ita adstringens unũ esset, sanẽ unũ quocq; perenitẽ eius esset opus: Verũ cũ præter adstrictionem insuper alias qualitates recipiat non paucas, semper quidem omnibus illis agget, sed euentius alias per aliam, nempe uincetentem: idq; ut ad corporis scilicet cui admotum est affectio: quippe cum & lac, & lens, & brastica, horũ interim citare aluum, illorũ uero sistere cernantur. Et causam quidẽ quamobrẽ nõ perpetuo euidenter agat in corpore unoquoq; unica duntaxat qualitas, uisq; medicamenti, eam quidem iam mox in sequenti sermone edisserã: Im præsentiarũ uero id quod res habet cõmemorare solummodo proposui, ne quis plerisq; medicamentis contrarias tum qualitates, tum facultates inesse diffidat. Sed & id quoq; multam considerationẽ & distinctiones non paucas requirit, tamen omnibus per facile uideatur, contrarias inuicem & qualitates & facultates inuenire. Ergo citra controuersiam omnes propemodum adstringens cõtrarium ei quod purgat, esse statuunt. Verum neque illud huic cõtrarium est: quod nos procedente sermone declarabimus. At in præsentia ex superabundanti illud quoq; monstrabimus, etiam si ea quis esse contraria ponat, nihil inde sequi absurdum: cum fieri possit, ut in unam substantiam conueniant uel maxime contrariae tum qualitates, tum facultates: quippe cum supra ostēderimus, in succis aliud esse quod grauissimum est, aliud quod leuissimum, aliud tertium toti succo permistũ. Nee miri quicquam est, si & in rosæ succo aliud quidẽ est grauissimum, amurcæ & feci proportionale: aliud leuissimũ, & ipsum proportionẽ respondens flori in quoque succo supernatanti: aliud tertium, quale est quod in musto feruet: ad hæc quantum ipsum uidelicet purissimum ac syncerissimum, cuius hæc tria excrementa existunt. Euenit autem alios quidem succos aut acescere, aut corruptos putrescere: sola uero oleum, mel, & uinum, in longum temporis spaciũ perdurant. Itaq; neq; per ebullitionem, neq; per secretionem in alijs succis has excrementorum differentias inuenire perspicuo licet: uerum protinus ab initio coctione quandam illis est opus, aut saltem aliquid perdurantis succi mistura. Nam sic rosæ succum melle miscentes, aut oleo incoquẽtes, aut totas rosas ei immergentes, reponimus. Cæterũ q; & in his quoq; probabile sit quatuor illa inesse genera, p̄priũ ipsius

succi uidelicet, & tria excrementa, intellectu clarum est, ac potissimum quia qualitas earũ nõ simplex est, inõ adstrictionẽ quoq; quandam obtinere, si rosam dentibus mandere uoles, uideatur. Habet autem & dulcedinem, & amaritudinẽ, qualisq; mordicantẽ quandam leuem. Verum satis erat, etiam si horũ nihil gustantibus deprehẽdi posset, tamen ex eo q; nõ extreme adstringit, aliorũ quoque saporũ misturã intelligere. Etenim si solus sit auusterus, summus itidem fuerit. At si nõ summus, sequitur quod neq; etiã solus: Quam enim proposui adstrictionis generationem, eam si solum citra alias esse cogites, summa hæc sit necesse est: quo modo si sola corpori crispam caliditas summe inesset, id inueni utiq; foret. Nam contrariorum mistura, summities ipsas frangunt.

Quam ob rem lingua, tangentibus ipsam dissimilaribus corporibus, ac per diuersas eius partes simul agentibus, nõ quã in oēs illa partes infortit, percipit affectionẽ, sed ea ex parte primo affecta in totam ipsius diffunditur substantiam. Ca. 15

Atq; in similibus quidem partibus calor, frigiditas, siccitas, humiditas, particulae differentias efficiunt: in dissimilaribus uero, acrimonia, siccitates, auusteritates, acerbitates, dulcedines, amaritates, falsitates, aquositates, & unctuositates. Itaq; unaquæque simularium in ipsis partium non multas, sed unam qualitatẽ obtinet: quod uero totũ est dissimile, cõplures. Nam si mille, exempli gratia, hoc in cyatho huius succi corpora contineantur dissimilaria, fieri potest ut centum adstringant, sexaginta mordicent, sexcetera sint dulcia, ducenta amara, quadraginta salcia, siccq; mutua missione tẽperata, ut parte nullã accipere sit quantum uis paruam, quæ non sit omnium particeps: ut in linguæ contactu omnes quidem agant, diuersa tamen unaquæq; eius parte, nempe cui ipsam appropinquare contigerit: ipsa uero affectio, ex eo quod primo affectum est, in totam eam diffundatur: ueluti si in frigore ingenti digitum in aquã gelidam repente immittas, tota interim manu horrebis, sæpenumero uero & corpore toto. Nam uelox est ex eo quod primo affectum est in corporibus sensilibus, in totum animal diffusio, ut uidelicet cum calfacto unã concalescat: refrigerato, similiter refrigerata: siccato, pariter siccescat: humectato, cohumescat: atque adeo frequenter etiam contraria uno tempore perpetiatur. Quod autẽ id facilius quod dicitur intelligas, alteri etiam exemplo adhibere animũ præstiterit. Vidisti opinor quandocq; coniecto in aquam quietã lapide, ex hoc quidem moueri aquam incipientem, in orbem autem motum extēdentẽ, tanquam centrũ sit id quod percussit. Cum ergo uno tẽpore in diuersas placidas tranquillacq; aquæ partes duo lapides coniecti duos effecerint circulos, qui per sese inuicem serantur, contrarios conspicias in quauis aquæ particula motus. Quæ res uiris etiam naturæ studiosis dubitationem non paruam attulit, num alia partes ab utroq; motuum, an eadem ab utroq; mouerentur. Nam quod circulus circulum non sistat, nec ultra profumq; ferri prohibeat, id manifestissimẽ

cernitur. Idipsum item fieri mihi intellige, cum eodem tempore pedes quidem in calidâ, manus uero in frigidâ indideris. In totû enim corpus utriusq; affectionis motus peruat, contrarijque inuicem occurrunt. referatq; forsan nihil, etiâmsi contraria non incendant semetip, sed unus ab uno, alter ab altero pede proficiat. Tunc em̄ nec nihil pari corpus, nec ab altero duntaxat dicere queas; nam & manifestò patit, & ab ambobus patitur, incallescens, ac frigidescens. Quod utriq; & in febribus lepyrijs & hepialis euenire autumno, extra q̄ quòd in illis nō extrinsecus, sed ex ipso corpore caliditate frigidatisq; affectus exorit. Quòd si quis dicta assequi nequeat, certe ex eo quòd iam dicit, factilime periculû facere possit. Erem̄ nō longe ab ijs quæ inquirimus abest, sed ex linguæ affectuum numero existit. Nam si parem absinthij portionem mellis exquisite cōmistam, linguæ imponas, *γλυκύμελον* (quemadmodum poeta cognominant) hoc est, ex amaro dulce, quod ex ambobus mistû fuerit, uidebis: nimirû cum haud aliò tēpore mellis sapore linguam sentiat, alio uero absinthij, neque alterû solum, uerum perpetuo ex utriusq; insolētem quandam mistionem permittam. Tale quid euenit cum in unum succum coierint austerâ & nitrosa facultas, siue natura miscuerit, siue à medico fuerit compositum. Nam eodem tēpore lingua utriusq; succi qualitatem percipit: ac si percipit, nimirû & afficitur, idq; pro familiaribus illorû uiribus. Necessesse est quancq; aliarum corporis partiu similiter afficit, etiâmsi qualitates ipsas non sentiat. Neque enim in patiēdo aut non patiēdo, ab alijs linguam differre putandû, uerum eo quòd ipsam nihil familiarium affectuû ob exquisitam sentiēdi facultatem latere possit. Quòd si ad id non nihil faciat ipsius raritas: quippe succi facilius in profundum penetrantes, atq; in molliculas partes actionem exercentes; tum ualidam quidem affectionē, tum uero sensum eius imprimūt euidentiore: ueruntamen maior uis in sensu accurato potius q̄ in affectionis robore consistit: cū affectionis robur nihilò secius & in exulceratis partibus fiat, sed quia exacta sentiēdi uis caret, idcirco succorum qualitates non percipiunt. Licet uero cum in illis, tum etiam ante illas, nondum uidelicet cute exulcerata, mistam ex contrarijs facultatis. actionē simul, in corpore fieri colligere. etenim si parti inflammatæ solani succi imponas, densari eam constipariq; & cohiberi transpiratus conspicies. Itaq; si plusculo idipsum tempore facias, non rubram seruabis particulam, sed aut liuidam aut atram efficies: id quod assidue in erysipelatis à medicis plerisq; fieri uidere est: nam & ea tempore dura atraq; immodice refrigerando efficiunt. Quòd si ergo non solanum, sed anthemida, hoc est chamæmelum parti inflammatæ impose uis, eam proxiim cōtra affici uidebis: quippe quæ rara, fusa, mollis, laxaq; euadet, [cum nondum cutis exulcerata fuerit,] multûq; illius superfluitatis quæ sub ipsa continetur transpirabitur, nec liuida amplius atræue erit, etiâmsi uel plurimis deinceps

Galien.

A diebus chamæmelo utaris. Fundere enim hoc ac digerere per halitum potest, haudquaquam cōtra here, condensareue; aut transpiratus prohibere. Quod ergo solano chamæmelum contrarium sit, illinc liquet. Quòd uero etiâmsi utranque commisceas, euidenter tamen utriusque uires perspicies, ego sanè expertus edisseram; utriusque te quoque malim ipsa re expertunda euentum cognoscere, quàm narrati mihi fidem habere: id quod scio efficiet quisquis ueritatis amore tenetur. Oportet uero ut in re iam patenti orationem absolueret. Si enim simul impositis solano, & anthemide, neque ita densa, dura, tenfa, liuidaq; reddatur, atq; si solo usus solano esses; neq; adeo rara, mollis, laxa, rubensq;, ac si chamæmelo solo usus fores, sed ditorum mediam accipere affectionē particula cōspicitur, consentaneum est utriusq; medicamentû secundum suam operatum esse facultatem. Nam si neutrû quicquam egisset, sed quiescisset utrumque, quam ab initio affectionē particula habebat, eam haud dubie seruasset, non secus ac si omnino nihil impositum foret. Sin autē alterum quidem eorum operatum fuisset, alterû uero penitus deustum, non mediam affectionem, sed extremarum alterâ perpeffa particula esset. At si utrumq; agit, eaq; contraria facultatibus fuere, cōtraria utiq; eodem tēpore corpus perpeffum est: Nec enim paritatis inter se agendi uicibus operabatur, tanquam si utriusq; exempli causa totum diem impositis, sex horis prioribus medicamentorû alterum, reliquis uero sex alterum suo uicissim munere fungeretur, nugax enim hæc est hypothesis, nec solum demonstratione, sed probabilitate quoq; omni destituta. Quancum profecto nec ita quidem fundi contrahiq; subiectam contingit substantiam, uelut in ijs qui in balneis lauantur, posteaq; ingrediuntur frigidam, sed potius ita ut si lauantur frigidâ aquam adpergas. Sic enim non diuersis temporibus, sed eodem contraria perpetiuntur. Igitur quemadmodum in medicamentis compositis mirum nō est; si contrarij simul affectus corporibus insigantur; ita neq; in simplicibus, cum & ipsa sensu quidem omni atq; cognitione simplicia appareat, uerum natura sint composita. Quinetiam quædam modum in ijs quæ nos componimus ac commiscemus, interim, si ita uisum est, plus adstringentis succi indimus, interim plus dulcis, aut amari, aut salis, aut acris, aut cuiuspiam alterius contrariorû, nonnuncquam uero utrosq; partibus partibus: ita quoq; naturâ in arboribus, fruticibus, animalibus, & in ipsa quoq; terra contrarios temperare succos partibus aut portionibus, aut uiribus alienum non est. Potest etiam quandoq; alterum uincementem efficere, Itaq; actiones eorum in misturis partibus similes euadent, in imparibus autem diuersæ. Nequis ergo putet, quod & supra monuimus, nihil referre; adstringentem succum dicas, an adstrictionem; Nam adstrictio una res intelligitur, adstringens uero duplex: sicut & calfaciens partim simplex & summum, ut ignis; partim per exuperantiam caloris, ut sanguis. Sic adstringens quoque aliud sum-

tom. 5 d 3 inum

num est, ut exempli causa, alumen, et melantheria, siue atramentum sulfurum, & galla, & rhus: Aliud quia adstrictiois cuiusdam esse particeps, uelut pírurum, uinum, malum, rosa: nam mínimū omīno est in rosa quā adstringit, multis numeris eo quod non est eiusmodi superante. Quapropter non abs re exigui quocq; adstrictiois effectus sunt, tanti scilicet, dum à relaxandi facultate quæ rosæ inest, corporis illi admotorū robur nō exoluat. Itaq; mirandum non est, medelam esse eam inflāmatiōnū ac potissimum dum increfcunt adhuc atq; augentur, plusq; etiā dum incipiunt.

Quod rosaceum, utpote olei rosæq; mediū ad unguē naturam obtinens, inflāmatiōnum optimum in augmento remedium sit. Cap. 16

Rosaceum uero (utpote cuius natura olei rosæq; in medio est) in inflāmatiōnum augmentis optimum est remedium. At oleum cōmodum est ubi inflāmatiōnes maxime uigent: id quod experientia docent: causam autem nos in tractationibus De medendi ratione exponemus. Porro rosaceum ut quod in medio eorū ex quibus confectum est consistit, utiq; & in medio tempore utilitatem ostendit. Nam per initia repellere comprimereq; influxus oportet: in uigore autem ita per halitum digerere, ut morsus ablit: at in incrementis repellere simul ac digerere. Id quod si quis natus, citraq; iam dictas ratiocinationes audiat, forsatis fidem non habebit. Nunc autem mirer, si quis adeo sit stupidus, ut rationi nondum acquiescat. Nam semel unoq; impetu ab adstringentibus contrahentibusq; substantiam, ad laxantia fundamentaq; transire, planē absurdum est: sicuti sanē equum est, in intermedio principij statusq; spatio, dum uidelicet morbi adhuc increfcūt, nec planē repellere sicut in principijs, nec itidem digerere sicut in uigore: sed perinde ut morbi conditio mediā est inter contraria, ita medicinam quoque mediā esse oportet, quæ uidelicet non ut in principijs adstringat, nec ut in uigore digerat. At quod medium omne ex contrarijs mistum est, ijsq; totis per tota temperatis, aut per exiguas particulas sensum effugientes eorum quibus apponuntur. Porro hoc an illo modo rosaceū mistum esse uelis, mea quidem certe nihil refert: nam utroq; modo propositum demonstrari potest. Satis aut certo scio, si ratiocinationes oēs tum quas Theophrastus memoria prodidit, tum quas nos toto hoc tractatu cōplectimur, multum animo uersaueris, te secundum missionis modū reperturum. Quin & in profundū penetrare, & corpora arenantia magis quam oleum humectare rosaceum potest: arbitrorq; subinde rosaceo te prædensas coriaceas tunicas teri uidisse: quoniam neq; oleum neq; hydrelæum (quod ex aqua & oleo mistis cōstat) eas probe mollire ac madefacere possit, quia uidelicet crassiorum sunt partium, q̄ ut penitus imbibit ac penetrare queant: rosaceo uero præter cætera quæ potest, paucula que dā inest adstrictio haud parum huic rei conferens. Nam quæ magno pere austerā acerbaq; sunt, primo statim contactu

A superficiem condensantia, humorem ingredi imbibitq; prohibent: at quæ paululum quidē adstringunt, cæterum plurimū in se continent essentiatum tenuis, tum tepidæ, tantum abest ut præ astrictione ingredi altius corpora admota prohibeantur, ut etiā ab ea, magis scilicet impellente, iuuentur. Quæ autem penitus tenuia calidatq; sunt, magis digerūt discutiantq; humores ex corporibus quibus admouentur, quam alios ipsa apponant. Porro quæ frigida sunt & crassioris essentia, omnino nullum intro ducere humorē queunt. In quibus uero humiditas inest tenuis pariter & tepida, hæc per essentia quidem tenuitatem & tepiditatē prompte mobilia, corporum quæ contingunt, meatus subire nihil prohibet. Quod uero non admouendum calfaciunt, ex eo liquet, quod existentem in illis humiditatem non digerant. Si uero præterquam quod dē sint eiusmodi, insuper exiguam adstrictionē possident, quæ tenues particulas meatum iam ingressas in profundum propellere ualeat, ipsamq; extrinsecus superficiem quadam tenus cōstringere ac condensare, ea inter omnia humecantia efficacissime humectant. Adstrictiois enim natura est, ut meatus occludere præoccupas, uicinamq; substantiam ad se contrahens, cōstipansq; ijs quæ humectare ualent, impedimento existat. At quæ adeo infirma est, ut in rosaceo, quæ ipsa uincatur potius q̄ uincat, tenues calidasq; rosæ particulas præuertere quidē nequit, sed ubi illæ altius penetrauerint, in ipsam iam tum superficiem agere incipit, pro uiribus cōstipando, contrahendo, ac condensando. Ex quo necessario sequitur, ut quæ ingredi meatus anteuertentur exigua corpuscula, intrò propellantur, ac meatibus præclusis foras regredi inhiibeantur.

Quod quæ frigiditate interrimunt deleterijs, ex mutationis celeritate uiti corrumpant euenti, ac proinde dietam requirāt caliditatem, que uelut manu in totum deducat corpus. Cap. 17

Sanè ad opera eiusmodi non medio critere confert innata corporibus nostris caliditas: quippe quæ intrò ad se attrahat, & cōminuendo extenuet. Hinc est quod & quæ natura frigida sunt medicamenta, nempe quæ deleteria nuncupantur utputa cicuta, papauer, hyoscyami semen, mandragora, & quæ eius sunt generis, citius magisq; in calidis naturis uim suam exerant, cuius & tu, tamen si unum ex ambiguum difficultiumq; problematicum numero habitū id fuerit, haud difficultiter, modo nō segniter ijs quæ dicimus aduertentis animū, solutionem inuenieris. Etenim cum sit impossibile ut talia interficiant, nisi prius cor refrigerent, sanè intrò cōminuta extenuatq; ingrediuntur necesse est. Id quod ex sua natura præstant nequeunt. Quippe quæ crassarum sunt partium, nec facile moueri possunt, nec ut minutim concidantur, profusumq; ferantur, ex sua natura obtinent: uerum ad scitiam caliditatem requirunt, que in minuta seccet, extenuet, atq; comminuat, quæq; uelut manu ducat, atq; in subtiles partium omnium meatus deducat. Itaq; si quando ea ablit, cunctantur, tardantq; in

in maioribus meatibus hærentia, et uenis atq; arte-
rijs uelut innatantia, ac tæporis spacio interim per
logos errores ac multas fæciatões ab humoribus
qui in eis sunt, uicissim nonnihil perpetuuntur. O-
stentum est enim iam sæpenumero, in sese mutuo
qualitates omnes quæpantenus agere. Nam & la-
pis ab assiduo aquæ stillicidio excauf, gladiusq;
ceram secando hebetatur. Monstratum etiam est,
actiões a solidis animantiũ partib. perfici, quare
cum hæc nondum a refrigerantibus medicamen-
tis refrixerint, animans superflue necesse est. Porro
refrigerari nequeunt prius q̄ illa in proprios illo-
rum meatus subierint; atqui ex sua id natura cras-
sioribus frigidisq; medicamentis datũ non est, nisi
succurrat quod uelut deducit. Deducit porro ut
causa primaria, arteriarum attractio (ostendimus
enim ipsas inter dilatandum uicinum omne attra-
here) ut secundaria uero & materialis, essentia: ne-
uitas: quam cum ex natura sua non obtineant fit
gidiora crassiorumq; partiũ medicamenta, ijs uti-
que opus habent quæ præbeant. Corpora itaque
quæcumq; temperatura sunt frigidioris, ea arteria-
rum tractũ imbecilliores possident (id quod etiã
demonstratum est) atq; in minutas particulas me-
dicamentorum substantiam redigere nequeunt.
Proinde medicamentum & ipsum cunctando tar-
dandoq; temporis spacio aliquid perpetuatur par-
est. Itaq; interim accidit ut concoquatur, uelut la-
ctuca succus. Nam & is tempore cõcoquitur. At
si integer ad cor pergere properaret, non secus at
que cicuta hominem interficeret; euenit autem id
ipsum alijs quoq; omnibus admodum refrigeran-
tibus succis. Nã nisi celeriter interimere possint,
sanè ex hoc omnino nullius effectus redduntur. At
quæ aut erosione aut putredine enecat, ijs ut tem-
pore inualefcente accidit. Siquidem temporis spa-
tio putrescunt omnia, eoq; magis quo fuerit humi-
dior calidiorq; locus. Merito ergo sit, ut quæ frigo-
re suo noxam inferunt, ijs actiões celeritas ad per-
niciem proficiat; quippe quæ alioqui spatio exca-
facta, uim per quã agebant, deperdant. At quibus
actio cõsistit in putredine, ijs tempus actiõnẽ ad-
auget, quoniam scilicet & putredinẽ. Nec enim a-
nimale ullũ interire potest, quin cor ab agendi mu-
nere cesset; fieri porro ut cesset nequit citra maxi-
mam intemperiem. Siquidem non simpliciter q̄
par est aut calidius, aut frigidius, moueri desinet.
Eodem modo si modice siccum aut humidũ eua-
dat; minus enim suo fungetur ob hæc quidẽ in-
temperies munere, cæterũ motu nõ uacabit prius
quã immẽsam aut caliditatem aut frigiditatem,
aut reliquarũ qualitatũ aliquã acceperit. Porro
medicamentis quæ frigore occidunt, ubi ad cor
pergere cunctant, simile quid accidit, quod lignis
humidis uiridibus frequenter euenit. Hęc siquidẽ
si multa aceruatim in ignem cõiiciantur, eum ce-
lerime extinguunt; sin undiq; in orbem com-
posita prius siccantur, ac incalescunt, & deinde sen-
sim iniiciantur, tantũ abest ut extinguant, ut etiam
alimento illi efficiantur. Sic hominem quidem ci-
cuta necat tum ob meatuum amplitudinem, calo-

risq; multitudinem, tũ ob attractiões arteriarum
robur ualidum etiamnum ad cor pertingens. Stur-
nos uero ob causas contrarias haud enecat, ut pu-
ta cum & retineatur & cunctetur, ac sese tempo-
ris tractũ concoqui præparariq; a corde tanquam
a foco incalescens sinat, non secus ac ligna extrin-
secus. Quare nec id quidem mirum dubiumq; pre-
linquitur, sed est quale lactucis accidit, quippe
quæ moderato esu hominem nutriant. At si quis-
piam expressum earum succum largiter hauserit,
non secus profecto morietur, quã qui aut cicu-
tam, aut papauer sumpserint. Sic lactuca si cor re-
frigerauerit, interimat; sin concoquatur, alimen-
tum animalĩ efficitur. Ad eundẽ arbitror modum
cicuta hominem quidem celeritate distributionis
interficit, sturnos uero tarditate ipsa nutrit. Si ue-
ro exiguum quiddam sumatur, mortẽ homini ne-
quaquam inferet. Id quod anus Atheniensis expe-
rimẽto docuit, cuius apud omnes percelebris me-
morã est; Etenim ea ab exigua cicuta portione
auspicata, nullo detrimento ad permagnam pro-
gressa est copiam; principio enim paucum exigui-
tate ipsa deuictũ est: ut consuetudo naturale re-
didit. Nec enim nũc locus est, ut cur plurimũ pos-
sit cõsuetudo, curq; uelut altera ac adsciticia natu-
ra sit, uti à ueteribus proditum est, causam reddã.
Nam ita maius euaderet operis accessoriũ, quã
ipsum opus, ut omittam quod separatim de hoc
tractauimus. Verum connectendus est perficien-
dusq; præsens moro.

*Quod medicamentorum que frigiditate sua interimunt,
nullum proptus genere letale sit, ac delecte-
rim, sed sola quantitate. Cap. 18*

Eorum ergo medicaminum quæ frigore interi-
munt nullum genere letale est, sed sola quãtitate.
At in erodentibus, putrescentibus atq; excalfa-
cientib. haud ita se res habet; sed de his paulo post
dicetur. Quæcumq; autem frigiditate occidunt, eã
exigua quantitate sumpta mortem non adferent,
non magis quã si pro cõpõe flãmæ paxillũ aquæ
instilles, aut lignũ iniicias humidũ ac uiride. Quẽ-
admodũ itaq; nisi calorem habeant abundantem,
quittum cõminuat, tum ad cor usq; perducatur, in-
terficere nõ poterit; sic si quod cõminuat ac dedu-
cit, multo ualẽtius fuerit, prorsum deuincet, muta-
bitq;, ac alimento ut sibi sit medicamentũ, efficiet.

*Quod medicamenta que natura sunt frigida, iure à ueteribus
potestate frigida appellentur. Cap. 19*

Quamobrem eius quoq; nunc proptinus memi-
nisse oportet, ueteres medicamenta natura frigida,
potestate dixisse frigida. Nã ea quoq; quadan-
tenus refrigerandi potentiam à nobis accipiunt,
sicut ex calfaciendi calida. Quod si alio modo illa
alio uero ista, nihil utiq; refert; generale em̄ idem
communesq; utriq; est, nempe alterationis prin-
cipiũ ex passuro corpore in acturũ medicamentum
procedens. Nam quæ potestate quidem sunt cali-
da, alterantur eo dumtaxat, quod incalescant à no-
bis; at quæ natura frigida, tũ quod comminuantur,
tum q̄ adscititiũ accipiãt motum. Cum itaq; ipsi
tanquã frigida agere absq; corporis patietis auxi-

lio non licet, iure potestate frigida dicuntur. Nam ut actus nos refrigerent, non prorsum ex sese obtinent, uerum à nobis prius perpetuantur ut refrigerent oportet. Etenim in minuta conteri, & aduentitium motum accipere, affectus sunt medicaminum. Attamen sicuti libeat ea actu frigida nominare, haud equidem repugnè, modo omnis in uerbo diffusio sit, res aut utriusque confessa. Siquidem (quod paulo supra monuimus) id genus omnia calidum corpus quo agere possint postulant. Ea propter meconium, hoc est succus papaueris, & cicuta, si uino mista bibantur, ocyus necat, licet non quouis temperata modo. Si enim ipsa paucissima plurimo uino miscantur, prorsum deuinci possit. Si uero paulo multa, deducuntur quidem ad cor, uinci autem nequeunt. Si quis uero papaueris succum quantus interficere potest, hauserit, ac etiamnum tamen superstit, recta ratione et hunc quoque sanabit large epotum uinum uetus, magisque etiam si generosum fuerit: nam id quoque magis calefacit. Quod uero cononduum admodum refrixerit, liquet quandoquidem adhuc homo uiuit. Tunc autem digestionis in corpus tarditate quadantenus mutatum iam à corpore esse medicamentum, sicuti lignum uiride ubi proxime igne aliquandiu iacuerit: nec id quidem obscurum est. Calidum itaque id temporis uinum ebibitum presentissimum est remedium, nosque etiam quandam extreme iam refrigeratum uini lesbij potionem serua uimus: potestque idem salernum, surrentinum, arisium, timolites austerum, ac quotquot calida simul exquilitate uino facta fuerint uina, eundem cum lesbio praestare ualent effectum. In summa quod tenui perliquidatque substantia est, colore uermiculo aut flauo, odore gratum, quodque multam aquam misturam exposcit, id tum admodum exalfacere est natum, tum facile undique per corpus uniuersum deferri. Tale ergo natura uinum, etate uetus, meracius mistum, eos etiam qui refrigerati iam sunt persanat, nec solum à papaueris succo, aut alio quopiam refrigerantium medicaminum, uerum etiam qui in morbis aut ex stomachi, aut ex cordis dolore animi patiuntur deliquitum. At quod cum refrigerantibus medicamentis, quod celeriore morte afferant, bibitur, id nec multum est, nec generosum, sed quod comminere ea, ac distributionis sui impetu in corpore perducendo modo ualeat. Atque de his quidem haec sufficiant.

De actione medicamentorum, quae putrefactione & erosione nos necant. Cap. 20

Quoniam autem de ijs etiam medicamentis, quae erosionem ac putredinem interimere sunt nata, dicturum me, quod tempore perniciosiora reddantur, & ipso genere naturam nostram corrumpere possunt, non modo multitudinem, uelut refrigerantia, sum pollicitus: tempus nunc est promissis satisfacere. Coniuncta est enim quadamtenus quae de his habetur oratio, ijs quae de medicamentis potestate calidis dicuntur. Verisimile siquidem est plerumque eorum etiam actu esse calida, sed idcirco nos fugere, quonia aut ipsi plurimum habeamus caloris, aut crassa eorum essentia sit. Redigamus enim eadem rursum in memoriam, nempe quod in bal-

neo frigida uideatur urina: itidemque memoria repetamus, quod cum in solium calidum descendere non ualeremus, aliud prius minus calidum ingressi, nullo negotio quod antea intolerandum uidebatur, postea pertulerimus. Quin & aqua fontium tempore hyberno quibus manus algent, pida apparet, cum alijs minime uideatur eiusmodi. In summa enim (id quod antea quoque diximus) pro suo unum quodque affectu corpora admodum sentire consuevit. Sic ergo si manus habens frigidam, eam in tritici acrum immeris, luculenter calorem percipies: in calidam, nequaquam. At si stercore columbino accumulato, potissimum syluestrium columbarum, manum inferas, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misery, sory, chalcitis, arugo, calx, aliaque id genus innumera, si illis acruatis manum altius iniicias, protinus uidebuntur esse calida. Caterum si bolum ex eis unum acceperis, cuius extrinseca superficies ab ambiente extrinsecus aere sit refrigerata, merito nullum percipies calorem: quippe qui refrigeratas tantum eius partes contingas, idque antequam in minutas redacta sint. Ad eundem modum hyme saepenumero tum putealis, tum magis fontalis, calida tangentibus esse uisa: uerum si quis calfacis prius manibus contigerit, frigida uidebitur: memorari que sanè possint alia id genus infinita, quibus facile adduci quibus possit, ut credat medicamenta potestate ut ad nos calida, alteri animantium generi actu esse calida.

Quod recte quae erodendo putrefaciendoque, interimunt medicamenta, genere, non qualitate deleteria sunt dicta: & quod quanto in corpore morantur diutius, tanto & magis agere sunt nata. Cap. 21

Atque haec quidem obiter dicta sunt. Ceterum quae nos contactu aut per putredinem, aut per erosionem interficiunt (nam de his habebatur oratio) ea recte quidem ratione humanae naturae deleteria toto genere existimata sunt, non ut frige facientia, dumtaxat quantitate: haec enim interdum uincuntur, & nutrimentum animalis redduntur: putrefacientia autem etiam si quantitate minima sumantur, omnino tamen corrumpunt, quia uidelicet quae putredini obnoxia sunt, calore humiditateque putrescere solent. Atqui calidus humidusque sanguis est. Itaque putrescere nunquam cessare possunt, simulque uicissim putrefacere, quae *συνερωσώδην* à putrefactione uocantur medicamina. Proinde longo etiam post tempore à quo sumpta sunt, nonnulla interimunt, potissimum quae crassa, terrenaque essentia sunt. Haec enim corporibus nostris inhaerentia insidentiaque dein temporis spatio putrefactia erodunt corrumpuntque uicinas corporis partes.

Qua causa putrefacientia medicamina, licet genere letalia sint, non tamen perpetuo occidunt. Cap. 22

At quae tenuiora sunt, etiam excerni interim cum excrementis possint: fereque accidit, ut duas ob causas istas quandoque medicamenta putredine erosioneue necantia non interficiant: unam uidelicet, quam modo admodum dicere desij: nempe cum

una cum excrementis excernuntur priusquam iniuria corpus afficiant: alteram, si cui accipienti bona faueat fortuna, videlicet aut cibus, aut que alio qui conferunt, utenti; aut medicum qui curando præstet, nactus. Nam ubi grauis ab ijs noxa illata est, malum neque uictus ratione, neque generosorum medicaminum, medicorum auxiliantis ope sisti potest. Quod si prorsum exile sit deleterium, nihil repugnat quod minus illud quoque nihil perficiat, propterea quod cum excrementis excerni possit, aut idonea uictus ratione superari: ut puta si cantharidis sit ceterisima drachmæ particula: nam id priusquam noxa animali inferat, una cum urinis excernatur. Sanè cætharides urinæ cientibus medicinis miscetur, sicut pleraque alia letalia alexipharmacis, hoc est amuletis. Atque id genus medicamenta composita si apte temperata fuerint, omnino efficacissima sunt; quoniam admodum quod ex cantharide conficitur, urinæ mouendæ accommodum est. Ferunt enim alioqui sponte sua cantharides per urinam ad uesciam, atque sic rodendo eam exulcerant; uerum ubi paucum ex illis multis miscetur bonis atque utilibus, illa quidem uelut manu ducunt, rodere tamen nequeunt. Opus est enim ut quicquid agat, etiam si sit ualentissimum, aliquantulum tamen & magnitudinem habeat: quando nimirum & igitur ipse si prorsum minimus sit, præterquam quod non uret, ne calciescit quidem: quippe cum & centesima scintilla portiuuncula sensu à nobis sit imperceptibilis. Ex quibus patet, quæcumque frigiditate interierint, si paucula sumantur, nutrire corpus posse, uelut lactucæ succum: at quæ putrefaciendo erodendoque, ea nunquam nutrire, ne si præparitate quidem innoxie corpus permeent: genere namque talia humanæ aduersantur nature.

Quod in medicamentis, dissimilari substantiæ reperiatur misurata: prouide ubi sine suo purgatiua frustratur, interim quidem extreme læduntur, interim nequaquam, quippe ubi deletæria in se uim permixta obtinet, ad corruptendum conuertuntur. Si uero uim non habeant deletæria, concoquuntur, talemque generat succum, qualem trahere nata erant. Cap. 23

Quemadmodum in saporibus ante monuimus, nullum proprie eorum alienæ esse qualitatis expectem, uerum siue in arboribus, siue in herbis, siue in fructibus mistos semper alterius generis esse saporibus: ita in medicamentis intelligere oportet, multas diuersi generis misas esse substantias; id quod inuenias, si consideres granum cnicidum hoc à cnicico differre, quod plurimum habeat caliditatis. Nam similitudinem utriusque substantiæ tactu uisumque cognoscere liceat: præterque ea tertium esse, quod ambo pituitam detrahât. Ostensum est siquidem nobis in commentarijs De naturalibus facultatibus, quod qualitates quæ in substantijs sunt proprietatibus attractiones perficiantur. Attamen grano cnicico multum permixtum caloris est, quare à cnicico distat. Idcirco purgantium medicamentorum, ubi forte purgatione frustratur, quedam extra quæ quod noxam corpori nullam afferunt, etiam alimentum homini præbent: alia uero in corruptionem, ac tanquam in uenenum uertuntur. prorsum enim medicamentum

A expurgans uel cum uno saltem humorum, qui in corpore sunt nostro, similitudine obtinet, non autem perpetuo permixta est uis uenenoosa: quam ob rem nec perpetuo licet non purget, iniuria afficiet, uerum concoctionem accipiet, talemque producet humorem, qualem trahere natum erat.

Quamobrem, cum qualitatum proprietate attractiones perficiantur, purgantia medicamenta quidem perpetuo humores attrahant familiares, nec tamen unquam à familiaribus attrahantur: An quod efficaciora sunt purgantia medicamina sic ut attrahere potius quam attrahi sint idonea? Cap. 24

Non autem me fugit, qui in naturalium facultatum commentarijs exercitatus ante non sit, hæc rationationes non satis consequi posse. Demonstrationem enim ibi est, pleraque perfici attractiones qualitarum familiaritate: proinde quancumque singillatim animantis particulam familiare sibi nutrimentum attrahere. Ad quam sententiam seu dogma sequitur medicamenta purgantia esse quidem detrahendis humoribus familiaria, uerum quæ attrahunt, quodammodo esse efficaciora ualentioraque, sicut magnes lapis ferro: quippe qui ad ferri naturam accedat, inque ferri metallis reperitur, eius magnopere speciem ferri similis sit, uerum fortior est quodammodo, ut attrahere sit aptior, quam attrahit. Quin nec cnicicum quoque à pituitæ natura alienum esse diffidendum est, uti colore suo præ se fert: sed tamen calore ipso quam pituita ualentius est, ut trahere quam trahi magis par sit. Ad eundem modum granum cnicidum siquidem forte à corpore nostro uincatur (id quod assidue cnicico usuuenit, rarus autem grano cnicido, nimirum ob robur) uicè purgationis alimentum efficitur: uelut ueratrum semper cotinucibus. Volo autem (quando quidem in hunc sermone descendimus) logici cuiuspiam meminisse theorematum, quod et in commentarijs De demonstratione monstrauimus, cæterum in rem præsentem haud inutiles. Est autem theorema eiusmodi. Demonstrationum aliquid quod ex necessitate hoc illi inesse concludunt. Aliquod in esse possibile est. Harum ipsarum quedam in id quod ex necessitate inesse reuertuntur, quando uel delictet ex necessarijs consequuntur principijs, uelut in hoc ipso quod modo monstrauimus. Siquidem in grano & cnicico pituitosum inesse succum euidenter monstrare non est: tamen posse esse, ac probabile uerisimileque esse, ratione colligitur. Sed quia attractiones substantiarum fieri similitudine ostendimus (demonstrationem enim subinde est, in purgationibus attractionem esse eorum quæ purgantibus medicamentis similia sunt, haud uero omnium simul succorum alterationem) similitudinem inesse quandam utrisque substantijs, & eius uidelicet quod purgat, & eius quod purgatur, necesse est. Porro cum quod purgat, pituita est: quod trahit, pituitosum sit oportet. Pituitosum autem esse oportet quod trahit diximus, non autem plane pituita. Etenim similitudinem inesse substantijs diximus, non identitatem. contrarium enim cernimus. Nam neque ferrum attrahit ferrum, neque caro carnem, sed lapis

fideritis ferrum, caro sanguinem. Differunt enim, mea quidem sententia, idem & simile. Quippe pituita pituita eadem est, & cnicū cnicō, similis autem pituita cnicus, non tamen idem. Neque enim quaecumque aut biliosa aut pituitosa dicimus, perinde tanquam bilem aut pituitam continere sic nuncupamus. Huius enim opinionis absurditatem de tartarijs, tum multis alibi locis.

Quod in purgantibus medicinis duplex insit similitudo, nempe quaedam actus, & quaedam potentia. Cap. 25

Quapropter prætereūda sunt omnia huiusmodi. Illud uero rursus repetendum est, quod purgantium medicaminū quaedam tam etiam possident idoneam ad attractionem similitudinē: quaedam non perfecte quidem eam obtinent, uerum in animantis corpore accipiunt, non secus atque uentria medicamenta, quæ caustica Græci uocant. Itaque duplex quoque in his similitudo est, una actus, altera potentia, uelut & in alijs omnibus. Quin & permixti sunt similibus in unoquoque succis, alij dissimiles, qui partim quidem medicaminosi sunt, partim nō. Quare ubi purgationem haud assequunt, quaedam purgantium malum corporibus nostris inferunt, quaedam uero alimentum exhibent.

De superpurgationibus, quas τῶν ὑπερκαθάρσεων Græci uocant. Cap. 26

Porrò quoniam semel sermonem de purgantibus medicamentis attigimus, præstiterit fortassis non nihil quoque dicere de nimis purgationibus, quas τῶν ὑπερκαθάρσεων Græci uocāt, quasi superpurgationes dicas. Euenire igitur eas solent, cum purgans medicamen usque adeo inualuit, ut in uasorum ad uentrem pertinentiū osculis mordicationem apertionemque multam relinquat; alsidueque irritans conuellensque corpora, quæ in uasis sunt uires dissoluat atque deiciat. Nam quod in uentre euenire conspicimus, ubi uires eius in extremam inciderunt infirmitatē, idem in uenis accidere putandum. Quid porrò est quod in uentre euenit? uomitus totius eius quod deglutit, ubi uidelicet superiores eius partes debilitas occupat; intestinorum uero leuitas, ubi inferiores. Ostensum est autē & de hisce latius in tractatu De uacuandorum causis. Huiusmodi affectū existere in uenis existimandū est in superpurgationibus. Cum autē per inītia modica etiam nū sit & apertio, & imbecillitas, tum & quod tenuissimū est, minimūque naturæ familiare, excernit: sed ubi utraque adaucta est, tum etiam crassa, & quæ nature familiaribus sunt, euacuantur: quamobrem flaua bilis primo, pituita secundo loco, tertio loco atra bilis, post hæc postremum omnium in superpurgationibus effundi-

tur sanguis, utpote qui naturæ succus sit familiarissimus. Ante hūc uero primus quidē qui tenuissimus, postremus qui crassissimus. Disseruit autē & Hippocrates in opusculo quod de natura humana inscribitur, de ordine qui in istis euacuandis seruari solet, ac nunc quoque ne quid huic sermoni desit, dicendum est. Etenim si quod pituitam ducat medicamentū exhibeas, prima quidem in superpurgationibus flaua, mox atra, tertio loco sanguis eijctur. At si quod flauam bilem detrahat, pituita consequetur, tum atra, quartus demū red-detur sanguis. Quin & si atram bilem purgare sit natum, eam quidem primā euacuabit: post quā flauam, deinde pituitam: omniumque postremus sequetur sanguis, tanquam ex inanissimam uasculis effluens, ut quæ summa iam debilitas occupet, quæque ad extremam osculorum apertionem peruenerint. Ex quibus manifestum est, postremū in superpurgationibus uacuari humorē, qui idem & familiarissimus est: aliorum autem unumquodque prout aut crassus est, aut tenuis.

Quæ causa in superpurgationibus humores minime purganti medicamento familiares itidem euacuatur: nempe propter uasorum infirmitatem, propter osculorum laxitatem, propter purgantis mordacitatem. Cap. 27

Cæterum causæ quamobrem omnino et qui alieni sunt à purgante medicamento succi, unā excernantur, in hisce tribus consistunt, uasculorum scilicet imbecillitate, osculorum laxitate, & purgantibus mordicatione. Cum enim uascula nō amplius in sese continere succos possunt, & oscula eorum reclusa fuerint, nec irritare medicamentum desinat, possitque non amplius familiarem trahere succum, necesse omnino est reliquos quoque quod diximus ordine excerni. Satis enim erat unica mordicatio, quæ organa ad excretionē excitare posset: quanto ergo magis id fiet, ubi et apertio, & imbecillitas uasorum coherit: sit autem ut supra diximus, apertio ob medicamenti potentia: ob quam uidelicet mordicatio item prouenit. Vasorum autem imbecillitas, tum ob ingentem defatigationem (quam scilicet dum à purgante medicamento mordicantur, ac ueluti emulgerentur, acquisierāt) tum ob intemperantiam, quæ in superpurgationibus occupat. Quenuncque enim humorum penitus euacuaueris, intemperantia consequatur necesse est. Itaque quod à purgante & alieni quoque uacuentur succi, eas habeto causas: porrò quod supra dicto ordine, uacuandorum humorū tum tenuitas, tum crassitudo in causa est, & adhæc prout magis & minus animantium constitutioni succus quilibet familiaris est.

ARGUMENTA

Proxiū in quo deinceps dicēda proponit. Cap. 1. Quomodo frigidum corporibus nostris mordax appareat, & qua differat ab ijs quæ caliditate mordicat, nempe quod continuum diuellat: Cuius rei causa est quiddam & tenues humores compressu exprimentur, & uacua spacia relinquatur, & mollis substantia in arctiorem locum contrahatur. At calidum, quia substantiæ cōnu-

LIBRI QVARTI

tatem erodat. 2. Quæ uocemus tenuium partium, & quæ crassarū. 3. Quomodo excerci oporteat in agnoscenda cuiusque saporum facultate. 4. Quod pharmacorum emplastica uocata, cum media sint in caliditate ac frigiditate, terrestria quoque esse, ac sine mordicatione siccare oporteat. 5. Quod duplex est emplasticomum medicaminum natura. Nam partim terrena sunt, atque

exacte sicca: partim planè viscosa ac lèta, sed misa aqua terraq; atq; ut plurimum etià aere: Communiter vero omnia mordicatione uacant. 6. Quòd astringentia medicamenta acidatq; licet utraq; qualitate sint frigida: in de tamen diuersa sunt, q; astringentia terrèna sine crassiq; essentia: acida uero tenuis. 7. Quòd per acerbis saporis exolutionem nascatur & auferat sapor, & acidus, ac dulcis, ac pinguis. Solutur autem acerbis sapor, cum frigidus sit ac terrensus, aut ex calcificatione, aut humectatione, aut simul utraq;. 8. Quòd amara ab immodico nascantur calore, & immodice sint calida: Dulcia uero omnia sint calida miti caliditate, quæ non supra modum nostram exuperet caliditatem. 9. Quòd pinguis, atq; adeo quæcunq; nutriunt, ex dulcibus sint generata. 10. Quòd amara dulcitatq; partim adscitio calore sunt, partim proprio & ingenio. 11. Quòd & acidi succi ex frigore proueniunt. 12. Vnde arbitrari sunt quidã ac sapore acidum prouenire saporè: Ex eo quoddam nequaquã fortis, utre & itaq; inueniuntur: 13. Quæ de causa ab extremo calore uinum natura frigidum infirmumq; corruptur. Quia scilicet res quælibet in propria natura proprio feruatur calore: corruptur uero ab extrinseca immoderatione atque extinguuntur. 14. Quod in saporib; aciditas prouenit, calore ipsos

A quidem incipiente concoquere: non autem perfectamurationem atq; alterationem asserere potènt. 15. Quæ de causa quæ igni admoventur, alia suauiora, alia insuuiora efficiantur. Et quæ de causa edulia quædã, cum per se ledi non possint, suauitatem tamen his præbent, quæ per ipsa præparantur. 16. Quæ de causa mel à caliditate ualidiorè amaritudinem contrahit: lac uero frequenter etiam dulcius efficitur, quum tamen utraq; gustu sint dulcia. An quia mel cum summè sit dulce, nec quicquam addi possit ad dulcedinem, in cõsequenter recidit qualitatè: lac uero minus dulce cum sit, quod reliquum est à calore accipit. 17. Quòd sapores acres omnium sunt calidissimi. 18. Quæ differunt amarus acrisq; sapor: Quòd amarus præterq; quod calidus sit, etiam est siccus: ac acris, utiq; qui non exaltus est, uberem quandam humiditatè obtinet. 19. Quòd sapor amarus in sit corporibus temperamento siccis: & si planè amarus sit, effluens non sit. 20. Quòd sapor salis calidus sit atq; terrestis, eaq; ratio quædam tenus saporis amaro similis. 21. Quòd odorata omnia calida. 22. Quod nec ex odore, nec ex calcificatione cerro quid definitur de medicaminum temperie possit.

GALENI DE SIMPLICIUM MEDICAMENTORVM FACVL TATIBVS, Liber Quartus.

P R O O E M I V M:



Vò pacto igitur dicat frigidũ, calidum, humidũ, siccumq; facultate medicamentũ: tum quæ ratione id explorare oporteat, supra definitum est. Porro quoniam nonnulla emollientia dicuntur, relaxantia, rareficiẽtia, condensantia, emplastica, ac digerentia, multaq; his similia alia, præstiterit & de his differere: unã uero cum istis, aut etiam ante ea, de saporũ omnium & essentia, & facultate, de qua & in fine primi horum cõmentariorum uerba fecimus, quando scilicet Platonis ex Timæo dictionem adscripsimus.

Verum ibi quidem gratia passionũ sensibilium, quas lingua in quoq; eorũ perpeti est nata: at hic de essentia & facultate sermo habebitur: quandoquidem & aliæ animãtis partes similiter ut lingua perpetuntur, sed passionũ sensum nõ exactè percipiunt. At lingua præterq; quod perpesiatur, sensus etiam perfectionem possidens, eorum omnium naturas dignoscere potest. Nec enim hoc dicendum est, calidum, frigidum, humidũ, siccumq; linguam calcifacere, refrigerare, siccare, aut humectare posse, aliarum uero quamuis non posse, imò uti hanc, ita & alias omnes singula afficiunt & alterant, tantum diuersitate in ipsis existentis pro minoris maiorisq; ratio: haudquaquã in ipso, ut sic dicam, affici, aut non affici. Quippe quod lingua non ferus atq; alia quæuis animantis partium, calidum, frigidum, siccum, humidumq; dignoscere corpus ualeat, cuius clarum est: amaritatem uero, dulcedinem, salinitatem, aciditatem, auferitatem, acerbicatem, acrimoniam hæc sola discernere creditur:

tametsi passionum similitudinè inuenire est cuius in alijs partibus omnibus tum in ulceratis. Nam cutis duntaxat densitas que excludit, resistit, prohibetq; quò minus foris incidentium facultates intro in carnem ipsam penetrent.

C Quoniam modo frigidum corporibus nostris mordax apparet, & qui differat ab ijs que caliditate mordicant: nempe quid continum diuclat: cuius rei causi est, quod tenues humoris compressi exprimantur, & necum spatis relinquuntur, & molis substantiis in arctiorem locum contrahantur, quia substantia continuentem erodit. Cap. 1

Sic enim & illud ab Hippocrate dictũ est: VLceribus frigidum mordax, tãcti cuti priusquam ulceraretur, mordax nequaquã esset. Est uero & oculis, & naribus, & ori externis partibus animalis, frigidum mordax, nec minus internis, uetris, & intestinis, ut difficile sit nonnunquam discernere, an à frigore quis, an ab humorũ mordicetur acrimonia. Inueniunt autem hæc nõ abs re. Siquidem cum frigidum quæcunq; contingit, eorum & contrahat substantiam & condenset cõstringatq;, primum tenues tum excernant humiditates necesse est, sicut ex oculis lachryma, ex naribus mucus: postea uero etiã mordax appareat, licet alia ratione quam in calido. Nec em erodendo quod continuum est, sed diuellendo, molestum ac mordax est frigidum. Quare nec duris corporibus tale apparet. Nam dum mollia contrahuntur cõprimuntq; humidum exprimi cõtingit, simulq; partes diuellit: humidum quidem, sicut in spongia à manibus nostris contracta compressaq; diuellit autem, sicut in ijs quæ distrahuntur diuelluntq;, siue à nostris

noſtris manibus, ſive aliūde. Tale quid rara molliāq; corpora à frigido perpetiantur neceſſe eſt, raritate frigus prompte intrò recipiente, multoq; e-ritate promptius partibus in ea mollibus, quæ in profundo ſunt, à frigore concreſcentibus. Frigidum itaque ſpiramēta nunctā in raris corporibus ſubiēs, qualia ſunt uulnera omnia, oculiq;, & nares, ac os, uenterq;, omnes refrigerandorum corporum partes circumquaq; amplectitur, & quodammodo multis circumquaq; anſis eas contrahens atq; cōdenſans, à cōtinuitate auellit. Quæ dum patiūtur, multa fieri ſpatia inania neceſſe eſt; non tantum quia tenues exprimantur humiditates; uerum etiam quia ſubſtātia mollis in arctum contrahatur. Atqui ſpatium inane in ſibi continuis corporibus, ſeruata etiā nūc cōtinuitate, fieri non poteſt. Ergo ſi fieri id conſtat, clarum eſt illam deperdi, ac corpus continuum diſtrahi, ex quo moleſta mordaxq; ſenſus exoritur affectio. Tameſi non eadē utriuſq; qualitas eſt, tum ijs quæ frigore mordicāt, tum ijs quæ calore; ſed in illis prōtinus & cōtractionisq; condensationisq; ſenſus percipitur, in his diſſolutionis & fuſionis. Quin nec par eſt utriuſq; affectus celeritas, uerum in refrigerātibus quodammodo tardior, & cunctantior eſt mordacitas, at in excaſciantibus celerem penetrat. Quando igitur abunde definitum eſt tum ipſa rerum natura, tum etiā qui in nobis ſit ſenſus; clareq; expoſitū eſt, quo pacto calidum, quoq; frigidum mordax appareat, colligere quæq; apud ſe ſe nūc oportet uel antequā à nobis id audiat, mordacitium medicaminum alia calida facultate, alia frigida, neceſſario eſſe; à nobis autem diſtinctiones eorum exacte addiſcere licebit, ubi prius commone fecerimus, poculum & balneum cum temperata ſunt, calida à nobis dici nonnunq; appellationis abuſus; quandoquidem eucrata ſiue temperata dici debebant, ac ſymmetra potius quā calida. Ergo quæ ſic calida ſunt, grata amicaq; ſunt; funditur enim quod in corporibus noſtris conſtitit, atq; concretū fuerat; quo maxime affectu uoluptas animātibus cōſtat. At ſi moram etiam trahant, ſenſim quoq; & ipſa moleſta euadunt. Ad tantam enim fuſionis immoderationē ſic recidunt, ut ſubſtantiam noſtram etiam digerant, diſſoluant, atq; diſpergant. Verū nec ſic quidē mordicatione inſiſtant, ſed animi aſſerunt deliquiū, uiresq; deſcitiūt, ut mors quoq; tandem ſequatur. At quæ his magis ſunt calida, ſecant, diſtrahunt diuiduntq; ſubſtantiam; quare neceſſario mordacia uidentur, uelut aqua feruēs, ac ipſe ignis. Eundem in modum frigida quæ contrahunt, nondum tamen contacti corporis cōtinuitatem diuellunt, frigida duntaxat ſunt, haud etiā mordacia. At quæ ſupra quā, quod cōtrahunt, etiam cōuellunt, ea utiq; omnia uiolenta condensatione uſitū, quocirca & mordacia apparent. Igitur ſubiectam materiam cōtrahere & condenſare, frigidi ſemper proprium eſt; fundere autē atq; liquare, calidi; utriuſq; uero immoderatiuſ aucti, cōmunis eſt mordicatio. Eteim quæ ſumme frigida calidaq; fuerint, præter omēs

alias, quas modo memorabam, raras mollesq; partes, cutem etiam noſtram inuadunt. Memini & me quandoq; per niuem iter feciſſe tam altam & copioſam, ut nulla terræ pars nuda conſpiceret: Aer exactiſſime purus erat, ſpirabatq; à niue quidam uentus adeo frigidus, ut non oculis modo & naribus, & totam adeo faciem mordicaret, uerum etiā ſiquis forte manum protuliſſet, ſimiliter illam afficeret. At quæ à ſumma frigiditate, aut caliditate abſunt, cutē non mordicant. Frigida quidem, quoniam cōtinuitatem eius ob duriētē diſtrahere nequeant, nec in profundum ſubſtre præ ſuperficiē denſitate ualeant. Calida autē, tum quod non erodant, ſed duntaxat fundant, tum quod interdum meatus prompte penetrent. Plurimū autem ad id genus paſſiones facit eſſentia medicamentorum uel tenuitas, uel craſſitudo. Siquidem frigida quæ tenuium partium ſunt, cum magis in profundum tranſeant, uehementius etiā proinde mordicant. Calida uero quæ craſſarum ſunt partium, quoniam plus ulcerant, uiolentiſſe idcirco etiam affligunt. Tenuiorum itaq; partium aer eſt, craſſiorum terra, medium eorum tenet aqua. Sed aer accenſus ſit flamma, terra autem pruna: At aqua uehementem ſanē caliditatē accipit, ſed nec flamma, nec pruna propter innatam humiditatē efficitur. Siquidem flamma & pruna, ignis ſunt genera: Ignis autem omnis calidus eſt & ſiccus: At aqua ſicca ut ſit, fieri nequit, proindeq; ipſius ignis exacte qualitatē ſicut aer & terra non accipit. Nullum eſt itaq; æque calidum pharmaciū, ut aut flamma, aut pruna, aut feruēs aqua, imò ut ſit uel calidiſſimū, omnino tamen pluſimum ab illis uincitur. Procedit autem ad uſionem uſq; medicamentorum caliditas, ubi uidelicet in craſſa cōſiſtit eſſentia. Quæ uero ſubtilium partium ſunt calida, nonnunquam omnino non mordicant, ſed caſcaciūt duntaxat. Eſt autem ubi & mordicent, non tamen urant.

Quæ uocemus tenuium partium & quæ craſſarū. Cap. 2

Sed quid tenuium partium, quid uel craſſarum eſſe intelligamus, cōmemorare oportet. Nempe quæ celeriter in tenuia ſoluuntur, tenuium appellantur partium. At quæ id perpeti nequeūt, craſſarum. Quòd ergo ea ſoluuntur, calor qui eſt in animantis corpore, cui unū quodq; applicari cōtingit, in cauſa eſt. Quod autem in tenues craſſas uel partes comminuantur, id à ſua ipſorum natura obſtinet. Quocirca refrigerantiū medicaminum ea quæ craſſarum ſunt partium, mordicare nequeunt, utpote quæ extimam cutis ſuperficiem penetrare non ualeant. At quæ tenuia ſunt partium, & perfacile penetrare poſſunt, & in profundum ſubeuntia molles animātis partes mordicant. Mordicant etiā magis quæ cum tenuia ſint partium, inſuper inæquabilem obtinent temperiem. Sed ſupra demonſtratum eſt, inæquabilia eſſe, prope modū omnia. Quippe aut impoſſibile eſt, aut perdifficile, ullam inuenire ſubſtantiam quæ adamuſſim ſimilariū ſit partium. Vinum nāq; diximus unū quidem habere in ſe recementū craſſarū partium; unde dum temporis ſpatio ſecernitur, ferturq; deorſum, ſæx con-

sistit: aliud uero secundū quod florem nuncupat, quod dum uinum feruet supernatat, sed postea ad faeces subfidit: tertium, aqueum, quod toti uino permixtum est, hoc primario potissimumque feruet: quarum praefer hęc est ipsum reuera uinum. Ostensum uero etiam est, quod tum in oleo, tum in lacte, tum in alijs omnibus succis eadem sit recrementorum natura, multoque magis in totis plantis, metallicisque omnibus. Quae memoria tenentes nunc tempus est de medicamentis omnibus considerare. Ac primum omnium cauendum est, ne nobis quoque quod plerisque omnibus qui talia scrutantur, accidat. Nam quasi omnia simularum forent partium, ita differunt, nec concedunt neque uinum, neque oleum, neque reliquorum ullum ex diuersis facultate partibus consistere: immo multo magis mirantur, si de aceto audeamus dicere, ipsum ingenitū uini caliditatem perdidisse, ceterum ex putredine aliam adeptum: cuius sanē sententia est tum Aristoteles tum Theophrastus. Nam uinosa uini partes, dum ipsum in acetum transit, refrigerantur: at aqueum recrementum putrescens adicitiam caliditatem obtinet, uelut cetera omnia quae putrescunt: itaque acetum quiddam ex contrariae facultatis partibus compositum, partim refrigerantibus, partim calidis, sicuti ustorum lignorum omnes cineres. Etenim in illis aliquid uelut fomes quidam igneus per exiguas partes dispersum est, quod & ualde calidum est: reliquum omne tum terream est, tum frigidum. Idcirco cum cinis aqua maceratur, ac per rariusecula quaedam corpora modice coatur, fit ut calidæ quædam partes uanā ferantur: reliquum quod est, frigidum est, nempe quod igneas suas particulas in aquam deposuerit. Vocant eam aquam homines graece *uolay*, latine lixiuū: idque proportione quadam aquae marinae, et mirrae dispositionis, generationis & facultatis ergo respondet: illa enim ex aqua saleque constant: at aqua quae cinerem abluunt, tum ex ipsa, tum ex partibus quas secum rapuit, composita, hoc pacto efficit nominatam *uolay*, id est, lixiuū: quod nisi antea scias ex aqua ac fuliginolis cineris partibus effectum, forsitan simplex et incompositum esse corpus existimes. Eiusmodi quiddam in aceto nobis euenit. Nam cum nequeamus sensu cernere ipsius generationem, rationi diffidimus. Ceterum si nihil aliud, saltem considerantes omphacis cum eo differentiam, aequum esse credere sciemus, quod non acidus modo, sed & acris quidam alius ei permixtus sit sapor: quam obrem perfecte omphacis succus refrigerat, hinc est quod summe ardoris profit, siue ori uentris impositum, siue totis hypochondrijs, siue culibet alij quod refrigerare libeat. Secus uero habet acetum: nec enim ad unguem unum est, neque tantum acidum, sed & acris alius quidam ei sapor permixtus est. Itaque quod tantum est acidum, quicquid id fuerit, plane frigidum est, siue pirum, siue malum, siue acinus uuae, siue rubi, siue ipsius mori, siue rhoëas fructus, hoc est mala punica, siue quibus alius tum fructus, tum succus, tum planta; ut oxylapathum, & oxalis, quam eandem oxidat

Galen.

A quoque nominant. Quippe si gustati uehemens atque manifesta illi ineffe aciditas apparet, nec quicquam prae se ferat acrimoniam, omnino hunc succum refrigerantē reperies: quin cōfidenter utitor, siue ad ardores uti consilium est, hypochondrijs imposito, siue ad erysipelas, siue ad alium affectum calidum. Similiter quoque frigidus affectus ab eo omnes palam ledi cōperies. Porro ubi mista tibi qualitas appareat cum acrimonia, cōsiciendum est caliditatem quoque inesse. Sin iūcta sit adstrictio, aliud est frigiditatis genus: nā acidā frigiditatis tenuissimum est partium, at adstringens crassarum.

Quomodo exerceri oporteat in agnosenda cuiusque saporis facultate. Cap. 3

Sed horum paulo post probationes afferemus in medium. At quod prius consilium dari oportet ijs qui talia absque sophistica arrogantia, immo unius ueritatis gratia scrutantur, id nunc tempus est exponere: nempe quod non solatione exerceri per eas methodos logicas, ad quas nunquam hortari desino, quasque in demonstrationū cōmentarijs tradidi, sed etiam gustandi exercere sensum in saporibus oporteat, principioque in ijs exquirendis sollicitos esse, quae unā quampiam habeat qualitatē manifestissimam: ut si acrimoniam cogitatione cōplecti clare uelis, id in alio, capis, & quae ipsi similia sunt, efficies assidue gustando, plurimumque dentibus mandendo, tum in longo usupassiois existentis sensum memoriae diligenter mandando atque insigendo: Sin adstrictioem, in galla, rho, & similibus: Si uero amaritatem, nitri fellisque gustu: Si autem dulcedinem, gustu siraē & mellis. Ad haec siue *αρωγ*, hoc est quod qualitatis sit expers, siue qualitate quod ad sensum attingat, medium uoles comprehendere, aquam gustare iubeo, ac diligenter memoriae commendare, eamque potissimum quae nullam dictarum praefert qualitatem, neque dulcedinem, neque amaritatem, neque acrimoniam, neque aciditatem: praeter haec quae neque supra modum sit aut calida, aut frigida. Nam hinc exorsus promptus & ad aliorū obscurorum omnium saporum agnitionē peruenies, & ad eorum quos ego quidem dulces, alij uero aqueos appellat: qualis utique est calamorum uiridium, & graminis (agrostem Graeci uocant) ad haec triticū, hordeū, &c; aliorumque multorum quae Theophrastus recenset, inquires an plures sint ponendae dulciū saporum species, an uero in maioris tantum ac minoris inter se differre ratione existimandi sint. Sed de his alibi definiam.

Quod pharmacorum emplastica uocata, cum media sint in caliditate ac frigiditate, terrestria quoque esse, ac sine mordicatione siccare oporteat. Cap. 4

Porro si qualitate praebet sensum aqua plane omnium qualitatis uacua, talem in re sicca inuenias, ea nimirum extra omnem est insignem tum caliditatem, tum frigiditatem, medium quoad fieri queat constitutionem obtinens, aut certe paulum ad frigidius declinās. At si talis cum sit in caloris frigorisque differentia, insuper consistentiam nacta sit siccam, terrestris sit, ac citra morsum deficet, ne-

tom. 5

e cello

cessè est. Appellitant eius generis medicamenta omnia medici emplastica: uelut pleraque exacte lota sunt, Amylū, Pompholyx, Cerussa, lapis hæmatites, Cadmeia, terra Cretensis, Cimolia, Chondrus siue alica, Samius aëter, & suilonum terra, ex emplasticis sunt pharmaciis. Sunt uero ex eis non nulla non terrena solum, sed aquea natura. Quintam quædam non parum in se aeris continent, omnia quidem glutinosa, ac proinde emplastica.

Quod duplex est emplasticorum medicaminum natura. Nam partim terrena sunt atque exacte sicca: partim planè uiscosa ac lenta, sed mista aqua terraque, atque ut plurimum etiam aereocommunitè uero omnia mordicatione uasant. Cap. 5

Duplex siquidem est emplasticorum medicaminum natura, altera exacte terrea & sicca, altera uiscosa quidè omnino, sed ex aqua & terra, & plerunquæ etiã aere mista, sicut oleum dulce. Positū autem retro est, quid dulce uocitè. Ergo hoc ex aëro facta, terrea, aqueaque essentia temperatum est. At ouis albumen ex ipsdem quodammodo, sed magis tamen terrenū oleo est. Quin & quod lactis est caseosum, emplasticum quoque est, & suillus adeps. Nam tauri sanè & hirci pinguitudo acrimoniã & multã, & igneã possidet: bouis item ouisque adeps acris est. Nam taliū animantū pingue ob crassitiẽ adeps appellatur. Sunt enim nõ calidiores tantū, sed & magis terrene suisbus. Porro anseris & gallinacæ calidior est pinguedo & sicciõr quàm suū: quin & subtiliorū partiū, & minimum terrestris, sicut & aurium omnium: quandoquidem & corporis ipsarum substantia non parum habet aeris. Sed de his alibi tractabitur. Quæcūq; ergo pinguedines nondū ulla nactæ sunt acrimoniã, emplasticam & siliñedi poros facultatè obtinent, eamque tanto efficaciorè, quanto sicciõres, magisque terrenæ fuerint. Huiusmodi est cera elota: deponit siquidem & ipsa quam habebat à melle acrimoniã. Satis uero constat, hæc à me non dicta esse de cera quæ natura sua amara est, qualis est pontica. Ex absinthio namque ea amaritudinem obtinet: ac si uel sexcenties eam laueris, prorsum tamen omnem amaritatem haud elueris. Fugiendo uero etiam illa cera est, quæ ex acri & thymoso melle conficitur, cum planè ab omni mordacitate alienum præparare uoles medicamentū. Quocirca ad lauandum idonea est, quæ ex melle facta est tum aquosiore, tum minime mordaci.

Quod adstringentia medicamenta acidãque, licet utraq; qualitate sint frigida, inde tamè diuersa sunt, quod adstringentia terrena sint crassaque, essentia, acidã uero tenuis. Cap. 6

Atque emplastica quidem medicamenta eiusmodi sunt: sed ad acidã adstringentiaque reuertor. Adstringentia certe terrena sunt & crassa corporis consistẽtia, qualitate uero frigida. Acidã autem tenuitate pollent corporis, sed perinde ut adstringentia refrigerant. Vtiq; gemina probatio est, nẽpe ex sensu, quæ ab inductione est: & ex ratione, quæ ex substantia eorū colligitur. Prior autem probatio ea dicitur, quæ uulgo quidè est aperiõr, ceterū ad scientificam demonstrationem minus habet uirium. Arborum fructus quotquot nobis ubi maturuerint

dulces apparèt, nuper enati, acerbis sicciq; sunt consistẽtia, pro sui nimirū parëtis quiscq; natura (ceu quodam aut loco Theophrastus) oliuæ, uuæ, mala punica, mora, palmaria, pira: at progressu tẽporis humidiores redduntur, acquiruntq; ad acerbitatem aciditatẽ, quam sensim exuentes postea dum maturescunt ac perficiuntur, dulces euadunt. Sunt qui nõ in arboribus, sed postea cum decerpti conditiq; aliquandiu fuerint, dulcedinẽ accipiunt. Alij sunt qui non interueniẽte aciditate, sed palam ab acerbitate in dulcedinẽ transeunt, sicut oliuæ. Quin quod calido maturescunt coquuntq; omnes, clarum est: tum quod id ipsum duplex sit: alterum propriū, & cuiq; ingentitū: alterū externum, à sole uidelicet, sed tamen naturæ ipsorum conueniens ac familiare: siquidem meminimus quæ non bis perpetuo proposita sunt elemẽta, & ipsum uti que clare cognorimus. Porro si cum initio acerbis essent, tempore maturescẽtes dulcescunt, sequitur ex calore ipsis prouenire dulcedinẽ, acerbitatẽ uero aciditatemq; constituisse ex frigore. Quoniã autem principio lignosi cum sint (ut & Theophrastus dixit) sicci quoque sunt: simulq; acerbis, uerū affluentis postea humoris copia acidus efficiat: palam est saporẽ acerbum magis esse terrenum, acidum autem magis humidum. Itaque & Plato recte definiit dicens. Quæcunq; partes eiusmodi in succis deferuntur terrestres, ex liquefacta contrahunt atque exiccant humiditas linguæ sensibiles partes: ac si exasperat, acerbæ: sin minus id faciunt, austerae apparent. Recte autè & non præter hæc dicemus, frigidum esse tẽperie saporẽ eiusmodi. Nam si terrenus fuisset duntaxat, emplasticus, non acerbus foret. Iamq; oratio quodammodo ad essentia ipsam transgressa saporum, demonstrationem attingit scientificam. Quippe si ab acerbis sapore manifeste linguã contrahi, siccati, asperariq; cõtingit, ostẽtumq; superiorib. libris est, ab unico frigido cõtahi, cõtstringi densariq; corpora: liquet planè frigidum esse saporẽ acerbum. Quoniã porro inæquabiliter desiccatur (id est em quod exasperat) fuerit sanè omnino etiam terrenus. Siquidem a quibus omnia æquabiliter penetrat atque peruadit, eiq; inseparabile est ac perpetuum, etiam si diuulsus sit, ut rursum uniat: at terreno corpori quod in saporibus defertur, iam antea inest diuulsio, simulq; ut nunquam deinceps facile coeat. Quin si eius re corderis quod utriusque singulatim passiois est proprium, ipsdem idem ipsum subsciberis ac testificabitur. Velox siquidem acidorū saporū transitus in sentientibus partibus fieri conspicitur, acerbiorum aut tardus. Tum acidã quidem in alto magis agere apparèt, in superficie autè acerbã. Hæc itaque omnia crassarū esse partium acerbã indicant, acidã uero tenuium. Multū inter se hæc conueniunt, tum ea quæ à rerū dicta sunt essentia, tum ea quæ per inductionem eorum quæ sensus sunt inuenta. Porro nihilo deterius fuerit, mentionẽ rursum de nominū usu facientes, hæc quoque adijcere, nempe quod utraq; adstringere dicantur, tum quæ acerbã sunt, tum quæ austera, sed in maioris minorisque

ratione inter se differat. Tum quod multæ insunt medicamentis qualitates, nõ diuerfæ tantũ, sed & pugnãtes, atq; interim etiã subcõtrariæ. Id quod retro satis ostensũ est; cæterũ ab eo nunc rursus ordiri necesse est. Nam si gustanti tibi idem acerbum & mordax appareat, id missũ facias medicamentũ iubeo; atq; illud queras, quod absq; mordacitate adstringat. Ac si neq; acidũ appareat, neque dulce, neq; amarũ, sed q̃ fieri maxime possit unam possideat qualitãtẽ a mistiõne alienã, nõpe adstringentem, ita deniq; experiẽtia examinabis: quomodo sapenúmero faciendũ ante proposui. Sin astringit simul ac mordicat, aut aliã quamuis qualitãtẽ seu facultãtẽ adstrictiõis iunctã habeat, frustra est ac superuacaneũ, ubi adstrictiõis actionem explorare consiliũ est, ad experimentũ tale ducere pharmacũ. Incertũ est enim, num ob adstrictiõnẽ, an ob aliã quampiã admistarũ illi qualitãtẽ, an ob utraq; sic in corpore illi applicato egerit. Etenim chalcitis, misy, chalcãthos; fori, æris squama, cum simul adstringant & mordicent; secundum utraq; qualitates in quouis admotorũ corporum actionem exerunt; nec tamen docere nos aperte queunt, an ab adstrictiõne urendi uim habeant, an ab acrimonia. Mittere itaq; illa præstiterit, & multa deinceps alia gustare, syncerã seorsum adstrictiõnẽ intuentem, ac quoad fieri possit per sese existentem: ac ubi tãdem talem quãpiã repereris, ita deniq; medicamentũ iudicare ijs methodis quas supra à me frequenter audiuisi: ut potes si gustãti tibi balaustrum, aut galla, aut citinus, aut hypocyfitis, aut solãnũ, aut glaucium, aut acacia, aut succus rhu, aut id genus aliud exacte quidem esse appareat acerbum, nec ullam manifestã habens aliã qualitãtẽ in hoc iam expẽdere ac diligenter explorare adstrictiõis actionẽ oportet. Porro exploratio ipsa fieri (ut saepe diximus) debet in optima corporum constitutione ad unguẽ sanorum, tum in simplicibus affectibus, seu calidis, seu frigidis, seu humidis, seu siccis. Nã si corpus sanum manifesto refrigerare cernatur, & calidis pro sit affectibus, & euidentem quoque laboranti ipsi frigidã afferat qualitãtẽ: au dendum erit de adstrictiõne, quod refrigeret, pronunciarẽ. Sin cõtrã appareat, sanaq; ab eo corpora incallescant, & calidi affectus exasperẽtur, frigiditq; iuuentur; non refrigerare, sed excalfacere medicamentũ eiusmodi putandum est. Eodem modo de acrisbus fumentum experimẽtum, in capis, alliis; pipere, pyrethro, zinzibere, struthio, helenio, calce. Etenim quemadmodum qui solani succum piperi miscuit, neutrũ satis explorare potest; sic nec quæ à natura sunt mista. Eundem in modum contemplãdum de acida qualitate, de amara, de dulci cense, uehementes nimirum, & quæ quantum licet sola sint in exploratione legẽdo, & experiẽtia uires eorũ scrutando. Quippe quiduis te, quod modo sit aut acerbum, aut austerum, aut amarũ, in experimentum ducere, tanq; in eo acerbãtis, austeritãtis uel amaritãtis facturũ periculum, planẽ absurdũ arbitrõr. Nam si unam duntaxat quali-

Galen.

tatem possideat, idem erit medicamentũ ipsius & qualitãtis experimentum: sin multas, ex omnibus nimirum mistam medicaminũ actionem edet: ex quo unius adhuc eius quæ in iudiciũ ueniebat actiõ obscura & incerta permanet. Itaq; si, ut proposuĩ est, iudicare oporteat, nõ rectẽ senserit qui nihil prorsum pronunciari posse de saporũ facultatibus existimarunt, quicq; aliter iudiciũ in eundem censent. Siquidẽ & de ipsis aliquid asseri potest, nec iudiciũ aliter q̃ nunc est propositum iri cõuenit. Sanẽ si id modo dixissent, planẽ opus non esse saporum consideratione, cum uires medicamentorum experidimus (nam absq; his medicaminũ uires experientia inuenire licet) laude illos potius, q̃ ut iuperatione dignos putarẽ. Verũ ubi tanq; de re necessãria quidẽ illa sed incõprehensibili differunt, bis reprehendendos iudico, tum quod rem non necessariã habeant pro necessariã, tum q̃ consequi eã se posse desperant. Nam facultãtis medicamenti cuiusuis iudiciũ, ab uide citra saporũ dignotionem sola reperitur experientia, cum in modũ habita quem sexcentis iam ante posui. Atq; ego sanẽ nunc, non quasi aliter inueniri quod inuestigãt nõn posset, ad sermõnẽ de saporibus descẽdi, sed partim propter eam quæ ad principia est sequelã, ut uidelicet ostenderẽ, omnia ad elementorum rationes cõsequi, nec quicq; usquã inueniri pugnans; partim uero etiã ut illos coarguerem, qui adstringẽtia omnia excalfacere contendunt. Quinimmo fuerit etiam nonnullus eius ad præsens negociũ usus: sed hæc postea monstrare conabor. At nunc ad rem propositã reuertor; moneoq; & hortor qui ueritãtis sunt amatores, ut ipsimet adstringẽtia omnia degulserint, uti nos fecimus: ac ubi inuenierint aliquo in corpore perfectã adstrictiõnẽ, quoad liceat ab aliarum qualitãtũ mistiõne alienã, tum deniq; experientia expendere tentẽt frigidum sit an calidũ, humidum an siccũ corpus eiusmodi. Sed hoc quisquis capiet, seorsum ipse faciet. Ego uero ut aliquid de mea asserã pronunciemq; experiẽtia fortassis necessarium fuerit, atq; in hoc quidem libro in genere, membratim autẽm in commentarijs sequentibus. Fuerit autẽ generalis de omnibus sermo eiusmodi. Corpus omne adstringẽs, ab alijs, quod sensu animaduerti posset, qualitãtibus syncerum, perpetuo comperi experiẽdo frigidum: quin etiam nõnnulla ex ijs quæ qualitãtibus mista erant, nempe quæ modice dulcicia; aut amara, aut acris, aperte quoq; refrigerãtia reperi, scilicet cum in eis adstringẽtiã refrigerãdiq; facultas ita uincerent, ut alias obscurarent. Eadem ratione acida uniuersã, tum ea quæ simpliciter acida essent, sicut oxalida; & oxylyparthum: tum mistis quoq; alijs qualitãtibus quædam siue dulcibus, siue acris, siue amaris, nihil secius refrigerantia expertus sum, quãlia sunt miala punicã, mala, pruna, uue, mora, ficus, cerasia, ipsumq; adeo acetũ: sed huic, ut supra positum est, permista est quædam acrimonia: fructibus autẽ ijs quos *διπράς* Græci uocant, dulcedi nes quædam & acerbitates; quibusquã uero etiam

tom. 5

e 2 ama-

amaritates quædam obscure ac leues. Tum item a quæ adstringunt pariter, atq; acida sunt, ea omnia quoq; manifestè refrigerare experientiâ cognouit. Sola uero dulcia omnia pro dulcedinis modo protinus etiâ calorè continent. Quocirca eorum quæ admodum dulcia sunt, nullum omnino est frigidum. Fyeriat tamen quædam modice dulcia, itidem frigida, scilicet quando plurima corporis ipsius substantia aquea extiterit, sed nõ adeo tamen frigida, ut id quod ualde acerbũ est, aut acidum, sed sicut alicubi retro diximus de illis quæ tepidũ calorè possident. Porro amara omnia calida sunt, ut bilis, nitru, uina ualde uetusta, ac numerosa seminum copia. Nam & semen, rutæ, potissimũ syluestris; & tordyli & spondyli, melanthij & lupini, magisq; agrestes, orobi, & inter hos potius agrestes, quicq; a secure pelecinus nuncupatus est, reperitur; autè in tritico, amygdalæ quædam, quæ ob id ipsum amara uocantur, & cucumerũ quædam femina, & semen mali medicũ, & ad hæc infinita alia amara apparent gustantibus.

Quod per acerbis saporis exolutione nascatur & austerus sapor, & acidus, & dulcis, ac pinguis. Soluitur autem acerbus sapor, cum frigidus sit & terrensus, aut ex caliditate, aut humectatione, aut simul utraq;. Cap. 7

Sed infra copiosius de amarissimis gemis. Nunc rursum resumpto de astringentibus atq; acidis sermone, conuenienter ei finem imponamus. Ergo austerum q; sit acerbũ exolutũ, sensum ad memoriã reuocare oportet. At quæ sit eius generatio, nunc dicã. Quãdo quidẽ corpus acerbũ terreũ est ac frigidum, tripliciter necessitatio exoluitur: aut incalescens, aut humescens, aut utruq; simul perpetiens. Itaq; si calefeat duntaxat; id nec humidius est nec mollius, sed durũ manens, solam acquirere dulcedinẽ, uel utrobustæ glandes, ac potissimũ quæ uocantur castanæ. Sin tantũ humescat, si quidẽ ea crassarũ sit partũ & aquea humiditas, austerũ eua det; cuiusq; enim saporis uires aquea retũdit ac hebetat humiditas: Si uero aerea, accescit; ostensum nanq; est, frigidũ subtile acidã efficere qualitatẽ. At si pariter & humescat & calefiat, humiditate quidẽ aquea in dulcedinẽ, aerea uero transibit in pinguedinẽ. Perspicuũ ergo hinc iam euasit, quo pacto fructus principio acerbũ cum sint, processu tẽporis quidam planè dulcescãt, quidã acescant, nonnulli fiant austeri, aliqui etiã acerbũ permanẽat, tum quidam etiam pingues reddantur. Et sanè secũdum propositarũ qualitatum misturas uariam sortiuntur mutationem. Acerbus ad extremũ per seuerat fructus ilicis, arbuti, fagi, corni: si quidem frigidus fuscusq;, qualis erat ab initio, permanet, tantũmodo mole increscens, nulla præterea magna accedente alteratione. Nam & arbores ipsæ tum densissimæ sunt, tum siccissimæ, ac frigidissimæ. Acerbus simul & dulcis myrti fructus est, & piri agrestis, ac roboris. Magis tamẽ dulcis q; acerbus fructus castanæ quem nominãt. Tantũ acerbus uitis amineæ tum fructus, tum uinũ, ac quotquot his similia sunt. Austerus unaq; dulcis fructus palmæ, et inter uina surrentinũ, sabinũ, alba-

tes, ut uocant, & quæ eius sicut generis. Solummodo dulce theracũ, & scybeliticũ, & syreum, & alia quæcumq; tum istis conueniunt. Pinguis exactè tum fructus, tum succus oleæ, tum etiã alij omnes ex quibus oleũ cõficitur, sicut rhicini, raphanidis, & ipsa sesama, nucesq;, & amygdala. Nam id genus omnia uetustate prorsum efficiuntur pinguis, quippe in quibus aquea quidẽ excrementitiãq; humiditates digeritur, propria uero à calore natiuo elaboratur atq; exactè concoquitur.

Quod amara ab immodico nascuntur calore, & immodice sint calida: dulcia uero omnia sint calida miti caliditate, quicq; non supra modum nostram exuperet caliditatem. Cap. 8

Quicq; ergo fructus oleosi sunt solummodo, edendo ij sunt & dulces; quibus uero alterascensibus amaror aduenit, ij edũ nõ possunt. Quippe amarũ omne edĩ nequit: taleq; efficitur à caloris excessu, sicuti postea docebimus. Verum dulce omne calidum est, nec immodice calorem nostrũ exuperat: imò sicut aqua calida, cuius cõtactus uoluptati est, maxime ubi fixerimus, hæc tamen uidelicet nos exalfaciens, dum concretas frigore in nobis particulas fundat, nõ tamen soluat aut fecet distrahat uel continũt, ea, inquam, ut summa afficit uoluptate; ac utilissimã est: sic omne eduliũ dulce, calidũ sanè omnino est, sed non tantum calore excedit, ut is lædat, ac molestus sit, sed inter limites se cõtinet fundentis, leuigãtis, ac mollentis. Rursum mihi hic memoriã repete quæ sæpe ante posui, quædã esse quæ una, quædã quæ duabus in se se qualitatib; & agunt & patiuntur, quædã uero estiam totis substantijs suis: quorũ in numero & medicamenta nõ pauca posui, & nutrimenta uniuersa. Horũ duplex esse genus apparet, prout significauit & Theophrastus. Nam quædã prout pinguis, uelut pinguedo: quædã dulcia magis minus uel, uelut fructus omnes quibus uescimur, & carnes, tum herbarum multæ, ac radices, floresq;, & germina. Nam tamet si sunt inter ea quædã acerbã, sicut pira syluestria & corna, omnino tamen dulcedine participant, nisi summe sint acerbã, uelut galla, rhus: uerum ob hæc iam pro medicamentis ijs magis q; pro cibis utimur. Apparent enim quæ citra laborant uulnere, quicq; impleti sunt, & quibus exolutus est stomachus, ea appetere degustare: alioqui si esuriant, contra respicere potius tum acerbã, tum acidã: expetunt autè ac sumunt quæ dulcia sunt & pinguis, hisq; expleri desiderant.

Quod pinguis, atq; adeo quæcumq; nutriunt, ex dulcium sunt genere. Cap. 9

Sanè uero fortassis & pingue ipsum dulce est, & quicquid nutrit, ex genere est dulcium. Euenit autem ad illis nõ abs re, sed secũdum ipsam quam tum fieri potest nutritio substantiã: quippe nutritio est euacuati repletio. Atqui quod euacuati est, familiare erat: quam obrem & quod nutrit, familiare sit necesse est. Porro si familiare & iucundum amicumq; fuerit, protinus etiã ut ad id quod nutritur, modice calidum. Sed in hoc nõ parua est maioris minorisq; ratio: quando nimirum nec ad cibos

cibos accedimus planè secundum naturã affecti. Solum enim corpus eorum qui cibum desiderant, inanitum sit oportet, si exacti futuri sint familiaris ipsorum qualitatis cognitores. Nam si præter id calidiores quæ conueniat aut frigidiores euaserint, seu toto corpore, seu pertinētibus ad linguam ac uentrem locis, non solum quæ nutriant, uerum etiam quæ refrigerent aut exalciat, postulabunt. Proinde sanè cibi quoque illis aliis alij uidentur iucundiores. Nam cum duplex sit genere iucundum: alterum quod impleat id quod euacuatum est, cuiusmodi est nutritiū: alterum quod medeat ut ei quod alteratum est, id quod iam medicamentum est: uenit utique cibis, ubi non modo uacuatibus exhibentur corporibus, sed etiam qualitate aliqua mutatis, ut duobus nominibus delectent, ut cibi scilicet, & ut medicina. Sed ut medicamenta quidem, refrigerant quædam, & exalciando, & exsiccatō, & humectando ex ratione iuuabunt & prouident: Ut nutritiua uero, sola ea quæ cognata sunt, & familiaria totis nutriendorum substantijs. Protinus uero istis ad est, ut cōueniēter scilicet sint, ad ea quæ nutriuntur, calida. Quamobrem nec eduliorum, nec medicamentorum una est animātibus omnibus species. Si quidem pro sua unaqueque familiari substantia simul & affectio ē tum delectantur, tum iuuantur ab utrisque. Sed si hæc sic habent, id quod in cibis minus erit dulce, minus quoque erit calidum: quod dulcius, tanto nimirum erit calidius, quanto uidelicet dulcius. Sin ad immo dicū recidat calorem, nec eiusmodi dulce erit, sed iam amarum apparebit, uelut mel uetustum atque decoctum, itidemque aliorum dulcium unum quodque.

Quod amara dulciatque partim adscitio calore fiant, partim proprio ingenito. Cap. 10

Etenim ut à moderato calore bifariam cuique corpori dulcedo provenit, partim enim sunt proprio & insito calore dulcia, partim uero adscitio: ad eundem modum amara. Alia enim sunt que suapte natura exalciantur per eas quæ temporis spatio eveniunt mutationes: alijs autē id accidit ab acquisitio calore accensis. At de amaris post dicitur. Quæ terum dulcia calore proxime accedunt ad ea quibus apparēt dulcia: sunt autem talia (urante dictum est) bifaria. Quædam proprio calore, ut mel: quædam adscitio, ut sunt omnia quæ ab igne præparantur, ac proinde dum calida sunt, fuuoraria ijs quibus nutritione est opus, apparēt. Porro mustum non suo modo, sed & acquisitio calore dulce esse uidetur. Multum etiam ceu ardoris (Græci *εὐρωβ-εσθουα* uocāt) ut Aristoteles & Theophrastus censere, ex solari calore tū acinus, tum alijs inest fructibus: a quo id quod illis aqueum, ac uelut etiam num semicoctum reliquum est, ad cōcoctionem ducitur conficiturque: ac transmutanti simile redditur. Nam ex quibuscumque pomis si succum exprimas, eum protinus non secus atque mustum feruere deprehēdes: tanto tamē feruoris discrimine, quanta erit unius fructus ab alio in calore diuersitas. Sed ubi iam quod aquosum ac semicoctum erat, transmutatum fuerit, atque cōfectum, & is qui feruo-

Galen.

rem concitabat calor euauerit, iam tum denique que proprie sunt succorum proprietates, syncera cōspiciuntur. Itaque tunc quæ propria uinorum natura sit agnoscitur. Qua in re animū diligenter auerte, ut austera sensim austeritatē deponat. Semper enim quæ inueterantur, ac redinem quandam & dulcedinem adfiscunt: quæ uero prius inerat illis adstrictio, eam tempore abijciunt. Est autem in quibusdam, postque efferbuerint, dulcedo quædam syncera suauis & propria ipsius succi nature: non qualis ante erat, mista scilicet ex proprio atque eo qui circa semicoctum aquosumque excrementum erat feruore. Igitur si confessum est, uinam omnia uetustate fieri calidiora, austera uero primum quidem tempore dulcedinem quandam atque acrimoniam deposita adstrictione acquirere, ac deinde inefcescente acrimonia sensim dulcedinē deponere, ac subinde rursus maiore tempore acris admodum euadere, absidueque amarescere, ac denique ubi crassescere incipiunt, penitus fieri amara: sanè constat dulce austero esse calidius, ac dulcia amarum. Atqui si uerum est, dulcedinem à moderate ratione provenire caloribus, patet adstrictionem à frigido uincere perfici.

Quod & acidi succi ex frigore proueniant. Cap. 11

Porro quod aciditas frigoribus ueniat, & antea ostendimus. Veruntamen, quādo quidem in presenti disputatione de naturali uinorum que temporis spatio fiat alteratione docuimus, non nihil quoque & de non naturali dicamus. Itaque ut uinum acerbum, tempore dulcius primum, mox acrius amariuscque efficitur, denique planè etiam amarum redditur: ad eundem modum quod uelut rigorem perpersum est, acidius protinus reddit, ac si prorsum refrigeretur, penitus acescit. Itemque quod in fructuum collectione, uindemiaque per asiduam pluuiam aliena humiditate impletum fuerit, quodque alio quouis modo humiditatem accepit, leui occasione ea omnia prompte acescunt: contra euenit ijs quæ igni admoventur. Nam & protinus statim, & temporis progressu postea semper dulciora euadunt. Quod si multo etiam tempore durauerint, & ipsa nihilominus quam cætera amarescunt, uideturque id sibi quodammodo secundum naturalem consentaneum esse rationem. Nam si omphax acida est, uia uero dulcis, ac fructibus omnibus maturatio à solari prouenit calore, planum est, imperfectius & frigidius esse quod acidum, perfectius uero & calidius quod dulce fuerit. Cum ergo uinum perfrictione rursus acescat, manifestum est, in eum illud humorem cōuerti, ex quo prouenerat. Diuersis tamen hæctenus uinibus omphacis acetique succus cōstant. quod aceto accedat ex putrido calore acrimonia quædam. Proinde Aristoteles recte dixit acetum proprio quidem uini calore esse frigidum, adscitio calidum. At omphacis succus calorē non habet, ac proinde neque acrimoniam. Accedit uero & in substantiæ tenuitate diuersitas. Si quidem omphacis succo acetum tenuius est: cui rei & sensus adstipulatur. Excellit enim que ab aceto infligitur frigiditas, eam que ab

tom. 5

c 3 om

omphacis succo, uehementia & miffione: imbecillior em̄ est quæ ab omphace fit refrigeratio: cū etiam aliena in se caliditatis ne minimum quidē contineat. At quæ ab aceto proficifcitur, tanto est ualidior, quanto & tenuior: inest uero illi & acrimonia quædam excalfaciens: quæ tamē satis non fit ad superandam ab aciditate proueniētem frigiditatem: uerū quæ transitus modo celeritatem promoueat. Nam quāto calidum frigidum facilius penetrat, tanto acris succus aptior est, qui sensibilitum corporum meatus transeat, quàm acidus. Ita que ille uelut præcedens uia sternit: hic uero haud ita tarde insequitur: quo tēpore sensus perficitur miffus, & qui ægre exponi queat, utpote qui nec planē frigidum esse acetum denunciet: quippe cum in eo ignea quædam percipiatur acrimonia: nec planē calidum. Nam perpetuo quæ ex præcedente fit acrimonia calfactionem frigus ab insequente aciditate occupās, obscurat, protinusq; extinguit: quo fit ut maior multo ex frigore percipiatur sensus, quàm ex calore. Porro si plurimo mellis aceti paulum admisceas, statim & calorem & frigus manifeste percipies. Nam si paulum mellis aceto permisceas, magis frigidum quod fuerit miffum, quàm calidū uidebitur. Sin multo mellis paulum misceas aceti, plus calfacere quàm refrigerare conspicietur: & si pari mole utraq; miscueris, acetum tamen etiam uiribus superare conperies. Quod si, ut est dictum, plus sit multo mellis quàm aceti, æqualia rursum frigus ac calorem in ea miffura conspicias. Multis enim numeris aceti plus ab ijs quæ moderate sunt calida, ad frigiditatem recessit, quàm mel ad caliditatem. Proinde & supra demonstrauimus, fieri nō posse ut uehemens coeat cum dulcedine caliditas: ueteris illud uerbum pulchre dictum est: Vera inter sese omnia cōsentanea esse, ac conuenire. Etenim ad hypochondria ardentia præstantior est succus omphacis q̄ aceti, quod nec uiolentam, ac ferientem habeat frigiditatem; nec eam mordacis admistam caliditatis. Debent enim qui sic laborant, sine uiolentia mitigari, ut est dictum, nec foris ullam adfiscere mordacem aut caliditatem, aut acrimoniam. Atq; hæc quidem iam curandi attingunt methodum, quæ multis in locis huic tractationi cōmunis est. Quare ijs denuo relictis ad propositum reuertamur. Itaque omphacis succus non acidus modo est, sed & acerbus. Nam, ut supra propositum est, omnes propē arborum fructus ortus sui principio, testimonio etiā Theophrasti, gustantibus acerbis sunt: dein ubi humore implentur accedit quidem aciditas, decedit uero acerbitas: haud tamen et quod accedit, & quod amittitur, par est in fructibus omnibus, neq; si speciem, neq; si genus respicias. Etenim inter omphacas aliæ plus acerbitalis, aliæ aciditatis plus obtinent. Sunt & quæ pari portione ambas sortitæ sint: omnes tamen ad refrigerandos ardores non abs re conueniunt: quippe cum non solum quod acidum est frigidum sit, sed & quod acerbum, uelut & ante a nobis dictum est. Recedit sanē & hic rursum oratio ad curandi metho-

adum: quare & rursum ad propositum illam reuertemur. Porro propositū, ut reor, ab initio fuerat, de saporibus omnibus differere: ac nunc quidem ferē de omnibus uerba fecimus: interim tamē orationis affinitate & alia attingere coacti. Nec em̄ de acerbis modo, & austero, & acido iā diximus, sed & persepe de dulci, & amaro, et acri: reliqua tamē quod tota oratio perfecta euadat, adijcienda etiam sunt. atq; in adstringentibus haud ita multum etiā reliquū est, quod non ex iam dictis clarum euadat.

Vnde arbitrati sunt quidam a calore acidum prouenire saporis: rem: Ex eo quod uina nequaquam sortia, uere estateq; mutantur. Cap. 12

At in acidis deesse fortassis etiamnum uideatur, quod eximios quosdam medicos sefellit. Nā eo quod uina inualida, uere atque æstate alterentur atq; acescant, hyeme uero suas seruent qualitates, hinc adeo quibusdā a calore aciditate nasci uisum est. Quorum auget opinionem & quod uehementius motū est, & quod longius aduectum. Talia enim omnia cū infirma fuerint, celerrime acescunt. Quinetiam quidā qui de re rustica scripsere dolia in ædibus ad Aquilonem expositis defodiēda censent: tanquā frigus scilicet qualitatē eorum seruet, mutet autem caliditas. Sanē uero et id sæpe numero ipsa experientia comprobatum constat. Acescunt enim uina quædā prompte, ubi in meridianis & soli expositis locis reposita fuerint. Videorq; dictorum hinc iam orsus solutionem. Etenim quod non omnia caliditate acescant, sed quæ initio tantum frigidiora sunt, nec id ueteri alicui accidat, id nobis ad ueritatem uiam inueniet.

Qua de causa ab externo calore uinum natura frigidum infirmumq; corrumpitur? Quia scilicet res quælibet in propria natura proprio seruat calore, corrumpitur uero ab extrinseca immoderatione, atq; extinguitur. Cap. 13

Quippe causam sermo scrutabit, propter quā uinum natura frigidum atq; inualidum ab extrinseco arguatur calore. Quanquam per uerbum, arguatur, iam dictum, omnes prius dictæ ambiguitates dissoluantur: perfimile enim quid uicinis accidit quæ natura frigidiora aquosioraq; sunt, quale flammis exiguis & imbecillis: quippe si eas ad solem feruidum exponas, aut prorsus obscurari aut dentē etiam extingui conspicias. Sic quoc; si ardentē lucernam aut iuxta flammam uehementem magnamq; deponas, aut ad solem feruidum exponas, marcescere utiq; ac dissipari protinus uidebis. Quinetiā si ualidum uentū facias infirmæ par uaq; flammæ, citius eam extinxeris q̄ inauxeris. Natura enim infirma, ualidum neq; motum, neq; calorem sustinet, uerum ab ijs dissipatur potius q̄ augetur & crescit. Quanquam ex industria multis in locis uina & commouent & transportant, licuti sanē & in solem efferunt, atq; excalfaciunt, ut etiam quædā insuauia fiant, fumū contrahentia qualitate. Apud nos sanē in Asia in tecta ædium æstate omē propē in lagenas transfusum imponūt, postea in edita cubiçula, sub quibus inferne multa flamma luceat, transportant. In summa autē ad meridiem solemq; cellas obuertunt, in quibus & citius ea maturescant, & potui idonea euadant.

Nam quod multo tempore alijs, hoc ijs quæ sic ex calcafa sunt, breuissimo auenit. Porro nihil mirum est, qui de colendis agris memoriae prodiderunt, ob eam quam de sua regione habebat experientiam, audacius atq; inconsiderantius de uinis omnibus definiuisse. At Theophrastus atq; Aristoteles experientiam etiam ulteriorem nacti, & in perferutandis naturæ rationibus exercitiores, ac diligentius omnia distinguentes, cum multa huiusmodi, tum uero de uino nos docuerunt q̄ simile illis atq; corporibus nostris accidat. An non em̄ & ipsa quoq; prout aut robusta sunt, aut infirma ab isdem tum iuari, tum lædi conspiciunt: Etenim ut exercitia ualida, & sol, calida atq; robusta corpora etiam ualidiora efficiunt: profertur autem & digerunt refrigerantq; quæ non sunt eiusmodi: sic uina natura calida motus uelut uentilans, sol excofaciens, flammæq; iuxta ardentes, celerius concoquit. Quæ uero frigidiora sunt & diutiora, eorum arguunt omnia id genus inbecillitatem, celeriusq; perpeti cogit, quæ alioqui post passuræ essent: quippe cum ita comparatum sit, ut res que libet in propria seruetur natura calore proprio, corrumpatur autem ab immoderatione extrinseca, nempe caloris humidam aut frigoris abundantiam. Atq; quod ab utroq; efficitur, unū est, non tamen unus generacionis modus: quare nō aequè ab idiotis omnibus facilis cognitu est hæc corruptionis ratio. Etenim ubi quid rerum calidarum à frigore deuiçū est, ne uulgo quidem ignotū est. At ubi circumstante foris calore ualidior digestum ac dissipatum est, eos sanè qui circa naturam exercitati non sunt latet, ignorantes caliditatem mediocrem omnibus esse utilem, immoderatā uero non minus frigiditate noxiam.

Quod in saporibus aciditas prouenit, calore ipsos quidem incipientem concoquere, non autem perfectam mutationem atq; alterationem afferre potente. Cap. 14.

Cæterum in genere hoc nobile pulchrum est, qd aciditas in saporibus nasci potissimū uidet, dum à calido quidem mutatur, ut tamen nō superet: id quod ex acidis ructibus uel maxime cōiiciat. Nā hi haud quaquam, ubi nulla prorsum facta in uentre est ciborum alteratio, prouenire solent: quem admodum nec ubi optime cōcocti, sed tantū ubi semicocti, ut ita dixerim, fuerint. Voco autē semicoctos, qui à uentriculi calore alterationē perpeffi, non etiā perfecte ab eo superati fuerint. Sic lac, pitansæ succus, & quæcumq; eius sunt generis, tempore æstiuo citius acescunt q̄ hyeme, postulantq; edes frigidæ, ut in ijs reposita plufculo rēpore perdurent. Ex quibus omnibus patet, qd à calore mutante quidē, non tamē prorsum uincente, aciditatis generetur qualitas: atq; ob id pleriq; inest fructibus prius q̄ maturuerint. Idq; etiā ijs quæ ab initio de saporibus acidis diximus, consentaneū uidet. Etenim si simile quid illis usuuenit quod Bo-realibus constitutionibus accidit, ut tenuis scilicet essentia sint, simulq; frigidū: nasci eos haud sine calore satis constat, sicut nec illum ipsum aerē. Proinde quoque quæ summe nos refrigerant ac

interimunt, ueluti cicutæ, papaueris succus, hyoscyamus, mandragoræ, minime omnium acida sunt: quippe licet frigidū sint sapores acidi omnes, haud tamen eosq; refrigerant, ut interficiat: non enim subtilis forent essentia, si extreme essent frigidū. Itaq; nō modo iam qd frigidus sit sapor acidus, sed & quatenus, iam apparuit. Exploranda porro eius natura est in oxylapatho & oxalide, quæ etiā oxida nuncupant: est autē hæc holus syluestre: in istis enim maxime mihi sincerus est uisus ac simplex, nullius particeps acerbatis, ut solent arborū fructus: perspicuo enim hi cum acerbitate quadā admistam habent aciditatem, sicut cum acrimonia acetum. Itaq; quod proprie in saporibus appellatur acidum à sola lingua percipi potest, sicut & acre: cæterū quod utriq; cōmune est, nempe mordacitas, etiā à tactu sentitur: utraq; uero lingua agnoscere nata est: nam quæ cōmunia sunt, sicut & reliqua corpora sensilia: quæ uero propria, tanq̄ gustus organum percipit: idq; mihi uidetur illi extremum ac peculiare esse iuxta totarū substantiarū tum proprietatē, tum, ut ita dicam, alienitatē. Dicitur autem demonstratūq; sæpe numero est, nec secius aliās quoq; repetam, quid sit secundum totas substantias agere, aut pati: imò uero & hæc tenus eius nūc meminero, quod in rem præsentem satis sit, hinc sumpto initio. Ex quatuor elementis, particulatim corporibus omnibus constant generaciones impares mistura, ac diuersæ. Siquidem quædam ignis aliorūque elementorum in se plus continent, quædam aquæ: sicut alia, si fors ita tulit, terræ, nonnulla aeris. Ex eiusmodi itaque imparitate proprietates corporū particularium sunt perfectæ: ex elementis quidem, plantarum: ex his autem, animalium, sicut in libris De elementis, demonstratum est. Porro transeunt quædam quidem protinus in sese mutuo, nonnulla uero me diantibus alijs: uelut terra in triticū, hordeū, et aliā id genus: rursum horum unumquodq; in carnem humanam: cum tamen ipsa terra caro ut fiat sit impossibile, eam uidelicet quæ in medio est mutacionem transiendū. Attamen eorū quæ in sese mutuo transeūt, quædam promptā celeremq; quædam diuturnā alterationē obtinēt: at quæ similitudinibus propinqua sunt, celerem: quæ uero remotiora tardierem. Oportebat itaq; meo quidē iudicio, in nasci animantibus organū, quod naturæ similitudines ac dissimilitudines discernendi potestatem polleret: quod agnoscers rerū naturas, familiaria quidem eligeret, aliena uero refugeret. Eiusmodi ergo lingua est, quæ exuberanti sensu non calidam modo frigidamq; humidam atq; siccam, sed etiā quæ familiaria: quæ non familiaria, sunt agnoscit: in hanc enim duntaxat particulam cōplures inseruntur nerui: cum aliæ omes aut unius tantū, aut duorum sint participes, nec ita magnorum tamen. Porro cum quædam naturæ nostræ magis sint familiaria, quædam minus: hæc partim in hac coniugatione, partim in illa: necessario plures gustus, qualitates extiterunt. Cæterū omnium quæ nutriunt, communis dulcedo est. Nam quicquid nutrit, aut

plus, aut minus est dulce. His uero quæ non nutriunt, commune est id quod per negationem aut priuationem sic dicitur, uelut non dulce, & indulce. Particulares autem differentiæ cōplures merito euaserunt: quia id quod cuiq; rerum familiare est unum est: nēpe quia & natura eius familiaris una, aliena uerò, plurima; partim plus, partim minus à substantia eius dissidentia. Quæ ita summe acida sunt, acerbæ, aut amaræ, aut simpliciter aliam quâuis qualitatem præter dulcem sortita sunt, ea omnia nutrire nequeunt: sicut quæ solum dulcia sunt, omnia nutriunt: inter ea autē quæ mista sunt, quot quot dulcia simul & acerbæ sunt, & crassioris sunt essentiæ, & temperature frigida: uelut paulo ante ostēdimus. Quot quot uero acida simul & dulcia, tenuiora quidem sunt, quàm acerbæ: sed & ipsa tamen refrigerat. Quin etiam amaræ quidem calida sunt, sed acriæ his etiā calidiora. Nutriunt ergo hæc omnia, si iunctam habeat dulcedinem. Cæterum per se dīctorum nullum, ut nutrit, satis est. Porro duplici ratione mista esse assolent, nempe ut dissimilariā sint, & diuersas habeant qualitates in diuersis partibus: aut simplicia & simularia, sed quæ in mutua eorum quæ multum dissident, altere ratione consistant: neq; enim mel ex templo sit amarum, sed aut multa coctione aut uetustate amaritudinem inquit: nec id tamē illi nisi pedetentim accidit: neq; quot quot ex fructibus, dulces ex amaris euadunt, sicut quidam cucumeres & melopepones, & ipsi repēte semelq; ab initio qualitatem abijciunt. Nam ipsæ à natura mutantur, sensim fiunt mutationes: potissimum ubi in multum dissidentes, aut planē contrarias qualitates alteratio siue transitus perficitur. Sicut ergo quod est summe dulce, aptum esui est: quod uero solum ac syn cere amarum, esui ineptum: sic quæ in medio sunt eorum, nutriunt quidem etiā, uerum minus q̄ dulce. Eadem ratio est in alijs qualitatis. Nam nutrire præter dulcem nullæ omnino possunt. At elementa multo sanē etiā minus nutriunt, nullamq; gustui qualitatem offerunt: proinde & terra, & aqua (sunt enim ambo gustui insipida) minime nutrire idonea sunt, sicut nec aer, nec ignis. Itaq; pro horum interim admittioe, dulcium sæpe qualitates excoluitur, aquea ferē essentia in pumilium (*in pnyssa* Græci uocant) fructibus superante (nam triticum, hordeum, fabæ, cicer, & quæ eius sunt generis, cum propter humiditatem principio qualitatū prope expertia sint, temporis successu maturata ac siccata, frigidiora euadunt) terrestri uero & sicca in paleis, fœno, gramine, & hariditibus sicca & lignis: quorū tamen quedā priusquā aruerint, dulcia nobis sunt, nutrimentumq; interdum corpori exhibēt, uelut palmæ cerebrū (sic enim nominant summā eius particulā) & gramen, & molles maluorū radices, maxime quæ in Aegypto pro ueniūt: ad hæc plerūq; arborū germina. Siquidē quod nutrit, à similitudine quæ est illi ad id quod nutritur, dulce apparet: à dissimilitudine uero nō dulce. Porro multæ cū sint dissimilitudines, multas proinde necesse est qualitates esse non dulces:

A quas uerbis quidem efferi est impossibile: attamen memoriam earum mouere suggerereq; quoddammodo licet, cum omnes homines certissime norint, alium fieri in lingua sensum atque affectum ab acerbis, alium ab acidis, & alium à falsis, aliumq; ab amaris.

Quæ de causa quæ igni admoventur, alia suauiora, alia insuauiora efficiuntur. Et quæ de causa edulia quedam cum per sese edī non possint, suauitatem tamen ijs præbeant quæ per ipsa præparantur. Cap. 15

Itaq; quemadmodum edulia quæcunq; nutrimentorum naturæ simillima sunt, ea et dulcedinē suam præ se ferunt, nec ullā præparationē postulant, sic quæ tēperaturā natā sunt remotiorem, alia condimentis, alia coctione, alia utroq; indigēt. B Nec uero mirum est, cum condimentorū nullum edendo sit, suauitatē tamē ijs augere quæ per ipsa præparantur: quippe cum fieri possit, ut immoderatis duobus coeūtibus, id quod ex ambobus mistum sit, cōmoderatū euadat, ac proinde quoque dulce appareat: cum immoderata minime sint talia: postea uero quàm & per elixationē & per assationem, & omnino per calidum quiddam præparatio fiat ciborum, nihil etiā absurdū est aut abiguum, quæ prius non erant suauia, tunc fieri suauissima. Apparet enim calidi natura quib. admodum mutare. Quocirca nec id quoq; dubium est, quædam suauiora, quædam uero insuauiora effici igni applicata: tum quædam tempore minimo, quædam plurimo coqui debere. Etenim quæ nutrimentorum corporum temperaturis simillima sunt, ea uel citra coctionem aut præparationem iam dulcia apparent. Quæ uero dissimilia sunt, omnia insuauia sunt antequā præparentur. Porro quæ nimisquam calida sunt, frigido corrigi debent; quæ uero multum frigida, calidorum mistura ciborum, & igni, ad eundem modum humiditate, quæ terrea sunt & sicca: siccitate, quæ plus q̄ cōueniat aquea sunt & humida. Siccitates ergo, humidorum admittio: humiditates uero, siccorum mistura ignisq; emendant. Maximā rei dictæ fidem assert quæ in eo fit mutatio. Nam qui plusculum sustinuerunt seium uero, ijs salua falsa redditur: qui uero plurimū, non falsa modo, sed & amara. Sic etiā corpus uniuersum, biliosum habitum contrahit, ac si perinde ut lingua sensu polleret, falsedinem quoq; quæ in ipso est, atq; amaritudinē perfacile, reor, perciperet, ad hæc etiā ipsam dulcedinem quæ naturali inest sanguini. At nunc ubi uase quopiam aut rupto aut aperto affatim calidus sanguis in linguā effunditur, dulcissimus apparet: utiq; si secundum naturam habuerit. Nā morbidus, amarus aut falsus est, alitæue eius generis qualitatem præ se fert. At qui in toto est corpore, nos fugit, nō aliter q̄ aut bilis, aut pituita. Quanquam & bilis quidem flaua uel minima quapiam parte linguam cōtingēs, perpetuo amara apparet: atra uero acida. Porro ubi pituita linguam attingit, partim quidem dulcis, partim acida, partim falsa sæpe est manifesto uisa, cum & ipsa in toto animali incognita sit.

Qua de causa mel à caliditate ualidiorum amaritudine con-
trahit. Lac uero frequenter etià dulcis efficitur cum tamen
utraq; gustui sint dulcia? An quia mel cum summe sit dulce,
nec quiquam addi possit ad dulcedinem, in consequentem
recedit qualitate. Lac uero minus dulce cum sit, quod
religium est à calore accipit? Cap. 16

Nihil mirum igitur neque cur rerum omnium
dulcissimum mel, succum generet amarissimum,
neq; cur id maxime atate florentibus, & calidis
natura, & febricitantibus, accidat. Nam ut foris, cum
plufculum igni admouetur, amarum efficitur: ad
eundem modum & in animalium corporibus;
ubi syncerum ualidumq; nactum calorem fuerit,
biliolium succum procreat. At in temperaturis fri-
gidioribus, siue propter atatem, siue propter natu-
ram corporis, siue etiam cum morbum facile in
bonum & moderatum sanguinem conuertitur;
quippe cum neque nimium in ijs corporibus aut
excalhat, aut alteretur, uerum ei quod modice co-
ctum fuerit, simile quiddam perpetiatur, plane il-
lis adsimilatur, prorsumq; seruat dulcedinem. Et
quid obsecro miri, si à ualentiore animantis calo-
re, & longiore coctiōe ueterem mel dulcedinem
exuat? cum etiam citra hæc per suum ipsius calo-
rem spacio tēporis amarum euadat? Nam in mu-
tationis distaxat celeritate, haudquaquam quod
aliam perpetiatur passionem ab alia causa, diffe-
rentia consistit; quippe & passio est eadē, & causa
quæ mutat. Passio quidem amaritudo; causa uero
caliditas immodica. Porro immodicum, quod ad
alterationē ducit, duplex est: aut enim in admodum
consistit robore, aut in tēporis diurnitate; alterū
ex nobis & igni, alterum ex seipso mel accipit. Et
merito sanè tēpore maiore id fit ex ipso; siquidē
quod mutat, imbecillius est. Ergo quod à minore
longiori fit tēpore, quid mirum est à maiore in bre-
uiori perfici? Caterū lac etsi gustu sit dulce, tamen
ex se se nunq; amarum efficitur. Vincitur enim in
eo à frigore magis caliditas, q̄ ipsa uincat: proinde
etiam repositū acefcit. Ex tribus enim substā-
tijs qualitate dissidentibus (uelut supra quoq; di-
ctum est) constat. Prima quidē crassa, ex qua caseus
conficitur; altera pingui, ex qua butyrum: & ter-
tia aquea, quod serum nuncupamus. Verum ex hi-
sce pinguis quidem uel maxime temperata est,
crassa uero paulum ab ea declinat, at excrementū
illud serofum, & frigidum & humidum est. Quare
lac uniuersum à modice caliditatis corpore lon-
go intervallo relinquatur: quia, ppter ex se acefcit
potius quàm amarefcit. Ac si gustari posset, ubi in-
uentre & per uenas concoctum est, ipso etià melle
dulcius inueniretur. Nam quod foris & ex se
mel obtrinet, id dum coquitur, lac accipit. Et est ad
modum ingens in animalante calor extiterit, tātam
acquiri lac dulcedinem, quantam mel deperdit.
Rectaq; id ratioe euenit: etem quod summe dul-
ce est, ac proinde etiam nihil apponi ad eius dul-
cedinem possit, id ut in consequentem uerū per-
gat qualitatē necesse est. At cui quid deest, id per
concoctionem acquirit. Proinde sanè lac ubi cru-
ditatem in uentre perpetit, duplicē suscipit altera-

tionē. In frigidiore nanq; uentre acefcit: in calidi-
ore nidorolum amarūq; efficitur. Non tamen mel
coquedo unquā aciditate admittit: quippe cum
calidius sit, q̄ ut ubi non superet acefcit. Itaq; utra
que linguam mordicant, tū quod acidū est, tum
quod amarū, non tamen id tanq; propriū linguæ
sensus possidet. Quippe si in aliam quauis carnē
cute spoliata ipsa inieceris, & illā sanè etiā morde-
bit. Ex quo constat, mordacitatē à tactu propriē,
non à gustu sentiri. Quin & quæ acria appellatur,
uelut pyrethrum, alium, capra, non linguā modo
mordicant, sed & omnem reliquam nostram car-
nem: communisq; est mordicatio tribus istis sapo-
ribus, acido, amaro, acri. Verum acido quidem, ut
frigidio simul & subtili (nam & id sepe monstratū
est) amaro uero & acri, ut calidis.

Quod sapor acris omnium sunt calidissimi. Cap. 17

Quod itaq; sapor amarus calidus sit, modo ostē-
dimus. At de acri uocato, principio ne demonstra-
tione quidem est opus: præuertit enim sensus eui-
dentia, rationis fidem, quare nec quisquā de ipso
addubitaui: imò & Plato de eo tanq; omnium ca-
lidissimum pronunciat, tum Aristoteles quoq; &
Theophrastus. Atq; adeo nec ueteris, nec recentio-
rum quisq; est qui secus sentiat, quippe cū excal-
factio ex essentia eius sit ratione. Itaq; si uel ex ple-
be quēpiam roges, quid uocet edulit acris, dixerit
sanè, puto, quod fortiter dū gustat excalfacit, uel
ut piper, pyrethrum, nasturtium, alliū, capra, & id ge-
nus omnia: uide itq; id adeo saporū genus, cum ap-
pellatione careret propria, cōmuni per excellen-
tiam usum. Nā cū & sapor amarus, & sapor acidus
ambo etiā acres sint: in quo cūq; tamen corpore
uehementē cōperimus acrimoniā, tamen si neq;
amarum sit, neq; acidum, acris appellare cōsueui-
mus: quanquam multa in specie sint corpora eius-
modi: alia enim edi possunt, alia esui sunt inēpta.
Ea igitur quæ idonea sunt esui, dulcem quandam
saltem obscuram admittant habeant qualitatē
necesse est: proinde multis ipsorum pro osonio
utimur, multis uero ut cōdimētis tantū: at ut ei-
bo, ipsorū omnino nullo, idq; ob utrum uehēmē-
tiam. Porro eorū quæ non eduntur, alia mortifera
sunt, alia simpliciter medicamenta: omnia saltem
cuti nostræ imposita ulcus celeriter molliuntur.
Quin & horum quoq; nonnulla qualitatē quandā
amaram præferunt, quemadmodum esculentorū
quædam dulcem: non tamen uocantur amara
quando quidem hæc in eis leuis est & infirma, ua-
lida autem uis acrimoniæ. Sunt & quæ ne gusta-
re quidem audeas, cuiusmodi est thapsia, cantha-
rides, & ea quæ erosione aut putrefactione inter-
rimunt. Sed & horum gustum esse acrem ex ijs
conijcere licet quæ in toto agunt corpore. Multa
uero etiam ipso statim odore aliena sunt, planeq;
pugnantiam cum homine indicant, uelut & hæc
ipsa quæ nūc dicta sunt, & cicuta, papaueris, man-
dragora, & hyoscyami succus. Quin & nuper
quoque herbam quandam conspeximus, quam
Centurio quidam ex barbarica circa Aegyptū re-
gione comportauerat, odore adeo graui, adeoq;
inamēntē

inamœno, ut ne gustare quidem audeam, sed letalem esse conijcerem: utebatur autem ad urgentes articulorum dolores: atq; ipsi etiam laborantibus refrigerandi pollere facultate est uisa. Est autem colore subflauro, odore tam graui, q̄ cicutatini si q̄ leuem quendam instar aromati odoris adferat gratiā. Nomen herbæ ex qua succus hic exprimitur, lycopersiū esse dicebat. Verū de facultatibus deleterijs alibi tractabit. Scire autē oportet, acres sapores oēs (nam de istis agebat) summe esse calidos, ac deinceps post illos esse amarus: deinde uero dulces. Cum uero in omnibus ampla sit latitudo, is qui magis aut acris, aut amarus, aut dulcis est, magis quoq; est calidus: qui uero minus, tantū amittit caloris, quantū abest ab exacta gustus qualitate. Terminis autē seu finis saporis amari est abstergere: acris uero, urere: at dulcis, nutrire: ubi uidelicet in sua quisq; natura absolutus fuerit, hoc est, ubi quoad fieri possit, minime alienis permixti sint qualitibus: uelut amarus prorsum quidem est calidus: uerū qui modo admodū ex dulcimitate natus est, & minus amarus est, & minus calidus. At qui iadiū mutatus est, summe amarus est, & pximē ad acrē pertingit, ut nō abstergat solum sed etiā excedat et mordicet: uelut aristochia quidem, iris, & panax, id modo possunt, nēpe ulcera abstergere, atq; expurgare. At uitis agrestis, quæ Græce staphis agria dicitur, nihilo ab istis amaritudine uincitur, nisi uel ipsa quoq; uincat: est enim iam etiam acris, idq; ualde: tum multum quoq; calida, ut non sordem ulceribus auferat modo, sed & ipsam quoq; carnem colliquare possit. Porro quod in ulceribus nati sunt prætare amari sapores, id ipsum in corpus assumpti efficere ualeat: abstergunt enim, expurgantq; & quæ in uenis est crassitiem incidunt: quamobrem menses mouent, educendoq; ex pectore pulmoneq; puri auxiliant. Et in summa, siue crassa in eis pituita, siue pus, siue aliud quippiam cōtineat eiusmodi, expurgant: eaq; ratione & comitali morbo cōpetunt, quicūq; cetera naturā nō habet deleteriā ac uenenosam. Illi enim toto genere prætere naturā sunt. Sed & ijs qui sanguinē spuunt, noxijs sunt: quippe cū isti adstringentia & uiscosa, non incidentia diuidentiaq; exposcant. Atq; hæc quidem iam quadantenus curandi attingunt methodum.

Qua differunt amarus acrisq; sapor: Quod amarus præter quā quod calidus sit, etiā est siccus: acris, utiq; qui nō exactus est, uerem quandam humiditatem obtinet: Cap. 18

Postea uero quæ de saporibus amaris definiuimus, diximusq; quod incidenti uim habeant & extenuandi, tum abstergendi, ac nimirum etiam calfaciendi, hæc tamen, ut non urant, rursus ad acres orationē uertamus. Ac primū exacte ipsos calidos dicimus, deinde exedentes, urētes, crustam molientes, ac deniq; etiā colliquantes, eosq; uel cuti impositos esse huiusmodi. Sin intrō in corpus sumantur, siquidem tota substantia animanti cuiusq; summe aduersentur, putrefacientes, eiusq; generis animantium deleterijs. Sin caloris duntaxat immoderatione, si crassæ sint essentia terreeq;

A interiora exulcerādi pollere facultate: sin tenuis, urinā mouendi, sudoresq; ciendi uim habere: in summa autē, incidendi, & digerendi per halitū. Ex quo genere quidam tum exspuitionibus ex thorace, tum mensium motibus auxiliantur. Cæterum quādo sit, quomodo, & qua methodo utendū, nō est præsentis tractationis exponere: de omnibus siquidem eiusmodi in curando methodo differretur: quare de acrium saporū natura plura scribere super se debō: sat enim fuerit distinctiones adijcere exactiores, quibus ab amaris differunt. Nec enim sola caliditate uehementi ab illis diuersi esse consueuerunt, sed q̄ amari omnes non modo calidam habeant facultatem, sed & siccam, cinerem (uti eos quis optime comparet) adsimiles. Acres autē, quicūq; utiq; amari nō sunt, multam interim humiditatem admixtam habent, proindeq; corporū eiusmodi nō pauca à nobis esitantur. Porro quod non calidus modo, sed & siccus est omnis sapor amarus, in primis nos maximeq; discreta docet experientia, de qua sæpenumero uerba supra fecimus. Iis uero qui præter experientiā per rationē etiam scrutantur, similiter accidit. Admodū itaq; ex calfactis dulcibus, siue ab igne, siue à calore ingenuo, amarorum corporum constare generatio nē indicauimus: quæ porro uis consistentia quoq; sicciore apparent: tum uero quoniam absumatur semper ac defluat ab eis humor in uaporem à calore solutus, necesse est reliquum terrenū siccisq; effici: quippe cum dulce præterq; quod calidū sit, siue plus, siue minus, necessario sanē & humidum plus minusue existat. Si autem eorum corpora nostra natura maxime est simile, ipsa uero sit temperate tum calida, tum humida, id quod ex dulci superaffato prouenit, perinde ut calx cinisq; calidum siccūq; necessario efficitur: proinde abstergere quoq; cōminuere, secare crassos uiscososq; humores, sicut cinis & nitrum, est natum. Nec enim aerea est neq; tenuis, neq; aquea eorum consistentia: sed, ut paulo ante dictum est, terrena, exacte à calore elaborata, ac uelut superaffata ipsorum essentia. In comparatione ergo adstringentium quidem, non parum ijs tenuiora sunt medicamēta amara, ut ad acria uero, crassiora: quamobrem neq; facile crassos uiscososq; humores pertranseunt, uelut ea quæ sunt tenuiora essentia, nec incidere perinde ut crassiora nequeunt. In medio autem utriusq; excessus sint oportet quæ incitura sunt, nempe ut neq; prompte penetrēt perinde ut flamma, neq; dum cunctantur tardantq;, dissecare nō possint. Verū de istis in sequenti lib. qui ex ordine est quintus, tractabit. Nunc autē tantū nouisse suffice rit, q̄ qualitas omnis amara calidis simul siccisq; subitantijs accidit, & præter hæc tenuibus & terrenis. Inaudiendū est autē totum quod dicitur coniunctū, haud quaquā utrunq; separatim legēdū. Nam sic pugnare cum terreno uideatur tenue. Verum non simpliciter tenue, sed ut in terrena consistentia tale esse amaram assero, uelut calx & cinis, & quicquid exacte peraffatū fuerit, cinisq; redditum: forte autem uerius adsimiles fuligini,

ac ipsius flammæ fauilla: quippe quæ gustantibus apparet amara. Ergo crassum & terrenum est corpus, ferrum, ac lapis: fauilla autem & cinis tenuis. Ignita itaq; ferrum lapideq; calce cinereq; sunt crassiora, multoq; magis quam fauilla: ad hæc quoq; & calidiora. Sed ferro lapidique ignito, ea quæ per erosionem interimunt medicamentâ, similia sunt; quæ à corporis nimirum calore hæc perduntur: uelut chalcitis, mysi, fori, ad hæc arsenicû, hydrargyros, lithargyros, et alia innumera: crassum enim sunt partium id genus omnia, ac potestate calida, ac proinde temporis spacio accensa per eam quæ est in amante mutationem, non aliter quam lapis ferumq; ignitum uentrè tum exulcerant, tum exurunt, cum scilicet in corpus distribui præ gravitate haud possint. Isthæ autem subtiliora sunt, tã et si & ipsa terrena sunt consistentia, calx, cantharis, lepus marinus; quorû quædam usq; ad theoricis pertingunt regionè, quædam uero usq; ad uescicâ & pectus, in tanto interim itinèris spatio igneam acquirètia naturam. Porro aristolochia & iris his etiam subtiliora sunt: quippe quæ tum humidæ essentia, tum aeris plus quam illa obtinent; quod hinc constat, quod neq; adeo sint sicca duraq; neq; adeo grauiâ, quapropter & deleteriû effugere genus. Sanè uero & cantharis, præcè interim sumpta quibusq; oportet admitta, præterquam quod uescicam nihil offendat, etiam renes expurgat: imò et quæ efficaciora conficiuntur ad urinas mouendas medicamenta, nonnihil habent cantharidis. Sed de hiscè aliàs habebitur sermo.

*Quod sapor amarus insit corporibus temperantio siccis;
& si planè amarus sit, esculentus nõ sit. Cap. 19*

At amarus sapor quod siccis temperie corporibus insit, hinc colligere licet, quod & minime omnium amara putrescant minimeq; uermes aliq; nonnulla animalcula, qualia in radicibus herbisq; ac fructibus putrescentibus prouenire solent, procreent. Maxime namque uidemus in humidis nasci corporibus uermes ac putrilagineum: At quæ exacte amara sunt (uoco autem ita quæ nulla sensu notabili alia participant qualitate) omnibus prope animantibus, nedum hominibus, esuri incepta sunt; quippe cum animal omne plus minusq; sit humidum: amara autè, sicca: haud aliter quam cinis & puluis. Itaq; neq; cinerem, neq; puluerem, neq; fauillam, neq; calcem animal ullum esurat, neque eorum quæ planè amara sunt quicquam. Absinthium enim non solum amarum est, sed & adstringit; marina uero aqua salua potius est, quam amara, plurimum in se habens aquæ potabilis: id quod & ab Aristotele olim satis est demonstratû. At aqua quæ est in lacu Palestinæ in caua Syriæ, quem alij quidè mare uocant mortuû, alij stagnû bituminosum, gustatib. nõ salua modo, sed & amara est. Saleum uero etiã habet ex sese natum, perinde amarum: primoq; statim aspectu unã cum uniuerso mari tum candidior, tum crassior apparet, salugini meræ similis: in quam si salein inijcias, ne liquiri quidem etiã possit: plurimû em̃ eius in se habet; ac si quis in eam se mergat, continuo sale te-

A nuissimo uelut conserpus undiq; emergere conspicitur. Quapropter etiam aqua illa quam cætera marina grauior est, idq; tanto pondere quanto fluuiali marina. Itaque ne si teipsum quidem dimittas, in profundum deferri possis: ita attollit eleuatq; aqua; nõ sanè quia natura leuis sit, quod quidam ueterum sophistarum prodidit, sed ut celsiuit Aristoteles, propter grauitatem instar lutu quæ leuiora sunt gestans. Proinde si hominè ligatis manibus pedibusq; in stagni illus aquam conieceris, deorsum haud feret: quin uerò sicut naues in mari onera plura quam in fluuijs citra submersionem portare ualent, eundè in modum in stagno mortuo multo plura quã in mari. Tanto enim est què in illo est aqua, marina grauior, quanto marina lacustri aut fluuiali. Inest enim ei salis substantia, quæ terrea grauiusq; est. Ipsiç tibi marina, si lubet, efficerè licet sale in qua fluuiali colliquitur, cognoscerè quanto grauior reddatur aqua eiusmodi q; sit dulcis. Quin & modum iam inuenerunt, moderatam ad salindû conficiendâ falsuginè, si ouè in ea uideatî natare. Nam ubi etiam nõ sidit, ac nondum super falsuginis superficiè innatat, aquosa magis est & dulcis: grauius uero salua est, ubi tanta est salis copia indita, ut amplius liquari qui postea adijcitur nequeat. Quam aquã si pendere nõ grauable ris, omniû aquarû cõpèries grauisimã: Itaq; egò quandoq; inanè esse diuitis cuiusdam ambitionè ostendi, qui tantã in Italiam maris mortuã aquam deuexit, quæ cisternã implere posset. Nã id ipsum ego expedite præstiti, sale plurimo in aquam potabilem cõiecto. Longe etiã grauiorè etiusmodi efficeris aquam, si quam plurimû salis liquatum sub Canis exortum, ubi potissimum aestus uis fuerit ualentissimus, torreris siueris, haud aliter quam in stagno bituminoso: sic enim hæc aqua perinde ut illa grauis efficitur; ac si ligatum hominè, aut aliud animal, in ipsam conieceris, instar nauis super aquã feref. Quin uero & amarior protinus quoq; eiusmodi erit aqua, si decoquere ipsam in igne lubeat. Nam quicquid salsum plusculum exaltesceris, amarû tibi euadet. Sic & ipsius bituminosi lacus aqua in caua calidaq; regione contenta, dum sole torretur, amara efficitur: proindeque aestate quam hyeme amarior est. Ac si quid eius haustum in uase cauo regionè que aprica (quemadmodum rios effecimus) aestiuo tẽpore depõnas, cõtinuò amarior sese reddita uidebitur. Verum hæc omnia ijs quæ paulo superius de amari generatione diximus, abunde subscribunt. Cæterû cuius gratia oratio ad bituminosum digressa est stagnum, id nondum omne expositum est: nullum enim in eõ neque animal, neq; planta inesse conspicit: imò cum duo in eum fluuij confluant longe maximî, pisciumq; copia fecatetes, maxime qui propè lericiontem fluit, quem Iordanem nominat, nullus omnino piscium fluuiorû ostia excedit: ac si captos quis in lacum inijciat, celeriter mori conspicit; adeo est omnibus tum hominibus, tum plantis inimicû quod exacte amarû est, & quod squalidû pariter & siccum est, atq; natura uelut fuliginem ab exaltatiõe

referens. Quamquā ne illius quidē stagni aqua ex acete amara sit: quippe cū nec ipse sal. Vocant autē eum Sodomoniū, à circumiacentibus stagnū montibus, quos Sodoma appellat. multūq; ipsūm ac colā ad omnia, ad quæ nos alio utimur sale, accommodat. uis eius nō modo plus q̄; cufusius alterius salis exicatoria est, sed & extenuare nata: quia scilicet plus q̄; alius exalfatus est. Omni enim salī ob scura quædam adstringendi uis inest, quæ eas quæ condium carnes cōstringit, dēfatq; potissimū ubi durus & minime fragilis extiterit. Talis est exactissimus quidē fossilis ferē omnis; Minus autē illo marinus: tum qui multis in locis aquis leuiter falsifere cōtibus prouenit; Tertiu locū obtinet, abstergere magis quā adstringere cōtrahereq; potēs; Proximas his uires habet Sodomiticus, æque atque marinus durus; cæterum ob admistam amaritudinem, facultatem ualentius abstergentem ac digerentē quā marinus possidet. Sic & nitrum ipsūm, & ipsius spuma, & quod composita appellatione uocatur aphrolitrum, cæteris magis extergere possunt, nempe quia minime adstringunt, et exacte sunt amara.

Quod sapor salis calidus fit & terrestris, eaq; ratione quæ dantenus saporis amaro similis. Cap. 20

Etem propinquus est sapor salis amaro: quippe terreni ambo sunt, & calidi: nō obscura tamen diuersitate dissident, quod uidelicet amarus à colore arido plus sit extenuatus & elaboratus. Sic in genere salis, qui durior est & densior, terrestriorq; qualis ferē est uniuersus fossilis, minus calidus est, subtiliorq; minus partium: qui uero rumpi facilius, laxusq; tenuior simul & calidior est; in quo genere est & qui subamarus est, mediā quodammodo naturam inter salē durum & aphronitru obtinens. Sanē & inter aphronitra quædam sunt dura crassaq; essentiæ, quæq; nec facile liquari in aqua queant. Verum de ijs que iuxta nominis rationē, essentiā habent spumosa, qualis utiq; est ipsa nitri spuma. Est enim ea omnium modo dictorum tenuissima: uelut & Asiæ petreæ flos: multum em̄ & hic quoq; tenuis est, sed aphronitro minus calidus. Quare utiq; carniū excrementiā minore cruciatu colligat: mordicat autē eas nitri spumæ; mordicat uero & aphronitru, nec secius quoq; & ipsūm nitru, tametsi illis sit minus calidū. Verū si pra mouimus, essentiā crassam plus erodere, ubi nimirū calorem quandam acta fuerit. Nulla em̄ eius pars sine cruciatu celeriterq; transit, sicut eius quæ subtilis est, uerum retenta & immorans actar dans, plusculoq; tempore unī corporis nostri particula in herens, haud immerito molesta redditur instar palī carni infixi.

Quod odorata omnia calida, Cap. 21

Cæterum ubi de saporibus omnibus, quæ conuenire uisum est, exposuimus, reliquum fuerit de odoribus differere: quippe cum huius sensibilium generis gratia, odoris sensum natura crearit. Sanē pleriq; similiter saporibus nos afficiūt. Siquidem acida omnia, & ante ista ipsūm adeo acetum simi-

liter odoratum gustumq; mouet: tum acria quoq; uelut allia cæpe, et ipsa non minus q̄; gustum, odoratum quoq; offendunt, mordicantq;. Sic in alijs singulatim similis propemodū est odoris sensus sensui gustus. Itaq; quorundā corporū, etiam non gustantes, qualitatē cognoscimus, ueluti fimi: proinde omnino ne gustare quidē aggredimur: quia scilicet admodū fides habeat odoratum. Quinetiā si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta, odore nos suro offēdit, protinus ea abijcimus haud gustare dignati: fereq; in omnibus mutuo consentiunt odoratus & gustus: attamē in odore suauissimis, uelut rosa, plurimū differunt dissidētq;: tantū enim abest ut gustatibus suauia sint, ut amaritudinem non paucā præ se ferant, tametsi amarum nunquā odoratum est, neq; ut medicamen nobis suauē, neq; ut cibus. Quamam igitur huius sit dissonantiæ causa, licet Theophrastus quæsiuerit, tamen præstiterit & quæ nos de ea cognoscimus exponere. Amari saporis generationē ex dulcibus à calore extenuatis prouenire iam clare docuimus: apparuitq; calidiora simul & tenuiora tēperie esse amara, q̄; dulcia. sed & odoris sensus in ipsiſ cerebri est uentriculus, uelut & id quoq; alibi à nobis demonstratum est: & odorabilem uaporosa est substantia. Ea enim quæ à corporibus defluunt, ambientī permista, ac deinde per narium inspirationē in cerebrum delata, sensum mouent. Recta ergo ratione, quæcūq; uaporosa, omnia eadem & calida sunt: quippe cum uaporum copia à calore proueniat, non tamen protinus quicquid odoratum est, suauē esse colligitur. Siquidem non omne id spiritū in cerebri uentriculis cōtento familiarē est. Etenim quemadmodū qui linguæ obueniunt saporē, ij qui familiarissimi, ij dē & dulces erant: qui uero non familiares, complures habebant differentias: ita odores qui familiares sunt cerebri spiritui, ijdem & grati sunt & suauē: qui uero nō familiares, multis differētis à sese mutuo dissident. Cæterum non omnino imposita sunt nomina perinde ut saporibus. Dicimus em̄ quippiam acidum acremq; habere odorem, sed austerum, acerbum, salsum, aut amarum haud etiā dicimus. Verum in hæc duas appellationes odora bilium pleraq; reducimus, beneolentia, et graueolentia appellantes: beneolentia quidem proportione quadam ad ea quæ linguæ sunt dulcia: graueolentia uero ad ea quæ non dulcia. uo enim nomine totū hoc in saporibus genus appellari nequit. uidetur autem à corporibus non odoratis aut omnino paucum defluere, aut quod pro mole sua nō sit moderatum, sicut in ijs quæ exacte tum salia, tum acerbā sunt. Exacte autē cū tale aut tale quid dicimus, syncerum, & quantū fieri possit, alterius qualitatis expers dicimus. Siquidem crassa utriusq; essentiā est, & ad hoc acerbiorum etiā frigida, quare uerisimile est, quod ab ijs defluit, paucum esse & crassum, & mole sua ter reum, ac proinde per inspiratio nem in cerebrum non incidere.

Quod

Quòd neq; ex odore, neq; ex colore certo quid definiiri de medicaminum temperie possit. Cap. 22

Itaq; haud solida res est, ex odore de sensibilitu temperatura conijcere perinde ut ex gustu. Nam quæ odore caret: crassam quidem essentiam obtinent: cæterum quæ sit eorum in calore frigoreq; natura, id uero nondum constat. At quæ odorata sunt, tenuia utiq; sunt quadantenus & calida. Verum eius tenuitatis caliditatisq; quantitas haud etiam indicatur. Porro maxima potissimaq; causa, quamobrem in odoratis nihil euidentis de temperatura iudicari queat, inæqualitas est substantiæ, de qua sæpenumero uerba mihi iam habita sunt, ubi demonstrabam, corpora pleraq; dissimilari esse substantia. Ac nunc quoq; etiam claritatis gratia in exemplo proponam, nempe rosam, quæ non ea modo ratione dissimilari est, qua pars quidæm eius continet, pars uero continetur (cotinens quidem, durum & terreum: quod continetur, succus est humidus) imò & succi ipsius tria sunt extremata, quemadmodum supra necessarium esse demonstratum est: unum terreum, quale est in uinis faxæ; alterum aereum, quod ipsum quoq; uini flori proportionè respõdet: tertium aqueum, quod in omnibus bullitione efficere corruptioneque diximus, ubi nimis neq; deuictum, neq; planè alteratum ebullitionis tempore fuerit. Sanè huius extremæ gratia quidam succos non nisi coctos reponunt alij in sole feruenti præscicatos: nam terreæ aerisq; gratia non admodum corruptumdes metunt, cum ea & separari uideant, ægreq; corruptibilem sortita substantiam: quando quidem temperamentum natã sunt siccum. Sed de istis supra abunde disseruimus. Cæterum in rosæ natura aliud gustantibus acerbum est, quod terreum ut sit & crassum frigidumq;, necesse est: aliud uero amarum, quod tenue est & calidum: & tertium in his aqueum, necessario quidè frigidum, sed in tenuitatis cras-

fitudinisq; oppositione quadantenus summorum medium: cuius mixtura neq; ipsum illud adstringens, neq; ipsum amarum, summe est tale quale dicitur: qualitates enim omnes exloquit aquei admistio. Ipsum itaq; hoc aequum elaboratū extenuatumq; atq; excalfactum quodammodo uidetur, ac proinde facile in uaporem solui, & hac ratione rosam tum odoratam esse, tum celerrime resiccari. Atque hæc omnia de eo ex gustu conijcias: at per odorem haud æque, quippe cum non æque omnes eius partes euaporent, nec perinde sensum moueat. In gustu autem omnes similiter gustabilium corporum partium in linguam incidit, sensumq; mouent pro sua natura singule. Quare certum tutumq; non est, de tota medicamentorum facultate ex odore conijcere. Nam ea sola agnosci possunt quæ modo posuimus. Multo minus ex coloribus de medicaminum uirtutibus colligere quid ualeas: quippe cum in singulis coloribus calida, frigida, humida, siccaq; reperias: quemadmodum in primis huius operis cõmentarijs ostendimus. In quoq; tri singularium genere aut feminis, aut radicis, aut succi ex colore indicatione quandam liceat sumere: utpote cæpa, scilla, uinũ, quantum fuerint albidiora, tanto & minus sunt calida: quæ uero subflaua suluatq;, calidiora. Idem usuuenit tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri, ireos radicis, asphodelisq;, alijsq; compluribus. In quoq; eum genere in uniuersum fulua, flaua, rubraq; omnia albis sunt calidiora. Itaq; & si hinc quoq; de medicamentorum uiribus cõiectura fieri queat, tamen sermoni adijciatur, optimi sanè esse (ut & dictum & ostensum sæpenumero est) per experientiam discretam facultates inueniri. in hac enim falli non possis: quanquam prius quam experientia uirtutem agnoscas, gustus pleraq; indicet, pauculum etiam approbaate ipso odore.

ARGVMENTA CAP.

LIBRI QVINTI.

Proœmium. Cap. 1. De usu medicamentorum. 2. De pus mouentib. atq; emolliētibus medicamentis. 3. Tribus modis dicitur molle & durum, partium ut extreme tale: partium ut per excellētiam: partium ut ad symmetrum quous eiusdē, aut speciei, aut quiduis obuii. 4. Quot modis sunt duræ: Nemp; aut resiccatione, aut concrectione, aut nimia impletione, aut harũ cõiugatione quapiã. 5. De medicamentis pus mouentibus. 6. De ortu scitri. 7. Emollientia medicamēta in hoc à pus mouentibus differunt, quod emollientia calidiora sunt, & moderate desiccant existentem in partibus humiditatē: Pus aut mouentia corporibus nostris similem calorem obtinent, atq; existentem in eis humiditatem seruant. 8. Quod pus mouentia etiam emplastica esse cõueniat, &c. 9. Quod medicamenta in durantia humido frigidof; sint temperamento. 10. De detentibus laxantibusq; medicamentis. 11. Quod poros purgantium medicaminũ unum quoq; calidum sit & tenuium partium: nam amara omnia, & nitrofa sunt. 12. Quod urinam cientia ex acrim genere sint, ac proinde calida & sicca, tum quod sanguinem serofum segregent, crassum uero cogant. 13. Quod rarefacientium temperies moderatã sit

tum caliditatis tum siccitatis, consistentiæ uero tenui partium: Anastomitorum autem tum calidior, tum etiam mordax atque acris ac crassarum partium: Porro condensantium astringens atque aquea potius: Stipantium autē siue stegnoticon, crassarum partium & frigida. 14. Quod escharotica crassæ sunt consistentiæ, ac uehementer caustica siue arentia, a cædo ut corpus sensibiliber colliquent. At septica, uidelicet non dicuntur proprie caustica, & ipsa colliquare sunt nata, non tamen tam ualenter quam escharotica: ad hæc consistentia sunt tenui, ac proinde latenter molliuntur colliquationem. 15. Quod cicatricem inducentia medicamenta constrictoria esse & desiccatoria cõueniat: quæ uero ulcerum cauamplēt; mediocriter ex tergentia & morfu uacantia. 16. Quod attrahentium essentia & calida sit, & tenuium partium: Repercutientium uero, & frigida, & crassarum. 17. Alexiteriarum & alexipharmacarum facultatum, quædam alterando quod mortiferum est, iuant; quædam uero euacuando. Et earum quæ alterant, alia una aut duabus qualitatibus agunt: alia tota essentia. Similiter quæ euacuant, quædam substantiæ similitudine euacuant, quædam facultate subtili ac tenui.

18. Quod anodynorum id est dolorem sedantium, & paregoricorum, id est, lenientium aut mitigantium uocatorum medicamentorum, quædam reuera sunt eiusmodi, uelut calida coniuncta habentia partium tenuitatem: Alia uero nomine duntaxat; uelut narcotica, id est, stupefacientia, qualia sunt refrigerantia omnia. 19. Duobus modis dicitur cathartica, id est purgans facultas: aut enim quocunq; modo expurgas corporis recrementa, aut quia uim attractoriam familiarium succorum obrinet. 20. Quod lagacenerium aut semen prouocantium facultas moderate sit calida & humida: Alimentorum uero totius essentia consistat similitudine. 21. Quod menses mouentium medicaminum facultas calidior est & modice, defecat: Alimentorum uero est secundum totius substantia si-

militudinem. 22. Quod quæ semen prouocant, quorundam ut medicamentorum quidem facultas est flarua & calida: aliorum uero ut ciborum, flarua quidem etiam, sed tota substantia familiaris. Quod bechica, diuretica, sputum uel excretionem educentia, lac & menses mouentia, omnia sunt attenuantis facultatis, &c.

23. De facultatibus à corporis partibus cognominatis: de quibus etiã in præcedenti capite non nihil.

24. De inani nominum usurpatione, quam medicamentorum, & inter eos maxime methodici induxerunt: scilicet metaphyncritica quædam medicamina appellando. 25. Quo pacto contrarias indicare facultates oporteat.

26. De limitatione ac finitione ordinis cuiuscq; ex calfacientium, frigefacientium, humectantium, & deficcantium.

GALENI DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM FACVLTAIBVS

Liber quintus.

PROOEMIUM



VINTVM librum de simplicium medicamentorum facultatibus orsurus, ea primū repeteram, quæ supra demonstrata in rem præsentem censeantur accommodata, sumpto ab elementis principio, aqua, uidelicet, igne, aere, ac terra, quæ nonnulli à qualitatibus denominantes, humidum, calidum, siccū, & frigidum esse aiūt. Sunt ergo qualitates hæc, humiditas, siccitas, caliditas, frigiditas. Quæ uero ab illis denominatur corpora, ea sunt tum cōmunia omnium elementa, tum ea quæ per harum excellentiam aut humida, aut siccata, aut calida, aut frigida nuncupantur, tum ea quæ ad conueniens siue symmetrum generis eiusdem ad speciem conferuntur, quæq; ad quiduis obuium. Sane de horū differentia frequenter tractauimus, nec minus diximus quatenus differat nutrimentū à medicamento, & quod nutrimentum uincitur ac superatur ab eo quod nutritur, medicamentum autem contrariū ipsum enim uincit atq; superat corpus cuius fuerit medicamentū: quippe cum utriuscq; referat ad aliquid notio. Ostensum præterea est, medicamentū alterare natū esse aut una quæpiam qualitate, nempe aut calfaciendo, aut refrigerando, aut humectando, aut siccādo, aut dictorū cōiugatione quapiã; aut tota sui substantia, sicuti cōplura letalium medicamentorū, nec pauca alexiteriorum seu amuletorū, tū purgātia omnia, ac pleraq; eorū quæ epispastica, hoc est attractentia nuncupant. Sed de istis quæ reliqua sunt infra adijciam. Quæ uero una duabusue qualitatibus in unum corpus nostrū agunt, ea in hoc lib. exponā, rursum hic sumpta hypothesis superius demonstrata, q̄ simplicium medicaminū pleraq; dissimilium sint partium, req; uera cōposita; cæterū appellari simplicia, quod cuiusmodi sunt, talia natura sint, nec quicquam ex nostra industria assumperint; quin etiam quædam crassarum sunt par-

tium, & terrena suis substantijs, quædam tenuia & aerea, alia uero aquea, & dictorū media. Hæc cum sint superioribus libris demonstrata hypothesis mihi sunt, ad ea quæ nunc dicenda ueniunt. His ergo propositis ordiēda iam oratio est.

De usu medicamentorum. Cap. i

Vsus est frequenter hominibus medicamentorum ob id ipsū tantummodo, ut aut refrigerent, aut humectent, aut calfaciant, aut siccant, aut per coniugationem horum quid agant. Interim uero, ut quod supra modum laxatum est contendat atque contrahant, aut quod intensum est laxent, aut quod condensatum est rarefaciant, aut rarum condensent, aut durum emolliant, aut immodicam mollitiem ad duritatem reuocent, aut plenum euacuent, aut uacuum impleant, aut generis eius aliud quid agant. Nam quisquis perfrixerit, non medicus tantum, sed cuius etiam ex plebe, ab ipsa rei natura ductus, calfaciens medicamentum inuenire desiderat. aut ardenti febre est uans, quod refrigeret. Sic priuatus quispiam si ulcus ha beat nimis molle ac humidum, id medicum desiccare iubet; aut si siccum & exuccum, humectare. Quinetiam cum siccitatem pariter, atq; caliditatem toto corpore percipiunt, ceu qui aestuant, siue uesti sunt, aut defatigati, lauari expetunt, frigidamq; bibunt, tum quidquid refrigerare, simul & humectare potest, studiose exquirunt, uoti q; sæpe cōpotes fiunt, atq; ipsa natura duce eorum remedia pleriq; idiotarum inueniunt. At phlegmones, scirrhi, cedematis, erysipelatis, putredinis, herpetis, gangrenæ, nullus ex illis sibi remedium peruestigandum sumit, tanquam unumquodque eorum maius iam sit quam pro captu hominis plebei, ac scientiam requirat uenerabiliorum. Eam scientiam nuncupant Medicinam, & qui eam exercet, Medicum. Atq; hucusq; & ipsi procedunt, ut sciant ulcus cauum carne impleri, sordidum purgari debere, aequabile cicatrice induci. Non tam enorū quid carne impleat, quid purget, quid

cicatrice inducat. Sic sanè etiam si musculus ha-
 beant durum aut tensum laxum uel, quòd duro
 quidem mollitibus sit opus, tenso autem laxan-
 tibus, laxo uero cõtendentibus, id satis perspici-
 unt, non tamen compertum habent, medicamen-
 tum quòd aut emolliat, aut laxet, aut contendant,
 sed ea inuenire opus est medicì. Siquidem inueni-
 as ex plebe quosdã, qui non secus atq; medicì me-
 dicamentorum pollutent inuentione, sed hæc tenus,
 dum calida modo ac frigida, humida ac sicca per-
 quiritur: uerù in ijs quæ modo dicebamus, pror-
 sum rudes reperias. Tamen si, ceu ante nouimus,
 haud omnibus tum calfacientium, tum refrigeran-
 tium, tum humectantium, atq; exiccantium, æ-
 que facilis est atque expedita inuentio. Quippe
 quòd napy pyrethrumq; ex calfaciunt, & portula-
 ca solanumq; refrigerant, tum aqua & oleum hu-
 mectant, & acetum & marina aqua deficcant, pe-
 nne omnibus non medicis duntaxat, sed & idiotis
 confessum est. Atroraceum an ne calfacere, an re-
 frigerare dicendum, similiter acetum, oleum, &
 eius generis non pauca, ingenti contouersia iac-
 tata sunt. Verum de talium facultate in quatuor
 ante hunc libris disputauimus. In primo ac secun-
 do sophistarum redarguentes epicheremata, seu
 in utranque partem ratiocinationes monstran-
 tes ueramq; methodum, cuius quis ductu medica-
 mentorum facultates inueniat. In tertio, misis sò-
 phistis, omnes ab initio logicas exposuimus quæ-
 stiones, quibus maxime insistas, quibusq;, ut sic di-
 cam, artificiosè efformatus, idoneus sis ac sufficiens
 qui medicamentorù omnium facultates inuesti-
 ges. In quarto de proprijs linguæ sensorijs differui
 quos sapes appellat, id indicans, quo pacto
 hinc orsus, primas inuenias tum qualitates, tum fa-
 cultates. Artigi porrò etiã in extremo libro qualita-
 tes odoratus, docens quantum sitidem & hinc
 iuuari queas ad primarù inuentionè facultatù. At
 in hoc quinto libro aliud mihi propositum est fa-
 cultatum genus expromere, quos uocare potes se-
 cundas ac tertias post primas & omnium cõmunes.
 Siquidem cum particulatim unum quodq; nõ pa-
 tri modo ex illis temperatum sit, aliud, puto ex ijs
 laxatorum euasit, aliud intensorium, aliud emolli-
 ens, aut indurans, aut rarefaciens, aut cõdensans;
 tum ex operibus quæ edere nata sunt, facultates in
 se habere dicta sunt rarefaciendi, cõdensandi, e-
 molliendi, indurandi, inslinendi, extergendi, attra-
 hendi, repellendi, ad hæc laxandi, cõtendendi, ora
 referandi, ac cõtrahendi, incrassandi, extenuandi,
 dolores sedandi, ac ciendi (illas *αὐθιγνός*; has *ὀδυ-
 νούρας* nominant) cõcoquendi, puris mouendi, di-
 gerendi per halitù, sudoris prouocandi, saponis cõ-
 cilian-di, stuporis accersendi, animù alienandi (*ε-
 κσεληνός* nũcupant) putrefaciendi, urendi, eroden-
 di, crustam faciendi, fundendi, densandi, succum
 prauum procreandi; attèrpendi, purgandi, sisten-
 di, exasperandi, leniendi, infarciendi, factu libera-
 dit: ac cum ulterius etiã procedunt, ac propè parti-
 culatim opera appellant, urinas ciendi, uomitus
 proritandi, subducendi uentris, ac lubricandi, per

Galen.

nares & os purgandi, quas *ἰσχυρὸς* & *ἰσχυρὰ* uo-
 cãtis uocant, menses mouendi aut comprimendi,
 similiter lactis ac seminis tum generandi & extin-
 guendi, tum prouocandi & reprimendi, magisq;
 etiã cù à iecore hepaticas, à liene splenicis, ab auribus
 oticas, ab oculis ophthalmicas, à dētibus, odonticas,
 à coxalifthyadicis, à renibus nephriticis, à pedibus
 podagricas, ab articulis arthriticis, à costis pleuriticis,
 à tulsis bechicas, & à calculis cõmnuendis *ἰσχυρὸν ἔργον*
 facultates uocitat, ad particulares perueniunt. Pari modo
 quædã dicta est à procreanda in ulceribus carne facultas sarcoti-
 ca, ab inducenda cicatrice epulotica, à glutinãdo
 collectica, à purgatione cathartica, ab excrecentia
 carnis detrahenda cathemetica; fereq; numerari ne-
 queant omnes particulatim facultates, si ab uno-
 quoq; singulatim eorù quæ perficiunt deflexa il-
 lis imponere nomina aggrediamur. Sed præclaris
 us sanè ac methodo dignus est, si missam facien-
 tes orationè tum prolixam, tum confusam, cõmo-
 dis speciebus cõpositas medicamentorù facultates
 cõpendio definiamus, non puris mouendi aut
 mitigandi, aut doloris sedandi, aut per halitù dige-
 rendi, aut laxandi in triticeæ farinae cataplasinate
 facultatè inesse dicentantes, sed modice tum humi-
 dam, tum calidã: superius namq; positũ est, in quò
 significato eiusmodi dictionè efferrimus. Similiter
 non urinas, aut menses prouocans, aut bechicum
 esse medicamen, aut pleuriticis, aut peripneumo-
 nicis, aut purulentis (quos *ἰσχυρὸς* uocant) cõgru-
 ere, aut morbis comitalibus, & spasmis, & palpi-
 tationibus, & tremoribus, & ruptionibus, & spas-
 matibus prodesse, neq; carne implere, aut purgã-
 re sinuosa ulcera, aut lateris, iecoris, lienis uel dolo-
 res sedare, neq; choerãdas discutere, aut ex ossibus
 carnes educere; ad eundè modum neq; geniturae
 profluuio congruere, aut in uteri fometa utiliter
 misceri emollientè & referantè: quin nec quòd ne
 uos & ephelides detergeat, & inueteratũ capitis
 dolorè sanet, aut scetũ corruptum detrahat; sed
 sufficit hæc tenus dixisse calidam, hæc tenus siccã,
 & cãtenus tenuitũ partũ illis obuenuisse tẽperiem;
 sicq; tum omnia quæ nunc memorata sunt, tũ lon-
 ge item plura indicasse: quin alio quoq; modo de
 ea dixisse fat est amarum esse, sed non extreme, im-
 mo ita ut dulcedo quædã admista appareat. At pri-
 mus docting modus empiricorũ proprius est; se-
 cundus uirũ potissimũ rationalem decet; atq; hæc
 mihi nunc exponere statutum est.

De puris mouentibus, atq; emollientibus medicamentis. Cã. 2

Cæterum uniuersa ea quæ quatuor superiori-
 bus libris sunt dicta, propria sunt ipsius de medi-
 camentis speculationis, nisi si quando per affinita-
 tem curandi methodũ sermo attingit: in quo nũc
 uersamur, ad illam magis pertinet; quapropter sæ-
 pe cõsiliũ mihi fuit, omnino intactum præteri-
 re. Verũ quãdoquidẽ uisum est præexercẽdos esse
 eos qui allequi debent curandi rationis intẽtio-
 nes, & pleriq; ex amicis, potissimũq; ij quorum in-
 gratiam hunc tractatũ cõscribere sum aggressus,
 ita me facere cõsuerũ: idcirco sermonẽ hunc hoc

in libro absoluam, sumpto exordio ab emollientibus, & pus mouentibus. Quæ cum utraq; sint calida humidacq; diuerso tamen utrunq; modo. Hæc ceu simillimū corpori in pus mouendo calorem producentia, absq; ulla existentis in eo humiditatis, aut cōsumptione, aut adiectione; illa uero ceu maiorem quā pro natura accidentia, ac nonnihil quoq; humiditatis contrahentia. Porrò respiciua est notacq; pus mouentiū notio. Siquidē suppuratio in pus est mutatio.

Tribus modis dicitur molle & durum, partim ut extreme tale, partim ut per excellētiā, partim ut ad symmetriū generis eiusdem aut speciei, aut quiduis obuium. Cap. 3

Sed de emollientibus medicamentis, ipsaq; adeo emollitione non perinde simpliciter loqui licet, quia uidelicet nec de duro molliq; corpore. Si quidem partim absolute durum dicitur, ut terrarum partim per excessum, ut unguis, calcar, cornu; partim ad symmetrum sui generis aut speciei, ut hoc animal, puta elephas, aut hic homo, puta Hercules; partim ad quiduis obuiū collatum, ut Diogenes ad Aristotelem. Pari modo dicitur molle, aut ut summe eiusmodi, aut per excessum, aut ad symmetron sui generis aut speciei, aut ad quiduis obuium. Quod uero tripliciter quoq; id genus omnia dicere liceat, partim ut a mistura aliena, summasq; habetia qualitates a quibus nūcupata sunt, partim ut ad symmetrō sui generis aut speciei, partim ad quiduis obuium collata, et q; nihil retulerit, illo an hoc modo dixeris, fræquet̃ mihi ostēsum est. Ommissis itaq; cæteris significatis, de mollib. durisq; ut ad optime cōparatum habitūq; hominē contēplemur, quem sanē regulā ac mensurā statuimus omnium quæ eum in modū dicunt; nec tñ ad illius partē quamcumq; puta os adipemūe, sed que tempore mediā est, nempe cutē, maximeq; eam quæ in manibus est, ubi perfecta est tangēdi potentia. In unū autē redit, si quod per excessum ad totā substantiā dicit, sic molle durūq; appellites, quandoquidem mediū quoddam est tactus noster; uti & Aristoteli uisum est, & Plato quoq; sensisse uidetur, cum ait. Dura quidem quibus caro nostra cedit, mollia uero, quæ cedunt carni. Nam cutem hominis eo ipso in lib. Timæo scilicet, genere esse carnē ostendit. Quin & Aristoteles cū ait molle esse quod in se cedit, durū quod nō cedit, idē qd Plato sensisse uidetur, & maxime q; ad tactum ea iudicanda censet, tanquam ad mediū. Quod uero in cōparatione ad quiduis obuium durum est ac molle, id in eo q; magis minusq; cedat, iudicari uidetur. Quin & ipsam cutem nostram aut musculum aut partem aliam quamlibet cum induratum dicimus, cum naturali eius statu aduentitiū affectum conferentes ita nominamus. Sanē corporum hoc pacto affectorum ad statum naturalem reditus emollitio est.

Quot modis sunt dura? nempe aut resiccatione, aut concretione, aut nimia impletione, aut harum coniugatione quapiam. Cap. 4

Porrò cum uarie quidq; durius efficiatur, nempe aut siccescens, aut concrecens, aut nimia re-

pletione, adeo ut uehemēt̃ distendatur, aut coniugatione quapiam, sequitur ut & propria suaq; cuiq; emolliēdi sit ratio. Itaq; de omnib. deinceps distinguamus. Interim illud prius cōmonefacientes, nominū uerborūq; copiam plerumq; non esse indecoram, sed potius eius cōtrarium; illiberalem uero tum esse, cum non est necesse de illis distinguere. Nam ita & Plato prodidit. Et nobis in præsens necessitas incūbit de duri significatis definire principio rursum ab ijs desumpto quæ modo dicere desinimus. Nam quod in se cedit, molle est, si quidem corpus simplex fuerit. Siquidē quod ex pluribus constat aut sese contingentibus, sicut tritici aceruus, aut inuicem implicatis, ut lana & pili, si mul & cedere potest, nec tamen esse molle. Contra in ijs quæ summe plena sunt, uelut utres, uesicæq; neutriū latus in se cedit, nec tamen quod continetur durum est, sicut nec quod continet ubi impletum est, durius seipso euasit, aut aduentitiū alium affectum est adeptum, nisi q; nunc tensum est, quod hæc tenus fuerat laxū. Quamobrem ego id tenitens, Græce ἀπίρνον, non durum appello, quando nimirum accuratius loqui propono. Permitto tamen qui uelit durū appellare; quin & ipse sæpe sic nuncupo. Sed illud tamen moneo non unam esse induratum naturam, neq; unam medelam. Nam quod a siccitate induratum est, humectari postulat; quod uero a congelatione, excalesceri; quod autem a repletionē, inaniri; quod deniq; a siccitate simul concrectionēq; humectari simul ac concalescere; quod uero a congelatione pariter & impletione, pariter quoq; & calferi & euacuari. Siccantur itaq; corpora citra congelationem, tum in ualidis exercitijs, tum in sole feruenti, tum inedia ingenti, tum in febre ardenti, & medicamentis quæ ita siccant ut non refrigerent quoq;. Congelantur a uehementi duntaxat frigore. Sicut sanē & implentur a largi tantum humoris affluxu. At siccantur simul & congelantur coeuntibus quæ simul conuenire possunt causis: ut si quis supra modum laboret in frigore. Sic quoque replentur simul & cōgelantur ab influxu frigido, ac partim refrigeratione. Frigoris rursus ipsius causa triplex est: una a foris incidentibus, puta, aere, aqua, medicamēto, quod sæpe factitant in erysipelatis. Altera ex propria patientis particula: temperie. Tertia ab influente in ipsam humore ueniunt. Nam is sæpenumero seipso calidior effectus est, aut putrescens, aut contactu calidarum natura partium alterascens, cum interim quod partibus natura frigidioribus affricuit frigus, plurimo perdurat tempore. Atq; tot quidem modis corpora tum indurantur, tum molliuntur. A medicamen emolliens (Græce uocant μαλακῶν) non de omnibus ijs modis efferre uidentur, sed peculiariter de ijs quæ cōgelatione induruerunt, magisq; etiam si in eis contentus sit humor præter naturā, uelut in scirrhis. Quippe si a siccitate induruerit, humectare, nō mollire id præcipiunt; sicut impleta euacuare, non emollire. Sed de nominibus neq; contendere honestum est, neq; cu-

riofum esse necesse; utrum rerum insistere diuersitatibus præstat; in quibus siquid peccatur, ingēs egrotis damnū malūq; prouenit. Itaque quod reliccatum est, humectātia poscit remedia, de quibus supra abunde disserui. At quod à frigore congelatum est, excalescencia postulat; quæ nec ipsa obscura sunt. At quod impletum est, aut refrigerantia requirit, aut excalescētia, aut quæ proprie uocantur siccantia. Vniuersa siquidem hæc humorē superfluum euacuāt, sed sua ac peculiari quodq; ratione. Frigida quidem duobus modis nempe rē pellentia, simulq; cum calore multam eduentia humiditatem, sicut Aristoteles docuit. Quæ uerò excalescunt, dum cōtentum in calefcentibus corporibus humorem in uapores dissolunt. Quæ autem desiccant, uelut quæ uocantur diaphoretica, hoc est per halitum digerentia, & ipsa duplici ratione, aut humores ebibentia cum poris quibusdā insunt, aut totam alterantia partem. Verum quando tempestiuus cuiusq; sit usus, non est presentis negocij definire, sed ad curandū attinet methodum. Quæ uero à frigore pariter & siccitate in duruere, ea excalescere pariter & madefacere expedit, non sicut pus mouentia calore & humiditate secundum naturā attemperatis, sed tanto esse medicamen expedit calidius, quanto exuperauit frigiditas; tanto que siccius, quanto & uicit siccitas. In quibus mensuram finire ad curandū itidem methodum pertinet. Sufficiat autem hic medicamentorum species formulam quandam exponere, idq; pauculis exemplis. Igitur oleum et aqua calida humectant simul & excalescunt. Quod si ambo in unum misceantur, multo magis excalesciat, tum humectabit quod ex ipsis erit mistum, sicut aquæ potabilis balnea cum oleo copioso exhibita. Idem efficit eduliorum qualitas, si similiter habeat. Itaq; ingentis famis, quam *βελιμου* nominant, illiusmodi sunt remedia. Est enim ea affectio frigiditas iuncta siccitati; & sanatio eius per contraria perficitur. Veruntamen cataplasma quod ex farina triticea conficitur, in tēperatis naturis pus mouens, nec quicquam naturalis partium humiditatis aufert, quod quidē relatu sit dignū; multoq; magis nec apponit; sicut nec calorē intendere potest, nec hebetare, sed tantum in substantia ipsa augere. Caterū non idem est, qualitatē intendere, & augere substantiam. Sed hæc paulo post accuratius ostendam. Attamen id genus medicamētā humida calidāq; dicimus, nō ceu calidiora humidioraq; quam nostra sit substantia, sed ceu similem habentia nobis tēperiem, quæ calida & humida est iuxta ueterem sermonem, uelut in libris De temperamentis ostēdimus. Nec tamen sic aquam humidā aut galbanū calidum dicimus; sed illam tanquam quæ carnem nostrā riget, hoc tanq; quod calfaciat. Nam ræti si aqua calida euacuare partes quæ per humorum influxum contumuerunt ualeat, similes tamen saltem omnino humectat, si cut in primo libro à me demonstratum est.

De medicamentis pus mouentibus. Cap. 5

Medicamenta itaq; quæ pus mouent, eo quod

Galen.

A perinde ut aqua calida excalesciant, superfluum in spacijs uacuis contentum humorem per halitū digerunt; sicut in libello De inæquali intemperie monstrauimus. Ipsi tamen similaribus corporibus secundum naturam affectis, humiditatis nihil neq; adijciunt, neq; adimunt, quod quidem manifestum sit, & sentiri queat. Quippe cum temperaturam possident similem, earum substantiam tueri potius quam alterare possunt. Nam in suppurationibus humiditas quidē alteratur, itemq; siqua sit caro cōtusa; cætera uero quæ secundum naturam habēt, substantiā suam seruant. Etenim cum tres in animalium corpore fiant alterationes: una planē secundum naturam est, cum uidelicet in uentre cibis coquitur, aut in uisceribus & uasis quibus inibi generatur succus, unde rursum pars unaquæ que nutriatur. Altera contra planē præter naturam, nempe in putrescentibus omnibus. Atque hæc quodammodo iniucē sibi contraria sunt. Tertia ex utraque mista & media est, partim primæ quidquam obtinēs ac naturalis, partim huius contrariæ quæ est præter naturam. Siquidem alterationi secundum naturam duo hæc insunt, ut & ex familiaris animantis natura fiat alteratio, & ab ingenito calore planē superetur. Ei uero quæ præter naturā est, & ab aliena caliditate mutatio prouenit, & ad nihil utile. At media earum, quæ scilicet suppurationes comitatur, ab ingenito quidē sit calore, sed non planē uincente; neque enim ex materia peragitur quæ prorsum benigna sit, neq; tamen ex omnino aliena. Itaque quemadmodum naturales alterationes, quæ ab innato proueniunt calore, à simili extrinsecus iuuantur, pari modo & quæ in mouendo pure conspiciunt. Nam quid æque concoctioni uentris cōferre nouimus, atq; corpus humanum illi impositū? Proinde quidam pueros noctu ad mouentes per quietē, longè eui dentissimū ad iumentū sentiunt. Cōfert siquidem amplius, magisq; multo familiaris est eo calore qui à fomentis paratur. Eiusdē gratia utilitatis quidam paruos catellos per quietem uētri imponūt, copiam coquentis cibos caliditatis adaugentes; non qualitatē. Tale esse debet quod ad mouendū pus adhibebitur medicamentū, qualis est in naturis tēperatis calor natiuus. At si iusto calidior natura fuerit, in eo corpore, quod pus mouebit medicamen, calidius sit oportet; tanto nimirum temperato calidius, quanto & natura eius tēperatam in caliditate exuperat. Itaque clarum iam illud est ex curandi methodo, cuiusq; singularim hominis suū ac proprium esse puris mouendi medicamentum. Nec minus illud constat, quod sæpenuero iam demonstratū, horū cōprobatur testimonio, omnes medicamentorū facultates ut ad optime temperatū hominē explorandas. Siquidem nulla cōstitui ars possit, nisi prius uelut regula ac scopo generi materiae in qua uerfatur cōstituito, ad illum iam particularia omnia dirigantur. Rursum ergo proposito tanq; scopo quodam in hoc sermone optime tēperato homine, eius respectu aliud esse dicimus medicamentū pus mouens, q̄ quod in-

1011. 5

f 3

durata

durata emollit, effecq; eorum temperaturas, quas superius esse posuimus: Eius quidē quod natura in mouēdo pure auxilio est cōmoderata & similē ei corpori cui admouetur: ac proinde quod natura nostra humida sit & calida, humida calidaq; me dicamēta eiusmodi frequenter appellari: Eius uero quod indurata emollit, tēperata natura multo calidiorem, non tamen iam ualde calidam

De ortu scirrhī. Cap. 6

Oritur autem induraturū affectio ex fluxione uiscosa & crassa, paruis particulis poris siue meatibus impacta. Digesto uero per halitum quod tenuē est eius ac subtile, ac deinde quod reliquū est refrigerato ac uelut cōgelato, uocata sequitur scirrhosis: ac proinde frigidū pathos aiunt, & per calfaciētia curari. Porro quoniam cum frigiditate humor redūdat superfluous idcirco etiā cōpositam eius esse medellam, ob refrigerationem scilicet ex calfaciētia poscente affectū, ob alienā uero & sit per uacant eam humiditatē, euacuantia. Vnde fit, ut eorum quæ scirrhī in morem indurata sunt, nullum curari ualeat, neq; a ualide exiccantibus, neq; a fortiter excalciantibus, neq; ab ijs quæ utraq; hæc præstare possunt. Nam quæ ualde excalciant, hærens ac contentum in particula humidum uolenter digerentia atq; eficientia, reliquum omne desiccant, & incurabile cōstituit: quæ uero fortiter desiccant, etiā si non excalciant, tamē ipsa non per medium, euacuando scilicet quod subtile est, sed ex professo, ac ex natura sua ad summā duritiē infixam particulæ fluxionē adigunt. Sola igitur ea quæ calcantur, sed nō admodum, unacq; exiccant nō magnopere, eiusmodi sanare affectus possunt: uocanturq; ea medicamenta Græcè *μελαλκικά* (Latine emollientia nomīno) eodem tēpore utrumq; agentia, nempe quod congelatum est fundentia, & sensim per halitum digerentia.

Emollientia medicamenta in hoc à pus mouentibus differunt, quod emollientia calidiora sunt, & moderate desiccant existētem in partibus humiditatem: pus autem mouentia corporibus quidem nostris similem calorem obtinent, sed tamen existētem in eis humiditatem seruant. Cap. 7

Quapropter calida sunt id genus medicamenta, nec admodum sicca, atq; à pus mouentibus eo dissidentia, quod calidiora sint, & sicciora. Illa enim cognatam ac simillimam corporibus nostris caliditatem possident: emollientia uero licet ualidiorem habeant, non tantam tamen ut attractio nis uolentia reliquum desiccant. Præterea ea quæ pus mouent, humorem qui præfuit in partibus induratis, seruant: emollientia uero paulum quiddam eius absument. Proinde quamuis innumera sint calcaciētia simul atq; exiccantia medicamenta, sola tamen ea quæ cōuenientē ac symmetrum calorem possident, unacq; illi respondentē fortitā sunt siccitate, mollitē que scirrhī instar indurata sunt, possunt, quale est bellium, styrax, galbanū, thymifama ammoniacū, medulla tū ceruina, tum uitulina, a deps caprinus, & taurinus, & quæ eius sunt generis. Nam nunc consiliū non est omnem expromere materiā, sed solum de id genus facul-

tatibus omnibus generalem cōstituerē doctrinā. Præstat nanq; in genere de pus mouentibus atq; emollientibus cognoscere, quod illa æqualem ac cēdunt calorē ei qui est in homine secundum naturā: quæ uero emolliunt, multo maiorē. Quocirca illa quidem quantitate potius quā qualitate caloris agere sunt nata: at quæ indurata emolliūt, qualitate potius. Itaq; si in parte quæ supuratione indiget, absiduo impolitas seruire manus, aut aliā quamuis partem possibile foret, celerrime sic supurationi procederet. Pari quoq; modo si medicamentum hominis tēperaturæ sit quam simillimū, ocysime cōcoquet quod in pusuerti debet, ut est nonnuncq; caro, nimirum ubi contusa fuerit, in terdum uero humor qui phlegmonem produxit.

Quod pus mouentia etiā emplastica esse conueniat. Cap. 8

Quinetiā quod emplastici esse debeat eius generis medicamentum, ut exacte suppuratorium sit, & ipsū liquido mihi apparere uidetur. Nam si substantiā innati caloris augere, non intendere qualitatem ipsam conueniat, poros corporis obstruētos esse necessum est, quod uidelicet halitus uos transpiratus includant. Siquidem ea cataplasmata quæ aut detergētia, aut ualidius excalciantia, halitus dissilari permittunt, exiccant quidē, sed pus nō mouent. Talis est hordeacea, cicerum, fenigræci, fabacea q; farina, amplius etiā ærina, erui na, panicū, lupinorū, milij, omnūq; adeo exiccantium: quippe cum tum per ea quæ detergunt, etiam si non admodum excalciant, sed quia obstruētionē liberāt, reserantq; meatus, unā quoq; calor particulæ euolet, ut naturalis haudquaq; seruetur cōmoderatio: tum ab admodum excalciantibus huius etiā non parum uacuetur, & qui reliquus est incaleat, ex quo fit ut natui caloris substantia diminuatur, sed qualitas intēdatur. Quorum neutrum fieri expedit, uerum hialituosum & calidum spiritum cōtineri quamplurimū, & ad unguem cæliditate symmetrum: quippe cum hic in pueris copiosissimus, oēs a cōtiones naturales adaugeat. Sed sunt quos id fugit, & cum hoc quod ignorēt, Hippocratem insuper accusare non uerentur, quod dixerit crescentia plurimum habere calorū innati. Sed nos dicētia eius haud perperā capere oportet, ac cognoscere innatum dixisse calorem, quem in quoq; animantū & natuum spiritū nominamus, de quo & Aristoteles scriptū reliquit. Verū nihil prohibet, sanguineam substantiam simulq; æream unā cum spiritu calidum inaudire innatū. Ac Stoici quidem nunc ipsū spiritū animæ esse substantiam autumāt. Nos sane de animæ substantia non admodum pronuciare quippiā audemus, & ad præsens stupere uacuum arbitramur. Quanquam nos iam ante spiritum innatum, etiam si non sit animæ essentia, saltē primū eius esse instrumentum in commētarijs de Hippocratis Platonisq; placitis demonstrauimus: et certe dicimus eū spiritum in omnibus animantis cōtineri partibus, sed non undiquaq; esse sui similem, ueluti nec sanguinem, esse necesse. Tum in spacijs inanibus non paruum eius inesse substantiā, imō potius, uelut materiam quandam

quandam leuiculam etiam mutationem exposcentem ad innati spiritus qualitatem suis absoluti generationem, nihil fecius tamē iam tum etiam admodum ad naturalia opera conducen-
 tem. Porro autem unum ex naturalibus operibus est, ea quæ in pus fit conuerſio. Nam & illi-
 quædam perficitur coctio. Cum autem quidquam co-
 quere consilium est, quam plurimū, meo iudicio,
 spiritū seruari intus oportet. At qui digeritur tum
 ab euaporantibus ac detergetibus, qualis est hor-
 deacea fabaceaq; farina: tum à resiccantibus, qua-
 lis est panici, lupinorū, milij: tum ab excaſfacienti-
 bus, qualis est scœnigræci. Quin multo etiam ma-
 gis ab ijs quæ simul et excaſfacere et resicare pos-
 ſunt, puta lolio, eruo, cicere, ochris. Igitur omnīū
 ad puris generationē aptissimum est, ex ijs utiq;
 quæ perfundunt aqua tēperata, aut cui additum
 oleū est, quod hydrelæum Græci uocāt: ex ijs uē-
 ro quæ irrigatur, oleū temperatum. At ex ijs quæ
 ex hydrelō illinuntur, farina triticea, & panis ipse.
 Sed is modice coctus sit oportet. Nam qui pluri-
 mum coctus est, quodāmodo sicciōr est, aptusq;
 phlegmonis quæ egrius concoctionē admittunt;
 qui uero minus, ijs quæ admodū calidā sunt atq;
 ut sic dixerim, feruent, cōgruit. Tum cui plus ad-
 ditum olei fuerit, perinacius coctioni aduersantī-
 bus cōuenit: Cui minus, feruētibus magis compe-
 tit. Et sanē quod ex pane conficit cataplasma, dis-
 ficulter coctioni cedentibus phlegmonis idone-
 um est, siquidem panis tum sal, tum fermētum ad-
 mistum est. Quod uero ex triticea farina præpara-
 tum est, calidioribus utiſus est. Et ipsius etiā triticeæ
 farinæ quæ pura est, tum panis quoq; qui pur-
 us est, puri mouendū cōpetentior est, nimirū cum
 furfur minus sit calidū, & magis desiccet. Farina
 aut pura, quæq; alere est nata, humidā est et calidā:
 qualia certe ad pus producendū conferre ostēdi-
 mus. Itaq; medicamēta quæ phlegmone tentatis
 imponuntur partibus, si calida sint & humidā, ad
 pus mouendū conducūt, uti adeps suillus, & uitu-
 linus. Nam tauri & capræ acrioris esse ostēdimus:
 quamobrē phlegmonis tum frigidioribus, tū du-
 rioribus magis congruunt. At suillus ijs quæ prop-
 riē phlegmōe appellanē, familiarissimus est. Est
 & adeps gallinæ acrior familiarissimus, magisq; e-
 tiam anserū, quodāmodo tamen ad digerendū po-
 tentior: est enim substantia sua tenuior, sicut & bu-
 bulus & caprarū crasior & terrenus magis. Quin
 & agrestīū animalium omnīū acrior est adeps si-
 mulq; sicciōr multo q̄ domesticorum, maximeq;
 pardalis & leonis. Quare horū nullus omnino pu-
 ri mouendū idoneus est, sed, ut dixi, suillus & uituli-
 nis. Porro pus mouēt & pix, & resina, nepe oleo
 quopiam aut rosaceo subacta. Sed & hic ad feruen-
 tes phlegmonas ex rosaceo eas liquare oportet:
 ad frigidiores uero excaſfacientiū quopiam, puta
 cicino, raphanino, ueteri sicyonio. Quod siquādo
 sola utaris cera, alijs ad manum nullis, ad pus mou-
 endum, & ipsam in excaſfacientiū quopiam dis-
 soluere oportebit: quippe cum ipsa per se minus
 sit calida quam ut pus mouere possit. Siquidē illi-

endi certē uim obtinet. Solis itaq; feruentibus
 phlegmonis apta est, ex calidorum oleum quo-
 piam liquata. Verum quemadmodū hæc symme-
 tria ac mediocritate inferior est, ut ad medias tem-
 perie phlegmonas, hominūq; & partiū naturas,
 sic paulum quiddā excedūt resina & pix. Quapro-
 pter hæc omnia simul mista moderate pus mouēt.
 Sed hæc iam ad tractatum de medicamentorum
 compositione attingēt, quem ut aliquatenus attinge-
 remus, speculationis ipsius nos sequeſta adegit.
 Rursum ergo ad propositum reuēto r. Est autem
 propositū, definire quæ sit in genere pus mouen-
 tium natura. Dicitur uero est, quod modice eam
 humectantē & excaſfacientē esse oporteat: quod
 alijs uerbis est, ut neq; excellat, neq; inferius sit tē-
 peratura corporis ipsū immutantis, sed quoad
 fieri possit simillimum. Cæterū quod medicamen-
 tum puri mouendo idoneum tale sit facultate, &
 actu, siue energia fiat eiusmodi, dum corpori no-
 stro admotum est, sæpe numerō iam ante dictum
 est: sed nunc nihilo secius id repetimus, quando-
 quidem utrobique eius meminisse oportet. Atque
 eiusmodi est pus mouentis medicamenti tēper-
 ries. Porro corporis ipsius constitutio emplaſtica
 est: cum maxime pollēt quæ lenta & uiscosa sunt,
 uelut adeps porcinius, butyrum, thus, & quod ex
 farina triticea conficitur cataplasma: quippe quæ
 moderate tum calidā, tum humidā lentaq; sunt, ac
 proinde puri mouendo idonea. Chondrus tamen
 farina triticea sicciōr est, quanquam nihilo minus
 lentus sit, nisi forte etiā amplius: unde fit ut in
 dijs temperatura phlegmonis puri mouendo in-
 peptior, in humidioribus etiam triticea farina præ-
 stantior sit. Verum & hæc iam præsentis cōmen-
 tationis limites excedunt. Itaq; denuo ad medica-
 menta duritates emolliētia reuertor, hæc tenus &
 hic curandī methodum attingens, quantū dicen-
 dorum claritati cōducat. Scirrhum uocant tumo-
 rem præter naturam, doloris uacuum, sed durum:
 Sunt aut inter eos quidam, qui ubi plurimum in-
 creuerint, simulatq; indurati fuerint, non modo do-
 lore carent, uerū etiam sensum exiguum, aut eti-
 am nullum habēt reliquum: porro nascuntur ex
 humore crasso & frigido, quales sunt in animalīū
 corporibus duntaxat duo, bilis uidelicet atra, &
 superexiccata pituita. Proinde tumores scirrhosi
 omnino aut pituitosæ sunt substantiæ, aut atrabila-
 riæ, aut ex utraque misti. Sed de agnitione eorum
 non est nunc tempestiuū disserere, uerū de me-
 dicamentis emollientibus illud ut nunc dicā op-
 portunum est, nempē quod proprie uocantur e-
 mollientia, quæ medentur scirrhosis tumoribus
 ex pituita resiccata crassoq; humore prognatis.
 Consueuerunt autem h̄ potissimum in musculo-
 rum capitibus, & qui ex eis prodeūt tendonibus
 consistere. At quæ ab atrabilario succo duruerūt,
 cancroſa sunt omnia, & ab emollientibus medicī-
 nis exasperantur. Sed his quo pacto prospicere o-
 porteat, in Commētarijs methodi curandī doce-
 bimus. Quæ uero a lento crassoq; humore cōge-
 lato indurata sunt, calidā poscunt siccaq; medi-

caementa. sed non tamen quæ ualida sunt ac uio-
lenta: sed sufficit interitum ut secundi aut tertij sint
ordinis exsuccificantij, primi exsiccantium. Por-
rò cum non exigua sit in corporibus sic induratis
maioris minorisq; latitudo, necesse utique est &
medicamentorum illis medentium non paruum
esse latitudinē. Siquidem adeps caprinus, & gal-
linarum, quæ sic indurata fuere iuuarunt. Verum
illi quidem imbecilliores sunt, & moderatas du-
ritates emolliunt. Valentior gallinarum gallo-
rumq; adipe asferinus est, caprarum uero hircinus,
ualidior quoq; & taurinus, sed minus tamē quam
hircinus. Quinetiam medulla ceruina modice e-
molliit, & cum ea uitulina: quippe cum id genus
omnia medicamenta calida sint, & mediocriter
sicca, multoq; magis excalcifere quam exsiccare
nata. Vnde liquis forte ea quandoq; calida dicat
& humida, non repugnandum; nam paulum ab-
sunt ab ijs qui neq; humectant, neq; desiccant. Eo-
dem ex genere sunt, quanquam ualidiora, ammo-
niacum thymia, & styrax, & galbanum, &
bdellium scythicum: sed ad emolliēdum præstan-
tiora ex ijs sunt quæ recentia sunt. Siquidem inue-
terata ualidius quam oportet desiccant. Id ipsum
usuuenit in medulla & adipe, quippe quæ & ipsa
uetustate seipsis tum acriora, tum sicciora euadunt.
Quin & oleum quoq; sicyonium ex hoc est gene-
re, nec in postremis id quod inueteratum est, &
ea quæ præparantur, ut iusinum. Sed de composi-
tis hic dicere statutum nō est. Porrò radix altheæ,
& cucumeris agrestis, nonnullaq; alia plantæ par-
tim in oleo, partim in aqua decoctæ, emollienti-
um medicamentorum facultatem induunt, sicut
maluæ agrestis folia tum cruda, tum cocta. Atq;
hoc simplex medicamentum est, sicut porcinius
adeps uetustatem passus, sed salis nihil oportet
adiicere, sicut nec alijs quæ emolliūt: ualde enim
desiccant sal. Porrò quæcumque alia emolliere pos-
sunt, seu simplicia seu composita sint medicamen-
ta (alibi enim ea recensēbimus) calida sunt ex se-
cundo & interdum ex tertio ordine, leuiter ue-
ro sicca. Sed & his sanē illinendi uis (emplasticam
uocant) insit necesse est, non aliter quam ijs quæ
pus mouent. Sed quanto maiore euacuandi fa-
cultate pollere debent, tanto utique minus etiam
meatus illitu obstruere.

Quod medicamenta indurantia humido frigidoq; sint
temperamento. Cap. 9

Sanē emollientium facultas medicamentorum
abunde iam exposita est, proinde deinceps de in-
durantibus uerba faciā. Frigida ita que hæc sint o-
portet & humida, uelut temperuim, portulaca,
psyllium, lenticula palustris, solanum; aut hoc qui-
dem certe non est temperamēto humido, sed me-
dium absolute humectantis & exsicantis: ex pu-
gnantibus facultatibus compositum, exsicante
uidelicet & humectante: nimirum cum & dupli-
cem in se habeat substantiam, terrenam & aqueā.
Sed iam non est mihi consilium, ad particularem
materiam sermonem deducere, uerum generales
duntaxat breuiter facultates desinire. Sanē siquid

simul & refrigeret & desicet, & ipsum profecto
omnino indurabit; sed non est ex ijs quæ proprie
indurant. Siquidem congelatione potius quam
euacuatione durum efficitur corpus, prout supra
posuimus. At si quid sit quod proinde quia natum
humorem non retinet, induratum est, id sic-
cum potius quam durum appellabimus; cōstatq;
eius sanatio rigatione & humectatione, non e-
molliitione: sicut certe & tensio curatur laxatio-
ne, & laxatio tensione.

De tendentibus laxantibusq; medicamentis. Cap. 10

Sed hæc ut se habeant liquido conspiciuntur,
cum in cute, quemadmodū & ab Hippocrate di-
ctum est, cutis duræ mollificatio, tēsa laxatio; tum
etiam frequenter in articulis. Igitur laxatio proue-
nit humectatis immodice quæ circa eos sunt liga-
mentis pariter & tendonibus: tensio uero non e-
tiam simpliciter, sed aut plulculum exsiccat, aut
refrigerata, aut phlegmone affectis, aut scirrho.
Atq; ita quidem in articulis. In cute uero non tam
tum ita, sed musculis quoque qui ei subiecti sunt,
quoquo modo in tumore sublati. Nam & præ
carnis sæpe copia quibusdam tenditur. Quod ue-
ro & in phlegmonis id ipsum illi accidat, supra po-
situm est. Quamobrem non simpliciter una est spe-
cies laxantium remediorum, utpote cum alia hu-
mectando, alia calcifiendo, alia uero emollien-
do, quædam euacuando, nonnulla tumores præ-
ter naturam purgando, alia etiam per coniugatio-
nem horum quampiam agentia, laxare assolent.
At Thesalus, fereq; sequaces eius uniuersi, sicut
in alijs multis, ita & in his appellatiōes simul cum
rebus confundunt, quicquid obuisum est, citra ul-
lam examinationem cōscribentes. Quamobrem
ubi quæ in manibus sunt absoluerimus, necesse
nobis forsan fuerit aliquando in eos stylum con-
uertere; in præsentiarum autem quod dicta con-
tinuo sequitur persequamur, rursum sumpto prin-
cipio ab ijs medicamentis quæ uocantur emplasti-
ca, quia sæpe iam ante & de ijs diximus. Breuiter
ergo Emplasticum medicamentum est, quod ten-
naciter corporis poris siue meatibus illitum inhæ-
ret. Porrò abunde dictum est nobis de pororum,
quos nos statuisimus, natura in libris De tempera-
mentis, demonstratum autem est & in libro hunc
præcedente, mordacitate uacare omnino debere
medicamentū emplasticū; nā si qua illi inerit mor-
dacitas, hæere in poris nō poterit, sed omnino fa-
cile excerneret, aut partiu aliquam liquādo, aut
certe humorem aliquem ex alto attrahendo. Sed
& illud satis constat, terrē consistentiæ & uisco-
sum esse oportere emplasticum.

Quod poros purgantium medicamentum unumquodq; calie-
dum sit, & tenuium partium: nam amara omnia &
nitrosa sunt. Cap. 11

Sed de istis supra abunde dictum est. Quod ue-
ro illi contrarium est, dici queat poros repurgans,
& infarctui liberans, sicut & ipsum emplasticum
non modo emplasticum dicitur, sed & *εμψαστικόν*
ὄρυ quasi dicas infarciens. Fuerit autem id sicut
effectū contrarium, ita & corporis natura, neque
uisco

uiscosum, neq; mordacitatis expers, sed nitrosum & subtile. Nam in ratione maioris ac minoris differunt, substantiæ genere minime diuersa, tum emplastica ab ijs quæ sordem nutriunt, tum repurgantia ab extergentibus. Nam quæ in superficie sordem auferunt, siue in cute, siue in ulceribus, ea extergentia siue rhyptica nominantur. Quæ uero poros etiam expurgant, ea subtiliorum huius partium sunt & emplasticis contraria: proinde pororum ephraçica & eccathartica quasi expurgantia & factu liberantia dicas, appellantur. Sunt autem hæc tum nitrosa, tum amara. Atq; cuti extime impoçita solam nitrosam qualitatē possideant exactam est opus ad ea peragenda quæ dicta sunt. At intrò in corpus assumpta, etiam si adiucta sit quedam adstrictio, possint tamen sic quocq; magnos purgare abstergereq; meatus, cuiusmodi sunt in ualis. Nam foris meatuū exiguitas prius ab adstrictione occlusa, quam probe queat expurgari; nõ etiam inde in altum abstergentem substantiam recipit, nec expurgatur. At quæ circa uentrem sunt partes omnes, quæq; in iocinore, liene, alijsq; omnibus uisceribus, cum maximos in se meatus habeant, maius accipiunt commodum ex ualorum corroboracione, quam propter ofculorum exiguitatem lædantur. Proin intus absinthium repurgare potest, foris non potest: quippe quod compositum est, ut supra dixi, ex amara acerbaq; facultate. Quamobrem eius generis medicamenta partiçulati ut persequant, non est necesse. Quæcunq; enim repereris nitrosa & amara, ea ad purgandos meatus omnes ualere noueris. At cutis uniuersæ ac ulcerum sordes, nõ hæc tantù, sed & uiribus minoribus auferre possunt, qualia sunt dulcicia quæ tenuium sunt partiũ, puta mel, & ex cerealibus seminibus quædam, ut eruum, fabæ, hordeum, lupini: Quæquã in ipsis fabacea hordeaceaç farina tantum extergit, non etiam meatus factu liberat: erui autem & lupinorum potissimum si amara fuerint, supra q; quod extergunt, nõ nihil quocq; meatus purgare ualent. Simile quiddam amygdalis accidit: nam & horum ipsorum ea quæ amara sunt, & detergunt, & meatus expurgant: quæ uero edendo sunt, detergunt quidem, non tamen infarctuli berant. Quin & urtica semen non secus atq; erui amygdalaç amara, meatus purgat. Ex eodem genere scilicet sunt scilla & iris, & quæcunq; alia uincem in se ipsitatem amaram possident. Siquidem nitrum ipsum per se, & aphrolitrum, & spuma nitri, & seriphon, & abrotinũ, & id generis reliqua cum cibo potuq; assumpta eandem uim obtinent. Protinus enim his inest, ut crassos lentosq; humores extenuandi uim obtineant, sicut emplastica omnib. crassos lentosq; corporis succos reddendi. Quamobrem lentis ac pituitosis thoracis pulmõisq; humoribus, aut puri, & incidendis & extenuandis & educendis aptiora inuenire alia præ istis medicamenta nequeas. Iisdem istis & iocinoris obstructions expurges, & modicas etiam lienis: nam quæ maiores sunt, uehementiora desiderant, nempe capparitis corticẽ, radices tamarices,

A scolopèdriõ, & scillam, & eam quæ id ipsum nomine repræsentat, apsenos appellata. Sed tamen istis utendum in quoq; uiscerum est: ad iecur, ipsis per se duntaxat: ad lienẽ uero, mixtis aceto, aut ei incoctis: ad thoracem pulmoneq;, melicrato, ptisanæ, oxymelitis, aut dulcium uinorum cuiuspiã. Sed hæc ad curandis pertinent methodum: proinde in præsens rationibus ea confirmare omitto. Nam & in illo opere, & in alio quod De componendis medicamentis inscribetur, eas explicabo.

Quod uinum scientia ex acrimonia genere sint, ac proinde calidum & siccatum quod sanguinem seropum segregent, crassum uero cogant. Cap. 12

B Porro quæ necesse est ut dictis adiuncta, ea duntaxat expromant, nempe cum plurimum mouere urinam annitimur, non admodum dictis utendũ pharmacis, sed quæ acriora sunt, & magis exalfaciunt. Dictum siquidem supra est, acre omne esse calidum: eius generis sunt semen apij, petroselinũ, foeniculi, dauci, agrioselini, smyrnijs, & sanæ ipsum quoque seseli, & ammi, & phu, & meon, & asaron, & acoron, a quibus sanguis non extenuatur duntaxat, sed & funditur ac fecernitur, non seues atque lac quod coagulat serosum uidelicet & tenuis serum segregato, crasso uero in se coeunte. Siquidem quod facillime ad se attrahant renes quod in sanguine aqueũ tenuesq; ac serosum est; utraque hæc conferunt, nempe totius sanguinis primum fusio, deinde segregatio, quorum neutrum absq; ualido calore peragi queat. Quamobrem puris ex thorace exuitioni ea omnia aduersa sunt: quippe cum natura eorum sit tum excalfactoria excicatoriaq;, tum etiam secretoria, & coactoria. Cogitur quidem in sese quod crassum est; excernitur uero ac fecernitur in ipso coactu quod in sanguine serosum ac tenue defertur. Atq; hoc ad sese trahere renes anteuertunt; quod uero coactum est atq; excicatum, haud etiam facile exuittur. Proinde ut modo posuit, incidẽdi uim habeat eiusmodi medicamentum oportet, sed nõ tamen insigniter calidam, ne uidelicet ualide desiccet: ac eiusdem profecto commoditatis gratia cum sordibitunculis potionibusq; humectantibus exhiberi postulat. At quæ renes expurgant, & ipsa quidem incidentia sunt, uerum larga humiditate non indigent. Porro quæ callosas siue tophaceas consistencias incidere sunt idonea, & ipsa utque admodum incidunt, sed minimum caloris possident. Quippe caliditas callum porrum uel ipsa contrahit ac procreat, nõ incidit neq; diuidit. At quæ minus sunt calida, cum hoc quod incidere ualeant, meliora quoq; sunt, uelut radices regionum asparagorum, & rubi, & betonica, & polium, tum ochra, & uirum ustum, & ex scilla confectum acetum, & quæ sunt eius generis. At Thesalus insulsissimus atq; imperitissimus, sicut pleraque alia artus contumelios ac probris immerito afficit: ita & hæc quoq; discernere contendit, nullum esse medicamentum censens quod proprie sit aut hepaticum, aut nephriticum, aut pleuriticum.

Quod

Quod rarefacientium temperies moderate sit tum caliditatis, tum siccitatis, consistit uero tenuium partium anastomotica- rum autem calidior, tum etiam mordax atq; acris, ac crassa- rum partium: porro condensantium adstringens & aqua potius stipantiu uero siue *στυνωτικόν*, crassarum partium, & frigida. Cap. 13

Sed illius peccata alijs libris detexi. In presenti autem libro reliquis simplicium medicamentorum facultates edisseram, exordio rursus ab aperientibus ac rarefacientibus (illa anastomotica, hæc acæotica nominant) desumpto. Videntur enim & hæc quodam sanè modo iam dictis esse uicina: nepe quæ extergere, incidere, obstructiones tollere, diuide- req; diximus: quanquam non undiquaq; esse simi- lia. Sanè & horum ante omnia distinguenda notio est, ac sic in quædam substantia. Quæ quædam meatus referant, rarefacientia dicimus: quæ uero uasorum oscula, aperientia. Quin & illis contrariorum, quod poros contrahit, condensans appellatur: quod autem osculum occludit, haud etiã proprio designat nomine, sed generalioribus, puta contrahens, occludens, constringens, obstruens nominant. Porro utriusq; natura sic habet: rarefacientium quidem tum modice calida est, tum minime desiccã, tum tenuium partium: aperientium uero, tum crassarum partium, tum acris ac mordax. His porro contrariorum, condensantium quidem frigida sanè, sed non terrena, neq; aerea, sed potius aquea. Eorum autem quæ apertiones siue anastomosis occludit, crassarum partium, et frigida. Exempla horum sunt, rarefacientis quidem naturæ chamæmelii, et althea, & quod ex ipsis preparatur oleum, nec minus quod ex agrestibus conficitur cucumeribus. Quin & uetus, & cicutinũ, & raphaninum oleum ex eadẽ sunt nota. Aperientis uero facultatis, quæ acria sunt simulaq; terrena, cyclaminus, allia, cæpe, fel taurinũ, unguentorumq; adeo omnium quæ simul crassarum sunt partium, & calida, subsidentiã: cuiusmodi est irinum, & amaracinum, quæ utiq; & occæcatas aperitum hæmorrhoidas. Porro quæ uteri os à phlegmone, aut scirrho, aut ariditate oculum aperire dicuntur, ex accidenti, non autem primario et per se eiusmodi habere facultatẽ censentur, uelut nec ea quæ laborum à phlegmone occlusorũ, aut genarum, aut narium, aut gutturis, aut præputij, aut sedis, aut alterius eiusmodi oscula instrumentũ phlegmonem sanant, atq; occlusionem corrigunt. Ea nanq; phlegmonẽ soluere dici possint, haud quaquam aperientia siue anastomotica. Peccat sanè in istis Dioscorides, nonnunquam aperientis in- quens facultatis medicamentum quod laxat, aut emollit, aut humectat, aut phlegmonẽ soluit. Atq; rarefacientium quæ aperientiu eiusmodi sunt essen- tia. At eorum quæ ipsis contraria sunt, condensan- tium quidem, aquæ est frigida, semper uiui, portu- lacæ, tribuli uiridis, psyllij, herbar, quam muris au- rem uocant, lenticulæ palustris, ut semel dictã, quæ cumq; refrigerant, sed nõ adstringunt. Proinde et mandragora, cicutã, altercum, papauer, ipsas nunc dico herbas, si quis modice utatur, cõdensan- di uim obtinent: sin liberalius, non modo conden-

A sandi, sed & obtupecientia: si uero etiam pluri- mum, non tantũ obtupecientia, sed & enecãdi. At eorum quæ aperientibus aduersantur, substan- tia, cum sit crassarũ partium, & frigida, adstringen- tium est omnium, quæ quidem admittam non ha- bent acrimoniam. Quorum sanè materiæ abunde multa posuimus in quarto huius exempla: in quo & essentiam eiusmodi medicaminum terrenã iri- gidamq; exposuimus. Mirũ ergo uideri nõ debet, si sola contrahere occludereq; possit aperta præter naturam uasorum oscula: soli enim huius, quæ cunctq; requirunt ea quæ contrahi debent, omnia adfunt: nimirũ quæ consistentiæ crassitudine foris incum- bat, nec paruos meatus penetrare possit, tum frigi- ditate sua intrò premat, atq; undiquaq; in sese con- tacta uicinaq; corpora cogat ac contrahat. Nã pro- inde quod desiccet (eiusmodi enim esse ostensum est quicquid adstringit) humorem depascitur, & partem roborat. Itaq; si hæc omnia cõueniãt, oscu- lum cludetur, ceu à manibus foris, ipsis nimirũ ad- stringentis substantiæ partibus contractũ. Ea uero medicamenta quæ frigida quidem sunt aut æque, aut amplius, sed substantiam sortita sunt aqueam, ea inquam, debiliter & cõtrahunt, & constringunt, nimirũ propter mollietẽ: quippe quicquid ua- lenter tum constipare, tum constringere debet, ro- bur quoddam renitens & durum habeat oportet: quæ cũ careat medicameta naturæ magis aqueæ, tenues quidem poros in uno quoq; corpore con- trahunt atq; condensant, ceterum instrumentum undiquaq; totum cõstringere nequeit. Quamob- rem merito talia cõdensantia quidem sunt (græce *στυνωτικά* dicta.) Intelligas nunc uelim obstruentia siue stegnotica me dicere corpora, quæ sensibiles ex- cretiones cohibet: corpus enim stegnoticũ, quod *στυλ* siue claudit ac continet in se, nec quicquam quod sensu queat percipi, ex sese emitit, græce *στυλ* nuncupatur. Atq; hæc eiusmodi sunt tum tem- peraturæ, tum facultatis. At rarefacientia prorsum quidem calfaciunt: nec enim aliter diffunderet & laxare possent substantiam: ad quod consequitur, ut & pori dilatentur. Debent autem non admodum esse calida temperie: si quidem ea tam acria sunt, & inhorre faciunt: neq; item exiccatoria: nam & hæc sensilia corpora colligant, doloremq; in ip- sis excitant.

Quod escharotica crasse sint consistentia, ac uehementer cau- stica, siue urentia, adeo ut corpus sensibilibus colligat, ac septi- ca, quæ uidelicet non dicitur proprie caustica, & ipsa colligat- re sunt nata: non tamen tam ualenter quam escharotica: ad hæc consistentia sunt tenui, ac proinde latentem moluntur colligationem. Cap. 14.

Itaq; quæ citra molestant exalfaciunt, ea sola om- nium sunt rarefacientia. Si uero non modo cali- da fuerint, sed etiam consistentia crassa, siquidem uehemetia sint, & caustica, hoc est uretia: & ignis instar corpus colligant, & sæpe escharas, hoc est crustas, ritu cauterij efficiunt. Porro si debilius q; ut urere possint calfaciãt, anastomotica siue ape- riendi uim obtinent. Itaq; medicamen omne ana- stomoti-

stomatium essentia quidē terrea simulq; ignea est, haec tamen ex caldissime, ut nōdum urat. Si porro causticū sit, non tamen uehementer, prae terrea essentia tenuioris, id planē ab omni aberit mordacitate: aut cum exiguo tū dolore, tum morfu carnosas partes eliquabit. Nā quod non confer tim alerat, uti quae uehementer sunt calida, quodq; non aegre penetrat, sicut quae crassa sunt essentia, latentem ea actionem obtinent. Siquidem alterationes subite confertaq; mutationes maxime sensibiles sunt, tum penetrations quae uiolētae sunt. Quippe quod in crassa essentia causticum est, id cuiuscunq; inhaeserit parti, aculei ritu infixum excruciat. Verum hoc quidem escharoticum est, pē rinde ut caustica; ceterum de quibus nunc agitur, crustam non faciunt, & uocantur septica, hoc est putrefactantia, haud quidem appellatione propria (nam quae uere sunt septica, humectant simul & calfaciunt) ueruntamen symptomata similitudo, ut sic appellemus, efficit: utpote cū ab utrisq; nullo doloris sensu fiat corruptio. Multis em̄ modis corrumpi quid potest. Siquidem quae nimio plus refrigera sunt aut exalata, tum exiccata aut humectata, ea omnia corrumpuntur: ceterum non quicquid corrumpitur, *σκληρὸν δὲ*, hoc est putrefescere dicimus, sed quibus id cū febre accidit. Sed de nominibus non admodum esse sollicitum oportet: uerum nouisse expedit ea medicamina, quae septa & septica nuncupantur, ut sunt auripigmētum (*ἀρσενικόν* Graeci uocāt) sandaraca, chry socolla, dryopteris, ptyocampe, aconitū, omnia tum eliquare, tum colliquare, ac potissimum carnē tenellā, idq; absq; dolore. Sed sunt inter ea quaedā quae proprie uocant cathartica, hoc est detractoria, eisq; utuntur ad inducendam ulceribus ex crescentibus cicatricē. Sunt tamē & ipsa eiusdem genere facultatis, septices scilicet: uerum tantulo imbecillioris, q̄ extimam modo superficiē quam contigerint detrahant, non tamen in altum subire ualeāt, uelut asq; petre flos, quancq; nec talia ipsius uera facultatis cicatricem inducentis, q̄ uocant *ἰσχυρὰ*, sunt. Siquidem quae huius sunt facultatis, non detrahent, neq; liquare carnem sunt nata, uerū indurare & desiccare, cuiusmodi sunt alumē, galla, ompachitis uocata, as combustum, maxime lotum: nā quod lotū nō est, quiddā obtinet catharticū, uelut et aris squama. Nā quod lotum est, omniū medicaminum cicatricem inducētium longe praestātissimum est: quippe quod probe cicatricem inducit, modice adstringat oportet atq; desiccat. Quapropter spinā Aegyptiā fructus, & mali granati putamina sicca, & eius generis uerua cicatrici inducendā sunt medicamina.

Quod cicatricem inducentia medicamenta adstrictoria esse desiccatoria conueniat: quae uero ulcerū caua implent, mediocriter extergentia, & morsu uacantia. Cap. 15

Ceterum cōfusa est apud ueterosq; medicorum non solum appellatio, uerum etiam omnium id genus medicaminum facultatis cognitio. Siquidem quae carnem detrahent ac colliquare sunt nata, ea nōnunquam nominant epulotica, hoc est cicatri-

cem inducentia, scilicet q̄ horum saepe usu ulcera ad cicatricē perueniant: sed id neq; primario, neq; peculiari ipsorum facultate, neq; in omni usu sequit. Siquidem ad exactum pulueris leuorē redacta id genus medicamēta per specilli cuspidē carnem leuiter cōtingentia, ad cicatricem ulcera perducunt. At si paulo largius utare, mordacit collā quantq; carnem, & ulcus cauum efficiunt, contra quam in ijs quae re uera sunt epulotica. Siquidem nisi satis magna eorū quantitatē imponas, nihil proficies. Id enim est in planis ulceribus ad cicatricem ducendis cōsiliū, ut caro alteretur, fiatq; cutis: id quod perficitur per ea quae illam cōtrahere, cōstringere, cōstipare, densare, praeterea siccare, & calli insitū indurare ualeant: quippe cū cutis uelut in callum durata caro sit. Quae igitur medicamēta sic agere possunt, primario proprieq; dicuntur epulotica, siue ad cicatricem perducētia: caetera uero, nempe cathartica, hoc est detractoria, secundario, & per accidens: sicut & ea quae absq; adstrictione desiccandi uim habent mordacitatis ex parte. Nam & haec quocq; ex accidente cicatricē inducunt, cuiusmodi utiq; medicamētum est myrrha, & lithargyrus, & ostreum, & diphryges cōmbusta: quando quidē et ipsa saepe numero cicatricē inducunt illita. Ceterum scire oportet, ubi tum in his libris, tum alijs omnibus hanc uocem saepe uero adijcio, id me uelle significare, q̄ aliquando promissa frustrēt, propterea q̄ nec primario, nec sua facultate efficiāt. Porro epulotica medicamēta ulcus omne planum claudere cicatrice ualent: sicut mediocriter citraq; morsum abstergētia cauitates implere. Ceterū de hoc genus medicamētis fusius dicitur in commentarijs De ratione librāditas, ceu etiam ab initio praetaxi sum. Proinde suspēso de istis sermone, ad alterum genus facultatum, nempe attrahētium & repercutiētū, siue repellentium, transeundum censeo.

Quod attrahentium essentia & calida sit, & tenuium partium: repercutientium uero & frigida, & crassarum. Cap. 16

Igitur attrahentes sunt, quae ex alto uehementius extrahunt: repercutientes uero, quae in altum occurrentes sibi succos repellunt. At essentia illis quidem calida est, et tenuiū partiū: his uero frigida, & crassarū. Attrahit enim perpetuo calidū, repellit uero frigidū: uerū quod cū caliditate cōiuncta habet partiū tenuitatem, trahit uehementius q̄ uero cum frigiditate partiū crassitudinē, id uiolentius propellit. Itaq; ex actionis uehementia nō men utriq; impositū est. Atq; adstringentiū quidē nota est essentia: attrahentiū autē alia spontē nata est, alia uero ex putrescente auferenteq; generatio nem sortita. Sponte nata, ut dictami essentia, & propoleos, & thapsia, & lagapeni, & succorū cyrenacis & medici, & si qua his similibus extiterit. Ex putrefactione, qualis est fermētū, & pforicū, quod uocant. Quod si fimis quoque ex putrefactione generatio constat, utiq; omnes attrahendi facultate pollebunt. Sed nō parua illis inest diuersitas:

Nam columbinus admodum attrahit; ex equo autem utrinq; ab hoc recesserūt, ad calidius quidem anserinus, ad frigidius uero gallinaceus: hoc etiā magis uincūtur humanus & iuillus. At canū stercus simile est medicamentis extergentibus, maxime si uescatur olisibus. Crocodilorum autem terreftrium stercus magis etiam id perficit atq; absoluit. Sed & aliud est attrahentiū genus medicamentorū, quod qualitatis familiaritate attrahit: id quod aliud est nihil, q̄ totius essentiaē similitudine, ceu quæ nutriuntur, familiaria nutrimenta attrahunt. talium medicamentorum sunt purgantia omnia, & nonnulla alexiteriorū siue amuletorum. Caterū calida ut sint id genus omnia necesse est. Nam inter ea quæ essentiaē similia sunt, quod calidius est, id potētius attrahit, utpote quod similitudini auxiliariū adiūxerit calorē. Siquidem cum ipsum duabus causis attrahat, superabit id quod unā duntaxat trahit. Porro nihil refert *ἰδιόπρασινόν*, aut *ἑλκλόν*, aut *ἑλκισκόν* διῶκεμυ dicas, latine attrahentem siue attractoriam facultatem.

Alexiteriarum & alexipharmacarū facultatum, quedam alterando quod mortiferum est uiuant, quedam uero euacuando. Et earum quæ alterant, alie una aut duabus qualitātibus agunt, alie tota essentia. Similiter quæ euacuant, quedam substantiaē similitudine euacuant, quedam caliditate subtili ac tenui. Cap. 17

Verum quādoquidem de istis abunde dictum est: transeamus ad facultates quas uocant alexiterias: & alexipharmacas. Est autem harum natura duplex. Siquidem quædam alterant, quædam uero euacuant ex corpore patiente, seu uenenum corrumpens, seu deleteriū medicamen. Alterant igitur aut una qualitate; aut duarū coniugatione; aut deniq; tota substantia. Euacuāt totius substantiaē similitudine, & caliditate subtilium partium. Quatuor itaq; sunt uniuersæ differentiaē proficiscētis ab illis utilitatis, duæ alterantes, & duæ uacuant. Atq; ea sanè quæ qualitatis contrarietate auxilio deest, manifesta est. Nam si frigidū sit medicamen deleteriū, aut uenenum animātis, ab excalfacientibus petēdum remediū: sin calidū, à refrigerantibus. Si uero humidum, ab exiccantibus: sin siccum, ab humectantibus. Sic etiam si humidum sit & frigidum, ab exiccantibus & excalfacientibus: sin calidum et siccum, ab humectantibus & refrigerantibus: & in reliquis duabus coniugationibus ex proportione. Sed nec obscura est alteratio quæ fit per totius substantiaē facultatē, utiq; ijs quæ memoria tenent quæ demonstrata sunt in commentarijs De naturalibus facultatibus, & in illis quæ inscribuntur De temperamētis. Siquidē facultates quæ deleteria medicamina alterant, naturam habent mediam inter corpora perpetiētia, & medicamenta ipsa ledentia, ut uidelicet eadem sit proportio corporis ad facultatem alexiteriam, quæ illius ad deleteriam: & rursum deleteriū ad alexiterium, quæ alexiterij ad corpus. Ea propter propemodū omnia quæ deleterijs aduersantur, si largius sumpta fuerint, grauiter animātis corpus oblaedunt. Quamobrem ea moderatione quanti-

tatis omnes id genus facultates, exhibere oportet, ut neq; copia nimia corpus offendāt, neq; exiguitate sua ad deleterijs uincantur. Sed hoc iam attinet ad curandi methodum. Nunc autem quæ reliqua sunt persequamur. Omne deleterium uenenum à foris impositis medicamentis euacuatur, nempe aut caliditate attractionem molientibus, aut totius substantiaē similitudine. Sed & hic quoad fieri poterit maxime medium natura alexiterium sit oportet, corporis uidelicet quod curatur, & ueniū lædentis. Nam si aduersissimū foret corpori, in ipsum ageret potius, ceu deleteriū, haud euacuaret uenenu. Etem, ut claritatis gratia summam repetamus, scire oportet, deleterias facultates uniuersas temperatura esse aduersissimas corporibus quæ ab ipsis læduntur. Itaq; si à similibus temperie medicamentis euacuentur, erūt & hæc corporum naturis contraria. Sanè & sunt quadam tenus contraria, non tamē adeo ut interimant, sed ambigant potius, in medio sita eorum quæ ex professo corpus animantis lædunt, & quæ iuuāt. Porro nihil intererit, deleterias facultates, an phtharticas, an phthoropœas, an alio quouis modo appellare uoles: similiter nec an alexiterias, an alexipharmacas. Attamen si quæ ea quæ uenenatarum bestiarum ictus aut uenena sanant, alexiteria nominare uelint, quæ uero medentur deleterijs, alexipharmaca, ceu quidam censuere, disceptandū cum istis ac pugnandum de nominibus non est. Nec enim ex istis comparatur curandi morbos perita, sed ex rerum ipsarum cognitione.

Quod anodynorum, hoc est dolorem sedantium, & paregoricorum, hoc est lenientium aut mitigantium uocatorum medicamentorum, quedam reuera sunt eiusmodi, uelut calida coniuētiam habentia partium tenuitate: alia uero nomine duntaxat, uelut narcotica, hoc est stupefacientia, quæ sunt refrigeratiua omnia. Cap. 18

Porro quandoquidem & de his quod ad præsens conueniat satis iam expositum est, transeundum deinceps est ad sermonem De facultatibus anodynjs, hoc est dolorem sedantibus, & paregoricis aut praynticis, id est lenientibus aut mitigantibus, aut ut quæ nuncupare libebit. Facultas igitur anodyna, alia reuera est, alia tantum dicitur, tāquam si quisquam hominem mortuum dicat anodynū, quia dolore uacet. Caterum facultas reuera anodyna est eorum quæ primo ordine excalfaciunt, si utiq; in essentia tenui continentur. At facultas eorum quæ dicuntur, frigidorum est, quæ absolutō utentia frigore partem obstupefaciunt. Est autem stytor paulo minus q̄ insensibilitas, ac sensus priuatio. Porro quæ affectum sanando, dolorem sedāt, nec ea merito anodyna dici possunt. Nam id commune est omnium quæ curant. Itaq; quæ reuera sunt anodyna, partium sint tenuium, et scilicet euacuent, ac digerant, tum rarefaciant, extenuent, concoquant, & æquabile reddā quicquid in partibus dolore uexatis aut humorū acrim, aut lentorum, aut crassorū, aut multorum tenuibus spiramentis infarctorū, aut etiā uaporosi-

aut crassi, aut admodū frigidi spiritus exitū commo-
 dum nō inuenientis inhæsit, atq; inclusum est.
 Itaq; nihil prorsum adstrictiōnis habeat oportet,
 ne si pars quidem aut etiā affectus exposcant. Ex
 quibus liquet, quod interdum affectionem nō
 iuuabunt, sed dolorem tantummodo mitigabūt,
 quando uidelicet reuera dicentur anodyna. Inter
 dum uero etiā affectum ipsū adiuuabūt, & fa-
 cultatem habebūt duplicem, nempe anodynam,
 & sanātem. Sed de talibus copiosius agetur in cu-
 rādi uoluminibus. At in præsentis hoc dixisse suffi-
 ciat, nempe quod horum anodynorum proprie nū-
 cupatorum medicamentorum quædam, ut est an-
 te dictum, primi sunt ordinis exalfacientū, quæ
 sanè proprie sunt anodyna, ceu oleū anethinum;
 quædam uero similiter ut corpus nostrum, uelut
 pus mouentia nuncupata, de quorum materia su-
 pra dissertum est. Sed de ipsorum usū in libris De
 curandi ratione definitur. At ea quæ *καταφραγδα*,
 id est soporem epota molliuntur, ac proinde *καταφραγδα*,
 hoc est somnum conciliantia à plerisq; appel-
 lantur, temperem sortiūtur uel summe aduersam
 ijs quæ reuera sunt anodyna. Refrigerant siquid-
 em omnia corpus, & sensum eorum obstupefaci-
 unt, ut si paulo liberalius ebibantur, mortem affe-
 rant. Cæterum ad usum propositum optima sunt
 quæ desiccāt. Nam quæ frigida cum sint, humidita-
 tatis item copiam obtinent, ceu cicuta, ea potius
 non sunt utilia: talis est mandragora, excepto cor-
 tice eius sicco, & altercum, præter semen. Sed ta-
 men & in his candidum semen atro præstat. At
 tum quæ tota essentia nobis contraria sūnt, proin-
 desi uel minimum eorū assumptum fuerit, omni-
 nō lædāt necesse est, ceu dryopteris, & pityocam-
 pe, & thapsia, & solanum manicum, & hydrargy-
 ros, & fungorum nonnulli, præterea salua & fel
 uenenatorum animalium. Nam talia omnia gene-
 ra sunt deleteria, non quantitate: Ac proinde ni-
 hil eorū in alexiteris antidotos inditur, ueluti pa-
 paueris succūs, & myrrha, & styrax, & crocus. Si-
 quidē hæc si largius bibantur, quædā demerant,
 quædā mortē inferunt: uerū conuenienti quædam
 mensura alijs admista adiuuant. Porro quæcumq;
 inter ea mentem lædunt, continuo etiā pleraq;
 caput degrauant, uaporum prauorum cōgeriē ip-
 sum implentia. Sed & quædam os uentriculi ten-
 tant atq; affligunt, ut et in eadem caput per consensum
 lædatur. Communiter uero uniuersa duobus mo-
 dis cerebrum affligunt læduntq;, aut cum tota sub-
 stantia sunt contraria, aut cum unā durabusue qua-
 litatibus temperaturam immutant.

Duobus modis dicitur cathartica, hoc est purgans, facultas: aut
 enim quocumq; modo expurgans corporis recrementā,
 aut quia uim attractoriam familiarium succū
 corum obtinet. Cap. 19

Cæterum quoniam de his sufficienter dictum
 iam est, quod quidem ad præsentia faciat, tempe-
 stiuum nunc est, resumtis dictorū capitibus, ea
 adijcere quæ sermōni reliqua esse uideātur. Nam
 in ueritate quidē nihil est reliquum, nimirū cum
 secundæ iam facultates omnēs sint expositæ, qua

Galien.

A les sint genere scilicet, nec pauca speciatim supe-
 riorum explanatae ceu exēpla, unde quis orsus, quo-
 rumq; auxilio reliqua ipse queat assequi. Verum
 nihil seferes deterius habebit, si claritatis gratia
 breuibus iterum capitibus ea fuero complexus.
 Primum enim facultatem omnes purgatoriam in
 ore habent, haud tamen omnes perinde intelli-
 gunt: quia uocabulum duō significat. Alterū com-
 mune omnium quæ quouis modo animalis excre-
 menta expurgant: Alterum uero quod per excel-
 lentiam de ijs tantūmodo dicitur, quæ aut per uo-
 mitum, aut per uentris deiectionem purgant nō
 tanquam eiusdem sit generis tū ea quæ fit per na-
 res, tum ea quæ per os fit purgatio. Vocat autem
 ea medicamenta, quæ naribus (quas Græci *σινάρις*
 nominant) capitis purgandi gratia infunduntur
 errhina. At quæ in ore colluunt, aut dentibus mā-
 dentur, omnia una nomenclatura comprehendē-
 tes apophlegmatizōnta nuncupāt. Eiusdem cum
 istis sunt generis, quæ uuluae admota expurgant.
 Quæcumq; siquidē purgare animaduertimus, ea
 trahēdi uim possidēt, alia unum quocumq; suc-
 cum, alia duos, aut etiam plures: & id illis inter se
 commune est. Nam quæ crassis lentisq; humo-
 ribus extenuandis aut urinā ciere possunt, aut ex
 pectore pulmoneq; efficiendis excretionibus au-
 xiliari, purgāt sanè & ea quidem quodam modo,
 uerum antedictis non similiter nuncupantur, sed
 alia uocātur uretica, alia bechica, alia menses mo-
 uentia, hæc re à superioribus diuersa, quod non ha-
 beant uim familiarium succorum attracticem, ut
 illa. Quamobrem & in hisce sermō alia distinctio-
 nem postulat, nempe huiusmodi. Quæ in pelsis,
 aut fomētis, aut quouis modo simili, uuluae admo-
 uentur, ea duplici ratione agere cōsueuerunt. Nā
 alia calfaciēdo duntaxat prouocant, alia facultatibus
 attractorijs & purgatorijs, quas uocāt, quas
 demonstrauimus trahendorum familiaritate attra-
 ctiones peragere. At quæ hoc nomine bibūtur, ut
 sanguinem extenuent, & meatūs obstructione li-
 berent aperiantq;, ea trahēdi facultate uacuationem
 non perficiunt. Atq; priorē quidem cum pur-
 gantibus eiusdem sunt generis, secūda uero cum
 ijs quæ lac & sanguinem generant: de quibus pau-
 lo infra uerba faciemus, ubi prius de bechicis dis-
 fertum à nobis fuerit: quandoquidem & hæc bifa-
 riā nominata sunt, partim quia tussim prouocent,
 partim quia sedent. At qui contrariæ horum facultates
 sunt. Alia enim extenuandi naturam habēt,
 alia incrassandi. Atq; extenuandi quidem facultas
 in calidis & tenuium partium substantijs sita est,
 incrassandi uero in frigidis & crassarum partium
 essentijs inest. Atque hic sermō hoc in loco finem
 habeat. Conuenit autem transire ad id quod pau-
 lo ante distulimus. Est enim societas & similitudo
 quædam tum operum tum facultatum in ijs quæ
 prouocant sedantq; menses, lac, & semen. Sed &
 affinita illis quodammodo uicinaq; sunt quæ
 urinas mouent, & bechica. Proin-
 de de quolibet seorsum dis-
 ferendum est;

tem. 5

g

Quod

Quod lac generantium, aut semen provocantium facultas moderata sit calida & humida, alimentorum vero in totius essentia consistat similitudine. Cap. 20

Lactis et feminis effectrices facultates sunt partim in medicamentis tantum, partim in alimentis. In medicamentis, cum succos pituitosos exalfacientes in sanguinē vertimus. In alimentis autem secundum substantiā totius similitudinem, ubi uti delicti boni sunt succi, & humida, ac tepide calida, ceu ipsū lac. Siquidē sanguis calor est particeps animalis mediocris: plus quā vero mediocris, bilis: sicut pituita, frigiditatis. In medio autem pituita & sanguinis est lac, utiq; quod ad calorem attinet. Non tamen aequa ab utroq; abest, sed longius abest a pituita, propius accedit ad sanguinē. Cum ergo minus quam expedit ad ubera lactis venit, velis autem copiose provenire, ipsū cum contempla tuo sanguinem. Aut enim paucior est quam cōveniat, aut deterior. Itaq; qui paucior est, univērsam vitū rationem exposcit humectantem & excalfacientem: qui autem deterior est, si quidem bilio sus fuerit, primum purgationem desiderat, mox vitū quem modo dicebamus: si pituitosus, medicamenta requirit excalfacientia, aut primo aut secundo ordine, non tamen desiccantia. Verū inter ea potiora sunt quae nō tantū sunt medicamenta, sed & nutrimenta, velut eruca, foeniculum, anethum. Dico autē ipsas herbas etiamnum virentes & humidas. Nam sicca, plus quam oporteat et excalfaciunt & desiccant. Huius generis est & myrrianum, apium, sion, polium, eaq; vitū prius quā siccentur: quippe cum ea quae desiccant, humorem sanguinis depalcētia, ipsam crassiorē simul pauciorēq; efficiant: tum si natura quoq; sint calida, iusto etiam calidiore, si frigida, frigidiorē. Debet enim esse modice calidus, ac neutiquam crassus, ut lac generet. Quocirca quae sunt illiusmodi, extinguunt magis lac quam procreant. At quae sic ut dictum est calfaciunt, nullamq; insignem adiūctam habent siccitatem, lactis procreatricem habere facultatem merito dicta sunt. Verū ea numero sunt perquam exigua. Nec enim profecto facile inuentum est quod propositam in temperie sortitum sit mediocritatem: ceterū infinita sunt et multitudine incomprehensa quae lac laedant: Etenim quaecunq; plus quā expedit calefaciunt, quaeq; desiccant aut refrigerant, partim qualitatē ipsius sanguinis vitiantia, partim ipsū minorem reddentia, lac provenire prohibent.

Quod mensēs moventium medicaminum facultas calidior est, & modice desiccet, alimentorum vero est secundū totius substantiā similitudinem. Cap. 21

Porro dictis ad similitudinem vim obtinent, quaecunq; provocare aut sedare menses possunt. Vtrorumq; enim communis materia est, nempe sanguis in venis contentus. Itaq; ubi hic fluxilis fuerit, & qualitate temperatus, utiq; abundanter suppetat copiam. Communes quinetiam uberibus uteroq; venae sunt non exiles. At quae nam ea sint, alibi dictum est. Itaq; ubi ad alterutram partium sanguis defertur, altera siccescit, Proinde quibus menses

mediocriter ferūt, ijs lac in mamillis [non] colligit: quibus vero hoc large suppetit, ijs planē menses supprimuntur. Itaq; mirandum non est, si tum vitū, tum medicamenta similia sint, nempe & ea quae generant sedantq; in menses singulos exute purgationē, & ea quae lactis in uberibus generationem procurant ac supprimunt. Quanquam haecenus differant, quod & calidioribus & magis incidentibus purgatio mensura nōnunquam indigeat: quippe cum ea in parte sita magis aperiri debeant, quae tendunt in mamas, & sanguinem fluxilem magis requirāt, nimirum cum uteris ad delationem eius nihil conferat. Mittūt enim in venas quae illi cōmittuntur, haud attrahūt menses. At sanguis in ubera non tantum mittitur, sed & trahitur: ac proinde leviori subsidio medicaminum opus habet, cū non abunde in mammis fluit. Et medicinae quae iuvāt ut sanguis in mamillas eat: deficientes atq; imperfectas purgationes eam adiuvant. Sin autem multum oblaesa sint, aut planē retēta, nulla ex eiusmodi eas sanare potest: verum Sabinā, & Meum, & Iris, et Calamintha, et Pulegium, tum Diētannum, Asarum, Costus, Cassia, Cinamonum, Amomū, Aristolochia, Buniū, & eius generis reliqua absolutas uteri purgationum retentiones sanant: nam talia quoq; urinam promouent. Sed ab ijs quae hoc ipsum tantum appellantur, nempe uretica, hoc quidem differunt, quod non uehementer desiccēt. Siquidem excalfacio tribus generibus medicaminum cōmunis est, puta quae lacti procreando succurrunt, quaeq; mensibus ciendis, aut urinā conueniunt. Differūt tamen calor mensura: tum etiam quod quaedam desiccant, quaedam non. Siquidem quae non desiccant, & modice excalfaciunt, lacti generando utilia sunt. Quae vero plus excalfaciunt, non tamē ualenter desiccant, mensib. eliciendis sunt congrua. Verum & utraq; haec urinas prouocant et ad haec cum primis ea quae desiccantia etiam calefaciunt. Proinde ea peculiariter dicuntur uretica, siue urinam mouentia, non quia solum mouent urinas, sed quia solas, absq; ut etiam menses aut lac. Nam praeter alia et reddēdis ex pectore pulmoneq; excretionibus incōmoda sunt desiccantia. Pofeunt enim & ipsa incidi quidem, at non sicari, ceu & renum uicēq; calculi. Verum de talibus medicamentis supra disserui.

Quod quae semen provocant, quorundam ut medicamentorum quidem facultas est flatuosa et calida, aliorum vero ut ciborum flatuosa quidem etiam, sed tota substantia familiaris. Cap. 22

Ut lac, ita & semen quaedam generare dicuntur, & quae his sunt contraria, ex tunc genere: tum quaedā prouocare, & ipsi contraria supprimere: ac generare quidem, quae procreant quod antea nō erat, extinguere vero quae corrumpūt: prouocare autē, quae quod in alto delitescēbat, in apertum profertur, & his contraria, quae supprimunt. Igitur semē generant cibi quidem qui bene nutriūt, & flatuosi sunt, totisq; substantijs familiares, medicamenta vero flatuosa & calida, Extinguunt autē desiccantia

cantia & refrigerantia omnia, & quæ totis substantiis sunt contraria. Porrò prouocant quæcumq; calida sunt & flatuosa absq; delicatione, suppressi uero cōtraria. Etenim cum seminis substantia ex bona superfluitate generationem fortiaur, sitq; etiam effluuosa, bene nutriant & flatuosa sint necesse est quæcumq; semen aut procreare, aut prouocare possunt. Itaq; bulbi, cicer, fabæ, polyposes, conus, edulia dicuntur multi seminis, & sunt. At scincus & saryrion medicamenta sunt. Porrò simul cibi ac medicamina multi seminis sunt lini semen & eruca. Cæterum quæ refrigerare sunt natura tum edulia, tum medicamine semen cogentia, incrassantia, & stabiler reddentia, uim habent ipsam suppressentem, non autem corruptentem: nempe lactuca, blitum, atriplex, cucurbita, mora, melopepones, cucumeres seu pepones, seu nō pepones, hoc est maturi, seu non. Porrò quæ reficant, prorsum non esse quidem semen permittunt, etiam si calida sint natura, uelut ruta. Si autem nō calfaciūt, multominus, ut nymphæa. Atq; hæc sane rationale est substantiæ proprietate contrarie affecta esse semini. Eandem proportionē tum esculentorum tum medicamentorum est inuenire in lacte & mēlibus. Porrò alio modo sub idem genus cadunt, quæ respirantium instrumentorū reiciendis excreationibus auxiliātur, quæq; urinam ciere possunt. Hęc enim omnia extenuandi facultatem obtinent, uti cōtraria incrassandi. Sed de uicē extenuante priuatim conscriptum est, nihilo secius in eodē uolumine in dicitis quæ incrassant. Verum extenuantia & incrassantia medicamēta ex libris qui deinceps sequentur seligit: in extenuantibus quidem scopum habēs caliditatem istā partium tenuitati, in incrassantibus uero cōtraria. Oltēdem enim est in superioribus libris, q; propria quædam sit medicamētorum essentia tenuis natura, non solis excalcācentibus cōiuncta. Eadem ratione & incrassantium natura non solis inest refrigerantibus. Cæterum ut in talibus facultatibus proportio quædam inest, eundem in modum quærendum est in omnibus, etiam si nomen non sit impositum. Vocatur enim quædam oxydoricæ facultates, quæ oculos, ubi nullum illis insit sensibile pathema, male tamen munere suo funtentes corrigunt, & in integrum restituit. Ac nimirum & in auribus, & in naribus, & per quæq; aliorū sensurū singulatim proportione talis quædā sit facultas necesse est, nec tamē facultas nominata est ab acumine auditus oxycoos, sicut nec in olfactu, nec in gustu, nec in tactu, cū tamē in reb. ipsis sensilib. ex proportiōe insit. Porrò si quis similitudinē plus etiam extēdat, per quancq; nostri particulam talem existere medicamentorū facultatē necesse est, à qua uiderelicet melior reddatur partis ipsius actio, ut uerbi causa, uentris actio. Si quidē talē eius imbecillitatē inuenire est sæpenumero, qualis est in oculis amblyopia, hoc est hebetudo uisus, cum ij nec phlegmone teneant, nec influxu torqueant. Nec ulcerati sint, nec alius quiduis maliperfessi. Et sanē in medicamētis quæ affectum

Galen.

uentris eiusmodi emendant, peptica siue concoquentia nuncupantur, appellantis quidem figura nihil proportionale habentia oxydoricis, cæterum opere ipso & facultate similia.

De facultatibus à partibus corporis cognominatis. Cap. 23

Porrò quoniam & quasdam appellatas à corporis partibus, facultates esse diximus, nihilo fuerit deterius & de his disserere. Nec em̄ (quod quispiam forsan existimet) omnibus partis affectibus congruūt, nec ita uni, ut alij nihil prosint, sed quoniam frequentissime aut maxime agant ea in parte à qua nomen sunt mutuata. Ophthalmicæ quidem quando quidem maxime ac plurimum ad oculos ipsas usurpamus, uelut collirio *ἢ ἴα ἰαδωγ*, & alio *ἢ ἴα πομφόλυγ*, & eo quod cygnum uocant, itemq; eo quod Libianum appellant, & alijs omnibus quibus uti quidē liceat & ad aures affectas, aut os, aut nares, præterea pudendū, & anū: uerum non ita frequenter, nec tanto cum fructu. Rursum autem alias nūcupamus hepaticas, alias splenicās, pleuriticās, & stomachicās: nimirū cū & ipsas ea in parte quam nomine designāt, sæpissime simul ac potissime prodesse cōspicimus. Porrò quæ sit profectus & adiumentis causa, in opere De curandi ratione explicabimus, in quo cætera quoq; omnia de medicamentorum usu exponetur. Itaq; nihil etiam hic hęrendum atq; immorandum est, nisi quod uocabulorum nonnihil declarandus est usus: quem cum alij nonnulli recentiorum medicorum, tum præsertim qui uocantur Methodici, inaniter inuuarunt atq; induxerunt.

De inani nominum usurpatione, quam medici recentiores, & inter eos maxime Methodici induxerunt. Cap. 24

Nam quod stalticas quasdam facultates, hoc est sistentes seu suppressentes, & constringentes, & contrahentes, & repellētes, aut alias id genus profecerat, id nequaquam absurdum est, nec obscurū. At cum metasyncriticas tum materias, tum facultates nominant, nec apertum est quod dicūt, nec uerum, nec etiam sectæ congruens eorum, qui se fugitare profiterentur quæ à dogmaticis opinionibus (*Ἐσπορῆσις* uocant) profiscitur indicationē. Sufficere namq; aiunt sibi apparentes communitates. Atqui, excedentibus corporis meatibus ex statu naturali in statum præter naturā, in proprietate naturæ dēdē existere quædam pathē, ea dogmatica hypolepsis est. Sequitur uero ad hanc quædam esse facultates eiusmodi *πρωθυ* metasyncriticas, uel dēscet quæ commutent meatuum alienam à natura confusionem: nā sic usurpant nomina Thesalsi sequaces: atq; ad ea quæ diutina fluxione ueuantur, facultates eiusmodi adhibent, cum nec monstrarint meatuum alterationes in talibus pro uenire affectibus, necq; hæc medicamēta transmutare (nā ita uertō *ἢ μετασυγκρινω*) uitiatū meatuum statū possunt, demōstrare ualeāt. Nam, per deos immortales, cur obscuro napy, thapsia, pyrethrum, capparīs, & absolute quæcumq; urere possunt, si diutius corpori inhærent, meatuū statum commutant. Nam q; partes quæ tentatur assidua fluxione, ab hoc genus medicamentis iuentur;

tom. 5

g 2

perspi

perspicue uidetur:at quamobrem inuenitur, natu-
ralis speculationis problema est. Ac nos quidem
dicimus earū frigidam simul atq; humidam esse
temperiem, ac proinde posse esse medicamēta quæ
simul & exaltescant, & desiccant. Atq; alij aliam
causam exaltescant, pro opinione nimirum quam
conceperunt de corporis elementis. Nec tamen
usurpari conuenit metafynchrisos uocabulum à
quouam alterius sectæ, præterquam eorum qui
animantium corpora & existimant & appellatit
synchrinata, seu confusiones ex corpusculis inse-
cabilibus, minimisq; et partitionis expertibus, ac
similibus: quamquam nec istis omnibus, sed ijs
dixitaxat, qui, uti Theſſalus in Canone, meatuum
alterationi id genus morbos ascribunt. Nō enim
qua methodicus est Theſſalus id dicit (siquidem
ubi tanquam methodicus differit, illic ab osculo-
rū recedit indicatione) sed quia dogmaticus, scilicet
ab iisdem quæ Asclepiades ponit elementis
exorsus, cæterū haud utrobicq; sequens. Sed nunc
tempus non est super talibus prolixius differere.
Nam quædam curandi methodo magis sunt pro-
pria, quædam uero in opere de Themisonis &
Theſſali secta exactius expromitur. Uel pesti-
uum itaq; nunc est, cōtractis huius libri temis qui
escere, si modo duo illi præterea capita adiecerō:
alterum superius dilatum, nempe de facultatibus
contrariis: alterum ad insequeſtem sermonem ne-
cessarium, definitur scilicet cuiusq; tum exalta-
cium, tum refrigerantium, tum exiccantium
atq; humectantium ordinem.

Quo pacto contrarias iudicare facultates oporteat. Cap. 25

Igitur contrarias iudicare facultates ex operi-
bus oportet, sicut toto hoc libro sæpenumero o-
stendimus, dicentes quasdam facultates emplaſti-
cas: & his contrarias extergentes tum factu libe-
rantes & infarciētes, præterea emollientes & in-
durantes, ac laxantes & contendentes: nā adstrin-
gentes, aut acres, aut amaras, aut acidas, aut dul-
ces, non facultates medicamentorum, sed gustus
esse qualitates mōstrauimus. Itaq; in his aut pro-
sum quærenda non est contrarietas, aut non ut in
facultatibus quærenda. Quanquam & in istis du-
plex est scopus, nempe earum actiones, & tempe-
raturæ. Actiones quidem, in densando & rarefa-
ciendo, aut quippiam ex alto extrahendo, aut re-
pellendo, in crassando materias, aut extenuando,
aut infarciendo meatus, aut factu liberādo. Tem-
peraturæ uero in calido, frigido, humido, et sicco:
de quibus omnibus abunde in quarto libro deter-
minatum est: monstrantibus nobis quod adstrin-
gens terrestre sit et frigidum: acidum uero subtile
frigidum: amarum autem terrestre subtile: deniq;
quod absq; insigni qualitate frigidum aqueū. Sic
acre igneum ostendimus: salum uero terrestre ca-
lidum, nondum tamen igneum: similiter dulce ca-
lidum, sed nondum urens. Quæ uero oleosa sunt,
omnia aquea sunt & aëria. Secuta sanè sunt tem-
peraturas eorum & opera. Nam adstringere con-
trahere, constringere, dēfere, repellere, & incre-
fate: ad hæc omnia refrigerare exiccateq; natum

est: Acidum uero incidere, extenuare, diuidere,
factu liberare, perpurigare (*σπαρασθαι* Greci uo-
cant) citra exaltescentiam. Acre uero similiter ut
acidum agere, quod ad extenuationē perpurga-
tionemq; attinet: cæterum hoc differt, quod aci-
dū refrigerat, acre uero exaltescat: ad hæc quod
illud repercutiat, hoc attrahat & digerat. Sic ama-
rū quoq; meatus perpurgat, abstergit, extenuat,
incidit humorum crassitiam absq; manifesta ex-
altescentia: Frigidum uero aqueum in crassat, co-
git, contrahit, constringit, extinguit, atq; obstupe-
facit. Porro acre extenuat, perpurgat, digerit, per-
rumpit, attrahit, & escharam siue crustam efficit.
At salum contrahit, constringit, condendo ser-
uat, desiccatur citra apertam aut caliditatem aut fri-
giditatem. Dulce uero cōcoquit, laxat, rarefacit.
Oleoſum deniq; humectat, emollit, laxat. Facili-
us itaq; iam erit ex modo dictis ponderantem sa-
pores, inuenire qui temperamento, quicq; operi-
bus sint contrarij.

De limitatione ac finitione ordinis cuiusq; exaltescentium, friga-
cium, humectantium, & desiccantium. Cap. 25

Porro congruens iam tempus est, definitis tem-
peramentorum & facultatum quæ in medicamē-
tis sunt ordinibus, hunc librum absoluerē. Igitur
symmetrū appellare medicamen conuenit, quod
neq; exaltescat, neq; desiccatur, neq; frigefacit, neq;
humectat, neq; calidum, frigidum, humidum, sic-
cū est. Quod uero aut calidius, aut humidius,
aut frigidius, aut siccus est, à uincente seu excedē-
te cognominatur facultate. Porro per unūquen-
que excessum quatuor posuisse ordines, quod ad
usum spectat, sufficit: calidum quidem nominan-
tes primi ordinis, quod nos exaltescat, nō tamen
euidenter, uerum ut opus sit insuper demonstra-
tione rationali: sic frigidum, humidum, et siccum,
quod demonstrationem requirat etiam, nondum
actionem ualentem adeptum. Quæ uero manife-
ste aut calfacere, aut frigefacere, aut humectare,
aut dēficcare possunt: ea secundi esse ordinis dicē-
tur. At quæ iam uehementer quidem, non tamen
summe, tertij. Quæ autem adeo exaltescere pos-
sunt, ut escharam moliantur, & urant, quarti. Sic
quoq; quæ uehementius refrigerant, adeo ut ex-
tinguant, & ipsa quarti sunt ordinis. Cæterum nul-
lum inuenire est quod quarto ordine dēficcet,
quod non etiam uratur: nam quod summe dēficcat,
omnino id etiam deurit. Attamē tertij ordinis
exiccantium esse quippiam queat, quod non urat,
ceu omnia quæ uehementer adstringunt, ex qui-
bus est omphacion, rhus, alumen, balauſtium, gal-
la omphacitica. In his autem ipsa quædam uicina
iam sunt adurentibus, ut squama aris, & æs ustū,
quasi inter tertium quartumq; ordinem dubie he-
reant. In medio tertij est æs ustum: si lotum sit. In
principio tertij hypocyſtis. Sic autem & in secun-
do & quarto differentias constituere licet tripli-
ces. Nec enim perinde urit cauterium, & sinapi, si
cet ambo quarti sint ordinis. De his sanè omnib.
in sequentibus libris per singula scorum medica-
menta determinabitur.

ARGVMENTA CAP. LIBRI SEXTI

Proceñiū, in quo argumentū primi et secundū huius operis librorum explicat: deinde huius & sequētium librorum: quod quā legendi non sint, nisi priores quinque bene teneantur. Quod varia nomina Babyloniorum & Aegyptiorum, & à quibusdam conficta, tanquam uana omiserit. Censura ueterum & recentiorum qui de medicamentis simplicibus scripserūt, ex quibus praecipue reprehendit Paphisum & Andream, maxime uero laudar Diocoridem, Cap. 1. Abrotonum: itē de tribus absinthij generibus, & de abrotono usto. 2. Agnus id est Vitex. 3. Agrostis id est Gramen simpliciter: & gramen cuius radix edendo est, & parnassi gramen. 4. Anchusa, & quatuor eius genera. 5. Agaricum. 6. Ageraton. 7. Adianton. 8. Aizoōn id est sedum. 9. Aegilops. 10. Aera id est lolium. 11. Aegirus id est populus. 12. Acacia. 13. Acalephe id est urtica. 14. Acanthus. 15. Acanthium. 16. Acanthus leuce id est spinaalba. 17. Acāthus Aegyptia. 18. Acorus. 19. Aconitum. 20. Ache, sambucus. 21. Alimū. Alisma, uide Damafoniū. 22. Aloe. 23. Alyssum. 24. Alfinem. 25. Amaracus id est parthenium: de samphuro sine infra. 26. Ambrosia. 27. Ami. 28. Amara thūs. 29. Amurca. 30. Ampeloprasum. 31. Ampe los agria, uitis syluestris: item de uite cultiua, & alba, & nigra. 32. De amygdalis. 33. Ammoniacū. 34. Amomum. 35. Anagallis. 36. Anagyris. 37. Androsamon. 38. Androsaces. 39. Andrachne id est portulaca. 40. Anemone. 41. Anethū. 42. Anthyllis. 43. Anthemis. 44. Anisum. 45. Antirrhinū, uel Anarinū. 46. Aparine. 47. Apios id est pyrus arbor: & de pyris syluestribus. 48. Apocynon. 49. Arge mone. 50. Arisaron. 51. Aristolochia. 52. Arceuthus id est iuniperus. 53. Arction: & Arction alterum quod personata uocant. Arctiū, uide Bunium. 54. Arnoglossum id est plantago. 55. Arū. 56. Artemisia. 57. Asarū. 58. Asclepias. 59. Aspalathus. 60. Asparagi. 61. Asplenon. 62. Astragalus. 63. Aster Atticus, uide infra, Buboniū. 64. Astaphis id est uua passa: & de staphisagria. 65. Asphodelus. 66. Atractylis. 67. Atriplex. 68. Asphace. 69. Absinthiū: De cuius tribus generibus supra etiā in Abrotono docuit, uide infra, Seriphum. 70. Balanus id est glans unguetaria. 71. Balsamū. 72. Balaustū. 73. Batus id est rubus. 74. Batrachium id est ranūculus. 75. Bdeliū. 76. Bechium id est tussilago. 77. Blitum. 78.

Bulbus: & de bulbo uomitario. 79. Buboniū, uide etiā Aster Atticus. 80. Buglossum. 81. Bunium, alias Arctiū. 82. Buphthalmum. 83. Brathy id est Sabina. 84. Britānica. 85. Bromus id est auena. 86. Bryō id est muscus marinus: & de musco arborū. 87. Galion. 88. Gentiana. 89. Gigarta id est acinorum uuae nuclei. 90. Gingidiū. 91. Glauciū. 92. Glauz. 93. Glechon id est pulegium. 94. Glōcis id est sorde seu strigmenta balnearum. 95. Glycyrriza. 96. Glycyfide. 97. Gnaphaliū id est tomentū herba. 98. Gonpyllis id est rapum. 99. Damafoniū, uel alisma. 100. Daucus & de femine dauci: (uide etiā infra in Staphylino id est pastinaca) 101. De lauro. 102. De lauro Alexandrina herba, & Chamædaphne, & Daphnoide. De daphnoide, uide etiā in Clematide infra. 103. Diōgamnus. 104. Dipsacus. 105. Dorycnidiū. 106. Dryaculus. 107. Dryopteris. 108. Drys id est quercus, & glades. 109. Ebficus, uide infra in Malta. 110. Ebenus. 111. Olea: & de Oleis primum ex oliua arborum, tum dulcium acerbō: deinde de alijs diuersis quae seminibus exprimuntur, ut Cicinum, raphaninū, selsaminum, &c. Rursus de differentijs olei ex oliua. Et de illis oleis quae floribus aut alijs iniectis sūt: quibus si aromata addas, myra id est unguenta dicuntur. 112. Elatium. 113. Elaphobocū. 114. Heleniū id est Inula. 115. Eleliphacus id est salua. 116. Elleborus uterq;. 117. Helxine: & altera, cissampelus quocq; dicta. 118. Elymus id est panicū. 119. Empetrum. 120. Epithymū. 121. Epimedium. 122. Epimelis uel unedo: uide Comarus infra. 123. Erebintus id est cicer: & de agrefti cicere. 124. Erice. 125. Serpyllū. 126. Erysimon id est irio. 127. Erythrodonon id est rubia. 128. Eupatorium. 129. Euphorbiū. 130. Ephemerum non letale. 131. Echinus, alias Erinus. 132. Zea. 133. Zingiber. 134. Zythus. 135. Zyme id est fermentū. 136. Hedyosmus id est mintha, & calamintha. 137. Hedyfarū id est securidaca. 138. Hemerocalles. 139. Hemionitis. 140. Erigerō id est senecio. 141. Bryngiū. 142. Thaliētū, alias thaliētū. 143. Thapsia. 144. De thermo id est lupino satiuo et syluestri. 145. Thapsia. 146. Thridax id est lactuca. 147. Thymus. 148. Idæa radix. 149. Ixos id est uiscū. 150. Ion id est uio la. 151. Hippuris. 152. Hippomarathū uide marathū. 153. Ictis. 154. Ifo pyron. 155. Itea id est falix.

GALENI DE SIMPLICIUM

MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS,

Liber Sextus.

PRO O E M I V M.



De simpliciū medicaminū forma pariter & facultate scribere nobis aggressis primis duobus libris ante omnia prauos modos ratiocinationum, quibus recentiorū medicorū pleriq; usi grauissime allucinantur, indicare est uisum. In tertio uelut elementa quaedam totius doctrinae tradidimus. Deinde uero in quarto de factorib; disquisiuitur, studio inueniendorum omnium quae ex illis ad facultatum conducere cognitionē possent. differuimus autem in extremo ipsius libri de quae sitaibus medicamentorū quae ad odoratū attinēt. Porro in quinto ad reliquā facultatū genus trans-

gressi, quod quidē ab ipsis operibus quae peragere natā sunt, denominatur, et illic quoq; cuiusque substantiam ostendimus. Et sanē generalis sermo de simpliciū medicamentorū facultate uniuersus tam finē sortitus uidetur. Tempus uero ad sermones particulares, seu speciales, seu utcumq; nominare cuiq; uisum erit, transire. Et sanē hi priuati in unoquoq; medicamine peragētur, ceu protinus in initio fecimus: in horum cōmentariorum primo quidem de aqua & aceto cōtemplati: in secundo uero de oleo & rosaceo, nisi quod illic uelut in exemplis sermonem transigimus aduersus eos qui non recte de illorum facultate quid protulissent: hic autē breuibus de unoquoq; differā, non amplius curans, si quis male de quouis eorū quip-

piam pronunciarit: id tantum scripturum quod mihi uidebitur uerissimū, omīssa aduersus illos qui quid peccarunt, concertatione. Porro quod non modo obscura futura est oratio ijs qui superiora ignorant, uerum demonstrationis quoque si de desituta, uel me tacente clarum arbitror. Sed tamen & in memoriam reduxisse forsitan præstiterit, primum quidem quod in natura temperatissima faciendum est medicaminum facultatis periculum, postea deinceps in morbis simplicibus. At si quis ex gustus qualitatibus indicatorie cōiectari uelit de eorum facultate, in quarto monstrauimus quamnam sit in his methodus. Si quis ergo aut negligenter lectis superioribus, aut plane non lectis, statim ad hunc librum pergat, festinans quam primum medicaminum facultatis peritus effici, haud certam eorum habebit noticiā. Cæterum quoniam medicamenta omnia partim sunt partes animalium, aut platarum, aut fructuum, aut horū liquores (quos *ærās* Græci uocāt) aut succi, partim uero ex metallis sumuntur: optimum mihi uisum est de plantis ante omnia differere, tum quod numerosissimum illarum est genus, tum quod uirū robore præcellentissimū: inde de metallicis tractare, atque hinc ad animalium partes transire. Quinetiā eo illas ordine prescribere decreui, qui in elementis uisitur, eas plantarum primo loco collocās, quarum appellationes initium sui sortitæ sunt elementum æ: secundum uero loco quæ à B incipiunt, & sic tertio, quarto, quintoque loco: atque deinceps, pro literarum uidelicet ordine. Nā & Pamphilus eū in modum tractatum de herbis cōposuit. Verum is ad fabulas uersus aniles est, simulque præstigiaturas quas dā deliras Aegyptias, iunctis nonnullis incantationibus, quas cū herbas colligunt admurmurāt. Et sane utitur ad periapta, id est quæ suspenduntur, & manganas nō solum curiosas, & à medicina alienas, sed etiam falsas uniuerfas. At nos neque horum quippiā, neque nugaces istorum narrabimus transformationes: nec enim uel paruis admodum pueris utiles tales esse fabulas existimamus, nedū ijs qui medicinā opera obire properāt. Et profecto protinus in Aphorismorum initio ab Hippocrate dictum mihi uidef, Vita breuis, ars uero longa: ut tēpus non in inutilia impenderemus, uerum quāmaximo studio festinare uisā incedere cōpen diosissimam, nempe per ea quæ sunt in arte utilissima. Pleraque uero ista herbarum nomina aut Aegyptiaca, aut babylonica, quæque nonnulli aut præuocant, aut notæ gratia illis imposuerunt, hic adscribere mihi uisum est superuacuum: nā præstat, si quis hæc uolet curiosus persequi, seorsum & per se apud illos legere qui transulere: nā ita & libros illos inscribunt, ut qui eos nō composuerint: uelut Xenocrates Aphrodisiensis fecit, uir cum in alijs supra modum curiosus, tum à præstigiatura nō alienus. At Pamphilus, is scilicet qui libros De herbis cōposuit, plane ex ijs quæ uel ipse scribit, præsert grammaticum, indicatque se nec conspexisse herbas de quibus conscribit, nec uires earum expertum, sed ijs qui ante ipsum scripsere; si dem ha-

buisse circa illam explorationem. Sic sane libros expleuit, annexo ad quancque herbā nomīnum aceruo, deinde etiam exponens si qua ex homine ferebatur trāsformatio: tum epodos et libationes atque thymiamata, quæ in colligendis illis adhibebant, adscribens: nec non & alias eiusmodi præstigiaturas nugaces. At Anazarbēsis Dioscorides quinq; libris materiā omnem utilem absoluit, non herbarum tantum, sed & arborum, & fructuū, & succorum, & liquorum, memorans insuper et metallica omnia, & partes animalium. Et mihi utique uidetur omnium perfectissime tractatum de materia medicamentorum cōfessice. Nā licet à maioribus eorum plura de illis bene scripta extent, tamen à nemi ne omnīū æque de omnibus: nisi si quis Tanitrum prædicet Aesclepiadis. Nā & huic cætera bene dicta esse probantur extra ratiocinationes quas super caulis affert. Atque hæc nimirum perlegere debet quisquis peritus medicamentorū materiæ euadere studeat. Ad hæc quoque quæ scripta reliquit Heraclides Tarentinus, & Crateus, & Mantæas: uerum illi nō similiter scripserūt, nec in unum collegerunt omnia, ceu Dioscorides, qui de materia quinq; libris fecit titulum, uerum seorsum, uerbi causa, de preparatione aut probatione scripserūt, ut Heraclides Tarentinus: seorsum uero de purgationibus, aut propotismis, aut clysmis, ut fecit Mantæas: separatim de facile parabilibus remedijs, uti Apollonius: aut de ijs quæ secundū locos, ut Mantæas. Porro plerumque medicamentorum usum ueteres in curandi tractatibus prodiderūt, ut & iuniorum medicorum prope omnes. Nā & ab Hippocrate dicta sunt multa, & ab Euriphonte, & Diuiche, & Diocle, & Pliftonico, & Praxagora, & Herophilo. Nec est ueterum medicorum quisquam, qui nō aliquid plus minusus arti cōtulerit ad medicamentorum scientiā, idque citra præstigiaturam aut mēdaciū, quæ postea inuexit Andreas. Itaque cui ocium suppetit legendis utiliter de medicamentis scriptis libris, multos quidē habet, ut est dictū, antiquorum, sed nec paucos iuniorum, adusque Paphilum & Archigenem. Quin et Rufus Ephesius cum multa medicamenta in curandi libris conscripserit, tum de herbis uersibus hexametris quinq; libros cōposuit. Nec metus est, defectuorū libros utiles, etiam in tota uita quis aliud nihil quam de medicamentis legere uolet. Verum abstinendum ab Andrea est, alijsque similiter mendacibus: multoque etiā magis fugiendus Pamphilus, qui ne pro somnium quidem herbas uidit, quarum aggreditur figuras prescribere, nam id genus hominum (quomodo assimilauit eos Heraclides Tarentinus) simillimum est proconibus, qui formā ac notas fugitiui mancipij, licet ipsi nō uiderint unquam, præconio tamen publicat: notas enim ab alijs qui norunt accipiunt, & ceu cantilenā eas profert: ut si forte is quem præconio indicat, prope adfuerit, agnoscere tamen non possent. Equidē non possem non accusare & illos quoque, qui primi herbarū formas scriptis docere sunt conati, cum melius existimem ab ipso præceptore oculis discere,

ac non adfimilari ijs qui ex libris prodeunt gubernatores: nam sic & uerior & manifestior eſſet doctrina, nō herbarum modo & fructū arborumq; ſed & aliorum omnium medicaminū. Verū enim uero ſi omnino libris eſt opus, quis adeo miſer eſt, ut prætentiſcriptis Dioſcoridis, Nigri, Heraclidis, Crateuz, & aliorum innumerorū qui in arte ipſa conſenuerunt, libros grammaticos ſcribentis incantationes, trāſformationes, & decanorum dæmoniorumq; herbas ſacras perferat: Nā quod hominibus iſtis præſtigiatoribus unicū fuerit ſtudium, ut uulguſ imperitum talia ſcribentes in ſua admirationem uerterent, uel ex ipſiſ Pamphili libris diſcere liceat, qui primā inter herbas conſcripſit Abrotonon omnibus nobis cognitā: ac deinde Agnon ſiue uiticem, & ipſam admodum notā: inde Agroſtin herbam, nec uulgo ignotam: mox Anchulam, quā nec ipſam quiſpiā ignorat: ſicut nec Adianton, quæ illi deinceps ſcripta legitur: at que in hiſ utiq; nihil, quod quidem ſciā, ſuperuacuum ſcribit: uerum poſtea herbæ meminit nomine (ut ait) Acti, hoc eſt Aquilæ, de qua ſateſ Græcorum nulli quicquam eſſe proditum, uerum ſcripta ſe reperitſe in libello quopiam ex ijs qui inſcribuntur Mercurio Aegypcio, continente trigintaſex ſacras horoſcoporum herbas. Quas clarū eſt eſſe omnes nugæ meras, atq; autoris ipſius ſigillatim ſimilia Ophioniciſ Cōchlacibus. Nec em̄ proſum quiſpiā extitit Conchla: ad riſum em̄ fictum nomē eſt, ſicut pleraq; alia in libro eius cōſcripta. Nec trigintaſex herbæ illæ ultra nomen ipſum quicquā ſunt, nec ulla ipſiſ res ſubiaceat: uerū Pamphilo ocium fortaliſis ſupererat, inutiles fabulas libris intexere. At nos nunc quoq; tempus nos perdiditſe arbitramur, qui proluxiſ eorum meminimus. Itaq; quæ uſilia ſunt, iam nunc ordiamur.

Abrotonon, Abſinthij genera tria, abrotomum uſitum. Cap. 1

Abrotoni herbæ nec ſpeciem formam ue ſcribere poſt tot tantosq; uiros oportet, nec particulares actiones, ceu illi faciuntur, quas ut non deſinite diſtincteq;, ſaltem clare ſignificauerunt: uerum & nos quoq; eas copioſius exponemus in opere De componendis pharmacis, ſimulq;. De paratuſ facultibus: interim uero etiam in Curandī methodū libris, nimirum ubi expoſcet uſus. Verū quod ab initio propoſitum fuit, nepe uniuerſales dūtaxat medicamentorum omnium facultates inſpicere, id quidem & in alijs conſentaneum eſt, & nunc ſane etiam faciendū dicendumq;, Abrotonon eſſe calidum & ſiccum facultate, in tertio ordine ſiue reſſu poſt media ſitū. Porro quod eiſmodi ordo ut ad temperatam naturā expenditur, ſæpe ante diximus. Sed & inueniemus temperiē eius non minime quidē et ex gūſtu ducta coniectura, ut pote cum ſit admodum amarum. Porro ſaporē eiſmodi, cum terrenæ ſit eſſentia, à largo calore extenuatum oſtendimus. Itaq; non inſtrēne excaſcit pariter & deſiccet. Quinimmo & cū diſtincta illa experientia, de qua ſupra frequēter dictū eſt, diligenter explorafſemus, ex eadem temperiē mediam hoc comperimus. Nam ſiue comam cum

floribus (nam reliqua eiſ palea inutilis eſt) cōtufam ulceri puro illinas, mordax & irritans uidebitur: ſiue eo in oleo macerato caput uoles aut uentre perfundere, admodū calfacere reperies. Quin & ſi quibus per circuitum redeunt rigores, eos ante inuaſionē rigorū hoc uoles cōfricare, minūſ utiq; rigore cōcutientur: immo & ſenſus quidē protinus ubi admotū fuerit, ipſum calfacere percipit. Porro quod liſtricos interimat, par eſt, nimirum cū ſit amarum, ac proinde uel antequā experiaſtis manifeſtū, ſiquidē memoria teneas quē in horum cōmentariorum quarto de amari ſaporis natura prodidimus. Sciesq; protinus, quod et digerēdi et incidēdi quādi uim habeat: ſed & q; magis q; Abſinthio id ipſi neceſſario inſit, in promptū erit colligere, primū quidē ex gūſtu (pauciſſimæ ſiquidē acerbitatis particeps Abrotonon eſt, nō pauca uero Abſinthium) deinde ex eo q; inimicū ſit ſtomachō Abrotonon, uelut etiā Seriphon: gratum uero & amicū, Abſinthium. Siquidē de iſtis ſupra oſtenſum eſt, quod amarum ipſum per ſe omniaſ riam inſenſum ſit ſtomacho: auſterum uero, aut acerbum, aut in ſumma adſtringēſ, ſtomacho amicum. Porro ubi qualitates hæ inuicē permiſſæ fuerint, quæ uehemētior fuerit, ea utiq; uicerit. Atq; hæc ſatis eſt in hoc tractatu nouiſſe. Moſtrabitur autem in libris De ratione curādī, quo pacto quis optime medicamēto eiſmodi uti poſſit. Ac proinde quærendum haud etiam eſt, quamobrē cum malo cydoneo cocto illitū aut pane, oculorum ſanitat phlegmonas, neq; quod cū farina hordeacea tritum ac coctum digerat phymara. Neutrū ſiquidem horum nec aliorum quiduis huic propoſito nobis tractatū proprium eſt: ſed qui Empiricam profitentur doctrinam, ij in paratuſ facultibus medicamentis ea conſcribunt. At qui ex ratione artem tractare uolunt, ijs opus eſt methodo curandī. Nā alioqui damnium magis q; utilitatem ex tali conſequant narratione. Sanē Hippocrati, qui in Aphoriſmiſ ſcripſit: Dolores oculorum ſoluit merſio, aut balneū, aut fomentatio, aut ſanguinis miſſio, aut purgatio: nec adiecit quofnam dolores uini potio, quos balneum, quos fomentum, quos ſanguinis miſſio, & quos purgatio, ignoſcendum forſan quis arbitretur, tribus, ut arbitror, de cauſis. Si quidem aphoriſticam faciebat doctrinam, in qua propter breuitatem & compendium pleraq; ita dici conſeſſum eſt: et omnia quæ dolor eſt ſoluitur enumerauit, tamen nō deſiſſit ad quem dolorem quodnam ex illis cōgneret. Tum multis in locis aliorū librorum occaſiones nobis præſtitit, diſtinctiones in ijs quæ hoc pacto dicuntur inueniēdi. At qui neq; in alijs libris de talibus ſcribere diſtinctionibus, aut in enarratorio & prolixo tractatū aphoriſticē tamē ac breuiter ſcribunt, aut inſuper etiā ex multis uicem tantum indicat: ij plus nos lædunt q; iuuat. Nā cum ſint multæ in ophthalmiſ differentia, atq; una duntaxat ex eis prædictū poſcat cataplaſma, alia uero omnes ab eo lædantur: ſi quis ad id omnes ſine diſcrimine adhibeat, multo plus lædet q; iuuabit. Ad hunc itaq; modum non

tantum de Abrotono, sed de alijs quoque omnibus scribendum nobis est, eas quidem facultates quae sunt in calefaciendo, frigefaciendo, humectando, siccandoque, ipsas quas saepenumero memorauimus methodis, reperiendis: quae uero secundum totius substantiae proprietatem perficiunt, sola experientia. Et de his offensum est quod deleteria sint, & deleteriarum alexiteriae & purgatoriae. Nam has ex ratione in uentre est impossibile, praeterquam quod in quibusdam suspicionem duntaxat probabiliter inuenire liceat. At de facultatibus quae hoc pacto inueniunt, separatim postea differemus, ubi uidelicet prius singulatim per quodque medicamentum de his quae calefaciunt, frigefaciunt, humectando, siccandoque aguntur de his quae ad has consequuntur, narratione absoluero. Porro ubi unum modo adiecero, sine faciam de Abrotono dicendi, nempe quod summam suspicionem illi Pamphilus etiam illi hanc primam herbarum recensuit, ac forsitan uel nullam deinceps aliam, tamen hanc saltem oculis suis conspicari uoluerit, attamen uel maxime allucinatus, existimans hanc herbam a Romanis appellari Santonicum: differt enim ab Abrotono Santonicum, uel ut a Dioscorides exactissime scripsit in tertio de materia, & omnes id norunt tum medici, tum rhopopolae. Nam Abrotoni duae sunt species, altera quam marem, altera quam foeminam nuncupant: quod ipsum de finitum est tum apud Dioscoridem, tum apud ipsum Pamphilum, aliosque innumeros. At aliud est ab eo Absinthium, cuius rursus tres statuedae sunt species, quarum unam eodem cum genere ipso nomine appellat: cuiusmodi potissimum est Ponticum: alterum Santonicum: tertium Seriphum. Si uero aliud placet appellare Absinthium, aliud uero Seriphum, aliud autem Santonicum, nihil interest, quod ad praesens certe attinet. Nec enim nomen diuisuri uenimus, sed studium nobis est ipsis de rebus. Porro quoniam haec tum specie seu forma, tum gustu, tum facultatibus inter sese diuersa sunt, non obscure uno, si ita lubet, omnia nomine nuncupes, uerum exacte uires earum edoceas. Ac nos sane sufficienter ipsas formas a Dioscoride explicatas esse, aliisque non paucis, iam diximus. Itaque de uero eadem scribenda non sunt, quae maioribus recte sunt prodita. At siquid illi in facultatibus omifere indistinctum, cuius profecto gratia ad hanc narrationem uenimus, ea nos adijcere tentabimus. Absinthium quidem dictis minus est calidum, nempe plurimam obtinet adstrictionem. Quod cum sit & minus quoque tenuium quam illa partium, & utique minori etiam quam illa ad eundem modum extenuandi facultate, attamen non minus desiccatorum est. At ceterorum Santonicum quidem a Santonia regione in qua nascitur, nomen sortitum, proximam habet facultatem, Seriphum paulo imbecillius in extenuando & calfaciendo desiccandoque. Porro ipsum Seriphum Abrotono minus est calidum, uerum calidius Absinthio, stomacho impeditio inimicum, nempe cum amaritate salcedinem quandam praese ferens. Sed & quandam, licet minimam, adstrictionem obtinet. Sic et Abrotonon

A & Santonicum admodum infesta sunt stomacho. Solum autem inter ea Absinthium, & maxime ponticum, gratum est stomacho, quia plurimam adstrictionem continet. Abrotonum uisum, calidum, siccumque facultate est, magis etiam quam Cucurbita sicca uisita, & Anethi radix. Illa enim ulceribus humidis simul & citra phlegmonem callo induratis conueniunt, ac proinde maxime ulceribus in pudendorum praeputijscopetere uidentur. At cinis Abrotoni ulceribus omnibus mordax est: ac idcirco cum oleo tenui, cicino scilicet, aut raphanino, aut lycyonio, aut ueteri & maxime Sabino ad alopecias accommodatur: tum barbam segetius tardiusque enascetem cum aliquo dictorum oleorum elicit: sed nec minus illis lentissimo maceratum. Quippe pro eo quod tenuius est partium, rarefaciendi uim obtinet, & mordax est, & calidum: quas utique maxime eius facultates nouisse oportet, nec quicquam etiam particulare in hoc tractatu requirere.

Agnos. Vitex. Cap. 2

Agnos, aut lygos, hoc est uitex, planta illa fruticosa, calidus quidem est & siccus tertio ordine, uerum multum tenuis substantia, tum gustu acris simul & adstringens: ipsas tamen uitices ad medicinam habet inutiles: ceterum folia semenque calida siccaque facultate sunt, substantia uero tenui. Nam & utentibus ita apparet, & gustantibus acre simul et subadstringens percipitur tum solum, tum flos, tum semen. Edendo tamen etiam semen est: uerum tam perspicuo calfacit, ut capiti hoc nomine dolore pariat. At si frigratur (nam & sic editum tragematis) minus caput tenet. Porro flatus uentris discutit & cum non frictus, & multo magis cum frictus fuerit. Cohibet porro impetus in uenerem, tum frictionis expertus, tum etiam ipsam expertus: folia ite floresque ipsius fructus id ipsum prestare possunt. Itaque non tantum esapotaque ad castitatem conferre creduntur, uerum etiam substrata. Hinc est quod Athenis in Thesimophorijis, hoc est sacris Cereris, mulieres totum sibi fruticem substerunt. Hinc illi quoque nomen inditum agni, hoc est casti. Ex quibus omnibus manifestum est, siquidem memoria teneamus quae superioribus commentarijs sunt dicta, agnum calfacere, simulque excicare, tum omnium maxime flatus discutere. Porro quod tenuium sit partium, facultas eius indicio est. Nam quod caput tenet, non magis a multitudine uaporum ab eo prognatorum, quam a caliditate eius ac subtilitate partium fieri rationabile est. Nam si flatus ipsum spiritum procreare posset, sane & uentre inflaret, & uenerem stimulare, perinde ut erua. Verum cum non tantum non excitare, immo etiam reprimere queat, fuerit profecto secundum rura maxime facultatem tum in excalfaciendo, tum in resiccando, non tamen illi par est. Nam utroque paulo est inferior. Siquidem ruta tum magis est excalfactoria, tum magis desiccatoria. Differt etiam qualitatis simul ac facultatis missione. Nam agni semen ac germina modicam ferunt adstrictionem: at ruta ubi aruerit, exacte amara est & acris: ubi uero humida, subamara. Non tamen austeritas aut acerbitas illi inest,

aut sicut uideatur, inesse, ea utiq; omnino obscura (scio) uidebitur, nec par ei quæ est in agno. Quocirca & ad secur & lienem indurata & obstructa agni semē potius q̄ rutæ competit. Sed hæc ad curandi iam methodū pertinet, quā ut omnino non attingā de medicamentorum pronuntiationis facultatibus, fieri nō potest: uerū celeriter ad rem propositā reflectere, uiri est utiq; temperati. Magisq; etiam id in sequentibus medicamentis efficere conabor, hoc est, ubi ex quibusdam evidentibus generalibus facultatibus collegero, particulares postea actiones omittam. Nam in presens id nouisse sufficit, q̄ agnus calidus est & siccus facultate, idq; nō mediocriter, sed tercio excessu, tū admodū tenuiū partiu. Hæc qui norit, ac postea methodum curandi didicerit, ipsemet inueniet quo pacto menses hinc cieat, quo pacto partes induratas digerat, quo pacto lasitudinē soluens, seu acopiū, & ex calfactorium ex eo unguentum præparetur.

Agrostis. Gramen. Cap. 3

Graminis radix modice frigida est & sicca: mordacitate quandā exiguā, & partiu tenuitate obtinentes. at herba ipsa primo quidē excessu refrigerat, in humiditate uero & siccitate moderata. Porro semē alibi quidē imbecillū est, in Parnaso uerō de siccatorium, & tenuiū partium, & subacerbum.

Agrostis esculenta.

Gramen esulentam habet radicem, ubi mollis fuerit, dulcē quidem instar aquæ, sed acre quiddam exiguum & subacerbum obtinentem. Hæc herba planē aquea gustatibus est, ex quibus aperit tum est, radicem modice esse tum frigidam, tum siccam, ac proinde cruēta ulcera glutinare. At ipsa herba illita non uehementer refrigerat, in medio cōstituta humiditatis & siccitatis. Porro mordacitas & tenuitas quæ radicē inest, exigua est quidem, sed interdum tamen lapides frangere asolet, si quis eam decoctam ebibat. At semē alterius quidem imbecillum est: eius uerō quæ in Parnaso nascitur, urinam ciet, & fluxus uentris & stomachi reficcat: uis enim eius est exiccatoria, tenuium partium, & subacerba.

Anchusa. Cap. 4

Anchusæ quadruplex species est. Quarū onoclea quidem radicē habet admodum refrigerantem & desiccantem, tum adstringentem & subamaram, tum quæ sufficiat extenuandis & extergendis humoribus biliosis, corporibusq; condensandis. Ceterum folia habet imbecilliora quidem radicē, adstringūt tamē & ipsa, & desiccāt. Porro lycopos cognominata refrigerat & desiccāt, magisq; q̄ onoclea adstringit, at onochelos calidior est, & magis medicata. nam pluscūlū habet & gustu ipso protinus acrimoniā. hac uerō etiam calidior est quarta, quæ & minor est, & amarior, & magis etiam medicata est.

De Anchusarum differentia.

Anchusæ non omnes easdem uires obtinent, nam onoclea quam uocant, radicem habet simul adstringentem & subamarā, corporibus condensandis & modice extenuandis idoneā, tum abster-

gendis quoq; & abluendis biliosis & falsis succis. Dicitur enim supra est, q̄ qualitas acerba mista amantudini ea præstare queat. Sic sanē aurigini & lienosis & renum affectibus est utilis. Sed & refrigerare idonea est. Et sanē cum polenta illita suruata erysipelata, et abstergit nō modo epota, sed et foris imposita. Proinde uti ligines & lepras sanat cum aceto. Ac radicis quidem hæc opera sunt, & operum facultates quas diximus. At folia ipsius herbæ radicē quidē sunt imbecilliora, non tamen aliena sunt a resiccatione, & abstrictione. Itaq; etiā profluuiū sanant pota cum uino. Et quæ lycopos nominatur, eodem modo erysipelatis cōgruit, & radicem habet q̄ onoclea magis adstringentem. At onocheli & alcibiadiæ cognominatæ uis magis est medicata. nam & gustu protinus maiorem habet acrimoniā, & eos qui a uiperis morfi sunt, admodū suuat tum illita, tum suspensa, tū esca. Reliqua uerō, nempe quarta quæ parua est, & ferē nō mine caret ex illis sola, alcibiadiæ quidē permissilis est, uerū et amarior, et magis medicaminosa, ac proinde ad laros lubricos idonea, oxybaphi mensura cum hyssopo & nasturtio epota.

Agarici radix. Cap. 5

Agarici radix, hoc est quæ trunco innascitur, primo quidem gustu dulcis, sed paulo post subamara apparet, & acrimoniæ quandā speciem temporis spatio inducit, leuiculaq; adstrictionis. Est & consistentia laxa. Ex quibus omnibus manifestum est, si quidem quæ superius dicta sunt meminerimus, quod medicamentum hoc compositum est ex substantia aëria & terrea a caliditate extenuata. Porro minimū habet essentia aqueæ. Hac ratione & digerendi uim habet, & crassitudinem incidendi, tum infarctus uiscerum expurgandi: proinde regio morbo laborantes sanat, eos utiq; qui sic ab infarctu icorici laborant. Iuuat & morbo comitali obnoxios eadem facultate: tum rigores per circuitum recurrentes ex crassis aut uiscois humoribus. natos sanat. Iuuat & eos qui a bestis frigore lædētibus, morfi sunt aut compuncti, tum foris in affecta parte impositum, tum intrō in corpus sumptum pondere drachmę unius cum uino diluto. Est & purgatorium.

Ageratum. Cap. 6

Ageratum facultatem digerendi habet, & leuiter quadantenus phlegmone liberandi.

Adiantum. Cap. 7

Adiantum in caliditate quæ & frigiditate symmetrū est, uerum desiccāt, & extenuat, & digerit. Etenim caput ex alopecia glabrū capillis conuestit, et strumas et abscessus digerit, lapidesq; frangit epotū, & uiscosorum crassiorumq; e pectore pulmoneq; excreationibus nō mediocriter cōfert, et uentris profluuiū sistit: non tamen ullam manifestam caliditatem affert, sicut nec frigiditatem. Verum posuerit ipsum quispia secundū hanc oppositionem & temperiem in ordine medio.

Aezoon. Semperrium. Cap. 8

Aezoon, utiq; tum minus, tum minus, desiccāt quidem leuiter, quando quidē & mediocriter adstringit

astringit, omnis alterius uel cōmētis qualitatis expers: quare in eo plus cæteris abundat essentia aquea. Cæterū nō mediocriter refrigerat. Est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantium. Hinc etiam ad erysipelata, & herpes, & phlegmonas à fluxione natas accommodatur.

Aegilops. Avena. Cap. 9

Aegilops digerēdi uim possidet: id quod ex gustu patet: leuiter em est acris. uerū ex eo liquet, & phlegmonas induratas & ægilopas sanat.

Acta. Lolium. Cap. 10

Lolium desiccatur & calcificat efficaciter, ut propinqua sit acris, magis q̄ iris: sed non est perinde ut illa subtilis essentia, uerum multum in hoc deficit. Secundum hoc ponat ipsam quipsiam in principio tertij ordinis excalcificantium, secundi uero extremo exiccantium.

Aegirus. Populus nigra. Cap. 11

Aegiri, siue populi nigrae flores calidi quidem sunt in primo recessu à temperatis: at in differētia quæ habetur in siccando & humectādo, paulum quiddā ad siccius deflexerunt, sed & subtiliorum potius q̄ crassiorum sunt partium. Et folia quoq; ipsius quodammodo floribus similia sunt, nisi q̄ ad omnia imbecilliora, minusq; efficaciam. Sed & resina eius floribus similem facultatem obrinet, atq; etiam calidiorē. Porro semen tum resina, tum floribus & subtiliorum est partium, & exiccantius, non tamen admodum calidius.

Acacia. Cap. 12

Acacie & plāta ipsa acerba est, & fructus, & succus, qui lotus quidē & imbecillior, & minus mordax redditur, utpote acrimoniam quandam in lauatione deponēs. Porro si parti alicui sanæ illinatur, protinus eam & sicciorē, & contractā efficit, nullum quidem caloris sensum inuehēs, sed nec frigoris admodū ualentē. Vnde constat medicamen id esse frigidū & terrosum, immista quadam etiam essentia aquea. Et sanē coniectura est, non esse similem, uerum quasdam in sese dispersas habere partes tenues & calidas, quæ in ipsa ablutione segregentur. Estq; & hoc tertij ordinis exiccantium, & secundi refrigerantium, ubi quidem elotum fuerit, absq; eo uerō primi.

Aculephe. Vrtica. Cap. 13

Vrtica: & huius herbae tum fructus, tum folia (nam hæc potissimum sunt usui) admodum digerentis sunt facultatis, adeo ut phymata & parotidas sanent. Sed & quiddā flatuosum obrinet, quo & uenerem extimulant, & maxime ubi cum multo semine bibitur. Porro q̄ nō uehementer calcificat, sed multum tenuium sit partium, testimonio est crassiorū uiscosiorūq; humorū expectore pulmonēq; ductio, tum quod partes quas cōtigerit pruriant. Porro flatuosum eius, cuius esse particeps dicta est, dū cōcoquitur, nascit: nō em actu flatuosa est, sed facultate. Ventre autē modice subducit ipsa dūtaxat absterfione, ac ueluti titillatione, non purgatione. Et gangrænosa, & cancrōsa, & in totum quæ exiccati citra mordicationē postulant, ea conueniēter sanat: nimirum cum sub-

tilium partium sit, & tēperaturæ sicca, nō tamen tantum habens caliditatis, ut iam mordicet.

Acanthos. Spina uulgaris. Cap. 14

Acanthos, alij quidem Melamphyllum nōniant, alij uerō Pæderota. Folia quidem mediocriter digerentē facultatē obrinet, at radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium.

Acanthion. Cap. 15

Acanthium: radix huius et folia facultatis sunt excalcatorię, ut & ijs qui cōuelluntur auxiliēnt.

Acanthaleuce. Spina alba. Cap. 16

Acanthaleuce. Hanc quidam Leucacanthon nominant: radix eius delicatoria est, & modice astringens. quam obrem & cœliacos & dysentericos iuuat, & sanguinis reiectiones cohibet, œdemataq; illitu contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius collatur: semen tenuis essentia & calida facultatis est. Itaq; potui dari pueris qui conuelluntur conuenit.

Acantha Aegyptia. Cap. 17

Spina Aegyptia, quidam Arabicam uocant: si milis autē est spina alba nostrati, uerū facultate ualidius astringētē pariter & desiccātē. Itaq; profluuium muliebrem radix eius iuuat, & alia quibus auxilio est, quæ apud nos nascit spina: sed efficacius tamē omnia iuuat tum radix, tum fructus. Ita etiam folia. Et ulcera sedis si insufflatur, ad cicatricē perducit, mediocrem habens & non molestatam adstrictionem.

Acorum. Cap. 18

Acorum, huius utitur radice, quæ gustu acris est, et modice amaro, odoreq; nō iniucundo. Itaq; facultatis calida est, & consentientia tenuis. Huic consentaneum est, ut urinam moueat, & lienes induratos iuuat, tum ceratoidis crassitiei detergeat simulatq; extenuet: sed ad hoc melior est ipsius succus. Omnino uero siccificum esse clarum est, & sanē ordinis esto tertij in utroq; in calcificando scilicet & desiccando.

Aconitum, siue Pardalianches. Cap. 19

Aconitum, siue Pardalianches. Hoc septicae & uenenosae facultatis est. Itaq; in cibo potuq; fugiendum: at tamen ad putrefaciendum quædam extra corpus, aut circa sedem aptū est: herbae autem radix ad hæc utilis est.

Aconitum, seu Lycocotnum.

Aconitum, seu Lycocotnum: est & hoc similis alteri facultatis, sed peculiariter lupos interficit, si cut illud pardos.

Acte, Sabucus, & Ebulus. Cap. 20

Acte, tum magna illa & arborea, tum herbaea, quam & Chamæacten Græci uocant (Latini hanc Ebulum, illam Sabucum) utraq; potentiam habet tum desiccandi, tum conglutinandi, modiceq; digerendi.

Alimum. Cap. 21

Alimum: hæc planta frutex est, plurimo in Cilicia præcipue prouetū, ubi & germina eius recentia esant, & reponunt quoq; in postero futura usui. Semē pariter & lac planta ipsa generat, estq; gustus acris & subadstringentis. Ex quibus omnibus palam est, ipsam esse dissimilarem. Maior autē

pars eius calida est temperate, cum humiditate in
confecta, & leuiter flatuosa.

Aloe. Cap. 22

Hæc herba nō admodum apud nos prouenit:
& quæ nascitur in magna Syria, aquosior est, & fa-
cultatis imbecillioris: attamen usque adeo desiccare
potest, ut uulnera glutinet. At in regionibus cali-
dioribus, qualis est Cœlesyria, & Arabia, multo
est melior. Optima autē Indica, cuius liquor est id
quod ad nos importat cognominatum Aloe, me-
dicamentū ad plurimas res propter siccitatē mor-
dicationis expertem utile. Est autem non simpli-
cis naturæ, sed, ut est in indicio gustus, adstringit si-
mul & amara est: adstringit quidem modice, sed for-
titer amara est. Subducit & uentrē, utputa ex nu-
mero medicamentorū, quæ Græci ab externē do-
stercore uocant, *κρηνοπρωτικα*. Itaq; ex dictis patet
(siquidem memoria tenemus quæ in quarto libro
sunt demonstrata) q̄ tertij sit ordinis exiccātum,
calfaciētium autē aut primi intensi, aut secundū
remissi. Sed & ipsius facultatis misturam attestan-
tur particularia eius opera. Nam et gratum stoma-
cho medicamen est, ut siquid aliud: & sinus glutin-
at. Sanat et ulcera quæ egre ad cicatricē duci pos-
sunt, & maxime quæ in ano sunt & pudendo. Iu-
uat & eorum phlegmonas aqua subacta, & uulne-
ra eundem admodum glutinat. Cōgruit similiter
urenti & ad phlegmonas in ore, ac naribus & ocu-
lis. In summa, repellere & digerere simul potest,
cum hoc ut paulum extergat, quantum uidelicet
ulceribus puris non sit molestum.

Alysson. Cap. 23

Nuncupata est hæc herba alysson, quod mirissi-
ce uiuet morfos à cane rabido. Sed & rabietū quo-
que data sæpe in totum sanauit atq; hoc ex totius
substantiæ similitudine efficit. Dictum q̄ prius est
talem facultatē in sola percipi experiētia, et pla-
nè nulla cōstare methodo. Quod siquis ad multa
experiat, cognoscat facultatem habere medio-
criter siccificam, & digerentē, cum hoc ut abster-
sorium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione &
utiligñem & ephelin expurgat.

Alfinc. Auriculamuris. Cap. 24

Alfinc, aut Myosota. Siquid hæc facultatē Hel-
xine obtinet, nēpe refrigeratē & humectantē:
est enim essentia aqueæ, frigida: quare & citra ad-
striccionē refrigerat. Quocirca ad feruentes phle-
gmonas & mediocria erysipelata competit.

Amaracon. Parthenium Dioscoridi. Cap. 25

Amaracon ex caliditate non infrenue, nō ualde
autē desiccatur, sed in caliditate quidem tertij est or-
dinis, in siccitate uero secundū.

Ambrosia. Cap. 26

Ambrosia illita uim habet adstringentem, ac
repellentem.

Ami. Cap. 27

Herbæ quæ uocatur Ami, semē maxime est utile:
facultatis est excafactoriæ, & desiccatoriæ, tenui
umq; partiū. Sed & gustu subamarū est, & acre. &
clarū est q̄ & digeratur, & urinā moueat. Fuerit autē
in calfaciēdo reliccādōq; ex ordine tertio intēso.

Amarantum, Dioscoridi Helichryos. Cap. 28

Amarantū facultatis est incidentis & extenuā-
tis: coma igitur eius mēses cum uino pota educit.
Sed & grumos sanguinis liquare ac soluere credi-
tur, non solum in uentre, sed & in uescia: Sed tunc
potius cum mulsō bibenda. Et omnes simpliciter
fluxiones pota desiccatur, stomacho infesta.

Amorce. Amurca. Cap. 29

Amurca terrestris est substantiæ, calidæ, nō ta-
men tantum possidet caliditatis ut palam mordi-
cet. Quod si coquisat quodq;, multo etiā magis ter-
rosa reddit: et fuerit sanè ex secundo ordine excal-
facientium, & siccantium intenso quodammodo
magis. Sic & ulcera corporum temperatura sicco-
rum curat: quæ uero in alijs omnibus sunt, exasperat.
Siquidem contrahit perinde ut resina, & pix
sicca, & bitumen. Quæ & ipsa in corporibus ad-
modum duris, quæ uulnus habent aut sunt, glutina-
toria sunt: alia uero omnia cōtendunt atq; irritat.

Ampeloprason. Cap. 30

Ampeloprason. Si inter alium & prason, hoc
est porrum, medium quiddā cōcipias, facultatem
ampeloprasini ueneris. Est enim agrestis, ut sic di-
cam, porrum: quamobrem & acrius eo & siccus
est, sicut agrestia omnia reliqua hortētib; ac pro-
inde stomacho q̄ illud nocētius: sed & crassos &
lentos humores potentius incidit, ualentiusq; in-
farcta organa, obstructione liberat. Hac quoq; ra-
tione urinas sæpe prouocauit, ubi à crasis & len-
tis retinebatur humorib;. Adeo uero est calidum,
ut illitum cataplasmatris modo exulceret. Dictum
est autē retro: quod quæ eum in modum sunt cal-
da, extremi sint ordinis.

Ampelos agria. Vitis agrestis. Cap. 31

Vitis agrestis racemi extergēdi uim habent, ut
ephelias, & neruos, & id genus omnia in extrema cu-
te existentia curare possint. Sed & adstriccionem
quandam extrema germina (*ἀκρίμωας* Græci uo-
cant) obtinent, quæ & sale condiri assolent.

Ampelos hemeros. Vitis satua & culta.

Vitis cultæ ad similes facultas est agrestis, sed ad
omnia imbecillior.

Ampelos leuce. Vitis alba.

Ampelos leucæ, quæ & bryoniam & psilothrum
uocatur, prima quidē germina ab omnibus pro mo-
re edi uere solent, utpote edulium stomacho pro-
pter adstriccionē acceptū, sed & subamarā & mo-
dice acrem adstriccionem possident: quare & uri-
nam modice cient. At radix & abstergentem, &
desiccantem uim habet, & moderate calidā: quam
obrē et lienes induratos liquat tum epota, tum so-
ris cum ficibus imposta: & psoram & lepram sa-
nat. Porro fructus eius racemi speciem præferēs,
ijs qui coria deplant, est utilis.

Ampelos melena. Vitis nigra.

Vitis nigra. Vocatur autem hæc proprie bryo-
nia, supradictæ tamen ad omnia similis, nisi quod
imbecillior.

Amygdala. Cap. 32

Amygdala, quæ quidē palam amara sunt, omni-
nō extenuādū uim possidēt, quod & qualitas ipsa
indicat

indicat, & experientia comprobat. Ac de amara quidem qualitate in quarto horum commetariorum proditum est. Cæterum duo experientia exempla proponi satis est, unde uim eorum possis discernere. Si quidem ephelis expurgant, & excretionibus ex pectore pulmonesq; crassorum lentorumq; humorum impendio cōserunt. Porro hæc ostensa sunt, genere quidem incidentis, specie uero extergentis esse facultatis. Quin et quod per acridens facultatem item habeant ab obstructione liberandi, & ipsum supra demonstratum est. Sed & experientia monstrat. Nam in icore crassorum uiscosorumq; humorū in extremis uasis impactu rursus obstructiones, abunde expurgat expeditiq;. Quin & laterum dolores ab huiusmodi causa natos, & lienis, & coli, & renum [sanant.] Porro & ipsa arbor similem sortita uim est. Nam huius radi ces coctæ atq; illitæ ephelas purgant. Quotquot uero sunt amygdala dulcia, et ipsa leuculum amaritudinem possident, quæ tamen dulcedine superante occultatur: cæterum id temporis spatio clarum fit. Demonstratum autē retro est, qualitatem dulcem moderatē esse calidam.

Ammoniacum. Cap. 33

Ammoniacum, opus siue liquor est ferulæ curtusdam: hoc habet emolliendi facultatem intensam, adeo ut & articulorum topiis dissoluat, & lienes induratos sanet, & choeradas siue strumas per halitum digerat.

Amomum. Cap. 34

Amomum acoro similem facultatem obtinet, nisi quod acorum siccus sit, maiore autem concoquendi facultate amomum.

Anagallis. Cap. 35

Anagallis utraq; tum ea quæ cœruleum habet florem, tum ea quæ purpureum, admodum extergentis sunt facultatis. Habent uero non nihil etiā caloris, & quandā trahendi facultatem, adeo ut & infixa corpori extrahāt. Succus earū ex narib. purgat caput eadē de causa. In summa autē, desiccandi uim habent citra mordicationem: quam obrem & uulnera glutinant, & putrida ulcera adiuuant.

Anagyris. Cap. 36

Anagyris frutex est grauior olēs, & digerētis excoficientisq; facultatis. Sed folia etiānum uirētia cū propter humiditatis admisionē minus sint acria, idcirco tumētia reprimūt resiccata incidētis sunt exiccatisq; facultatis. Similē ferē facultatē habet radicis eius cortex. Semē autem magis subtilium est partium. Sed & uomitum prouocat.

Androsæmum. Cap. 37

Androsæmum, planta fruticosā, natura duplex: tūm em alycyon, et alycyroides nuncupatum est, species hyperici. Alterum uero à quibusdā dionysias appellatur. Est autem semen eorum purgatorium. Foliorum uero facultas modicē extergens & desiccans, ut & ambusta curare credatur. Cæterum in uino austero decocta, uinum ipsum uulnerum grandium glutinatorium efficiunt.

Androsaces. Cap. 38

Androsaces, amara & acris herba. Potest autē

resiccata ehibitaq; tum ipsa, tum fructus eius magnopere urinam prouocare, & nimirum etiam diungere, & desiccare.

Andrachne. Portulaca. Cap. 39

Andrachne, frigida & aquea tēperie est, pauca particeps austeritatis, proinde fluxiores repellit, et maxime biliosas & calidas: cum eo quod eas mutet, & in qualitate alteret, magnopere refrigerās. Et fuerit sanē in refrigerādi quidem facultate tertij excessus à temperatis ac medijs, in hume citādū uero secūdi. Hac rationē & astuātes, ut si quid aliud, adiuuat, tū uētris osculo imposita, tū totis hypochondrijs, maxime in febrili, hecistica. Præterea dentiū stuporē sanat, nēpe quæ ab acidorum cōtactu aspere exiccata fuerāt leniens, atq; replens, ut pote cū uiscosam habeat humiditatē. Similiter uero & succus eius. Itaq; non foris modō impositus, sed epotus quoq; refrigerat. Hoc sanē & toti herba, sed comese accidit. Quoniam autem restringit, utiliter dysentericis editur, & muliebri profluvio, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc quidem multo est, quam herba, succus ipsius efficacior.

Anemone. Cap. 40

Anemone omnes extrahendi, & attrahēdi, & ora uasorum reserandi facultatem obtinent. Itaq; radix cōmansa pituitam euocat, & succus ex naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida ulcerū anemona expurgat, & lepras detrahūt, mēsesq; appositæ eliciunt, & lac trahūt.

Anethum. Cap. 41

Anethum adeo excoficient, ut habendum sit aut secūdi ordinis intensi, aut tertij remissi. Exiccantium uero ordinis est secūdi incipiētis, aut primi finiētis. Itaq; merito in oleo decoctum digerit, doctorem sedat, somnum conciliat, & crudos & incotos humores cōcoquit. Fit enim ex eo oleum, cuius propinquā sit tēperies pus mouentibus, & cōcoquentibus uocatis medicamētis, nisi quatenus paulo illis tū subtilium est, ac proinde digerens. Vstū autē tertij ordinis tum excoficientium, tum de siccantium sit, & proinde ulceribus nimis humidis mollibusq; prodest, potissimum ijs quæ in pu dendis consistunt: quæ in præputio sunt inueterata, ea probe cicatrice includit. Cæterū uiride & succulentum, humidius est scilicet, & minus calidum: itaq; magis concoquit, & somnum cōciliat, sed minus digerit. Idcirco mihi uidentur ueteres coronis ex eo plexis uti solere in symposiis.

Anthyllis. Cap. 42

Anthyllis duplex est, sed utraq; modicē desiccata, ut & ulcera glutinet. Cæterum altera, ea scilicet quæ chamapityi adsimilis est, quadatenus subtiliorum est partium quam altera, adeo ut & comitalibus competat. Quin & ipsa magis quam altera extergere potest.

Anthemis, aut Chamæmelum. Cap. 43

Anthemis, aut Chamæmelū. Dictum quidē in tertio libro copiosius est de hac herba, diciturq; nunc summam quod calfacit & desiccet in primo ordine: est & tenuium partium, ac proinde di gerendi, laxandi, & rarefaciendi uim obtinet.

Anisum. Cap. 44

Anisi semen maxime utile est, acre & subamarum, ut prope ad urentium accedat caliditate. Est autem & in sicando tertij ordinis, sicut & in calcificando. Proinde & urinam ciet, & digerit, & flatus ventris reprimit.

Antirinum. Cap. 45

Antirinum aut anarinū semen habet utuli naribus simile, ad sanationes inutile. Ipsum autē ad similes est cum bubonio facultatis, sed multo minus. Itaque ex illo de hoc conijcitur.

Aparine. Cap. 46

Aparine, quidam phylanthropon, alij omphacocarpum cognominant, modice extergit, & desiccatur, habetque non nihil subtilium partium.

Piros. Cap. 47

Piri folia pariter ac turioes austera sunt: fructus dulcedinis quiddam obtinet aqueæ, ex quibus clara quoque temperies est, inæqualis secundum partes. Nam pars una terrea est, alia aquæ, cæterū utraq; frigida: tum alia temperata. Proinde esu pira stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autem desiccant, & modice refrigerant. Nam ego ipsi illitis uulnus glutinasse me memini, cum aliud ad manum esset nihil.

Achrades. Pira slyuefria.

Achrades uocatur magis quæ pira reliqua astringunt, & desiccant, & proinde sanæ maiora uulnera glutinant, fluxusque repellunt.

Apocynum, aut Cynocrambe. Cap. 48

Apocynum, aut Cynocrambe. Vocant autem quiddam eam Cynomorum, quādoquidem canes celerrime interimit, sicut Lycostonon lupos. Est autem hominibus uenenum, herba multum grauius olens: proinde omnino calida est, non instrenue, non tamen proportionē desiccatur. Itaque illita admodum digerentis est facultatis.

Argemone. Cap. 49

Et huius herbæ facultas absterforia est, & digerens.

Arisarum. Cap. 50

Arisarū multo minus est Arō. Radicem habet oliuæ magnitudine, sed multo est ipsa acrius.

Aristolochia. Cap. 51

Aristolochiæ radix multo est ad medicationes utilissimā, amara & subacris. Sed ex illis omnium subtilissima est rotunda: aliarum uero duarū quæ Clematis appellatur, fragrantior est: itaque eā ad unguenta utuntur unguentarij: sed ad sanationes infirmior. At sōge minus quiddam tenuitatis obtinet quā rotunda: sed nec ipsa inefficax est, uerū abstergendū atque excalfaciendū potentiam possidet, minus quiddam quā rotundā abstergens ac digerens, sed non minus calcificans, imō forsan plus quoque. Itaque in quibus usus est modicæ absterfionis, comodior est longa, puta in ulceribus carne explendis, & fomētationibus uteri. At in quibus crassum humorem ualidius extenuare oportet, illic usus est rotundæ. Proinde dolores ab infarctu aut crassitie crudorum spirituum natos magis curat rotunda, & spicula extrahit, & putredines sanat, & sordida ulcera purgat, dentes et gingiuas

Galen.

Aciditas efficit. Auxilio est & asthmaticis, singulitiētib; comitialibus, podagricis, si cum aqua bibatur; tum ruptis & couulsis, ut si quod aliud medicamentum idoneum est.

Arceuthus. Iuniperus. Cap. 52

Iuniperus, calida & sicca, utriusque tertij ordinis. At fructus similiter quiddam calidus est, sed non similiter siccus, uerum in hoc primi fuerit ordinis.

Arctium. Lappa minor. Cap. 53

Arctium illud quod uerbasco est simile, radice tenera, candida, dulci, caule oblongo & molli, semine Cymimo simili, facultatis est admodum tenuium partium, & ob id exciccant [extergētis] tamen modice. Quam obrem radix ac semen eius cocta cum uino quadantenus dolores dentium mitigant. Porro ambusta & chimerhla non horum modo decoctum perfusum, sed & caules tenetiores sanare possunt. Arctiū aliud, lappa maior, bardana. Alterū uero Arctiū, quod Profopitida uocatur, cuiusque folia cucurbitæ simillima sunt, nisi quatenus tum maiora, tum duriora: digerit simul & desiccatur, sed & adstringit nonnihil: quā obrem folia eius ueteribus ulceribus mederi possunt.

Arnoglossum. Plantago. Cap. 54

Arnoglossum, mista & hoc est temperaturæ habet enim quiddam aqueum frigidum, habet uero & austerrum quiddam, id quod terreum est, siccum, frigidum. Itaque refrigerat simul & desiccatur, & in utroque secundi excessus à medijs est. Porro medicamenta quæ cum hoc quiddam refrigerant, uerū etiam adstringunt, ea & ad ulcera rebellia omnia, & ad fluxiones & putredines conueniunt, ac proinde & ad dysenterias. Nam & sanguinis profuua sistunt, & siquid aduratur refrigerant: tum sinus quoque glutinant, & alia ulcera recetia simul & uetera. In omnibus serè id genus medicamentis primas tenet, aut certe nulli secundum est Arnoglossum, idque temperaturæ symmetria & conuenientia. Nam siccitate obtinet morsus experient, & frigiditatem quæ nōdum obstupesciat, & fructus & radix similis sunt facultatis, nisi quod tum siccioris, tum minus frigida. Sed & semen subtilium est partium, & minus frigida facultatis: nempe diffilato ex eo ac digesto excremento aqueo. Hac ratione & radicibus utuntur ad dentium dolores tum mādentes tum collutionibus incoquētes: præterea ad iocinoris & renium obstructiones non has tantum adhibent, sed folia quoque, & multo magis semina. Hæc enim omnia quandam in se abstergendū facultatem obtinent: quam & in herba uiridi inesse satis conijci potest, uerum ab humiditatis copia deuinçit.

Arum. Cap. 55

Terreus & ipsum essentia constat, sed calidus proinde extergendi uim possidet, uerum non ualentem, sicut Dracontium. Est itaque in exciccando & calcificando primi ordinis. Radices eius maxime sunt utiles: siquidem comese crassitie humorum medio critere incidunt, adeo ut & excretionibus ex pectore idoneæ sint: sed magis tamen aptum est Dracontium.

tom. 5

h Artē

Artemisia. Cap. 56

Duplex quidē est herba *Artemisia*, sed utraq; excafcit, & modice deficcit: & sunt, quod ad calfactionem attinet, excessus secūdi: quod uero ad resiccationem, aut primi intensi, aut secundi remissi: sunt autem & modice tenuium partiū. Itaq; ad renum calculos mediocriter commodæ sunt, & ad fomentationes utili.

Asarum. Cap. 57

Huius herbæ radices utiles sunt, facultate similes radicibus acori, intensiores tamen. Itaq; ex ijs quæ de illis prodita sunt, hic faciēda coniectura.

Asclepias. Cap. 58

In tertio Dioscorides de hac herba conscripsit: at nos eius nondum periculum fecimus.

Aspalathus. Cap. 59

Aspalathus gustu quidem acris simul & adstringens est, facultate uero ex dissimilariibus constat, nempe partibus suis acris excafcans, partibus uero alijs, austeris scilicet, refrigerans. Itaq; utriusq; ratione deficcit, & proinde ad putredines & fluxiones est utilis.

Asparagus. Cap. 60

Asparagus petraus aut myacanthinus abstergendi uim habet, idq; citra manifestam aut caliditatem aut frigiditatē. Hinc renes ac iecur infarctū liberat, & maxime herbæ ipsius radices & semen. Quin et dentium dolores sanat siccitatis nomine, quam uel maxime dentes requirunt. Porrò Athenienses per ph. dicunt *Aspharagus*.

Asplenum. Cap. 61

Asplenum, tenuium quidem partium, non tamen calida est herba. Hac utiq; ratione & lapides frangit, & lienes liquat.

Astragalos. Cap. 62

Astragalos fruticellus est exiguus, radices habens adstrictorias: quamobrem etiam ex numero est non instrēne exiccantium. Nam ulcera uetera glutinat, & alium fluxu rētatam sistit, siquis in uino decoctam radicē bibat. Plurimus huius fructus prouentus est in Pheneo Arcadix.

Aster atticus. Cap. 63

Aster atticus. Alij bubonium uocant, nō ob id tantum, quod illitū, sed etiā quod suspensum bubonas sanare creditur: habet quiddam etiam digerens, habet uero non minime & refrigerans quiddam ac reprimens: ut mista sit potētia, uti rosa: uerum id non adstringit.

Astaphis. Vna. Cap. 64

Astaphis, culta quidem, concoquēdi, astringendi, & leuiter digerendi facultatem possidet. *Atragrestis* uehementer acrem obtinet, adeo ut ex capite purget, quod *ἀτραγρεστία* Græci dicunt, abstergatq; ualenter. Itaq; ad psoram accommodata est. Sed & urendi uim habet.

Asphodelus. Cap. 65

Asphodelus. Et huius radix utilis est, sicut *Asari*, & *Dracontij*, nempe extergētis facultatis: uisā aut cinis calidior, & exsiccatior, subtiliorq; ac digerere potentior efficitur, ac proinde & alopecias sanat.

A

Atractylis. Cap. 66

Atractylis aut *Cnicus agrestis*: hæc planta ex spinarum est genere: facultatem habet deficcandi & modice digerendi.

Atraphaxis. *Atriplex.* Cap. 67

Atriplex humida & frigida temperie est, humida quidem secundi ordinis à medijs, frigida uero primi, quam utiq; tepidam esse caliditatem posuimus, cuiusmodi rosas inest: non tamen adstrictio nis est particeps, sed aquea est, & nimirū terrena, similiter malua. Quin & uentrem celeriter permeat, ut illa, ob lubricitatem. Porrò paululum omnino eius est quod digerendi obtinet potentiam. Hortensis autē atriplex & malua, q̄ agrestes tum humidiores sunt, tum frigidiores. Proinde phlegmonis & phygethlim incipiētibus gliscentibusq; & emollibus etiamnum, ac uelut feruentibus hortenses, uigentibus autem & declinātibus ac indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abstergendi uim habet: itaq; ad auriginē ex hepatis infarctū prognatam utilis est.

Aphace. Cap. 68

Aphace uim habet adstringēdi, sicut & ipsa lenticula (*φάρυ* Græci uocant.) Sed & similiter ut lenticula edī solet: cateru egrius q̄ ille cōcoquit: ualentius autem deficcit, & moderatī calorīs est.

Abinthium. Cap. 69

Abinthium adstrictoriā, & amaram, & a crem simul qualitates possidet, excafcans pariter & extergēs, & roborans & deficcans: proinde biliosos uentris humores per egestionē infernam propellit ac per urinas euacuat. Magis autē quod in uenis est biliosum, per urinas expurgat. Ob hæc contentā in uentre pituitā nihil adiuaat sumptū: sic sanē si in thorace aut pulmone cōtineat. Nam adstringens in eo facultas, q̄ amara ualentior est. Porrò quod in sit quoq; acrimonia, idcirco maiori portione calidū est quam frigidum. At si opus est generatim comprehensam eius temperiem secundum primas circumscribere facultates (etsi anomæomeres & dissimilare sit) calidum ipsum dixerrim primi excessus, siccum tertij. Succus autē eius longe quā herba ipsa calidior est.

Balanos. Cap. 70

Balanus myrepica, hoc est glans unguentaria, adfertur ex barbarica regione. Utuntur unguentarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reliqua autem uide & expressus est succus, terrestres scilicet & duræ uincentem habent qualitatem amarā. Sed & admista est quedam adstrictio: Proinde extergentē simul & incidentem contrahentemq; & stipantē effectum possident. Itaq; ad ionthos, lentes, ephelin, & prunittū, deinde & ad psoram, & lepram cōueniunt. Verū enim uero & lienes liquat iecurq; indurescentia. Quod si quis carnem eius drachmæ pōdere cum melicrato bibat, medicamentum experietur uomitorij. Sæpe etiā per infernam alium largiter subducit. Itaq; cum hoc medicamēto utimur ad uiscerum expurgationē, & maxime iocinoris lienisq; ex oxycrato ipsum exhibere consueuimus. Gaudet uero uel maxime alioquit

alioqui aceto ad actiones extrinsecas. Adeo enim efficaç efficitur, ut & pſoras, & lepras extergeat, & multo etiã magis quæ his sunt minora, lentes, uſtiliginem, ionthos, epheſin, exanthemata, achoras, tum ulcerosa, & quæ crasi sunt succi omnia. Sed & cicatricib. decorẽ affert. Porrò quòd cum illinẽda est lieni, præter admistam esse farinarum quampiam exiccantium; cuiusmodi est erui ac lolijs farina; id iam potius ad componendorum medicaminum tractationem, haudquaquam ad præsens institutum pertinet; sed & in paratu facilibus ipsum dicitur. Verum in præsens sufficit abstergerem & incidentem cum adstrictione quapiam propositu medicaminis dixisse facultatẽ, ac sic ad aliud transgredi; cortex tamẽ eius admodum adstringit. Itaq; & hunc quoq; posſis ubi ualidus usus est adstrictionis, accomodare.

Balsamum. Cap. 71

Balsamũ deficcet & exalfacit secundo excessu; est autem & tenuium partium, adeo ut odoratum sit. Sed liquor eius subtiliorũ etiam partiu est quàm ipsa planta, nõ tamen adeo calidus, quàm quidam existimant, tenuitate partium falsi. Porrò fructus eius persimilis facultatis est, cæterum longè in subtilitate partium inferior.

Balaustium. Cap. 72

Balaustium flos est agrestis punicæ, sicut domesticarũ cytinus; ualenter gustum adstringit. Et sanè deficcantis & refrigerantis facultatis est, & nimirum etiam crassæ essentia, siquidem memores sumus eorum quæ in quarto horum cõmentariorum sunt prodita, ubi ostendimus omne adstringens terrestre esse frigidum. Aliarum autem qualitatium nullius præse fert indicium. Proinde ipsum quis censeat strenue & exsiccare & refrigerare. Siquidem non perperam in quarto horum uoluminum terreis frigidis corporibus adstringentem inesse qualitatem demonstratum est. Sanè uero & euentus ipse comprobatur. Nam si intertriginibus & alijs ulceribus ipsum illinas, celerrime illa uidebis cicatricem contrahere. Hoc sanè nomine & ad sanguinem reijcientes, & ad dysenteriam, tum ad uentris uterq; profluuium nõ est quispiam medicorũ qui curandi tractatus cõscripsere qui hoc non utatur medicamento.

Batus. Rubus. Cap. 73

Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, eaq; non obscura. Sed hoc inter se differunt, quòd folia mollia & recens nata plurimũ in se habeant substantiæ aqueæ, paucum uero adstrictionis; eadem ratione & germina. Itaq; si mandantur, aphthas & alia oris uelera sanant. Quin & alia uulnera glutinare ualent. Est enim eorum temperies & ex terrea frigida essentia, & aquea tepida. At fructus, siquidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi tẽperati, qui dulcis est, uti mōstrauimus. Itaq; ob hoc & ob modicam adstrictionem esui non insuaui est. At immaturus à frigida substantia terrea uincitur, ac proinde acerbus est & ualde exsiccatorius. Et sanè uterq; reconditur ualidius quàm recens deficcans.

Galen,

Sed & flos eandem uim fructui immaturo possidet; utraq; ad dysenterias, & uentris profluuium, tum robur deperditum, & sanguinis expuitionẽ idonea remedia. Porrò radix præter adstrictionẽ non paucam habet substantiã in sese tenuem, perquam & lapides renum comminuit.

Batrachium. Cap. 74

Batrachium quatuor habet specciatim differentias. Omnia uero uehementer acrẽ qualitatẽ possident, adeo ut cum dolore exulceret; hac ratione si moderate ac cõuenienter utare, pſoras & lepras excoarant, & unguis diuellunt; tum leprosis stigmata digerunt, & acrochordonas & myrmeccias detrahunt. Quin & alopecias iuuant pauco tempore admotas. Nam si diutius inhareat, non excoaratur solum ipsa cutis, sed & in crustam uritur. Atq; hæc omnia caulis & foliorum sunt opera, si imponas uirentia. Porrò radix arefacta sternutationem prouocat similiter alijs quæ ualenter deficcant. Sed & dentes dolentes iuuat, ut & frangat eos, ualenti scilicet exficcatione; & ut femel dicã, calida & sicca ualde est tum radix, tum uniuersa adeo herba.

Bdellium. Cap. 75

Bdellium, quod scythicum nominant, quod sanè & atrius est, & resinorum magis, emolliẽtis admodum & efficacis uirtutis est. At alterum, nempe arabicum, quod dilucidius est, magis deficcet quàm emollientia. Igitur recens & humidum est, & conuulsum facile mollescit, ad omnia ad quæ scythicum idoneum. At quod antiquius est, & admodum gustu amarum, & acre, & siccum, ab eorum quæ indurata molliũt mediocritate excidit. Vtuntur autem quidam illis, & potissimum arabico, & ad bronchocelas, & hydrocelas, salua matutina iciumaq; subigentes, ut emplastri cõsistentiam accipiat. Porrò arabicum & calculos renum in potu sumptũ frangere apparet, tum urinas ciere, & crudorum flatuũm discursus, præterea laterum dolores & rupturas peranare.

Bechium. Tusilago. Cap. 76

Bechium inde adeo nuncupatum est, quòd bechias, hoc est tusses & orthopnoeas iuuare sit creditum, siquid folia arida aut radicem in prunis urens accendentẽ inde fuliginem inspiratu attrahat. Est autẽ modice acris, ut sine molestia noxa ue omnes thoracis abscessus credita sit rumpere. Sanè folia uirentia partes cruda phlegmone obfessas illitu extrinsecus adiuuat, nempe ob aqueæ substantiæ admistionem, qua omnia uiridia teneraq; participant, alia plus alia minus. Nam sicca bechij folia acriora sunt quàm ut phlegmonis conueniant.

Blitum. Cap. 77

Blitũ holus est esculentũ humide frigideq; temperatura in secũdo maxime excessu a tẽperatis,

Bulbus satiuus. Cap. 78

Bulbus esculentus quidem frigidiorẽ & crassiorẽ lentumq; succum procreat. Nam & coctũ difficilis est, & flatusosus, & uenerem prouocans. Attamẽ illius ob amaritatem simul & adstrictionem abstergit simul & glutinat, et nimirum etiam exsiccat. Est em̄ ostensum, amaritudinẽ in exter-

tom. 5

h 2 gen

gentibus esse substantijs, adstrictionē uero in glutinantibus. At siccitas utraq; consequitur.

Bolbos emeticos, Bulbos uomitorius.

Bulbus uomitorius multo est calidioris temperaturæ quàm superior.

Bubonium. Cap. 79

Buboniū, aut Aster atticus, nūcupatum est ita, quia creditur est bubonas sanare tum illitū, tum in guina adalligatum. Est autem medicocriter digerētis facultatis, quia uidelicet & modice calidum est, nec uehementer: nec ita desiccatur ut tendat. maxime cum etiam tum molle ac recens fuerit.

Buglossum. Cap. 80

Buglossum humidæ calidæq; tēperie est. Itaq; uinis infectum, lætitiæ ac hilaritatis causa esse creditum est. Sed & ijs qui ob supremi gutturis (pharynga Græci uocant) asperitatē tulsunt, coctum in melicrato conuenit.

Bunium. Cap. 81

Bunium, alij Arctium, adeo exalfacit, ut & uirnam moueat, & menses prouocat: sed & pseudo bunium adsimilis illi caliditatis est.

Buphthalmum. Cap. 82

Buphthalmum sic appellatū est à floribus, qui figura quidem boum oculis uideantur adsimiles, colore autem anthemidis floribus simillimi sunt, sed multo tum maiores, tum acriores: proinde & uehementius digerunt, adeo ut & duritias sanent cerato misti.

Brathy. Sabina. Cap. 83

Sabina ex numero est fortiter exficcātium, idq; secundū tres qualitates quas in gustu præ se fert, similiter cupressō, nisi q̄ ea et acrior est, & ut sic dixerim, magis aromatica, seu odorator. Igif huius quā modo dixi qualitatē est particeps, nēpe acrimoniæ cōsistentis in tēperamento calido, præterea amaritudinis & adstrictionis obscurioris q̄ in cupressō. Quantū enim ipsa cupressum superat in acrimonia, tantū ab ipso superatur in adstrictione. Quo manifestū est quod omnino calidior est cupressō, & ob id etiā potentius digerit. Itaq; glutinare nequit uulnera ob siccitatis & caliditatis robur. Nam utriusq; illi tantū inest, ut etiā tendat, & inflammationē afferat. At putredinibus similiter cupressō accōmodari potest, maxime ubi rebeliores fuerint & diuturniores. Nam hæc citra noxiā uim medicamētū perferunt. Quin & quæ atra sunt reddita, & admodū fordida, ea cum melle expurgat. Carbūculos item soluit. Porō essentia tenuitate menses quoq; prouocat, ut si quid aliud: & sanguinem per urinas mouet. Fœtū etiam uiuentem interficit, & mortuū educit. Est autē hoc medicamentū tertij ordinis tum exalfacientū, tum desiccantium, ex numero eorum quæ uel maxime tenuium sunt partū. Et hoc utiq; nomine unguentis inditur, & maxime glucino, & in multas antidotos iniicitur. Quidam uero etiā cinnamomi uice duplum eius subiiciunt. Est enim extenuādū & digerendi facultatis, si epotum fuerit.

Bretanica. Cap. 84

Bretanicæ herbæ folia astringentiā sunt, & uul-

nerum glutinatoria, similia agrestibus lapathis, nisi quatenus atriora sunt, magisq; hirta. Sed & expressus ex illis succus perinde natus est adstringentisq; coctum quidam reponunt tanquam inter stomatica medicamēta efficacissimū. Videtur em̄ sanare etiam putrescentia.

Bromus. Cap. 85

Bromus unū ex leguminibus. uerū ut medicamentū similit̄ hordeo usum obtinet. Nā illitū desiccatur & digerit mediocriter, & sine morsu. Temperari aut̄ habet paulo frigidiorē. Nōnihil etiā adstrictionis obtinet, ut uentris profluua iuuat.

Bryon thalattion. Alga marina. Cap. 86

Bryon thalattion compositum est ex terrena & aquea essentia, utraq; frigida. Siquidem & gustum adstringit, & calidis quibusuis illitum, ea refrigerat & adiuuat.

Bryon aut Splanchnon. Muscus.

Bryon, quidā uero Splanchnon. Inuenitur autem in querubus, & piceis, & populis albis, uim habet adstringentē inualidā. Nec enim multū est frigidū, sed proxime fermē medijs, quia uidelicet & digerendi & emolliēdi facultatis est particeps, maxime quod in cedrinis lignis reperitur.

Gallium. Cap. 87

Gallium inde adeo nomē sortitū est suū, q̄ lac coagulet. Adsimile autem est aparinæ, facultatem obtinens exficcatoriā & subcretilos eius sanguinis profluuijs cōpetere uidetur, & combustis meri. Est autem boni odoris, & coloris lutei.

Gentiana. Cap. 88

Gentiana. huius herbæ radix multū est efficacis, cum opus est extenuatione, purgatione, absterfione, obstructionis liberatione; nec mirum si hæc possit, cum impenfe sit amara.

Gigarta, siue acinorum uue nuclei. Cap. 89

Acinorum uuae nuclei ex secundo ordine sunt exficcantiū, refrigerantiū uero primo. Substantia eorū crassa est et terrena: cui gustus indicio est, nimirū cum acerbū appareant. Quin & experientia cōprobat. Nam omnibus uentris cum profluuiō iunctis affectibus impendio conferunt.

Gingidium. Cap. 90

Gingidium sicut gustu amaritatē & adstrictionem præfert, sic temperie quoq; ipsa caliditatē & frigiditatē. Secundum utraq; uero qualitatē desiccatorium est. Sed enim stomacho amicum est, utpote non paruam obtinēs adstrictionē. Quamobrem non admodum conspicuā caliditatē possidet: duobus autem numeris desiccatur.

Glacium. Cap. 91

Glaciū astringit cum quodam fastidio. Tum adeo insigniter refrigerat, ut solum sæpe erysipelata, utiq; si ualentia non fuerint, curare possit. Mistrura eius composita est ex aquea terreaq; substantia; utraq; sanē frigida, uerum non summe, sed ceu aqua fontana.

Glaux. Cap. 92

Glaux herba, & ipsa lactis generandi uim obtinere uidetur. Quod si sit, calida quodammodo humidatq; fuerit.

Glebon. Pulegium. Cap. 93

Pulegium; & hæc herba, quando quidē actis & subamara est, ualde tum ex calcificat, tum extenuat. Porrō q̄ ex calcificat, abunde magnū est testimonium, q̄ illita rubrificat; & si quis diutius toleret, exulcerat quoq̄. Quod uero extenuet, satis indicat, cū humidā, crassa & lenta ex thorace & pulmone excreatu facilia faciat, mensēq̄ moueat.

Gleos. Strigmenta balnearum. Cap. 94

Gleos modice emolliendi uim obtinet.

Glycyrriza. Dulcis radix. Cap. 95

Huius fruticis radicū succus in primis utilis est, similiter ut eius radices dulcis, simulq̄ leuiter adstringēs. Proinde asperitates lenire potest, nec modo in arteria, uerū etiam uescica scabra, idq̄ tēperaturæ mediocritate. Quo circa fuerit sanè natura eius familiaris nostræ tēperaturæ; nam tale mōstratum esse dulce; sed cum adstrictio quedā adstricta sit, uniuersum eius temperamentū, quantum ex caliditate & adstrictione est, tepidæ potissimū caliditatis fuerit, quā proxime accedēs ad symmetricum siue temperamentum. Porrō quoniam temperie quoq̄ est humidū id quod modice est dulce, iure sanè etiam siti congruens medicamentum est, nimirum modice humidum, simul & humana natura frigidius. Refert Dioscorides, radicē siccam ad leuorem redactam, pterygiorum seu unguinum oculorum idoneum esse illitu remedium.

Glycyfida. Pœonia. Cap. 96

Glycyfida, quā pectoribon & pœonia nuncupat, radicē habet leuiter adstringentē cum quadā dulcedine; ac si plufculū dentibus mādās, acrimoniam item quampiā subamarā subesse percipies. Proinde mensēs ciet ex melicrato amygdali pota quietate. Sanè tumdere eam necesse est, ac ita cribratam inspergere. Expurgat porrō etiā iecur obstructum, & renes; sed hæc efficere nata est qua acris & subamara est; qua uero quiddam etiam adstrictorium obtinet, in uentre prouententes fluxiones sistere potest. Cæterū eam tunc in austerorum uinorum quopiam decoctam potare conuenit. Est porrō omnino & resicicatoria. Eapropter haud desperauerim eam ex collo pueris suspensam merito comitalē morbū sanare. Equidem uidi puellum quandoq̄ octo totis mēsis morbo comitiali liberū, ac postea forte fortuna cum quodā collo suspensum erat decidisset, protinus denuo conuulsione correptū, rursusq̄ suspensū in locū illius alio, inculpatē postea egisse. Porrō usum est mihi satius esse rursus id collo detrudere, certioris experientie gratia; id cum fecissem, ac puer ite rursus esset conuulsus, magnā recētis radicis partem ex collo eius suspēdimus, ac deinceps prorūm sanus effectus est puer, nec postea conuulsus est. Rationabile itaq̄ erat, aut partes quaspiā a radice de fluxiones, ac deinde per inspirationē attractas, affectos illos locos curare, aut aerē a radice assidue mutari & alterari. Nam hoc pacto succus cyrenaicus columellā phlegmone affectā iuuat, et melanthiū frictū palam catambos & coryzas desiccet, si quis id in calidū linteum rarū liq̄et, assidueq̄ calore ex

Galēn.

A eo per inspirationē in nares attrahat. Quinetiā si cōpluribus linis, & maxime marine purpure, collo uiperæ iniectis illis uiperam præfocet; eaq̄ postea cuiuspiam collo obuincias, mirifice profuerit tum paristhmīs, tum omnibus ijs quæ in collo ex pullulant. Sanè de talibus priuatim aliquando forte conscribam. Ac nunc pœoniæ cognoscendum temperamentum est tum exsicicatorium, tum subtilium esse partium, haud tamen insigniter calidū, sed aut symmetricum, aut pauxillo calidius.

Gnaphalium. Cap. 97

Gnaphaliū inde adeo nominatū est, q̄ folijs eius mollibus pro tomēto utant. Sunt aut candida, & modice adstringunt, ac proinde quiddā exhibent ex austerorū uinorū quopiam dysentericis.

Gongylis. Rapum. Cap. 98

Gongylidis semē uenerem excitat, utpote spiritum flatuorum procreās. Sic & radix coctū difficilis est, inflatq̄, & semen generat.

Damaſonium. Alisma. Cap. 99

Damaſoniū, aut Alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, q̄ radix eius epota dysenterias sanet, & aluum litat, atq̄ œdemata mitiget. Sed nos ea quidē experti nō sumus; q̄ autem constitutos in renibus calculos aqua in qua decocta fuerit, pota comminuat, id certe experti sumus. Ex quo liquet quod absterforiam quandam facultatem obtinet.

Daucus. Staphylinus. Cap. 100

Daucus, quē quiddā staphylinū nuncupat, agrestis quidē domesticus minus est eui idoneus, ceterum in omnib. uehemētior; at domesticus eui aptior; sed imbecillior, ac rē, et calefaciēdi facultatē obtinet, ac proinde etiam extenuādī. Certe radix præter iam cōprehensā flatuorum quiddā obtinet ac uenerem. Semen autem domesticū quidem & ipsum quādam ad uenerem ciendi potentiā possidet. Agrestis uero planē flatu caret, quod a quibus uocant; ac proinde urinam mensēsq̄ ciet.

Dauci semen.

Dauci herbe semen excalfaciēdi uehementer facultatem habet, ut inter prima efficax sit tum urinæ mouendæ medicamē, tum mēsisbus prouocandis. Multum etiam digerere per halitum foris impositum ualet. Ipsa uero herba similē quidem uim obtinet, tamē semine infirmiore, nimirum ob aqueū humiditatis misturam, quamquam utiq̄ & ipsa calidā sit temperie.

Daphne arbor. Laurus. Cap. 101

Lauri arboris & folia & fructus desiccāt & calcificiunt uehementer, plusq̄ etiam fructus quam folia. Atradicis cortex minus quidem acris est & calidus, plus tamen amarus, habetq̄ etiā adstrictionis nonnihil. Quamobrē & calculos cōstringit, & iecori prodest; bibitur ex uino fragrante triū obolorum pondere.

Daphne herba. Cap. 102

Daphnes herba, quam & daphnen Alexandri nam appellant, temperatura euidenter est calida, & gustantibus acris simul est & subamara, potaq̄ tum urinas, tum mensēs prolucit.

Chamedaphne, Laureola, Daphnoides.

Porro chamædaphnes germina tenera edi q̄q̄ affolēt. Est aut̄ persimilis uiribus daphnæ Alexan drinæ, sicut sanē & quod daphnoides nūcupant.

Dicamnum, Cap. 103

Dicamnum tenuiore essentia constat q̄ pule gium, cætera illi simile. At quod uocant pseudodi camnum, ad omnia imbecillius dicamno est.

Dipfacos, Labrum Veneris, Cap. 104

Dipfaci spinæ radix ex secundo ordine exsiccata est, habetq̄ nonnihil absterforium.

Dorycnidium, Cap. 105.

Dorycnidium tēperamēto papaueri simile est, & mandragoræ, ac quæcunq̄ parē habent refrige randi potentia; excellit & frigiditate aquea; quā obrem paululum quidem, soporem conciliat, plusculum uero sumptū interimit.

Dracantium, Dracunculus, Cap. 105.

Dracantiū quiddā Aro persimile obrinet tum folijs, tum radice, ceterū illo tum acrius est, tum amarius; ac proinde calfactoriū magis, & tenuiori bus partibus. Habet etiā leuiculam quandam ad strictionē, quæ quandoquidem cum cōprehensis duabus qualitatibus, acri scilicet & amara coniun cta est, medicamentū factū est, ut quæ maxime, ef ficax. Nam radix uiscera omnia expurgat, crassos potissimū & lentos succos extenuās: optimūq̄ remediū est contumaciū ulcerū, quæ ueteribus nun cupant. Expurgat quoq̄ extergētq̄ profecto stre nue tum alia quæ extersionē desiderant, tum uiti ligninē cum aceto, tum folia item, ut pote similit fa cultatem habentia, ulceribus uulneribusq̄ recēs infiltratis accomoda sunt, & quanto minus fuerint sicca, tanto magis cōglutinant. Nam quæ sicciōra sunt, uiribus sunt acrioribus q̄ ut uulneribus con ueniant. Creditum quoq̄ est, caseum humidum si illis foris tectus reponatur, ob tēperaturæ illorum siccitatē à putredine cōseruari. Fructus ualentior est non folijs tantū, sed & radice; itaq̄ & caneros & polypodas eliquare creditus est. Succus quoq̄ eius, uitia oculorum expurgat.

Dryopteris, Filicula, Cap. 107

Dryopteris gustu mistam qualitatem præfert. dulcem, acrem, amarā, in radice uero item acer bā. Facultatem habet septicā; proinde etiā pills glabram cutem efficit.

Drys, Quercus, siue Robur, Cap. 108

Quercus partes omnes adstringentis facultatis participes sunt. Sed plus tamen habet quæ in trun ci cortice mēbrana subest, tum quæ sub glandis ipsius calciculo, ea uidelicet quæ fructus carnē cō uestit. Quamobrē ad profluuiū muliebri, & san guinis exputationes tum dysenterias & diuturnos uentris fluxus cōmodam esse credūt. Maxime ue ro ea utunt̄ decocta. Valentius tamen adstringūt fagus & flex, quæ quis eas species esse Roboris ue lit, seu toto genere diuerfas. Quin & folia harum plantarū tenella illita non instrēne desiccare ua lent, minus autē quæ sunt alterius Roboris, nimi rum quāto minus fortita sunt adstrictionis. Siqui dem ego quandoq̄ glutinallē me uulnus memini

A securi inflatum, cum nullum adesset ad manū me dicamen præter ipsius quercus folia: terebā ea in leui petra, & uulnus omnemq̄ uicinū locū contexi. Eandem folijs uim habet & fructus Roboris, eoq̄ medici nonnulli ad incipientes & crescētes utuntur phlegmonas. Nam quæ iam uehementes sunt, adstringentia respuunt. Sed talia ad curandi potius rationem q̄ præsentē tractatū attinēt. Cæ terum in præsentia nouisse, q̄ eatenus adstringen tem, quatenus dictum est, facultatē quercus obti neat, sufficit; ac proinde desiccādā, atq̄ adstringen dē; ex calcificandi aut̄ paulo infra media, in genere scilicet eorum quæ (ut sic dicam) tepida sunt.

Ebifcus, Althea, Cap. 109

B Ebifcus, siue althea; est aut̄ malua agrestis; facul tate digerēdi, laxandi, & pleuræ, hoc est phleg mone leuādā, mitigandā, concoquendā difficultia cōcoctu tubercula. Radix porro eius & semē cæ tera quidē pari folijs modo agūt, uerū tenuiorum partiū, magisq̄ exsiccatoriā, ad hæc magis exteriōriā facultatē ostendūt, ut et uirilignes detergāt, & semen renū calculos cōstringat. At radicis deco ctum ad dysenteria, diarrœa, hoc est profluuiū, & sanguinis refectionē aptū est, nempe cum ad stringentem quandam facultatē possideat.

Ebenus, Cap. 110

C Ebenus ex ijs lignis est, quæ trita cum aqua in succum soluuntur. Vis ei inest excalcificēdi, extergēdi, & tenuium partium. Quamobrem quæ pu pillas offuscant, extergere creditur: miscetur alijs remedijs ocularibus, quæ ad ulcera uetera, fluxiones & bullas siue pustulas accommoda sunt.

Elea, Olea, Cap. 111

Oliuæ rami quantū habent adstrictionis, tantæ & frigiditatis participes sunt. Fructus uero, siquidem ad unguē maturuit, moderate calidus est; sin immaturus est, magis tū adstringit, tū refrigerat.

Eleon, Oleum.

D Oleum quod ex oliuis conficit, quod sanē pro prijsimo nomine oleū appellamus, cuiusmodi sit tēperaturæ, superioribus libris definitū est. Quippe humectatoriū esse & moderate calidū ostēdi mus. Eiusmodi est quod est dulcissimū; sitq̄ potis simū ex oliuis, quas Græci *dequeras* uocant, nos druppas. Ceterū quod omotribes & omphacinū nuncupāt, id quantū in se habet adstrictionis, tan tum etiā illi inest frigiditatis. Porro oleū uetus quod quidē ex dulci in ueterato efficiē, & calidius est, & potentiorib; ad euaporandū uiribus. Quod uero ex crudo, id dum reliquū quippiam seruauit adstrictionis, mistæ permanet facultatis; ubi ue ro illā prorsum abiecerit, reliquo sit simile. Quin etiam quicumq̄ in præparando ramos iniiciunt, ij & ipsi omphacino simile oleum efficiunt. Cæte rum rogandum non est, quo pacto sit præparatū, sed gustandum est potius; ac si præferat adstric tionis quippiam, eatenus etiam frigidum esse existi mandū, ceu illud quod ab Iberia portat, quod spa num, id est Hispanicum nominant. Quod si nequaquam gustantibus adstringere appareat, sed adamussim uideat̄ dulce, id modice esse calidum putan

putandum. Porro si tenue quoque cernatur (tale est quod purum est, quodque inuenti traslucidum videtur) ac modicum eius latissime per cute extendum sibi maneat continuu, celeriterque ac cute cobibatur, id utique pro optimo ducendum, ac olei uirtute quoque maxime pollere, quale est Sabinu. Porro quoque oleum lotum minime omnium mordacitate continetur, supra positum est. Ceterum quoque potissimum modo id probissime laues, in sequenti tradam opere, quod inscribetur De medicaminu compositione; ubi ad de lycionio, & si quod eius generis praterea oleu est, agetur: nunc sermo mihi est de simplicibus, ad quosque et de alijs olei speciebus. Vocatur enim quoddam cicinu oleum, in Aegypto maxime proueniens ex fructu ricini. Tum raphaninu, sesaminum, amygdalinu, caryinum: adhuc sinapinum, lentiscinu, laurinum, melanthinu, terebinthinu, mastichinu, myrtinu, balaninu, hyoscyaminu: nec pauca prater haec ex fructibus expressa omnia, ceterum tantum inter sese discrepantia, quantum & fructus ipsi a se inuicem dissident. Est enim cicinum tum tenuius, tum ad discutendum potentius, quam simillimu oleo ex oliua uetusto. Quamobrem liquando in medicamenti compositione cicinu oleu adscriptu fuerit, si ipsum non adsit, communi utendum oleo, maxime si fuerit sabinum. Raphaninum autem caetera huic simile est, sed calidius tamen, at hoc etiam calidius sinapinum. Huic simile est quod ex melanthino, hoc est gith, conficitur. Pugnant cum istis myrtinum & sesaminum, tum quod adstringat, tum quod crassarum sunt partium. mista facultatis est lentiscinu & terebinthinum, & mastichinum; non enim tantum emolliunt, sed & adstringunt. Amygdalinum porro amara ritatem exuperantem possidet, ceterum cuiusdam etiam adstrictionis est particeps; non tamen caryinum, sed id uel maxime simplicis est digerendi facultatis. Calidius eo est laurinu, & maiore digerendi uirtute praeditum, & hoc etiam magis cedrinum: proximum ei est quod ex nigra pice conficitur. Dadinum, minus quidem laurino calidum, uerum ualentius delicans. Hyoscyaminum uero mista facultatis est, emolliendi uidelicet, & refrigerandi: Oleum porro cicinum uentre subducit. Hoc uero magis, quod sit ex gnidio grano, tanto nimirum, quanto granu potentioru purgandi uim obtinet, quoque cibus, id est ricinus. Iam quod ex agresti oliua oleu exprimitur, non simpliciter temperaturu obtinet: sed extergit, simulque adstringit. Squalidissimum id est ex omni olei genere, & post istricum quoque: desiniceps illis est Hispanum. Pinguissimu est libycum, & cilicium: simul autem pingue & tenue sabinum. in medio comprehensorum omnium sunt tum id quod per Cyclades insulas nascit: tum quod per Graeciam, Asiamque. Porro oleum pingue aestimatur iudicaturque uiscositate: tenue uero, si perluceat, si purum sit, si plurimum minima eius portione inuagatur, si facile a cute combibatur. Ex dictis cognoscere iam liceat & de alijs olei generibus, quae aequiuoce ipsis dicuntur unguentis, puta rosaceo, melino, liliceo, & quaeque id genus floribus, fru-

ctibus, germinibus, folijs in oleo maceratis conficiuntur. Horum quodque ubi unam cum aromatibus praeparantur, unguentum efficitur. De his copiosius dicetur in opere De componendis medicamentis. Porro ubi quod in praesentiarum utile est exposuero, desinam. Pro cuiusque iniectionu natura oleum uariari cotingit. Exijs ergo quae in toto hoc opere de quoque iniiciendorum generatum discussas, singillatim quoque confectum ex iisdem oleum cognoscere dabitur.

Elatine. Cap. 112

Elatine modice tum refrigerat, tum adstringit.

Elaphoboscus. Cap. 113

Elaphoboscus facultatis est excalfactoriae, & tenuium partium, ac proinde excicatoriae secundo maxime excessuum ordine.

Elenium. Enula campana. Cap. 114

Elenij herbae radix maxime est utilis, non primo statim occursum excalfaciens, ac proinde dicenda est non calida & sicca exacte, ceu piper, cum atrum tum candidum, sed cum recrementu humore. Quapropter eligatis, quae faciunt ad educendos ex pectore pulmoneque crassos lentosque humores, idonee commiscetur. Rubrificat eius quoque uirtutes frigiditas ac diuturnis uexatas affectibus, cuiusmodi sunt nonnullae coxarum passiones, ichiadas uocant, & exiguae assiduaque articularu quorundam praehumiditate praecidentiae ac luxationes.

Elelisphacos. Saluia. Cap. 115

Elelisphacos euidenter excalfacit, ac leuiter subadstringit.

Elleborus. Veratruum. Cap. 116

Elleborus uterque tum albus, tum niger exergentis est & excalfaciens facultatis. Quamobrem ad alphas, lichenas, psoras leprasque accedendi sunt. Quinetiam niger si in fistulam callo indurata infundatur duobus tribus uel diebus, callum detrahit. Dentibus prodest cura accento colluentionibus. Sunt autem in tertio ordine excalfaciendi & desiccantium. Porro niger gustu acrior est, candidus amarior.

Elxine. Cap. 117

Elxine, alij perdicu nominant, alij parthenium, alij sideritum, sunt qui heraclea appellentur: caeteru uis ei inest adstringendi & constringendi cum humiditate subfrigida. Quamobrem phlegmonas omnes ab initio & augmeto sanat usque ad statum (ακμω) Graeci uocant) & maxime si calidae fuerint. Quinetiam incipientibus phygethils cataplasmatiss ritu influitur. Tum etiam ad aurium dolores phlegmonosos succus eius mediocriter profuerit. Gargarizandū item nonnulli exhibent ad paristhemia. Sunt uero etiam ex medicis quidam, qui ijs qui diutina tussi uexantur, illam exhibuerint. Certe euidenter exergendi experimentu praebet & in uasis uitreis.

Elxine cissampelus.

Elxine, quae cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem obtinet.

Elymus. Meline. Panicum. Cap. 118

Panicum ex leguminu genere est, milio specie simile, facultate certe pauci nutrimenti, & excicatoria. Sistet quoque non nihil uentris fluxus, ceu

ipsum etiam mlium. Si uero foris illinatur, exiccat atque refrigerat.

Empetron. Cap. 119

Empetron ad solas purgationes esse uidetur commodum, bilem ac pituitam educens. Gustu saluum est; proinde ad alia quoque utaris licet, ad quae pollere ostendimus substantiam salfam. Nominatur item prasoides.

Epithymum. Cap. 120

Epithymum thymi facultate habet, ad omnia effi caciis; exiccat & exalfacit in tertio gradu.

Epimedium. Cap. 121

Epimedium uis est moderate refrigeratoria cum aquea humiditate; quare nullam habet insignem qualitate; tuberibus illitum ea recte seruari potest. Auit uero si potu hauriatur, sterilitatem parere.

Epimelis. Cap. 122

Epimelis: acerba hec planta est, utque dixerit quispiam, pomus syluestris. Vocat astit ab Italia rusticis Vnedon. Ingens eius in Calabria prouetus. Fructus eius acerbus quidem est, nihilominus tamen stomacho ingratus, & capitis mouens dolores. Admista siquidem est ei aliena quapiam qualitas.

Erebinthus. Cicer. Cap. 123

Cicer, legumens est flatuosum, copiosum nutrimenti, alio mouenda habile, cienda urinam idoneum, laeti & femini generando aptum; proliciter uero & menses. Porro quod uocatur crium, hoc est arietinum, ceteris efficacius urinam prouocat. Decoctum eius calculos renum confringit. Reliquum autem cicerum genus (uocatur autem orobium) eadem uis pollet, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi, & modice sicci: particeps item sunt amaritatis: cuius uis & lienem, & icterum, & renes expurgat, psorasque & lepras, & lichenes extergunt, tum abscessus post aures prouenientes (καρπώνας Graeci uocant) & testes induratos discutunt. Tum etiam ulcera, quae caeothae uocant, cum melle sanant.

Erebinthus agrestis.

Erebinthus agrestis ad omnia efficacior domestico est, hoc est tum calidior, tum sicciior, quanto & acrior & amarior.

Erice. Cap. 124

Erice digerendi per halitum facultate obtinet, Flore eius potissimum ac folijs utendum.

Erypylus. Serpyllum. Cap. 125

Serpyllum usque adeo exalfacit, ut & menses, & urinas moueat: gustu multum est acre.

Erysimum. Irio. Cap. 126

Erysimi semine sicut gustu nascitio apparet simile, ita facultate igneus est, exalfactorium. Porro ubi in eligmate uti ex usu est, praestat aqua maceratam refrigerare, aut linteolo inuolutam & crusta pistoria circumlitum torrere. Utile est cum eligmatis ad promouendas crassorum lentorumque pectoris pulmonisque humorum expuitiones. Quin & parotides induratas & duritias antiquas uberum et testicularum iuuat. Refert Dioscorides, quod cum aqua & melle cataplastri in morem illitum occultis prolicit cancriis.

Erythrodanum. Rubia pasiuca. Cap. 127

Est autem tinctorum rubia radix acerba, & gustu a-

mara. Itaque quaecumque agere dicta sunt superiore libro, ubi eiusmodi conuerit qualitates, ea omnia in hac radice luculenter conspicietis: quippe cum & lienem & icterum expurget, & urinas crassas multas ac nonnunquam etiam sanguinolentas moueat. Quin & menses ciet, & medio crictur quae extersio nem postulant extergit: proinde uti ligines albas cum aceto illita iuuat. Sunt qui eam ischiadicis, hoc est coxendicium doloribus afflictis, & resolutis, in potu cum melicrato exhibeant.

Eupatorium. Cap. 128

Eupatorium herba ipsa tenuium partium, incidendi extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet: quocirca obstructions iecoris expurgat. Inest itidem ei & adstrictio quaedam per quam robur uti sceri addit.

Euphorbium. Cap. 129

Euphorbium causticae siue uentris & tenuium partium facultatis est, alijs succis similiter.

Ephemerum. Cap. 130

Ephemerum, non illud letale ac deleterium, sed alterum, quod & irin agrestem cognominant, folia et caulem lilio similem obtinet, radicem oblongam, non rotundam ceu colchicum, digitu potissimum crassitudine, adstringens, & boni suauisque odoris. Ex quibus palam fit, facultatis temperaturaeque esse mista, nempe repellentis, & halitu euaporantis. Testificatur opera quae particulatim edit. Si quidem non ineffaciter radix eius in dentium doloribus colluitur. Tum phymatum augmento & statui folio congruunt. Oportet autem ea in uino decocta prius quam pus moueas, illinere.

Echini herba. Cap. 131

Echini herbae fructus acerbus est, ac proinde repellentis & exicatoriae facultatis. Vtunt eo ad oculorum fluxiones & aurium.

Zea. Cap. 132

Zea uniuersa sua facultate quodammodo in medio est tritici & hordei. Itaque ex illis cognoscatur.

Zingiberis. Cap. 133

Zingiberis radix utilis est, utque quam ex Barbaria ad nos conuehunt. Exalfacit, sed non primo statim occurru uelut piper: unde sane & minus esse subtilium partium quam piper existimandum, siquidem in tenues solueret partes, et celerrime actu ut illud fieret calidum. Apparet enim illaborata & crassior adhuc quaedam ei inesse substantia, nec ea sicca & terrestris, sed humida potius atque aqua. Quo fit ut facile perforetur, cum scilicet recementitia insit humiditas. Neque enim quicquam eorum quae aut plane sicca sunt, aut humida, sed elaboratam & familiarem continentia humiditatem, huic uitio obnoxia sunt. Idem usuuenit piperi longo. Atque hinc est quod diutius perseuerat quae proficiscitur a zingibere aut pipere longo caliditas, quam quae ab albo aut nigro. Nam sicut ab aridis calami flamma simul celerrime accenditur, & unde quaque dispergitur; eundem in modum quae a siccis potestate medicamenti editur caliditas. At quae prodit ab humidioribus, ceu ligna sunt uitridia, & tardius accenditur, & durat diutius

diutius. Ex quo fit ut utriusque medicamenti diuersus sit usus. Siquidem ubi totum corpus celeriter exalfacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt quæ & celerrime à caloris nostri contactu incalfescant, & promptissime undeque ferantur. Verum ubi partem quamuis refrigeratam recalfacere studemus, contra agendum, nimirum quæ tarde callescencia plurimo tempore perdurent, ea præbendo. Cæterum licet zingiber & piper album hac ratione à nigro pipere differant, non magna tamen est differentia: at nasturtium, si napi, thapsia, & agrestium columbarum sterces maiori tempore perfecte accenduntur, & plurimo tempore perdurant.

Zythus. Cap. 134

Zythus acrior est non parum hordeo, & succi prauo, utpote qui ex putredine proueniat: est & flatuosus: tum partim acris est & calidus; parte uero plurima frigidus, aqueus, acidus.

Zyme. Fermentum. Cap. 135

Fermentum tenuium est partium, & mediocriter calidum. Proinde sanè sine molestia ac mordacitate quæ in profundo sunt tum extrahit, tum digerit. Cæterum ex contrarijs & ipsum facultatibus temperatum est, sicut alia multa. Particeps namque est aciditatis cuiusdam frigida, & caliditatis ex putredine nata, cui accedit ad ea quæ ex falsis est & farina natura.

Hedysimos. Menta. Cap. 136

Hedysimos: alij uero minthen odoratum nuncupant. Est enim & alia quedam minthe non odorata, quam calaminthen uocant. Vtraque gustu acris, & facultate calida est, ex tertio ordine exalfacientium. Inferior tamen est menta odorata quam calamintha: minus exalfacit. Vt enim in uniuersum dicam, hæc ceu syluestris quædam est, illa ceu domestica: quæ ob sanè ob eam quæ ex cultu accedit humiditatem, mediocriter item ad uenerè excitat. Id quod omnibus accidit quæ humiditatem semicoctam & flatuosam continent. Ob talem ipsi us herbæ temperaturam in abscessibus ea quidam cum polenta mista utuntur. Id quod in calamintha facere nequeas, propterea quod ualētius tum exalfacit, tum desiccet, quod id genus poscant. Habet uero etiam quiddam amarum in se & acerbum: illo quidem lumbricos interficit: acerbitate uero si cum oxycrato bibatur, recentes sanguinis reiectiones reprimit. Substantiæ est, ut si qua alia herba, tenuium partium.

Hedysarum. Cap. 137

Hedysarum, aut pelecinus. Huius fruticis semine colore rubrum est, utrinque anceps, uti secures. Amarum & subacerbum apparet. Quamobrè potum gratum est stomacho, & uiscerum obstructions expurgat. Idem præstant totius fruticis germina.

Hemerocallis. Cap. 138

Hemerocallis radicem habet lilij radici similè, non figura tantum, sed & uirtus: prodest non secus atque illa, igni ambustis: quippe quæ leuiter digerentem facultatem habeat, & cum hoc non nihil adstringentem.

Hemionitis. Cap. 139

Hemionitis simul & adstrictionem & amaritudinem possidet: quamobrem cum aceto potalientosis auxilio est.

Erigeron. Cap. 140

Erigeron facultatem mistam obtinet, simul refrigeratorem, & modice digerentem.

Eryngium. Cap. 141

Eryngium caliditate aut parum aut nihil potest, quod temperatum est superat: cæterum non parum habet siccitatem in tenui essentia consistentem.

Thalietrum. Cap. 142

Thalietrum folia habet coriandri similia, caulem crassitudine ruta. Vis ei inest exicatoria contra morsum: itaque ulcera inueterata ad cicatricem perducit.

Thapsia. Cap. 143

Thapsia acrè habet ac ualenter exalfacientem facultatem cum humiditate coniuncta. Quæ obrem ex alto uolenter extrahit, & quod extraxit digerit. Verum pluseculum ad ea efficienda tempus postulat, ut quæ larga humiditate impleta est, cuius uirtio etiam fit ut celeriter corrumpatur.

Thermus. Lupinus. Cap. 144

Lupinus edipotes coctus, multis ante diebus per macerationem amaritudine in aqua deposita. Fitque tunc nutrimentum succi crassi: cæterum ut medicamentum ita præparatus ex genere est emplasticorum. At ubi natua etiãdum manet amaritas, extendi digerentibus uim obtinet. Interficit lumbricos tum illitus, tum addito melle linctus, tum exposca epotus. Quin & decoctum eius lumbricos eijcere potest: tum etiam foris identidem persusum uti uilginæ, achoras, pustulas, exanthemata Græci uocant, poras, gangrenas, ulcera maligna, quæ cacoe the uocant, iuuat, partim extergendo, partim citra mordacitatem digerendo siccandoque: expurgat iecur & lienem cum ruta & pipere suauitatis gratia assumptum. Elicit menses ac foetum cum myrrha & melle impositum. Porro lupinorum farina sine mordicatione digerit: nec enim liuida tantum, sed & choleladas & phymata curat: sed tunc in aceto, aut oxy-melite, aut posca coquat oportet, idque pro laborantium temperamento & affectus diuersitate, quod ex usu est eligendo. Sed non est præsentis instituti talia distinguere. Digerit item quæ liuida sunt: & quæcumque modo diximus præstare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt uero etiam qui eam ischiadicis cataplasmatibus modo insinuant.

Thermos agrios. Lupinus agrestis.

Lupinus agrestis amarior est, & ad omnia ualentior domestico, eiusdem generis cum ipsio facultatis:

Thlaspi. Cap. 145

Thlaspi semen habet & ipsum facultatem acrè, adeo ut internos abscessus potius dirumpat, menses ciet, & foetum necat. Per sedem insulum sanguinolentam euacuas ischiadibus. prodest. Est enim alioquum tum superne, tum inferne, biliosorum humorum euacuatorium oxybaphi mensura epotum.

Thridax. Laüuca. Cap. 146

Laüuca humidum est frigidumque holus, non tam

men extreme (siquidem edendo non foret) uerū maxime secundum aquā, ut sic dicam, fontāna frigiditatem: proinde ad ualidas phlegmomas ac commodum est, & ad parua & leuia erysipelata: non tamen maioribus satisfacere idonea est. Est etiam edulium siti aduersum. At semen potu genituræ profluuium cohibet; quamobrem etiam ijs qui libidinosis somnijs uexantur, datur, sic & agrestis lactucæ semē, cuius colligitur succus, argemāta & caligines expurgans, tum adustiones cum lacte mulierum iniungi solitus.

Thymum. Cap. 147

Thymum incidit & calcificat uehementer: ob id & urinam, & menses prouocat, foetum euellit, uiscera potum expurgat, educens ex thorace & pulmone confert. Itaq; in excalfaciendo exiccandōq; in tertio ordine statuendum est.

Idearadix. Cap. 148

Idearadix gustu admodū acerba est: ac si opere periculum facias, eandem uim præferet, nimirū sanguinis profluuia, alui fluxus, dysenterias, profluuium mulierum, & quæcumq; eius sunt generis tum pota, tum foris imposita curans.

Ixos, Viscum. Cap. 149

Viscum ex plurima aerea & aquea, paucissima terrena substantia constat. Nam acrimonia in eo amaritudinem excessit. Itaq; etiam effectus substantiæ respōdent. Siquidē ualenter ex alto humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, eosq; diffundit ac digerit. Est autem ex eorum generis quæ non protinus admota excalfaciunt, sed quæ tempus requirūt, uelut thapsia: sed & supra hoc commonuimus, inesse calidis facultate medicamentis, ubi largum continent humorem recrementitium.

Ios, Viola. Cap. 150

Violæ folia aqueā & suffrigidā substantiā superantē possident: proinde tū perse, tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori uentriculi æstuanti, & oculis.

Hippuris. Caudæquina. Cap. 151

Hippuris adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter, simulq; citra mordacitatem exiccantem. Itaq; uulnera uel maxima conglutinat, etiam si præfectos esse neruos contigerit: præterea uocatas enterocelas glutinat. Ad hæc ad sanguinis reiectionem, ad profluuium muliebrem, potissimum rubrum, & ad dysenterias reliquosq; uentris fluxus strenuū ac generosum est remedium herba ipsa, aut ex aqua, aut ex uino epota. Sunt qui de ea scriptum reliquerunt, quod nonnunquam etiam uesciæ, ac tenuium intestinorum uulnera sanauit. Eius uero succus prodest etiam profluuiū sanguinis surrumpentis ex naribus, tum fluxui obnoxij in uentre passionibus ex austerorum uinorum quopiam potus: ac si febre teneantur, ex aqua.

Hippomarathrum. Cap. 152

Hippomarathrum: una cum foeniculo & de ipso differemus.

Isatis. Cap. 153

Isatis domestica quidem, qua utitur tinctorum, facultatis est ualenter exiccantis, nondum tamen mordentis: est enim simul amara atq; adstringens. Proinde magna uulnera corporum durorum glutinat, etiam si in capitibus musculorum fuerint; & sanguinis profluuiū laborantibus partibus utiliter illinitur: tumores œdematoses mirifice digerit simul ac reprimat, & aduersus omnia ulcera maligna & cacœthe mirabiliter resistit, etiam si putrescant, etiam si exedantur ac erodantur. Quod si quando quā pro laborantis natura ualentior apparet, folijs eius tritis miscere oportebit aut panem, aut hordeaceam farinam, aut triticeam, aut polentam, pro uincente nimirū in unoquoq; affectu. At isatis syluestris manifeste iam acre quiddā tum gustu, tum actione præfert. Proinde quāmodum mestica ualentius desiccans ualentius humidis etiam putredinibus obhsit, ad cætera uero iam comprehensa deterior. Minus enim moderate mordaciterq; desiccatur. talia enim irritantur hoc pacto, et phlegmone grauari incipiunt. Ceterum ob facultatis robur lienosis quoque utilis fuerit, cum altera nondum prodesse possit.

Isopyron, aut Phasiolon. Cap. 154

Isopyrum aut Phasiolon semen habet amarum & subacerbum. Extergit itaq; & incidit humores crassos cum hoc ut corpora contrahat & constringat. Quamobrem excretionibus peccoris conducit, & iecur expurgat, & sanguinem spuentibus non est aduersum: imò etiam iuuare creditur. Nam propter temperaturæ mistionem contrarijs etiam congruere uidetur.

Itea, Salix. Cap. 155

Salicis folijs ad cruenti uulneris glutinationem uti possis: uerum floribus eius maxime prope omnes utitur medici ad exiccantis emplastri preparationem: est enim uis eorum ita desiccatoria, ut morsu abstineat: habet uero etiam quandam adstrictionē. Sunt uero etiam, qui succum ex ea expressum, medicamē seruēt mordacitatis expers, & exiccatorium, ad multas res utile. Haud enim inuenias quid ad plures res utilius medicamento citra mordacitatem exiccante, quod paulum etiā adstringat: sicut in opere De medicamentorum compositione exactius docebimus. Porrò arboris cortex similem facultatem obtinet tum floribus, tum folijs, nisi quod temperaturæ sit sicciore, uelut omnes cortices: sed hunc quidam comburūt, eiusq; cinere utitur ad ea omnia quæ ualenter desiccare oportet. Nam clauos quos uocant, callos (Græci τάλως uocant) myrmecias tollunt, acetone ipsum macerantes. Nonnulli autem dum floret salix, corticem eius incidūt, & succum quandam colligunt, utunturq; ad ea quæ pupillas offuscant, extergente uidelicet simulq; tenuium partium medicamine. Vti uero illo ad multa quis possit, siquidem talis fuerit.

Proœmium, Omnino nncessarium esse ut omnes A
huius operis libri ordine legantur. Quodd in hoc & se
quente libro reliquas stirpium primas præferent facul
tates persequatur. Quod partium crassitudo ac tenui
tas, & graduum differentia non possunt prorsus ex
quisite ostendi: sed quantum tamen ad curandum
sufficere uidentur. Graduum quatuor differentias ex
plicat Cap. 1. Calaminthe. Vide etiam supra in
Hedyosmo. 2. Calamus aromaticus. 3. Calamus
phragmites, id est, arundo. 4. Cacanū, Dioscoridi, cala
lia. 5. Cannabis. 6. Capnium, id est fumaria.
7. Capparis. 8. Cardamon, id est nasturtium.
9. Cardamomum. 10. Caros. 11. Cassia. 12. Cà
rya, id est nux. 13. Caulalis. 14. Carpesium.
15. Cenchros, id est milium. 16. Cedrus.
17. Centaurium maius. 18. Centaurium minus.
19. Cerasus. 20. Ceratonia, id est siliqua arbor.
21. Cestros, id est betonica. 22. Cecis, id est galla.
23. Cera. 24. Cici. 25. Cinamomum.
26. Circea. 27. Cisthus, uel cistharus. 28. Ci
sthus uel ladanū. 29. Cistus, id est hederā. 30. Cli
nopoditū. 31. Clematis, & daphnoides. 32. Cnicus.
33. Coccus Cnidius. 34. Coccus, id est granum
tinctorium. 35. Coccyus, id est prunus dome
stica, & syluestris. 36. Glutinum librarium ex farina.
37. Cucurbita. 38. Colocynthis. 39. Comarus
id est arbutus: uide supra Epimelis. 40. Commi uel
gummi. 41. Conia, id est lixitiuum. 42. Conyza.
43. Coniandrum, Dioscorides notatur, & obiter de
erysipelatis natura, nomine & curatione. 44. Co
ronopus. 45. Costus. 46. Cotyledon, id est, acetā
bulum herba. 47. Crania id est cornus. 48. Crami
be, id est brassica. 49. Brassica syluestris. 50. Bras
sica marina. 51. Crateogonon. 52. Crethmum.
53. Crithe, id est hordeum. 54. Crimnon, & puls.
55. Crinon: i. lilium. 56. Crocodilion. 57. Cro

cus. 58. Crommyon, id est cepe. 59. Cyamus id est
faba. 60. Cyclaminus. 61. Cyminum. 62. Cy
nosbatus, id est caninus rubus. 63. Cyparissus, id
est cupressus. 64. Cyperus. 65. Cyprus. 66. Cý
tissus. 67. Conion, id est cicuta. 68. Conu carpos,
id est pineæ nuces. 69. Lagopus. 70. Lathyrus.
71. Lamplanē. 72. Lapathum. 73. Limoni
um. 74. Lichen. 75. Leontopetalon. 76. Lepidi
um. 77. Leucas. 78. Leucacanthum. 79. Leu
cotium. 80. Leuce, id est, populus alba. 81. Liba
notus, id est thus. 82. Libanotides: 83. Lignys, id est
fuligo in genere: & priuatum thuris, terebinthi, myr
rhā, styracis, picis liquidæ, cedri. 84. Libythium
85. Lini semen. 86. Linozofitis, id est Mercuria
lis. 87. Lonchitis. 88. Lycium. 89. Lyfima
chium. 90. Lychnis. 91. Lotus herba. 92. Lotus
arbor. 93. Macer cortex. 94. Malabathrum.
95. Malua, & arborascēs malua uel althea: de qua
& supra in Ebfico. 96. Mandragoras. 97. Mara
thrum, id est fœniculum satium, & duo syluestria.
98. Mastiche. 99. Melanthium. 100. Melilo
tus. 101. Mel, & sacchar. 102. Melissophylon, id
est apiathrum. 103. Mespilum. 104. Medium
105. Mecon, id est papauer, tum erraticū, tum aliā.
106. Mecon ceratius, id est Papauer cornutum.
107. Mecon Heraclea, Dioscoridi papauer spume
um: Vide Peplus infra. 108. Melea, id est malus.
109. Melea, id est malus persica. 110. Mala Ar
meniaca siue præcocia. 111. Malus Medica. 112. Mē
on. 113. Milax aspera: Dioscoridi simlax. 114. Mi
lax leuis. 115. Morus. 116. Myagrus. 117. My
ces, id est fungus. 118. Myle, Dioscoridi Moly: Vi
de Moly infra. 119. Muris auricula. 120. Myrica.
121. Myriophyllon, id est millefolium. 122. Myr
rhis. 123. Myrtus. 124. Moly siue ura agrestis,
uide Myle superius.

GALENI DE SIMPLICIUM

MEDICAMENTORVM FACVLTA TIBVS

Liber Septimus.

PROŒMIUM



SEPTIMUM de simpliciu medicaminum facultatibus
cōmentariū scripturus, ne
cessariū duxi præfari, solis ijs
apertū ac clarū fore, qui in su
perioribus libris nō uelut ali
ud agētes aut obiter fuerint
uerfat: alios uero potius per
peram inaudiuos, q̄ eorū quæ in eo dicēda sunt
aliquid addiditurosexistimo: tum sese falsuros, et
nos forsā tanq̄ non recte quædā scripserimus, ca
lumniaturos, atq̄ conuicijs laceraturos. Itaq̄ qui
faniotis mentis sunt, monitis scio auscultabunt: ac
siqua illis cura est præsentis huius speculationis,
ab initio totū opus perlegent. At qui præ curiosi
tate potius q̄ discendi studio huc accesserunt, mo
nita nostra cōtemnent. Enim uero mirū uideri nō
debet, si inuenti sunt qui mysteriorū libros à my
sterijs alieni legere non sunt reueriti. Verum illos
sui autores non scripserāt prophanis: nec ego, me
Hercules, ijs qui in principijs non sunt exercitati.
Exponent hoc in libro, & eo qui hūc subsequitur

reliquarum plantarū primæ facultates, eo doctri
næ ordine, qui in literis à quibus incipiunt uisitur.
Antecedēte itaq̄ libro usq̄ ad, & progressi sumus:
Hic autē principiū sumemus à: id modo præmo
nentes etiā quod & ante demonstrata principia to
tum referemus. Siquidē hinc omnis mēbratim me
dicamentorū in agēdo prouenit diuersitas, q̄ ha
ctenus eorū unūquodq̄ aut calidū est, aut frigidū,
aut siccū, aut humidū, aut tenuiū partiū, aut crassū
rum. Cæterū iuxta exactā ueritatē quatenus cōm
prehēsorū uno quoq̄ processum sit, explicatū cer
te est impossibile. Sed nos id tamē claris limiti
bus circūscribere sumus conati, qui quidē ad artis
usum sufficerent: Vnum esse medicamentorum gē
nus monstrantes, quod ad similem corporibus no
stris tēperaturā pertingeret, cū à calore qui in illis
est, mutatiōis alterationisq̄ acciperet principium.
Alterū, quod calidius q̄ nos efficeret: cuius qua
tuor cōstitutōdos esse ordines uisum est. Primū qui
sensū obscurus sit, adeo ut ratione sit opus, quæ ue
rum deprehendat. Alterum ab eo secundum quo
dāmodo iam sensū clarum. Tertiū deinde alium, qui

qui ualenter quidem excafaciat, sed nondū urat. Quem sequitur quartus & postremus iam adurens. Sic quoq; refrigerantium. Primū uiam eorum quæ rationis subsidio indigent, ut refrigerare demonstrentur. Secundū eorum quæ sensibilibiter refrigerant. Tertiu eorū quæ ualenter. Quartū eorum quæ extingunt, ac mortē, frigore inducunt. Proportione istorum & de humectantibus.

Calamintha. Nepeta. Cap. 1

Calamintha essentia est tenui, & calida siccaq; tēperie, ex tertio quodammodo ordine utraq; qualitate. Horum manifesta sūnt indicia, partim gustu apparentia, partim experientia cognita. Gustu siquidem acris & palam calida est, ac paulum omnino amaritudinis obtinet. Periclitantibus autem & corpori admoventibus extrinsecus imposita primum quidem ualde excafaciat & mordicat, cutemq; exugit, postremo etiam ulcus efficit. In corpus autē intro assumpta, tum ipsa per sese sicca, tum etiam cum melicratu, perspicuo calfacit & sudores ciet, omneq; corpus tū digerit, tum exiccatur. Earatione ducti quidam ipsam contra corporis concussiones rigoresq; per circuitum repetentes adhibuerunt: foris quidem oleo incoctā toti corpori inungentes cū frictione non legni, intrō assumentes sicuti est dictum. Quin etiam & coxendicibus eam quidem in ægri tudinibus isciadicis tanquam strenuum remedium illiunt. Trahit enim quæ in profundo hærent ad superficiem, totumq; adeo articulum excafacit, cutemq; nō obsecure adurit, mensesq; tum epota, tum apposita admodum efficaciter prouocat. Bonum etiam elephantorum remedium, non eo quod strenue tenues humores digerat, uerum etiā quia extenuet & incidat ualenter crassos, qui talem morbū procreant. Sic & cicatricibus atris candorem reddit, & fugillata digerit. Sed ad talia coctam in uino adhibere præstat, & uiridem acrecentem potius, q̄ siccam. Quippe arefacta uehemētior redditur, & ad urendum promptior. Porro talis cum sit, ad uenenatarū bestiarum morsum assumitur, uelut etiam cauteria, & quæcunq; medicamēta calida sunt & acria, tenuiūq; partium, quæq; facile ex alto ad sese circumiacentem omnem humiditatē possunt attrahere. Cæterum quæ illi in est amaritas, planē exigua est, uerum quædam ita efficaciter agit, ut quæ ualentissima est, nimirum cum conium, ea sit uehemētī calori cum tenui essentia. Quare & ascaridas & lumbricos succus eius aut infusus, aut epotus enecat. Eadē ratione aurīū uermes, aut si aliscubi in ulcere putredinoso, talis prouenerit affectus. Sic & conceptū seu pota, seu ad mota interimit & eicit. Igitur incidendi quidem eis uis adest propter calorem eius, tenuitatem, & amaritudinem: abstergen di uero propter unicam amaritudinem. Itaq; althmaticis ob omnia ante dicta prodest: isericis uero, siue regio morbo laborantibus, potissimū ob amaritudinem, sicut alia ferē omnia amara, utpote abstergentia & exuperantia in iecore prouenientes obstructions. Ad omnia iam dicta efficacior est montana.

Calamus odoratus. Cap. 2

Calamus odoratus leuiculam quandam adstrictionem, ac minimam acrimoniā possidet: magna ex parte essentia eius terrena est & aerea, in caliditatis frigiditatisq; coniugatione tēperata. Quæ obrem moderate urinam mouet, & facultatibus quæ iecori stomachoq; imponuntur, misceri potest: tum in fomenta quoq; uteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis mensibus assumuntur, utiliter admiscetur. Ponatur itaq; hab eaturq; secundū ordinis eorum quæ excafaciunt & deficcant, ualentius tamen deficcant quàm excafaciunt. Inest quoq; ei quædam partium tenuitas, uelut alijs omnibus odoratis, siue aromatis. Cæterum illorum compluribus tenuium partium plurimum, calamo uero non multum adest.

Calami phragmitis. Cannæ. Cap. 3

Calami phragmitis radicem cum bulbis aculeos & stipites ex alto extrahere quidam scripsere, ceu trahendi quædam uis ei inesset. Nos tamen eius rei periculum non fecimus: uerum quantum gustu liceat consicere, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeq; acrem. At tamen sola ipsa uiridia moderate perfrigerant, & simul non modicæ abstergentis sunt facultatis: cortex uero eius combustus admodū tenuium partium & digerentis facultatis efficitur, adiectum habēs absterforium quiddam, ut exiccet & excafaciat tertio quodammodo ordine, plus tamen deficcet quàm excafaciat. Vitandum est eius flos, quam an thelen uocant. Nam si in aures incidat, adeo tenaciter adherens affigitur, ut auelli non possit, auditumq; uitiat: quamobrem sæpissime exurdat.

Cancani. Cacia. Cap. 4

Cancani radix facultatem habet mordacitatis expertē, & modice exiccantē, essentiam crassam, & emplasticam. Quapropter macerata uino sicut traga cātha, & linctā arteriæ asperitates sanat: nec minus si quis eam cōmandat: succus eius defluens prodest arteriæ similiter ut glycyrriza.

Canabis. Cap. 5

Canabis semē flatus extinguit: adeoq; deficcatur si plusculum edatur, genituram exiccet. Sunt qui uiridem succū exprimentes ad aurīū dolores, ab obstructione, opinor, natos, eo utantur.

Capnios. Fumus. Cap. 6

Capnios, alij capnos, acris simul & amara qualitatis est particeps: nec tamen planē expers est acerbæ. Quamobrem urinam biliosam multamq; prouocat, sanatq; tōcinoris obstructions & debilitates. Succus eius oculorū aciem acuit, non paulum trahēs lachrymarum, uelut ipse fumus. Nam hinc ei appellatio indita. Plebejus quidam ea uti solebat ad stomachum roborandum, unaq; uentrem lubricandum. Si quidem herbam primum de siccatam condebat: porro cum uti uolebat, subductionis quidem gratia, melicratu inspergebat; roborandi uero causa, uino nimirum diluto.

Capparis. Cap. 7

Capparis radicis cortex uincens habet qualitatem amarā, proximam acrem, deinde acerbam

ham. Ex quo liquet quod diuersis pugnantibusq; conſter facultatibus: quippe abſtergere, purgare, incidere poteſt amaritudine, excalfacere, incidere, digerere acrimonia: porro cōtrahere, denſare, conſtringere, acerbitate. Itaq; lienēs induratos, ſiquid aliud, hoc medicamētū ſuauare ualet, tū foris idoneis illiniēdis remedijs admiſit, tū intrō in corpus aſſumptū, ſiue decoctū in aceto aut oxymelite, & id genus, ſiue aridum cōtuſum, illiſq; permiſtum: quippe cum aperte craſſos lentosq; humores hoc pacto ſumptū euacuet, nec eos tantū per urinas, ſed & per uentrē ſæpe etiā ſanguinolentos deſert, unde & lienēs adiuti ſunt, & coxarū dolores. Quinetiā menſes promouet, & ex capite purgat detrahitiq; quod ἀρρολεματιζήν uocant, auxiliariū ruptis atq; cōuulſis. Cæterū cuiuſq; ipſum potioni in quoq; affectuū miſceri cōueniat, nō eſt præſentis inſtituti perſequi, ſed aut eius ubi de cōponendis agit medicamētis, aut ubi curandi traditur methodus. Porro radicis eius cortex ulceribus malignis cataplaſmatis modo impoſitus non malū eſt remediū: ut qui illa extergere ualeat, nec ſegniter deficere. Præterea dentiū labores prædicarum qualitatū ratione adiuuat, interim cū aceto coctus, interim cum uino, ſæpe etiā ſolus dentibus manſus ac morſus. Sed non pertinet ad præſens negotium, quando quodq; horum tēpeſtiuū ſit, deſignare: nec enim id nunc propoſitū eſt: ſed ex quoq; particulariū eius operū, uiriū eius quando ſumere in dicationē, ſermonē ad principia ab initio propoſita reducendo. Ex dictis ergo clarū eſt, incidēdi quandā ei facultatē in eſſe, itēq; extergendi, digerēdi cōtrahendi. Vitiligines ſiquidem cum aceto detrahiti, & choeradas & duros tumores digerit idoneis ad ea medicamentis miſtus. Radicis cortici, fructus proportione uiriū reſpondet niſi qd ad omnia ſit imbecillior. Imō & folia & cauſes eius ſimile uſum obtinent: meminiq; me folijs quandoq; paucis diebus duriciem choeradis naturam referentē diſcuſiſſe. Sed admixcemus ſcilicet illis quippitā quod eorū uiriū obrūdāt uehementiam. Nec mirum eſt qd aurium uermes amaritate occidant ſua. Porro capparitis quæ in admodū feruentibus regionibus prouenit, ut quam fert Arabia, multo eſt noſtrate acrior, adeo ut plurimum etiam habeat facultatis adurentis.

Cardamum. Naſturtium. Cap. 8

Naſturtij ſemen adurentis ſeu cauſtica facultatis particeps eſt, ueluti napy: proinde coxendicis & capitis dolores, atque adeo quodcumq; rubrificatiōnem poſtulāt, eo excalfaciunt ſicut napy. Miſcetur quoq; remedijs quæ exhibentur aſthmaticis, tanquam ualēter craſſos ſuccos incidere ualeat, uelut & napy. Nam per omnia ei ſimile eſt. Porro & herba arefacta ſimilem ſemini uim poſidet. Humida uero eſt ac uiriſ propter aquæ humiditatis admiſtionem multo ſemine inferiore: adeoq; tunc mordacitas eius moderata eſt, ut cum pane ea uti liceat ceu obſonio.

Cardamomum. Cap. 9

Cardamomum eſt & ipſum ſanē facultatis ad-

Galen.

A modum calida, nō tamen uſq; adeo ut naſturtiū, ſed quanto ſuauius magisq; fragrans eſt naſturtio, tanto & imbecillior ei calida facultas in eſt: nec enim ulcerare idoneū eſt uel ipſum per ſe illitum. Porro adiunctum habet quiddam etiam amaritudinis, qua lumbricos interficit, & cū aceto ualenter pſoras detergit.

Caron. Cap. 10

Cari ſemen calfacit & exiccat tertio quodammodo ordine, moderate acrem qualitatem poſidet: itaq; & ſtatus extinguit, & urinas ciet, nō ſemen tantum, ſed & tota planta.

Cafia. Cap. 11

Cafia exiccat & excalfacit tertio quodammodo ordine, ſed & tenuiū admodū partiū eſt, guſtu uero plurimū habet acrimonia, leuiter quoq; nihil adſtringens. Quamobrem ob hæc omnia incidit ſimulq; digerit quæ in corpore ſunt recrementa, & ad hæc robur etiam inſtrumentis addit. Idoneum uero etiā ſuppreſſis menſibus, cum uidelicet a copia ſimul & craſſitudine excrementorum quod ſufficiat euacuari nequit.

Carya. Nucis. Cap. 12

Carya arbor tū in folijs, tum in germinibus adſtrictionem quandam poſidet, cæterum euidentem multaq; in nucis putamine recenti pariter & ſiccō: proinde eo ſullones quoq; uti ſolēt. At nos eius expreſſi ſucco, ſimiliter & mororum & ruborum, in melle decoctō, uice ſtomatici medicaminis utimur, & ad omnia reliqua adhibemus ad quæ modo dicti ſucci cōuenire cenſentur. Porro ipſius id quod edendo eſt, oleoſum eſt, & tenuet itaq; etiam facile in bilem tranſit: & quo diutius reconditum fuerit, magis taſte efficitur. Quamobrem oleū ex eo inueterato exprimere liceat. Tūc ſanē admodum ſit per haliū euaporatoriū. Itaque quidam eo gangrenas & carbunculos, & ægilopas ſanant, ac nonnulli ad neurotrota, hoc eſt neruorum uulnera utuntur. Cæterum ſtrepens ſit, ad ſtringentis nonnihil qualitatis etiam obtinet. At quod imperfectū eſt etiam dum, ac nondū ſiccum ueluti reliqui fructus omnes qui uirides ſunt, plenum eſt ſemicoctæ humiditatis. Putamen autem ipſius ſiccum uſtum, tenuiū partium & exiccatorium eſt medicamētū, morſus expers. Eſt & aliud genus nucū minorū, quæ nimirū ponticæ nuncupantur, plus habēs eſſentia terreſtris ac frigida: itaq; etiā guſtanti auſterior tum cortex, tum planta, tum fructus apparet: cætera magna nuci ſimiles ſunt, quæ à quibuſdam uocatur Græce καρύου βασιλικού, (Latine iuglans.) Appellatur autem parua hæc nux λεπτοκάρου Græcè, (Latine Auellana)

Caucalis. Cap. 13

Caucalis, quidā daucum ſylue ſtem nuncupāt: eſt enim ei adſimilis guſtu ſimul ac uiriſibus; excalfacit enim ut ille, & deſiccāt, tum urina ciet, & mūria ad reſpoſitionem conditur.

Carpesium. Cap. 14

Carpesium ſimile eſt uocato plu, hoc eſt ualeriana, non guſtu tantum, ſed & facultate. Sed plus

habet tenuitatis: proinde magis eo etiam uiscerū obstructions exergit, & urinam mouet, renesq; calculus degrauios expurgat. Non tamen eatenus tenuis est partium, ut liceat loco cinnamomi, si non ad manum sit, usurpare, sicuti faciebat Quintus. Præstantius est ponticum carpesium laertio, non tamē uel ipsum cinnamomi uiribus uicinum est, immo non paruo deterius uiribus cassia. Nuncupatur utrumq; a montibus quibusdam Pamphylia in quibus nascitur. Ingens eius prouentus est in Sida.

Cenchrus. Milium.

Cap. 15

Milium primo ordine refrigerat. Exicat uero tertio exoluto, aut certe secundo inrenso. Paululum etiam habet tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura esu quidē planē inter omnia frumentaria edulsa minimum cōfert nutrimenti. Sed & uentrem desiccet. Porro foris impositum in sacculis idoneum est fomentum ijs quæ citra morsum exicari postulant: & cataplasmatibus modo illitū exicare potest: tamē admodū friabile est: pīnde difficilis est eius in cataplasmatibus usus.

Cedrus.

Cap. 16

Cedrus specie duplex est, altera fruticosa iuniperis adsimilis, altera arbor non exigua: utraq; est calida siccaq; temperaturæ tertij quodammodo ordinis secundum utrumq;. Cæterum cedrea (uocatur ita cedri oleum) quartū etiam ordinem uidetur attingere, quemadmodū calida, simul & tenuium partium. Mollem itaq; carnem prompte citraq; dolorē putrefacit, sicut alia omnia, quæ cū eiusdem sint in calfaciendo ordinis, adiuncta etiam habent substantiæ tenuitatis. At in duris plusculo tēpore & uix effectum potest cōsequi. Porro talia omnia medicamenta septica uocantur, & septa: sed inter se maioris minorisq; ratione dissident. Est autem in hoc genere medicamentorum ex primo & infirmissimo ordine cedrea: pleraq; enim eorum admodum sunt efficacia. Talia itaq; & mortuorum corporum carnes corrumpunt: at cedrea exicat, simulq; a corruptione tuetur corpora demortua, utpote humiditates eorum depascens, cæterum solida corpora haud attingens. At in uiuentibus calor ipse qui in corporibus est, cedrea uires adaugens, causa efficitur ut teneræ ab ea carnes deurantur. Nec mirum uideri debet, si cum tanta polleat potentia, lentes, pediculos, & ascarides, & in auribus natos uermes interficere ualeat, tum foris uiuentem quidem interimar, mortuum autē ejiciat, sicut sanē etiam coitus seminis pudēdo circūlita. Proinde partui aduersum est medicamentum, si sic utaris, nulli secundum: Aliaq; multa eiusmodi particulatim efficit. Itaq; argumētum est ipsum ualenter excalfacere, sicut ubi dentium foraminibus instillatur. Siquidē dolores eorū mitigat, sed & ipsos cōstringit. Extenuat quoq; oculos cicatrice: & uisus hebetudini ab humorum crassitudine orta medetur. Porro quod eius est pinguisimum, & ad unguem oleum, quod suspensus supra eam dum coquitur lanis excipit ac colligitur, tota cedrea tenuius qu-

dem est, sed minus acre, quamquam nō minus excalfaciens. Eadem quippe rationem habet ad id, quod reliquū est cedrea, crassius illud uidelicet, q̄ oleum ad amurcam. Proinde illud, utpote crassius, mordax est, & maiore aperiēdi facultate præditum. Itaq; ulcera irritat, phlegmonēq; illis excitat. Porro oleosa illa cedrea adeo clementibus est uiribus, ut etiam plebeij experientia docti uulnera ouibus occasione tendendi a forfice facta, illa illita sanent, sicut etiam pice humida. Utuntur ut illa ea & ad ouium scabiem, & ricinos, Græci κροτωνας uocant. Porro cedrides (nam ita fructum cedri nuncupant) moderatiores uires obtinent, adeo, ut comedi quoq; possint. Atramen si liberius ijs utare, capiti dolorem inferent, ardoremq; ac morsum in ventre percipies.

Centaurium maius.

Cap. 17

Centaurij magni radix sicut gustu contrarias qualitates, ita in usu contrarios effectus præstat. Gustu itaq; acris simul adstringēsq; apparet cum leuicula dulcedine. At in actionib; acrimonia quidem caliditatis opera ostentat, menses prouocans, & foetum mortuum euellens, uiuumq; corrumpens atq; eiiciens. Adstrictio uero, opera crassa terenaq; frigiditatis, cum ulcera glutinet, & sanguinem reijicientibus proffit. Exhibentur autem eius drachmæ duæ, febrientibus quidem cum aqua, febrī uero liberis cum uino. Porro secundū omnium simul qualitarum actionem, ruptis, cōuulsis, dyspnoæ, siue spirandi difficultati, tum inueteratae tussi cōuenit. Nec enim in talibus euacuare solum quod præter naturam est oportet, sed partem quoq; euacuatā roborare ac cōfirmare. Variatio ni itaq; accōmoda est acrimonia utiq; cū non sola sit ac pura, sed aut dulcedini iuncta, aut certe non prorsum amaritudini. Siquidē uehementiam tūc atq; uolentiam mista illi tēperata quadam substantia, cuiusmodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea quæ euacuata sunt, roboranda contrahendaq; adstrictioe est opus. Eadem quæ radix & succus ipsius efficit: utunturq; eo quidam uice lycij.

Centaurium minus.

Cap. 18

Centaurij minoris radix planē inefficax est, sed caulis eius extremus, & potius folia quæ illi inhærent, & flores, utiliora sunt: uincit in eis qualitas amara, paululum habens & adstrictionis, atq; ob eiusmodi temperamentum admodum exicatorium est medicamen, expers mordacitatis. Porro quod omnia talia utiliora sint, supra commonui, & nunc nihilo scius tamen nos repetere temperatum est, omnes eius particulatim actiones memorantes. Ulcera itaq; magnæ herbæ ipsius recentis illitū glutinatur: & uetusta, quæq; ægre ad cicatricem perditū queunt, cicatrice eodem modo uentibus includuntur. Arefacta uero glutinatrijs & desiccatorijs miscetur facultatibus, ijs uide licet quæ sinus & fistulas sanare sunt natae, ueteresq; duritias emollire, tum ulcerum maligna & cacochæ sanare. Miscetur etiam ijs quæ rheumaticis affectibus medetur. In quibus ea medicamina præstantissima sunt, quæ uehementē desiccant

tia cum quadam adstrictione nullam habent mordacitate. Decoctū herba quidā ischia dicitur infundunt, ceu biliosa & crassa ducēs: nam & talia purgat: quanq̄ cum adeo uehementer operabitur ut cruēta euacuet, tunc plus proderit. Succus porro eius cum adsimilis sit facultatis, hoc est exiccatoriz & absterforiaz, & cætera iam cōprehensa pulchre prestare potest: & cum melle oculis insilitur, menlesq̄ & foetum euocat. Sunt qui ipsū præbeant & ijs quibus nerui affecti sunt, ut qui euacuet & desiccet innoxie quæ impleta sunt: quippe cum iocinoris quoq̄ obstructiones optime expectat, bonumq̄ sit lienī indurato remediū foris impositum, nec fecius si quis bibere sustineat.

Cerasus. Cap. 19

Cerasus arbor fructum fert non parīs adstrictionis in omnibus particulatim plantis participem. Nam & in harum, sicut etiā malorum granatorum, & malorum, quibusdam austerā qualitas, in quibusdam uero dulcis, nonnulli autem acidā exuperat. Quinetiam ipsorum dulcium ea quæ nondum cocta sunt ac matura, quædam admodum sunt acerba, quædam similiter moris acidā. Sed in moris immaturis acidā qualitas acerbam exuperat, in cerasiis non semper. Ergo quæ dulcīa sunt, magis quæ in intestinis sunt subducunt, sed minus grata stomacho sunt. Contra austerā acidā pituitosis excrementosisq̄ stomachis sunt apta. Siquidem austeris magis desiccant, & non nihil etiā incidunt. Porro ipsius arboris gummi communem omnibus uiscosis & mordacitatis expertibus medicaminibus facultatē obtinet, quæ & ad arterias exasperatas accōmoda est. Proprie autē, siquidem quod quidam subscribunt, uerum est, calculis uexatos adiuvat. Nam sic illi tenuium partium inesse facultas quædam.

Ceratonia. Cap. 20

Ceratonia exiccantis est & adstringentis facultatis, sicut & fructus eius, quæ ceratia uocant, non nihil etiā dulcedinis continens. Accidit autem istis quiddā simile cerasiis. Nam si humidā sumas, magis uentrē subducunt; sicca uero magis sistunt: ut pote cum humiditatē expiſent, & quod essentia est crassioris, tantum reliquum habeant.

Cestrum. Beticia. Psychotrophum. Cap. 21

Cestrum, aut Psychotrophum, Romanæ uero Beticonā, uim habet incidendī, ut gustus indicat. Amariuscula enim est & subacris ipsa herba: id quod ostendit & particulatim edita actio. Nam consistentes in renibus calculos rumpit: & pulmonē, pectus, & iecur expurgat abstergitq̄; menses quoq̄ ciet; & comitalibus prodest, tum rupta conuulsāq̄ curat: & omnibus bestiarū moribus ulceri illita auxiliatur, postremo acidum ructantibus, (*αφρορμαίννας* Græci uocant) & ischiadicis bibita auxilio est.

Cecis, Galla. Cap. 22

Galla quæ omphacitis nuncupatur, admodum acerbum est medicamē, pleraq̄ sui parte essentiaæ terrenæ & frigida, per quam desiccatur & repercutit fluxiones; ad hæc constringit cōtrahitq̄ partes

axillas ac languidas, omnibusq̄ fluxionum affectibus strenue resistit. Esto uero tertij in desiccandō, secundū autē in refrigerandō ordinis. Altera autē galla, flaua illa & magna laxaq̄, & ipsa desiccatur quidē sed tanto minus, & quanto minus acerba qualitatē est particeps. Cocta itaq̄ per se, ac deinde trita cataplasma est non instrenuum sedis phlegmonarum, ac proci dentiarū. Porro coquenda est, si mōdica opus sit adstrictionē, in aqua: sin uehementiore in uino. At si augerē in super adstrictionē sit opus, uino utere austeriusculo. Hanc rusticī nostrates *οιολουκιδια*, quasi uinigallā dicit, nomināt. Deniq̄ galla combusta sanguinis reprimendī facultatē acquirunt, ac nimirū etiā calorem & acrimoniam ex uestione assument: suntq̄ ijs quæ ignem expertæ non fuerint, tum subtiliorum partium, tum maiore desiccandī potestate. Cæterum cum ad sanguinis suppressionem præparare eas uoles, carbonibus impositas dum uondequaq̄ candeant, aceto aut uino extinguerē oportebit.

Cera. Cap. 23

Cera quodāmodo medium tenet calfacentium, refrigerantium, humectantium, & desiccantium. Habet uero quiddam etiā essentiaæ crassa, atq̄ emplasticum: quam obrē non modo exicare, sed & per accidēs humectare uideri fortassis poterit, perspirationes uidelicet prohibēs. Quam obrem aliorū medicamentorū tum exalfacietium, tum refrigerantium materia est. Ipsa autē per se ex genere fuerit debiliter concoquentiū: nec tamen intro in corpus assumptum, sed foris impositum. Habet enim paulum quiddam digerētis calidæq̄ potentia, quæ plurima mellī inerat.

Cici Ricinus. Cap. 24

Ricini fructus quoadmodum expurgat, detergit ac digerit, sic quoq̄ folium, sed uondequaq̄ debilius. Oleum quod ex semine cōficiunt, tum calidius est, tum tenuiorū partiū, q̄ est oleum cōmune, ac proinde potentius quoq̄ digerit.

Cinnamomum. Cap. 25

Cinnamomū summe tenuium est partium, nō summe tamen calidum, sed ex tertio ordine: nihil autem æque desiccatur eorum quæ pari sunt exalfaciendī facultate propter tenuitatem scilicet essentiaæ. At Cinnamomū est uelut imbecillum cinnamomum. Nonnulli esse pseudocinnamomum nuncupant.

Circæa. Cap. 26

Circææ herba radicem scribit Dioscorides ex uino dulci potā secūdas purgare: est em̄ boni odoris, & calfacitoria: semen autē eius in sorbitione exhibitum ad lacris generationem conducit.

Cisthus. Cap. 27

Cisthus aut Cistharus, frutex est gustu adstringens, omnibusq̄ particulatim operibus. Attamē folia & parua germina trita adeo desiccatur adstringuntq̄, ut ulcera glutinare ualeant. At flores magis sunt efficaces, adeo ut cum uino poti dysenterias, uentris imbecillitates, fluxusq̄ ac humiditates sanent; cataplasmatibus ritu illita ulcerum putredinosa iuant. Est enim facultas eorum non instren-

nue desiccans, fereq̄ secundu[m] excessus à temperatis absoluti. A deo uero frutex hic frigidus est, ut tepidi caloris sit particeps. Porro hypocistis, quā uocāt, multo est magis adstrictoria q̄ folia, admodum efficax remediū ad omnes fluxionum affectus, puta sanguinis reiectiones, profluvia muliebria, coeliacas, dysentericosq̄ affectus. Quin si quam partem roborare consilium sit, quæ uidelicet plusculo humore exoluta fuerit, robur ac firmitatem illi non segniter addit. Sic sanè stomachicis epithematis hepaticisq̄ cōmiscetur, & ex uiperis confecto antidoto inditur, nimirum quæ corpora confirmet ac roborat.

Cisthus. Cap. 28

Cisthus aut Ladanum. In calidis regionibus hic cisthus proueniens, tamen si haud alius sit genere quā qui apud nos nascitur: eximiam tamen à regione ac peculiarem, digerentemq̄ caliditatem nactus est: atq̄ utroq̄ à nostrate differt, tum quia frigiditatem deposuit, tum quia calorē assumpsit. Itaq̄ cetera quidem huius cisthi, illis que in nostrate uisuntur, similia sunt. Verum ladanū quod uocant, ex eo prouenit, medicamentū primo excessu iam quodāmodo cōplete calidum, ut uidelicet & secundum attingat, habens etiam adstrictiōnis paululum. Ad hæc substantia tenui, ac proinde emolliens, siue malacticum, pariterq̄ moderate digerens, ac uidelicet etiā *συμνεσθῆναι*, hoc est concoquens. Itaq̄ mirandum non est, si peculiariter ad utri uisita conueniat, quando quidem ad dicta paulum quiddam adstrictiōis obtinet. Quocirca diffluētes capillos retinet. Nam quicquid ad radices eorum prauū humoris sederit, id omne absumit: tum meatus quibus infixi sunt, contrahit. Ceterū alopecias, & ophiasas, sanare non potest, ut pote grauiore uires quā quæ ladano insunt, poscentes: quippe proueniunt ista ex prauis succis lentis crassisq̄, quos secantia ac digerentia medicamenta potissimum euocant atque euacuant. At uero hæc tenuium partium sunt facultatis oportet ac minime adstringentis, non tamen usque adeo tenuium partium, & desiccatoria, ut nimio plus desiccet, unaq̄ cum collectis inibi succis præter naturam, naturalem quoq̄ humiditatē incrementa pilis suppeditatē absumant. Nam sic non magis alopeciam sanabūt, quā caluitiem afferent. Sed hæc ad curandā rationem pertinent.

Cissos, Hedera. Cap. 29

Hedera ex contrarijs composita est facultatibus: habet enim quiddam adstringentis substantiæ, quam terrenam & frigidam esse ostendimus: habetque etiam nonnihil acris, quam calidam esse uel gustus cōprobat: Nec deest tertia; aqueam nanque substantiam quandam tepidam obtinet, certe si utridis sit. Siquidem dum arefcit, hæc prima exhalat necesse est: manetq̄ quæ terra est & frigida adstringensq̄, & ea quæ calida & acris. Viridis autē, folijs eius in uino decoctis, ulcera grandia conglutinat: quæq̄ maligna sunt, ad sanitatem reducit: tum igne factas exulcerationes cicatrice includit. Porro cum aceto decocta folia lie-

nos profunt. Flores autem quodāmodo ualidiore sunt, ut ad leuorem redacti cum cerato am bustis conueniant. Præterea succus medicamentū est errhinon, hoc est, in nares fufum, capiti purgandum idoneum: tum uetustas aurium fluxiōes sanat, ad hæc ulcera uetera tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo aut dulci oleo miscetur. Lachryma eius lentes interimit, pilis nudat: usque adeo calidæ potestatis, ut obscuro adurat: est enim uelut aqueus quidam liquor, si cut aliæ omnes lachrymæ.

Clinopodium. Cap. 30

Clinopodium excalfaciendū uim obtinet, sed nondum adurendū: est uero etiam essentia subtilis: ponatq̄ ipsum quisp̄iam in tertio ordine tum excalfaciendum, tum resiccantium.

Clematis. Cap. 31

Clematidis folia acrem & adurentem siue causticam facultatem obtinent, adeo ut & lepras excorrient. Fuerit itaq̄ in quarti ordinis excalfaciendum initio. Vocatur autem clematis & daphnoïdes, quod quidā myrsinoïdes, alij polygonoïdes appellant. Cæterū id nequaquam exulceratorium est aut acre, sicut quod ante dictū est, imò profluuijs ac dysenterijs cū uino potum prodest, dentiumq̄ dolores mansum mitigat: tum uteri quoque doloribus in pello ad motum usui est: tantum abest ut perinde urat aut ulceret, ceu illud superius. Sed summe nobis suspiciendus Pamphilus ille, sicuti in reliquis nugatur de ijs quæ nunquam uidit, literis ea mandans, sic hæc ambo in unum confudit. At Dioscorides utriusq̄ in quarto meminit, & eius quæ simpliciter uocatur clematoides, idq̄ in sine libri: & alterius, sed in principio, quam obrem non est necesse, ut ego rursum notis suis utrumq̄ depingam, sicut nec in alijs feci.

Cnicus. Cap. 32

Cnici semine duntaxat ad purgationes utimur. Tertij est ordinis excalfaciendum, si quis foris eo uti uolet.

Coccus gnidijs. Granum gnidium. Cap. 33

Granum gnidijs & ipsum quoq̄ purgat: sed acris est adurentisq̄ facultatis.

Cocos baphicos. Granum tinctorium. Cap. 34

Granū tinctoriū adstringentē simulq̄ amaram qualitatem possidet. Vtraq̄ sine morfu desiccatur. Proinde ad ingentia uulnera cōgruit, & ad neruorum uulnerationes. Sed tunc ipsum quiddam cum aceto terunt, alij cum oximelite.

Coccynelea. Prunus. Cap. 35

Pruni fructus uentrē subducit, recens quidem plus, aridus minus. Cæterum haud sic cur Dioscorides pruna damascena ficcata uentrem sistere dicat, cum & ipsa palām etiam subducant, minus tamen q̄ quæ importantur ex Iberia. Siquidē damascena magis adstringūt: at quæ Iberia fert, dulciora sunt. Quin & ipsæ arbores fructibus proportionē respondēt. Minus enim adstringunt quæ in Iberia nascuntur, magis uero quæ Damasci. Cæterum ut in summa dicam, quorū in folijs aut in geminis adstrictio quædam inesse apparet manifesta

feſta, n̄ decoctis phlegmōē in columella aut ton-
 ſillis exiſtentes idonee colluunt. Porro agreſtium
 fructus euidenter adſtrictorius eſt, uentreq̄ ſiſtit.
 Nominatur autem hæc planta in Aſia primum.
 Gummi autem arboris ſunt qui dicant cum uino
 potum lapides cōfringere, cum aceto, puerorum
 ſanare lichenas. Ac ſi id præſtat, clarum eſt exte-
 nuandi incidendiq̄ illi facultatem in eſſe.

Colla, aut gluten. Cap. 36

Gluten quod ad libros præparatur ex ſimilagi-
 ne & polline, emplaſtica cōcoctoriaq̄ facultatis
 eſt, quibuscunq̄ ipſum partibus illinas.

Colocynthis. Cucurbita. Cap. 37

Cucurbita humida frigidaq̄ tēperatura eſt ut-
 traq̄ qualitate ſecūdi ordinis: quo circa ramento-
 rum eius ſuccus ad auritū dolorem cum phlegmo-
 ne inunctos cū roſaceo utilis eſt, ſic tota quoq̄ illi-
 ta calida phlegmonas mediocriter refrigerat. In
 eſu autem humida eſt, & ſitum propellens.

Colocynthis. Cap. 38

Colocynthis guſtu amara eſt. Sed quæ illi ama-
 ritudinis dū pota adſunt opera, ea euidenter effi-
 cere nequit ob purgatoriam facultatem quā uali-
 dam in ſe cōtinet; nimirū cum ijs quæ expurgat,
 ante & ipſa per aliu excerni præuertens. Viridis
 ipſius ſuccus intritus iſchiadibi ſ prodeſt.

Commarius. Arbutus. Cap. 39

Arbutus arbor ipſa qualitate acerbata unā cum
 fructu eſt. Eum memecylum nuncupant. Eſt au-
 tem hic & inſenſus ſtomacho, & capiti dolorem
 commouens.

Comm. Gummi Cap. 40

Gummi lachryma eſt congelata concretaq̄ in
 truncis arborū ipſam producentiū, uelut reſina q̄q̄
 in multis uisitur quæ reſinam proferre poſſunt. Ce-
 terum q̄ exicatoria emplaſticaq̄ potentia ſit,
 conſtat. Præterea aſperitatibus medetur.

Conia. Lixiuum. Cap. 41

Lixiuum: ſic quod uelut ablutio eſt cineris, nō
 minatur. Porro omnium maxime tum abſterſori-
 um tum exicatoriū illud eſt quod ex cinere ficus
 & thymallorum efficitur: fereq̄ ſeptica ſeu pu-
 trefacientis eſt facultatis, quæ cuiuſmodi ſit, in
 quinto uolumine expoſui.

Conyza. Cap. 42

Conyza & maior, & minor adſimilis ſunt tum
 tēperatura, tum facultatis, guſtu amara & acres:
 excaſciantq̄ admodū luculentem, ſiue quis folia
 cum teneris ramulis (eſt em fruticoſa planta) parti-
 cipi cuiſq̄ illinat, ſiue ubi in oleo coxerit, eo utatur.
 Siquidem concuſſiones ſiue rigores per circuitū
 redeuntes tale ſanare oleum uidet. Flores quoq̄
 eorum adſimilis ſunt facultatis. Itaque quidam &
 ipſos cum folijs tritos in uino bibendos exhibent
 ad menſes fortiter ducendos, eſſicciē diuq̄ fortum.
 Eſt & tertium conyzae genus in locis humidioribus
 proueniens, utriſq̄ illis tū graueolentius, tum
 imbecillius. Sed prima memorata tertij ſunt ordi-
 nis in excaſciendo exiccandoq̄.

Coriannon, Corion, Coriandrum. Cap. 43

Coriannon, ſiue Corion, aut utcumque uoca-

Galen.

re lubet. Vetusiores Græci Coriannon nomina-
 bant: at recentiores medici omnes Corion appel-
 lant, ſicut & Dioſcorides, refrigeratoriū eſſe
 herbam ipſam diſcitans, ſed perperam. Siquidem
 ex cōtrarijs facultatibus conſtat & cōpoſita eſt,
 plurimum habens eſſentiæ amara, quā oſtendi-
 mus eſſe tenuium partium, & terrenā. Nec parum
 etiam aquæ humiditatis obinet, quæ tepētis eſt
 facultatis: his adiunctum eſt quoq̄ adſtrictionis
 pauſillum. Ex quibus omnibus uariē quidem ag-
 git ea quæ ſcribit Dioſcorides, ſed non tantum ex
 refrigeratione. Cæterū ego cuiuſq̄ particulatim
 actionis cauſam enarrabo, tameti propoſitū fue-
 rat mihi unius duntaxat hoc in libro ſententiā
 expromere, ſed forte nihil obſtat: imō, ſi uerum
 fatendum eſt, proderit non nihil, ſuperiores me-
 thodos, quæ in paucis medicamentis ſunt dictæ,
 hic repetere. Primum ergo non Dioſcorides tan-
 tum, ſed & alij cōplures medicorū indeterminate
 de morbis pronunciant, ſicut ſanē hæc quoq̄ tēpe-
 ſtate non paucos inuenias medicos uel inſignes,
 præter alia, hæc in re turpiſſime allucinant. In-
 ter dū enim atra, liuida frigidaq̄ reddita parte quæ
 eryſipelas habuit, nec amplius refrigeratiā poſcē-
 te pharmaca, cœu antea, ſed ea quæ infixum parti
 præter naturam humorem eliciant, quidam tamē
 refrigerare perſeuerant: alij ad digerentiā quidem
 tranſeunt, cæterum ea eryſipelas ſanare dicunt.
 Quamquam ſcribant, incipientibus etiamnum at-
 que gluſcentibus creſcentibus ue eryſipelatis alia
 eſſe medicamenta, alia uero iam declinationibus ac
 ſtaccetibus. Sed ita res non habet. Neq̄ enim
 eryſipelas etiam uocari debet poſtea quā in-
 flammatio eius, & ſeruor, ac biliolum illud abie-
 rint: neque quæ facultate ſunt frigida, neque quæ
 illa ſanant, remedio eſſe putandum: ſed uelut ſi
 uel in initio protinus aut percuffis, aut alia de
 cauſa quauis tumor in parte quāpiam aut liuidus,
 aut niger extiterit, eum eſſe frigidū affectum exi-
 ſtimabis, & quæ digerant excaſciantq̄ poſceret
 ad eundem, opinor, modum, ſi calida affectio in
 frigidam reciderit, negligēda quidē prior eſt, ſed
 ſecunda alio appellando nomine: aut ſi diſplicet
 nominis mutatio ſaltē ſicut quidā alia ſcribūt pri-
 cipij alia declinationis remedia, haud frigida eſſe
 autumantes declinationis remedia: concedendū
 ſanē eſt, ſi cui ita placet, ut talis affectio etiam ery-
 pelas uocetur: ſed eam etiam calidam dicere ubi
 iam refrigerata eſt, id uero ne utiq̄ cōcedendū.
 Itaque ne quod tūc ei auxilio eſt, refrigeratoriū mi-
 eſſe credamus, ſicut Dioſcorides coriandrum, quū
 cum pane aut polēta eryſipelas curet illitū. Nam
 quod ad unguem eſt eryſipelas, quod utiq̄ in-
 flammatum eſt & ſtauum, haud unquam ſanare
 queat cum pane coriandrum, ſed illud quod iam
 refrigeratum eſt. Proinde nos ſuperioribus uolu-
 minibus, cum determinata ac definita experientia
 cuiuſq̄ medicaminis facultatē explorandum cen-
 ſimus, quā maxime fieri poſſet ſimpliciſſimū
 eligi affectum conſulimus. At pleriq̄ medici ne
 quæ quod uel pluriſimi morborum protinus ab in-

tio compositi inuadant, norunt, neq; quòd alius affectus sit erysipelas exactū, alius uero is qui uocatur ab omnib. nobis usitate, ut à ueterib. quoq; phlegmonæ: alij autē inter hos medij plurimi, partim ut sic dicam, erysipelata phlegmonode, partim phlegmonæ erysipelato des. Ac inuentas non nunquam ubi neutrum uincat, sed ad unguem paria sint. Quinetiā nonnunq; œdemato des esse erysipelas conspicitur, sicut aliud scirrholes: ut compositorum morborum non paruus aceruetur numerus. De quibus copiosius cū alibi differuimus, tum in curandī rationis uoluminibus. Dicitur autem et nūc, quoad saltem eorum meminisse necesse est, quòd exactum erysipelas haud unquam ab ante dicto cataplasmate curari possit. Voco autem exactum, cum à biliosa fluxione pars impleta fuerit. Porro quòd longe à refrigeratione ablit coriandum, uel ex ijs quæ ipse scripsit Dioscorides, discernere liceat. Nam chœradas siue strumas cū erugum, siue lomento, inquit, discutit. Porro q; nullum refrigerantium medicamentorū idoneum sit discutit dis chœradibus, uel ipsū Dioscoridem non dubitaturū arbitror, quippe qui sexcenta scriperit medicamēta chœradas sanare poterit, quæ omnia tum temperie calidatū actionibus digerentia esse confessus est.

Coronopus. Cap. 44

Coronopodis radix cœliacijs prodesse creditur manducata.

Costus. Cap. 45

Costus leuiculam planē amaram, plurimam autem crem & calidam in se qualitatem simul & facultatem continet, adeo ut etiā exulceret, cum ex oleo corpus eorum in quibus per circuitum rigor inuadit, ante accessionem illo confricatur: sic uero etiā in resolutis, & ischiadicis, atq; in summa in quibus excalcacere partem quamuis, aut ex alto in superficiem extrahere quippiam est opus, ad costum cōfugitur. Eadem de causa urinas men sesq; prouocat, & ad rupta, conuulsa, ac laterū dolores cōgruit. Porro ob amaritatem quæ illi inest, lumbricos necat. Ob eandem & ad contractas uelut ex sole maculas, ἐφύλας Græci uocant, cum aqua aut melle usurpant. Inest item flatuosa quædam illius temperie humiditas, per quam & uenere rem excitat cum uino mulso.

Coryledon. Umbilicus Venæris. Cap. 46

Coryledon facultatis mistæ est, nempe humidæ subfrigidæ, & cuiusdam obscure adstringentis, & cum ea leuiter amare. Vnde refrigerat, repercutit, abstergit, & discutit. Itaq; phlegmonas erysipelato des & erysipelata phlegmonode curat: & maxime stomachi ardore aestuantis admodum utile est epiplasma. Putantur folia cum radice manducata calculos confringere, & urinam mouere.

Cornæ. Cornus. Cap. 47

Corni arboris fructus admodum acerbus est, esui aptus. Itaq; mirum uideri nō debet, ipsū ualenter uentrem restringere, sicut & melsila. Folia quoque & germina gustu acerbata sunt, ualenterq; desiccant. Itaque maxima uulnera glutinare

possunt potissimum durorū corporum: at paruis uulneribus & mollioribus corporibus magis contraria sunt. Nam nimium ea contendunt, ac plus fati desiccant.

Crambe. Brasica. Cap. 48

Brasica esculenta desiccandi uim habet tū esca, tum foris imposita, nō tamē etiā admodū acrem. Sed ita ut & ulcera glutinet, & maligna ulcera sanet, præterea phlegmonas iam induratas, ac ægre solubiles, & id genus quoq; erysipelata. Eadem facultate epinyctidas et herpes sanat. Habet quidam etiā in se absterforium, quo lepras curat. Porro semē eius potum lumbricos interficit, maxime brasicæ Aegyptiæ, quanto ea scilicet tēperatura siccior est. Sanē amara qualitatē particeps semē est, sicut uidelicet omnia alia medicamēta quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundū eandē facultatem ephelidas, & lentes, & quæcunq; modicā absterforionem postulant, adiuuat. Porro caules brasicæ combustū cineres efficiunt admodum desiccantes, ut uidelicet iam & causticam siue adurentem uim participant. Hac ratione ei ueterem adipem commiscentes, ad inuteteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis, abhibent. Nam ualenter digerens pharmacum efficitur.

Crambe agria. Brasica agrestis. Cap. 49

Brasica agrestis quodāmodo calidior sicciorq; domestica est, ceu alia propemodum omnia agrestia sui generis domesticis secundum utrāq; hanc facultatem ualentiora sunt. Quamobrem neq; intra corpus citra noxam sumitur, ut quæ longius ab humana recesserit temperatura. Eadem de causa & gustatibus amarior est quā domestica: quamquam domestica quoq; acrimoniæ nō nihil et amaritudinis contineat, sed utraq; habet agrestis ualidam: quare etiā extergit & digerit quam domestica ualentius.

Crambe thalattia. Brasica marina. Cap. 50

Brasica marina supra q; quòd uentrē desiciat, utpote subsalsa & subamara gustu, fuerit sanē etiā ad externos corporis usus, & ad omnia ea ad quæ tales qualitates accommodantur idonea.

Cratægonos. Cap. 51

Cratægoni herbe fructus & acris gustanti est, & utenti frigidus, similis milio.

Crethmon. Cap. 52

Crethmon gustantibus salsum est, cum pauca amaritate: quamobrem uis eius est exsiccatoria & absterforia. Vtraque tamen imbecillior eo est quā in amaris.

Crithe. Hordeum. Cap. 53

Hordeum primi est ordinis in exsiccando & refrigerando: habet etiā pauxillum absterforionis. Paulo etiā plus desiccet quā farina fabacea, cui non insunt cortices: cætera uero similia sunt foris utentibus. In cibo autē hoc fabis præstat, quòd flatuosam naturā exuat: fabis, quantum cunq; coxeris, flatuosa natura remanet, sunt enim crassioris essentia q; hordeum: quamobrem eo plus etiā alunt: porro quoniam utrunq; paulum modo à medio recessit, multo sunt usui. Nam talia medica

menta multis alijs miscetur ceu materiae quaedam: itaq; etiam cera & oleum non paucis medicamentis coniunguntur. Alphonon uero, hoc est polenta, multo plus hordeo desiccatur.

Crimmon. Cap. 54

Crimmon quod crassa essentiae est tum in tritico, tum in zea, ita appellari consuevit. Plus nutrit quam polenta, sed aegrius concoquitur. Porro sortibitio quae ex eo conficitur, poltos nuncupatur, eaq; si ex zea conficiatur, leuiter uentrem soluit, ac potissimum si frigatur.

Crimos. Lilium. Cap. 55

Lilij flos temperaturam mistam obtinet partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua utique habet ut gustu sit amara, partim ex aqua, eaq; temperata. Itaq; etiam quod ex eo conficitur oleum, citra morsum digerendi simulq; emolliendi facultatem obtinet; unde fit ut uteri duritiis sit aptissimum. Porro radix foliaq; per se trita desiccant & abstergunt, & digerunt moderate: proinde quoque ambustis competunt. Si quidem haec quoque moderate desiccantē extergentemq; facultate possulant. Radicem ergo tostam, ac deinde cum rosaceo contritam, ambustis quoad obducatur cicatrix imponunt; quippe cum aliquoq; & aliorum ulcerum omnium bonum sit inducenda cicatrici re medium. Quinetia uteros emollit, mensesq; prouocat. Folia uero praecoquentes, & ipsa ad obducendam usq; cicatricem imponunt, non in ambustionibus duntaxat, sed alijs quoq; uulneribus. Sed & sunt qui aceto ea condientes ad uulnera suo tempore utantur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quam in folijs, quanquam tamen nec in ea ipsa multum insit, sicut praediximus. Nam primordialis abstergentium est medicaminum: itaq; cum aut uiliginos, aut psora, aut lepra, aut achoras, aut aliquid id genus extergere uolumus, commiscemus illi aliquid aliorum medicaminum ualidius extergentium, cuiusmodi est mel. Caeterum si id moderate illi ac conuenienter admisceatur, & ad neruorum diuisiones competit, & ad alia uniuersa quae ualenter exsiccare postulat absq; morfu. Imposuimus uero etiam quoadq; & foliorum succum cum aceto & melle coctum. Quinque partibus succi plus utroq; erat; eratq; insignis medicamen ad omnia ea quae exsiccare postulant absque morfu, ceu uulnera omnia ingentia, & maxime quae in capitibus musculorum eueniunt: tum ea quae nimis mollia sunt, & diuturna, atq; aegre ad cicatricem perducuntur. Sed haec iam ad medicamentorum componendorum institutum attinent, a quo quantum licet abstinere in praesentiarum adnoto, caeterum rerum ipsarum natura saepe numero ut attingam adigit; celeriter uero relinquenda sunt, atq; ad propositum reuertendum.

Crocodilium. Cap. 56

Crocodilij semē acre est atq; odoratum urinam mensesq; ciens. Itaq; facultatem habuerit calidam digerentē & exsiccantē. Succus tū caulis, tū feminis, ut quae similis sunt facultatis, nephriticis adiuuant. Radix pectoris excreationibus ualēter cōdu-

cit, minus quidē q̄ semē acris, non tamen minus amara. Trahit uero etiam per nares sanguinem.

Crocus. Cap. 57

Crocus paulum etiam adstringēs quid obtinet, quod terreum frigidumq; ostendimus; sed superat in eo calfaciens & qualitas, & facultas, ut tota eius essentia secundū sit ordinis excofalcationum, & primū exsiccatum; proinde quocūq; uim quandam obtinet, adiuuante scilicet in hoc & paucula illa adstrictione. Quippe quibus medicamentis, cum non admodum excofalciant, paucula ad est adstrictio, ea parem facultatem habent essentis emplasticis uocatis, quas cum iunctas esse ealiditati non uehementi contigerit, pepticas, hoc est concoquentes esse offendimus.

Crommyon. Capa. Cap. 58

Capa ex quarto est ordine excofalcantiū; essentia eius potius crassior est partū; unde etiā hemorhoïdas aperit tum apposita, tum cum aceto inuncta. In sole alphas abstergit, tū alopecijs attrita pilos alcyonio citius restituit. Porro si succum eius exprimas, quod reliquū est admodum terre substantia est, eiusq; calida: at succus aquae aereaq; caliditatis. Hic igitur ijs qui suffulsi sunt, aut aciem oculorum obtusam praeratsitudine humorū obtinent, inunctus prodest; ex huius temperatura tota capa flatuosa est manducata. Itaq; quae temperatura sunt sicciore, minus flatuum generant.

Cyamos. Faba. Cap. 59

Faba in utroq; mediū temperamēti proxime est in excofalcatione & refrigerata. Caro eius paulum quoq; abstergentis facultatis cōtinet, sicut putamē non nihil adstringentis: idcirco medicorū nonnulli totam fabam cum oxycrato decoctam dysentericis, coeliacis, uomentibus, quos *εμελικός* nomināt, exhibuerunt. Porro ut edulium, flatulenta est, ac coctū difficilis, si quid aliud: ex creatōibus ex pectore & pulmone idonea. Ut medicamentū uero foris imposita, desiccatur innoxia. In podagricis ea saepenumero uisum est aqua decocta, & ita ad ipsi suillo admista. Ad neruorū tum contusiones, tum uulnerationes, farinam eius cum oxymelite imposuimus. Ad eos quos ex ictu iam phlegmone occupauerat, cum polenta. Sed & testium & uerū aptum est cataplasma. Nam haec partes cum phlegmone tenentur, moderate refrigerari amāt, maxime cum ubera ex lacte in ipsis concreto phlegmone patientur. Quin lac quoq; ab eo cataplasma extinguitur, sicut puerorū pubes farina fabacea illita plurimo tempore glabra permanet.

Cyclaminos. Rapum, siue tuber terra. Cap. 60

Cyclaminus uarias uires possidet. Nam & adstringit, & incidit, & ora uenarum aperit, & attrahit, & digerit: clarum id est ex particularibus operibus. Nam succus eius hamorrhoidas referat, uio lenterq; ad secessum prouocat in crocidē siue floccis appositus. Sic etiam facultatibus phymata, strumas, aliasq; durities digerentibus commiscetur, ad suffulsi cum melle illitus competit; ad haec quoq; per nares expurgat. Adeo uehemens eius facultas est, ut abdomine illito uentrē subducatur, & fo-

tum interimat. Nam & alioqui validū interimēdo cōceptui medicamē est, in pello additus. Tota autem radix succo imbecillior est, quamq; & ipsa uehemens sit. Nam & menses siue epota, siue apposita euocat, & aurigini prodest, nō modo ipsum uiscus expurgans, sed etiā quæ in toto corpore bilis fuerit, eam per sudorē eiiciens. Proinde sanē post portionē, sudoris adiutuāda prouocatio est. Modus eius bibendū est drachmarū trium, siue cum mellecrato, siue cum passo. Cutem detergit cum in alijs, tum quōd alopecias, ephelidas, omniaq; exanthemata siue efflorescentias curret. Lienem quoq; induratum iuuat emplastrū modo illita tū recēs, tum arida. Sunt qui radicē siccam asthmaticis seu anhelantibus exhibeant. Porro altera cyclaminus, quā quiddam cyslanthemom nominat, propterea quōd cyso, hoc est hederæ flore sit asmilis, radicem quidem superuacaneā habet, sed fructum admodum efficacem: nam hic cum uino pluribus diebus potus lienes sanat, urinas mouens ac uentrem subducens: locos quoque eiicit, & asthmaticis prodest. Qualitas eius gustanti acris est, & sublentia.

Cymium. Cuminum. Cap. 61

Cymini semine maxime utimur, quemadmodum anisi, ligustici, cari, petroselinū. Est uero & facultatis exalfaciētis, sicut illorum unumquodq; tum urinum mouentis & flatum extinguentis; ex tertio ordine exalfaciētium.

Cynobatus. Sentis canis. Cap. 62

Huius fructus fructus nō segniter adstrictorius est, folia uero mediocriter. Itaq; particularis eius usus haud ignotus est. Cauendū ab eo quod in fructu eius lanæ specē habet, ceu arteriā uitians.

Cypressifolia. Cypressifolia. Cap. 63

Cupressifolia, germina, pilulæ recentes & molles, magna ulcera cōglutināt in duris corporibus: ex quo clarū est qd relucēdū uim habeat absq; insigni acrimonia, aut caliditate, sicut certe & gustus testificat. Apparet enim in ea leuis quidē acrimonia, sed plurima amaritudo, multoq; etiam plus acerbitalis in tota planta. Tanta ei inest acrimonia caliditasq; quāta satis sit deducēda in altū acerbitali, ac nullam tamē mordacitatem aut caliditatem in corporib; efficiat. Proinde in alto latētes in flacidis putrescentibusq; affectibus humiditates innoxie tutoq; depascit, atq; absorbit, cum quæ exalfaciunt simul desiccantq; eas quidem quæ cōtēte sunt absorbit, cæterū acrimonia & caliditate alias attrahant. Sic enterocœlicos iuuat: siquidem exsiccat, roburq; addit corporis partibus præ humiditate laxis; utpote cū adstrictio in altū subeat, deducēte ipsa caliditate quæ admista est, eum seruante modū, ut deducere quidē ualeat, nō tamen mordicare queat. Quidā ea utunt ad carbunculos, & herpētes polentæ miscentes, tanq; absorbat citra exalfacionē eos morbos facientē humiditatem. Sunt qui ad erysipelata utantur, admista nimirum polenta cum aqua ut oxycrato aquoso.

Cyperus. Iuncus quadratus. Cap. 64

Cyperī radices maxime usui sunt, exalfaciētes pariter & exsiccatēs absq; mordacitate. Itaq; ulce-

ribus que præ nimia humiditate cicatricē difficulter admittūt, misce profunt; habēt enim quiddā etiam adstringēs: quapropter ulceri item oris conueniūt. Quin & incidendi uim quampriā illis inesse testificandū, quia & calculo uexatis congruūt, & urinam mensesq; prouocant.

Cypros. Cap. 65

Cyprus, huius arboris folia summaq; germina in usum ueniunt, & facultatis, & qualitatis mista: habent enim quiddam digerens cum aquea substantia modice calida, habentq; etiā adstrictoriū quiddam ex terrena substantia frigida. Itaq; eorū decocto quidam ambusta fouent. Utuntur uero etiam aduersus igneas phlegmonas & carbūculos. Nam absq; molestia & moriū desiccant. Quinetiā sponte prouentūribus in ore ulceribus aphthodesi, & ipsi puerorū aphthis cōmansa accōmoda sunt.

Cytisus. Cap. 66

Cytisi folia digerendi facultatē obtinent aquea & temperatā mistam, sicut & malua.

Conoson. Cicuta. Cap. 67

Cicuta quod extreme refrigerantis sit facultatis, omnes norunt.

Conos. Cap. 68

Coni fructus, quem quidam cocalon nuncupant, & strobilon, uiridis totus, habet cum humiditate amaritudinem quampriam & acrimoniam; proinde purulentis, & quibuscumque adeo que in thorace & pulmone sunt, facile extussire & expuere expedit, accommodos est. Porro fructus ex eo esculentus, nutrimentum est coctū difficile, & ualidum. At ut medicamen asperitū leniendā congruit, cum uidelicet in aqua maceratus omnem in ea acrimoniam reliquerit. Nam reliquum omne minus mordax, magisq; emplasticum redditur: in medio calidā & frigidā qualitatis consistens, ex aquea & terrea mitum substantia, minimum participans aere.

Lagopus. Cap. 69

Lagopus facultatis est desiccantis, adeo ut fluxus alui probe exsiccat.

Lathyrus. Cap. 70

Lathyrus sunt qui dicant & hanc esse tithymalī speciem, tum quōd similiter illis succum habeat, tum quōd eodem modo purget, totaq; illis facultate asmilis sit, nisi quōd semen gustantibus uideatur dulce: quod sanē etiam maxime purgatoriam uim possidet.

Lampfane. Cap. 71

Lampfane esa quidem succos prauos procreat, cæterum illita abstergendi nōnullam digerendiq; facultatem possidet.

Lapathum. Cap. 72

Lapathum moderate digerentem sortitum facultatem est, at oxylapathū mistam: nam cum eo quōd digerit, non nihil quoq; repercutit. Semē eorum manifestā quoq; quādam adstrictionem obtinet, ut & dysenterias, & diarrhœas siue profluvia sanet, & maxime oxylapathi. Porro hippopathum, quod in totū in paludibus prouenit, eadem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

Lemonium. Cap. 73

Lemonij fructū, ut pote acerbum, exhibent cœliacis, & dysentericis, hæmoptoicisq; siue sanguinem spuētibus: iuuat & profluuium muliebre. Satis est oxybaphi mensura.

Lichen. Cap. 74

Lichen qui in petris nascitur, est uelut muscus quidem, sed recte ex plantarum censi genere potest. Porro ita nominatus uidetur, quod lichenas curet: extergentē habet ac modice refrigerantem facultatem, utraq; uero rescantem. Atq; abstergentē quidem atq; exsiccantē à petra obtinet, refrigerantē uero ab humore aqueo: nascitur enim in humidis & grauiter olētibus saxis. Porro quod ex talibus cōponitur, aduerfum esse phlegmonæ (quod aphlegmanton uocant) nihil mirū est. Cæterum an hæmorrhagias sistat, ut refert Dioscorides, id uero neutiquam dicere queam.

Leontopetalon. Cap. 75

Leontopetali radice maxime utimur: digerendi facultatem & exsiccandi excalfaciendiq; in tertio ordine possidet.

Lepidium. Cap. 76

Lepidium ex quarto est ordine excalfaciendū, simile nasturtio tum odore, tum gustu, tum uiribus: sed minus eo desiccatur.

Leucas. Cap. 77

Leucas acrem possidet qualitatem exuperantem, temperaturam uero calidam siccamq; in tertio quodammodo ordine.

Leucacanthon. Cap. 78

Leucacanthon, quidam autem polygonaton, alij ischiada nuncupant, huius amara radix est, ac proinde incidit, & exsiccatur in tertio ordine: in calfaciendo autem ex primo est ordine.

Leucoion. Cap. 79

Leucoij frutex uniuersus extergentem facultatem possidet, ac tenuium partium, plus tamen flores, & inter hos qui sint sicciore magis etiam q̄ ut rides, adeo ut & oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum mensis quoq; decoctum eorum mouet, & locos, partumq; emortuum elicit, ac si bibatur, abortum facit. Est ergo id medicamentum, ut si quod aliud, amarū. Ac si quis uirium eius uehementiam multa aqua admista retundat ac mitiget, aut certe id genus aliquo, habebit & ad phlegmonem non malum medicamen. Sic decoctum eius si non merum fuerit, uteri phlegmonas identidem persufum sanat, potissimum quæ diutino tempore ad scirrhii modum induruerit. Sic cum cerato ulcera ægre ad cicatricem peruenientia curat. Sunt uero etiam qui cum melle & ad apthas adhibeant. Semen cum eiusdem sit facultatis, aptissimum est duarum drachmarum mensura porum, tum mensibus ciendis impositum conuenire creditur, partumq; uiuentem interficere, ac mortuum eijcere. Radices similis quoque facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, & magis terrena, cum acco lienes induratos sanant. Nonnulli uero & phlegmonas induratas ijs curant.

Leuce. Populus alba. Cap. 80

Leuce arbor mistæ quodammodo temperatura

A est, ex aqua tepida & terrena extenuata essentia, quæ obrem & abstergentis facultatis est particeps.

Libanotus. Thus. Cap. 81

Thus excalfacit ordine secundo, desiccatur primò, habet quoq; adstrictionē pusillā. Sed minimū manifesta adstrictio ex cãdido: cortex eius euidenter adstringit: proinde sanè strenue quoq; desiccatur, adeo ut ex secundo sit ordine cōpleto desiccantū. Est autem crassiorū partium q̄ ipsum thus, & minimum habet acrimonia. Ob has ergo tum facultates, tum qualitates multas est eius usus apud medicos in hæmoptoicis, stomachicis, cœliacis, ac dysentericis, non tantū ijs quæ extrinsecus applicantur, ipsum admiscentes, sed & ijs quæ intrò in corpus sumuntur. Fuligo eius tum sicciore, tum calidioris est facultatis q̄ ipsum thus, adeo ut ad tertium usq; excessum perueniat. Habet uero etiam absterforium quiddam. Itaq; eo nomine & expurgare & implere quæ in oculis consistunt ulcera uidentur, uelut & myrrhæ, & styracis fuligo.

Libanotides. Cap. 82

Libanotides tres sunt, una sterilis, duæ fructum ferentes: omnes uero eiusdem facultatis, emollientis & digerētis. Succus tum radicis, tum herbæ mistus melli obtusam oculorum aciem ab humorum crassitudine emendat. Porro eius libanotides quæ ad coronas est utilis, quam Romani rosmarinum nuncupant, decoctum regio morbo laborantes potum adiuuat. Omnes enim libanotides abstergentis & incidentis facultatis participes sunt.

Lignis. Fuligo. Cap. 83

C Fuligo omnis excicatoria est, ac proinde terrefris est essentia, habens quasdam etiam ignis qui materiam combulsit, reliquias: sed id pusillum est. Porro tota natura terrena est, tenuiū partium. Sed quæ speciatim in ea differētia sunt, ea pro ista materia eueniunt: ex acriore & calidiorē, tali etiā proueniente fuligine, ex dulciore simili quoq; hinc fuligine proueniente. Primum enim thuris fuliginē utuntur in ocularias medicinas mista, eas uide licet quæ ad oculos etiam nū phlegmone tentatos accommodantur: atq; etiam nū fluxione uexatur, & ulcera habent: nam & illa expurgat, & carne implet. Ad hæc usurant quoq; eã ad facultates quas ad palpebras exornãdis uocant calliblepharas. Præterea terebinthinæ myrrhæq; fuligo molestia caret, non aliter q; thuris: sed styracis quodammodo uolentior est: magis etiam picis liquidæ, qua etiam magis cedriæ. Porro acrioris picis utuntur ad uitia superciliorū uocata ptila, & erosos oculorū angulos humidosq; citra phlegmonē. At mollioribus mitioribusq; tum ad hæc, tum ad ea quæ cōpetere paulo superius diximus thuris fuliginem.

Libysticum. Cap. 84

Libystici radix & semen ex genere excalfacientium sunt, adeo ut & menses cieant, & urinas prouoent, flatusq; extinguant.

Linospermum. Lini semen. Cap. 85

D Lini semē esum flatuosum est, etiã si frigat: adeo sanè recrementitia humiditate plenus est. Est uero etiam in primo ordine quodammodo calidū, ac humi

ditatis & siccitatis quodammodo in medio est sitū.

Lincolostis, Mercurialis, Cap. 86

Lincolostide utuntur omnes ad uentris purgationes duntaxat. Verū enim uero si quis eius facere periculum uolet in cataplasmate, sanè admodū eam esse digerentis experientur facultatis.

Lonchitis, Cap. 87

Lonchitidis, eius uidelicet quę semē habet triangulare, cuspidis figura, radix potissimum quodammodo similis est radici dauci: proinde urinam ciet. Porro eius quę scolopēdriā similia habet folia, ea ad glutinanda uulnera idonea sunt uiridia, sed sicca cum aceto lienes induratos sanant.

Lycion, Cap. 88

Lycion, siue *pyxacathon*, arbor spinosa, ex qua lycium quod uocant conficitur, id uidelicet medicamentum liquidum quo ad sugillata utuntur, & sedis onisq; phlegmonas, ulcérationesq; tum herpetas, putredines, & ulcera contumacia, & aures pure fluentes, & intertrigines, ac paronychias. Est autē facultatis excicatoriæ, cōpositū ex diuersi generis substātijs, quas *ερεπογυας* Græci uocāt, altera quidē tenuiū partiū digerente atq; calida, altera terrestriet frigida, ex qua adstrictionē obtinet. Porro hæc qualitas pusilla medicamēto inest, digerit uero et desiccet nō parū, nempe in secūdo ordine: in calore autem medijs & symmetris proximū est: proinde ad diuersos affectus hoc utuntur medicamina, ut abstergente quidē assumentes ad ea quę pupillis tenebras offundūt. Vt adstrictorio uero, cœliacis, dysentericis, ac muliebri profluuiō adhibētes. *Lyciū* hoc in *Lycia* & *Cappadocia* plurimū provenit. Sed in diēū ad omnia ualentius est.

Lysimachios, Cap. 89

Lysimachios superantē habet qualitatē adstrictoriā, per quam & ulcera glutinat, erūpentemq; ex naribus sanguinem si obturetur reprimit: quin & reliquas sanguinis erupitiōes sistere potest tum ipsa, tum succus eius multo magis. Pota & per clysterem immissa dysenterias, sanguinis reiectiōes, ac muliebri profluuiū sanat.

Lychnis, Cap. 90

Lychnidos coronariæ semen calidum est secundū quodammodo ordine, aut iam etiā tertio: siccum sanè eodem modo.

Lotos, Cap. 91

Lotus domestica, quā quidā triphyllon, hoc est trifoliā nominant, ut mediocriter extergendi uim possidet, sic etiā exciccandi: in caliditate frigidi tatisq; cōiugatione mediā quodammodo est, et temperata. *Lotus* autē agrestis plurima in *Libya* provenit: semen eius secundū est ordinis excalficientium, habetq; nonnihil absterforiū. Porro *Aegyptiæ* loti semen etiam in panes fitiguntur.

Lotus arbor, Cap. 92

Lotus arbor non ita multā adstrictoriæ qualitatē est particeps, sed & tenuium partium est, & excicatoria. Itaq; lignorum assulā derasæ muliebri accommodantur profluuiō, & dysenterijs, & cœliacis affectibus. Decoquantur uero interim in aqua, interim in uino, nimirum prout usus popo-

Ascerit, nec infunduntur tantum, sed & bibuntur. Quinetiā quod pilos desuentes cohibeat, nō mediocriter signum est ipsū adstringentis esse cuiusdam, similiter mediocriter desiccantis facultatis. Dicitur quippe est in sermone de ladano eiusmodi esse facultatis oportere, quod fluentes capillos esset cohibitorum.

Macer, Cap. 93

Macer, cortex est, qui ex *India* conuehitur, gustu multum acerbum, cum leuicula quadam acrimonia odorata, iucundum sanè redolens, ut plerāq; aromata siue odorata quæ ex *India* conuehuntur. Videtur itaque & ipse ex mista constare essentia, plerāq; terrena frigida, pauca uero calida, & tenuium partium. Quamobrem ualenter desiccet, adstringitq;: proinde cœliacis & dysentericis misceatur facultatibus, in tertio exciccantium consistens ordine, in caloris frigorisq; differentia neutrum insigniter efficiens.

Malabathrum, Cap. 94

Malabathri folium cum spica nardi simillimam facultatem obtinet.

Malache, Malua, Cap. 95

Malua, agrestis quidem, digerētis paululum & emollientis leuiter est facultatis: hortēsis uero quāto plus habet aqueæ humiditatis, tanto facultate imbecillior est. Semen ipsarum tanto ualidius est, quāto & siccius. Porro huius generis est & ea quæ anadendromalache nuncupat, sed efficacior prædictis in digerendo. Appellatur etiā *Althea*.

Mandragora, Cap. 96

Mandragora uincemtam habet facultatem refrigeratoriā, adeo ut tertij sit ordinis refrigerantiū. Veruntamē nonnihil etiā caloris inest & in pomis humiditatis: proinde soporem ea conciliandi uim habēt. Radicis cortex cum sit ualentissimus, non tantum refrigerat, sed & desiccet: reliquum quod intus est imbecillum est.

Marathrum, Fœniculum, Cap. 97

Fœniculum tam ualenter excalfacit, ut ex tertio ordine excalficientium censi promeretur: desiccet uero non aque, sed ipsum quispam in hoc primi esse ordinis posuerit: proinde lac procreat: quod, si admodum desiccaret, non sanè efficeret. Insuffus etiā dem rationē auxiliatur, urinas mensescit. Porro est & alterum fœniculum, quod præ magnitudine hippomarathrum nuncupant, cuius radix ac semen amplius quàm domestici, de siccandi uim obtinet: quo circa uentrem quoq; eo nomine sistere uidetur. Nec sanè manifesta illis inesse uidetur adstrictio. Huius non radix modo, sed & semen *Chachry* assimile est, potestq; & calculos frangere, & auriginosos sanare, mensesq; & urinas mouere: non tamē lac congerere, sicut illud superius. Aliud est hippomarathrum, cuius semen rotundum est & acre, simile femini coriandri, facultate quidem hippomarathro simile, sed debilius.

Mastiche, Cap. 98

Mastiche cādida quidem, & *Chia* cōsuetō more cognominata, quodammodo ex cōtrarijs composita facultatibus est, adstringente uidelicet & emol-

emolliente. Proinde stomachi, uentris, intestinorū, ictericis inflammationibus cōpetit, utpote secundo ordine excalfactis & deficcans. Nigra uero, quæ Aegyptia cognominatur, tū magis deficcatur, tum minus adstringit: quā obrem aprior est ad ea quæ ualidiore digestionē per halitum exposcunt: hac ratione furunculis bonum est remediū. Porro oleum unguentūq; mastichinū ex Chia conficitur, nō admodū sanē ex Aegyptia. Cæterum similis est & ipsum mastichæ facultatis.

Melanthium. Nigella. Cap. 99

Melanthium excalfacit atq; deficcatur tertio ordine. Videtur etiam tenuium esse partū: hoc enim nomine catarrhos sanat in linteo admotum, atq; assiduo olfactum. Quinetiam si intro in corpus sumatur, uel maxime flatus extinguit. Vnde cōstat essentia ipsam esse subtilis, & ad unguem a caliditate elaborata. Propterea sanē etiam amarum est. Ostensum uero in quarto horum uoluminū est, quod cum ad extremam tenuitatem atq; elaborationem terrena pertingit substantia, amara proueniat qualitas. Itaq; mirum non est si lumbricōs interimat non esum modō, sed etiam foris impositum. Siquidem & id prestare posse saporem amarum monstratum est. Nec sane etiam mirandum si lepras, clausos, myrmecias enīciat, ei præsertim qui in superioribus libris cōpnenhorum haud est imemor. Sic uero etiā orthopnœam iurat, & menses prouocat, qui utiq; ob crassitiem aut uiscositatem retenti fuerint. In summa uero, ubi sectione, extinctione, deficcatione, excalfactione est opus, præstantissimum id remediū est.

Melilotum. Cap. 100

Melilotū mistæ facultatis est; habet em̄ quiddā adstringens: sed & digerit & cōcoquit: copiosior enim in eo est substantia calida quam frigida.

Mel. Cap. 101

Mel deficcatur & excalfacit ordine secundo. Est aut simplicis, quoad fieri potest, tū facultatis, tum temperamentī, extergescētis, ut nobis appellare mos est, medicamentorū speciei existens. Porro coctū minus acre absterforūq; redditur: itaq; ad sinusorū ulcerū glutinationes eo urunt. Cæterū si quod mel amarum est, ceu Sardoum, clarum est & ipsum mistæ esse facultatis, tanq; si nostrū quispiam ei ablinthium admiscisset. Sed & Sacchar, ut uocant, quod ex India atq; felici Arabia conuenitur, in calamis, ut aiunt, cōcrescit, & ipsum mellis est species, minus certe nostrate dulcius, sed ad similes ei uires obtinens, quod ad abstergendum deficcandū, & digerendū attingit. Porro quatenus nec inimicum stomacho est ceu nostras nec sitim afferens, eatenus ab illo substantia differt.

Melissophyllum. Citrigo. Cap. 102

Melissophyllum marrubio simile est facultate, sed plurimum ab eo uincitur: quam obrem nec utitur eo quispiam. Superuacaneum siquidem foret præsentem marrubio, cuius tantus est ubiq; terrarum prouentus, uelle uti melissophyllo: cæterum si cui forte ad manū quandoq; marrubium non

A fuerit, illo uti liceat, modo non exciderit quantū ab hoc exuperetur.

Mespilum. Cap. 103

Mespilū, aliq; tricoccū nomināt, quod tria intus in uniuersum gerat grana, quorum unūquodq; arboris est semē, ceu ea quæ in malis inueniunt, ipsius mali; & nuclei, iplius uitis; & ficus, minuta illa grana quas cōchramidas Græci uocāt. Arboris huius fructus admodū acerbus est, uixq; edi possit, uentri strenue coercēs. Quin & in germinibus & folijs a cerba hæc qualitas non pauca reperitur.

Medion. Trifolium odoratum. Cap. 104

Medij radicē contra atq; semen ipsum temperata esse contigit: nam illa quidē austera est, & fluxiones cohæbet cum aliis, tum uero etiam profluuiū muliebre quod uocant. At semen tantū abest ut tale quid efficiat, ut etiam menses cieat, nimirū tenuium partium, & incidendi facultatis.

Mecon. Papauer. 105

Papauer alterum rheoas nūcupatum est, quod scilicet celeriter flos eius desluit. Alterum domesticum, quandoquidem colitur. Quin & alteræ duæ sunt species syluestris papaueris: alterum uelut incidendum calicem sustinet, alterum longiorē q; illud calicem obinens, totum autem procerius ac squalidius. Ab hoc succus desluit, atque hinc est quod hanc speciem quidam rheoada nominent. Porro omnium facultas refrigeratoria est. Cæterum satiuū semen, quod & thylacite cognominant, medio crateri somnum conciliat, uisu candidum: proinde panī ipsū inspergunt, ac melle maceratū edunt. At eius quod primo loco recensuimus, cuius florē celeriter decidere posuimus, ualidius semen refrigerat: itaq; nequāquā eo quis innoxie solo uti possit, sicut satiuo siue domestico, sed melli admiscens. Admodū uero si ita sumptum sit, somnum conciliat. Cæterū pusillum eius inspergunt ijs quæ ex melle cōficiuntur bellarijs, atq; placentis, panibusq;. Porro tertio loco dictū semen atrum etiam medicamentosum est, admodum refrigerans. At quod quarto loco positum est, omnium est medicatissimum tum in semine, tum in caliculis, tum in folijs, tum in succo. Valide enim refrigerat, ad stuporem usq; & mortem perducens. Sed medici, quod probe eo utantur, medicamentis miscentes, frigiditatis uehementiam retundunt. Est enim ex quarto & ultimo refrigeratiū ordine. Porro quo pacto maxime ex metho mistionem facere oporteat, non est præsentis tractationis propriū, sed eius que de componendis medicamentis agit, quæ post hoc opus a nobis exponetur.

Mecon ceratilis. Papauer cornutum. Cap. 106

Papauer cornutū nominatū quidem sic est a semine leuem inuersionē habente, uelut & fornum græcū: ut bouis cornu esse uideatur simile. Vocatur porro a quibusdā paraliū, quandoquidem ut plurimū iuxta mare nascit: Vm̄ habet incidendi, & abstergendi. Itaq; radix herbæ in aqua decocta ad dimidiū, hepaticos affectus adiuuat. Porro folia & flores sordida admodū & contumacia ul-

cera iuuant: sed ea reijcere oportet ulceribus iam expurgatis. Adeo enim abstergere ualent, ut & puræ quoque carnis nonnihili eliquent. Hoc uirium robore nõ sordem duntaxat, sed & crustam ulceribus detrahit.

Mecon Heracleia. Papauer Herculeum. Cap. 107

Papauer herculeũ, uocat uero & aphrodes, hoc est spumofum: eo quod totũ eãdidũ est & spumofum, exile. Semen habet pituita expurgans.

Melea. Malus. Cap. 108

Malus nõ omnis eiusdem naturæ est, uelut nec eiusdem fructus. Quippe quedã mala dulcia sunt, quedãma austera, nõnulla acida, alia extremè exoluta & aquea; & sanè in istis aqueum exuperat: ut temperieseorũ sit tum humidior, tum frigidior: in acerbis autem terrenum frigidum. In austeris uero tum istud, tum aqueũ frigidũ, sicut in dulcibus aqueũ temperatũ. Sic quoq; succi cortices, foliaq; arborũ inter sese dissident. Itaq; si austeriora sunt atq; acidiora, uulnera illis glutinare possis, tum in phlegmonarum principio in fluxionem repercutere, ac stomachum uentremq; exolutũ, ac languidum roborare: at aquosioribus mediocres phlegmonas incipiẽtes & gliscẽtes remittere. Sed hæc iam ad curãdi rationem attinẽt: proinde ea citius etiam relinquẽda. Porro quod plurima pomis omnibus reciẽtitiã frigidãq; insit humiditas: uel hinc liqueat, quod eorum omnium nullus omnino succus durare, ac uetustatem ferre possit, uerũ acescant corrumpanturq; uniuersi. Solus enim cydoniorum & struthiorũ (utpote quę propter uincẽntem adstriccionẽ minus cæteris sunt humida) succus coctus cum melle durare potest, tamenĩ ipsẽ per se non ita durare queat.

Melea persice. Malus persica. Cap. 109

Melea persice, hæc uulgo nunc ab omnibus uocatur Perlice tãtum, illo uidelicet omisso Melea. Ipsa igitur arbor in germinibus & folijs uincẽntẽ habet amarã qualitatem: proinde folia eius trita & super umbilicum imposita lumbricos necant. Alio qui sanè etiam digerens medicamen est, Fructus eius, nempe esculentum hoc persicum, humidior est & frigidior temperie.

Melea armenice. Malus armenica. Cap. 110

Melea armenice, huius uetus nomẽ defecit. Vocant enim omnes tum fructũ tum arborẽ præcoction. Fructus humidior frigidiorq; est, utrunq; secundo quodãmodo excessũ maximè maturus.

Melea medicæ. Malus medica. Cap. 111

Melea medicæ, huius fructus non amplius malum medicum, sed ab omnibus citrium, nuncupari adfollet: in semine quidem uincẽntem habens qualitatem acidam & siccam, ut ipsum tertij sit ordinis reficcantium refrigerantiumq;: in cortice uero itidem deficcantem temperiem est fortis, nõ parum tamen habentem acrimoniam: proinde deficcatur hic secundo excessũ, non tamè frigidus est, sed aut tẽperatus, aut paulo infra. Porro caro eius pariter crassi succi est, & pituitosa frigidãq;. Nam & ipsa editur sicut & cortex, semẽ omne edi inaptum est, tum humidũ illud & acidũ, de quo pri-

mu differui, & nucleus qui in illo inuenit, id quod reuera semen est. Hic amarus est, & digerẽdi uide licet siccaãdiq; facultatem obtinens, secundo quodãmodo ordine a tẽperatis recedens. Folia uero deniq; exsiccandi ac digerendi uim obtinent.

Meum. Cap. 112

Meum, huius radices perutils sunt, calidæ tertio ordine, sicca secundo; proinde urinam mensesq; ciere uolentes hoc utuntur pharmaco. Sed si plusculum fumatur, capiti dolorem mouet, utpote cum plusculum sit calidum quam siccum: quippe cum humiditatem crudiufculam etiamnũ & flatusosam caliditatem ad caput deferat, atq; ita ipsum afficiat lædatq;.

Milax trachea, hoc est aspera. Smilax Dioscori. Cap. 113

Milax trachea clauiculis farmetolis plena est. Variè nanque arboribus circumuoluitur sursum deorsum. Folia leuiter acria gustantibus sunt, & alioqui utentibus calida.

Milax leua, hoc est leuis. Cap. 114

Milax leua quodãmodo iam dictæ similes uires obtinet.

Morea. Morus. Cap. 115

Mori fructus maturus quidem uentrem subducit, immaturus uero ubi aruerit, admodum restringit. Itaq; ad dysenterias accommodus est, & affectiones coeliacas, & quasunq; alias fluentes; con tunditur autem, ac obsonijs commiscetur, uelut rhoi fructus; aut sicuti ita uideatur, ex aqua aut uino bibat. Porro quod maturorum succus ad stomachicam medicamenta sit utilis, propter eam uidelicet quæ inest illi adstriccionem, neminẽ latet. Præterea ad alia complura particularia, quæ medicorum poscunt adstriccionem competit. At matura mora præter acerbicatem & aciditatem sortita sunt: & tota adeo arbitror in omnibus suis partibus mistam aliquam uim obtinere uidetur ex restringente & purgante compositam. Attamen in radicis cortice purgatoria cum quadam amaritudine exuperat, adeo ut & latum lumbricum interficiat. In alijs autem partibus restringens uincit: in folijs tamen & germinibus quodãmodo media utrisque temperies est.

Myagros. Cap. 116

Myagri semen pingue est: nam situndat, oleosum quid effundit, quod emplastica uim obtinet.

Myces. Fungus. Cap. 117

Fungus frigida humidãq; admodũ planta est: quamobrem etiam proxime ad deleteriã & enecantem facultatem accedit: & sanè inter eos sunt qui interficiant, potissimum qui ex natura mistam habent qualitatem putredinosam.

Myle. Moly Dioscoridi. Cap. 118

Myles radix paruo bulbo similis est, facultatis cõtrahẽtis: nam cũ unguento irino apertam uulnam sanare scribit Dioscorides.

Myosotis. Auricula muris. Cap. 119

Myosotis, quidam uero myosota: deficcatur secundo ordine; cæterum nullam euidentem caliditatem possidet.

Myrice. Tamarix. Cap. 120

Myrice abstergentis est accidentis facultatis, absq; perspicua desiccatione: habet uero etiam ad strictionem nonnullam. Has ob qualitates facultatesq; admodum prodest leni indurato decocta cum aceto, aut uino, siue radice, siue folijs, siue extremis ramulis. Sanat porro dentium dolores. Cæterum fructus & cortex non paucam fortita sunt adstrictionem, adeo ut gallæ omphacitidi proxima sint, nisi quod acerbitas euidēs est in galla, sed myricæ fructui temperatura inest inæqualis: immista est em natura eius multa partium tenuitas, atq; abs tergendū quod sanè gallæ non accidit. Attamen ubi galla forte ad manum non erit, eo uti liceat ad omnia ad quæ illa utimur: in eisdem & cortice. Porro myricæ combustæ cinis admodum desiccatoriæ facultatis est, plurimam habens abstergentis & incidendi facultatem, pauxillam adstringendi.

Myriophyllon. Cap. 121

Myriophyllon usq; eo desiccatoriæ facultatis est, ut uulnera glutinet.

Myrrhis. Cap. 122

Myrrhis, quidam myrrham nominat: radicē habet odoris iucundi, & dulcem, quæq; menses moueat, tum ea quæ thoracē ac pulmonē degrauiant, purgantem: itaq; ex secundo ordine fuerit excal-

A facientium, adiuncta quadam partium tenuitate.

Myrrhine. Myrtus. Cap. 123

Myrtus, ex contrarijs substantijs hæc planta constituitur: tamen in ea frigidum terrenum. Habet uero etiam tenue quiddam calidum. Itaq; ualēter desiccatur. Porro tum folia, tum germina, tum fructus, tum succus, non parum inter se in adstrictione dissident. Porro quod ramis & trunco adnascitur tuberosum, quā quidam myrthada nuncupant, quanto dictis siccius est, tãto et desiccatur et adstringit uēhementius. Quidam id tondentes reponunt, post ea uino subigentes in pastillos formant. Folia item arida uiridibus plus desiccant: miscet enim uirentibus humiditas quædam. Porro succus non tantum ex uirentibus folijs exprimitur, sed & fructu. Restringtondi uim hæc omnia habent tum foris imposita, tum intro sumpta in corpus: quod si licet non dum ullam deleteriam aut purgatoriam substantiam habeant admistam.

Moly. Cap. 124

Moly, hoc quidam uocant Peganon agrion, hoc est rutam syluestrem, Nonnulli Harmolan, Syri Befalan, sicut Cappadoces Moly, quia radicem habeat nigram, & florem lacteum. uis eius tenuium partium est, & calida tertio ordine: unde & crassos humores dissecat, ac digerit, & uirnam mouet.

ARGUMENTA CAPITVM LIBRI OCTAUI.

Proœmium, in quo iterum admonet ne quis hæc leget, præcedentibus libris non lectis. Cap. 1. Nardus spica. 2. Nardus Celtica. 3. Nardus montana.

4. Nardus, id est ferula. 5. Napy, i. sinapi. 6. Nardus. 7. Neuras, quæ & poterium. 8. Nerion uel rhododaphne. 9. Nymphaea. 10. Xanthium. 11. Xyris. 12. Xiphium, id est gladiolus. 13. Oe, id est forbus. 14. Oenosis, id est uinum. 15. Olynchi, id est grosi. 16. Olostion. 17. Olyra. 18. Onagrum. 19. Onofma. 20. Onobrychis. 21. Ononis. 22. Oxos, id est acetum. 23. Oxyacanthus. 24. Opos, id est liquor Cyrenaicus, uel Medicus, uel Syriacus per excellentiã: alioquin enim ex quouis radice, aut caule incisio fluens liquor sic appellatur. 25. Origana diuersa. Orminū, uide Phormium. 26. Orobos, id est eruum. 27. Orbanche. 28. Oryza. 29. Orchis, id est testiculorum herba. 30. Orchis Serapias. 31. Osiris. 32. Pancratiõ Pæonia meminit in Glycyside. 33. paliurus. 34. Papyrus. 35. panaces Herculeum: dixit autem supra, Origanum quocq; syluestre sic appellari. 36. panaces Alepium. 37. panaces Chironium. 38. paronychia. 39. pentaphyllum. 40. peplus, quam aliqui item pauper spumicum uocant, de quo supra. 41. peplium. 42. piper. 43. persea. 44. periclymenum. 45. peristereon, id est uerberena. 46. petalites. 47. petroselinum. 48. peucedanum. 49. peganon, id est ruta. 50. pix. 51. Oleū e piceliquida. 52. pistacia. 53. pinei nuclei. 54. pinus & picea. 55. pityusa. 56. platanus. 57. polygonum utrunq;. 58. polygonum. 59. polygonatum. 60. polemonium. 61. polium maius siue fruticosum, & minus. 62. polycnemon. 63. potamogeton. 64. Polypodium. 65. prafium. 66. propolis. 67. ptarmice. 68. ptelea, id est ulmus. 69. pteris, id est filix mas et femina. 70. pycnocomū. 71. pyrethrū. 72. pyros, id est triticū: & de amylo, cataplasmate ex pane, ac fermento, de quo etiã supra in Zyme. 73. Rhanus. 74. Raphanis, id est radiceula. 75. Rheū uel Rha-

76. Resina. 77. Rosa. 78. Rhodia radix. 79. Rhododaphne. 80. Rhocæ, id est malus punica. 81. Rhus. 82. Rhyos, id est fordes è statuis gymnasiorum, & ex palæstris mixtus puluere, oleo, sudoreq; & foridibus hominum. Vide infra etiam in fine libri 10. 83. Sagapenum. 84. sampsuchum. 85. saprotes, id est caries lignorum. 86. sarcocolla. 87. satyrium. 88. selinon, id est aptum. 89. seris, id est intybus. 90. seriphium: uide supra in abstincho. 91. sefel. 92. sesamum. 93. sesamoides maius & minus. 94. sideritis & Achillea. 95. siccyos, id est cucumis. 96. Cucumis syluestris & elaterium. 97. siphium. 98. sison. 99. sium. 100. sisarum. 101. silymbrium. 102. silymbrium cardamine. 103. scaldix. 104. scilla. 105. scilymus. i. carduus. 106. scorodion. 107. scorodod, id est allium. 108. scorodoprasum. 109. scorpioides. 110. smilax, id est taxus. 111. Myrrha: & myrrha Baotica. 112. smyrnium: uide Petroselinum supra. 113. sonchus. 114. sparganium. 115. spartha, id est genista. 116. staphylinus, id est passiflora: uide Daucus supra. 117. stachys. 118. stoebe. 119. stoechas. 120. stratiotes aquaticus & terrestris. 121. struthium. 122. styrax. 123. ficus fructus, & ficus arbor. 124. symphytum petraeum. 125. symphytum magnū. 126. spondylus, uel ium. 127. schinus, id est lentiscus. 128. schœnanthos, id est iunci rotundi odorati flos. 129. lunus palustris. 130. Teucinthus. 131. Teulon, id est beta. 132. Teucrium. 133. Tephra, id est cinis: & de calce. 134. Telephium. 135. Telis, id est scenogracum. 136. Thy malli. 137. Tragicacanth. 138. Tragium. 139. Tragicoriganum. 140. Tribulus uterq;. 141. Tripodium. 142. Trifolium. 143. Trichomanes. 144. Trychnus (alias strychnus) id est solanum, quatuor generum. 145. Hyacinthi. 146. Hydnæi tubera. 147. Hydroper. 148. Hyocyamus. 149. Hypericum. 150. Hypericum. 151. Hypoglossum. 152. Hyssopus. 153. Lætes. 154. Lens palustris. 155. phaleris. 156. phalanges. 157. phlomos, id est uerberiscum. 158. phœnix, id est

Galen,

tom. 5

k palma

palma. 159. Phormium, Paulo Aeginetæ horminum, & Dioscoridi. 160. Phū. 161. Phycos, id est alga. 162. Phyllitis. 163. Phyllon, id est foliū malabathri. 164. Chalbanc, id est galbanum. 165. Chamædrvs. 166. Chamæcissus, id est hederæ terrestris. 167. Chamælea. 168. Chamæleuce: vide Bechium supra. existit

matur enim à doctioribus eadem. 169. Chamæleon. 170. Chamæpitys. 171. Chamælyce. 172. Chelidonium. 173. Chondrila. 174. Chondrus, id est far. 175. Chrylocome. 176. pseudodictamnus. 177. pyllium. 178. Ocimum. 179. Ocimoides.

GALENI DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM FACVLTAIBVS

Liber octavus.

PROOEMIUM



VANTVM itaq̃ reliquū est facultatis secundū naturā, id hoc libro dicitur; nec id quidē omne, sed tantum effectū cū qualitātū actiones. Nam totius substantiæ plantarū opera postea per se exponam. Communes

est itaq̃ lectoribus de ijs quæ supra tractauimus, nempe q̃ cuiusq̃ simplicis facultatis in maioris minorisq̃ ratiōe discriminatiōe quatuor ordinibus notauimus, quodq̃ perspicuis limitibus cuiusq̃ ordinis latitudine circūscriptimus, tum quod inueniendarū facultatū ratiōe quandā ac viam docuimus, horumq̃ omnium demonstratiōes confectimus, ac scopos posuimus, & cuiusq̃ facultatis iudicandi normas tum peculiare, tum communes: sic iam reliqua adijciemus, hortantes, si quis sit qui in superioribus uersatus non sit, ut aut hæc omnino relinq̃at, aut si amās laboris est, ab initio prius totum opus perlegat. Si quidem prius quam in illis exercitatus fuerit, obscura omnia & demonstratiōnis expertia uidebuntur dicenda.

Nardus stachys. Spica nardi. Cap. 1

Nardi spica exalfacit excessu primo, desiccatur secundo iam completo. Composita est ex adstringente sufficēter substantia, & acri calida nō multa, & quadam leuiter amara: ex his constans facultatis radix & ad iecur, & ad stomachum rationaliter cōuenit tum pota, tum extrinsecus imposita. Urinā ciet, morsus stomachi sanat, in uentre ac intestinis consistentes fluxiones desiccatur, ad hæc & eas quæ in capite & thorace. Valentiōr est uocata Indica, quæ nigrior est quam Syriaca.

Nardus Celtica, hoc est Gallica. Cap. 2

Nardus Gallica iam dictis similis quadantenus in genere facultatis est, ceterū ad omnia imbecillior, præterquam ad prouocandam urinam. Si quidem calidior illis est, sed minus adstringit.

Nardus orca, hoc est montana. Cap. 3

Nardus montana, quæ & thylacitis, & pyritis nuncupatur, plurima in Cilicia nascitur, sed prædictis debilior.

Narthen. Ferula. Cap. 4

Ferulæ semen exalfacit & attenuat. Ceterum id quod intus inest, quod medullā uocant, adstringentem qualitatem participat, cuius nomine sanguinem spuentibus & cœliaciis conuenit.

Napy. Sinapi. Cap. 5

Sinapi calfacit & desiccatur ordine quarto.

Narcissus. Cap. 6

Narcissi radix usque adeo exsiccandi facultate posset, ut & maxima ulcera cōglutinet uel ad incisiones usq̃, quæ circa tendones accidunt. Habet uero quiddam absterforium & attractorium.

Neuras. Poterium. Cap. 7

Neuras, quidam Poterium uocant: desiccandi absq̃ morsu facultatē possidet, adeo ut & nervos incisos glutinare credat. Radices eius potissimū eiusmodi uim obtinent: quin & decoctum earum quidam exhibent ijs quibus affecti sunt nerui.

Nerium, aut Rododaphne. Cap. 8

Nerium, aut Rhododaphne, notum omnibus frutex: foris quidem illitus digerēdi uim obtinet. Porro si intro in corpus assumatur, perniciosus ac uenenosus non tantum hominibus, sed plerisque etiam pecudibus est.

Nymphaea. Cap. 9

Nymphaea tum radix, tum semen desiccandi uim habet citra morsum. Itaq̃ uentris profusua cohibet, semēdū siue per insomnia, siue alio pacto immodice profusua retinet. luvat porro etiā dysentericos. Ceterum nymphaea quæ candidam habet radicem, potentioris est facultatis, ut & muliebri medeatur profusio. Verum & hæc, & ea quoque quæ atram habet radicem, ex uino nigro austero bibitur. Porro nonnullam habent quoq̃ & abstergenti potentiam. Itaq̃ & alphas sanant, & alopecias. Ceterum ad alphas macerantur aqua, ad alopecias, pice liquida. Sed ad hæc aptior est ea cuius radix nigra est, sicut ad alia, cuius alba.

Xanthium. Cap. 10

Xanthium uocatur etiam phalaganium. Semen digerēdi uim obtinet.

Xyris. Cap. 11

Xyris: quidam xyrida: tenuium partium, attractoria, digerēdi, ac nimirum etiam desiccandi est facultatis cum radice, tum multo etiam amplius fructus qui quidem & urinam ciet; & lienes induratos sanare potest.

Xiphion. Gladiolus. Cap. 12

Xiphion radix, & maxime altera illa quæ superior est, attrahentem, digerentem, & desiccantem scilicet facultatem etiam possidet.

Oc. Sorbus. Cap. 13

Sorbus arbor. cuius fructus græcè βᾶ uocant, & à plerisque βᾶ, hoc est sorba nominant, adstringentē obtinet qualitatem, sed multo imbecilliorē q̃ mēspilus. proinde sanē etiam esui iucūda est, minusq̃ mēspilus uentrem constringens.

Oenos. Vinum. Cap. 14

Vinum ex secundo est ordine excalcificetium; sed quod admodum uetius est, ex tertio; sicut mustum quod uocant, ex primo. Caliditati eius proportionem respondet siccitas.

Olymbi. Grosi. Cap. 15

Grosi acrem uim possidet propter succum totius arboris communem qui illis inest. Cocti itaque duos tumores discutunt, crudi uero myrmecias & thymos eijciunt.

Olostium. Cap. 16

Olostium desiccandi uim habet cum adstrictio net; quam obrem ipsum adrupta potui exhibent.

Olyra. Cap. 17

Olyra mediam tritici & hordei naturam possidet, tam ut nutrimentum, quam ut medicamentum. Ex illis igitur de istis colligito.

Onagron. Cap. 18

Onagron aut onathera, aut onathyris, huius radix arefacta uinofum quiddam redolet. Sed & facultatis uini est maxime.

Onosma. Cap. 19

Onosma, uel osmas, uel phlonitis, uel ononis, ex acri & amara constat substantia: proinde quodque creditur fetus necare & eijcere, folijs eius in uino potis.

Onobrychis. Cap. 20

Onobrychis rarefaciens digerendique uim obtinet; proinde folia eius uiuentis etiamnum, illata ad morem cataplasmatum, phymata digerunt: arefactae uero si cum uino bibantur, strangurias sanant. Quin etiam sudores elicit cum oleo inuncta.

Ononis. Cap. 21

Ononis radicem habet tertio quadantenus ordine excalcificentem. Radix eius maxime est utilis, habens quippiam & absterforium & incisoriu. Itaque non tantum urinas prouocat, sed & lapides costringit. Eadem facultate & crustas detrahit. Vtuntur porro ea quoque & ad dentium dolores: collum uidelicet eam in oxycrato coctam praecipientes.

Oxos. Acetum. Cap. 22

Acetum in primo horum commentariorum mixta esse substantia, nempe frigida pariter & calida, eiusque utriusque tenuium partium, demonstratum est. Ceterum calidam frigidam exuperat. Porro magnam desiccandi facultatem obtinet, adeo ut sit tertij ordinis desiccantium iam completi utique cum ualidum extiterit.

Oxyacanthos. Cap. 23

Oxyacanthus. Haec arbor ut piro syluestri similem habet speciem, ita & uires non dissimiles: quin & ipsi fructus: piri quidem syluestris, prorsum atque absolute amarus est; ceterum oxyacanthos & tenuium est partium; & paulum quiddam incisuum obtinet. Porro arboris huius fructus, piri syluestris fructui similis non est, uerum myrtis, scilicet rubens & rarus. Habet uero & nucleos. Porro non efus tantum, sed & bibitus affectus omnes fluxionum, quos *ῥοιδα* Graeci uocant, cohibet.

Opus, siue succus. Cap. 24

Opus, siue succus Cyrenaicus quidem omnes & caliditate & tenuitate exuperat, ac proinde etiam

Galen.

A omnium maxime per halitum digerit: quanquam sane & reliqui admodum calidi sunt & spirituosi: siquidem plurima eorum pars essentiae aereae est & igneae. Porro complures habentur succi. Quauis namque radice incisa aut caule, quod ex uulnere crassum ac lentum effluit, succus est: ceteri specialius, & uelut per excellentiam quadam Cyrenaicum ita nuncupant, & Medicum, & Syriacum.

Origanum. Cap. 25

Origanum, heracleotica quidem efficacior est onitide: sed agrestis, quae quidam Panaces heraclii, alij Conylem cognominant, ualentior utraque est. Omnes uero incidendi, extenuandi, exsiccandi, calcificandi facultate possident: haecque tertio excessu obtinent. Porro ea quam Tragoriganum appellant, assumpsit etiam adstrictiois quippiam.

Orobos. Erium. Cap. 26

Orobos desiccet quidem excessu secundo intensio, calcificet uero primo. Porro quatenus amaritatis est particeps, eatenus incidit, extergit, atque obstructions expedit. Ceterum si sumatur copiose, sanguinem per urinas euocat.

Orobanche. Eruangina. Cap. 27

Orobanche sicca frigidaque temperatura est in primo ordine.

Oryza. Cap. 28

Oryza habet adstrictorium quippiam: quare medicocriter uentrem sistit.

Orchis. Testiculus canis. Cap. 29

Orchis, nuncupatur & herba haec Cynos orchis. Radix eius bulbosae ac geminae uis inest humida & calida, ac gustantibus dulciusscula est. Ceterum maior radix multantum uidetur habere humiditatem excrementitiam, & flatuosam: quapropter epota uenerem excitat. Altera uero, minor uidelicet, contra nimirum admodum elaborata: ut sit eius temperamentum ad calidum & siccum uergens. Itaque haec radix tantum abest ut ad coitum stimulet, ut etiam plane contra cohibeat ac reprimat. Eundem uero bulborum more tostae.

Orchis. Serapias. Cap. 30

Orchis, quae & Serapiada nuncupatur, sicciorae facultatem obtinet quam ut primi ordinis haberi mereatur, quocirca nec perinde ad uenerem accomodus est. Oedemata illitus discutit, ulcera sordida expurgat, herpes sanat. Siccatus multo amplius desiccatur. Nam & putrescentia cotumaciaque ulcera sanitati restituit: quippe cum & subadstringens sit, ac proinde etiam uentre ex uino potus sistit.

Osirid. Cap. 31

Osiridi herbae, ex qua sunt & scopae amara inest qualitas, & obstructions expedit facultas. Quare & in iocinore consistetes adiuvat obstructions.

Panacratium. Cap. 32

Panacratium. Radix huius scyllae similem gustum refert. Quare ea quidam pro scylla, si ea non adsit, utitur: efficit enim omnia in genere quidem similiter, sed longe imbecillius.

Paliurus. Cap. 33

Paliuri folia & radix adeo non obscuram habent adstringendi facultatem, ut & uentrem fluxientem cohibeat; adeoque digerunt, ut & phymata curent.

tom. 5

k 2 qua

quæ quidem non admodum phlegmonode sunt & calida. Fructus porrò tantam obtinet incidendi vim, ut & calculus uelica comminatur, & pectoris pulmonisque excretionibus auxiliatur.

Papyrus. Cap. 34.

Papyrus ipsa quidem per se in usum medicinalem haud ingreditur. At macerata aut uisita utilis efficitur. Igitur oxycrato uino uel macerata recetia ulcera glutinat, maxime in circumlocuta circumposita. Verum hæc quidem est ceu materia quæ medicamina sanantia accipiat: at ubi uisita fuerit, in medicam est exicatorium, uelut & charta combusta cinis nisi quatenus infirmior est quam papyri.

Panax Heracleum. Cap. 35.

Panax Heracleum. Ex hoc fit uocatus opopanax, radicibus eius & caulibus scilicet excisis. Porrò opopanax ipse longè est ad plurimos usus aptissimus, ut pote exalfaciens, emolliens, & digerens: ponatque ipsum quispiam in calcinando tertio ordinis, in desiccando uero secundi. Cortex radice exicatorium simul & exalfactorium est medicamentum: sed minus que succus. Quin & nonnullam habet abstergendi facultatem. Quare eo quoque utimur & ad nuda osium, & ad ulcera maligna & contumacia. Sufficiens enim talia carnem procreant, scilicet abstergendo simul & desiccando, nec ita magno opere calcificando, quæ omnia ad carnem generandam necessaria sunt: uelut in libris De curandis ratione ostendimus. Fructus calidus & ipse est, ac mensibus mouendis medicamentum accommodum. Cæterum nescio quo pacto nunc omnes ex more non panaces, sed panaca herbam hanc uocitent.

Panaces Asclepium. Cap. 36.

Panaces Asclepium minus est calidum supra dicto panace: quamobrem floribus eius & semine mellis mistis, ad ulcera, phymata, & phagedænas utuntur.

Panax Chersonaum. Cap. 37.

Panaces Chersonaum & ipsum similem prædicto facultatem possidet.

Paronychia. Cap. 38.

Paronychia ab effectu nominata est: sanat enim paronychia: & ut refert Dioscorides, fauos quoque. Vis eius est tenuium partium, & exicatoria, morsum uacans. Talia enim sint oportet quæ paronychias sanant. Porrò satis constat tale esse idoneum ad digerendos affectus omnes qui digeri possunt. Talia enim sunt quæ cum ex tertio sint ordinis exalfaciunt & desiccantium, uelut & hoc, essentia insuper subtilis sunt.

Pentaphyllum. Cap. 39.

Pentaphylli radix desiccatur uehementer, minimum uero acris est: quare multo est usui uelut alia quoque omnia quæ cum sint tenuium partium, contra morsum desiccant. Est enim hæc radix desiccatoria ex tertio ordine, minimum habens euidens caliditatis.

Peplos. Cap. 40.

Peplos, quidam uero mecona aphrode. & hic frutex succum habet similem tithymallis, cum in alijs, tum quia purgat ceu illi.

Pepulum. Cap. 41.

Pepulum, & hic quoque fruticulosum succum obtinet sicut tithymallis: nasciturque plerumque ad mare, radicem habens super uacuam, ut & peplos: succum uero ualidum, non tamen admodum utilem; sed semen utile est & flatuosum, similiter semini pepli purgans.

Peperi. Piper. Cap. 42.

Piperis radix uires costo similes potissimum obtinet. Porrò fructus nuper quidem admodum germinantis, longum piper est: quare etiam maturo humidius est: humiditatis eius indicium est, quod facile repositum perforatur, ac non protinus mordicet, sed post paulo incipiat, uerum plusculum duret. Porrò fructus qui uelut omphax est, piper album est, nigro quidem acris. Nam illud iam quasi superassatum est, & super exsiccatur. Verum utrumque ualenter tum exalfacit, tum desiccatur.

Persea. Cap. 43.

Persea folia adstringentem uim modice participant, adeo ut queant etiam nonnunquam utiliter sanguinis eruptione affectis partibus imponi.

Pericymenos. Voluerum maius. Cap. 44.

Pericymeni utilis est tum fructus, tum folia, adeo uehementer incidens pariter & exalfacientis facultatis, ut si plusculum bibatur, urinam sanguinolentam efficiant, principio quidem urinam duntaxat mouentia: porrò foris cum oleo illita exalfaciant. Iuuat & lienosos difficulter spirantes. Competens potionis mensura est drachmæ unius cum uino. Porrò desiccatur quoque semen: & quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem bibentibus afferre. Sed & sunt qui certum dierum numerum ad talem potionem præfiniunt, ut Dioscorides, qui septem & triginta eos tradit refert. Hic etiam urinam cruentam reddi à sexto die memorat.

Peristereon. Cap. 45.

Peristereon, appellata est inde adeo, quod in ea peristeræ, hoc est columbæ uersentur. Vim habet hætenus desiccantem, ut uulnera conglutinet.

Petasites. Cap. 46.

Petasites ex tertio est ordine desiccantium. Quamobrem ad cacoethæ & phagedænicæ ulceram adhæbit.

Petroselinum. Cap. 47.

Petroselini semen maxime usui est, cum tota etiam herba una cum radice similis sed imbecilliorum facultatem sortiatur. Est autem ut gustu acre cum amaritudine, sic & in operibus calidum, una cum incidendi effectu. Hinc menses & urinas assatum prouocat. Est & aphyson, hoc est, status extinguat. Fuerit itaque & ipsum tertij ordinis tum exalfaciendum, tum desiccantium. Porrò Cilices, id modo petroselinon appellant, quod natum est in Amano. Sed id smyrnium potius fuerit, quam petroselinum. Non tamen ita multum à petroselinum uiribus abest.

Peucedanum. Cap. 48.

Peucedani radice quidem maxime, sed tamen etiam succo & liquore utimur. Sunt autem omnia hæc eiusdem specie facultatis: sed ualētior succus, admo-

admodum exalfaciens & digerens: quare affecti-
bus omnibus circa neruōs consistentibus cōueni-
re creditur, tum morbis in pulmone thoracēq; ex-
crasitudine & uiscositate humorum proueniēti-
bus. Atq; intrō quidem in corpus sumptus, sed ta-
men etiā olfactu prodest. Porro q̄ incidat & exte-
riet, sapē etiā dentium perforatū dolorē cavi-
tati impositus protinus sedauit, quia uidelicet te-
nuum est partium, & exalfactorius. Quinetiam
lienes induratos iuuat nempē incidendo, digerē-
do atq; extenuādo crassos humores: sed & radice
ad hęc utiliceat, quæ & squāmas celerrime ab of-
sibus detrahit, quia uidelicet ualide desiccāt, mi-
nus tamen q̄ succus exalfaciens. Et ulceribus cō-
tumacibus remediū est optimū arida illita: ipsa em̄
expurgat, carnem inducit, & ad cicatricem perdu-
cit, exalfaciens quidem ordine secundo iam com-
pleto, desiccans uero tertio iam incipiente.

Peganon. Ruta. Cap. 49

Ruta agrestis ex quarto est ordine exalfacien-
tium & siccantium: domestica uero ex tertio. Est
autem non solum gustu acri, sed & amaro. Ex quo
sanē etiā digerere atq; incidere crassos lentosq;
humores potest. Ob eam uim & per urinas eua-
cuat, Quin & tenuium est partium, flatūs q; extin-
guit. Quare ad inflationē competit, ac ueneris ap-
petitum cohibet, digeritq; atq; exsiccāt sanē stre-
nue: est enim eorum ex numero medicamentorū
quæ ualent desiccant. Porro quod superius mo-
ly & besafan nominari diximus, & ipsum utique
fuerit ruta syluestris.

Pissa. Pix. Cap. 50

Pix sicca quidē desiccāt & exalfacit secundo à
medicamentis siue symmetris excessiue: ac plus desic-
care potest q̄ exalfacere. Humida uero econtra,
plus uidelicet calfacit q̄ desiccāt: habetq; nonnul-
lam partū tenuitatē, quo & asthmaticos & puru-
lentos adiuuat. Satis est autem cyathi linxisse men-
surā mellimistæ. Sed & abstergēdi quandam uim
habent, atq; cōcoquēdi digerēdiq; ueluti & in
gustū leuem amaritatē & acrimoniā. Sic leproso
ungues eximunt mistæ cum cera, lichenasq; deter-
gunt: concoquunt item duros & crudos tumores
omnes cataplasmatibus inditæ. Ad ea omnia humida
ualentior est. Arida uero pix tametsi ad hęc quidē
deterior est, glutinandis tamen uulneribus magis
congruit. Ex his itaq; clarum est, humidæ pici cali-
dam humiditatem assatim esse admistam.

Pissellum. Cap. 51

Pissellum ex humida pice efficitur, genere qui-
dem illi simile, sed essentia tenuioris.

Pistacium. Cap. 52

Pistacium, in Syria ubertim hæc planta nascitur.
Fructus eius quodam modo tenuioris essentia est,
subamarum quid & odoratum habēs; obstructio-
nes itaq; liberat, sed maxime secoris, ueruntamen
etiā thoracis, pulmonisq;.

Pityides. Cap. 53

Pityides, nominatur ita fructus pityon, hoc est
picearum. At quidam per abusum similiter quoq;
pini fructum nuncupant, Mistam uim obtinent,

utpote adstringētes, & acrimoniā quandam cum
amaritate possidentibus: quam obrem thoracis pul-
monisq; expuitionibus conferunt.

Pitys. Piced. Cap. 54

Picea cortex uincemtem habet facultatem ad-
stringentiā, usque adeo ut et intertrigines bellissimē
sanet, & uentrē porus sistat, sed & ambusta cicatri-
ce includit. Porro tedæ cortex illi adsimilis est, sed
uiribus tamen moderatoribus. In folijs arboris u-
triusq;, ut quæ multo sunt cortice humidiora, uis in
est ulcerum glutinatoria. In cono, quamquam his
similis sit, ualidior tamen facultas est tum in corti-
ce, tum in folijs, adeo ut dictorum nihil probe effi-
cere queat, uerū molestam quampiā habeat mor-
dacitatē. Porro fuligo quæ ex dictis colligit, ad pi-
los superciliorū accommoda est, itemq; ad angulos
oculorū erosos, lippientes, ac lachrymantēs.

Pityusa. Cap. 55

Pityusa, & hanc quidem speciem putant esse ti-
thymalli, quod succum habeat ut illæ, quod que si
milititer illis purget: cætera que omnia uiribus illis
est adsimilis.

Platanus. Cap. 56

Platanus humidioris frigidiorisq; essentia est nō
ita multo q̄ symmetra. Proinde folia uiridia trita
& illita, non obscure phlegmonas nascentes adiu-
uant. Cortex autem & pilulæ magis desiccantem
uim obtinent, ut ille quidē in aceto coctus ad den-
tium adhibeatur dolorē, pilulæ uero cū adipe ad
ulcera ambusta. Sunt autem qui cortice cōbusto
medicamen desiccatorū & absterforū efficiunt,
ut cum aqua lepras sanet: per sese autē illitum, ob
humorem nimium ulcera uetera & sordida. Vitam
dus est puluis folijs arboris insidēs: alioqui si spiri-
tu attrahatur, arteriam offendit, ualent desiccās
& exasperans, uocemq; lædit, sicut sanē etiā ui-
sum & auditum, si in oculos aut aures incidit.

Polygonon. Seminalis. Cap. 57

Polygonon ut adstrictionē quandam obtinet,
ita sanē uincit in eo aqueum frigidum: ut uidelicet
secundi sit ordinis medicaminum refrigeratium,
aut etiā quodammodo in initio tertij: profunde sanē
quibus stomachus æstu feruet, foris frigidum illi-
tum prodest, uelut etiā erysipelata & calidas phle-
gmonas iuuat. Porro tale cum sit, & fluxiones re-
percutit, & hac ratione uidetur esse exsiccatorū.
Quare cum herpetum, tum ulcerum, tum aliorum
bonum est remediū, tum etiā efficacissimum
in inflammatis partibus. Est & creutorum uulne-
rum glutinatorium. Sed & aurium ulceribus pro-
dest. Ac si uel plurimū insit puris, hoc tamē etiā
desiccāt. Eisdem ob facultates sistit profluuium
muliebre, ac dyenteriam, & sanguinis eiectiones,
& undecunq; aliunde immoderatus quippiam fe-
ratur. Refert Dioscorides, quod & urinam prouo-
cet exhibitum stillicidit & stranguria affectis: nō
tamen exacte dispositionem discernit, in qua
ipsum dari expediat. Porro mas ad omnia dicta q̄
fœmina ualidioris est effectus.

Polygonon. Cap. 58

Polygonon modice austera folia obtinet: uidet-

tur autem si sibi tantum lac generare. Itaq; superauerit in eo calidum ac humidum.

Polygonatum. Cap. 59

Polygonatum mistam habet tum facultatem, tum qualitatem; habet enim ad adstrictionis pariter & acrimoniae quippiam, nec non fastidiosam quandam amaritatem explicatū difficilem. Quocirca nec admodum est usui, sed tantum quod radicem eius quidam vulneribus illinūt. Sunt etiam quinæuos in facie illo detergent.

Polemonium. Cap. 60

Polemonium, quidam philetarium, quidam (uelut Cappadoces) chiliodynamon; tenuium partium est, & desiccandi uim obtinet; quamobrem quidam radicem eius cum uino ad ischiadicis, dysenteria, lienemq; induratum potui exhibent.

Polium. Cap. 61

Polium amarum est gustantibus, & modice aere: obstructione itaq; liberat uiscera omnia, urinamq; & menses ciet: ac uiride etiamnum magna uulnera glutinat, et maxime species eius fruticosa: aridum cum fuerit, rebellia ulcera sanat inspersum: & magis hoc praestat quod minus est, quo etiam utimur ad antidotos: nam & acris & amari est hoc quam maius, adeo ut ex tertio sit ordine desiccantiū, ex secundo autem completo excalfaciētiū.

Polynemum. Cap. 62

Polynemum desiccata & excalfacit secundo excessu. Itaq; & ipsum ulcera glutinat.

Potamogeton. Cap. 63

Potamogeton adstringit & refrigerat similiter polygono, sed essentia eius crassior quam polygoni est.

Polypodium. Cap. 64

Polypodium dulcem simul & austeram habet uincētem qualitatem; ut facultatis sit admodum quidem desiccantis, citra morsum tamen.

Praesium. Marrubium. Cap. 65

Praesium sicut gustu amarum est, ita si quis utatur, conuenientem huic saporis actionem possidet, iecur ac lienem obstructione liberans, & thoracem pulmonemq; expurgans, ac menses promouens. Sed & illitum detergent ac digerit: ponatq; ipsum quippiam in caliditate quidem secundi ordinis iam completi, in siccitate tertij medij aut completi. Succo eius ad aciei oculorum claritatem utuntur cum melle. Quinetiam & per nares auriginem purgat, et ad aurium dolores inueteratos adhibent, utiq; in quibus obstructionem discere, meatumq; ipsum & ramos meningum seu membranarum expurgare est usus.

Propolis. Cap. 66

Propolis extergentis non ita ualentis est facultatis, caeterum admodum uolenter attrahentis: est enim essentia tenuis, porro excalfacit ordine secundo completo, aut certe tertio incipiente.

Ptarmice. Cap. 67

Ptarmices flores quidem cienda sternutationis uim obtinent unde & herbae nomen obuēnit. Totus autem frutex si contundatur uiridis, sursillata, & reliquas ecchymosae digerit: est enim temperi-

as eius calida & sicca, uiridis etiamnum ordine secundo, siccata tertio.

Ptelea. Vlmus. Cap. 68

Vlmi folijs quandoq; recens uulnus glutinatum, confidentes adstringentem pariter & abstergentem inesse illis facultatem. Cortex amplius etiam subamarus est & adstrictorius. Itaq; cum aceto & lepram sanat. Porro uiridis etiamnum ac recens si uulneribus uicini uice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem uim obtinent: nam & decocto earum quidam perfundunt fracturas, quae topico siue callo inducto opus habent.

Pteris. Filix. Thelypteris. Cap. 69

Filix radicem habet maxime utilem; latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmis in mellicato esibat. Ad eundem modum partium uiuū quidē necare, mortuum autē ei eicere mirū nō est. Est enim amara, paulum habens adstrictionis. Quamobrem ulceribus imposita uim habet ualenter desiccandi: non tamen mordax est. Similem ei uim habet *Thelypteris* nominata.

Pycnocomum. Cap. 70

Pycnocomi radix, fructus, folia, omnia digerenda attrahendiq; habent facultatem, utpote quae & gustu sunt acris: folia itaq; phymata & furunculos discutiunt, fructus ualentior est; & haec quidem efficere potest mistus alicui digerentium cataplasmatum, cuiusmodi est quod ex hordeacea farina conficitur: palos & alia id genus infixata ad extimam cutem elicit. Porro radix ad supradicta quidem deterior est & infirmior, caeterum bilem illa expurgat.

Pyrethron. Cap. 71

Pyrethri radice potissime utimur causticā uenemū facultatē obtinēte, qua utiq; etiā dentes refrigeratos mitigat; & ad rigores ante periodum cum oleo confricatur. Ad haec stupidos quoq; quos uapores uocant, & resolutos adiuuat.

Pyros. Triticum. Cap. 72

Triticum ut alimentum quidē quam habeat naturam, non est huius instituti exponere, ut medicina uero foris impositum primi est ordinis excalfaciētiū: non tamen nec resiccare; nec refrigerare manifesto potest, habet uero etiam quiddam lenitoris, obstructisq; naturae. Porro quod ex eo conficitur amyllum, eo tum frigidius est, tum siccius. Quod uero ex pane fit cataplasma uim habet magis digerentem q̄ quod ex tritico: nimirū cum & salem, & fermentū panis adiecta habeat; quippe cum fermentum uim habeat attrahendi digerēdiq; ea quae in alto resident.

Rhamnus. Cap. 73

Rhamnus desiccata & digerit excessu secundo, refrigerat in primo completo, aut secundo incipiente: proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Caeterum ad haec teneris utendum est folijs.

Raphanis. Radicula. Cap. 74

Raphanis excalfacit quidem excessu tertio, desiccata uero secundo: agrestis autem in utroq; efficacior est. Quin & semen ipsum planta efficacius est

est. Facultas ei inest digerendi. Itaq; ad fuggillata, & alia id genus liuida ob talem facultatem accommoda existunt.

Rheum. Rha. Cap. 75

Rheum, quiddam id Rha nuncupant; mistā habet tum tēperaturā, tum facultatem: habet enim quiddam terrestre frigidum, ceu indicio est adstricōtio: & adiuncta est quaedam caliditas: siquidem si pluculum mādāf, subacere conspicitur. Quinetiā am acrea cuiusdam substantiā subtilis est participes, quod indicat tum laxitas, tū leuitas, uerum & opera: ob id enim non tantū conuulsis, sed et ruptis, & orthopnoeā prodest. Sic quoq; liuentia & lichenas sanat illitū cum aceto. Porro q̄ adstricōtionis opera haud infrenua sunt, hinc discere liceat, q̄ sanguinem expuentibus, coeliaciis, et dyfentericis conferat: nec enim reluctatur terrestri frigidō tenue aereum: immo eo quod deducat, & in altū perducatur, ualentioris effectus causa existit.

Rheina. Resina. Cap. 76

Resinae omnes desiccant & excalfaciunt. Ceterum inter se discrepant: quod plus ac minus habeant in gustu quidem acrimoniae in facultate uero caliditatis: tum quod alia plus, alia minus fortitā sunt partium tenuitatis: praeterea quod nonnullae adstricōtionis sunt participes, aliae nequaquam. Primas meruit omnium non iniuria lentiscina. Eam uocant mastichen. Nam praeterquam quod paucula ei adest adstricōtio, adeo ut stomachi uentriq; & icoris imbecillitatibus, & phlegmonis conueniat, in super illi inest mordacitate uocans desiccatio. Minimum enim acris est & maxime tenuium partium. Inter alias praefertur terebinthina, manifestam quidem, nō tamen similiter atq; mastiche adstricōtionem possidens: ceterum adiunctam habet amaritudinē quandā, per quam magis etiam quam mastiche digerit. Ob eandem qualitatem inest & abstersio, tāta quidem, ut & psoras sanat. Quin etiam quae in profundo residens, ceteris resinis magis attrahit, nimirū cum illis maiorem habeat partium tenuitatem. Attamen pinea & hoc etiā magis strobilina, acriores quidem ea sunt, sed non magis tamē digerunt neque attrahunt: Mediae inter has sunt picea & abietina, acriores quidem quam terebinthina, minus tamen quam aut pinea, aut strobilina. Habet porro etiam emolliens quiddam terebinthina. Secundum locum habet in emolliendo lentiscina, sicut & cyprisina acrimoniae.

Rhodos. Rosa. Cap. 77

Rosarum uis atq; facultas superioris. libris pluribus uerbis exposita est, nemp̄ q̄ ex aquae substantia calida mista duabus alijs qualitibus, adstricōti uidelicet & amarae, composita sit. Quinetiā cuius sit naturae utraq; amara scilicet et adstricōtiō, in horum cōmentariorum quarto declarauimus. Flos earū magis etiā ipsis rosis adstricōti, ac proinde sanē etiam exiccatorius est.

Rhodiarrhiza. Radix Rhodia. Cap. 78

Rhodia radix, ea uidelicet quae in Macedonia nascitur, tenuium partium, & digerētis est facultas.

tatis. In calfaciendo uero secundi ordinis censenda est, aut certe tertij incipientis.

Rhododaphne. Cap. 79

Rhododaphne tota sua essentia uenenum est, nec tantum homini, sed plerisq; pecoribus. At tēperie sanē tertij est ordinis excalfacientium, incipientis utiq; primi autem desiccantium.

Rhœa. Malum granatum, siue puniceum Cap. 80

Malum granatum omne adstricōtentem qualitate obtinet, nō tamen in omnibus ea exuperat. Sunt enim inter ea quaedam acida, quaedam plus dulcia quam austera. Et sanē quae ab uno quoque eorum procedit utilitas, secundū uincem eueniat qualitate necesse est. Dicitum autem in quarto horum cōmentariorum est super dulcissapore, austero, & acido. Itaq; ex illis de malorum puniceorum differentia liceat colligere. Porro succi ipsius acini tum adstricōtentiores, tum exiccantiores sunt, his etiam magis putamina: uocantur autem Sidia. ad similem illis uim habet Cytini: sic enim eorum appellantur flores.

Rhus. Cap. 81

Rhus fruticosā planta adstricōti, desiccatur. Nam & coriarij ad desiccandum & adstricōtendū plantae utuntur: ac proinde *Bupropde Jilēi* graece (latine Excoriaria) appellata est. Porro medicis in usu sunt in primis fructus eius & succus multū austerae qualitatis. Consentaneus est usus particularis ipsi gustus sensui. Fuerit itaque & hoc medicamen ex tertio ordine exiccantium, ex secundo uero refrigerantium.

Rhypos. Sordes. Cap. 82

Sordes in gymnasiis statuis, aut uasis aereis in quibus largum oleum inhaeret, digerēdi emolliendiq; uim obtinet. In palaestris autē, quantum accepit pulueris, tantū etiā diuersa est. Hāc sordem *πάπυ* graeci uocant. Prior cruda phymata digerit: secunda optimum est, phlegmones mamillarū remedium. Si quidem feruorem earum ueluti ignem extinguit, & quod affluit repellit: denique & quod cōtinetur halitu digerit. Cōstat enim ex puluere, oleo, sorde humana, et sudore: Ac puluis quidem emplasticam uim habet, & refrigeratorium, repercussoriamq; oleū uero emollit: porro sudor & sordes digerentia sunt. Ceterum quae a statuis corraditur cum puluere nō habeat, & ab aere aurginem quandā sumperit, nō iniuria acrior est: porro huius mentionē modo fecimus, quod maxima sui parte oleose substantiae est, quae ex planta originē fortitur. Sed & ubi de ijs quae ab animalibus protrahunt uerba faciemus, eius tum quoq; meminisse necesse erit propter sudorem.

Sagapenum. Cap. 83

Sagapenum liquor est calidus, & tenuium partium, sicut & alij liquores. Sed & abstersionem quandam possidet, qua oculorum cicatrices expurgat atque extenuat. Quin & suffusionibus & hebetudinibus oculorum, quae ob humorum proueniunt crassitiam, non malum est medicamentum. At ipsa planta ex qua prouenit, ferula asinilis, imbecilla & inutilis est. Sanē ipsa primum

ſagapenuſ appellatur. At liquor eius abuſive hoc nomen obtinet, ceu alia quoque multa ex nominis defectu per abuſum nuncupamus. Perfectius nanq; foret ipſum cognominare nō ſagapenum, ſed ſagapeniſ ſuccum.

Sampſycon. Meurana. Cap. 84

Sampſycon tenuiū partiū, & digerētis eſt facultatis: deſiccatur em̄ & excaſfacit ordine tertio.

Saprotes Xylon. Caries lignorum, Cap. 85

Caries lignorum, & maxime quæ particeps eſt adſtriſtionis ſimul & abſterſionis, uelut ulmus, expurgat impletq; ulcera humida.

Sarcocolla. Cap. 86

Sarcocolla lachryma eſt arboris perſicæ: miſtā uim habet ex emplaſtica quadā ſubſtantia, & pauca amara: itaq; citra morſum deſiccatur, ac proinde glutinare ulcera ualet

Satyrium. Triphyllon. Cap. 87

Satyrium aut triphyllum humidum & calidum temperatura eſt: quamobrē guſtu quoq; apparet dulce. Attamen recrementūſiam & flatuoſam humiditatem poſſidet. Quocirca ad uenerē incitat. Hæc uero & herbæ ipſius radix præſtare poteſt. Porro ut quidam aiunt, ex uino nigro auſtero potum ſanat opiſthotonon.

Selinon. Apium. Cap. 88

Selinon uſqueadeo calidum eſt, ut & urinas & mēſes cieat, ſtatu quoq; diſcutit, & magis ſemen quàm herba ipſa, ſed & oreſelini & hippoſelini ſimilis uis eſt: uerum hippoſelion imbecilliūſ eſt, oreſelion ualentiuſ.

Seris. Cichorium. Cap. 89

Seris holuſ eſt ſubamarū, & magis quod agreſte eſt, quod ob ipſum picrida, hoc eſt amaram quidam nuncupant, quidam uero cichorium appellant. Eſt autem ea ſiccæ frigidaq; temperaturæ, utrunq; ſecundo exceſſu: porro domeſtica magis etiā q̄ agreſtis refrigerat. Sed & humiditatis multæ admittio ſiccitatem extinguit: uerum utraq; ad ſtringentis qualitatis eſt particeps, uelut & chondrila: nam & ipſa eſt ſereos ſpecies.

Seriphium. Cap. 90

Seriphium, dictum ſanē de hoc eſt & in ſexto libro in ſermone De abſinthio. Eſt enim abſinthio tum ſpecie, tum guſtu ſimile: attamē diſcrepat: guſtu quidem quandoquidem non æque ut illud adſtringat, pluſq; excaſfaciat, amaritatemq; quandā cum ſalſedine reſipiat: tum quod ſtomacho inſeſtum ſit, magiſq; abſinthio lumbros necet, ſiue foris impoſitū, ſiue intrō in corpus aſſumptum. Et ſanē calſcere ipſum in ſecundo ordine intentio cenſendum eſt, exiccare in tertio.

Sefeſi. Cap. 91

Sefeſeos, & radix, & fructuſ uſqueadeo excaſfacit, ut admodum urinam mouere queat. Sed & tenuium eſt partium, ut & comitiali morbo & orthopnoeis competat.

Sefamon. Cap. 92

Sefamon non parum in ſe continet uiſcoſum & pingue: quare emplaſticum eſt & emolliens, ac modice calidum. Eiuſdem facultatis eſt quod

conſicitur oleum: & herbæ quoq; decoctum ſimilem uim obtinet.

Sefamoides. Cap. 93

Sefamoides magnum, quod & anticyricos helleboros appellatum eſt, propterea uidelicet quia ſemen eius ut helleboruſ expurgat: hoc et reliqua facultate helleboro ſimile eſt. Nam & in abſtergendo, excaſfaciendo, deſiccandoq; ſimilem illi uim obtinet.

Sefamoides album.

Sefamoidis albi ſemen nonnullā item amaram qualitatem continet: ſed multum amarum eſt: excaſfacit itaq; rumpit, & extergit.

Sideritiſ. Cap. 94

Sideritiſ habet quidem etiam abſtergēdi quandam facultatem, ſed plurima eius pars humida eſt, & mediocriter frigida: pauca uero ieſt adſtriſtio: quare phlegmonem ſedat, & glutinandi uim habet. Quidam etiam uocant Achilleon Sideritiū quæ propoſite quidem, quod ad ſam dicta attinet uiribus eſt non diſſimiliſ, cæterū adſtriſtione exuperat: quare ad ſanguinis eruptiones, dyſenterias, & muliebri profluuium congruit.

Sicyos. Cucumis. Cap. 95

Cucumis eſculentus, pepon quidē, hoc eſt maturus, tenuioriſ eſſentiæ eſt: qui immaturus eſt, craſſioriſ. Sed & abſtergēdi & incidendi facultas eis ineſt: quare & urinam mouent, et corpus ſplendidum reddunt, ac magis quoq; ſi quis ſemine arefacto contuſoq; atq; cribro uice pulueriſ abſterſori, ſiue *ξύματ* utatur. Superat in eis humida frigidaq; temperies, non tamen magnopere, ſed quali in ſecundo cenſetur ordine. Attamen ſi quis aut ſemen, aut radicem arefaciat, haud etiam humida fuerit naturæ, ſed ſam deſiccantiuſ, idq; in primo quodammodo ordine, aut etiam ſecundo, ſed incipiēte. Eſt & in iſtiſ maior abſtergēdi facultas, quàm in fructuſ ipſiuſ carne.

Sicyos agrios. Cucumis agreſtiſ. Cap. 96

Cucumeris agreſtiſ tum fructuſ ipſiuſ ſuccuſ, quem uocant elaterium, tum non minime radicis & foliorum ad medicaciones perutiliſ eſt. Elaterium itaq; menſes cieat, & forzum interimiſ appoſitū ceu alia omnia amara & ſubſtitiūſ partium, maxime ſi quam habeant caliditatē, uelut nimirū elaterium: ſumme ſiquidem amarum eſt, leuiter calidum: ut ex ſecundo ſit ordine excaſfacientiū: porro tale proſinuſ quoq; digerēdi uim poſidet. Sic igitur eo angina laborantes inunqunt quidā cum melle aut oleo uetere. Bonum item eſt regio morbo affectiſ ſuſum cum lacte in nares. Sed & doloris capitiſ ſanat hoc uſu. Atq; elaterium quidem eiſuſmodi eſt. At radicis ſuccuſ, ut & foliorum, licet elaterio ſimilem uim habeat, imbecillioſiorem tamen. Sed & ipſa radix ad ſimilem facultatem poſſidet: abſtergit namq; digerit, atq; emollit. Porro cortex ea potentiuſ deſiccatur.

Silphium. Laſerpiſium. Cap. 97

Silphij liquor calidiſſimuſ eſt: uerū enim uero et folia, & cauſiſ, & radix ſat ſtrenue excaſfaciunt. Sed omnia flatulentæ magiſ eſſentiæ ſunt, ac proinde

inde coctū difficilia; foris tamen imposta corpori
efficaciora: & omnium potissimū liquor admo-
dum trahentē facultatem possident. Attamen &
excrecentias amolendi, & liquandi uim quandā
propter propositam temperiem obtinet.

Sison. Cap. 98

Sison calidus & subamarus gustu est: quare &
urinam mouet, & concoquit, mensesq; prouocat,
omnesq; uiscerum obstructions diluic.

Sion. Cap. 99

Sion quantū gustu odoratum est, tantum eti-
am exsiccantiē facultatis est particeps. Sed & di-
gerit, & urinam mouet, & calculos renum frāgit,
& menses euocat.

Sifaron. Cap. 100

Sifari radix cocta stomacho grata est, & uri-
nam mouet, secundo ordine exsiccantiē, adie-
ctam habens amaritatem quandam cum leuicula
adstrictione.

Sisymbrium. Cap. 101

Sisymbrium tenuium partium, digerentiē,
exsiccantiē & resiccantiē facultatis est, & tem-
peraturæ in tertio ordine. Sed & semen eius te-
nuium partium est, & calidum. Quocirca ipsum
quidam cum uino exhibent singultientibus, &
tormina patientibus.

Sisymbrium. Cap. 102

Sisymbrium, quod quidam cardaminem uo-
cant, quandoquidem cardamo, id est nasturtio si-
mile quiddam gustu præfert: cum siccum est, tertij
est ordinis exsiccantiē & desiccantiē: cum
humidum & uiride, secundū.

Scandix. Cap. 103

Scandix ex agrestium olerum genere est, suba-
cre & amarum, adeo ut in siccatum & exsiccantiē
do aut secundū ordinis intensi [aut tertij incipien-
tis] urinam ualenter ciet, & uiscera obstructione
liberat, ex dictis qualitatibus constans.

Scilla. Cap. 104

Scilla admodum incidentem facultatem obti-
net, non tamen admodum calidam. Sed secundū
hoc eam quispiam secundū ordinis censet exsiccantiē.
Præstat autem aut assam, aut elixam su-
mere: sic enim uirium eius uehementia exoluitur.

Scolymus. Cap. 105

Scolymi radix copiosam urinam graueolentem
elicit, si quis eam in uino coctā bibat: ac proinde
grauolentiam sanat tum alarum, tum totius cor-
poris. Atq; hoc sanē medicamēto ex tota inest ef-
fectia, nimirū cum succus sit purgatorius. At quæ
secundum qualitates edic' actio, calidum in secun-
do ordine completo, aut tertio incipiēte, medica-
men indicat, siccum uero in secundo.

Scordium. Cap. 106

Scordium, ex uarijs id tū saporibus, tum facul-
tatibus constat, nam & amarum quid obtinet, &
acerbū, & acre, & maxime scorodo, hoc est allio,
admissilis eius est acrimonia: unde sanē, mea sentē-
tia, nomēclaturam sortitum est. Expurgat igitur si
mulq; exsiccantiē uiscera, tū menses urinamq; pro-
uocat. Propterea conuulsa ruptaq; & laterū dolo-
res ab obstructione & frigore natos sanat epotū.

deniq; uiride quidem illitum magna uulnera con-
glutinat; sed fordidā purgat, & contumacia ad ci-
atricem perducit illitum aridum.

Scorodum. *Allium.* Cap. 107

Allium desiccant & exsiccant quarto excessū.
Porro ophioscorodon agreste allium est, domestū
co ualentius, ceu reliqua agrestia omnia.

Scorodoprasion. Cap. 108

Scorodoprasion sicut gustu & odore mediam
scorodū, hoc est alij, & prasi, id est porri, qualitātē
possidet, ita & uiribus.

Scorpioides. Cap. 109

Scorpioides exsiccant ordine tertio, desiccant
secundo.

Smilax. Cap. 110

Smilax aut Taxus arbor est uenenosæ facultatis.

Smyrna. *Myrrha.* Cap. 111

Myrrha secundū ordinis est tum exsiccantiē,
tum desiccantiē. Itaq; caput uulneribus illita
glutinare ea potest. Inest & amaritas non pauca,
per quam scētū & lumbricos tum enecat, tum eij-
cit. Adest hinc ei & abstergendi potentia. Sic igit
ocularibus miscet facultatibus, utiq; quæ ad ulce-
ra & crassas cicatrices præparant. Eadem de cau-
sa inditur & medicamentis, quæ ad tussim ueterē
& asthma, siue anhelationē exhibent; non tamen
arteriam exasperat sicut abstergentium nonnulla.
Verum adeo moderatē obtinet absterfionē, ut nō
nulli eam arteriacis quæ uocant medicamētis cō-
miscant, tanq; sufficienter exsiccantiē & desic-
cantiē medicamēto: scilicet absterfionem proficiscen-
tem ab amaritudine nihil uerentes.

Smyrna Bœotica. *Myrrha.*

Smyrna bœotica uim habet exsiccantiē, fun-
dendi, emolliendi.

Smyrnum. Cap. 112

Smyrnum quidam hippofelinum agreste co-
gnominant. Ex eodem genere & ipsum cum apio
est, & petroselino. Fueritq; apio quidem ualidius,
imbecillius petroselino. Menses itaque & urinas
mouet, calidum siccūq; tertio ordine. Cili-
ces petroselinum nominant quod in Amano na-
scitur. Sed & ipsum smyrnum minus est petroseli-
no smyrnioq; acre: proinde sanē ulcerib. imponi
potest, quia uidelicet sine molestia desiccet. Sed
& digerere quæ indurata sunt potest. Reliqua uis
eius apio & petroselino similis est. Quocirca & se-
mine eius utitur ad menses, urinas, & asthma,
siue anhelationes.

Sonchus. Cap. 113

Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est.
Ceterum uiridis etiamnum & tener estur perinde
ut cætera olera. Temperamentum eius quodam-
modo mistum est: constat enim ex aqua terreæq;
essentiā, utraque leuiter frigida. Nam & adstric-
tionis cuiusdam est particeps: & siue cataplasma-
tis in morem illinatur, siue edatur, manifesto resit-
gerat: postea uero quam planē resiccatus fuerit,
terrestre eius temperamentū redditur, modicum
habens caliditatem.

Sparganium. Cap. 114

Sparganiū & ipsum desiccantiē est facultatis.

Spartium. Githia. Cap. 115

Sparti, quo & uites alligāt, tum fructus, tū uirgarū succus nō inflrenue trahētis est facultatis.

Staphilinus. Pasticina. Cap. 116

Staphilinus satius imbecillior, agreftis ad omnia potentior est. Vrinās mensesq; prouocat cum herba quidē tota, tum maxime semē ac radix. Habet porrō etiā absterforium in se quippiā: quam obrem ulcerum phagædenica quidam folijs eius cum melle, quō pura reddat, illinunt.

Stachys. Cap. 117

Stachys, frutex ille marrubio similis, gustu acri & amaro, tertij est ordinis excalfaciētium. Quam obrem rationabiliter menses prouocat, Sed & ab ortum affert, & secundas eijcit.

Stæbe. Cap. 118

Stæbes fructus & folia maximo sunt usui, adstringendū uim habentia mordacitatis expertem. Sed & desiccant euidenter in tertio ferē ordine incipiēte: quam obrem decoctum eorum dysentericis inijcitur, & auribus pure fluentibus, tum uulnera magna conglutinat. Euidētius hæc præstat cum uino atro austro. Valenter enim desiccant omnes præter naturam humiditates. Præterea folia uiridia si illinātur, uim habent erumpētis sanguinis supprimendi, deniq; et oculorum ex ictu suffusiones illita iuant.

Stœchad. Cap. 119

Stœchadis gustu quidem qualitas amara est, & modiciter subadstringens, cæterū temperies cōposita, nēpe ex terrena essentia frigida exigua, un de sanē adstringit; & extenuata altera terrena cōpōsiore, à qua utiq; amara est. Ob utrorumq; uero conuenientiam & coitum, obstruētionē liberare, extenuare, extergere, et roborareq; tum uiscera omnia, tum totum corpus est nata. Supra nanq; ostensum est, qd quæ ex eiusmodi essentijs constāt medicamina, dictos effectus reddere possint.

Stratiotes. Cap. 120

Stratiotes aquaticus quidem humida & frigida facultate est, terrestri uero nonnihil habet adstriccionis: proinde sanē & ulcera glutinare potest, et ulceribus esse utilis. Sunt qui eo et ad sanguinis eruptiones utantur, & ad fistulas.

Struthion. Cap. 121

Struthij radice potissimum utuntur, utpote gustu acri, & calida siccaq; temperamēto, ex quarto quodammodo ordine excalfaciētium: Sed & abstergi & irritat: proinde quoq; sternutationē prouocat, ceu cætera omnia quæ calida sunt tēperie, & gustu acria.

Styrax. Cap. 122

Styrax excalfacit, emollit, concoquit quamobres tuisibus, catarrhis, pituitæ destillationibus, grauedinibus, raucedinibusq;, quas ῥοφύλας & ῥεγάγῃς uocant, prodest. Tum menses seu potum seu admotum prolucit. Combusti eius fuligo, thuris fuligini quodam modo est similis.

Sycæ. Ficus. Cap. 123

Ficus aridē uim habent excalfaciēdi ordine primo etiam completo, aut secūdo incipiente: habet uero etiam partium tenuitatem quādam. Ex istis

A duobus idoneæ sunt quæ tubercula dura concoquant: statim uero etiam ea digerūt. Atq; ipsæ per se illitæ eiusmodi uim obtinent. Sed & decoctum earum eiusdem utiq; naturæ est. Verum ubi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea; ubi uero plus digerere, hordeacea: panis horum in medio. Sed hæc magis sunt propria tractatus De medicamentorū cōpositione, & rationibus curandi; uerum in præsentiarū hæc de ichthidibus nouisse sufficiat. Porrō scire oportet, qd quæ pinguiores sunt, magis possunt concoqueri: quæ uero gustu acriores, magis tum extergere, tum digerere. Cæterum quod ex ijs plurimū in aqua coctis efficitur, simile est melli non solum consistentiæ, sed & facultate. Porrō ficus uirides comestæ propter admistam humiditatem facultatis sunt imbecillioris: subducūt tamen aluum utraq; tum humidæ tum sicca. Porrō ficus caprifici acris & digentis facultatis sunt; sic etiam domesticarum grossi, Græce uocant ὀλῶβος: inest em illis nonnihil etiam succi ex ficu arbore.

Sycæ. Ficus arbor

Ficus arbor calidæ tenuiumq; partium temperaturæ est, ceu indicant tum liquor eius, tum foliorum succus. Valenter enim eorum uterq; calidus est. Itaq; non mordacit tantum, ut uehementer abstergit, sed & ulcerat, & ora uasorum referat, & uerrucas quas myrmecias uocant, eijcit, sed & purgare potest. Porrō ficus agreftis, quam erineū græce (latine caprificum) nominant, tum opus, tum succus ad omnia quā fatiuar ualentior est. Sed & crada earū adeo sunt calidæ, tenuiumq; partium, ut carnes bubulas duras, si coquēdis adijciantur, friabiles ac teneras efficiant.

Symphytum petreum. Cap. 124

Symphyton petreum ex contrarijs constat uiribus: habet enim secandi uim quāpiam, qua collectum in thorace pulmōe q; expurgare potest; habetq; etiā quandā contrahēdi uim, qua eictionibus sanguinis auxiliat: & tertia ad eas inest humiditas quædam nō immodice calida, per quam gustatibus dulce apparet, & odoratu iucundum. Mansum sitim extinguit, & arteriæ asperitates sanat. Porrō secundum omnium dictarū uirium missionē simul digerere abunde potest, simulq; corpora contrahere constringereq;: proinde enterocelis imponitur, & ad conuulsas & rupta cum oxy melite bibitur. Porrō qui ipsū in uino decoctū ad muliebres exhibent profluuiū, utuntur tanquam desiccante & contrahente. Qui uero ad nephritim, tanquam expurgante & incidente.

Symphytum magnum. Cap. 125

Symphyton alterum, puta magnū, similem dicto uim habet: non tamen gustantibus dulce est, aut odorantibus odoratum. Sed his sanē à modo scripto diuersum est. Cæterum quatenus uiscositate quandā & mordacitate obtinet, sicillæ simile est: utitorq; ad omnia ad quæ iam dicto.

Sphondylon. Cap. 126

Sphondyli fructus acris & secātis est facultatis: itaque ad asthma & comitalem morbum aptum est medicamē: prodest & aurigini. Et radix, nimirum

rum ad similes facultatis, ad eadem accommodatur. Sed & in super fistularū callos tollit: cæterum imponere eam oportet circumrasam. Porrò floribus etiam succus ad diuturniora aurium ulcera conueniens reponitur.

Schinus. Lentiscus.

Cap. 127

Schinus, frutex hic ex aqua essentia leuiter calida, & terrena frigida non pauca compositus est. Desiccatur igitur secundo ordine cōpleto, aut tertio incipienter: in caliditatis & frigiditatis differentia quodammodo est medius & symmetrus. Similem omnibus sui partibus adstrictionē obtinet in radicibus, ramis, extremis turionibus, germibus, ac folijs: præterea fructu, & cortice: ac si succū ex folijs eius uiridibus exprimas, similis hic ordinis est, moderate adstringens. Itaq; bibitur & per se, & cum alijs medicamentis, quæ dysenterias & alui affectus sanant: quin & ad sanguinis exspuitions, sanguinisq; ex utero eruptiones, tum sedis uuluerūq; procidentias idoneus est, utpote ad hypocystrida non nihil propè accedens.

Schinus anthos. Schini flor.

Cap. 128

Schinus anthos modice calcacit, modiceq; etiam adstringit: nec planè à tenuitatis natura alienus est. Quocirca his de causis urinam mouet, mensesq; ciet adhibitum siue in fomentatione, siue in potionem, prodest & iecoris & stomachi, ac uentris phlegmōis. Magis eo adstringit radix. Quod uero florē uocant, calidius est. Porrò in omnibus sui partibus, in alijs magis, alijs minus, gustantibus apparet adstrictio: proinde medicinis que hē moptoicis, siue sanguinem reiiciētibus exhibentur, commiscetur.

Schoenus lea. Yunctus leuis.

Cap. 129

Schoenus lea, quædam oxychoenos, alia holoschoenos nuncupatur: gracilior duriorq; oxychoenos, crasior laxiorq; holoschoenos. Fructus holoschoeni somnū affert. At oxychoeni due sunt species: altera sterilis, cuius quidem in medicina nullus usus est: altera uero semen fert: cōciliat uero & huius semē somnū, sed minus q̄ oligoschoeni: quamquam tamen hoc caput tenet. Vtrumq; si frictum cum uino bibatur, uentris fluxus desiccatur, & muliebri profluum rubrū sistit. Ex quibus clarum est, q̄ composita eorum temperies est, ex terrena uidelicet essentia leuiter frigida, & aqua leuiter calida: ut & inferna desiccare possint, & sensim frigidus ad caput uapores submittere, qui bus somnolentos efficiant.

Terminthos. Terebinthus.

Cap. 130

Terebinthi tum cortex, tum folia, tum fructus adstrictorium quiddam obtinent. Sed & secundo ordine excalfaciunt. Itaq; q̄ etiam desiccant manifestum est, recentes quidem etiam tum humidisq; modice sicci uero, ordine secundo. Cæterum fructus aridus propinquus est etiā tertio ordini desiccantium. Est enim adeo calidus, ut mandentibus protinus eius caliditas percipiatur. Itaq; etiam urinam prouocat, & lienibus prodest.

Teulon. Beta.

Cap. 131

Beta nitrosæ facultatis particeps est, qua tū di-

gerit tum extergit, & per nares purgat. Cæterū cōcta nitrositate omnē exiit, sitq; facultatis aphlegmantis, hoc est phlegmonis aduersæ, leuiter digerentis. Porrò ad detergendum digerendumq; ualidior est beta alba. Nam nigra adiunctum habet adstrictionis quippiam, & magis in radice quam alijs partibus.

Teucrium.

Cap. 132

Teucrium incidendi & tenuiū partium facultatis est: quare licentes sanat. Ponatq; ipsum quispiam in tertio exiccantium, secundo uero excalfaciēntium ordine.

Tephra. Cinis.

Cap. 133

Cinis, combustorum lignorū aut aliarum materierum reliquæ sic nuncupantur, cōpositæ ex contrarijs tum qualitibus, tum substantijs. Habet enim in se partim terrenum, partim uelut fuliginosum, græce zethalodes, siue lygniodes, id est fuliginosum, siue quomodo cunq; quis appellare uolet atq; hæ sanæ partes sunt tenues, & quæ maceratis aqua cineribus & percolata unā asportantur atq; abeunt. Quod uero reliquū est, terrenum est & infirmum, cinerum calida facultate deposita. Sed non omnis cinis eadem temperatura præditus est, sed pro cōbustæ materiæ diuersitate uariatur. At nescio quo pacto Dioscorides omnes cineres adstringendi habere uim proderit, cum ficulneus eiusmodi omnis uitalitatis sit expers, ut pote cum & ipsa arbor nulla sui parte acerbā quilitatē præferat, ceu quercus, ilex, arbutus, fagus, lentiscus, hederā, & hoc genus alia, uerum plenā quomodo ualido tota sit, eoque acri & calido. Ergo ex acerbis utiq; lignis factus cinis, nō parum adstringit. meminiq; me quandoq; cum aliud ad manum non esset medicamen, sanguinis suppressisse eruptionem. Verum nullus unquam ad tale uti ficulneo audeat. Si quidem hic acrimoniæ multū adurentisq; facultatis obtinet, mistæ absterfionis: & utroq; differt ab eo qui ex quercinis lignis conficitur, tum q̄ in eo fuliginē multo esse acrius, tū q̄ in illis terrenum quodammodo subadstringens est, in hac abstergens, ueluti in cinere tithymalorum. Est & calx cineris quædam species, cæterū tenuioris essentia q̄ qui ex lignis sit inimirū quanto lapides exactius torrerit in cinis fiat postulant: non tamen multum reliquū in se habet uelut naturæ igneæ, quod uocant *επιυροσυμα*. Proinde elo ta medicamen est citra morum desiccæ, magisq; si bis terū lauetur. Cæterum si marina aqua abluta sit, admodum digerit. Dicitur porrò de ea ubi de metallicis sermo habebitur.

Telephium.

Cap. 134

Telephium exiccandi & detergendi facultate est, nō tamen insigniter calida: uerum in hoc forsitan quispiā ipsum secundi esse ordinis censeat. Desiccatur tamen secundo ordine intensior: aut certe principio tertij: proinde ad putrida ulcera cōuenit, & utililiginem utraq; sanat cum aceto.

Telis. Foenumgræcum.

Cap. 135

Foenumgræcum calidum est secundi ordinis, desiccatur primo: proinde seruētes phlegmonas ir-

ritat acerbatq; quæ uero minus sunt calidæ, & magis duræ, eas digerendo curat.

Tithymalli. Cap. 136

Tithymalli omnes uincem habent acrem calidamq; facultatē, inest uero & amaritas. Validissimus itaq; eorum est liquor: secundū locum tenet fructus & folia. Sed & radix dictarū facultatū particeps est: sed non ex æquo. Sanè ipsa cum aceto de cocta dolores sanat detritū, maxime qui illis erosio proueniunt: at liquores, ut qui ualentiores uim habeant, in foramina quidem ipsa dentium induntur: cæterum si aliam corporis partem contigerint, cōtinuo adurunt, ulcerantq;: proinde foris illis cera circūlinitur: quippe eū ex quarto sint excoacti uisū ordine, quē esse adurentiū posuimus. Sic pilos quoq; succus inunctus tollit. Porro eū uehementior sit, oleo miscet, & si id eundem ac sepe fiat, tandem prorsum pilorū radices aduise corumpentur, corpusq; depile reddetur. Eadem facultate uerrucas, quas acrochordonas nominant, & myrmecias, & pterygia, siue oculorum unguis & thymos auferunt, detergentq; lichenas & sporas: quia scilicet & abstergendi facultas inest propter amaritudinem. Præterea ulcerum phagedænica, anthracode, & gargarode, quia ualēt tum excoactum, tum deliccāt, si in tempore & moderate utare, iuuare aliquando poterunt. Verū enim uero & fistularum callos eximunt. Cæterum hæc omnia genere quidem similiter, imbecillius tamē & folia, & fructus, prætare possunt. Quibus sanè & ad pisces in aqua stagnali capiendos uti assolēt. Celerrime namq; ab illis in uertiginē acti ac semimortui redditi, ad aquæ superficiem feruntur. Porro cum septem sint eorum genera, ualentissimus est quem characian nomināt, quē utiq; etiam quidam marem cognominant, & foemina nuncupata myrsinites: & qui in petris nascitur ad modum arboris: deinceps qui phlomo adsimilis est, & cyprisias: deinde paralius siue marinus; deniq; helioscopius. Proportione uero cōprehensæ illorū facultatis & cinis & lixijsium erit.

Tragacantha. Cap. 137

Tragacantha similem gummi uim obtinet, emplastica quamdam, & quæ acrimonia obtundit. Est sanè similiter illi deliccāt.

Tragion. Cap. 138

Tragii folia, fructus, lachrymaq; trahentis digerentisq; sunt facultatis. Est uero & tenuiū partiuū, & facultate in principio tertij ordinis calida: stipites & heretia corporibus extrahit, lapides frangit, menses mouet drachmæ pondere potum. Porro in Creta sola nascitur, lentisq; adsimile. Cæterum alterum tragium hoc minus, cuius folia scopendrio similia sunt, uisitur quidem multis in locis: sed non parum habet facultatis adstringentis; ut & ad fluxionum affectus conueniat.

Tragoriganum. Cap. 139

De tragorigano in sermone de origano supra est dictum.

Tribolos. Cap. 140

Tribolus ex humida essentia modice frigida &

licca non mediocriter & ipsa frigida cōponitur: in terrestri tamē superat terreū frigidū; quod adstringens ostēdimus: in aquatico uero aqueū. Propter utriq; itaq; cōtra phlegmonarū generationes, & omnino contra omnes influxus congruit. Porro terrestris ipsius fructus cum tenuiū sit partium potus lapides in renibus comminuit.

Tripolium. Cap. 141

Tripolij radix gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu.

Triphyllum. Cap. 142

Triphyllum, quidam asphaltion, quidam oxyphyllon, nonnulli myniantes, sunt & qui cnicium uocent: prima quidem tria ab accidentibus fructi, reliqua duo nomina haud scio unde. Vis plan tā est calida & sicca ut bitumen, cui odore est similis, utriq; tertio ordine. Proinde pota laterum dolores ab obstructione natos iuuat, & urinam mensesq; prouocat.

Trichomanes. Cap. 143

Trichomanes eadem prætare quæ adiantum.

Trychnon. Solanum. Cap. 144

Trychnon quidam præposito strychnum uocant. Esculentum quidem quod in hortis nascitur notum est omnibus, utunturq; ad omnia ea quæ refrigerari adstringiq; postulant. Potest enim hæc duo ordine secundo. Cæterorum non esculentorum unum quidē nuncupatur alicacabū, fructum habens rufum, acino uix tū figura, tum magnitudine adsimile quo & ad coronas utuntur: alterū uero fruticosum, à cōciliando somno hypnoticū; & tertium, quod insaniam afferat, manicū appellānt. Alicacabū igitur in foliorū facultate hortē soli solano simile est, fructū habens ciendæ urinæ idoneum proinde cōpluribus facultatibus cōpositis quæ ad iecur, ad uescicam, & renes accōmodantur, adiungitur. Solani uero hypnotici cortex radicis si cum uino bibat, somnū accersit drach: pondere sumptus. Sed & cætera quoq; papaueris succo per similia est, nisi q; hæcenus imbecillior est, quod ipse tertij habeatur ordinis refrigeratiū, cum hic positus sit in quarto. Huius solani semē urinam ciendi potestatem habet. Cæterum si plus duodecim corymbis hauseris, dementia quoq; adfiscet. Porro quod reliquum est ex propositis solanis, ad medicationes quæ intrō in corpus adhibent, inutile est. Nam si quatuor eius drachmæ offerantur, mor tem inferentis pauciores, saltē insaniam. Vna certe innoxie sumitur, cæterū nec ipsa utile quid obtinet. Verum si foris corpori emplastri modo illinatur, ulcera cacoethæ, & nomodæ, siue pascentia curat. Sed ad talia radicis cortex præfertur, desiccans secundo ordine tam completo, & tertio incipiente, refrigerans secundo incipiente.

Hyacinthus. Cap. 145

Hyacinthi radix bulbosa est, ordinis primi in desiccando: secundi uero completi, aut certe tertij incipientis in refrigerado. Itaq; pueros ditutissime seruare impuberes illita creditur. Fructus leuiter extergit & adstringit: quæ obrem & ipse regio morbo laborantibus, exhibet in uino, ordine quidē tertio

tertio quadantenus desiccans, cæterum in medio
consistens caliditatis ac frigiditatis.

Hydnon. Tuberterræ. Cap. 146

Hydnon omnibus nota sunt. Substantiam habet
uincensentem terrestrẽ quidem, sed tamen cum pau-
cula quadam tenuitate mistam.

Hydropeperi. Cap. 147

Hydropeperum à locis in quibus nascitur, & à si-
militudine quæ illi cum pipere in gustu est, nomẽ
sortitum est. Cæterum non usque adeo calidum
est quàm pipere. Attamen herba ipsa etiamnum ut
ridis cataplasmatris in modum imposita, singillata
& tumores induratos digerit.

Hyofoyamus. Altercum. Cap. 148

Hyofoyamus cui semen atrum est, infaniam ac
soporem affert: sed is cui semen mediocriter fla-
uum est, propinquam ei facultatem possidet. Ver-
rum utriq; fugiendi sunt ut inutiles & ueneni-
osi, seu deleteri. Cæterum cui semen ac flos candidus
est, ad sanationes uel maxime idoneus est, ex ter-
tio quodammodo ordine refrigerantium. Porro
flos eius quidem cui semen est nigrum, mediocri-
ter purpureus est: eius uero cui est subflauum, leui-
ter mali colorem refert.

Hypericum. Cap. 149

Hypericum calfacit & desiccac, essentia tenui,
adeo ut & menses & urinas prouocet. Sed ad hec
rotus sumendus est fructus, non tantum semen.
Porro cum folijs impositus uiridis ad cicatricẽ du-
cit ulcera cum alia, tum etiam ambusta. Cæterum
si sicca contusa inspergas, sanabis & mollia nimis,
humidaq; & putredinosa ulcerum. Sunt & qui is-
chiadicis bibendum exhibeant.

Hypecoon. Cap. 150

Hypecoon refrigerandi uim habet ex tertio or-
dine refrigerantium, ut parum absit à papauere.

Hypoglosson. Cap. 151

Hypoglosson inde adeo nucupata est, quod sum-
mis corymbis uelut ligulæ quædam exeunt. Cæterum
radix & succus fruticis emolliendi uim possidet.

Hysopum. Cap. 152

Hysopum desiccac & excalcac ordine tertio:
sed & tenuium est partium.

Phaci. Lentis. Cap. 153

Lentis ualenter adstringunt: medium tenent
caliditatis & frigiditatis, desiccant tamen in se-
cundo ordine: ipsum itaque earum corpus desic-
cat & sistit uentrem: cæterum decoctum prouo-
cat: eius etiam prior aqua abijcitur, ubi reten-
tionis causa adhibentur.

Phacos. Lenticula palustris. Cap. 154

Lenticula palustris humidæ frigidæq; tempera-
ture est, utriq; ex secundo quodammodo ordine.

Phaleris. Cap. 155

Phaleridis tum succus, tum semen, tum folia po-
tari utiliter creduntur ad uescicæ dolores, cuius se
se habeant tenue quiddam & calidum.

Phalangites. Cap. 156

Phalangites, sic appellata est, quod morsis à
phalangijs auxilietur: est autem facultatis tenui-
um partium desiccantis: quam obrem & tormina
patientibus succurrit.

Galen.

Phlomos. Verbascum. Cap. 157

Phlomos, quidam per pliteram & scribunt, &
proferunt. Quædam folijs alba est, quædam uero
nigra. Et albæ quidem mas est, cuius folia angusti-
ora: scemina, cuius maiora. Et præter has est alia
phlomos agria cognominata, flores habet aureos
& luteos, siue melini coloris. Sed & alia præter
has est, quam proprie phlomida nominat, & thry-
allida. Priorum itaq; duarum radix acerbæ gustu
est, & fluxionis affectibus prodest. sed & ad den-
tium dolorem eam quidam colluunt. Attamen fo-
lia digerendi uim habent: sic & aliarum folia, & ma-
ximè eius quæ aurei coloris flores obtinet, qui etiam
pilos flauos faciant. Omnium enim folia desic-
candi & detergendi uim possident.

Phoenix. Palma. Cap. 158

Phoenix arbor adstrictoria facultatis omnibus
sui partibus est particeps. Igitur ramorum succus
est, ex aqua substantia tepida & terra frigida co-
stans. Similis facultatis est encephalos quem uo-
cant, hoc est cerebrum siue medulla, esui aptus.
At fructus eius, & maxime dulcis, non paucam
obtinere caliditatem. Cæterum cum edendo sit,
multo est usui, non tantum foris impositum, ubi
quid roborare & desiccare, contrahere, stipare,
densareq; consilium est: sed & tanquam cibus sum-
ptus & simul cum alijs & per se. Porro quod elax-
ten uocant, nempe tenerum illud palmæ germen
eandem cum cerebro eius facultatem possidet.
Quod uero uelut tegmen eius est, adstringentem
& ipsum ualenter habet, uerum plus quam di-
cta omnia exiccat: utpote quod & essentia con-
sistentia illis siccius est, & minimum habet humidi-
tatis. Itaq; iure utuntur illo ad ulcerum putrescenti-
am, miscentq; medicamentis articulos plus iusto la-
xatos contrahentibus: ad hæc facultatibus hepatis
& stomachicis, seu in tro sumantur, seu foris ad-
moueantur. Sed & radix plantæ desiccatoris citra
morsum facultatis est, ad iunctum habet & ipsa ad-
strictioris quippiam.

Phorbion. Dioscoridi oryminum. Cap. 159

Phorbij semine ad leucomata, hoc est albugi-
nes, cum melle applicant. Sed & spicula extrahere
creditur. Porro & ipsa herba idem præstare ui-
detur. Ex quibus constat quod tenuium partium,
& attrahendi detergendiq; potentiam obtinet.

Phu. Cap. 160

Phu, odorata quodammodo est huius herbæ ra-
dix, nardo uiribus similis: sed tamen ad pleraq; in-
firmior, urinas mouet plusq; quam India, aut Syri-
ca nardus, perinde ut Gallica.

Phycos. Alga. Cap. 161

Phycos humens etiamnum & uires ex mari ex-
emptus desiccac & refrigerat ordine secundo: ha-
bet enim quiddam modice acerbum.

Phyllitis. Cap. 162

Phyllitis cum qualitate sit acerbæ, non absurde di-
arrhoeas, siue profluuia, & dysenterias pota iuuat.

Phyllon malabathru. Folium malabathri. Cap. 163

Folium malabathri nardo simile uim possidet.

Chalbane. Galbanum. Cap. 164

Galbanum succus est plantæ ferulaceæ molli-
endi & digerendi ui. Fueritq; sanè ex tertio ordi-
ne excalfacientium incipiente, aut secundo com-
pleto: in deficcando uero ex secundo incipiente.

Chamædrus. Cap. 165

Chamædrus uincemem habet qualitatem ama-
ram: est & quodammodo acris. Quocirca meri-
to lienes colligat, & urinas ac menses prouocat,
crassitudinem humorum incidit, & uiscerum ob-
structiones purgat. Ponatq; eam quispiam in ter-
tio ordine excalfacientium & deficcantium: plus
tamen calfacit quam deficcet.

Chamæcissos. Cap. 166

Chamæcissi flos cum sit admodum amarus, ie-
cur obstructione liberat, daturq; ex coxendice
laborantibus.

Chamelea. Cap. 167

Chamelea uincemem habet qualitatem ama-
râ: quâ obrè admodum sordida ulcera, & quæ maxi-
mas habent crustas, cum melle purgare potest.

Chamæleuce. Cap. 168

Chamæleuce calidâ facultatis est tertio quo-
dammodo ordine, siccâ primo.

Chameleon. Cap. 169

Chameleontis radix, nigri quidem, letale quid-
dam obtinet; quamobrem foris utiq; usus eius ad
pforas adhibetur, & lichenas, & uiligines, & in
summa, quæ deterfionem postulant: præterea di-
gerentibus & emollientibus pharmacis commi-
scetur: & phagedénica ulcera sanat illita. Est enim
sicca tertio ordine, calfacit uero secundo ordine
absoluto. Porro albi chamæleonitis radix potui da-
tur cum uino austerio mensura oxybaphi. Exhibet
sanè etiam aqua inter cutem laborantibus admisi-
lem habentem temperiem ipsius nigri radicis, nisi
quatenus illa acrior est.

Chamæpitys. Cap. 170

Chamæpitys gustu quidem amarum saporem
ualidiorem acris obtinet, effectu uero expurgat
abstergitq; uiscera plus quam calfacit: proinde au-
riginolis, & omnino quibus facile iecur obstruif-
, bonum est remedium. Quin & menses ducit tum
pota, tum apposita cum melle. Sed & urinæ mo-
uendæ medicamè est. Sunt autem etiam qui eam
exhibent decoctam in melicrato quæ coxendi-
cis doloribus torqueatur. Herba porro ipsa uiridis
uulnera magna conglutinât, & ulcera putrescen-
tia sanat, præterea uberum duricies discutit. Est enim
in siccâdo ordinis tertij, in calfacièdo uero secundi.

Chamæsyce. Cap. 171

Chamæsyce abstergendi simul & acré uim pos-
sident. Itaque acrochordonas & myrmecias caules
eius teneriores in modum cataplasmatis admoti,
quicq; ex eis profluit liquor, auferunt. Cum melle
uero crassas oculorum cicatrices detergunt: sed &
hebetudinem uisus à crassicie natam adiuuant,
sicut sanè & suffusionum principia.

Chelidonium. Cap. 172

Chelidonium extergentis admodum & cali-

da facultatis est: sed & succus eius ad acuum
uifum cõmodus est, utiq; in quibus crassum quid-
dam in pupilla colligit digestione atq; discursio-
ne indigens. Vfi sunt radice eius quidam ad auri-
ginem ab obstructione iecoris proficiscentem, in
uino eam albo potui exhibentes cum aniso. Simi-
liter manfa confert dentium doloribus. Porro che-
lidoniũ minus cum acrius sit maiore, in cataplas-
mate impositum, celeriter cutem exulcerat, un-
guesq; scabros eijcit. Succus eius per nares pur-
gat, utpote admodum acer. Itaq; hæc herba quarti or-
dinis fuerit calfacientium incipientis. Maius autè
chelidoniũ tertij est ordinis absoluti iam, idq; tum
in calfacièdo, tum in siccâdo.

Chondrila. Cap. 173

Chondrila, & cham quidam serin nominant. Est
enim eiusdè ferè cum illa facultatis: nisi q; gustu a-
maruifcula est ac proinde facultate siccantiore.

Chondrus. Cap. 174

Chondrus est sanè nutrimentum optimũ, sicuti
& triticum: sed huius instituti non est de nutrime-
to distinguere: uerum ut medicamen emplastice
facultatis est, temperie tritico similis, plus tamen
illo uiscosus: quare sanè etiã illo plus nutrit. Estq;
ceum materia quædã idonea excipiendis aceto, ma-
rina aqua, muria, & id genus alijs ualenter deficcã-
tibus: proinde quidã ex genere admodum exiccã-
ntium esse & hoc semen autumarũ. Cæterũ chon-
drus ex numero est potius concoquentium, ut &
triticum, quæ minime profecto deficcant. At ob
exiccantium medicaminũ admisionẽ, cum quod
ex illis compositum est, exiccatorum sit, medicor-
um complures in errorem inducti sunt, ut falsò
putarent deficcationem chondro acceptam feren-
dam, ijs quæ admista erant præteritis.

Chrysome. Cap. 175

Chrysome, uocæ & chrysites. Radix uincen-
tes habet acrem simul & adstringentẽ qualitates
quare non admodum multi usus est. Vfus tamen
est decocta in melicrato in peripneumonijs, &
morbis hepaticis siue iecorarijs: sed & menstruæ
purgationis prouocandæ uim quandam obtinet.

Pseudodictamnium. Cap. 176

Pseudodictamnũ imbecillè dictamnũ uim habet.

Psyllium. Cap. 177

Psyllium semè habet admodum utile, ex secundo
refrigerantiũ ordine: in deficcando uero & hume-
tando medium quodãmodo est & symmetrũ.

Ocimum. Cap. 178

Ocimum ex secundo est ordine calfacientium;
habet autem recrementitiam humiditatem: pro-
inde nec commodum est quod in corpus sumat-
ur. Cæterum foris impositum, ad digerendum &
concoquendum idoneum est.

Ocimoides. Cap. 179

Ocimoides, quidam philiteriũ cognomi-
nant. Radix superuacua est. At semè
tenuiũ partium, & deficcatis
citra mordicationem fa-
cultatis est.

Proœmium, quo continetur primum propositio sequentium: deinde de acrimia & astringentium differentia. Contra illos quæ acria & cōstringentia cōfundunt. Vsta nulla esse frigida: sed acria dum uruntur, multum sui caloris deponere: reliqua vero calidiora fieri quàm prius erant. Cap. 1. De differentijs terræ secundum rusticos, philosophos, & vulgus. 2. De differentijs terræ vulgo dictæ, est autem ea quæ in tenax lutum commixta, ac facile ab humore soluitur. Et primum de Lemnia terra, quæ triplex est. De peregrinationib. suis, & Lemni topographia. De diuersis viribus terræ Lemniæ cum experimentis Galeni. 3. De ablutione terræ.

4. De terra Samia, Selinusiæ, Chia, & stella Samia. 5. De Cimolia. 6. Recenset quædam communia omni terræ. Omnis terræ proprium igne nõ fundi. De ampelide terra, Cretica, Eretria, & Pnigitide. 7. De bolo Armeno, cum multis experimentis.

8. De lapidibus in genere: & priuatim de hematite. Quod veteres masculino, posteriores fœminino genere sition dixerint, & quod petram aliqui uocent nõ quæuis lapidem, sed unum duntaxat genus durissimum, se promiscue uti. 9. De hematite, galactite, melitite, Experimenta Galeni. 10. De schisto. 11. De thytex Aethiopia. 12. De Iudaico, & experimentum de eo in calculo renum. 13. De pyrite, & emplastro ex eo: communici lapidum apparatus, & de arena.

14. De phrygio. 15. De agerato. 16. De Afsio. 17. De Gagate cum experimento suo. 18. Magnes. 19. Arabius. 20. Alabastrites onyx. 21. Smiris. 22. Pumex: uide etiam infra cap. 40. 23. Lapides in spongijs, & lapides Cappadocij. 24. De ostracite, & Geode, & cote naxia. 25. Ophi

tes. 26. De iaspide uiridi, & omphacitide (actius & Paulus Ophitin legerunt). De hieracite & Indico. 27. Sapphirus. 28. aphroselinus & hieractes. 29. De Metallicis pharmacis. 30. De salibus: de quibus etiam infra libro xi. prope finem. 31. De sale armeniaco. 32. arsenicum. 33. De aphonitro, & aphonitro. 34. Gypsus, cum experimento Galeni: & Gypsus usit. 35. Diphryges, cum experimentis. Quod adolefens adhuc didicerit magna mercede data, Lemnium sigillum, pompholygem, opobalsamum, & Lycium Indicum ita mentiri, ut à ueris nemo discerneret. 36. De sulphure, cum experimentis suis: 37. De arrigine: & quæ falsò dicantur epulotica, id est cicatricem ducentia. 38. Cadmia. 39. Cinna bari. 40. Pumex: de quo etiam supra cap. xxij. 41. Lixiuum è cinere. 42. Cyanus. 43. Squama aris & ferri, & stomomatis. 44. Lithargyrus. 45. Nitrum: cuius etiam infra meminit circa finem undecimi. 46. Melanteria. 47. atramentum scriptorium. 48. Misy. 49. Molybdæna. 50. Plumbum & quod crescat: de utilitate plumbei mortarij ac pistilli, Experimenta. 51. Testa. 52. pompholyx, spodium, & antispodium. 53. Sandarica. 54. Sandix, uide cap. 66. 55. Scoria, cum experimento. 56. Stimmi. 57. alumen, triplex. 58. Calx. 59. Hydrargyrus, id est argemum uiuum. 60. Fucus: uide ca. 66. 61. Calcanthum, id est atramentum futurum. De scriptio sodinæ in Cypro. 62. Chalcitis. 63. asustum. 64. aris flos. 65. Chrysocolla fossilis & factitia. Vide infra libro decimo, capite decimo sexto, ubi de hominis urina agit. 66. Cerussa, sandix, fucus. 67. pforicon.

GALENI DE SIMPLICIUM

MEDICAMENTORVM FACULTATIBVS

Liber nonus.

PROŒMIUM.



VOT QUOT plantarū partes sunt, & fructus, & succi, atq; liquores, supra dicta sunt omnia. Nunc autē de reliquis medicamentis, quæ metallo rum genere cēsentur, quæq; ipsius terræ species sunt differere propositum est: post quæ deinceps nõnihil tractabit. De partibus animalū, utiq; quibus ceu medicamentis ad curatiões utimur. Ceterū prestare mihi uideat, cōmuniter de illis omnibus præfari, quo uideat, tum clarius intelligi possint, tum quæ dicēda sunt, distictē ceu in articulos inaudiant. Nā si quis in omnibus sequatur scriptores siue medicamentorū, siue materiarum, siue illorum præparandorū: in multis profecto turpissime allucinabit, & ea quæ præfinit ac determinate à me posita sunt, perperā accipiet. Ceterū cū duo sint capita cōmunis orationis iam proponendæ: Alterum est, in sponte nascentium medicaminū quæ cōbusta sunt, calidiora arbitrari oporteat, an frigidiora: Alterum de medicamentis adstringentibus, quorū in genere esse supra ostensum est tum austera, tū acerbata. Itaq; super his quidem in quarto horū cōmētariorū uerba fecimus: sed & modo commemorare satius fuerit, medica-

Galeni.

mentis adstringētibus & facultatē & qualitatem inesse cū acribus pugnantissimā. Adstringunt em̄ Acacia, Balaustrū, Hypocystis, Cytini, Galla, Rheon, Rhus, Omphaciū, Mespila, Corna, Malicorium, Myrta. Acria uero sunt Euphorbiū, Allium, Capa, Porrū, Sinapi, Piper, Gingiberi, Smyrniū, Origanum, Pulegiū, Calaminthe, & Thymus. Reuocandū itaq; in memoriam duntaxat qualem cuiusq; dictorū percipimus sensum, & protinus sequetur qualitatis eorū diuersitas, quā in quarto libro exposui unā cū alijs omnibus gustus differentijs. Sanè contrahunt cōstipantq; atq; cōdensant substantiā nostrā adstringētia: ac proinde in quauis corporis nostri partē extrinsecus imposita, continuo illā rugosam et contractā efficiunt, cōtra q; acria, quæ imposita cuti perspicuo eam excalcaciūt atq; in molem attollunt, rubente colore: ac si diutius immorent, etiā ulcerant. Hæc itaq; euidenter apparent tum incidere, tū excalcacere, tum etiam à uicinis partibus ad sese sanguinē attrahere: et ad stringentia refrigerādo, cōtrahendo, cōstringendoq; in illis etiā contentū repellere. Facultas itaq; aduersissima est adstringentib. cum acribus: nec quæ in gustu apparet qualitas, simile quippiā obtinere. Quid ergo nonnullis in mentē uenerit, ut piper, allū, atq; adeo acria omnia adstringere dice-

tom. 5

l 2 rene

rent, sanè cogitatōe assequi nequeo. Nā si ut hæc adstringere dicitur, ita Rhum, Balaustrū, Omphaciū, Meipilū, & quotquot eius sunt generis, acriā cognominarēt, diuersa ac cōmutata in nominib. cōsuetudine: ignaros profecto illos uocū, & earū significatū, nō tamè gustandi aut olfaciendi care re iudicio dicerem. Nunc uero cū res duas & olfactū, & gustū, & effectibus suis contrariā inter sese naturā ostentantes, una appellatione nuncupent; admirāda profecto hominū aut stupiditas est, aut dementia, aut simul utraq; perinde em̄ faciūt atq; illi qui & ignis, & niuis eundē esse sensum aiunt. Atq; adeo in quēdam quondā incidi, qui prae tam aliena atq; absurda usurpandorū uocabulorū cōsuetudine diceret nihil prohibere quo minus diceretur nix eandem igni habere tum qualitatem, tum facultatē: quia uidelicet & hæc quādoq; uisā sit pedes diutius per eam ambulantium adussisse. Sanè non pro paruo tēpore opus est, ut illis hominibus sordem animi expurges. At quibus non in tam profunda ignorantie caligine degere cōtingit, ac quartū horum cōmentariorum periegerint, ijs quæ iam dicta sunt, memoriæ causa repetita sufficiunt. quō distincte nomina de quacūq; propriarū rerum ita inaudiāt, quæ admodū Latinis efferre Græcisq; mos est. Trālibo uero ad secundū scēma siue speculationē, haud etiā de nomine & significatio eius habendum, uerum de rei natura. Nam pleriq; existimāt combusta omnia seipsis effici frigidiora. Alij e contra, cōbustorū omnium augeri caliditatem existimant: utriq; sanè errātes. Conspiciūt enim liquidd quædam calidiora reddita & adgustum, & ad tactum, & eam quæ in usū cernitur facultatē: uelut supra dicebam de acribus & adstringentibus. Quædam contra adustione minus apparent calidæ: idq; clare discernimus tū tactū, tum usū. Dico autem usum, cui ante dixi, cum cuti imposita alia calidiorē rubentiorēq; partem efficiunt, alia exanguem & frigidam: et alia molem at tollunt, alia contrahunt. Igitur acriā multum caloris amittunt usta. At quæ eiusmodi non sunt, assument. Sanè cōbustorum omnium nullum planè est frigidum. Relinquitur enim in illis uelut *εμπύρεον*, hoc est ignitio quædam; nā ita uocabat Aristoteles: atq; id est quod per ablutioes detergitur, ex cōbustorum substantiā subtilissimum: quod ubi cum aqua abierit, quod usui reliquum est, substantia terrena est. Siquidem humidum omne combustio absamit, reliquum aut terrenum est unā cum empyreumate ab Aristotele uocato. Hoc ergo ubi per lotionem ablatum ac semotū fuerit, aqua in qua medicamen ablutum est, calidam adficiunt facultatē, eamq; tenuium partiu: quod reliquum uero est, terreum est, desiccare citra mordacitatē potens. De his quidem & supra diximus: ceterum nihil deterius est in memoriā nunc ea reuocasse, ut refrecta illorum memoria, simul quæ dicenda sunt, exactius quis assequatur.

De terre differentijs. Cap. 1

Cum duæ sint res quæ terræ uocabulo significatur, necessarium duxi prius eas distinguere,

ut clariora sint quæ dicēda ueniūt. Altera sanè Græcis pariter Latinisq; consueta est. Siquidē ubi tritū cū, hordeū, aut aliud quodpiā seminū, quæ cerealina nūcupant, seminant, mediocriter humidā esse terram oportere aiunt: at ubi uites, ficus, oleas, aut aliam quāuis arborem plantant, fugiendā præcipiunt tum eā quæ uliginis planè expers sit, & arida, tum quæ humidā sit & lutosā. Nā lutū uocant terram humidō maceratā. Tum qui de colēdis agris seu georgica cōscribunt, in regionū differentijs atram terrā, argillosam, arenolamq; discriminātes effertur: sed & pingue terrā uocāt, ex qua lutum fit uiscosum ac lentū. Alterā uero contra q̄ hanc dispositā, quæ lutū efficiat, pinguitudinis expers, & friabile, ut sic dicam. Atq; hoc est unū terræ uocabulū significatū, omnibus usitatū. Alterū est solis philosophis usurpatū, cum aiunt elementa corporum esse terram, aquam, aerem & ignem. Corpus nanq; extreme siccum ac frigidum terrā nuncupant. Secundum hos ergo nullum cōpositorum corporum terra censetur elementaris: aiunt tamē ea plurimū habere terræ, puta adamantē, & saxa; & quanto corpore fuerint duriore, tātō magis eadicitū esse terræ, contra q̄ agricolæ. Haud em̄ quo durior sit corporum cōsistentia, eo plus terræ esse dicitant, uerum lapides & petras planè ad agriculturam esse ineptissimā contendunt. Cæterum eam esse terrā dicunt exactissimā, quæ q̄ longissime recessit a saxi cōsistentia; quippe cū & argillosam & arenosam ad plerāq; damnent inuilem. Secundum itaq; significatū quod à philosophis celebratur, tribus finietur generibus terræ differentia. Siquidem unum eius genus lapis est, alterum corpus metallicū, tertiu uero terra quæ coliffacta apud eos differētia de metallicis corporibus quæ fundi possunt, uelut ære, stāno, plumbo. Hæc em̄ quidam aiunt nō terre, sed aquæ plus cōtinere. At tamen ceteri homines oēs eam duntaxat terram nominant, quæ humidō macerata lutū efficiat: de qua utiq; et ego nunc statui differētias exponere, id modo præfatus, q̄ proposita sectio corporū terrenorū in lapides, metallica, & terrā quæ colitur, absq; corporib. quæ proprie physica seu naturalia nominant, dicta est. Nā si ea accedāt, tū ligna omnia, & fructuū partes cōpures, uelut etiā animalium, essentia esse terrena dicent: fructuū quidē partes, ut nucleoli utuarum, & acini utuarum, putamina nucum & conorū, & eius generis multa alia. Animalium uero, ossa, cornua, dētes. Verū de plantarū partibus, quæ terrenæ utiq; sunt & duræ, partim iam supra dictū est, partim etiam nunc dicet. Et de ijs quæ animalium sunt infra tractabis, ubi prius terræ species absoluerō. Licet em̄ ea tibi aut differentias, aut species, aut etiā appellare genera. Dico autem hæc, lapides, metallica corpora, terrā in lutum solubilem. Ac primum omnium dicā ab Latinis nuncupatæ terræ differentias, quæ cōmune hoc habet: ut addita aqua continuo soluantur & fiat lutū. Nam quod à philosophis sic appellatur, non habet omnibus commune, sed illis tantū cōsuetum ac celebratum significatū.

De differentijs nominatae passim terrae Cap. 2

Terram usitate Latinis uocari dixi, quae iniecta aqua statim soluitur, et fit lutum. Huiusmodi ergo est quam homines ad culturam elaborant, differentias habens quasdam sanè secundum propriam rationem, dum pinguis est & uiscosa, quae utique omnino & atra colore est: alia uero fibrilior, & pinguitudinis expertis, quam uocant argillā, quae sanè quodammodo candidior est. Atque haec contrariissima sunt differentiae. Alię harū in medio sunt, alteri atque alteri magis accedentes: atque adeo quaedam etiam quae ex æquo ad unguem in medio, pari intervallo ab utraque distant. At aliae sunt terrae differentiae ex diuersi generis corporum naturae commistione, quae ratione lapidosa & arenosa habentur: atque admixtata talium substantiam segregat largae aquae effusione ac maceracione, dum totum humidum efficiatur. Cum enim id effectū est, id quod defertur atque inest lapidosum atque arenosum, id omne subsedit, et terra exacta supernat. Tale quiddam & in Lemnia terra uisitur, quae cognominatā, quidam milton lemniam, id est rubricā lemniam, & alij quidā sphragida lemnia, hoc est sigillū lemnium, ob impressum uidelicet illi sigillum, Dianae sacrum. Siquidem hanc terram sacerdos cum patrio quodā honore sumēs, haud macctatis animilibus, sed tritico atque hordeo piamenti gratia terrae redditus, in urbem comportat: quam deinde aqua maceratur, atque in lutum redactam, ubi ualenter cōturbaui, paulumque inde quiescere sinit, aquam quae supernat, aufert, & mox quod sub ea est lutum tollit, ac reliquum dumtaxat quod ad inum subsedit, lapidosum scilicet et arenosum, relinquit ut in usum ac superuacaneū. Porro lutum illud pingue uiscosumque deficcatur, dum mollis cera consistētiam accipiat: huiusque exiguis acceptis particulis, sacrū Dianae signum imprimit. Ac postea rursum in unbra sicca dum reponit, donec omnē planiē humiditatem amittat, fiatque illud medicis omnibus cognitum medicamē lemnia sphragis, siue sigillum. Sic enim quidā illam cognominat ob impressam illi sphragida, hoc est sigillum: ceu etiam nonnulli ob colorem lemniam milton siue rubricam appellant. Verum ab ea differt, quod contactu nō contaminet atque illa: & secundum collem in Lemno quitotus colore fuluo est, & in quo neque arbor, neque planta nascitur, tantum huiusmodi terra uisit. Porro tres eius signant differentias: una quā posuimus terrae sacrae, quā alij nemini praeter unā sacerdotē contingere fas est: altera uero eius quae reuera miltos est, siue rubrica, utuntur autē ea potissimum fabri: demum tertia eius quae extergit, qua utuntur qui lintea & uestes lauant, quibus utique collibitum est. Ceterū cum & apud Dioscoridem & alios quosdam scriptum legissem, lemniae terrae hircinū misceri sanguinē, atque ex luto quod ea missione cōficebatur, sacerdotem lemnias sphragidas tum conformare, tum consignare, cupiebam profecto & ipse missionis modū inspicere atque symmetriā. Itaque quemadmodū in Cyprum nauigaueram uidentorū quae in ea sunt metallorum

Galen.

A gratia, & in caua Syriam Palaestinae partem profectus fueram, bituminis & aliorum quorundam inspicendorum causa, ita nec in Lemnum enauigare piguit, ut quantum sanguinis terrae admisceretur, conspicerem. Nam iterū cum Romā pedestri peterē itinere per Thraciam & Macedoniā, prius a Troade Alexandrae in Lemnum ad nauigandum nactus illic nauē quae ad Thesalonicae cursum destinabat. Conueniebā autem cum nauclero, ut in cursu Lemno appelleret. Et sanè ille praestitit, sed non ad eam ciuitatem ad quam oportebat. Antea enim nesciuerā duas esse in insula ciuitates, sed credebam, ut Samus, Chius, Cos, Andrus, Tenus, & omnes adeo quae in Aegeo sunt mari, unam dumtaxat ciuitatē habēt toti insulae cognominem, ita et Lemnum nominis sui unam habere ciuitatem. Porro ut ex nauē descenderē, intellexi ciuitati nomen esse Myrinae: nec in regione ciuitatis illius aut Philoctetis templum esse, aut sacrum Neptuni collem, sed in altera quae uocaretur Hephestia: nec ciuitatem eam Myrinae esse propinquā. Cumque me nauclerus expectare nō posset, distuli, ut cum Roma in Asiam redirem, tūc Hephestiadā uiserem: id quod feci prout sperauerā & proposuerā. Nam ubi ex Italia in Macedoniae traiecissem, eamque penē totā pedestri itinere pertransissem, peruenissemque Philippos, quae ciuitas est finitima Thraciae: inde ad mare descendi quod proximum ab erat centū uiginti stadijs: primumque Thason insulam distantem plus minus ducentis stadijs: atque illic in Lemnum septingentis, ac rursum ferme septingentis in Alexandriae Troadae traieci. Ac proinde sanè ex industria tū de nauigatione, tum de stadijs adscripsi, ut si quem eadem quae me caperet Hephestiadā uisendi cupiditas, cognito eius situ, sic nauigationem institueret. In tota nāque insula Lemno orientem spectat Hephestia, occidentem uero Myrina. Et quod a poeta dictum de Vulcano est, qui graece dicitur Hephestus, De cidit in Lemnum, propter collis naturam occasio nem suspensisse fabulā crediderim. Apparet enim cōbusto simillimus tū colore ipso, tū etiā quia nihil in eo nascit. In hūc itaque collem sacerdos quo tempore ergo ad insulam accesserā, egressa, certo quodam tritici hordei que numero in terram coniecto, alijsque quibusdam pro religione patriae perperatis, plaustrū totum terrā impleuit. Atque ubi in urbē cōuexisset, quo dixi modo, illas fama hominum adeo celebratas lemnias sphragidas praeparabat. Visum ergo mihi erat percontari, nunquid unquam antea hircinū aut caprinū sanguinem hūc misceri solitum, memorias proditum accepisset. Quo audito omnes in risum soluti sunt, nec ijs sane quiuis ex uulgo, sed uiri oppidō cōseruditi cum in alijs, tum praecipue in uniuersa patriae historia. Quin & a quodā librum accepi quondam ab incolarum quopiam cōscriptum, qui omnem lemniae terrae usum edocebat. Quamobrem nec me quoque piguit huius medicamēti periculum facere, acceptis sphragidum uiginti millibus. Sed & is a quo librū dono accepi, inter principes habitus,

tom. 5

13

ad

ad multa hoc utebatur medicamine. Siquidem ad uulnera tum uetera, tū cicatrici inducēdæ contumacia; ad hæc ad morfus uiperæ, atq; adeo oēs ferarum morfus, necnō aduersus medicamētā letalia nō ante modo exhibere, sed & post sphragide uti cōsueuerat. Addebat porro sese periculum fecisse medicamētū, quod quia fructum iuniperi accipit *ὅτι τῆς ἀρκυδίδος* uinum nuncupat, cui utiq; indēbat & terra lemnia: uomitūq; ciera eiebat, si quis cum etiā nū in uentre letale uenenū hareret, alexiteriū siue amuletū ebibisset. Et sanē nos quoq; huius fecimus periculū in lepore marino, et cantharidibus, cum sese tale quippiam accepisset homines suspicārētur; uerum haustum quod lemniam sphragida habebat medicamento, protinus omne euomerunt, nec postea ullum illis accidit symptoma eorum quæ ad leporē & cantharides comitari cōsueuerunt. tamen si cōiūcta esset perniciosorū medicaminum exhibitio. Cæterum an ad alia mortifera medicamenta, hæc inquam quæ uocant deleteria, eandem uim habeat medicamentum quod ex fructu iuniperi & terra lemnia conficitur, mihi utiq; ignotū est. At ille ab Hephēsiade profecto asserebat, adeo ut & rabientis canis morsum eam sanare diceret in uino diluto epotā, at ulceri ex aceto imperse acri impōitā. Sed & aliarum ferarū iūctus ex aceto sanare referebat, extrinsecus folijs insup̄ impōsitis, quæ putredini resistere didicimus. In primis uero prædicabat Scordium, dein de Centaurium exile, inde Marrubium. Porro si quādo nos sanē ad ulcera cacoethæ & putrida terra lemnia adhibuimus, magnifice profuit. Vfus autē est pro prauitatis ulceris magnitudine. Quippe id quod grauiter olet, impēdiōq; laxū molleq; est, ac fordidum, sustinet ut uel per acerrimū acetum lemnia terra in lutofam soluatū consistentiā, aliorū more pastillorū, quorū alius alio uti: dico autē Polyidæ, & Pasionis & Andronis, & eo qui nunc inuentus est, & Bithynus appellatus. Si quidē hi oēs ualēter deficcātes profunt ulceribus contumacibus, soluti interim quidē in uino dulci, interim sapa, interim œnomelite, nōnunq; etiā alborū quopiā, aut fuluorū, aut flauorū, prout nimis uis postulat. Nā de talibus alibi definies. Similiter uero quandoq; soluunt aut ex aceto, aut uino, aut aqua, aut oxymelite, aut oxycrato, aut melicrato. Porro lemnia terra ex aliquo cōprehensorum soluta, medicamē sit idoneū tū recētibus glutinandis uulneribus, tum medendis irueteratis, egre ad cicatricem uenientibus, & contumacibus. Similiter autē & alia quæuis terra pharmacodes siue medicamentosa. Necessē enim erit distinguere, sicuti supra, ab elementari terra, in qua & lapides comprehendebantur, eam quæ in lutofam soluitur: sic nunc ab ea quæ colitur, quæ medicamentofam: nihil enim deterius erit ita eā cognominasse quæ ad curationes utimur: tamen si eius quoq; quæ colitur, si qua pinguis est, cōmoda est ad curationem earum omnīū partium quæ deficcari possunt: unde sanē ea & Alexandriæ & per Aegyptum utuntur multi sua utiq; sponte ac iudicio, multi uero e-

tiam moniti somnijs. Vidi enim Alexādrig quosdam aqua inter cutem laborātes ac lienosos Aegyptiæ terræ luto utētes, qui sibi furas, femora, cubitos, brachia, tergū, latera, pectusq; inungerent, ac perspicuo iuuarentur. Eūdem in modum & ueteres phlegmonas, & laxa œdemata adiuuat luto hoc. Noui siquidem quosdam, qui ex immodica per hæmorrhoidas euacuatione turgētes effecti ac tumidi, nō obscure fuere a diuiti. Sed & quidam diutinos fixosq; parte quapiam dolores perpessis, luto hoc planē persanati sunt: deficcandi nanq; uim terra quæuis possidet. Quoniam uero corpus eius natura siccum est, & quia prorsum igne substantiæ missionis est expertus, ita deficcatur, ut minime sit mordax: ad quod tamen etiam proficit si lauetur.

De terre lotione.

Cap. 3

Cæterum lauatur terra omnis ad eundem modum quo propositum est de lemnia. Primū quidem maceratur aqua, quæ nullam habet medicamento sã qualitatis suspiciōnē: at ubi lutum confederit, effundit quæ innatat aqua: ac quod in fundo erat, segregat à lapidosis atq; arenosis quæ ad imum referētur. Ac si exercitauū habeas gustandi sensum, ipse iudex eris accuratus, quæ oporteat terram lauare, quam nō. Nam quædam lauari nō desiderant, quædā etiā bis terq; elui exposcunt. Ac lemniam quidem paratā accipis semel à sacer dote lotam, quæ iterum ablui non exigit.

De terra Samia.

Cap. 4

At Samiam ne lauari quidem opus est: utimur autem altera eius specie magis, quam Samium altera cognominant, ad sanguinis expuitiones un decūq; natas, uelut etiam Lemniō sigillo. Eadem ut iuuant sanguinis ex utero profluuis, & uocant fluxum muliebrem, Quin & profunt exulcerationibus dysentericis antequā putrescentia euadant ulcera. Nomen id genus affectus appellare medicis mos est, ab eo quod putredo depascatur, & ad uicinas partes serpat, quod græce dicitur *νεμεδω*, uñ cum primū uitiata & ipsas corrumpens. Tamen si etiam in istis quādoq; sum uisus Lemnia, & palam profuit tum per sedē infusa, tum epota, utiq; antea: quod facere solemus ulceribus melicrato priore ablutis, posteriore uero muria. Inijciebat ergo per succū arnoglossæ: bibebatur uero ex oxycrato aquoso. Sed nec parū efficacioribus uide esse uiribus Lemnia terra quàm Samia: quare nec ea quæ iam phlegmone tētari cœperint, uim eius perferunt, sed clare irritantur, atq; exasperantur, potissimum si uir sit habitus mollioris, quem malacofarcon Greci uocat. At à Samia adeo non exasperatur ulla sic affectarum partium, ut etiam mitigentur, maxime quæ humidiores sunt & laxiores, uelut ubera, testes, adenes. Idonee autē utaris terra eiusmodi, si ubi ad leuorē redegeris per aquā, tantum admisceas olei rosati boni, quod misione sua medicamentū à resicatioe prohibeat: sed & commodum utileq; est, ubi sic præparatum fuerit, ad alias quoq; phlegmonas calidas, & bubonas incipiētes, & fluxiōnes podagricas, & sum-

matum ubi refrigerare statutū est mediocriter cum mitigatione ac lenitiōe: ut euidenter appareat uim Samiæ medicocriter esse refrigeratoriam. Quin & magis quodāmodo aerēa est eius essentia collata ad leuaniā, cuius argumentum est & leuitas. His itaq; notis & omnem aliam terram medicaminosam æstimato. Dico autem notas cōsistentiæ tum leuitatem, tum grauitatem, prætereaq; in gustu asperitatem ac leuitatem, ad hæc tenacitatē, & abstergerendi potentiam. Tenax enim & uiscosus est Samius aster, cum & Lemnia sphaeris eiusmodi paululum quiddam habeat. Absterforiam quoq; facultatem moderatā obtinent & Selinusia terra, & Chia: quamobrem mulieres quædam ad faciem ijs utuntur. Ostensum autem est in tertio libro De ratione curandi, quicquid leuiter absterget, producendæ ulcerum carni esse idoneum. Id autem si etiam desiccet, cicatrici inducendæ habile est. Porro omnium ex ijs aptissima sunt & ad ulcera quæ in summa cute consistunt, & ad ambusta, illa quæ cum citra morsum exsiccant, tum neq; manifesto excalfaciunt, neq; refrigerant. Quocirca terra Selinusia & terra Chia pulcherrima sunt ad ambusta ulcerū remedia. Expositum enim ea moderatissime extergentia medicamina absq; insigni aut calfactione, aut refrigeratione: quod utiq; inest tum Selinusie, tum Chie, tum Samiæ terræ. Ostensum est autem quod & huius species est Aster quæ uocant, reliqua terra hoc præstant, q̄ uiscosum quiddam ac tenax obtineat. Quocirca quod cum ad astra ulcera, tum ad ambusta pertinet, alijs terris quæ tenacitatem nō habent, conferendus nō est. Si quidem substantiā tenacitas magis reddit emplastica, q̄ ut linat abstergere: scilicet ubi nulla utiq; alia ad sit acrimonia uiscoso tenaciq; corpori, ut in uisco cernere est. Attamen Chia & Selinusia terra inferiores sunt Samiæ ad phlegmonas in mamillis, testibus, atq; inguinibus incipientes: tamen ubi inopia est aliorum quæ summe profunt, nec ipsæ plane ineptæ sunt & incommoda.

De cimolia. Cap. 5

Porro Cimolia cum mista sit facultatis, partim refrigerat, partim etiam digerit, sed leuiter: proinde dum lauat, hanc facultatem deponit atque exiit. Absq; eo secundum utraq; agit facultates, ceu alia quoq; compositorū medicamentorū plurima digerentia pariter & percutiētia. Porro utranq; facultatem facile indicat dum illi miscentur humores naturæ contrariæ. Nam si mista sit repercutientibus refrigerantibusq; lutum quod ex ipsa & illis conficitur, refrigeras repercutiensq; efficit. Sin digerentibus, & ipsū digerens. Sic ambustis conuenit. Atq; idiotæ quidam protinus aceto maceratum illint. Sed in tali usu non impense acris sit acetum oportet. At si tale sit, aquā miscere præstat. Et illud mihi semper memoria teneto, ceu commune omnīs terræ leuis. Omnes enim ambusta iurant, continuo illitæ ex aceto, aut oxytrato, nimium bullas existere prohibentes. Cæterum contemplandum insuper est, corporis curandi quæ sit natura siue habitudo, dura ne an mollis: id in uni-

A uersum præ oculis habēdo, corpora mollia ualentium medicaminū uim haud posse perferre, dura uero posse. Sed hæc huius instituti nō sunt, uerum copiosius exponentur tum in tractatu De cōponendis pharmactis, tum in libris De facile parabilibus. Præsens aut narratio à principio id studuit, ut generales inueniret facultates. Quibus animū intendens quispiam cōplura habiturus est ad particularis usus copiam, utiq; si utendi eorum uiam ac rationem insuper adiunxerit atq; edidicerit.

Communia quedam omni terræ. Cap. 6

Quare immorandū nō est: Verū quod antea dictum est, nunc in memoriā reuocare oportet, nempe terrā ipsam expertem mistionis substantiæ generis alterius, uim habere citra morsum delicatū. Atqui cum nullum reperire corpus queas mistionis ad unguem expers, inspiciēda item est eorum quæ illi accidunt cōmissio, idq; secūdm leuitatis & grauitatis differentias, easq; quæ in gustu uisuntur. Nam si qua eluceat adstrictio, tantum assumptis frigiditatis, quantū habet & adstrictionis. Sin etiam acrimonia quædam appareat, tantum inesse scito caliditatis, quantū & acrimoniæ. Similiter in leui & graui uidentur: cum leuitas illi inde proueniat, q̄ larga & copiosa in tota eius temperie aerea in sit substantia: grauitas uero quantū maior sit, tātō itidem syncerior terra existat. Terræ propriū est, quod igni admota non fundatur aut liquecat: id quod accidit plumbo, stanno, argento, & auro. Itaq; cum terrā audis ab argento nominari argyriten (nam ita nuncupant quidā illas quæ ex metallis sumuntur) haud putes per totū terræ immixtum esse argentū, aurum, aut ferrū: sed contingere, coniunctasq; esse paruis terræ particulis immixtas particulas paruas: in chrysite quidē, quæ ab auro dicitur, aurū: in argyrite, quæ ab argēto, argenti: in siderite, quæ a ferro, ferrū: easq; ab igne in fornacibus fusas, coire ad inuicē. Eundem in modū quæ uitri cōtinet terra arenosa est. In arena enim potissimū eiusmodi substantiæ frustula reperiuntur sæpenumero parua. Et qui earum rerum periti sunt, conspectis arenis talibus haud difficulter cognoscūt, quantū ex eis colligi queat uitri. Sed & aurū quoq; frustula exigua frequenter non paruo numero in quibusdam inueniuntur arenis. Verū non ex quauis arena, qui negotio huic sunt dediti, aurum uitrumq; extrahunt: sed eas eligunt arenas quæ quāminimo impendio plurimum congerunt. Si quidem post multos sumptus quos in fornacibus instruendis facere necesse est, si paulum modo colligeretur substantiæ, damnosum id ipsīs esset. Itaq; cum in plurimis arenis aurū uitriq; frustula parua contineātur, qui talia callent, non ad quauis accedunt. Ad eundem modum neq; æs, aut argentū, aut ferrū, aut stannum, plumbum uel ex quauis terra colligunt. Nectamen ubi dictorum quodq; ab admista terra separauerint, quæ reliqua est, alijs terris est similis: quas passim sic ab omnibus nuncupari proposui, quæ cōmunem habent notam, q̄ irrigatæ facile soluantur in lutum. nam terræ quæ in metallis est, reliquiæ lapideæ sunt, nec macerari ri-

gari ue possunt. Dico autem rigari, per totam substantiã humectari; madescere uero, extrema tãtum superficie madefieri, haud etiã in altũ penetrante humore: illud *ῥυγισθῆναι*, hoc *ἄρρηκθῆναι* Graeci appellant. Sic sit cadmiã, quam uocat, lapidea, nec ipsa rigari potis. Sed de talibus corporibus infra dissetur. Nunc autem ad medicaminosa terram reuertor, quæ proinde quod aqua irrigata facile in lutum soluitur, terra appellatur, quia uero ea utimur uelut alijs medicamentis, idcirco non iniuria græce pharmacitis, latine medicaminosa sola uocatur; nempe quia aut sola est eiusmodi, aut euidentiorem uim medicaminosa possidet. Id quod sane uerũ est. Nominatur autem ampelites nõ quod uitẽ in ea ferere præstat, sed quod uiti circumlita interminat nascentes in ea uermes, quos scnipas apud nos uiniores cognominant. Nascuntur porro hi ineunte uere, cum germinare uites, turgereq; earũ pars unde germen exit (quem oculum nominant) incipiunt. Hos igitur oculos scnipes depascentes, non leuem uiti noxam afferunt: ac proinde oculorum istorum radices, qui hæc sapiunt, inungunt ac stillunt. Hac itaq; ratione ampelites & pharmacites id genus terra appellata est; uel eo quod scnipas perdat quantum habet facultatis medicaminosæ indicans. Sed & à reliqua terra, qua ad curationes utimur, multũ diuersa est; quippe quæ proximè ad lapideam perueniat; quamobrem miscerẽam in medicaminum scriptionibus cõperes, ubi exsiccare atq; digerere quid opus est. Nec em̄ mordacitatis expertus est, nec moderata, nec mitigandi uim obtinet uelut Chia, Samiã, & Selinũgia. Atq; de Cimoliã quidem dictum est, quod illis paulo sit ualentior, ueruntamen etiam morius expertus, maxime si elota sit. Cretica uero terra istis quodammodo assimilis est: uerum admodum imbecilla est, multum habens substantiæ aeræ; inest tamen ei uis extergendi; quamobrem ea homines uasis argenteis sordidis splendorem recuperant. Itaq; hæc tibi usus fuerit ad ea omnia, ad quæ alias sine morbo extergentes idoneas esse posuimus. Harum omnium Lemniã ualentissimas uires obtinet. siquidẽ & adstrictio ei quardã inest. Porro Eretrien̄sis hac etiam ualentiorẽ possidet, hac tenus tamen, ut nondum mordicat. Quod si lauetur, ualde moderata efficitur, nõ secus atq; supradicta. Expendit uero hanc terram non semel, sed bis terq; laua-re, ut & Cimoliã. Quin & urunt eam quidã, quod uidelicet essentia reddant subtilioris & acrioris, ut & ad digerendi potentia transeat. Caterũ si uista lauetur, tunc depolita in aquam acrimonia, subtilitatem quidẽ quam ex tollitione acquisiuerat, retinens, desiccantior constituitur. Quo circa cum unctionem non experta, communi ratione terræ cuiuslibet, ulceribus sit accõmoda, magis certe iam congruit & ad ea quæ carnem sibi restituit ægre paruiuntur, & ad ea quæ ad cicatricem difficulter perueniunt, si postquam cõbusta fuerit, abluatur. Porro cum duæ eius species sint, ea quæ colore est cinericio, illi quæ admodũ albidã est præferatur. Est & alia terra dicta Pnigites, tota quidem facultate

A Cimoliã assimilis, cæterum colore diuersa. Est em̄ atra, perinde ut Ampelites. Porro uiscositatem & tenacitatẽ non minorem quã Samiã terra obtinet, immo nonnunquã etiam maiorem.

De bolo Armenica cum multis experimentis. Cap. 7.

Cæterum durante hac immani & graui peste, allata ad me terra est ex Armenia ea quæ Cappadocia finitima est, etiam siccantior, colore pallido. Lapidem qui donatur, nõ terram appellabat; promptissimeq; in leuorem soluitur, ceu etiam calx. Sic enim uidelicet nuncupo petram combustam. Verum uti nec in illa arenosum quippiam admittum est: ita nec in Armenica. Nam posteaq; in mortario pistillo cõminuta est, adeo est leuis, nec plus est lapidea, quam aut calx, aut Samius aster: tamen et non eque ut aster leuis est. Itaque illo etiam magis conspissata est, minusq; aëria, quam obrem opinionem ac phantasiã præbet ijs qui negligentius intuetur, quasi lapis esset. Cæterum quod ad præsentia attinet, nihil interest lapidem an terram uocites, si id modo teneamus, quod summe desiccet, siquidem ad dysenterias & uentris profluuiã, tũ sanguinis expuitiones, & catarrhos, ad hæc ad putrescentia oris ulcera in primis competit. Quin & eos magnifice iuuat quibus ex capite in thoracem fluxio decumbit; quamobrem illis quib. ex tali occasione assidua difficilis est anhelitus, ualde prodest. Sed & eos qui phthoe laborant, adiutat. Vlcus enim eorum desiccatur: ut haud etiam tussiant, nisi in uictu peccetur non leuiter, aut ambiens derепente ad intemperiem recidat. Ac mihi uideretur, quod, si cut in fistulis saepe conspeximus, non in alijs partibus duntaxat, sed in ipso etiã ano, ut citra collyrij immersionẽ quod fordem & callum auferret, ipso duntaxat desiccante medicamine contraherentur ac clauderent, ita quoq; in pulmõis ueniatulcere. Siquidẽ et ipsum ab exsiccatib. iuuari medicamentis perinde conspicitur, utiq; cũ medio cre est, nõ admodũ magnũ. Itaque uisi sunt quidã eorũ qui talia habebant, prorsum esse liberati. Ac quidã qui Roma in Libyã talem ob causam profecti sunt planẽse sanos esse credidere: & sanẽ usq; ad annos aliquẽ inculpate transgebãt: postea uero cũ nõ pari degeret cura & cautio, reditus morbi apparuit. Hos ergo ut dixi, Bolus armenica euidenter audiuit; quin & eos qui Romẽ agũt, qui assiduo difficultate spirandi discruciantur, magis etiã. Porro in magna hac peste, cuius eadem facies fuit atq; eius quæ Thucydidis memoria grassabatur, quorq; hoc medicamen biberẽ, celeriter curati sũt. At quibus nõ profuit, omnes interire, scilicet cũ nec alio quouis iuuarent. Unde colligitur quod ijs duntaxat nõ fuerit auxilio, qui planẽ erãt incurabiles. Cæterũ bisibis ex uino albo, consistentia tenui, modice diluto, si aut planẽ febrĩ careat, aut leuiter ea teneat: sin grauius febrat, admodum aqueo. Non tamen calore uehemẽtes sunt febres pestilentiales. Porro de ulcerib. reficari postulantibus quid attinet dicere quantam uim habeat bolus hæc armenica? Liberum est autem utiq; appellare uelis, siue lapidem, ut ijs qui

mihī donauit: siue terram, ut ego, quando quidem humidis rigari patitur.

De lapidibus. Cap. 8

Ex sponte natis corporibus sunt et lapides, hoc est diuersi à uulgo nūcupata terra, quòd rigari nō sustinent. Vires habēt partim secundū totius substantiæ proprietatem, partim secundum qualitates effectrices. Porro ut hæc differant, superius docui. Nunc autem sermo nobis esto de illis quæ secundum effectrices agunt qualitates: in quibus sanè est & utriū ratio ac methodus. Siquidem ut ostendimus, facultates quæ proprietatis totius substantiæ ratione insunt, à methodo ac ratione alienæ sunt, & per solam noscuntur experientia. Nam cur hic lapis tacto uulnere, unde sanguis prorūpit, cur sum eius reprimat ac sistat, haud nouimus. At cur lapis quē uocāt Hæmatiten, in oculares facultates indatur, haud laet. Nam id rationis inuentū est. Si enim in cote oculari eum teras cum aqua donec mellis crassitiē accipiat, adstringentē facultatem percipies. Atqui didicisti quod phlegmonas etiānum giscentes, potissimū quæ contingunt in partibus neruosis, restringentibus medicamentis repercutere oporteat ubi haud etiam sanguis in partem affluit, adstringentibus medicinis, quæ digerāt adiungere, & sensim ad ipsa sola transire. Atque de huiusmodi quidem facultatibus in lapidibus differemus, ubi ea prius in memoriam reuocamus, de quibus fusc locuti sumus in libro contra eos conscripto, qui insultant ijs qui uoce solēcissimi committunt. Nam horum quidam *λιθον* (quæ uox lapide Græcis significat) masculino genere effertur non sinunt; uerū si dicas, *ἡμεθαλον ὁν λιθον ἂν ὄν κῶλα*, non aliter uociferantur, quā si ipsis in caput lapis esset coniectus: uelut etiam si quis dixerit *ὄν φῶν* (quæcum sonat) exclamant tanquā fuisse percussus. Itaque si quis eorum usus consuetam medicis nomina mutare in animum inducat, dicēs *τὴν λιθον*, *τὴν ἀματιτίαν*, & *τὴν πυρίτιαν*, & *τὴν γαλακτιτίαν*, & *τὴν χιρίαν* uel curiosis sanè & stolidis damnabitur: nimirum cum ueteres ex more omnes masculinæ essent eorum differentias, *ἀματιτίαν*, *πυρίτιαν*, *γαλακτιτίαν*, *μελιτίαν*, *γαγῶτιαν*, *χιρίαν*, *φρύγιον*, *ἀρῶσιον*, *μεμῶτιαν*. Econtrario uero *τὴν ἡπύραν* foemine pronunciant, non *τὴν ἡπύραν* masculinæ. Nam *ἁσιαν ἡπύραν*, non *ἁσιον ἡπύραν* nominant, *λιθον ἁσιον*, hoc est lapidem assum, ceu etiam alia petrae flosorem. Porro ex petra combusta calcem fieri dicunt. Artamen Heraclides Tarentinus, & alij nonnulli, non ex quouis lapide calcem fieri uolunt, sed ex sola petra, nuncupantes ita per excellentiam solum qui sit lapidum durissimus. E quidem ego uel ex industria & studio cōsueui mutatis inuicem nominibus utroque modo talia esse, de quibus inutiliter nonnulli rixantur, id re ipsa commonstrans, nihil offendi enarrationis claritatem utrouis modo quis dixerit. Cæterum mirandum non est, qui ignorant enarrationis naturalis aut unā solamque habendam uirtutē, ipsam scilicet perspicuitatem ac claritatē, aut certe omnium aliarum primam principemque atque optimam, si

ad tantas uertatur nugas. Itaque de ijs lapidibus primum disseram, qui mortarij aut cotis attritu in liquorem succum uel soluantur.

Hæmatites, Galactites, & Melitites. Cap. 9

Porro talium quoque unus est hæmatites quena uocant, à coloris similitudine id appellatiōnis sortitus: sicut & galactites, quando & ipse in succum solutus, lacti similis conspicitur. Huic autem colori ad similem succum efficiens melitites à mellis similitudine, quod gustu representat, nuncupatus est. Porro ostensum in quarto horum commentariorū est, quod succus omnis dulcis à temperato calore talis eueniat, adstringens uero à frigore. Hæbit ergo lapis hæmatites tantū frigiditatis, quantum habet adstrictiōis; melitites uero calore temperatum; mediā autem utriusque temperiem galactites. Merito itaque ausi sunt medici ocularibus facultatibus lapidem miscere hæmatiten. Ac solo eo uti possis supercilij exasperatis: siquidē cū phlegmone aspera sint reddita, ex ouo ipsū diluens: ac si magis, etiam per decoctum fœnigræci. Sin uero citra phleginonem, ex aqua. Incipito uero semper à modice humido, per specillum infundens. Vbi autem quòd uires eius ferat conspexeris, magis ac magis crassum efficies: ac tandē adeo crassum facies, ut specilli cuspidē in ungas secundum subiectionē aut euerisionem supercilij. Hic idem lapis similiter in cote contritus, sanguinis expulsiōni cōpetit, omnibusque ulceribus. Porro siccus si ad tantum redactus fuerit leuorem, ut pollinem tenuitatem æquet, reprimat excrescētia. Atque eo nullus solo atque per sese utit. Ego uero, ut proposui, usus sum facultate eius ex gustus qualitate cōperta, cum mox experientia periclitari uellē, nunquid recte coniectissem. Et ipsa quidem oculorū ulcera solus per se cicatrice includit (ut paulo ante cōprehensum est) attritus, cæterum aut affusus, aut inunctus. Nam & id experientia exploratum habeo.

Schistos. Cap. 10

Huic lapidi per similem uim obtinet, uerū infirmiorē, is qui uocaf schistos: ac post eū galactites. At melitites caliditatis etiā non nihil, ut dixi, adiungit. Vt itaque unusquisque leuiter ac sensim ab hæmatitis facultate recedat, ita ad oculos in usum ducit: est tamen mitior. Porro mitiora remedia partibus etiamnū phlegmone afflictis semper gratiora sunt atque iucūdiōra: cæterū liberis iam phlegmone partibus infirmiora quæ perferant ualeant. Porro cum lapidibus omnibus cōmune fit et desiccant: quotquot ex ijs in succū soluti, aut alioqui ad leuorem triti, nullam euidētē qualitātē in gustu obtinent, hos putandū est esse tum infirmissimos, tum mitissimos, tum minime mordaces. At qui manifestam gustui qualitātē afferūt, hi pro qualitatē proportionē potentiā possident: ac siquidem adstringant, ad cōprimendum, constringendū, spissandū, & contrahendum: si uero mordicent, ad excalcandum, digerendū, & liquidandū. mediū eorū sunt qui abstergent citra mordicationē. Igitur hæmatites, schistos, galactites, ac melitites, in succū soluntur quo posui modo, ad cotem aut mortarium attritū

tritum cum sint & alij lapides in succu solubiles, ut A
 qui in Aegypto nascitur, quo utuntur ad splendo
 re linteis conciliandū. Est autē omnium dictōrū mī
 nime qualitatis particeps, nec adstrictionem, nec
 morsum, nec absterisionem præ se ferēs: quo circa
 hoc ipsum duntaxat lapidi huic inest, quod desic
 cet uidelicet: proinde cerato eum miscentes, ad ci
 catricem ulceribus inducendam in mollibus cor
 poribus usurpant. Sed & ocularibus miscetur fa
 cultatibus perinde ut modo dictū: at quāto est ma
 iore emolliēdi uicq; prædicti, quod nullam uideli
 cet effectricem qualitātē habeat, tanto etiā mode
 rator est, magisq; dolorem leuat. Hunc lapidem
 quidā moroxū, nōnulli leucographida nūcupāt.

Dioscoridis Thyites. Cap. 11

Omnium dictōrum lapidum ualentissimā uim
 habet is qui ex Aethiopia affertur, quadantenus
 subuiritis dicitur, ut Iaspis, quem Thyiten uocant. Solutur hic lapis in succum colore lacteum, gustu uero
 acrem, ac proinde illum nemo ocularibus mis
 cet facultatibus, nec fluxiones repercutientibus,
 neq; ulcera sanantibus: sed tantum ad purgandū,
 & abstergendum quæ pupillam offuscant absq;
 phlegmone: ex quibus sunt cicatrices recentes,
 quas attenuare potest: sed & oculorum unguēs
 (Græci pterygia uocant) utiq; si non admodum
 duri fuerint.

Iudaicus. Cap. 12

Est & alius lapis uiribus ualentioribus in Pala
 stina Syria proueniens, colore candido, specie cō
 cinnā, lineas habens ceu torno ductas. appellatū
 eum a loco in quo nasci consueuit, Iudaicū: utun
 turq; ad uesciā lapides, in cote soluentes, & ex a
 quā calidā tribus cyathis potui præbentes. Sanē
 in quibus nos experti sumus, profecit nihil, quod
 ad lapides uesciā pertinet: uerum ad eos qui in re
 nibus hærent, efficax est.

Pyrites. Cap. 13

Vnus eorum qui ualidam facultatē possident,
 est et pyrites quem uocant, quo utimur digerenti
 emplastro admisto: adijcit ei & schistos. Ab hoc
 medicamine & pus sæpenumero, & consistentia
 grumosa in spatij intermedijs musculorum nata,
 per halitum digesta sunt. Caterum ubi in usum
 uocantur lapides, admodum uehementer cōtusi,
 atq; ad leuorem redacti sint oportet, similiter at
 que ea quæ in ophthalmicis facultates admiscen
 tur. Etenim nisi pollinis instar cōminuātur, adeo
 ut in profundum corporū quibus applicantē sube
 ant, असimiles manēt istis marinis, & fluuiatilibus
 arenis, quæ & ipsæ cōmune omnium lapidum
 uim possident. Siquidem exiccant tumentem ab
 aqua inter cutem carnem, uidelicet laborante in
 eis ex calcatis decumbente. Non tamen ad aliud
 quippiam eis utimur tanquam prædictis, puta ad
 ophthalmicas & sistentes tum sanguinem, tum
 muliebri profluuium facultates, præterea ad glu
 tinanda ulcera cicatrice claudenda, carne imple
 da. Nam qui ex eis acres non sunt, ad hæc omnia
 sunt utiles: uelut & acres, quorum posterius men
 tionem faciā, ad detergendum abstergendumq;

tum detrahendum, extenuandum, digerendum,
 ualenterq; siccandum, & colligandum.

Phrygius. Cap. 14

Huius facultatis habetur & phrygius, quem uo
 cant. Sed eo semper utor combusto quidem ad ul
 cera putrida, idq; aut ipso per se, aut ex aceto, aut
 œnemelite, aut oxycrato: ad oculos uero medica
 mentum siccum efficiens: quod multi nunc acce
 ptum a me obtinent. Miscentur ei & alia quæpiā.
 Dicitur autem de ipso in opere de componendis
 pharmacis. Nunc satis est de generali eius facultate
 explicuisse: ualide enim deliccat, habēs quiddā
 adstrictionis simul & mordicationis. Dictum ue
 ro superius est, ea esse omnia optima medicamina,
 plurimiq; usus, quæ mistas in sese hæc facultates
 habent, nempe repercutientem, & digerentem.

Ageratus. Cap. 15

Est autem lapis ageratus quē uocant, quo utun
 tur coriarij, facultatis mistæ, adstringentis scilicet,
 & digerentis. Sed de sola adstringente consideran
 dum. Iuuat quidē euidenter columellas phlegmo
 ne grauatas: non tamen apertam gustu adstric
 tionem præferre aut aeternam conspiciunt.

Assius. Cap. 16

Est & alius lapis in Assio proueniens, quem ob
 id ipsum Assion cognominant, non durus ut pe
 træ. Siquidē color illi est pariterq; consistentia ceu
 tophi, friabilis & laxus. Innascitur ei quiddam fari
 næ tenuissimæ simillimum, qualis in molarum pa
 rietibus adhærere uisitur. Appellatū hoc medica
 mentum petra asie florem. Est uero & subtilem
 partium, ut sine morsu nimis molles carnes ac flui
 das eliquet. Petra uero in qua nascitur, tamen
 uim habeat illi similem, actionis tamen uehementia
 inferior est. Hoc enim ea potior est flos, nō tan
 tum quod magis colliquet ac digerat, & uelut sa
 le condita seruet, sed & quia hæc præstet absq;
 uehemētī mordicatione. Habet & falsedinem quan
 dum in gustu hic asie petra flos: uo coniectura sit
 illum nasci ex eo quod ros ex mari in petram resi
 dens, postea a sole desiccetur.

Gagates. Cap. 17

Est & alius lapis colore atro, qui ubi igni admo
 tus fuerit, persimilem bitumini odorem exhibet:
 quem Dioscorides nonnullq; alij in Lycia inuen
 iunt. unde & ipsi lapidi nomenclaturam in dita dicunt.
 Ego tamen cum fluuium non uidi, tamen par
 ua nauicula totius Lyciæ littora legerim, quod uide
 licet quæ in ea sunt inspicere. Crustaceos uero
 lapides, & qui in ignem additi exillem flammam
 ederent, complures ex Cœle Syria asportauī, na
 tos in colle mari mortuo, quod uocant, circumdato,
 qua orientem spectat, ubi & bitumen est: eratq;
 lapidum odor similis bitumini. Vtebarq; eis ad tu
 mores in genu diuturnos, & egre curabiles, mistis
 uidelicet facultatibus quæ ad hoc symptoma pro
 batæ fuerāt. Planeq; uisum est mihi euidentem eorū
 eorum facultatū reddidisse. Miscui uero ipsum &
 Barbaro emplastro appellato: et palā medicamē
 tum effectum est exsiccatius, adeo ut & sinus con

traheret, nedū cruenta vulnera glutinaret, ad quæ competere maxime creditur. Est & alius lapis, cuius meminit Nicaner hunc in modum.

Si lapis uratur candenti Thraciis igne, & Post madefiat aqua, flagrabit totus; at idem Mox oleo affuso penitus restinguitur; adfert Thraciis hūc ad nos pastor de flumine, nomē Cui Pontus.

Verum nullus eius in medicina usus est: neq; Nicaner præter graueolentiam, quæ suffitu feras fugat, quicquam ei adscripsit.

Magnites, quæ & Heraclæa. Magnes. Cap. 18

Ex lapidibus unus est & magnites, & heraclæa, quam uocant, ad similem hæmatiti uim obtinens.

Arabius. Cap. 19

Attamen arabius quem nominat, lapis ebori similis, desiccantis abstergentisq; facultatis est.

Alabastrites. Cap. 20

Et alabastrites uocatus onyx in medicina usum ingreditur combustus. Quidam eum bibendum dant stomachicis.

Smiris. Cap. 21

Sed & smiris q; multā abstergentē habeat facultatem, clarū est uel ex eo q; dactylioglyphi, hoc est qui annulos exculpunt, eum in usum illo utantur. Quinetiā q; dentes purōs efficiat, experti sumus.

Cissaris. Pumex. Cap. 22

Cæterū si pumex inter lapides recenseri potest, & ipse eiusdem est facultatis, quod certe ad absterfionē attinet, uelut etiā figulina testa, ac multo magis ea quæ fornicatiō est. Sed smiris acrimonię quiddam obtinet; proinde causticis & desiccantibus facultatibus addit, eisq; quæ curant gingiuas laxas, ac mollitiē fluidas. Pumex autem li comburatur, haud erit inferior eosdem ad usum Smire.

De lapidibus qui in spongijs reperiuntur. Cap. 23

Lapides qui reperiuntur in spongijs, frangendū uim obtinent, non tamen ita ualidam ut lapides in uelica comminuant: & qui id scriptū reliquerunt, mentiti sunt. Verū qui in renibus consistunt rumpunt, uelut qui ex Cappadocia cōuehuntur, quos in Argeo nasci aiunt. Soluūtur autem hi in succū colore lacteū; ex quo liquet, quod extenuādī uim obtinent absq; ut insigniter excalciant.

Ostracites. Cap. 24

Porrō ostraciten uocatū lapidē predicare quosdam audio quasi desiccādī ualenter facultatē obtineat, temperatā ex adstrictiōe & acrimonia, uelut Geoden nomine pupillas expurgare, & uberū te stitūq; phlegmonas sanare, ex aqua uidelicet dilutū. Attamē cotis Naxię ramentū māmās uirginib. suo tēpore prohibet tumescere, & puerorū testes, tanq; uidelicet particeps facultatis refrigeratoriæ.

Ophites. Cap. 25

Sed ophites quē uocant lapis extergendi confringendiq; uim possidet, ceu etiā uitrū. Admodū enim ipsum ex uino albo ac tenui epotum lapides uesicæ conterit atq; cōfringit. Verum ipsum in lapidibus quispiam forte non numeret.

Iaspis uiridis. Cap. 26

Proprietatē nonnulli lapidibus quibusdā testis

monio suo adscribūt, talē quālē reuera habet Iaspis uirens, nempe stomachum adhasū uētrisq; os adiuuans. Ac nonnulli quoq; annulis inserūt, scilicet punctq; in eo draconem radios habentē; uelut rex Necheps in eo draconem radios prodidit in quarto & decimo libro. Sanē huius ego quoque lapidis abunde feci periculum. Torquem enim ex huiusmodi lapillis confectum a collo suspendi, ita ut lapides os uentris contingeret. Apparebant autem nihil fecius prodesse, etiā mihi sculpturam non haberent quam scripsit Nechepsos. Porrō lapidem ophiten uir fide dignus reuera iurare morfos a uipera suspensum retulit. Sed eiusmodi facultates extrinsecum sunt methodo constantem, uelut etiam cum Hieracites & Indicus profluentem ex hæmorrhoidibus sistunt sanguinem.

Sapphyrus. Cap. 27

Sed & Sapphyrus ictos a scorpio epotus iuuare creditur.

Aphroselinus. Cap. 28

Et aphroselinus quem uocant, commitali morbo uexatos; non tamen nos experti sumus. Sunt uerō & alij lapides nonnulli, qui aduersus quædam suspēduntur. Cæterum quidam characteres quosdam & literas inscriptas habent; sicut qui hæmorrhoidibus congruit Hieracites; cuius nos fecimus periculum. Sed non est nunc tempus de illis differere, qui sola experientia fidem habent, ac non rationali quadam methodo in usum ueniunt. Aliud de his tempus erit & locus. Nunc autē ad id quod toto opere propositum fuit, reuertor.

Metallica medicamenta. Cap. 29

Metallica medicamēta appellare medicis mos est, quorum generatio in metallis est, siue spontanea, siue per fornacem facta. Et ad hæc tertio loco sunt quæ rursum homines ex his ipsijs præparant quouis modo, uelut cerussam, psoricum, sandyca, phycum. Deinceps itaq; de singulis dicitur ea serie literarum, qua quodq; nomen incipit. Verū illud primum de omnibus illis dicemus cōmuni præfatiōe, qualem de lapidibus paulo ante habuimus, et his etiam superius de terra medicaminosa. Nam ut illis id inter sese omnibus commune est, ut desiccet, ita metallicis quoq; medicamētis omnibus; est enim essentia eorū terrea, secundum elementaris uidelicet terræ significatum nunc loquendo. Sed quemadmodū a nobis ex terra figulina dolia, & sicilia, ollæq; & alia eiusmodi parantur, per ignem, qui torrendo humiditatē absumit, durata, eundem in modū in terra, caliditate diutina mista ex terra & aqua, nonnunq; etiā aere, substantiā ueniēte temperantēq; ac postea desiccate, metallicorū medicamentorū proueniunt cōsistentiæ. Porrō locorū in quibus hæc proueniunt, natura, prout plus minusq; est frigida, alia plus, alia minus congelat ac cogit. Quemadmodum itaque in terræ differentijs plurima inest essentia terræ elementaris, paulum uero aeris: ita in metallicis multum immistū est igneæ substantiæ. In medio eorum sunt lapides. Proinde plerūq; metallicorum medicamentorū alia semel aut bis, alia uero frequētius

lota, idonea sunt ad desiccantes sine morfu facultates. Atque hæ sunt communes rationes quas præscire oporteat. Deinceps uero dicitur quæ cuiusque singularium sunt proprietates, idque iuxta literarum, à quibus appellationes incipiunt, ordinem.

Halas. Sales. Cap. 30

Sal partim ex mari provenit, in salinis uidelicet, quas Græci uocant halas, cuius & inter marina medicamenta mentionem facturi sumus; partim ex terra effoditur, Græci *δουλορὸς ἁλᾶς* nominant, communi metallicorum genere comprehensus. Vtriusque uis ad similes est, siue fossilis sit, siue ex mari oriundus. De quibus et supra uerba fecimus libro quarto, eo loco ubi salum ac saluginosum saporem ab amaro distinximus. Ac nunc quoque dicitur, quod aphonitri quidem amarus est & abstergens; salis uero tanto in abstergeredo inferior est, quantum accessit adstrictio nis. Est enim ex duabus qualitatibus, mistus abstergente uidelicet, & adstringente. Porro quod magno pere uterque desiccet, supra monstratum est: Cæterum utriusque in medio est spuma litri.

Armeniacum. Cap. 31

Armeniacum uim habet extergentem cum leuicula acrimonia, & leuissima adstrictione. Ita que tale cum sit, ocularibus miscetur facultatibus. Et ipso per sese quoque ad pollinis leuorem redacto, utuntur sicco ad pilorum in supercilij incrementum; nempe ubi præ humorum acrimonia partim excidunt, partim uero nec crescunt, nec aluntur. Si quidem de partibus his acrimonijs, in bonum naturæ habitum pars reducitur, cuius cum alia sint nura, tum etiam producendi, incrementum præbendi, ac roborandi qui in supercilij sunt pilij: quippe cum prima & ex professo quædam sint medicamentorum opera: quædam uero mediante natura, quæ animantium corpus dispensat, edunt, uelut quæ in ipsis calliblephara nuncupant. Ipsa enim partes oblectas mediocriter desiccant, pilos corrumpentem humiditatem absumendo, quæ ubi abolita est, tum natura ad proprias redit actiones, nimirum sublati quæ hæctenus impedimento fuerant.

Arrhenicum. Arripigmentum. Cap. 32

Arrhenice, siue arrhenicum (utroque enim modo appellat) facultatis est causticæ, siue urentis, idque tam combustum quam ustionis expert. Cæterum id constat ustione reddi tenuiorum partium. Utuntur porro eo ceu adurente ad denudandam pilis partem quamuis. Verum si diutius inhaereat, nec cuti etiam ipsi parceret.

Aphrolitrum. Cap. 33

Aphrolitrum ab aphonitro differt. Litri enim aphros, hoc est spuma, medicamentum est exliccatorium, aspectu triticæ farinæ similis. Etenim alba est, non ut aliæ petrae flos, cinericea. Aphonitrum uero farinæ speciem non habet, neque solum est, sed coægelatum & coactum, quo qui in balneis sordes exertunt, quotidie utuntur; ea detergendæ facultate, ut non modo sordes extergat, sed etiam pruritum sanet, nempe digerendis quæ ipsum excitant fariebibus. Non absre itaque medici ex eo multa digerentium medicaminum præparant. At spu

ma litri, eiusdem quidem cum litro tum nature, tum facultatis est, cæterum essentia tenuioris. Dicitur tamen paulo ante est, aphrolitrum in medio consistentem habere facultatem aphonitri & salis. Aphonitro enim sola inesse uis extergendi: salis uero etiam astringendi. Aphrolitro uero, ambæ facultates sunt. Verum adstringens modica, extensoria uero multo amplior.

Gypsum. Gypsum. Cap. 34

Gypsum & ipsum ad communem omnium terrarum lapidosorumque corporum facultatem, qua desiccare dicta sunt, insuper hoc adiunctum habet, quod est facultatis emplastice. Vnitur enim ipsa ad sese, & cogitur lapidescitque macerata. Quamobrem siccis medicamentis, quæ ad sanguinis accommodationem eruptionem, utiliter commiscetur. Nam ipsa per sese lapidosa fit coacta ac coægelata: proinde rigare diluereque illam excogitauit tenui albosque oui liquore, quod ad ophthalmias utile est, admixto quod in farina triticea est pollinis tenuissimi, qui in parietibus molarum residet. Excipere uero quod sic maceratum est tenellis leporis pilis, aut qui perinde sunt molles, expedit.

Gypsum κεκαυμένον, hoc est, deustum.

Gypsum combustum non æque emplasticum uim habet, cæterum tenuiorum est partium, & ualentiùs desiccet. Quin & repercussorium est, maxime si maceretur oxycrato.

Diphryges. Cap. 35

Diphryges mistam habet tum qualitatem, tum facultatem. Habet enim in sese quiddam & medio critere adstringens, mediocriter acre: quamobrem ulcerum rebellium optimum medicamentum est. Conuexi autem & huius medicamenti uim ingentem ex Cypro Solis, ubi metallum ab urbe abest, quasi triginta stadijs. Proiectum enim erat in medio spacio ædium quæ ante metallum extractæ erant, & uici qui ei subiacet. Cæterum præfectus ac procurator metalli, id quod post cadmiam reperiretur, esse dicebat inutile: itaque abijci non secus atque uisum in foco lignorum cinerem. Verum hoc mihi multo utilissimum factum est medicamentum, tum ad purrescentia oris ulcera, siue per se, siue cum melle cui detracta sit spuma: tum ad anginam, uidelicet ubi iam per adstringentium medicaminum auxilium constitit quod influebat. Præterea columellam ubi præfecuissim, ipso solo & statim, & usque ad cicatricem tum usus, ac frequenter exacte oculifam esse citi cicatricem tum huius particulæ, tum omnium adeo exulceratorum: sic in ulceribus omnibus pudendorum, atque ani. Vfus autem similis est ut in oris ulceribus: siquidem eæ partes eisdem ferè medicamentis gaudent, nimirum calidæ similiter ac humidæ. Verum hæc oratio iam tractatum de componendis medicamentis attingit. Ea itaque ommissa, ad id quod propositum est pergamus, uniuersalem medicamentum cui usque facultates exponentes, sicut sanè diphrygis diximus. Adijci uero huic qui de illo habet sermonem, rem non modo de diphryge scitu utile, sed & de lemmia sphragide, & popholyge, & opobalsamo, & lycio Indico. Nam etiam uero adolescentis didici hæc

hec ita præparare, ut à ueris natiuisq; nihil differre uiderentur. Nam qui me docebat ingenti mercede, homo curiosissimus erat, nō in his tantum, sed & alijs similibus. Itaq; in Lemnum, in Cyprum, in Palæstinam Syriam eo studio nauigauit, ut medicamentorum istorum cuiuscq; uim magnam, quæ in omnem uitam meam satis forent, reponerem. Sed & lycium Indicū cum aloë Indica id temporis cōmodum accipere contigit, cum à Palæstina iter reflecterem: cum persuasum haberem, eo ipso quod à camelis cum tota sarcina aduectum esset, procul dubio esse Indicum: quodq; adulteratum haud nobis ab ijs qui portarent posset, propterea quod materia, ex qua id præparatur atq; adulteratur, illis in locis haud nasceretur. Porro satius uisum est mihi, quibus rationibus ea adulteratur, haudquaquam adscribere, utpote cum homines scelerati in lucro ponant talia posse discere. Nec enim necessarium est cum uerorum ac germanorū notis ac indicijs, adulterandorū nosse cōpositiones, cum nihil ad ea discernenda cōferant: imò optem, si queam, quæ à maioribus me perperam conficiendorum atq; adulterandorū medicaminū proditæ sunt cōpositiones, omnes prorsum delere atq; extirpare.

Theon. Sulfur. Cap. 36

Sulfur omne trahēdi uim possidet, estq; temperamenti calidi, atq; essentia tenuis, adeo ut ad multa uenenatorum animalium resistat. Siquidem ego aduersus turturem marinum & draconem sæpenumero eo sum usus: et cum id piscatores quosdam docuissim, reuerso post aliquantum temporis magnifice medicamentū hoc commendarunt. Vfus eius est ut & sicci ficuti inspergatur, & cum salua mistum: nam cum & hoc excogitasset, ab experientia comprobari reperi. Sed & urina maceratum idem effecturum excogitauit. Docebam enim piscatores medicamenta maxime parabilia, dixiq; pulchre illos & cum oleo ueteri, & melle & resina terebinthina usuros, Et sanē horū omnium experientia iudicium præstitit. Quin & pforas & lichenas, & lepras, nō raro hoc medicamento cum resina terebinthina sanauit. Exergit enim omnes id genus affectus, absq; ut in profundum repellat, cum alia multa medicamenta quæ illos curent, mistam habeant potentiam, nempe ut digerant pariter & repercutiant.

Ios. Aerugo. Cap. 37

Aerugo gustantibus acrem qualitatem offert, digerens, destrahens, & liquans non teneram modo sed & duram carnem. Porro supra dictum est, nonnullos eius generis medicamenta, epulotica, hoc est, quæ cicatricem inducant, appellare, cum ijs in tenuissimū pollinem tritis per specilli cuspidem contigerint ulcera excrescentia, ac postridie cōtractareperiant: tamen si illos haud lateat, si paulo plus impositum foret, sese ulcus non contractū, sed erosum inuenturos. Siquidem colliquat & digerit carnem cum medicamenta epulotica contrahant, conspient, confringant, & calli in morem illam indurent. Quin & gustum mordicat ærugo, non tantum ipsa ulcera. Quod si pauculum eius ce-

Galen.

A rato non pauco admisceas, id quod ex ambobus mistum est, citra morsum extergit. Dictum uero supra est de talium medicamentorum natura, tum ut sese quidam fallunt, ex talibus cōpositionibus aut farcoticam, aut epuloticam adscribentes facultatem medicamentis quibus minime oportet, utpote cum ipsa id præstare nequeat, uerum ea quæ ex ipsis cōposita sunt.

Cadmia. Cap. 38

Cadmia fit ubi in fornacibus æs paratur, nempe tota terra ex qua æs generatur, in fornacibus in altum egerēte uelut fuliginem quampiam, & fauillam, siue utcumq; appellare libebit. At si non terram, sed lapidem nuncupare uelis, ex quo in fornacibus secernēdo partim fit æs partim cadmia, partim diphryges, nihil sanē retulerit. Sed & in argenteis metallis efficitur simili secretione siue generatione, aut quomodocumq; uocare uoles. Quin & ex pyrite lapide in fornacibus usto fit cadmia. Cæterum absq; fornacē in Cypro cadmia inuenitur: ac iure quispiā illam lapidem nūcupet. Itaq; in Solis, quo tempore ego in insula peregrinabar, paucissimū etiam reliquū erat cadmiæ quæ in fornacibus prouenit. Verum lapidibus qui in montibus & riuis reperiebantur, à metallis profecto acceptis, eos in Asiam Italiq; portauit ad amicos, à quibus summam inuicem gratiā, quod se uel maximū mirius accepisse diceret, & quæ alia omni cadmia multo esset præstantior. Et talem certe merito quis lapidosam uocet cadmiā. At eius quæ cōbusta est, aliam botryitin, aliam placitin medici nuncupant. Botryitin quidem, quæ in editioribus domorū, in quibus fornacēs extructæ sunt partibus colligitur: Placitin uero, quæ in inferioribus. Ac licet sanē botryitin partium esse tenuiorum, crassiorum uero placitin, utranq; autem ui desiccādi cēu alia metallica omnia, & lapidosa terrēnaq;. Porro præter desiccandi facultatem mediocriter item extergit. Attamen quæ in fornacibus colligitur, ignea facultatis aliquid habeat necesse est. Merito itaq; uiuantes eam, medicamentum efficiūt mediocriter tum desiccans, tum extergēs absq; mordicatione, utile ad ulcera carnis impletionem poscētia, & in oculis, & in toto corpore. Porro ulcera magnopere humida aut putrescentia in corporibus impendio mollibus, qualia sunt eunuchorum, puerorū, ac mulierū, eiusmodi cadmia adiuuat. At in durioribus & cōtentionibus, quæ ualentius desiccant requiruntur. Itaq; illud semper memoria tenendum, sermonē ad temperatā & mediam excessuū naturam in ijs quæ ita simpliciter efferuntur, referendū: puta, cum dicimus medicamentū aut ulcera carne implere, aut cicatrice claudere, aut aliud quiduis eius generis præstare, ad quam utiq; & nos respicientes, leuiter desiccatoriā absterforiāq; cadmiæ inesse facultatē dicimus. In caliditatē autē & frigiditatē differentia, temperata quodammodo existit cadmia, nempe neutrum insigniter efficiens.

Cinnabari. Cap. 39

Cinnabari modice acrem facultatem obtinet. Habet uero & adstrictionis quippiam.

tom, 5

m

Ciferis

Ciferis. Pumex. Cap. 40

Pumicem si inter metallicarecenseas, calumnia buntur quibus animus prurit accufandi libidine, & si inter lapides ponas, lapidem esse negabunt: ac multo minus terram esse concedent, nec marinorum haberi quodpiam uolent. Atqui alicubi tamen de illo dicendum est: quippe qui in farcotica indatur medicamenta, & ea quae dentes extergunt, partim uisionem non expertus, partim etiam uftus, quando uidelicet, alijs omnibus combustis similiter, substantiae efficitur tenuioris. Ceterum uftione quiddam acquirit acrimoniae, quam rursum lotionem exiit. Videri autem poterit splendorem conciliare non tantum facultate, sed etiam asperitate: uelut etiam si smirin, aut testam, aut hoc genus quippiam tritum admoueas. Quae certe & ipsa splendorem afferunt, forte utroque, tum quia detergendi habeant facultatem, tum quia asperitatem. Eundem in modum cornua deusta dentes splendidos efficiunt.

Conia. Lixiuum ex cinere. Cap. 41

Lixiuum, abluto cinere fit lixiuum. Cinerem autem, ustorum corporum reliquias Latini nuncupant, siue natura sint lapidea, siue arborum animalium uelue particulae. Fit ergo lixiuum pro eius quod eluitur natura: eius quidem quod empyreuma, siue igneam naturam habet acerrimam, ipsum quoque acerrimum est, eius quod tale non est, etiam moderatius. Quare & septicis uocatis facultatibus commiscetur, utpote causticam caliditatem possidens, sed propter substantiae tenuitatem citra dolorem adurens.

Cyanos. Coeruleus. Cap. 42

Cyanos siue masculino, siue foemino genere pronunciare uelis: hoc medicamen acri facultate est tum detrahendi, quam *νεκραγελλου* uocant, tum digerendi, potiore quam Cinnabari. Inest quoque ei nonnulla adstrictio.

Lepis, id est squama aeris & ferri. Cap. 43

Squama alia est aeris medicamen, multo utilissimum: alia ferri & stomomatis. Quidam uero nominant & helitin lepida siue squama. Omnes sane uehementer desiccant. At inter sese diuersae sunt, tum quod alia magis, alia minus exsiccat: tum quod alia crassioris, alia tenuioris sit essentia: quodque plus minus uel adstrictiois sint participes. Helitis certe principem in desiccando locum obrinet: nam & subtilissimae omnium substantiae est: nimirum quae & eruginis nonnihil assumperit. Maiorem obtinet adstrictionem squama ferri, & hac etiam maiorem stomomatis: quamobrem ad contumacia ulcera meliores sunt quam squama aeris. Detrahit & liquat carnem potentius squama aeris, & hac etiam ualentius helitis. Omnes autem squamae non infrene mordaces sunt. Ex quo clarum est, quod essentiae ipsarum consentientia non admodum tenuis est, sed potius crassa. Si quidem inter quae eadem uim obtinent, minus est mordax quod est tenuius: ceu superioribus libris ostendimus.

Lithargyros. Cap. 44

Lithargyros desiccatur quidem uelut alia omnia

A metallica, lapidea, terrenaque medicamenta, uerum omnium id efficit moderatissimae: & secundum alias tum qualitates, tum facultates quodammodo in medio esse, neque manifeste exalciaciens, neque refrigerans: modica tamen adstringendi abstergendique facultas ei inest: quamobrem inferior est & sarcoticis medicamentis, quae medio critere extergentia ostendimus, & contrahentibus atque adstringentibus. Ceterum ad intertriginas femorum utilis melale est: quando quidem utriusque iam dictae facultatis leuiter est particeps. Iure itaque medi ordinis in metallicis habebitur. Proinde ea frequenter utitur ceu materia istis miscentes quae ualentem facultatem obtinent siue mordicantem, siue adstringentem, sicut in liquefactibus ad plerumque medicamentum ceram adhibemus tanquam materiam, quia scilicet & ipsa quodammodo medium tenet eorum quae ualentem facultatem possident.

Litrum. Cap. 45

Litrum dictum est supra in medio esse a phronitri & salis uisui: caeterum uisum propius ad aphroditum accedit, utpote ex uisui tenuius redditum. desiccatur itaque ac digeritur: & si intro in corpus sumatur, secat & extenuat crassos lentosque succos potius multo quam sal. Aphronitrum uero, nisi grauis urgeat necessitas, de uorandum non est, nimirum inimicum stomacho: quando quidem plus etiam litro incidit. Sane ad fungos suffocantes, rusticus quidam uti eo affolet: & semper profuisse probatum est. Ceterum litro uisui simul & non uisui, & multo etiam magis eius spuma in talibus uti consueuimus.

Melanteria. Cap. 46

Melanteria ex medicamentis est multum adstringentibus, cum hoc quod omnia propemodum adstringentia tenuitate exuperet.

Melanographiceu. Atramentum scriptorium. Cap. 47

Atramentum quo scribimus, admodum & ipsum desiccatur aqua solutum: ulcera autem igni ambusta protinus illitum iuuat: at si acetum quoque habeat, multo magis.

Misy. Cap. 48

Misy in metallo Cypri, cuius modo mentionem feci, in montibus Solorum, domus erat ingens, cuius ad parietem dextrum, sed ad nos utique qui ingrediebamur sinistram, descensus erat in ipsum metallum, in quo quosdam conspexi in longissimum porrectas ueluti zonas alias super alias, numero tres: infima erat ipsius foreos, super quam erat altera chalciteos, suprema misyos. Ceterum id temporis praefectus metalli, his commonstratis: Sicut, inquit, nunc aduenis in cadmie fornacarie inopia, ita horum trium admirandas has uides diuitias. Itaque ego ingenti eius accepto pondere, primum quidem in Asiam, deinde Romam attuli, & usque modo habui, elapsis iam annis plus minus triginta. Et forte quadam absolutum fuit hoc opus ad usque octauum librum ante annos utingit, nec adiectus fuit nonus, partim quod lapides quosdam modum conspexissem, partim ob alia negotia quae mihi interea temporis obuenerunt. Nunc autem cum nonnum hunc librum caeteris addere pararem, interea

forte fortuna mihi accidit res spectatu longè pulcherrima, ac si quispiam eo studio ac industria magno cum artificio effecisset. Nam cum misy opus haberem ad medicamen quodpià preparandum, bolum eius accepi, quam ferè plena manu teneas, qualem sanè consistentiam misy nō admodum solet habere, cum in parua frustula diuidatur. Miratus itaq; insolitam eius condensationem, bolo fracta, extimū quidem misy circum quaq; reperi eius quod intus erat uelut efflorescentiam. Porro sub eo, inter chalcitin uidelicet & misy, quiddam erat medium uergens ex chalcite ad misy, ex dimidio iam cōmutatum: principio enim bolus fuerat chalciteos, ceterū quod in alto erat, perfecta erat chalcitis, nullam dum alterationem experta. Hoc igitur ubi uidissem, cogitatione repetens & in metallo ita super chalcitin nasci ipsū misy, ut erugo super eas, in mentem subijt inspiciere quod seruabatur adhuc apud me reliquū ipsius foreos, nunquid & ipsū uillam accepisset mutationem in chalcitin: & quædā certe apparuit suspicio, ut uideret & ipsū forte longo tēpore mutationem in chalcitin posse accipere. Itaq; mirum non est, tria hæc medicamina eiusdem genere facultatis esse, fori dico & chalcitin, & misy, tenuitate & crassitudine inter se diuersa. Crassissimū enim est inter ipsa fori, tenuissimū misy, mediā utriusq; facultatem habet chalcitis. Adurūt uniuersa hæc tria, & escharas quas uocant efficiunt. Attamen etiā si urant, non nihil quoq; adstringunt. Cæterum misy ad motum corporibus duris minus chalcite mordicat, tametsi ea non minus sit calidum: uerum id habet beneficio tenuitatis. Porro cum utraq; hæc in decoctionibus fundantur, & magis chalcitis quàm misy, fori tamen non liquefit, nimirum quòd lapidolius sit ac uehementius compactum: sicut rursum misy quia à congenito calore elaboratius est, ac proinde siccius chalcite, idcirco merito quoq; ægrius liquefit.

Molybdæna. Plumbago. Cap. 49

Molybdæna simile lithargyro uim possidet, tantū à media temperie ad frigidius paulum quid recedens. Sed nec abstergentis facultatis est particeps. Vtraq; autem hæc medicamina liquari possunt, ac nō ut lapides, & cadmia, & arena liquationem respuunt, sed celerime liquantur, ubi oleo additum nonnihil acetū est: liquantur tamen etiā admixta aqua, sed diutissima coctione. Porro ceu in Cypro Cadmiā, quæ in montibus & riuis nascitur, accipiebā, quæ & ipsa lapidis, ut dixi, species est: ad eundem modum Molybdænam multā cum alijs profectam lapidibus conspexi in uia quæ ad Ergasteria ducit à Pergamo. Vocatur autem Ergasteria pagus quidam in quo metalla sunt, inter Cyzicum & Pergamū, quadringentis & quadraginta stadijs distans à Pergamo.

Molibdos. Plumbum. Cap. 50

Plumbum facultatis est refrigeratoria. Siquidē non modo multam habet substantiam humidam à frigore cōgelatam coactamq;, sed & aeream, pauca autem terream. Igitur quòd plurimam habet

essentiæ humidæ à frigore coactæ, indicium tibi esto, quòd ubi admotum est igni, celeriter fundatur fluatq;. Quòd uero & aereæ sit particeps, hoc habet signum. Omnium quæ nouissim, unicūm plumbum tum mole ipsa, tum pondere augetur, si condatur in ædibus subterraneis aerem habentibus turbidum, ita ut quæcunq; illic ponantur, celeriter situm colligant. Tum etiam plumbea statuarum uincula, quibus earum pedes annectuntur, se penumero creuisse uisum est, & quædam adeo intumuisse, ut ex lapidibus dependerēt crystalli modo uerruca. Atque hæc probabiles quidem sunt humiditatis eius frigiditatisq; notæ, prius q̄ experientis: cæterum scientificæ & certę per experientiam cognoscuntur. Preparato igitur mortario, simulq; pistillo, utrisq; ex plumbo, infunde quemlibet liquorum, itaq; terito ut & pistillum, & plumbum mortarium succum quandam reddat, id quod ex utroq; constabit, multo erit frigidius quàm liquor ipse fuerat. Licet autem & aquam, & uinum tenue aqueum, & oleum iniicere, aut quiduis eiusmodi. At si etiam plus efficere succum uoles refrigeratorium, oleum omphacinum sit, aut rosaceū, aut melinum, aut myrtinū. Porro si succo qui proueniet uti uoles, optimum habebis remedium & ad phlegmonas in sede cum ulcere aut rugis auferentes, & ad eas quæ in pudendis, testibusq; & uberibus consistunt: similiter aduersus cæteras omnes fluxiones incipientes, quæ aut in inguina, aut in pedes, aut in alium quemuis articulum decumbunt. Sed & ulceribus rebellibus utile est. Nam ad caneros eo utens, uirtutem medicamenti mirabere. Quòd si celeriter multum succi plumbei uoles colligere, conare in sole terere, aut quocunq; certe modo aere excalcato. Multo autem utilissimum habebis medicamentum, si adfuso refrigerantium succorum quopiam teras, ceu semperuiui, coryledonis, intybi, lactuca, chōdriles, psilij, omphacis, portulacæ. Porro si qua horum non facile in succū soluntur, uelut portulacæ, misceto illis aliorū succorum quempiam, uelut omphacis, qui & ipse per sese prædicto mortario inditus, medicamentū efficit refrigeratorium longe pulcherrimum. Quin & in laminam diductum plumbum ipsū per sese athletarum sese exercitantium lumbis insternitur, ubi Veneris somnijs uexatur scilicet: nimirū haud obscure eos refrigerans. Sed & bractea tenuis probe ganglio illigata planè ipsūm distipat. Illigabit autem probe quicquas ab Hippocrate didicerit in ipsam noxam potius firmandum, quàm hinc uel inde. Mirum ergo nō est, si plumbum crematum, ac rursus ablutum, refrigerantis efficiatur facultatis, cum ante lotionem mixta fuerit. Et hoc ipsū medicamen, nempe plumbum combustū, bonum est ad ulcera rebellia. Vbi uero lotum fuerit, multo optimum medicamen est & ad ulcerum impletionem, & ad eadem cicatrice obducenda. Conuenit & Chironeis quæ uocant ulceribus, & cancris omnibus, & putredinosi, tum ipsū per sese, tum medicaminum ad cicatricem perducentium, quibusdam commixtum, quale est quod ex Cad-

mia conficitur. Cæterum soluedum est principio, si copiosa sit sanies, quotidie: si minus, tertio aut quarto quoque die. Verum foris spongiam imponi to aqua frigida, quæ si desiccetur, rursum mergatur. Sed hæc fusius quam pro instituto diximus, plusculum sermonis affinitate prouecti. At tæpus iam est sequentia deinceps persequi.

Ostracon. Testa. Cap. 51

Testa desiccandi uim possidet, atq; abstergendi, maxime quæ ex fornacibus est, quod uidelicet tosta sit. Quocirca Emplastrum quæ uocant Hephæstidam, ex hac præparata uidelicet, optimû est medicinam inducendæ cicatrici.

Pompholyx. Spodium. Cap. 52

Pompholyx fit & in æris fornace, uelut & Cadmia: fitq; & dum in fornacibus Cadmia uritur, ut in Cypro. Cum enim præfectus ad æris fornacem instructas res non haberet, præcepit ex ipsa Cadmia præparari (præsentibus atque inspeçantibus nobis) pompholyga, uidelicet minutis Cadmiæ fragmentis in ignem coniectis, qui ante ararium facebat follem. Camera erit incurua, nusquam per rufa, sed integra, quæ egestam ab usta Cadmia fauillam excipiebat, quam ubi collegissent, habebat pompholyga. At quod reflectens in pauimentum recidebat, spodos est quam uocant, quæ plurima ubi æs in fornacibus uritur, colligi assolet. Quidam eam spodium neutro genere pronunciant: Cui uidentur similem habere facultatem quod uocant Antispodium. At ego illo usum sum nunquam, cum large mihi semper pompholyx suppeteret. Nec enim quisquam ubi hæc adsit, spodio uti uelit, nedum antispodio. Est autem pompholyx medicamentum propè omnium quæ citra morsum desiccant, si elota fuerit, præstantissimum: quamobrem ad ulcera cancrofa idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaq; inditur collyrijs quæ ad oculorum imponuntur fluxiones, quæq; bullas siue pustulas in eis natas curant. Præterea ad pudendorum ac fedis ulcera optimum est medicamen, nimirum sine morsu desiccans. Sed non est huius negocij in istis diutius immorari.

Sandarace. Cap. 53

Sandarace uerentis est facultatis, ceu Arsenicum quod uocant. Merito itaq; eam digerentibus facultatibus commiscet, atq; extergentibus.

Sandix. Cap. 54

Sandix qua fit facultate prædita, in sermone de psimythio explicabitur.

Scoria. Cap. 55

Scoria omnis resiccatorum medicamen est, potissimum autem ferri. Si quidem ad leuiorem redigens ipsam in aceto quamacerrimo, postea que decoquens, ad aures quæ longo iam tempore pure fluxerunt, ea uitor pro medicamento maxime exciccatorio, adeo ut mirentur qui præparantem me uident, & ante rei periculum fidem non habeant, aures tale posse ferre medicamen. Porro argenti scoriam proprie helcysma appellant. Verum emplastris quibusdam resiccatoræ facultatis commiscetur.

Stimmi. Cap. 56

Stimmi, ad facultatem desiccantem adiunctam habet hoc medicamen adstrictionem: quamobrem & ocularibus medicinis commiscetur, & illis scilicet quæ conformantur in collyria quæ uocant, & siccis, quæ utiq; sicca collyria cognominant.

Stypteria schiste, strongyle, & hygra. Alumen fissile, rotundum, & humidum. Cap. 57

Stypteria, huius medicamenti nomen ab adstrictione deductum est: nam adest illi uehementissima. Cæterum cum sit crassarum partium, tenuior quodammodo est quæ uocatur schiste, hoc est fissile: proxima est strongyle, & astragalotis. Admodum autem crassa est, tum liquida, tum placitis, & plinthitis appellata.

Titanos. Calx. Cap. 58

Calx, uisua quidem, quæ uoces & græce dicitur, uehementer urit, adeo ut crustas efficiat: extincta uero protinus etiam crustam molitur & ipsa: at post diem unum aut alterum minus urit, minus que inducere crustam potest. At uero temporis progressu prorum nec crustam quidem gignere queat, tamen etiam num calfaciat, carnem que liquet. Porro si lauetur in aqua, suam mordacitatem exuit, efficitq; nuncupatam græce *uoriat*, (la sine lixiuim.) At ipsa absque morsu resiccant: ac si bis ter que, aut amplius abluta fuerit, planè mordacitatis expers constituitur, ac strenue absque mordacitate exciccant.

Hydrargyros. Cap. 59

Hydrargyros non est ex sponte nascētibus medicamentis, sed ex ijs quæ præparantur, uelut psimythium, ærugo, psoricum, lythargyros. Nullum autem eius feci periculum, neq; quod interimat, si deuoretur, neq; ubi foris admo'ta sit.

Phycos. Cap. 60

Phycos cuiusnam sit facultatis, ubi de psimythio agetur, exponam.

Chalcanthos. Atramentum sutorium. Cap. 61

Chalcanthos. Forte fortuna & chalcanthum in chalcitum transire cōspexi. A sportaui enim ex Cypro & huius medicamenti ingentem copiam. Extimum eius omne post annos plus minus uiginti chalcitis esse etum est, intima eius parte chalcanthi speciem seruante. Quamobrem & usque in hunc diem quod sic mutatur, asseruo, obseruans dum ad immum usque uoluētibus annis procedat mutatio, ceu chalcitidis quoq; in misy: ut esse antè positum; Cæterum mirari subit de hoc medicamento, quo pacto uehementissimæ adstrictioni admista est caliditas nō instrenua. Constat ergo quod omnium maxime condire seruaræ que carnes humidass potest, nimirum caliditate humiditatem absorbens, atque adstrictione substantiam contrahens atque constipans: hoc enim opere non nihil etiam humiditatis ipsius exprimit. Constringit uero, desiccant, atque contrahit in sese totius substantiam carnis. Porro quo tempore in Cypro diuersabar, hunc in modum medicamentum hoc colligi cōspexi. Dominus erat magna quidem, sed humilis, ingressui in metallum obiecta. Ad parietem autem domus sinistrum

niftrum, qui erat ingredientibus dexter, effofus erat fpecus in continentem collem, ea latitudine, ut tres fele uiri in eo contingerent, tanta uero altitudine, ut uiro fumme procero recto liceret incedere: Specus hic decliuus quidem erat, fed non planus, uerū multis locis præruptus. Porrò ad finem eius quafi in ftadium porrecti, lacus erat aquæ uiridis & craffa, calore tepenti. At in toto defcèfu calor fimilis qualis in primis balneorum ædibus percipitur: quas, quòd in eis corpora præmolliſſe ſoleant, promalactèria appellare conſueuerunt. Aqua uero quotidie guttatim ex pertuſo colle deſtillans, quatuor & uiginti horis totius diei ac noctis colligi aſſolet ad amphoras Romanas quafi octo. Eam uincti quidã in piſcinas quafdam quadratas ficiles in domo ad ingreſſum poſita ſtias efferebant, in quibus paucis diebus concreſcebat fiebatq; chalcantus. Mihi uero ubi ad terminum effoſi ſpecus deſcendiſſem, ubi uidelicet tepida hæc uiridisq; aqua colligit, æris odor uiſus eſt ſuffocans, & toleratu difficilis, chalcitini æruginemq; redolens. Et aqua quoq; gultu præferēbat qualitate eiuſmodi. Ea propter & nudi, & cum ſumma feſtinatione amphoras uincti exportabāt, nec longiorem illic moram perſerre poterant, fed celertè recurrēbant. Accenſi autē erant mediocribus in ſpecu interuallis lychni, qui nec ipſi longo tempore durabāt, fed celerrime extinguebātur. Hunc ergo ſpecum pederentim excauatum multis annis, ab ijs tunc didici. Hæc enim, inquiebant, aqua uiridis quam uides ex colle in lacum manantem, ſenſim ſeipſa minor effici aſſolet. At ubi propē ad eſt ut deſinat, rurfum uincti, quod continens eſt ipſius collis, perſodere pergunt: euenitq; aliquando olim ut ſubito quicquid perſoſſum eſſet, concideret, omnesq; ad unum occideret, ac totam uiam corrumpere. Id ubi fit, alio foraminē ſodiēdo eo uſq; inſiliūt, quoad rurfum aqua illis adſit. Hæc habui quæ tibi de chalcantus exponenda cenſerem, & ſane fortaffe non neceſſaria, cæterum quæ ſcire præſtaret quam ignorare. Memineris autē, quòd ad ſiniſtram manum ingredientibus conſpectum nobis dixerim metallum ſoreos, chalciteos, & miſyos: ut ex his conſicere liceat, aquam pluuiam totius collis terram illam colluere atque abluere, ex qua ſponte quidem fiebat ſori, miſy, & chalcitis: & per fornaces æs, cadmia, pompholyx, ſpodium, & diſphiges.

Chalcitis. Cap. 62

Chalcitis, dictum de ea eſt in ſermone de Miſy: nunc autem tantum dixiſſe ſufficiat, quòd miſtas habeat adſtringentem acremq; facultates. Cæterum uincti acris, ut quæ adeo eſt uehemens, ut carnem urat, uocantq; eſcharam efficiat. Vſtum hoc medicamentum minus quidem mordicat, cæterum non minus deſiccatur: ſed & adſtrictionis non parum remittit. Itaque unde quæq; melior eſt chalcitis uſta quam quæ non uſta eſt, nempe partibus

Galen.

tunc quidem tenuioribus redditis, ceu alia omnia combuſta, uerum haud aſſumpta acrimonia, uelut in alijs multis accidit. Didiciſti porrò, quòd uſta omnia ſi lauentur, moderatiora reddantur, minusq; mordacia.

Chalcus cæcaumenos. Aes uſtum. Cap. 63

Aes uſtum eſt & acrimoniam quandam, ſed & adſtrictionis eſt particeps. Proinde ſi laueſ, pulcherrimum eſt medicamē, inducēdis cicatricibus: quanq; idipſum præſtare & antequam laueſ poſſit, poiſſimum in carne duriore: alioqui in molliore commodius eſt quod ablutum eſt.

Chalcu anthos. Floſ æris. Cap. 64

Floſ æris tenuioris eſſentiæ eſt, q̄ aut æs uſtum, aut ſquama. Merito itaq; ex eo factis collyrijs extergunt auferuntq; ſuperciliorum magnas aſperitates, quas uocant ſycofas.

Chryſocollo. Cap. 65

Chryſocollo, & hoc medicamentum ex ijs eſt quæ carnem liquant, non tamen ualenter mordicat, quanquam ſit facultate admodum digerente deſiccanteq;. Igitur quidam id modo quod in metallis inuenitur, ita nominant: alij uero id quod in aëro mortario piſtilloq; aëro ex pueri urina præparatur: id quod quidam inter æruginum differentias numerant. Satius uero eſt ipſum præparare tempore æſtiuo, aut certe aëre proſum calido, urinam in mortario terentes. Præſtat autem æs, ex quo mortarium piſtillumq; conſicias, rubrum ſit. Nam quo æs molliuſ fuerit, eo plus circumagendo piſtillo deteritur. Hoc medicamentum aptiſſimum eſt ulceribus contumacibus, tum per ſe, tum alijs miſtum, ut in opere de componendis medicamentis referetur. Nunc autem id nouiſſe ſat eſt, quòd quanto plus quam chryſocollo metallica deſiccatur, minusq; mordicat, tato etiam ipſam excellit tenuitate. Ipſam tamen chryſocolam illam ſi ueras, multo tenuiorem efficiet.

Pſimmythium. Ceruſſa. Cap. 66

Pſimmythium, & hoc medicamē teſtimonium præbet modo dictæ facultati. Nam ſi ex acri aceto ſoluatur, gultu tamen neq; acre erit, neq; mordax, ſed emplaſticum & refrigeratorium: facultatis ærugini diſſimillimæ, tamenſi & illa conſiciatur aceto æs diſſolvente. Porrò ceruſſa aduſta, in ſandyca quam uocant, tranſit, medicamentum ſeipſo tenuius, nondum tamen excalcaciēs. Phycos autem ſeruata ceruſſæ frigiditate, tenuitatem aſſumpſit, ut per eam in profundum altumq; corporum quibus admoetur, uis eius penetrare ualeat.

Pſoricum. Cap. 67

Pſoricum, Conſicitur hoc medicamē dupla chalcite admiſta lithargyro: antè tamen utriſq; aceto acerrimo ſolutis, ſicq; in ollam nouam coniectis, quam ſimo æſtate media diebus quadraginta obrutam ſepelies. Hoc medicamē delicatiorum eſt, ſimulq; minus chalcitide mordax: nimirum cum partibus conſtet tenuioribus.

Procediam. Summatim argumenta precedendum huius operis librorum omnium perstringit: & q̄ deinceps ea remedia perscripturnus sit quæ ab animalibus sumuntur. (In hoc quidem libro ab excrementis: in undecimo autem ab ipsis animalibus aut partibus eorum: & circa finem eius de marinis quibusdam rebus) Deinde inuehitur in Xenocratem & similes, qui humanas partes aliquas & excrementa omne genus, quorum multa abominanda sunt, in remedijs posuerunt etiam intra corpus fumendis: Postremo in eos qui noxia medicamenta literis mandant. Cap. 1. De sanguine. 2. De stulto sanguine, & columbino, cum experimentis. 3. De columbino sanguine (uide etiam circa finem præcedentis capituli) cum experimento. Laus rosacei ad ossa caluarie peritosa. 4. De sanguine uespertiliois, capræ, galli & gallinæ: agni & hœdi cū aceto ad hæmopticos: Vrsi deniq; capræ & hirci & tauri ad abscessus. Reprehendit autem hoc & duobus sequentibus capitulis, curiosa & exquisita nimis & superstitiosa pharmaca. Imprimis autem hoc capite, & posteriore parte præcedētis, damnat curiosum usum ex sanguine animalium quorundam, quorum loco promptiora alia & præstantiora medicamenta habemus. 5. De sanguine uiridium ranarum parutarum & ricini, in sanguine esse non renasci pilos palpebrarum, si euulsis eis illinantur. 6. Quod sanguine crocodili, equorum admittariorum: & murium nunquam uoluerit uti. 7. De lacte. Lactis optimi notæ. Lac abluuit ut aqua, illinit ut adeps, abstergit que seri ratione. Quorum animalium lacte utendum. Butyrum uide etiam sequens caput. 8. Serum lactis. Quomodo igniendum sit lac cum lapidibus. Lactis integri facultates cum alia multæ, tum contra uenena. Mendacia de canino lacte. 9. De caseo. Experimentum de caseo uteread poros in arthritide: & aliud quod caseus nouus uulnera glutinet. 10. De butyro (de quo etiam in fine capituli septimi) cum experimentis suis. 11. Coagulum, cum experimento. Phoca coagulū. 12. Fel aut bilis. Nomen & colores fellis. De tauri felle pluscula.

GALENI DE SIMPLICIVM

MEDICAMENTORVM FACVLTIATIBVS,

Libri decimus.

PROOEMIUM.



ihil eorum quæ nunc dicenda ueniunt, magnopere iuuare poterit eos qui ea quæ principio huius tractationis, primis uidelicet quinque libris tradita sunt, ignorant; imò quædã forsan istis noxæ occallo erudit illi, qui cū scriptis hinc medicamē-

tis uti uolet, rationē tamen ac methodum non habeat. Tanq̄ itaq; illa didiceris, ita tecū uerba faciā, repetita totius tractatus summa. Ostensum est, medicamēta quæ esse tribus, nominatis qualitatibus agunt, nempe caliditate, frigiditate, humiditate & siccitate, harū missione effici acerba, austera, salia, falsifuginosa, amara, acria, dulcia: præterea extergētia, repercutiētia, attrahētia, emollientia, uentia, septica, crustifica: ad hæc secundū alias actiōes magis speciales sarcoptica, synulotica, glutinatoria tū fistularū, tum ulcerum, aut carnis excrecentia detrahētia. Ostensum quoq; est, quo pacto uniuersalis facultas experiētia unica demonstratorie inueniatur, nec ea uulgari & quauis, sed quæ cum dictis adhibetur limitationibus. Cæterum inuenta

Differentia eius ex colore & substantia. Fella diuēria, quadrupedum, auium, piscium. 13. De sudore (obiter quid temperie ambientis significetur) sapore & colore eius: Et quid medici de eo scripserint, nisi uel superstitiosa quædam, uel superflua, id est quæ commodius per alia medicamenta efficiantur. Experimentum ad bubonem. 14. De urina. 15. De humana urina, & potu contra pestem, alijsq; uiribus. Experimentū ad ulcera, & pedes ostenos. Chrysofolla quomodo fiat ex pueri urina, deq; usu eius ad ulcera maligna: Vide supra lib. 9. cap. 65. Sedimenti urinae usus ad erysipelata. Urinae potum ad orthopnoeam non laudat, quando quidem frustra eam expertus sit: nec alias ob causas intra corpus sumi approbat. 16. De spūto, & remedijs ab eo expertis. Quod uenenosus animalibus præcipuē scorpis aduerferur. 17. De his quæ in corpore cōtra naturam gignuntur, ut calculus uescicae, pus: q̄ non adhibenda sunt pro remedijs. 18. De stercore: nō utendum esse humano: sed bubulo, caprino, &c. quæ minus foetent. 19. De canino stercore & eius experimētis. 20. De humano stercore: & experimentum contra periculum suffocatioem ab inflammatione circa fauces. 21. De lupino stercore, & experimēto eius ad colicā. 22. De caprino stercore, cum experimētis aliquot: Et q̄ parabilib; huiusmodi, quæ homines auerſari solent, alijs tantum remedijs destituti, & in duris rusticisq; corporibus utendum sit. De excrementorum qualitate & differentia in genere. 23. De bubulo stercore, cū experimētis Myſi medici. 24. De ouillo stercore, cū experimētis eiusdem. 25. De columbino stercore, cum suis experimētis. Qui affectus phoenigmo indigeant. 26. De gallinaceo simo, cū experimētis. 27. De simo anserum & ciconiarum: & q̄ quidam falso ciconiarum simum ad epilepsiam & dispnoeam conferre scripserint. 28. De mucſerda, qua quidã ad alopecias utebatur: alius glandibus, quæ supponuntur, miscebat. 29. De simo crocodili terrestriſ, & sturnorū. 30. De sordibus aurium, & cutis humanae: & œſypo.

semel facultate uniuersali, nulla in super experientia opus esse ad particulares actiones, nisi ad cōfirmationem eorū quæ ratio reperit. Sic ergo nunc quoq; iudiciū faciamus proposita materia, quæ est ea quæ ab animatibus accipit. In tribus enim libris qui insequuntur quintū, nempe sexto, septimo, & octauo, materiã ad plantas attinētē exposuimus, non sanē omnē quæ uniuerso terrarū orbe periat, sed quantū nobis experiri eius datū est. In superiore uero qui est totius operis nonus, eam quæ uersatur in terroſis ac lapidosis, enarrauimus. Reliquum porrō nunc est, ut eam quæ ab animalibus sumitur materiã, diuidamus. Deinde restat quæ in mari, paludibus, aut omnino in aqua nascuntur, quæ quidem neq; planta, neq; terra, neque lapis, neq; animal sunt. Ea planē paucissima sunt, & ultimo loco scribenda, postquam uidelicet quæ ad animantium corpora pertinent, absoluero. In quibus is doctrinæ ordo seruabitur, qui in nomenclaturarū primis uisitur literis. Porrō sicut in plantarum materiã etiam de succis, qui ex ipsis fiunt, differuit: ita nunc quoque non solum edocebo solidarum in animalibus partium facultatem, sed eorum

rum quoque quæ in ipsis continentur, puta pituita, bilis, sanguinis, urinæ, stercoreis, et similibus. Igitur in ijs quæ superius sunt dicta, haud ita multa particularia eorum quæ in materijs cõscripta sunt à medicis, ignota mihi fuisse: uerum operam dedi, ut ipse per experientiam facultates eorum cognoscerem. Quòd siquid ignorabam, planè nec de illo quicquam cõscripsi, haud credendum alijs censens, ne de uno quidem eiusmodi, quòd certum habeam nonnullis multa mentiri. At in præsentì materia non ita se res habet. Ingenuè siquidem fateor, cõplura esse tum partium, tum liquorum in animantium corporibus comprehensorum, quorum nullius eiusmodi feci periculum, cuiusmodi quidam scripturam reliquerunt. Si quidem quædam eorum abominanda detestandaque sunt, quædam etiã le-
gibus uetita, de quib. haud scio quo pacto scribere licuit Xenocrati, hominì nõ oliũ nato, sed proaurum nostrorum seculo, cum imperium Romanum hominibus uelci uetuisset. Atque ille sanè, tanquam ipsemet fuerit expertus, magna profecto fiducia scribit, quosnã affectus curare ualeat comedens cerebrũ, aut carnes, aut iecur humanũ: quos autem capitis, fure & digitorum ossa partim uita, partim uisionem non experta: quæ denique & sanguis. Sed hæc sanè tametli contra leges sunt, non tamen sunt foeda atque abominanda. At potio sudoris, aut urinæ, aut mensium mulieris, abominanda detestandaque est: atque horũ in primis sterco, quod tamen scribit Xenocrates, si oris ac gutturis partibus inungatur, & in uentre deuoretur, quid præstare ualeat. Scripsit etiã de aurium sordibus deuorandis. At ego ne has quidem unquam deuora re sustineam, ne si in totum quidem morbo deinceps liber degerem. Atque his etiã magis abominandum puto sterco. Estque probrum grauius hominì modesto audire *το νεφελαγωγον*, hoc est sterco- uorum, quàm fellatorem aut cinedum: & inter fellatores magis execramur qui phœnicissent, quàm qui lesbiantur. Cui nõ dissimile mihi uidetur perpeti qui menses bibere sustinet. Itaque horum nemo periculum facere non auefabitur, hominũ certe secundum naturam habentium: neque insuper quæ tametli modestiora uideantur, tamen etiã foeda sunt, nempe partem aliquã corporis stercore inungi, perpeti, ob affectum scilicet, si quæ patiatur: aut humano femine, id quod *γόνου*, hoc est geniturã, appellare solet Xenocrates: summaque diligentiã distinguit, quænam ipsa genitura sola illita, quæ uero ubi ex sinu mulieris post coitum uiri effluerit. Nam ingens sit medicamentorum penuria oportet, ubi quis quòd chimethla, siue perñiones culeris, uirifemine conquirere cogitur, quod in mulieris congressu intus nõ remanet, uerum effluxit, atque effusum est. Atque pleraque sanè eiusmodi materiæ species est in ijs, quæ de utilitate ab animalib. percipienda, ab illo sunt cõscripta. Si quid nõ quã uim habeat epota urinã, aut deuoratum illiusmodi oris partibus sterco dũtaxat hominis enariat, uerum etiã aliorum cuiusque animalium, atque alia etiã non pauca rarorum & paratu difficilium, pu-

ta cũ elephantis aut equi Nilot meminit. Nam ba-
siliscum reptilium generis bestiam ne uidere quidem mihi unquam contigit: & si uera fuit quæ de illa referuntur, periculosum etiã est uel propè accedere ad hoc animal. Non dissimilia ijs qui à Xenocrate scripta sunt, & ab alijs prodita sunt de animalibus, ex quibus & ipse Xenocrates pleraque exscripsit. Nam unde illi tantarum taliumque rerũ experientiarum fuisse copia: Sanè rex quòdam nõ ster Attalus cum ambrosiosissima talia ad experientiam conquireret, tamen pauciora scribere conspicitur. Porro quidam Ateuristi eandem tractationem commendans, perlegendã mihi tradidit: cæterum iudicio meo nec illa quidem etiã ita ab illo cõscripta est, ut omnia ipse fuerit intuitus, oculisque suis præsens cõspexerit. Proinde nec ego basiliscorum, aut elephantorum, aut equorum Niloorum, neque alterius cuiusquam, cuius ipse periculum non fecerim, meminero. Porro *φιλτρον ἐργασίμου, ἐν ἰσθμῷ πηδῶν & μισθῶρου* (ex industria enim ipsa illorum nomina recensuit) hoc est eorum quæ amorè conciliant, somnia inducunt, & exosos faciunt, planè nec si abunde illa forent expertus, mentionem facere in animũ inducerem, sicuti nec letalium medicamentorum, aut aliorũ ut ipsi uocant, *παροποιδῶν*. Nam illa sanè ridicula sunt, constringere ac uincire aduersarios, ut in iudicio nihil possint eloqui, aut grauidẽ abortum afferre, aut ut ne unquam deinceps cõcipiat efflicere, et quæcũque eius sunt generis. Sanè horum pleraque uel antequam facias periculum, scire licet esse impossibilia: quædam uero possibilia, cæterum uitæ mortaliũ noxia. Itaque ego, per deos, admiror, qua cogitatione, quòue consilio ad ea scribenda quidam accesserint. Nam quæ uiuẽtibus de decori atque ignominia rebus prodita, quo pacto sibi post mortẽ gloria fore sperauerunt: Itaque i regia potestate præditi in hominibus mortì condemnatis illa experientur, nihil graue committerẽt. At ubi totam uitam degunt priuati, atque eiusmodi potestatis expertes ad ea scribenda accedunt, duorum alterum necessesse est: Aut enim si experti non sunt, ea cõscribunt quæ ipsi ignorant: aut si experti sunt, hominũ omnium sunt uel impijssimi, qui experientia de gratia hominibus innoxijis perniciosissima medicamenta exhibent, ac nõnunquam etiã honestis ac probis uiris. Nam quidam medicis duobus ad unguentariorum officinam cõspectis, attulit ad eos mel, uen diturus scilicet: illi ubi gustassent, de precio disceptant: at hic tanquam illi parum offerrent, prope subducit sese: uerum medicorum neuter seruatus est. Itaque non minus qui scribunt, quàm qui talia perpetrãt, immo magis etiã odio digni sunt: quanto scilicet minor iniuria ad scelus est, quod solus facias, quàm quod cũ multis. Deinde cum eo qui perpetrãuit, moritur & malorum theorema experientia. At eorum qui scriptis prodidere, immortalis est malitia arma prauis hominibus suppeditans. Iam igitur nos dicamus de ijs rebus quæ humano generi sunt utiles, utique quarum fecimus periculum.

Hæma. Sanguis. Cap. 1

Sanguis, intelligendum uidelicet est animalis secundum naturam habentis: nam is re uera sanguis est. At melancholicus, aut picrocholicus, aut pituitosus, aut ferofus, aut putridus, sanguis est mistus, ex sanguine scilicet uero, & succo, aut farie illi permista. Tum ipsius quoque sanguinis naturalis in quoque animali alius est liquidior, alius ficior: hic magis, ille minus calidus. Nam frigidus sanguis nullus est.

De sanguine suillo. Cap. 2

Sanguis suillus humidus est, & minus calidus: humano maxime temperie similis. Siquidem & carnes suum humanis sunt similes. Comperti enim sunt hospites & coqui complures, qui humanas carnes pro suillis uenderent: tamen qui eas edissent, nullum omnino discrimen percipere poterint. Quin & ipse narrantes audiui uiros fide dignos sese in diuersorio publico ius estasse delicatum cum carnibus suauissimis: ceterum cum iam penè futuri essent, inuenisse digiti partem anteriorē, quæ uidelicet ad unguem est, quo percussi, ac metuentes eos qui agebant in diuersorio, ne scilicet se quoque uorarent, ceu ei rei affluerit, protinus quidem illinc exiere, ac uomitu redditis quæ ederat, ita iter denuo ingressi sunt. Sed & in ipso facinore homines maciantes deprehenso non ita multo post referebant. Itaque iure quispiam existimet suillum sanguinem humano esse simillimum. Ex tali enim sanguine tum prima constat generatio, tum postea nutritio carnibus. Itaque quisquis sanguinem humanum morbo alicui utilem esse ait, in suillo primum id comprobet: ac si non eandem, saltem similem actionem ostendat. Nam etsi aliquatenus inferior sit humano sanguine, saltem asimile quippiam efficiet, quo cognito, ab humano pleniorē fore utilitatem sperabimus. Nam si ne paulum quidem promissis respondet, non erit cur in humano experiri oporteat. Quippe similia efficere posse similia, experti sumus. Nam columbæ sanguinem Pergameni nostri, atque adeo per totam ferè Asiam qui capitis ossa contracta perforant, in crassum cerebri inuolucrum effundere assolent. Postea quidam cum haberet palumbum, nec esset ad manum columba, usus est palumbi sanguine, & tamen seruatus est homo ille. Et alius turturem eundem ad usum applicans, nihil hominem læsit. Siquidem similibus ad eundem uti affectus, ubi quæ antea expertus sis non adfuit, unum est ex confelsis, & experientia comprobatis. Et humanæ uitæ plerumque hunc in modum peraguntur.

Hæma pteristeris. Sanguis columbæ. Cap. 3

Porro quoniam exempli uice mentionem feci sanguinis colubini, nihilo deterius fuerit iam ipsum sermone proponere. Siquidem eo ad hypophagmata id est surgillata in oculis consistentia quidam utuntur, protinus uidelicet sumentes qui ex animante macerata effluit. Nam calidum in hypophagmata affundunt, uenis ad alarum exortus incisis, quod uidelicet ad multos usus idem animal sufficit. Alter pullorum tenerorum extractis penis (sunt autem hæ

molles, & fistulas humore plenas obtinet) eum ipsum humorem exprimebat, oculis instillans. At alius medicis controuerfisa fuit, pulli ne sanguinem, an colubæ adultæ meningi affundere oporteret et an maris, an foeminae. Ego uero sexcentos noui eorum quibus Romæ perforata fuere capitis ossa, nec quicumque ab usu rosæci citra columbæ sanguinem offensos. Verum id calidum sit æque atque colubæ sanguis, necesse est. Ac fortassis ipsa tantum caliditatis in cõtractu moderatione est utilis, haud quaquam eximia & incognita facultate. Adest illi quoque bona facultatis temperatura. Sed quid hoc? Nam & hæc rosæco inest, præterquam quod leuiter adstringat. Itaque melius inuenire nihil possis in capite perforato, quam ut rosæco probo utar. Indicaui autem supra, quo pacto oporteat rosæcum, de quo queri non liceat, præparare. Sed & collyria sunt plurima quæ medeantur hypophagmatis, & maxime quod plurimam recipit myrrham, quale est quod à Democrate compositum est, quod uocant diasmynon. Secundo sunt quæ habent multum thuris: post quæ sunt quæ ex croco constant. Quin & foenigraci succus sanguine columbino in hoc utique præstat. Quid ergo moramur aut columbos, aut palumbos, aut turtures, cum omnium medicamentorum paratu facillimum habeamus scenum græcum? tum memorata collyria in promptu seruemus? Ad eundem modum nec noctuæ sanguine ad difficulter spirantes egebimus; quancumque sunt qui non sanguinem bibendum exhibent, sed ipsam iubeant coctam edere ex albo iure. Ac sanguinem quidem alij aquæ, alij uino instillantes exhibent. Et fuit etiam quidam qui immodice hunc sanguinem apud mulierem alsidue difficulter spirantem extolleret, & cum rogarem, qualem ab eo sciret curatam spirandi difficultatē, ne id quidem noueret, quod plures essent. Et sanè in muliere quidem est usus, uerum profuit nihil.

Hæma mysteridis. Sanguis uespertilionis. Cap. 4

Sicut nec sanguis uespertilionis, quem scribunt quidam, si uirginum uberibus illinatur, plurimo ea tempore ab extuberatione tueri. Est autem & ipsum falsum, ueluti & quod enasci sub alas pilos prohibeat id quod recte Xenocrates tanquam mendacium calumniatus est. Verum ipse censet post illi usum ut calcanthion inspergendum, aut semē cicutæ. Atque ubi hoc factum erit, aut prorsum pilos non prodituros, aut certe lanuginosos: ceu leue atque exile medicamentum adderet cicutæ semen, ac non per sese sufficiat strenue refrigerare partes quibus fuerit impositum. Alij uero & puerorum pudendis sanguinem uespertilionis illinunt, credentes ita diutissime eas partes a pube seruari posse immunes. Atqui non oportebat putare diutissime, uerum perpetuo fore tales, uelut existimant & alas. Ergo ex refrigeratione partis uehemētē eiusmodi quippiam posse contingere, non est à ratione alienum. Non tamen adeo frigidæ facultatis est uespertilionis sanguis. Nam in totum nullus sanguis frigidus est. Sunt tamen non pauci qui pro alimēto habent sanguinem leporis, gallinarum, et caprarum; uerum

leporis & gallinarum coplures etiam eorum qui
urbes incolunt: at agrestes ventres ipsarum cap-
rarum sanguine illarum una cum adipē implēt,
ut Homerus ait solitos sponso Penelopes. Sed
nunc non tractatur de ijs quæ ciborū loco sumun-
tur, sed quæ adhibentur ut medicamēta. Sed quæ
dam sunt, uti supra posui, alimenta simul & medi-
camenta, quorum hic faciendā mentio est, quate-
nus medicamenta, non quatenus alimenta. Ete-
nim qui aqua inter cutem laborantibus sanguinē
caprarum cum melle exhibuerunt, eum ut medi-
camentum, non ut alimentum obtulere: tum qui ad
dysenteriam tosto eo, & ad ventris fluxum sunt u-
si. Videturq; mihi quispiā crassam esse essentia &
terrea cum caliditate exicatoria esse suspicatus,
ad hunc usum perductus. Porro gallinæq;
sanguinē cū ab ipsis ad meningū siue cerebri mē-
branarū hæmorrhagiā scriptū inuenissēm, nec ma-
gnū quippiā effecturū speraui, nec ausus sum ex-
periri. Simul em̄ metuebā, ne curiosos & stolidos
uiderer, si tantis, tāq; probatis remedijs semel præ-
teritis, considerē sanguinē gallinacum illis plus
posse præstare. Simul uero cū eiusmodi sanguinis
eruptio a modū sit periculosa, nō est mihi uisum
fore honestū, si ad ea quæ explorata essent, tran-
sissēm. Siquidem periculosa est eiusmodi experi-
entia, & quæ solis regibus in homines noxios me-
rito usurpatur. Desperabam uero etiam de sangui-
ne agnorū, quem quidam comitali morbo mede-
ri potum scriperūt. Itaq; nec hunc quidem etiam
experimento dare sum ausus. Quod si quis experi-
ri uolet, certō scio damnabit qui talia scriperunt.
Siquidem quæcunq; potu iuuant epilepticos, ea
facultatis sunt incidentis. At sanguis agninus om-
nium minime talis est. Porro quod ex hædorū san-
guine prodidit Xenocrates, quod existimasse non
esse impossibile, ratus ob acetum missionem posse
aliquid efficere, persuasi cuidam in agro degenti,
acri rustice quidem studioso, cæterum primis di-
scipulis erudito, retulitq; se in duobus sanguinē
expentibus usum, nonnullam utilitatem exper-
tum. Cæterum illorum neuter ex ijs quæ mihi
narrabat, neque ex arteria, neque ex larynge aut
pulmone exuisse uisus est. Xenocrates igitur in
primo libro De percipiendā ab animantibus uti-
litate, ubi de hædis disserit, scribit in hæc uerba:
Ad hæmopticos, hoc est sanguinem spuētes,
ad modum utilis est hædorum sanguis. oportet
autem nondum concreto plus minus mensura fer-
micoryla tantundem admiscere acetum acris, idq;
seruacatum trifariam partiiri, & in singulos dies
singulas partes exorbendas præbere. Itaq; liceat
tibi forte fortuna in agro deprehenso, ubi reliquo-
rum fuerit inopia hoc uti, cum citra periculum id
experiri possis. Vrsorum uero sanguis si abscel-
sus inonatur, si erit potest ut concoquat. Ad ijs cū
uero etiam caprinum, hircinū, taurinum. Licetq;
tibi, si uoles, præteritis decem millibus medicami-
num parate promptorum, quibus concoquuntur
abscellus, uros, tauros, ac hircos mactare, quolibet
scilicet usu: nec enim quispiam semel impossi-

to in partē medicamento promissum eius exiget,
nec etiam si refrixerit ut iam cogatur.

De sanguine uiridium ranarum. Cap. 5

Porro cum assereret quidā sanguinē uiridium
ranarum, paruārū scilicet, quas quidam inbrexates
nuncupant, si euulsis ex palpebris plis inungere-
tur, ut in posterū ne recrescerent prohibeturū, fal-
sum id cōperi factō periculo. Postea uero scriptū ā
quibusdā reperi illud ipsū, sicut etiā crotonum,
quos potius ueteres appellitant Cynoraistitas. Ve-
rum nec hic factō periculo promissā praestitit.

De sanguine Crocodili, & reliquorum. Cap. 6

Cæterum an Crocodili terrestris sanguis uisum
acuat, ne id quidem experiri uolui, cum haberem
probata aciei exacuendā medicamina, quæ Græci
uocant *ὄφθαλμική*. Nec; an admiffariorum equo-
rum sanguis crustam moliat, & septicus sit; neq;
an murium domesticorū sanguis uerrucas, quas
uocant *ἀκροχοδδβνας*, decidere faciat. Nam alio-
rum fuit mihi magna semper copia & ad hoc pa-
thema, & quod ægrius illo medicabile est, nem-
pe ad uocatam myrmecciam. Et cauebam ne præ-
stigiatarū opinionē merito referrem, cum iam etiam
improbi quidam medici ex diuinandī quapi-
am arte, non ex speculatiōe medica me in morbis
solere prædicere calumniarentur.

Gala. Lac. Cap. 7

Lac, bifaria hoc uti mur, partim ut cibo, partim
ut medicamento. Sed quid ualeat ut cibus, in cu-
rādī methodo alibiq; expositū est: At facultatem
eius ceu medicamētū, eam nunc explicabimus, ac
primum illud cōmonebo, quod paulo ante de san-
guine, quod nō de morbido lacte, sed de naturali
cuiuscq; animantis, ea quæ dicenda sunt, intelligen-
re oporteat. Igitur lac lacissimum, uelut etiam lan-
guis, purum lyncerūq; est, nec amaritudinis, nec
acrimonīæ, aut aciditatis, aut faldedinis, aut foeto-
ris particeps, sed ut dixerit quispiam bono odore
præditum, aut odoris experts, aut certe exiguum
odorem bonum referens. Clarum etiam est id esse
debere gustu suaue, pauculā habēs dulcedinem,
sicut & sanguis integræ sanitatis, ex quo & lacti
constat generatio. Tale lac ad acres & mordaces
fluxiones est utilissimum, non abluēs tantummo-
do eas ā partibus afflctis (est enim id illi cum aqua
commune) sed & corpora illiniens, ut non in nu-
da cadat quod defluit. Nec in hoc duntaxat aquæ
præstat, uerū etiam quia colluit, ut pote extergen-
tem in sese humiditatem continens, quam uocant
Serum, quo prius abluuntur, insuperq; extergen-
tur corpora: reliquo autē quod crassum pingueq;
est collinuntur, nō aliter quā pinguedo, adeps,
atq; qui albumen, & ceratum ex eloro oleo ceraq;
confectum eundē usum præbent. Nam & hæc ab
acribus humoreb; natas mordicationes mitigant,
corpora uidelicet oblinendo, ipsa naturæ minime
mordacis. Porro cum lac omnium facillime altere-
tur, præsertim si ambiens fuerit calidus, multum ā
dicta facultate amittit, nisi protinus quis ab uberi-
bus effuso calido etiam nū utatur. Maxime igitur
mulieris bene habite, & bonam uicūq; rationē ser-

uantis, lacte utendum (nam id humano corpori est familiarissimum) deinde aliorum animalium, quæ quidem ab humana natura non longissime abfunt, id quod scies ex carniū odore: nam fali diosus est & iniucundus eorū quæ multum diuersam habent temperiem, ceu canis, lupi, leonis, pardalis, uulpis, hyenæ, ursi, & similibus: non iniucundus autem est eorū quæ non porro abfunt, ut suis, capræ, equæ, bouis, ouis, asini. Quocirca etiam homines docti experientia, caprino, ouillo, bubulo, alininoque utuntur lacte, & caseos ex eis conficiunt, excepto asinino. Nam id planè reuexit, & plentū humoris ferosi, uelut bubulum crassum: cæterum consistentia medium caprinum est. at sus crudum aqueumque lac obtinet. Porro lac omne ex tribus constat essentis, caseosa, serosa, pingui: hanc plurimam habere conspicitur bubulum, ex quo conficitur & id quod butyrum nominant, concoquentis & laxantis facultatis, quam obrem maxime illi utitur ad parotidas & bubonas.

Serum lactis. Cap. 8

At serum, ut dictum est, extergendi potentiam possidet, adhibeturque subducendi uentris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergens & abluens sine mordacitate intestinorum acrimoniam. Præterea si quis ulcera quæ sanie infestantur acri, uice aquæ sero colluat, optime sanè fecerit. Præterea quæcumque medicamenta digerere solent ecchyomata & atra, ea præstat sero quam aqua diluere. Sic etiam eo utimur ad sugillata & hyposphagmata, peculiaribus ad hæc medicamentis commiscentes. At caseolum illud & crassum ipsius lactis magis illitum adhæret, & eo nomine acrimoniam retundit. Porro ubi aliam quampiam deficcantem facultatem habuerit aduictam, optimum est remedium dysentericæ, & omnium uentris acrimum fluxionum. Eam accipit à lapidibus qui præ decocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet quos uocant *σκληραυς*. Et lac eousque decoqui debet, dum pleraque serosi in eo humoris absumpta pars fuerit. At nos iniectis ferreis in ipsum cylindris candentibus eandem, aut etiam meliorem facultatem efficitimus. Nam ferrum adstringentis quoque (ut est dictum) facultatis est particeps: ac proinde cylindros ego compures effeci huius gratia, ad fines uerū propendentes, quod uidelicet quis manubrio ignitum ferrum facile igni excimat, & sicut cauteriorum, ita horum manubria pannis inuoluo. Porro lac totum ad acres oculorum fluxiones tum per se, tum cum mollium collyriorum quopiam est utile, præterea ad hypopia, & hyposphagmata. Quin etiam palpebris extrinsecus, ubi qui ophthalmia laborant, somno sese dabunt, impositum simul cum rosaceo & ouo, phlegmonas eorum concoquet. Sed hoc esto lac mulieris recens ex mamillis expressum. Infundimus ipsū & utero ulcerato tum per se, tum ijs medicamentis commiscentes quibus misceri potest, utique citra morsum curantibus, & ubi in sede ulcera mitigamus præ sanie acrimonia dolentia, aut propter phlegmonas, & rugas augetentes.

Sic & ad ulcera pudendorū utimur, & omnia que leniri postulat, siue ob phlegmonem, siue ob morsum, siue ob malignitatem. Eapropter & cancris applicatur ulceribus, medicamentis anodynis commistū, qualia sunt quæ constāt ex pompholyge. Et quid attinet cōmemorare, quod ore cōtentum & collutum gargarizatiū uel maxime phlegmonas eius mitigat: Sed & tonsillas, & columellam & antidas phlegmone affectas admodū mitigat, & proinde & lyncanthen siue anginam. Atque, ut se mel dicam, medicamentū est leniens (Græci uocant *σπυροειδής*) totam quidem substantiā habens mordacitatis expertē, sed multo magis ubi concoctioe moderata potissima pars serosi humoris absumpta est. Sic mihi uident etiam medicū ad uenena quæ erosione interimunt, lac dari suadere, uelut sunt lepus marinus, & cātharis. Sed & sunt qui exhibēt ijs qui aconitū & thapsiam sumperint. Sed hæc ex ratione fecerunt. Alia uero palām mentitū sunt, ut de lacte canino, quod in palpebris pilos renasci prohibeat, si prioribus euulsis eo loco foret illitū unde pilorū radices extractæ essent. Ad eundem modum qui scripserunt, quod celerem pilorū in pudendis exortum reprimat, si quidè foret ante pubertatem illitū, quicquid foetus emortuus eijceret potum, uerum non protulere. Sed & alia quædam præstigiaturis cōtaminata, tū de horum, tum de aliorum quorundam animalium lacte cōscribūt, quæ me ab initio dicturum negauī, etiam si experientia didicissem uera dixisse.

Caseus. Cap. 9

Caseus, Sermoni qui habetur de lacte, annexum est dum est de caseo, propterea quod lac sic coagulatum ac glaciatum, non tamen uniuersa lactis essentia in caseos cogitur, sed quod crassum est duntaxat, scilicet tenui seroso secreto ac separato. Porro dictum est habere lac in senaturam quandam pinguem & oleosam, eamque plurimā esse posui in bubulo, ac ubi à reliquo lacte seicūctum fuerit, solūque per se consistere ita pingue, butyrum appellari. At ubi cum toto lacte coagulatum fuerit, seroso duntaxat humore per coagulationē separato, pinguem caseum effici, siuntque hoc pacto casei bubuli quidam adeo pingues, ut ex ijs effluat quiddā ad speciem olei. Porro tum hi, tum reliqui omnes temporis spatio acriores tibi apparebūt, siue gustes, siue olfacias. Itaque cum mihi olim caseus allatus esset bubulus, quem ex odore ac rem esse consiciebam, abieci, & iam à famulis absumptum putabam: cæterum illi talia seruare soliti, longo post tempore ex promptuario proferētes, quidnā de illo fieri iuberem rogant. Cum igitur edendo nō esset propter acrimoniā, ludicrum nobis problema extitit, proponētibus cuirei quis illū utiliter posset accommodare. Interea cum ad me arthriticus quispiā in curru cōuectus esset, tophos quos Græci *πάγες* nuncupāt, in articulis habens: subiit mihi crure suillo salso decocto, caseū eo decocto macerare, ac probe in mortario subigēdo unitū, tophis imponere. Et sanè arthriticus ab hoc medicamine magnifice adiutus est. Nam rupta sponte sua cute, abiectione

sione uidelicet, effluxere quotidie citra dolorem topiorum particula. Vbi autem totus qui apud me erat caseus fuisse absumptus, talem sibi alium comparans arthriticus in posterum seruauit, et postea rursus usus est inueterato: atque ubi tunc quoque idem percepit eodem modo, sæpius deinceps uti perseverabat: & quosdam amicorum similiter affectorum docuit. Atque id quidem nos excogitauimus, cæterum comprobauit atque confirmauit experientia. Porro recentem, qui inueterato contrarij est temperamēti, quandoque homini in agro degenti moderatæ magnitudinis uulnus habenti imposui, antea uidelicet ad leuorem tritum. Extrinsecus autē illi imponebam folia lapathi. Post sint uero etiam, si hæc non adsint, folia superponi uitis, aut plantan, aut betæ, aut lactucæ. At ipsæ quidem caseus uulnus glutinauit, eratque etiānum mollis. Alius uero qui uocatur & in patria mea Pergamo, & per superiacentem Asiā oxygalactinus, magnum rusticū uulnus conglutinauit impositus. Nam recens coagulatus ac mollis reperiendi uim obtinet, nimirum leuiter refrigeras. At oxygalactinus præter hæc digerendi insuper leuem quandam uim possidet.

Butyrum. Cap. 10

Butyrum, aut butyrum, ut cuique nominare uoles, siue masculino, siue neutro genere, sit quidem, ut supra dictum est, ex eo quod in lacte pinguisimū est. Miror autē quo pacto Dioscorides ex ouillo & caprino cōfici referat: Ego namque ex bubulo ferino uis, ac proinde nuncupatum esse butyrum existimo. Facultatis est concoquentis, paulum habet etiam digerendi potentia, in medijs nimirum corporibus secundum duritiem ac mollitiem. Nam id semper memoria tenere oportet, quicquid simpliciter ac sine addito profertur, de medijs temperatura corporibus intelligi. Nam corporum planē durorum tumores præter naturam hoc nequit medicamen digerere. At quæ in mollibus sunt phlegmonæ, eas & concoquit & digerit persacile. Nam peritidas & bubonas, & oris phlegmonas, aliaque innumera eiusmodi prorsum illo solo curauimus, nimirum puerilibus corporibus ac muliebribus perpetentibus. Sed & gingiuis puerorum dententium uasidue illitum, nihil imbecillius melle gingiuis extenuat, per quas exitus est dentibus: & alios oēs in ore affectus phlegmonosos, postea quæ fluxio resisterit, digerit pariter & concoquit. Proinde cataplasmatis inditur quæ extrinsecus imponuntur parotidibus, hypochondrijs, & bubonibus. Sed & in uentrem deuoratum, & ex eo distributum, magnifice cōfert expuitionibus ex pulmone, idque in pleuriticis & peripneumoniacis affectibus, cum hoc quod eos etiam concoquat. Atque si solum lingatur: magis quidem concoquit, uerum minus educit: sin cum melle & amygdalis amaris, plus educit, sed minus concoquit.

Pytia. Coagulum. Cap. 11

Coagulum omne acris ac digerentis potentia est, ac nimirum etiā exicatoria: nam necessario id superiora comitatur. Ac leporis quidem coagu-

alum comitale morbum, si cum aceto ebibatur, præterea profluuium muliebre sanare proditū est: sed & lac in uentre coagulatus dissoluere, quod certe & nos experti sumus, non solum in leporino, sed etiam in aliorum animalium omnium coagulo. At tamen leporinum omnium est præstantissimum. Sed & sanguinem in uentre concretum simili modo epotum dissoluit, ac efficacius quidem ceteris, uerum non solum, quod quibusdam scriptum legitur, sed & hoc commune est omni coagulo. Quiddam autem sanguinis est thorace reiectiones leporinum coagulum epotū suppressere prodiderunt: cæterum nec alium quenquam eo usum noui, nec ipse sum ausus acri uti remedio ad affectū adstrictionem poscentem. Porro coagulum equinum ad dysentericos & cæliacos peculiarietate accommodari scripserunt nonnulli.

Coagulum phocæ.

At phocæ coagulum eximie aptum esse quiddam prædicant, tanquam uires obtineat castorij. Verum quæcunque proditum est quodque coagulum secundum essentia suæ præstare proprietatem, non est nunc tempus exponere.

Chole. Fel. Cap. 12

Hic succus omnium quæ in quocunque sunt animalium, calidissimus esse demonstratus est. Itaque sicuti sanguinē & carnes dissimiliter temperata obtinent animalia, eadem ratione & fel. Quocirca calidissimum fel, aliorum quoque animalium fel excellere necesse est: & quæ illis minus sunt calida, proportione & hunc humorem illis inesse calidum, quanto scilicet & in alijs sunt inferiora. Didicisti enim quatuor esse uniuersos in unoquoque animalium sanguine humores, sanguinem, pituitam, & bilem tum flauam, tum atram. Didicisti porro ex more non tantum medicis, sed & Latinis omnibus bilem flauam absolute efferi bilem, tanquam subaudituris qui audiunt, coloris cognominationem: Atram uero non simpliciter nūcupari bilē, sed cum addito, nempe hoc totū, atram bilem. Sed & quæ flauam bilem nonnunquam pallidam cognominat, non est: & quæ in uesica iecoris interdum pallidam, interdum flauā in confectionibus animalium conspicimus. Audisti porro flauā tato esse pallida calidiorē, quāto & crassiorē. Nam seroso recremento flauæ bili cōmixto pallida constituit cōtingit sicut & flauam plusculū ex calfactā cōsistentia reddi crassam colore autem flauam. Quin & in animalibus apparet flaua quidem ijs quæ magis sunt calida: quæ uero minus, pallida. Et ubi calida animalia aut fame, aut siti torquentur, ad atrum colorem uergit, interim illum habens aruginosum, interim coeruleum, interim llatidus, qui quiddam esse colore brasicæ fuscus. Itaque & tu bilis coloris diligentem intendito, cum medicamentū præparabis cui admiscenda est bilis. Miscet autem cycliscis uocatis & trochiscis, qualis est Andronis, & Polyidæ, & Pasionis & Bithynus, qui tauri recipiunt bilē: nam ubi ea medicamenta præparant quæ sunt utilia ad oculos: hyenæ, galli, perdicis, & aliorum quorundam animalium bilem adhibent. Porro taurorum

bilis calidior est & siccor q̄ boum castratorum. Nam castratum animal semper simile reddi soeminae, & ijs quae sunt aetatis minoris. Itaque sicut haec humore superant adulta & perfecta, uincunturq̄ ab iisdem caliditate: ad eundem modum bos castratus a tauris. Et quorundā ego taurorum bilem uidī coeruleam, flaua nimirum superflata: quam sanē in praeparandum iniici medicamentū uetui, sumpto illius loco alterius tauri bile mediocriter flaua. Nā ille uinculus uiolēter tractus, supra modum fuerat defatigatus. Itaq̄ eo labore cum excidisset, clarum est temperaturā eius fuisse calidiorē: probabileq̄ est sic uiolenter pertractum tum sitisse, tum etiam efuriuisse atq̄, ut summarim dicam, uelut urina a modica portione modice pallescit, & sitim famemq̄ & multum laborem perpeffis flaua esse cōspicitur: impletis uero atq̄ inebriatis albidita & bilis colores uariata: ad flauius quidem per exercitia, inediā, & sitim: ad candidius uero in contrarijs. Scito ergo si praeparando medicamini bilem impense flauam iniicias, calidius te id effecturum: si pallidam, mediocriter calidius: si exolutam & aqueam, tanto imbecillius tēperie cōuenient, quanto & bilis ad candidius fuerit uersa. Sic qui oclusas hēmorrhoidas tauri nō felle aperiant, ijs interdū imbecillū, interdum uero supra q̄ conueniebat acre apparuit. Quamquam nōnulla quoq̄ diuersitas existit pro corpore cui adhibetur, prout scilicet promptiore sensu aut hebetiore fuerit, tum per facile patiens, aut difficulter. Verum in ipsa bile non parua uisitur, ut dixi, uarietas. Nam idem homo a pallida minus, a flaua bile plus mordicatur. Liquet itaq̄ uel ex eo quod hēmorrhoidas aperit, quam sit hic humor acris: sed & illis ipsis qui utitur, mordicare percipitur. Ac proinde cauemus, ne ad aliū morbum aut symptomata bilem uisurpemus solam ac per se. Nam propositi cyclisici pauculum bilis accipiūt. Ac quae ad oculorum acutiem componuntur medicamēta, partim hyaenae, partim perdicis, partim galli, partim alterius cuiuspiam bilem accipientia, admistum habent tum mel, tum sceniculi succum, tum opobalsamum. Porro animalium quorundā singulariter bilis a medicis extollitur, tanquam aciem exacuat oculorum, & suffusionū inietia digerat, uelut piscis quē uocant callionymon, hyene, & scorpij marini, tum galli, & perdicis. At suilla adeo omnium imbecillima est, ut ne ulceris quidem toleratū sit grauis: & apparet omnū bilium maxime aquea, exceptis syluestribus suribus, & ijs quae degunt in montibus. Nam ut harum caro & calidior & siccor est, ita & bilis. Porro domesticarū suum bile utuntur quidam ad ulceram aurium, medicamento utiq̄ non reprobo: & tu quoq̄ ubi compositorum nihil adfuerit, utitor: sunt enim innumera. Sed & pro affectus magnitudinea alia etiam atq̄ alia alterius animalis bilis potest congruere. Nam ubi ulcus diuturnum fuerit: multaq̄ saniem pusq̄ contineat, etiam sicciorem bilem praferet, puta ouis, quae paulo est acrior suilla, hac etiam magis caprarum, cui adsi-

milis quodammodo est urforum, & boum. At taurorum his ualentior est, inferior tamen bile hyaenarum, & haec quoq̄ inferior bile callionymi, & scorpij marini, & marinae testudinis. Porro hirci agrestis bilem scripsere quidam prodesse lusciosis, siue nyctalope uexatis. Ceterum uolatilium animalium biles omnes tum acriores sunt, tum sicciiores quā quadrupedum, & inter ipsas quae uolucres gallinarum et perdicum biles ad medicinā usum probatiores habentur. Miluorum uero & aquilarum impendio acres sunt: sed & erodunt: quamobrem colore uisuntur aërugineo, ac nonnunquam atro. His itaque earum cognitio differentijs atque affectibus, qui plus, quiq̄ minus deliciarī postulat cognitis, si unam modo quampiam opere fueris expertus, inde ad alias transire poteris per methodum, ut semper quae cōmoda sit adhibeatur. Nam cum uelut in coniectura sita sit cuiusque facultatis uehementia, a definitio quopiam principio ad materiā inexplorata transire oportet: ac a prius explorato, excessus qui in illis cōsistunt discere. Sed & notas quasdam luculentas ego exposui tum a bilis colore, tum ab animalium temperie.

Hidros. Sudor. Cap. 13

Sudor, Vnus hic est humorū in animantis corpore proueniētiū, & eandem habēs materiā quam urinā, & eundem generationis modum. Si quidem utriq̄ exhibito humore constat generatio, excalfactio simul in corpore, & biliosae nonnihil substantiae adepto. Verum sudor plus est elaboratus, utpote qui ad cutem usq̄ permeatis omnibus quae intersunt partibus, peruenit. Attamen si dores inter sese & urinas differre necesse est, tum pro animalium tēperaturis, quae & natura & per aetates non parum a sese inuicem sunt diuersae, & pro ambientis nos aeris temperie. Clarum autem est, etiam si aliquando in sermone omissum fuerit, pro tēpore anni, & praesenti constitutione, praeterea pro regionibus diuersitatem effici in animantium corporibus non paruam. Nam compendij gratia uno capite cōplecti eiusmodi omnia soleo, nempe pro cingentis nos aeris temperie ea mutari dicens. Etenim diuersitate regionum quae est in caliditate & frigiditate, hic cōprehēdit, ut tempus anni, & praesentē praeteritamq̄ cōstitutionē. Cum ergo sermo fuerit de urinis, aut sudoribus, aut bilibus, aut sanguine, aut pinguedine, aut adipe, aut quopiam in corpore nato, diuidentibus ut delictet nobis eas quae in animalib. uisuntur differētijs, de sanis corporibus sermo intelligēdus est, mediā propriā ipsorum temperaturae cōstitutionē habētib. Sic ergo q̄ & sudor salis & saluginosae uocatae qualitate est particeps, gustus testimonio probat. Nam saepenumero nolentibus in os defluēs, dicāam qualitatem indicat. Saepē uero etiam non obscuram praefert amaritudinem. Attamen & color eius naturā designat. Nam sicut urina naturalis modice est pallida, sic & sudor. Verum id facile cognosces in ijs qui lauant, cū absq̄ oleo strigili raduntur. Nam sudor in cauo strigilis colligit-

colligitur, colorem quem dixi simul & gustū præferens, ac euidenter falsedinem habens, sed obscurè amaritudinem. Verum de urina plus etiam quæ conueniat medici scripserūt: propterea nimirum quæ large ea in omnibus hominibus tum priuatim, tum publice quotidie colligatur. At de sudoribus aut nihil, aut quæ curiosa sint potius, & prestigiatūra obnoxia, & insuper scripserunt alij superuacanea, quæ per aliam fieri possent materiam. Porro sudor etiam in palestris miscetur exercentium sordibus, quem quidam curiosè Atticam sectantes linguam, Conisalon uocant: confertq; tenuibus sordibus ac simplicibus ut tumores præter naturam per halitum digerant. Nam ille plus reperciunt, minus autem digerūt: at post adiunctum exercentium sudorem acquirunt multum facultatis digerentis. Ergo in phlegmonas uberem solæ hæ sordes impositæ, efficaciori sunt remedio. Sin sicciore uidebuntur, cyprinum superungit: & si ualde etiam sicca, cyprino item subigito. Præstat autem non sicca, sed molles accipere. Porro si non adsit cyprinum, rosaceum bonum miscuisse sufficit. Hoc medicamentum admodum est utile ijs quibus à partu restinguere lac cōsiliū est, eo nomine quod in mammis coaguletur in morem casei. Hinc orso, ad alios affectus similes uti licebit. Atq; ego sanè ad bubonem eo usus, celeriter disparuisse tumorem conspexi.

Urina. Cap. 14.

Dictum quidem est de tota eius natura in sermone de sudore: diciturq; & nunc, quod quanta est in animalibus bilis diuersitas, tanta item sit in urinis. Atq; omnes quidem facultate sunt calidæ: sed plus tamen animalium calidiorum, minus autem frigidiorum.

Vrina bubonana. Cap. 15.

At urina hominis omnium propè aliarum urinarum est imbecillima, exceptis porcis domesticis, quibus exacti sunt testes. nam illorum similis est totius corporis temperatura, temperie i hominum, & urina similiter debilis. Verum montanorum aprorum ualida est, ut etiam ex odore apparet, qui utiq; acerrimus est. Sed & in alijs animalibus ex odore uim eius consicere liceat. Nam urinas illas degustare planè est abominandum, cum ne pueri quidem urinam uir quidam honestus uita pariter ac moribus ebibere sustinuerit, cum peffiterè agrotaret in Syria, ubi cum multi urinam puerorum simul & uirosum hausissent, sese hinc seruatos credebant. Cæterum urina hominum, ut si quid aliud, extergendi uim obtinet: quod cum alij multi satis indicat, tum maxime fullones, qui sordida uestium expurgant ea atque extergunt. Hanc eius uim cum & medici conspexissent, psoras & lepras ea detergunt, perfunduntq; ulcera tum multa humiditate, tum sordibus & impuritate scæntia, ac multo magis ubi putridum quiddam obtinent. Sed & pudendis, ubi sic afficiuntur, urinam infundunt, & auribus pure fluctibus. Quin & achoras, & furfures ea curat, capiti identidem infundentes. At nos hæc facere odimus pot

Galeni

tius, cum ad manum sint quæ illis conducant alia medicamina. At ulcera digitorum pedis maxime quæ ex illusione atq; offensione essent inflata, sæpenumero, ubi nimirum phlegmone carerent, & ipse curauit, eaq; in feruis & hominibus rusticis, quos itaui ingredi absq; medicis erat necesse. siqui dem linamento (μύρω) Græci uocant) ulceri imposito, ac insuper linteo circumuoluto, quoties me iendi incesselet cupiditas, in digitum ferri urinam præcepi, nec ante soluere q; bene esset curatus. Nam & si quem alium rui sine medico agentem, urinam ulceribus perfundentem audissem, non uetui, ubi scilicet in partibus thorace inferioribus usq; ad imos pedes ulcus constitisset. Si quidem ulcera aut capitis, aut faciei, urina perfundit sinere auersabar. Attamen medicamentum quod ex urina pueri conficitur; quod quidam uocant chryso collan, quia eo ad auri glutinationem utuntur, ad ulcera difficilia sanatu optimum esse assero. Fit autem figura phiale, confecto mortario ex ære rubro, habente pistillum eiusdem materiae, in quod me iente puero pistillum circumages identidem, ut nō tantum à mortario quid deradat, sed etiam à sese non nihil deterat, id quod pluribus deinceps diebus peragitur, donec urina crassitudinem assequatur mellis. Faciendum uero id in sole. Nam facilis in aere eiusmodi à mortario quid deterior. Aut si sol absit, calidas esse ædes saltem conuenit. Hoc medicamento misto ijs quæ curandis ulceribus rebellibus sunt idonea, utimur, ut dixi, ceu optimo. nihil enim habet abominandum, perinde ut urina capiti, alteri ue parti infusa. nam quid commemorem urinæ potum? Scripsere tamen medicorū quidā de subsidente in urina crasso illo uidelicet & albo, dicentes id mederi erysipelatis. Sanè ea erysipelata, quæ ignea etiā nō sunt, & reuera erysipelata, calidorum & acrum medicamentorum omnino nullum iurare potest. quæ uero per refrigeratā refrigere, tum hoc, tum alia multa medicamina digerentia adiuuare ualent. Atq; hoc quidem uti licebit, ubi non in facie, aut prope erysipelas constitierit, uerū in artuum quopiam, aut dorso aut uentre. At urinā pueri orthopnoæ gratia ebibere necessariū non est, cum sint & alia medicamina quæ huic medeatur affectui. quin cum bibisset quidā, affectu liberatus nō est, ut noni eximium quid præter alia possideat.

Sielon. Salina. Cap. 16.

Sielon, siue sialon, siue ptyelō appellare libet, nihil interest. Verum id sciendū est, uim eius esse differentem tum in animalium speciebus, tum in eorum unoquoq; sano & ægroto, seimio & situbim do, aut cibo potiq; sumpto. Etenim ut urina & bilis, sic etiam salina sumpto quidem cibo imbecilla est: ualida & acris eorum qui ingēti aut inedia, aut siti premunt. In medio utriusq; est eorum qui pot probe cōcohere quidē, nondū tamen cibum potum ue hausere. Hac ergo salina nutrices pueris lichenas curant, paruū uidelicet digitorum rigantes, ac deinde cutem affectam cōfricantes. Idq; faciunt subinde, tato scilicet interuallo, dum salinæ

tom. 5

h uires

uires in lichene perdurent, ac nondum sint extinctæ. Sed & triticum mandentes rusticis non pauci fuerunt in oculis imponunt. Nam celeriter eos & digerit, & concoquit: cum si maceraretur aqua, non æque prodesset. Ex quo liquet saluam iuuandi robur adferre. Atque corporibus mollibus aut puerorum panem, non triticum imponunt, ore comansum. Porro omnia sic commansa digerunt & fugillata, cæteraque ecchymomata, maxime ubi panis simul cum pauco radicaque fuerit commansus. Porro tota substantia uel maxime aduersa est salua bestijs hominem interficientibus, ceu alicubi etiam Nicander poeta refert. Pollicitus autem mihi quidam incantationem sese ostensurum, quæ scorprios interficeret: ubi illam festum dixisset, in scorpionem exiit: inde rursum eam obmermurâs, iterum scorpionem conspuit: ac ubi tertio dixisset, atque expulisset, mortuus est scorpions. At postea ego absque incantatione à sola salua occidit scorpionem, idque celeriter à salua esurientium, aut sitientium, tarde autem ab illis qui cibo potuque fuerant impleti: in alijs autem proportione.

De ijs que in corpore proueniunt. Cap. 17

Nascuntur in corpore cum alia præter naturam, quorum non est satis honestum meminisse, tum etiam lapis in uescia, de quo scripsit quidam quod lapides uescicæ comminuat. Atque hoc quidem falsum ex experientia iudicatum. Cæterum an renum lapides frangat, omnino experti non sumus, cum suppetere alia ad hoc symptoma probata medicamina. De pure autem & id genus dicere superfedeo, id illis concedens qui his in rebus mirifici sunt, scilicet quibusdam cum præstigijs. Cæterum stercus unum est inter ea, quæ in corpore proueniunt secundum naturam affectu animalis, ueluti & aurium sordes. De utroque itaque deinceps differam.

Copros. Stercus. Cap. 18

Sive Copros, sive Apopatema appellari uelis, perinde est. Scito autem hæc substantiam uim habere uel maxime digerentem. Verum stercus humanum ob foetorem abominandum est. At bubulum, caprinum, crocodilorum terrestrium, & canum, ubi oisibus duntaxat uescuntur, neque grauior olet, & multa experientia non tantum nobis, sed & alijs medicis me natu maioribus coprobatus est. Si quidem Asclepiades, cui cognomen tum erat Pharmaceon, & alia omnia medicamenta collegit, ut multos impleter libros, & stercore ad multos sæpe affectus utitur, non modo medicamentis quæ foris imponuntur commiscens, sed ijs quoque quæ intrò in os sumuntur.

Stercus animinum. Cap. 18

Sanè ego meminisse admirandam tum humani, tum canini stercoris expertum facultatem, sed prius differam de canino, quo uti assidue consuevit præceptorum nostrorum quidam, sola ossa caniedenda exhibens duobus continuis diebus, ex quibus durum candidum ac minime fetens stercus proueniebat. Hoc igitur acceptum desiccabat, ut cum postea usus esset, facile ad leuorem posset re-

digere. Vtebatur eo ad anginam, & dysenteriam, & summe in ueterata ulcera. Ad anginam quidem, ijs admiscens quæ alioqui huic affectui congruebant. Ad dysenteriam, lacti illi immiscens, cui decocto calculos uocatos καλλυνος ignitos iniicit antè posuimus: aut, ut ego postea ob parabilitatem ad ferum confugi, id cadens lacti probe decocto iniiciens. Vocant autem medici nonnulli lac eiusmodi, nescio quo pacto, schistum. Verum oportebat non hoc sic appellare, sed in quo segregamus ac scindimus (quod ριζευη Græce dicitur) ferum à caseo. Cæterum medicus ille stercus caninum lacti, in quo extincti erant calculi marini, clam iniiciebat, & id solum generosissimos quoque discipulos docebat. In his ergo duobus multum expertus sum stercus caninum ceu medicamentum mirabile, sicut & in ulceribus extreme malignis. Miscui ergo & ad illa paulum quiddam stercoris canini medicamentis probatis: & manifestè seipso ualentius redditum est medicamen. Et si quando digerere aut desiccare quid opus esset, illis etiam medicamentis admiscui.

Stercus humanum. Cap. 20

Cæterum humani stercoris non habeo experimentum. Assidue quidam à phlegmonis ad guttur existentibus uexabatur, adeo uehementer, ut suffocationis subiret periculum, & sanè ob hoc periculum sanguinè mittere cogebatur. In hunc cum forte quis incidisset, pollicitus est se præbiturum medicamenti experimentum, & se uocari si quando rursum aliqua in parte gutturis emicussisset phlegmone, ante sanguinis missionem præcepit. Itaque uocatus medicamentò illito statim hominem curauit. Ut autem iterum profecit, non in ipso tantum, sed & in alijs qui similiter erant affecti: rogabat is qui assidue periclitabatur, data mercede, ut sese medicamentum illud doceret. Erat enim ille & locuples, & in pecuniâ sumptu liberalis. Porro ubi cõuentum esset de pretio is qui uendebat: Hoc medicamentum, inquit, per antipatheam quandam utilitatè obtinet. Esse autem eam antipatheam, ut qui curam nesciat unde cõficiat. Iussit itaque alium daret qui pro ipso diceret, quidque iurandum reipereret, sese nulli eius facturum copiam, prius quàm ipse qui dedisset, foret defunctus. Itaque à morte eius qui indicaret, non tantum ille ferum hominè, sed & alios sanabat: & mihi ne petenti quidem medicamenti exemplum uolens ac lubens obtulit. Erat autem stercus pueri siccum cum melle Attico ad leuorem tritum. Vicibat autem puer cuius stercus acceptum rursum erat, uti ipse qui medicamentum dederat offendit, lupinis, illis uidelicet qui ex more edendi solent cum pane bene cocto in clibano, modicum salem & fermentum habente. Præbebat autem bibendum uinum uetus: atque hæc omnia medicosia in quantitate, modo ut perfecte ea puer posset concoquere. Itaque cum primo die eo uictu esset usus, postero tamen die non dum stercus capiebat, sed in eo quoque die rursum eodem alebat uictu, ac tertio demum sumebat, ac postea a refectio utebatur, similiter ut stercore canino, ut ante dictum est. dicebat autem

autem illum qui docuerat fugitantem alios cibos ob fetorem, prætulisse lupinos: sese uero experimenti gratia carnes gallinaceas aut perdicum ex aqua, aut tenui iure bene coctas per sæpe exhibuisse, & medicamentum nihilominus operatum. Atq; ego sanè hæc tibi de canino humanoq; stercore narrare possum.

Stercus lupinum. Cap. 21

At lupinum stercus quidam colicis potandum dabant, non tantum in ipsis paroxysmis, sed etiam in interuallis, siquidem phlegmone uacarent. Quorum ego quosdam uidi non amplius inuadi: & qui erant inuasi, non amplius id grauius passos, sed nec post paucum temporis. Accipiebat autem ille albidus potius stercus, quale ubi ossa ederint, solent excernere. Verum illud etiam in eo mirabar, quod uel appennum euidenter aliquoties inuisisset. Itaq; hic stercus capiebat quod non decidisset in terram: id quod non erat inuentu difficile. Ea enim est luporum natura, quæ canum, ut suspensio altero posteriorum crurum & meiant & cacent in eminenti quopiam ex terra. Itaq; in spinis sæpe æstate stercus lupinum reperitur, & fruticibus, uerbis, herbisq; procerioribus. Inuenit porro in stercore illorum & nonnihil ossium deuorati animalis: quod ut effugit compositionem, ita & concoctionem: quod & ipsum contundens ac coterens, bibendum præbuit colicis: ac si homo esset puritatis amans, miscebat & salis quippiam aut piperis, aut quippiam eiusmodi. ut plurimum autem ex uino albo consistentiam tenuis bibendum præbebat: interim uero etiam ex aqua. Hoc ergo stercoris quod patientis inguinibus, *λαγανες* Græci uocant, applicandum esset, præcepit suspensum de uinculo confecto ex lana, sed non qualibet, uerum multo præstabat eam esse ouis à lupo laniam, unde quod ad hunc usum accommodaretur esset conficiendum. Quod si talis non adesset lana, expelle ceruina & lorum quod cingeret inguina, & in quo stercus contineretur, parari precipiebat. At nos in ollulam stercoris maxime fabæ magnitudinem inieciimus, eamq; experundi gratia quibusdam appendimus, nec potuimus non mirari, cum plurimos ipsorum uideremus adfuturos: cæterum ad ollulam duas ceu aures affiximus, per quas lorum transmitti posset. Sed hoc quidem obiter dictum esto, si quis inuenietur qui sic suspensibilis habere dignabitur. Dico autem sic, nam substantia est quæ suspenditur, non uoces barbaræ, ut quidam facere præstigatorum assolent, quando & alias expertus sum substantias, quæ in alijs affectibus similiter operarentur. Sed de his non est nunc dicendi tempus. Ad propositum itaq; reuertamur.

Stercus caprinum. Cap. 22

Nam humanum, caninum, lupinumq; stercus recessum, alia uero nondum, quorum etiam maior est quam dictorum numerus: & quædam absi duo habentur in usu, quædam rariora. Omnium creberime utimur caprino stercore (Græci *αυγυλοvs* proprie nominant) digerentis & acris facultatis: adeo ut & induratis scirrhorum in modum tumoribus congruat, nec tantum lientis, ad quos creberime medici non pauci huiusmodi stercorea applicant, sed etiam aliarum partium. Siquidem ego eo usus sum ad genus tumorem habens inueteratum & egrè solubilem, iussu fieri cataplasmate ex farina hordeacea per oxycratum indito uel deficeret hoc stercore: & mirum esse quam homo ille fuerit adiutus. Erat autem rusticus in quo id factum est. Et iam etiam alius rusticus cum sic usus esset, non tantum in genu, sed etiam alijs in partibus ad tumores similes, perinde adiutus est. Nam acrius est medicamentum, quam ut mulieres urbanas, aut pueros, aut omnino qui tenera sunt carne, sanare possit. Sed de particulari omnium medicamentorum usu in opere de componendis illis tractabitur. Quin & ad aquam inter cutem, & ad splenicis uarie caprino stercore utimur. Sed & usum tenuioris quidem essentiam, uerum haud manifeste redditur acrius: quam obrè sanè ad alopecias congruit, & omnia adeo quæ extergentia medicamenta desiderant, ut lepras, psoras, lichenas, & hoc genus alia. Misceatur & digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt quæ accommodantur ad parotidas & bubonas diuturniores. Est enim uis eius tum uis, tum non uis, absterforia, & digerens, nec eam paruam habet digerentem potentiam. Nam medicus quispiam ex ijs qui in agris & uicis medicinam exercent, utebatur eo ex aceto ad uiperarum morsus, & multo sanè etiam magis aliarum bestiarum: ac profecto ex ijs complures seruauit. Et hic ipse quoque medicus ad auriginem potandas ipsas spy rathos ex uino præbuit, & ad profluum muliebrem cum thure apposuit. Quæ omnia sanè optimus medicus ignorare non debet: cæterum potiora eligere potissimum ad urbanos & honoratos, alicuiusq; existimatis uiros: in quibus equidem ego tali nunquam usus sum medicamine, cum multo meliorum suppeteret copia. Attamè existit nonnunquam talium usus, aut in itinere, aut in uenatione, aut rusticatione, cum scilicet meliorum nihil adfuerit, aut homo rusticus perinde fuerit carnis duræ ac asinus. nam eiusmodi multos in agris reperias dignos qui bibant spy rathos. Porro quod & supra monui de uiribus & bile & salua, id nunc memoria repete, nempe uniuersalem & communem facultatem eandem omnibus inesse, uerum pro animalium temperaturis uariam. Nam eorum quæ ficiore sunt temperatura, & stercore exiccantius est: sicut & calidiorum magis etiam excalcatorum. Verum nullum omnino stercore refrigerat, sicut nec ullum humectat. Sed & pro natura eorum quæ edunt, multa itè fuerit diuersitas. Proinde in hominibus potius quam alijs animalibus maior est: quandoquidem hoc animal diuersissimis maximeq; uarijs cibis utitur. Nam quid simile habeant qui alium ac cæpas comedunt, & qui curbitam, uerbi causa? At caprarum spy rathi pro pastu uario nonnihil item habuerint differentiam, non tamen tantum quantum stercus humanum.

Stercus bubulum. Cap. 23

Similiter stercus bubulum exigua habet differentiam

rentiam, estq; & ipsum facultatis exicatoria. Ve-
rum attractoria etiam obtinet, ut monstrat dum
apum uespertinam morsus iuuat. Atq; hæc ut a prop-
rietate substantiæ totius iuuentur, fieri potest.
Cæterum medicus quidam medicamentorum per-
ritus, in Mysia quæ in Helleponto est, aqua inter
cudem laborantes bubulo stercore oblinens, in so-
lem exponebat. Atq; hic ipse imposuit & parti-
bus rufficorum phlegmone obsefsis humidum il-
lud uere collectum, cum herbam boues pascun-
tur. Manifestum autem est hoc esse alio modera-
toribus multo uiribus. dico autem aliud, cum pa-
leis uescuntur. Nam hoc medium est inter id quod
modo diximus, & quod provenit ab erui pastu.
Liquet ergo, quemadmodum id quod ex pascuo
herbaceo provenit, ad phlegmonas accommoda-
tur, sic istud aqua infestatis esse idoneum. Scire ta-
men oportet, omnia id genus medicamenta duris
agrestium hominum corporibus aptari, nempe
fossoribus & melloribus, & qui opus obeunt tam
ualidum, in quibus utiq; Mysius ille medicus &
ad choeradas adhibebat, & ad tumores omnes
scirrhosos, ex aceto in cataplasmatibus formâ com-
positum imponens.

Stercus ouillum. Cap. 24

Sed & hic ipse medicus ouium utebatur stercore
ad acrochordonas, & myrmecias, & thymos, &
furunculos duos, quos clauos nominat, aceto uel
delicet diluens. Quin et ulcerum ambusta ad cic-
atricem illo ducebat, nempe stercore hoc cerato ro-
saceo comiscens. Sed & per stercore caprinum
bustum similiter curabat: cæterum pauculum eius
multis numeris maioribus cerati molis admiscebat. &
in totum studium id illi erat unicum, omnia curare per
ea quæ ex agris facillime parantur: inter quæ sunt
& herbe, & frutices, & arborum flagra, & germina,
& folia mollia, & fructus, & cortices: super qui-
bus copiosius dicitur in facile parabilibus.

Stercus columbinum. Cap. 25

Porro stercore columbarum nomadum (nam
sic eas quidam cognominant, à domesticis uidelicet
distinguentes) tanquam medicamento exal-
faciente & ipse ad multa frequenter admittitur,
nempe cum semine nasturtii cotussum cribratumq;
siccum uice sinapis ad ea quæ rubrificari debent,
adhibens. Manifestum autem est, quod inueterata
omnia dico in talibus affectibus quales sunt co-
xendix, hemicrania, scotomata, uertigines, & cep-
halæa, & in lateribus, scapulis, ceruicæ, lumbis
dolores inueterati: & ad hæc nephritides, & affe-
ctus coeliacæ, & podagricæ arthritides: quando uel
delicet in articulis eorum nondum consisterint topi
siue pori. Atq; hoc stercore planè fecitidum non est,
maxime arefactum. Quocirca & in uribus eo ua-
rie utimur, aliàs alijs miscentes medicamentis.

Stercus gallinaceum. Cap. 26

Porro cum conspexissimè illum in Mysia medi-
cum gallinaceo utetem stercore in eis qui ab efu
fungorum suffocabantur: & ipse quoque sum usus
in quibusdâ urbem inhabitantibus, qui et ipsi fun-
gos elitarant, ipsum uidelicet ad leuorem contri-

tum tribus quatuorue oxycrati aut oxymelitis in
spargens cyathis, & palam adiuti sunt, idq; celeri-
ter. nam qui præfocabantur, paulo post uomebāt
pituitosum humorē omnino crassissimum, & exin-
de planè liberati sunt symptomate. est autem hoc
stercus columbino minus calidum. Cæterum My-
sius ille medicus dabat etiam bibendum stercore gal-
linaceum ijs, qui diutino colli dolore fuissent ue-
xati, ex œnomelire. quod si hoc non aderat, ex ace-
to aut uino aqua diluto. Porro memoria tenere
oportet cōmune de omnibus animantibus rati-
onem, nempe tum in ijs quæ in corporibus ipso-
rum continentur tam humida quam solida, tum in
ipsis partibus plurimam esse diuersitatem monta-
norum quæ uocant, & eorum quæ in pratis, palu-
dibus, lacubus, & ædibus uersant. Semper enim
quæ exercentur, ijs quæ non exercentur, sunt sic-
ciora: & quæ cibus utuntur calidioribus siccioribusq;
ijs quæ humidis frigidisq;. Nam in colum-
bis (quædo quidem creber nobis earum stercoreis
est usus) multo semper inferius ac imbecillius ex-
pertus sum earum stercore quæ in domibus dege-
bant, q; earum quæ in montibus, quas nomadas
nuncupant. Tum gallinarum quoque inueni multo
etiam imbecillius earum quæ conclusæ seruatur,
& furfibus aluntur, non paulo autem ualētius
earum quæ in agris, atrijs, aut foris pascuntur.

Stercus anserinum & ciconiarum. Cap. 27

Cæterum stercore anserinum præ nimia acrimo-
nia inutile est. Colligo etiam ita esse & accipitrum,
& aquilarum. Verum fugienda est materia omnis
eiusmodi quæ difficulter comparari potest. Qua
occasione complures ualidissimas uires talibus ma-
terijs testimonio adscribunt suo ceu non facile re-
darguendi: uelut qui ciconiarum stercore comitia-
li morbo mederi scriptitāt. Verū quamquam hoc
multis alijs quæ scribunt, longe sit parabilis, cu-
riosum tamen est, ut taceam falsum esse, quod de
illo est proditum. Nam quidam ijs qui talia memo-
rant, credulus, epoto hoc stercore, nihil aditus
est. Nam & anteq; experiari, promissorum prauitatem
ac falsitatem ipsi qui talia scribunt detegunt.
Nam cum multis modis difficulter homines spi-
rent, nec quod omnibus conferant adscribunt, nec
quod his, aut huic. Tameñ sunt inter eos qui ita-
lia scriptitant, qui non simpliciter dispnoæ, hoc est
difficilis spirationis, sed orthopnoæ talia esse re-
media dicunt, nempe ciconiæ stercore, noctue san-
guinem, urinam humanam, & alia his absurdiora:
haud sciētes quod pituitosus uiscosusq; succus bron-
chia obstruens pulmonis, huius affectus sit causa,
& quod in eo euacuando consistat medela, & quod eua-
cuatur cum per tussim excreatur, & quod id fieri ne-
queat absq; crebro epoto medicamento acriore.
At hi adeo sunt nugaces, aut præstigiatores, aut
quo illos digno appellè nomine nescio, ut dicant
absurdum illorum poculorum unumquodque potum à
dispnoæ liberare: quod fieri non possit, ne si uel
specillū fas esset alicui in pulmonem demittere,
quo infixū humorem tolleret, semel duntaxat de
missō. Præstabat itaq; illis dixisse, non si epotus sit
hic

hic sanguis, aut urina sanare dyspnoeam, sed si poteretur. Rectiusque etiam quod non semper & omnino sanabit, ne si uel assiduus poterit: sed quod multos sanauit, multos uero adiuuit quidem, sed morbo prorsum non liberauit. Sed hos iam mittamus, & quod deinceps est, ad id pergamus. Cuiusque enim stercoreis acrimonia & digerendi uisum possidentis, prout aliud alio plus minusue eius sortitum est facultatis, ita particulares in ipsis proueniunt differentiae: ac proinde aliud hoc pathema potius, aliud illud magis curare ualet.

Stercus murium. Cap. 28

Sic enim murium stercois alopecias curare proditum est, & inuentus est quidam medicus, qui ad hoc pathema urebatur coposito medicamento ex murio stercore confectio. Et alius quidam glandem puero familiaribus rogantibus ut apponeret, praecepit ut ex stercore conficeretur murium. Quo dicto omnes qui audierat in risum soluti sunt, quod cum toto essent que apposita sedi ad excretionem excitarent intestinum, ille omnibus praeteritis ad murium confugisset stercois, nam re uera pudendum est alia etiam experiri uelle, cum omnes ceu curiosum & praestigiatorem condemnent eum quia talia aut faciat, aut dicat. Itaque de murio stercore haec quoque sufficiunt.

Stercus crocodilorum terrestrium. Cap. 29

Ceterum terrestrium crocodilorum, horum inquam exiguorum, & humi serpentium stercois pre-

tiusum effecere mulieres deliciosae, quibus non est satis quod alia sint medicamenta tam multa, quibus faciei cutis & tena & splendens efficitur, quin etiam adiungant stercois crocodilorum. Similis illi est et sturnorum, cum solam oryzam ederint. Clarum itaque est quod abstergendi desiccandi facultatem utraque moderatam habent stercois eiusmodi, & multo moderatiorem & hebetiorem stercois sturnorum. At stercois crocodilorum sicut a facie ephalem tollit, ita & utilissimam & liehenas.

Rhypos, hoc est sordes hominum. Vide supra etiam libro 8. statim post Rhum. Cap. 30

Sordes nascitur non tantum per totam corporis cutem, sed & in auribus, sed ob paucitatem parati difficilis est. Proinde de illa nihil scribimus, nisi quod paronychijs congruat sordes aurium, quam sane etiam solam per se licet accipere. Nam quae in tota cute prouenit, & in balneis & in palaestris deditur, conferens nonnihil & ipsa ad partem uocant, de quo supra disserui. Sed & generatio eius naturam indicat. Nam si sordes est crassum illud ac terrestre, quod reliquum est eorum quae per latentem transpirationem euacuantur, sequitur ut desiccandi uim habeat, cum nonnulla caliditate iunctam. Ea tamen sordes quae lanis ouium inhaeret & adnascitur, ex qua oesypion, quod uocant, conficitur, concoquenda uim habet similem butyro: paulum uero etiam digerentis facultatis obtinens.

ARGVMENTA CAP. LIBRI XI. GALENI DE FACVLTATIBVS MEDICAMENTORVM SIMPLICIUM, SCILICET DE REMEDIJS EX ANIMALIBVS, EORVMQUE PARTIBVS, & REBUS QUIBUSDAM MARINIS.

Prooemium. De carne & parenchymate simpliciter. Denominibus non litigandum. Cap. 1. De carne uiperarum, cum historijs quinq; & experimentis. 2. De uiperarum & dipsadum differentia: de maritimis uiperis. de uiperarum apparatu ad theriacam, passillii theriaci quomodo fiant. sales theriaci. 3. Iterum de carnis uiperina facultate. Animalium carnes non modo nos nutrire, sed omni qualitate afficere, calida, frigida; humida, sicca: ut in tertio de temperamentis dictum est. Carnes echini terrestris. feles salis, mituli. cochleae cum experimento Galeni: de quibus infra cap. 29. 4. De adipe & seuo in genere primum: deinde priuatum de suis, caprino, asinerino, gallinaceo, taurino, haedorum, hirorum, leonum. contra illos qui omnia uocant styphontia, etiam quae acria sunt. de uiperino, urfino, uulpino, & piscium adipe. 5. De medulla uiribus, delectu, & quomodo recodi seruatiq; debeat. 6. De capitibus manidum, leporum, lacertorum, & rursum leporum. 7. De cornibus cerui & caprarum. 8. De pulmonibus agni, suis, & uulpis. 9. De iecinoribus canis rabidi, caprae, hirci, & lacerta. 10. De uentriculo mergi & gallinacei. de iecore lupi. 11. Castoreum: & primum quod calidum, siccum, & tenuium maxime partium sit. canon generalis. experimenta Galeni. 12. De renibus scincorum. 13. Vngulae caprarum & asinorum. 14. Ossa: experimentum de humanis. 15. Senecta serpentina. 16. pellis ouina. 17. liehenes eorum. 18. relacrae. 19. coria uetera. cum experimento. 20. ostrea genus, ostrea speciem significare. 21. buc-

cina & purpura. uide mox cap. 24. 22. ostrea (& ca non generalis de illis, quorum terrena & dura substantia est) & reliqua ostracoderma. lapis specularis. 23. os sepiae. 24. purpurarum opercula, uide superius cap. 21. 25. lanae succida. 26. pili usui. 27. oua: & primum, ouum non esse partem animalis: albumen ouum, & quod ad oculos lacti praefertur, &c. de albo priuatum, mox de luteo, denique de ouo integro. quae miscenda sint ouis in aceto coctis ad uentris fluxiones, &c. 28. echini usui. 29. cochlearum experimenta ad dyenteriam, & tumores artuum. uide supra circa sine ca. 30. cancri usui, cum experimento ad morsos a cane rabido. 31. hirundines usuae. 32. cicadae. 33. alaudae, cum experimento ad colicos. 34. ius gallinaceum. 35. muscicula. 36. ranae usuae. 37. hippocampi cinis. 38. tellinae usuae. 39. lumbrici. 40. cimices. 41. cantharides. 42. buprastis. 43. ptyocampe. 44. sala maestra. 45. torpedo. 46. quae uim animalia, quibus affectibus imposita conueniant: de animalibus quae oleo incoquantur. 47. de uulpibus & hyanis, cum experimentis. 48. de ijs quae gignuntur in mari, & aquis salis: & primum de adarcio. 49. alcyonia. 50. sales, uide etiam supra libro 9. cap. 30. 51. sales usui. 52. litrum, uide supra libro 9. cap. 45. 53. salis flos. 54. maris spuma. 55. bitumen marinum, & cum in alijs aquis tum mari mortuo genitum. 56. spongia cum experimentis. 57. garus. 58. muria, cum experimento.

GALENI DE SIMPLICIUM

MEDICAMENTORVM FACVLTATIBVS

Liber undecimus.

PROOEMIUM.



RERAEQVE animantium partes communes inter se omnium sunt, nulla tamen est aequae communis ut caro. hanc enim habet omne animal sanguine quidem praeditum, ut homo, & omnes quadrupedes, tum aues, serpentes, laerti, quos sauros uocant, testudines, & quae sunt eius generis. Sanguine carentia, tum oistrea omnia, tum non pauca eorum quae in aquis degunt, sicut & nonnulla quae in terris. & quod ex animantibus maxime editur, caro est. Nam & uiscerum plurima moles ex carnisuis ipsius inhaerentibus constat. Verum nonnulli medicorum carnem uiscerum parenchyma uocandam censent, propterea quod ex uenis effusus sanguis circum uasa omnia concreuit, ut ipsi arbitrantur. Sed eam quae uisitur in musculis, solum carnis appellatione dignantur. Verum de nominibus, ut semper monemus, contendendum non est: sed excenda potius rerum scientia, cuius nos quoque studio usque dediti, quae cumque tum de cuiusque animantis partibus, tum de communibus cognouimus, earum partium experientia, partim ratione docti, omnia deinceps exponemus, orsi a carne proprie dicta.

Caro uiperarum. Cap. I

Non omnes animalium carnes hominem nutriunt, sed quorundam etiam letales sunt, non secus atque uene nae quae uocantur delecteria. tum inter eas carnes quae hominem nutriunt, quaedam hoc ipsum tantum sunt, nempe nutrimentum, quaedam uero supra quod nutriunt, habent & facultatem ceu medicamentum, quandoquidem desiccando, humectando, ex calcificando, ac refrigerando corpus alterant. nam uiperarum carnes palam uidere est ex calcificantes & desiccantes, ubi codiuntur ceu anguillae, nepe oleo, sale, anetho, porro & aqua, seruatim nimirum modo, quod autem totum corpus per cutim euacuetur, discere tibi liceat uel ex istis quae ego iuuenis etiam in Asia nostra sum expertus, quae singularim deinceps narabo. Homo quidam morbo quem elephanta cognominant, laborans, aliquouosque cum sordalibus conuersabatur, donec ex ipsius consuetudine conuersationeque quidam ipsorum morbi insicerentur contagione, & ille iam odoratu grauis, ac foedus redderet aspectu. constructio igitur illi turgio proxime uicem in iugo collis propter fontem, illic hominem collocat, tantum illi quotidie ciborum ferentes, quod uitae sustinendae satis foret. Caeterum ad canis exortu, cum forte messoribus, haud procul inde metentibus, uinum esset allatum in fictili sane quod fragrans: inde qui attulerat, depositio illo prope mellores abiit: uerum ubi eius bibendi aduenisset tempus, sublato fictili adolecens, ut pro more impleto cratere, competente aqua uinum temperaret, in cratera uinum effundit, & una excidit uiperam mortuam.

A Quare attoniti mellores, uerum ne quid, si bibissent, inde sibi malum eueniret, sua quidem sitim aquae potione sedare maluerunt: caeterum cum illinc discederent, pro humanitate uidelicet ac misericordia homini illi elephanti obnoxio uinum largiuntur, rati expedire illi potius mori, quam uiuere in ea miseria. At ille ubi bibisset, admirandum in modum sanitati restitutus est. nam tuberosum illud omne cutis totius non aliter quam animalium a testae mollitie nuncupatorum malaco straco, tegmine decidit, quod autem reliquum erat, molle admodum apparuit, instar cutis cancrorum ac locustarum (carabos Graeci uocant) ubi extrema testa fuerit detracta. Alterum quoque eiusmodi non dissimili casu in Mysia Asia, non procul ab urbe nostra accidit. Vir quidam elephanto laborans profectus est ad aquarum sponte nascentium usum, sperans inde non nihil se commodi adepturum. Erat illi scortum mancipium, iuuenicula sane formosa, copulans amatoribus ambita. Huic tum alia quaedam ex domesticis rebus, tum poenit aeger contulerat. Profectus igitur illis, in aedibus, quibus uicinus erat locus squalidus, & uiperarum plenus, forte fortuna ex illis una in uterum uini incidit negligenter positum: extinctaque fors. Ac scortum quidem in lucro id reputas quod fuerit uenisset, hero id uini propinat, atque ille ebibit caeterum exinde ad eum modum quo ille qui debebat in tugurio, perfanatus est. Atque haec iam duo sunt experientium ex fortuita occasione sumpti exempla. Porro tertium quoque annexum, quod ex nostra profectum est imitatione. Cum quidam hoc morbo egrotaret, animo magis quam uulgus philosophico, & contemptore mortis, oppido quam grauiter ferebat, fatiusque dicebat mortem semel perpeti, quam uitam uiuere tam miserabilem. Itaque illi quae superioribus, duobus accidissent indico. Erat autem ipse auguriorum peritus, & amico utebatur mirifice hanc disciplinam tractare. Itaque ubi ad augurium cum illo consedisset, peruersus est, ut quae per experientiam essent cognita, ipse imitaretur: atque epoto uino quod sic erat ueneno infectum, leprosus factus est: ac postea lepra eius nos consuetis remediis sanauimus. Quartus praeterea uiuas capere uiperas arte utebatur. Sed illius in illo morbi tantum erat principia: itaque cura studiumque nobis fuit, ut illum quam celerrime sanitati redderemus: quo circa misso sanguine, atque bile medicamentum detracta, uiperis quas capiebat uti iussimus, preparatis in olla anguillarum in modum. Atque hic ita sanatus est, euaporato per cutem affectu. Postremo & alius uir quidam opulens, non nostras ille quidem, sed ex media Thracia, Pergamum aduenit admonitus somnio: ubi iubente deo per insomnium, ut quod cotidie medicamentum biberet quod confectum est ex uiperis, forisque corpus inuigeret, non multos post dies morbus in lepra abiit: rursumque et hoc pathos quibus deus precipiebat medicamentis curatum est.

Sanc

De uiperarum & dipſadum differentia, &c. Cap. 2

Sanè uiperarum caro adeo ingentem obtinet deficcandi facultatem, ut quidam qui eam edere, uehementiſſima cruciati ſunt ſiti: ac proinde illas dipſadas cognominant. Sunt autem qui dicant demorſos à uiperis ſatiari non poſſe potando, ſed diſumpſi citius, quam ſit liberari. Quocirca eos qui Romæ uiperas uenantur, quos Marſos nuncupant, percontatus ſum, ecquid haberet ſigni quò genus utrumq; uiperarum diſcerneret. At illi prorſum negabant ullum eſſe genus uiperarum dipſadum, uerum eas quæ iuxta mare atq; in locis degunt falſedinem multam habentibus, carnem obtinere falſam: ac proinde in Libya taſium ingentem eſſe prouentum: in Italia uero propter regionis humiditatem non inueniri. Atq; hæc quidem narantes audiui Marſos, nõ tamẽ certò dicere quæ, an in totum uerum dixerint, an partim etiam falſum. Nam quaſdã eſſe uiperas in ſis quas memorabant regionibus, quibus falſa ſit caro, uel maxime mihi uidetur eſſe probabile. Scio enim cum ciſbis animalium mutari carnes: non tamen nullum eſſe genus uiperarum dipſadum pronũciare ualeam. Caterum tutiſſimum eſt cauere, ne in euſmodi regionibus uiperas uenemur ſeu ad uſum, ſeu ad medicamentũ præparationem, quale eſt & hoc præclarum quod medici propè omnes Theriacã appellitant. Porrò quoniam ex more, cũ artiſcos theriacos, quos uocant, præparamus, non tantum caput, ſed et caudam earum abiſcimus, ſubiſt mihi frequenter rationabile fortaiſis eſſe, caput quidem totum abiſci, ob uenenum quod ore continet, uerum à ratione alienum eſſe, adimere & caudam. Nec enim dicere liceat quòd id faciendum ſit ob recrementa tum liuida, tum ſicca. Nam interfectis atq; excoriatis apertisq; exẽpta interanea omnia abiſcimus, ut ſola ſit carniũ ſubſtantia reliqua una cũ arterijs ueniſq; pro ipſas innatis, quarum minima moles eſt ut ad totã carnem, ac ne apparatus quidẽ, niſi quis multum diligenter intẽtis oculis cõſideret. Atq; artiſcos, quos & Theriacos uocant, hunc in modum præparamus. Purgatas illas in aqua lixamus, quoad exacte nobis uideantur coctæ. Indimus autẽ ab initio ſtatim aquæ anethum, & poſt coctionem ſpinas à carne ſeparamus: mox panem ad leuorem trito carnem cõmiſcimus. Verum nõ quemlibet panem citra delectum accipimus, ſed q̄ fieri poſſit puriſſimum, ſimul & probe in clibano coctum, & ſalis ſimulq; fermenti quod ſatis ſit habentem. Eum autem antea deſiccamus in ædibus ſiccis, minimeq; humectis, donec adeo ſiccus efficiatur, ut in mortario contundi poſſit. Nõ tamen tundentes miſcimus, uerum aqua in qua decoctæ fuerant uiperæ, maceramus, & carnem ipſam prius q̄ cõmiſceatur panem, in mortario coquorum eatenus conterimus, donec exacte reddatur leuis. Poſtea paruos artiſcos fingentes, atq; in edibus calidis ſiccisq; deſiccãtes, deinde quoq; in talibus reſpoſitos ſeruamus. Hos ergo ineunte æſtate conſicimus, quo potiſſimum tempore optima eſt uiperarum caro. Porrò utimur eis poſtea

A contuſis denovo & cribatis, & rurius ad leuorem redactis, ſalis nonniſi adijcientes ad ſuauitatem compoſiti, cuius etiam aliquid ipſi theriacæ iniſcimus. Caterum eodem quoq; tempore ex uiperis deuſtis ſalem conſicimus, uiuis illis in ollam nouam iniectis una cũ ſiſ medicamentis quæ illis & ſubſterni, & apponi aſſolent, quæ omnia nunc cõmemorare non eſt præſentis negocij. Nam inueniuntur fortaiſis etiã qui me nõ iniuria reprehendent, ob monſtratam hoc in loco Artiſcorum præparationem, tanq; alieno tempore expoſita. Verum hæc poſtea quam dicta nunc ſunt, ſeruent tamen ac maneant, etiam ſi non admodum uideantur huic inſtituto propria. At quæ ſequuntur, conuenienti dicantur modo.

B Iterum de carnis uiperinæ facultate. Cap. 3

Conueniens autem eſt generalis facultatis meminiffe, carnem uiperinam dicendo exiccatoriã, & ualenter digerentem, mediocriter uero excalcificentem. Propter autem, ut uidetur, uis eius ad cutem, per eam uidelicet quæ in corpore ſuius recrementa exigens. Quibus ergo aſſatim eſt mali ſucci in corpore, iſs ingens prouenit pediculorum numerus, & à cute ceu ſquama abſcedit ac decidit extima cutis, quam Græci uocant *terroſequida*, ad quam ſiſtuntur ac retinetur craſſi uroſiq; humores ad cutem protruſi, à quibus quidem pſoræ, lepræ & elephantes naſcuntur. Et hæc quidem habui quæ de uiperarum carne dicenda putarem. Rurius ergo ſermonem repetam. Calidiorum natura animalium carnes non ſolum nos alunt, ſed etiam calcificiunt: frigidiorum autem refrigerant ſic etiam ſicciorum carnes deſiccant: humidiorum humectant. Memoria itaq; repete, quem admodum didicisti in libris De temperamentis, quòd ubi cõieceris animal quoduſ temperatura eſſe ſiccus, uel ut exempli gratia ſuem ſylueſtrem domeſtico, huius & carnem eſſe magis exiccatoriã, & ſecundum alias temperaturarum differentias ſimiliter: puta ſue ſicciorẽ ouem, & hac capram, qua bouem, quo deniq; leonem: ſic in caliditate leo calidior eſt cane, canis tauro, taurus boue execto. Itaq; pro portione, qua cætera animalia in temperatura excedunt, & carnes quoq; eorum differunt atq; exuperant. Proinde ubi conſilium fuerit corpus exiccare, ſicciorum temperie animalium carnem exhibeto: calcificare autem uolens, calidiorum: & frigidiorum, ſi cõneris refrigerare: deniq; ſi humidius reddere, humidiorum. Nec parua exiſtit carniũ differentia, cum quaſdam ſale cõdimus. Nam prorſum diuerſæ atq; aliæ euadunt, adeo ut ſæpenumero animalis temperatura humidiffimi caro ſalita longè euaserit exiccãtior, q̄ ea quæ natura fuerat ſicca. Porrò inter eas quæ ſalitæ non ſunt, ſiccior eſt quæ aſſa eſt, q̄ quæ in aqua elixa. Scripſerunt autem & aliorum animalium carnes quidam prodeſſe tum comẽſas, tum in partes affectas impoſitas, ut erinacæ terreſtris deſiccãtam, ſi bibenda præbeatur elephanto obnoxiiſ, cachectis, hoc eſt qui mali ſunt habitus, tum conuulſionem ſæpenumero patiebus, nephriticisq; & iſs

qui laborat aqua inter cutem, quam anasarca uocant. Ac si ea efficere potest, facultatem habuerit ualenter simul digerentem desiccationemque, sicut & caro Mustelae (Graeci galen uocant) arefacta, quae utique comitiali morbo afflicto iuuat epota. Sed & salutorum Hælororum carnem ad leuorē contritam palos & spicula educere aiunt, inpositam uel delictet tanquam trahendū uim habeat. Porro Mutulorum, quos Myacas Graeci uocant, carnem ulceribus a mordente canē influctis competere. Ego uero nullam insignem inueni facultatem quam requirant id genus ulcera, tanquam ea quae a rabido cane mordente sunt illata. At cochlearum caro prius in mortario contusa, ac postea ad leuorē redacta, omnium ualētissime desiccet partes super fluo humore grauatās, adeo ut & hydericis conueniat. Ipse autem humor solus per se citra carnem (uocatur autem is a uulgo cochliū myxa, hoc est mucus limacis) thuri mistus, aut aloē, aut myrrhē, aut horum quibusdam, aut omnibus quoad accipiat cerati crassitiē, medicamentū fit tenax, desiccaturque purulenti mucus aurium: sed & fronti inpositum inhæret, oculorum fluxiones resiccans. Quidam etiam ad palos eximendis utitur totis una cum cetis ad leuorem tritis: sed & quidā ad istendos menses. Equidem ego aliquando in agro carnes ipsas solas in uulnus cū nerui uulneratione & contusione factum tritas inposui, ipsumque uulnus pulchre glutinatū est, & neruus phlegmonem haud perpessus: erat autem homo durus & agrestis, miscui tamen illis contritis pollinem fari nā acceptū a pariete molae proximo. Scripsere autē maiores me nonnulli medici, ad eiusmodi usum miscendum thus aut myrrham. Verum horum habebam tum neutrum, ut qui tūc ab urbe abessem in agro. Pofsis autem & resina fricta contrita ad mittere, si adsit, quippiam. Porro ubi multi mucicochlearū accipere uoles seorsum, stylo carnem earū pungito. Sed non ante multos dies uenatas esse expedit: alioqui enim tēpore desiccantur. Nam recentes plurimū habent uiscosa illius humiditatis, quā stylo cōpuncta effundūt. Humiditas hæc pilorum in supercilijis præter naturam gluten est.

Pinguedo, & adeps, Cap. 4

Pinguedo, & adeps, & hæc quoque communis sine sunt inter animalium partes. Nam quaecumque bene nutriuntur, ea omnia aut pinguedinem, aut adipem obtinent. Quae uero macilentas sunt, maleque nutriuntur, sæpe omnino ne habere quidem, sæpe uero pauculum, idque siccum, ut aegre uti possis, apparent. Porro differt a pinguedine adeps, quæ crassior sit, ac propterea animantibus totam naturam terrosiorem habentibus adeps prouenit, uelut humidioribus pinguedo. Proinde pinguedo celeriter in ignem polita liquefcit: nec facile ubi liquata fuerit, rursum concrefcit ac coagitur. At adeps nec facile funditur liquefcitque, & fusus celestime coit ac cōglaciatur, multoque apparet pinguedine durior. Sus enim bene habitus pastusque multā habet pinguedinē, ob naturalem temperamenti humiditatem. At boues & caprae, & quaecumque id ge-

nus cornigera, ob siccitatem adipem plurimū generant. At rursi uoles, oleosam & pinguem in animalibus substantiam omnem adipem appellato, ut plerique medici. Sed & pinguedinem appellare totum hoc genus licet. Non tamen licet citra mēdaciū adipem caprinum humidiorum esse dicere quod surum. Nā hic omnium ferme aliorum est humidissimus, ac proinde actione sua uicinam oleo uim possidens, quamque oleo magis tum emolliat, tum concoquat, ac proinde cataplasmatīs quæ ad phlegmones accommodantur, commisceri solet. Qui uero mordicationes perpetuuntur aut inrecto intestino, aut in colo, his potius caprinum adipem quam suillum inijcimus: non quod acrimonia plus obtundat (nam ex natura sua suillus obtundit magis, ac proinde miscetur in medicamentis ulcera curantibus, cuiusmodi est quod uocant parygrum) sed quod caprinus ob crassitiem citius concrefcit, suillus autē instar olei defluat: proinde ipsum potius dyfentericis & tinesimos inijcimus, quando morsum eorum mitigare cōsilium est. Porro ob tenuitatem essentiae nonnulla acrimonia magis retundunt, ubi nimirum in alto mordicatorum corporū quod molestum est hæserit. Nam quod crassiorum est partū, minus, magis autē quod subtiliū, tota corpora penetrat, & omnibus ipsum saniebus mordicantibus permiscetur. Hac ratione adeps asnerinus quæ in alto corpore mordicant magis obtundit. Sed & suillo calidior est. Horum tamen in medio est gallinae adeps ac gallinarum.

Porro calidior semper ac siccior est masculorum animalium, & horum ipsorum exectorum minus tum calidus, tum siccus. Quippe mas castratus eiusdem semper generis foeminae assimilatur. Hoc autem fermonis caput commune est, cuius meminisse oportet: Pro animalium temperatura semper existere differentias eius quæ in illis est pinguedinis, aut adipis, aut quocumque modo appellare libebit totum hoc genus corporis in animalibus oleosi & pinguis. Igitur cū sus omnibus prope quadrupedibus animalibus in caliditate ac sicitate inferior sit, proinde pinguedinem quoque minus habet calidam, magisque humidam. Omnia igitur pinguedinis facultas est humectatoria & excalfactoria humanorum corporum. (Huius enim meminisse perpetuo oportet in principijs huius operis dicti.) At differentiae quæ sunt cuiusque singularitatis, in maioris minorisque ratione consistunt. Nam pinguedo suis, ut ad nos quidē, largius humectare potest, sed non aequè excalfacere ut oleum: uerum pinguedinis surum talis est caliditas, qualis spectatur in nobis. Porro taurorum adeps suillo multo calidior est & siccior. Rursum id memoria repetentibus nobis, marem foemina esse tum calidiorum, tum sicciorum: marem autem castratum ad simulari foeminae, uelut quicquid iuuenis est attingit. Et inter iuuenilia foemina mare humidior est, & minus calida. Sic & adeps utulinus taurino minus tū calidus est, tum siccus, & hædorū quæ caprarū: Sed & caprarū minus quam hircorum: Et rursum hircorū minus quam leonū. Nam horum adeps

omniū propē quadrupedū adipe potentius digerit. Nam & caliditate exuperat, & partiu tenuitate. Itaq; si ipsum medicamentis ad ulcera & phlegmonas conuenientibus comisceas, nō modo nihil adiuueris, uerum etiā leseris, nimirū addita maiori q̄ conueniat acrimonia. Inueteratis tamen tum moribus atq; scirrhī in morē induratis, tū neruorum curuaturis (ἄγκυλας Græci uocāt) & in summa quæcunq; scirrhosa sunt, ijs aptissimus est, in quibus sanē minime apparet efficax sullus. Taurinus autem ab utroq; æ quoq; distat: ut quāto ca sidior sicciorq; sup̄ sulto est, tāto superetur à leonino. Itaq; tanq̄ in medio consistens, merito utriq; medicamentorū miscetur generi, & ei scilicet q̄ scirrhosus medet̄, & ei quod phlegmonas cōcoquit, cuiusmodi est tetrapharmacū quod uocant, ex cera, resina, pice, & adipe constans. Nam siue in hoc taurinū, siue uitulinū, siue hircinū, siue caprinū, siue sullū indideris, semper puri mouendo aptū, & concoctorum medicamē effeceris. Sed sullus si addatur in pueris, & fœminis, & ut breuiter dicam, omnibus quibus caro est mollior competit. Sin taurinum adieceris, fossoribus & messoribus, & omnibus carnem duram habētibus, siue ob naturalem temperiē, siue ex ratione ac forma uitæ, cōueniens effeceris. Ceterum adeps dum in uete rascit, seipso & calidior, et tenuior efficitur, ac proinde quoq; ualētius desiccans. Verū id omnibus inueterascentibus accidit, quæ quidem nō putrescere anticipent. Nam uinum, mel, acetū, frumentum, butyrum, cœypus, oleum omne, siue lentiscinum, siue cicinum, siue raphaninum, siue ipsum quod ex oliuis cōficitur, uetustate & calidiora, & tenuioris essentia efficiuntur, ac proinde gustantibus apparent acriora, & ad induratos ægreq; fo libiles affectus adhibentibus potentius digerentia. Atq; ego sanē gustantibus acriora uideri dixi. At quidam quibus studium est nominū significatus corrūpere, non acria sed affringentia uocāt id genus omnia, aduicq; pipere: tanq̄ inter sit nihil, adstringēs, an acre dixeris. Et si denuo illos roges de galla, myrto, mēspilis, mali punici putaminibus, quæ sūda uocāt, rhoō & omphacio, & hæc dicūt adstringere: tamen si aduersissimū ex illis sensum percipiamus, ei qui d̄ pipere, pyrethro, sinapi, euphorbio, cæpa, allio, adarce percipiē. Igitur si quē admodum adstrictionis uocabulū de utroq; affectu quem gustu percipimus, cōmuniter efferunt, sic ipsos quoq; affectus unam habere naturā existimant, quiduis aliud potius habendi q̄ homines, ut qui soli proprios sensus obtineāt. At si omphaca, rhoon, gallā, balaustium, hypocyttida contrahere cōstringereq; nostram fateantur substantiam, secernere uero, mordicare ac penetrare, pipere, sinapi, pyrethrum, improprie adstringentia nuncupant quæ mordicant & exalfaciunt, ceterum in cognoscendæ ipsi medicamentis nō peccant. Verum si oportet coniectantē dicere, in uocabulis, an in rebus allucinentur, equidem in uocabulis potius falsos uiros illos dixerim, & maxime quib. Græca lingua insueta est, qualis est Dio

A scorides Anazarbēnsis, qui profecto multa benedixit eorum quæ de materia memoriæ prodidit, ceterum significata græcarum uocum non satis pernouit. Hic ergo cum ait, magis esse adstrictorem adipem caprinum sullio: siquidem acriorem significare uelit per magis adstrictorium, accipimus sermonem ceu uerum. At si illud, talem habentem qualitatem, qualem rhus, rheon, hypocyttis, balaustium, haud uerum esse sermonem dicemus. Porro quoniam uiperatū adipem ubi radicatus pilos sub alis euulseris, prohibere illos recrescere illitum referunt, uisum est mihi eius facere periculum esse fatius: at ubi prout iubēt fecissem, mentitos comperi, sicut etiam quod initia suffusionum sanet. Verum urforum adipem aploecias curare uere est proditum: cum tamen probatoriā habeamus ad eum affectum remedia. Porro cum dicant tamen uulpinum adipem dolores aurium sanare, absq; ut dicant quos aurium dolores, ceu non noscentibus ipsos distinguere, attendendum non est. Alij piscium adipem laudant, tanquā ad suffusiones, aut quemcūq; alium affectum nominare uelint, congruat. Alij non similes piscium dicunt, sed addunt flumiatiliū, alij uero potius marinorum: quod uidelicet aliquid plus scire uideantur quā uulgus.

Myelos, Medulla. Cap. 5

Medulla uim habet indurata & scirrhosa corpora emollit, siue musculus, siue tendonibus, siue ligamentis id accidat, siue etiā uisceribus. Optimum semper expertus sum ceruinam, deinde iuniorum boum, quos uitulos etiam nominant, ac proinde medullam eorum uitulinam appellat. At hircorum & taurorum tum acrior est, tum sicciore. Itaque durities scirrhosas emollire nequit, si qua etiam memoria manet eorum quæ in quinto libro de his sunt prodita. Ex uitulina igitur & ceruina medulla pēsi cōponuntur uteros emollientes. Et extrinsecus uteris medicamenta imponuntur, quæ ex medulla preparantur, uim habentia emollientia. Accipitur autem non solum medulla ex ossibus, quæ sanē reuera est medulla, sed & ex spina, quam & ipsam medullā nominant, & spinale uidelicet: quæ tum durior, tum sicciore est q̄ alia. Illa enim mollior est & pinguior: ac proinde ego spinalem seorsum per sese absq; illa repono. Sed ea mihi utriusq; cura est ne aut putrescāt, aut sicut colligāt. Itaq; in hyeme primum eas capio, uelut & adipem, deinde in ædibus siccis atq; editis, plantis humoris expertibus, cum folijs lauri siccis repono. Nā quæ recentia sunt & humida, multum etiam qualitatis suæ illis impartunt, ut aciores fiunt medulla. At si quando ambiente calido & astringino medullas aut adipem uoles reponere, paratum sit in hoc cubiculum neq; calidum, qualia ferè sunt quæ meridie spectant (putrescunt enim in talibus) nec humo proximū, atq; humidum (nam in talibus situm contrahunt) sed supernū atq; excelsum, & ad aquilonē obuersum, paruas habens apertas fenestras, ut tam noctu quā interdiu ab Arcto spirantes uentos accipiat.

Caput menidum. Cap. 6

Capitibus mēnidum sanē interatarum ad se-
dis fissuras utebatur quidam, & is ipse ad columel-
lam diu induratam. Videtur ergo uis illarum esse
desiccatoria, non admodum acris, nam id a dusta-
rum quæpiam obinent, sicut omnes communi-
ter desiccationem.

Caput leporum.

Alius caput leporis comburens utebatur ad a-
lopecias cum adipe ursino.

Caput saurarum.

Porro sauræ caput contritum quidam palos &
spicula extrahere memoriæ reliquerūt, tum myr-
mecias, acrochordonas, & clausos.

Cerebrum leporis.

Cerebrum leporis attritum & esum utile esse
didicimus pueris dentiētibus, capite uidelicet to-
to elixo, ut ego facere soleo. Nō tamē eximia uis
eius est, sed similis mellis & butyro, & alijs quæ ad
dentientes pueros cōueniunt. Quidam etiam ad-
uersus metū utiliter edi cerebrū hoc prodidere.

Cornua cerui & capre. Cap. 7

Cornibus cerui & capre usitis maxime utun-
tur, ut & nos sæpe usi sumus, tum ad candorē den-
tium, tum ad contrahendas mollitiæ fluidas gingi-
uas. Cæterum ceruinum maxime commendatur
ab ijs qui talia scribunt, q̄ si ab ustione lauetur, dy-
senteriam & sanguinis excreationē, præterea cœ-
liacos affectus sanat: & aurigini utile esse dicunt.
Porro duo exhiberi cochlearia ad omnia ista præ-
cipiunt. Miscuerunt autem ipsum nonnulli, ut di-
ctum est, ustum et elotū collyrijs etiam desiccanti-
bus oculorū fluxiones. Est enim scilicet omnium
talium uis exiccatoria: uelut & dictum est.

Pulmo agninus, & porcinus. Cap. 8

Pulmo agninus pariter & porcinus intertrigi-
nes à calciamentis curare creditur. At uulpinus si
bibatur reficcatus, althmáticos iuuat.

Iecur canis rabidi. Cap. 9

Iecur canis rabidiētis si assum edatur, remediū
existere ijs, qui ab ipso fuerint morfi, quibusdam
est proditum: ac scio certe quosdam qui sumptere
mansisse superstitēs, uerū non illo dumtaxat usos.
Siquidem alia præterea remedia, quorū fecimus
periculum, in rabientibus tunc adhibuimus. Au-
diui uero quosdam cum illi soli fidem habuissent,
postea mortuos.

Iecur caprinum.

Porro caprinum iecur quidam affantes, sanieq̄
effluentem excipiētēs, ea utuntur ad nyctalopas.
Vaporem autem eius dum lixatur, oculis apertis
excipiendū præcipiunt. Quin & assum si edatur,
& ad eosdem affectus accommodari aiunt: & eos
qui comitali morbo sunt obnoxij, arguere, con-
uulsionemq̄ illis accersere. Idem potest hircinū.

Iecur lacertæ.

Iecur autē lacertæ erosis impositum dentibus,
eos dolore liberare nonnulli scriptum reliquere.

Venter mergi. Cap. 10

Ventrem mergi quidam commendant tanq̄
medicamen concoquens, et pepticū, idq̄ siue pro-
tinus lixum, siue arefactum comedas. At nos id

A experti, uanum esse promissionem comperimus,
sicut sanē etiā quod de interna tunica gallinarum
memoria est proditum. Aiunt enim quidam, si ea
arefacta bibatur, iuuare stomachicos.

Iecur lupinum.

Iecur lupinū sæpenumero in medicamentum
indidi hepaticum, quod ex eupatorio conficitur,
nec tamen quod mentione dignum sit amplius
præstare comperi, ad illud uidelicet comparans
quod sine ipso componitur.

Castorium. Cap. 11

Testiculos castoris nuncupatur castorium, me-
dicamentum & celebre, & multi usus, adeo ut Ar-
chigenes de castorij usutorum cōscripserit librū.
Atque ille sanē particulares eius facultates expo-
suit, nos uero uelut in alijs medicamentis fecimus,
ita & in hoc quoq̄ generalem modo facultatem
dicemus. Quam si præ oculis habeas, ipse per te
particulares inuenire possis. Itaque quod excalsa-
ciat, manifestum est. Nam si uoles ipsum ad un-
guem leuigatum oleo maceratum parti cuipiam
inficrare, euidenter illū incallescere percipies. Por-
ro calefacientia omnia ubi contactæ substantia
quippiam digerunt, continuo etiam illam desic-
cant, nisi si quid natura fuerit humidū, ceu oleum
& aqua, atq̄ aduentitiā qualitatem calidam, nō
facultatē assumperit: sicut certe hæc ipsa igni so-
liū æstiuo admotā. Itaq̄ cum castorij consisten-
tia quoq̄ sit sicca, & calefaciendi potentia habeat
adiunctam, merito desiccet. Atq̄ hoc illi cū mul-
tis alijs medicamentis cōmune existit. Porro quo
niam impense subtilium est partū, ob id plus ua-
let quàm alia, quæ similiter ut ipsum & calefaciūt
& desiccant. Nam quæ tenuium sunt partū medi-
camenta, ijs quæ sunt crassarum, plus sunt effica-
cia, etiam si parem sortita fuerint facultatem, nimi-
rum quia penetrent & in altum subeant admoto-
rum corporum, potissimum si ea densa fuerint, ue-
lut neruacea. Palam igitur talia ob causam postā
magnifice iuuantur a castorio. Cæterum fallun-
tur medicorum pleriq̄ in usu castorij, cum id mo-
do considerant, partem quampiam aut tremere,
aut conuelli, aut sensu motuue priuata esse aut
ægre sentire mouerēue: haud sciētēs id genus sym-
ptomata ad dissimiles sequi corporis affectus. At
tu ab Hippocrate doctus, ex plenitudine pariter
& inanitione conuulsionē consequi: ubi quidem
quæ in neruis continentur præter naturā, euacua-
re consilium est, ibi & bibendum exhibe, & foris
cuti castorium impone. Vbi uero exsiccitate ni-
mia obuenerit conuulsio, scito hoc medicamen-
tū lic esse aduersissimum. Ad eūdem modum ijs qui
præ plenitudine tremunt, utilissimum: aduersissi-
mum uero ijs quibus id accidit ab inanitione. Ad
portionem modo dictorum affectuum, ubi sin-
gultus euenerit stomachi, percuratō prius inuē-
toq̄ illius affectu, ac discreto, si quidem a plenitu-
dine ipsum ægroti perpetiatur, ad castorei usum
accedito. Sin autem ab euacuatione, aut acrim
humorum morfu prouenerit, medicamen hoc fu-
gito. Sanē si odorū gustuq̄ aduertas animū, suspi-
caberis

caberi humano corpori aduersissimā habere substantiam: tamen in natura nihil efficere cōperitur eorum quae talia facere assolēt. Si quidem alia stomachum vitiant, alia uentrem, alia caput, alia aliam quamuis partem laedunt. At hoc medicamē siue corpori humido applicēs resiccationem poscenti, siue frigido excafactionem, siue humido simul frigidoq; excafactionem pariter et resiccationem requirēt, magnam utiq; experire cōmoditatem: nec ullam partē cuiq; noxam afferet, potissimum si febrī uocet, aut non admodum calidam perpetiatur homo febrim, sed ut sic dicam tepidam, qualis accidit in cataphoris maxime & lethargis. Ac multos sanē castorij exhibuimus unā cum pipere albo, utrumq; mensura cochlearij ex melicrato bibendum prābētes: nec quisq; ullam sensit noxam. Sed & mensibus retētis, ubi per uenam quae in talo est, modice euacuassē, oblato castorio unā cū pulegio aut calamintho, semper medicamen hoc expertus sum purgationem ceterē absq; ut hominem laederet. Prāterea secundas morantes ei cit. Ea q; omnia ex melicrato potum efficit. At quibus ita uenter flatu distēditur, ut aegre curationem admittat, itaq; torminibus uexatur atq; singultu, idq; ob frigidos crassosq; humores, aut crassos flatulētosq; spiritus, eos ex oxyera to potum adiuvat. Quae porro iuuat in corpus intro sumptū, ijs prodest quoq; cui imponitū cum sicyonio aut ueteri oleo. Quae uero ampliori caliditate indigent, ijs etiam per sese infricari debet. Iuuat etiam, si quis suffitum eius in prunis impositū inspiratione hauriat, maxime affectus, in pulmōne aut capite consistentes. Attamen lethargicos & cataphoricos affectus, qui quidem adiunctam habent febrem, praestat non dictorum oleorum quopiam macerantes curare, sed potius ex rosaceo capiti colloq; imponere.

Renes scincorum. Cap. 12

Renes scincorum bibunt quidam tāquam pudenta intendentes: quorum contrarium accidere uidet femine lactuca potō ex aqua. Sed & quidam lenticularum decoctum cum melle bibitum intentiones sedare referunt.

Vingues caprarum, et asinorum. Cap. 13

Quidam unguēs caprarum deustos moxq; acetō perfusos alopecij illinunt. Itaq; fuerit & talis cinis facultatis extenuatoria. Sunt autē qui combustos alinorum unguēs comitialē morbum curare dicant, si scilicet assiduo bibantur: si uero oleo macerentur, choeradas digerere. Sed & ipsum cinerem si siccus inspersus fuerit, sanare perisiones siue chimethla.

Ossa. Cap. 14

Ossa combusta admodum digerentē exiccantemq; uim obtinēt, & id maxime, ut quidā ferunt, humana. Certe talum suillū cōbustum, ac deinde bibitum, inflationes & tormina sanare dicunt. Noui autem nostratiū quosdam ossa potui exhibuisse, haud sentibus qui biberēt, quidnam ebibissent, ne scilicet auersarēntur, ac multorum tum epilepsiam, tum arthritin curasse.

Senecta serpentis. Cap. 15
Senectam serpentis scripsere quidam in aceto bullitam dentium mederi doloribus.

Pellis ouina. Cap. 16

Pellis ouina recens detracta, circūposita ijs qui quocunq; modo fuerint uerberati, omnium lucu lentissime adiuuat, a deo ut die ac nocte uallos curet: concoquit enim & digerit quae sub cute sanguinem habent.

Equorum lichenes. Cap. 17

Equorum lichenas cum aceto triuas comitiales curare scriptum quibusdam est. Alij uero & ad cutis uisus ferā morsum adhiberi consulumt.

Tela aranei. Cap. 18

Aranei telam scribunt quidā a phlegmōne tueri summā cutis ulcera.

Coria uetera. Cap. 19

Coria uetera, quae uidelicet ueteramentorum sunt uita, ad attritiones commodari calcamentorum scriptum a quibusdam est, tanq; scilicet hoc faciant ex antipathia quadam. Certe quae phlegmone obsidentur, haudquaquam iuuantur: uerū ubi extincta fuerit phlegmone, non iniuria iuuantur, nempe quia resiccantur. Est em talis cinis resiccatorius. Ac nos sanē quādoq; in agro ad ulcus eiusmodi ex attritione fumus usi. Curat autē talis cinis non abs re ulcerum ambausta, & quae uocatur intertrigines in foeminibus existentēs.

Ostrea. Cap. 20

Ostrea quidam nuncupant omnia ostracodema, hoc est testacea, ab Aristotele appellata. At q; a plerisq; uocatur ostreon, secunda syllaba absq; scripta, unā esse ostrorum speciem constituunt, in toto genere cōprehēdentes et buccina, et purpuras, & chamas, & pinas, & similia omnia.

Buccina, et purpura. Cap. 21

Buccinorum purpurarumq; testa quandoquidem durissima est, nunquā absq; ustione utor. At que uita quidē desiccandi uim possidet, ceterum ad unguem eam leuigare, planeq; pollinis in modum necesse est, tundendo scilicet & cribrando. Quod tibi commune sit in omnibus lapidosis testaceisq; substantijs praecipuum. Nam nisi exacte leuia sint reddita, arenis similia sunt: per se autem illarū tritarum farina ulceribus malignis competit. Id quod ipsum quoq; comune est omnium quae citra insignē morsum desiccant uehementē: quippe cum alioqui fluxionum causa existant. Sed & aliud est omnium id genus commune, nempe ut cum aceto, aut oxyerato, aut cœnomelite, aut oxy melite idonea sint ulceribus putrescentibus. Idcirco lapides omnes ubi ad eū usum applicant, alij magis, alij minus, certe omnes conferunt.

Ostrea. Cap. 22

Ostreorum testa uita similis est facultatis buccinorum testis, tamen etia subtilis, immo ut certius ueriusq; dicam, minus crassa. Nam terrosam duramq; corporis sortita consistentiam cōcretionemq; impendio omnia crassarum sunt partium. Itaq; accuratē ea leuigare necesse est. Quāobrem eum dicimus horum aliud alio esse tenuius; ita in

audienda

audienda dictio est, tãquam si Vlyfsem Therfite dicamus maiorẽ, cum uterq; tamẽ fuerit parvus, aut Aiaceam Achille minorem, cum ambo itidem fuerint magni. Cãterum omnia id genus (ut et antea est dictum) cogendi quãdam in se facultatem obtinent, per quam condensata eorum essentia, dura terrosãq; sunt reddita, quã ubi per ustionein deposuerint, contrariam adfciunt facultatem, quam uocant digerentem. Porrò si laueris ea effe risq; ignea in aquam naturã deposita, ipsam efficiunt cum tenuitate ex calcaciẽtem, adeo ut & pũtrefaciat, sed nonnunq; reliquum illud terrenum est, morsus expers, id quod maxime implendis ei catriceq; claudendis ulceribus humidis effe utile. Igitur testa eorum quã peculiariter uocantur ofstrea, combusta utor ad diuturnas ex fluxione, ægreq; carne implebiles cavitates, nempe quẽ sistu losã sunt atq; profundã, eã foris cum sullo adipẽ ueterato circumponens: id uulgo axungiam nuncupant. At in sinum ipsũ aliquid eorum quã talia carne implent, immitto, quale est usũ diaphanes, quod specularium nominant. Parem in genere facultatem habet & cãterorum ostracodermorũ testa deustã, maxime uero, ut dixi, ofstreo rum, deinde buccinorum, et purpurarũ. Itaq; cinis eius generis emplasticis miscetur facultatibus digerẽtibus, & cum quouis adipẽ digerit. Verum quoniam inueteratus effica eius digerit, illi magis misceri solet. Porrò potentius hoc medicamen digeret, si a crem illi adipem quempiã miscueris, de quibus superius determinatum est. Quin & dentes splendiores talium omnium cinis efficit, nõ tantum extergendi potentia, sed & asperitate substantiã, uelut & pumex, & testa clibanĩ. Verũ in usu eiusmodi non est necesse quã sic usã sunt admodum leuigari. At in ulceribus rebellibus præ omnibus diligenter sunt leuigãda. Porrò excrementiam mediocriter exenterat comprimũtq;. Ad hæc cum sale omnia id genus usta dentium smegma reddunt efficacius, adeo ut non modo laxitatem mollitiemq; gingiuarum deficiet, uerum etiã ulcera putrescentia adiuuat.

Sepia. Cap. 23

Sepiarum testa admodũ laxa est, non ut ofstreo rum lapidosa. Itaq; absterlio quidem illi cum alijs ofstrocodermorum testis communis est, uelut etiã deficcatio: cãterum partium tenuitas eximia illi præ cãteris inest. Quocirca usta ea utimur ad utiligines, ephelin, lentes, psoras. Quin & folsili salĩ mista, in oculis existentes ungues eliquat. Et antequam uratur, dentibus splendorem adfert, ulceraq; deficcãt. Porrò hoc nomine, quod mediocrem obtinet asperitatem, adhibemus eam & ad ingentes oculorum asperitates, quas fycosas appellare consueuimus. Nã exscalpẽtes ea quidãdam ipsã figurã simile collyrio, eo illas confricamus, donec sanguinem reddere incipient, quo facto collyriã cathartica siue detrahentia præstantius effectum suum in illas exerunt.

Opercula purpurarum. Cap. 24

Opercula purpurarum quidãdam memoriã pro

A diderũt, lienes turgidos sanare, & suffitu eas quã uteri suffocacione periclitantur, iuuare: præterea retentos eijcere locos.

Lana ofstrea, hoc est succida. Cap. 25

Lana fordida, ac proinde à quibusdam appellata succida, idonee excipit irrigationes quã adhibentur contusis, aut quomodo cumq; percussis, ut quã utilitate ex illis proficiscẽtẽ promoueat, idq; propter ofstreon. Lora uero, nec amplius ofstreo habens, apta humoribus qui irrigantur excipiendis. Porrò usta uim habet acrem pariter & calidã, unã cum partiũ tenuitate. Itaq; molles nimiumq; humidãs ulcerum carnes celerrimẽ eliquat. Inditur & in medicamenta deficcatoria. Vrito eã tanquam alia plurima, ollam implens nouam, quam tegat operculum multis foraminibus pertusum.

Pili usũ. Cap. 26

Pili usũ, similiter ustã lanã ex calcaciendi deficcandiq; admodum sunt facultatis.

Ouorum facultas. Cap. 27

Consequens fuerit ad partium doctrinã de ouis differere. Nam alibi eorum meminisse non licet. Sanẽ oua partes non sunt animalium, ceu nec arborum fructus, nec grauidarum fetus: uerum proportionẽ respondent ijs quã agnascunt. Itaq; eorum quã agnascuntur, quãdam planẽ familiaria propriaq; conspiciuntur tum plantarum, tum animalium naturis: quãdam non omnino talia, ut uiscum quod agnascitur quercubus: & ut semel dicã, si qua arboribus, alterius generis arbor, frutex, fructus, herba aut germen quodpiã, ut fungĩ agnascuntur. Ex familiaribus autẽ est & ouium lana, & aliorum animalium pili, & cornua quẽ de cidentia denuo recrescunt, ut in masculis ceruis, ex hoc sunt genere. Conceptus autem siue fetus fructibus proportionẽ respondent, nimisũ ad generis propagationẽ à natura creati. Ex his unum est & ouum factum ad generis successiõnem perpetuatẽq;. Cãterum utile est & tanquam nutrimentum. Verum de nutrimento non est nunc institutum differere. Proinde quã tanquam medicamentum efficere potest, ea hoc loco recẽsebo, ex pauculis usibus particularibus uim eius exquirẽs tum in partibus, tum in tota substantia. Si quidem quo pacto inuẽta rerum cuiusq; generali facultate, ad multos eam usus particulares ducere possimus, didicimus. Insuper docti iã sumus, quomodo ex uno alteroq; experimento de generali facultate liceat colligere. Igitur ouorum album et tenue illud, quo item ad ophthalmias utimur, ex numero est medicamentorum minime mordicãtium, nec unquam effectu frustratus sum ex ulla tali intemperie, qualẽ habet sepe lac, ut ante ostẽdimus, in animalibus cruditate perpetuã, aut nimiam famẽ, sitimũe aut quẽ cibis pasta sunt prauis. Quã sanẽ frequentius euenire solent mulieribus, ob uictus uidelicet uitãq; errorẽ. At oua unam modo prauitatem patiuntur, quam scilicet adfert uetustas. Eamq; facillimẽ effugias, si uitaris recentibus. Porrò usitatissimum nobis est, maximeq; parabile gallinarum ouũ; ea propter illo uti

mur, aliorum oua nihil curantes, tamen si eandem illi habeat naturam. Temperatura porro symmetri frigidius est. Itaq; utendum est oui albumine non tantum ad oculos, uerum etiam ad alia omnia quae medicamenta requirunt suauissima, minimeq; mordacia, ut sunt uniuersa sedis ac pudendorum ulcera contumacia. Miscetur quoq; aduonee medicamentis profluuium sanguinis ex cerebri inuolucris suppressentibus, quae nimirum citra morsum illinuntur, atq; adstringunt. Sed & ad ulcera rebellia miscetur ijs quae absq; morsu ea possunt defecare, cuiusmodi est medicamen pompholyx elota, & metallicorum quaedam elota, de quibus priuatim supra disseruimus. Porro & ipse uitellus ad similes est naturae, ac proinde miscetur ceratis morfus expertibus, ouis uidelicet aut laxis, aut assis. Verum id tamē manifestum est hic leuiculam existere differentiam, quod paulo plus desiccant quae sunt assiae: quantum huius accipit facultas, tantum dependant de mitigandi potentia. Miscetur & cataplasmatibus phlegmonem extinguentibus, ut ijs quae ex meliloto constant, sedi applicandis. Crudo uero ouo toto utimur admixto rosaceo ad palpebrarum, aurium, mammarumq; phlegmonas, quae scilicet aut ictus illis, aut alio quouis modo euenierint, aut extiterint in nervosis corporibus, puta cubito, & digitorum tendonibus, aut articularibus, idq; in pedibus pariter & manibus. Porro in aceto coctum ouum si edatur, fluxiones uentris defecant. At si etiam quippiam eorum quae ad dysenteriam, aut coeliacum affectum conueniunt, adiunxeris, atq; in igne modico fumiq; experte (qualis est qui ex prunis constat) frixeris, edendumq; ita praebes, non minime sanē laborantes adiuuabis. Aptissima talem ad usum sunt omphacium, ihus, tum ipse qui cibus aspergitur, erythros nuncupatus, tum succus ipsius: galla, sidia, hoc est mali granati putamina, cinis cochlearum integrarum uisitarum. Aptia quoq; & uuarum uinaeae, & myrta, & melpila, & corna. Magis istis medicamentis nosa sunt balauistium, hypocistis, cytini, siue mali punici flores. Sed & ad ambustiones protinus impositum est utile, siue quis feorsum albumen dumtaxat ipsum molli lana excipiat, siue etiā dum utello commiscens confundensq; applicet. Etenim medioocriter refrigerat, & citra morsum defecant. Tale quū sit, et ad anacolemata uocata, quae fronti uidelicet imponuntur, utimur, & pilos palpebrarum ad glutinamus, nimirum admixto idoneorum quoque, cuius generis est thus, potissimum pinnae si fuerit, ac non inueteratum & siccū. Verum in illiusmodi, ipsius albuminis comoda est uiscositas, non autē temperies, nisi quis quatenus nequaquam aduersatur illi quod adhaeret medicamento, eo nomine utile comodumq; dixerit. Nam uiscosorum quaedam sunt quae aduersantur, uel ut uiscum, nimirum acre & calidum, ad ea quae ex calciferi non debent, dictūq; frequenter superius est, ea quae ualidam uim nullā obtineant medicamentā, ceu materiam ijs quae tales uires obtinent, misceri: proinde quoque creberrimi sunt uisus, utpote ijs quae ua-

Galen.

lenter agunt, inferuentia. Eiusmodi cum sit ouum, simulq; non paruum adipiscatur in ligationis affectionisq; qualitate differētia, sit sanē multo utilissimum. Nam medicamentis quae humiditates desiccant, aut lixum, aut assum, aut frictū miscetur: ijs uero quae lentorem humorum in pectore pulmoneq; incidunt, sorbile quod uocant, id quod in aqua eousq; lixari debet, dum incaluerit. Eiusdem huius naturae nomine & ad eos quibus gutturis superna exasperatū est, assumit: tum scilicet quod affectibus partibus illinuntur, atq; cataplasmatibus modo inhaeret, tum q; substantiae suae leuitate eas mitigat, sanatq;. Eadem ratione, stomachi, uentris, intestinalium ac uiscerū medetur asperitatibus.

Echinus, hoc est erinaceus, combustus. Cap. 28

Erinacei utriusq; tum marini, tum terrestris corpus ustum cinerem efficit facultatis tum extergētis, tum digerētis, tum detrahētis. Itaq; eo quiddā & ad excrecētia, & ad sordida usi sunt ulcera.

Cochleae, siue limaces. Cap. 29

Cochleae si totae cum testis uratur, admixta galla omphacitide, simulq; pipere albo, mirifice profunt dysenterijs, in quibus ulcera nodum computrescere coeperunt. Conuenit autem ut piperis sit pars una, gallae uero duae, quatuor cochlearum. Haec ubi ad unguem leuigaris, cibus inspergito, bibendumq; aut ex aqua, aut ex uino albo & austero praebeto. Caeterū absq; gallae mixture cinis cochlearum ad modum resiccantis est facultatis, obtinens item non nihil ex uestione calidum. Porro cochleae quae uestionem non sunt expertae, si tritae unā cum testis imponantur, & toti uetri aqua inter cutem laborantium, & in arthriticis articularum tum moribus, aegre quidem diuelli poterunt, caeterum impense desiccant. Et sanē inhaerere sinere oportet, quoad sponte decidant. Idemq; facieridum in tumoribus ex ictu natis difficile solubilibus, et ex contusione facta in auribus. Deficcant enim illos magnopere uniuersos, etiam si uiscosus crassusq; in alto humor contineatur.

Carcini, hoc est cancri, uisus. Cap. 30

At fluuiatilium cancerorum cinis quanquam si militer predictis exiccatorius est, substantiae tamen proprietate mirabilis est eius in ijs qui a rabiente cane sunt morfi, effectus, isq; tum solius, tum cum gentiana & thure multo praestantior. Thuris sanē partem esse unā oportet, quinq; autem gentianae, porro cancrorum decem. Et raro equidem aliter illis uisus nos sumus usi, caeterum ad eum modum plerumq; quo Aeschriion empiricus ille, medicamentorum potissimum senex, concius ac praceptor meus. Patella erat aeris rubri, in qua impositis cancris uiuentibus, eos haecenus usis, dum facile ad leuorem redigi possent. Hic Aeschriion paratum semper in aedibus hoc habebat medicamē, urens eos post ortum Canis, quando Sol in Leone transisset, non nisi Luna decimoacta. Porro bibendum hoc medicamē ijs qui a cane rabido fuissent morfi praebebat quotidiē diebus quadraginta, mensura cochleari magni aquae insperum. At si

tom. 5

o non

non protinus ab initio, uerum aliquod post dies A
 curam cepisset demorſi, tunc quotidie duo coch-
 learia aquæ inſpergebat. Ad ipſum uero uulnus
 emplaſti unam, unum acetii acerrimi ſextarium I-
 talicum, opoponacis uero uncias tres. Hęc tamen
 ſi à præſenti inſtituto eſſent aliena, ſcribenda ta-
 men cenſui, quia magnopere medicamento huic
 ipſe conſiderem, nimirum cum applicabat medi-
 camentum, quod ex pice brutia & opoponace a-
 cetoq; conficitur, habens picis librâ, cum nullus
 unquã eorum qui illo fuerint uſi, ſit mortuus. Cæ-
 terum ſeorſum librum conſcribam aliquando de
 ijs quæ proprietate ſubſtantię totius quid agunt,
 & quorum numero ſunt id genus omnia. Ignorẽ-
 dum itaq; tum hoc in loco ſcribendi importunita-
 ti, tum ſicubi præterea id mihi hoc in opere conti-
 git: nempe quia ex ijs ſumma prouenire utilitas,
 quam ſanè poſteris impertire uolebam, ſi forſan
 me prius q̃ quę hiſ deinceps ſunt opera perfecif-
 ſem, mors occuparet, propoſitum impediens. Ce-
 terum Pelops doctor meus & ipſe omnium ei-
 modi cauſas reddere uolens, non abs re inquit, cã-
 cer cum animal ſit aquaticum, prodeſt à cane ra-
 bidum morſis, quibus uidelicet metus eſt ne, corri-
 piantur affectu ſicciffimo, nempe rabie: quam ob-
 rem ſanè etiã aquam metuunt. Ac fluuiatiles,
 non marinos conuenire cancores dicitabat, ſcilicet
 quòd animalia marina ob admiſſionẽ falis na-
 rura ſicciffimi haud æque exactam tuerentur eam
 quæ eſt aduerſus rabiem contrarietatem. Ac cum
 quidam ſubieciffet, cur non omnia quæ in potabi-
 li aqua degunt animalia, perinde ut cancri iuuare
 aſſolent: quia inquit, ſimilem cancri præparatio-
 nem non admittunt. Nam horum uſtorum cine-
 rem, excicatorius cum ſit, canum rabientium ue-
 nenum abſumere ſimulq; digerere profeſſus uide-
 licet eſt, ambitione magna iactans, omnium ſe ta-
 liũ nouiſſe cauſas. At ego niſi planè me ſcire, quip-
 piam perſuaſum habeam, alijs perſuadere nõ ten-
 to. Itaq; nec Pelopis rationem ut ueram accepi, ut
 quæ crebras habeat contradictiones: uerum can-
 cores opinor ex proprietate totius ſubſtantię pro-
 deſſe. Quoniam autẽ nullum eorum qui fuerant
 ſendaq; à me exiſtimauit, tamen nõ eſſet huius in-
 ſtituti propriũ. Sed corporibus totis (nam id erat
 propoſitũ) non ijs tantum animalibus quæ poſui.

Chelidones, ſiue hiruindines uſte. Cap. 31

Sed & hiruindibus uſi ſunt multi, comburen-
 tes uidelicet, & cinerem mellis miſcentes, ac dein-
 de ſynanchicos inungentes, & in totum quicun-
 que in gutture ac columella coſiſtit affectus. V-
 tuntur & ad acuendũ uiſum hoc cinere nonnulli.
 At aliq; eas arefactas drachmâ pondere bibendas
 exhibent.

Tettiges, id eſt cicade. Cap. 32

Sed & cicadis quidam utuntur ad colicos affe-
 ctus cũ paribus numero piperis granis, datq; aut
 tres, aut quinque, aut ſeptem, per intermiſſionẽ ui-
 delicet, & ipſos etiã paroxyſmos. Porro aliq; aſſas
 edendas offerunt quibus affecta ueſica eſt.

Corydus, id eſt galeritã. Cap. 33

Galerita tamen auis illa puſilla obiter nobis
 plerunq; obuia, in iure ſimplici elixa colicos adiu-
 uat. Verum aſſidue am edere ſimul cum iure ne-
 ceſſe eſt. Habet uero hoc animal in capite uelut
 galerum ex pennis ſponte enatum, cuius occaſio-
 ne efficta eſt, quæ apud Ariſtophanem comicum
 legitur fabula. Is enim inquit hunc in modum: Im-
 peritus es, & minime curioſus, & ne Aefopũ qui-
 dem didiciſti, qui ait galeritam primã uolucrum
 fuiſſe, etiã ante terram: inde patre morbo defun-
 cto, cum humus nondum eſſet enata, illum qui-
 dem dies quinque iaciſſe: at hanc præ inopia me-
 lioris conſilij, in capite tandem patrem ſuum de-
 foſiſſe. Hoc quoq; aiunt obſcure licet, deſignafſe
 tamen Theocritum.

οὐδ' ἄνθρωπι βία κερυδαλίδος ἠλάοντι. i.

Et necq; tumbiferæ circumuolitant Galeritæ:
 nempe indicare illum eas quæ in capite tymbon,
 hoc eſt, ſepulchrum gerant. Annexui autem huic
 iſta ſermoni, quò planè & clarè hoc animal, nem-
 pe galeritam, ſignificarẽ, quas ferat in capite pin-
 nas erectas: quãdoquidem expertus ſum eius ad-
 uerſus colicos uſitãtẽ, uel imq; qui ipſum nõ no-
 uerit, ijs bene aperteq; monſtratũ. Nam & ipſa co-
 rydalis appellata herba colicis conuenit. Et hoc
 quoq; tibi obiter ſit notatum.

Alcatorides, id eſt gallina. Cap. 34

At gallinarum ius ſimplex retinendi uim poſ-
 ſidet, uti gallorum ſubdugendi. Coquendi autem
 ſunt cum ſale prolixiffimè. Sed horum ipſi feci-
 mus periculum.

Gale, id eſt muſtela. Cap. 35

Muſtelam nunq; cõbuſimus, de qua ſcriptum
 legitur, cinerem quidem eius cum aceto illitum,
 podagricos arthriticosq; iuuare, tanq; uehementer
 ualeat digerere: ipſam uero arefactã ac potam
 prodeſſe comitialibus, eadem nimirũ illa facultate.
 Porro quidã etiã planè omnis ferẽ alexiphar-
 macum eã eſſe referit, & maxime eius uentrem.

Renauſte. Cap. 36

At ranarum uſtarum cinerẽ ſanguinis eruptio-
 ni mederi referunt inſperſum, cæterum cum liqui-
 da pice ſanare alopecias.

Hippocampus. Cap. 37

Et Hippocampus animal illud marinum ſi to-
 tum uſſeris, alopecijs prodeſſe proditum quibus-
 dam eſt, ipſumq; uidelicet deſiccantis eſſe facultatis,
 extenuantisq; aut certe eius cinerẽ, quem qui-
 dam unguento amaracino cõmiſcent, quidam pi-
 ciliquidã, aliq; ueteri adipi ſuſſilo.

Tellina falſe. Cap. 38

Et falſas tellinas uſtas adeo urentem efficere ci-
 nerẽ aiunt, ut is cũ cedria, euulſos radicitus ex pal-
 pebris pilos, inſtillatus in locũ, renaſci prohibeat.
 Porro citra uſtionẽ aut lixationem, totorum ani-
 malium in partes affectas impoſitorũ, aut intrò in
 corpus ſumptorũ, quidam medicorum fecere pe-
 riculũ, aut ceu fecerint periculum, ita ſcribunt.

Inteſtina terre. Cap. 39

Terra quidem inteſtina contrita, neruiſq; diu-
 ſis

lis imposita, protinus mirum in modum profunt: atq; hæc ipsa quoq; cum mulsio pota, medicamen sunt mouenda: urinæ idoneum.

Cimices. Cap. 40

Sed & de cimicibus quibusdam traditum est, quòd si cum aceto bibantur, hirudines eijciant: at nobis, cum eas perpetuò alliorum esu eiecerimus, haud opus fuit cimicibus.

Cantharides. Cap. 41

Verumtamen sufficientem habemus de cãtharidibus experientiam, quod in unguens pisorodis cum idoneis ceratis aut emplastris impositæ sic illos educunt, ut toti cadant. Miscuimus eas etiã facultatibus pisoris & lepris cõgruentibus, nec non quibusdam septis, atque interim etiã ijs quæ claros, quos uocant, eijciant. Porro præceptorũ meorum quidam earum paulum quiddam in medicina urinam mouetiã solet iniicere. At quidam solas alas & pedes iniiciunt, quæ aiunt esse alexiteria ijs quæ corpora ipsorũ bibissent. Alij cõtra. At nos totas indimus. Cæterum aptiores sunt ad ea quæ expertũ me dixi, eã cantharidũ quæ inuenta in frumento, lutea transfuersim in alis cingula obtinẽt, potissimũ si iniiciant in uas fictile, cuius orilinteum obductum sit rarum, itaq; illud inueras, ut linteum halitũ ab aceto subtus posito excipiat, donec emoriantur ipsæ cantharides.

Buprestis. Cap. 42

Sic buprestas quoq; reponere expedit. Sunt autem & ipsæ animalis quoddam genus cantharidibus tum specie, tum uiribus a disimile.

Pityocampe. Cap. 43

Quin & cruce quæ in piceis nascitur, merito sane nuncupata pityocãpæ, huius sunt facultatis.

Salamandra. Cap. 44

Et salamandræ combustæ cinerẽ quidam septis & lepris pisoricisq; miscent facultatibus.

Narce. Torpedo. Cap. 45

Sed & torpedinem totam (dico aut animal marinum) capitis dolores sanare capiti admotam, se demq; euerfam coercere, à quibusdã est proditũ. Verum ego cum utrũq; essem expertus, neutrum uerũ cõperi. Eam igitur cum cogitassẽm uirum esse applicandam, cui caput doleret (posse enim fieri ut hoc medicamen anodynon sit, ac dolore liberet similiter alijs quæ sensum obstupesciunt) ita habere cõperi. Putoq; eum qui primus est usus, tali quapiam motum ratione experiri aggressum.

Draconis marinus, & trigle, & alia id genus. Cap. 46

Vitas etiamnum hæc animantes apertas, & protinus partibus affectis appositas prodesse scripserunt, nempe draconem marinũ in suum ipsius ictrum pospositum, similiter & triglã in draconis, mures domesticos in icũ scorpionis, uelut & saurã, ryngalen in suum ipsius, & sauram chalcidicam, quam & ex uino bibendam præbẽt: tanquã suum ipsius morsum sanat. Porro scorpionum suum ipsius ictrum curare si tritus imponatur, similiter si assus edatur. Congruere autem aiunt & ijs qui à uiperis sunt mori, a calabota uero ijs qui à scorpione. Refertur autem & in Aegypti regionibus arefactũ asy-

Galen.

A racum quem uocãt, exhiberi ijs qui à scorpione percussi sunt: & id quod cybium uocatur utiliter uulneri à cane influcto imponi. Multaq; efusmodi, de quibus copiosius differemus, ubi tractabitur de ijs quæ proprietate substantiæ quid agunt. Cæterũ in oleo lixis totis animalibus, ipso oleo urebantur nostratium medicorum quidam, sed & superiorum nonnulli, ad depilationẽ seu pilorũ nudationẽ, nempe pityocampis, & urticis marinis, lepore marino, scolopẽdro marino. Ad aurũ uerò dolorẽ silphis in oleo coctis, et ijs quos uocant orniscos Græci (Latini multipedas.) Ea em animalia in globum sese contrahunt, uocantq; ea apud nos quidã cyamos, hoc est fabas, quando quidem esculentis fabis sunt per similia, ubi sese uidelicet in globum conuoluerint, colore fusco. Porro in agro cõplures uidere esse natos sub finibus, quibus à fontibus rustici aquam comportant, deponũtq; eas iuxta focum. Vidĩq; quosdam ex ijs qui medicinam in agro exercebant, assidue oleo ex illis cõposito ad uniuersos aurum dolores uti, nõ discernentes affectum unde oriretur. Itaq; non ab re uenit, ut interim effectum consequerentur, interim læderent. Et quid mirum, quando & insignes quidam medici de ijs citra distinctionem scripserunt: Tales sunt Apollonij libri De parabilibus. At que hic sanè etiam scripsit, uermes terræ in oleo coctos aurum dolores mitigare: sed alij censent, admisso adipe anserino, sic demum utendum.

Vulpes & hyæna. Cap. 47

Cæterũ de uulpibus quæ totæ in oleo coquantur (nam sic quidam curant arthriticos, partim ut uas uulpes in lebemem ingentẽ iniiciẽtes, partim etiã mortuas) fusius dicere mihi necesse est, quãdoquidẽ plerosq; uisæ sunt principio planè morbo hoc liberasse, uerũ post multum temporis non ita profusum. Si quidem illos malum reperit, quãquam nõ ita uehemens quã antea. Sanè oleum in quo cocta uulpes est, non est potentioris in digerendo facultatis, quã in quo hyæna: quæ si similiter in oleo lixetur, redditur oleũ longe potentiũ in digerendo facultatis. Porro frequenter uisum est, talibus medicamentis inesse potentia eorum quæ in alto continentur corpore, in extremam cutem extrahendũ, ac eo nomine quandoq; sedandi dolores: non enim perpetuo hoc ad ea sequitur, cum ij dũtaxat dolores ab eiusmodi medicamentis sedentur, quorum causa est humor in alto contentus, dolorem ciens aut substantiæ crassitiæ, aut refrigeratione, aut uehementi acrimonia, aut etiam spiritus flatuosus exitum nõ habens. Ita que qui utuntur uulpibus, & ipsi oleum digestorium efficiunt: atque inde impletis eo aluelis totos arthriticos in eos imponunt, multo ibi tempore immorari præcipiẽtes: uerum ex hoc fit ut non tantum qui citra articulos sunt tumores euacuentur, sed etiam uniuersum corpus. Itaq; ubi corpus illis antea plenitudine affectum fuerit, mirum nõ est per euacuationem consecutum commodum, nempe cum nihil etiã in affectas partes influat, quia corpus uniuersum iam euacuatum est, & qui

continebantur humores exhalantur. Cæterum quemadmodum antea cum corpus noxa uacaret, praua uictus ratio morbum inuexit: eundem in modum, aut etiam amplius, à simili diæta par est rursus illos similiter afficiendos in articulis quibus iam laborauerunt.

De ijs que in mari & aquis salis proueniunt. Cap. 48

Sola hæc in toto opere reliqua hoc habent nunc tempus opportunum. Nam quæ in mari & aqua nascuntur animalia, superior sermone exposita sunt, ubi uidelicet agebat de animalibus. At quæ in aquis quidem nascuntur, nec sunt animalia, ea nunc exponuntur.

Adarcion.

Adarcion, quidam uero masculinè efferunt adarcion, alij femininè adarcè appellat, essentia quidem sua uelut spuma est aquæ salis concretæ, circa arundines & stœres concreta. Acerrimum hoc est simulq; calidissimum: proinde & per se in utile est, uerum commisceri solet ijs quæ uim eius retundunt, sicq; fit multo utilissimum in ijs affectibus qui exalteseri postulat, idq; foris impositum. Nam intrò in corpus ipsum fumere est impossibile, nimirum ob uirium uehementiam.

Alcyonia. Cap. 49

Alcyonia acrimonia detergent ac digerunt, qualitate habentia crem & calidam: uerum aliud alio non parum plus minusq; & in his ipsis quæ diximus secundum partium essentia tenuitatem. Est autem eorum unum densum & graue, odoris prauit: olet enim pisces putridos, spongiæ in specie simile. Alterum uero figura longiulcula, leue & rarum, odorem habens similem phycijs. Aliud tertium uerum simile est specie, colore purpureo, consistentiâ molli: uocant id milesum. Post quæ quartum secundo quidem iam posito similiter & leue & rarum, uerum lanis succidissimè. Deniq; & quintum extrema superficie leui, cæterum interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamen apparet acris: & sanè omnium alcyoniorum est calidissimum, adeo ut et pilos urere possit. Itaq; cum duo prima lichenas, alphas, psoras, leprasq; adiuuent, præterea cutem splendidiorem competentia uirium efficiant, idem præstare non potest hoc ultimo loco positum. Nec enim perinde ut illa cutem duntaxat summam extergit, sed etiã excoriat, usq; in profundum cutis penetrans, ut etiam ulcera moliat. Porro quod tertio ordine recensimus, omnium est tenuissimum. Itaq; usum alopecias curat illitum cum uino, colore quidem fuluo, tenui tamè essentia. Quartum autem eiusdem cum hoc speciei est, uerum uires habet haud parum imbecilliores.

Sal. Cap. 50

Sal eiusdem genere facultatis est, siue fossilis sit, siue marinus: uerum hoc differunt, quod salis ex terra effossi substantia magis sit compacta, ac proinde in hoc maior est & partium crassities, & adstringendi potètia. Itaq; marinus affusa aqua protinus liquefit, at fossili hoc non euenit. Porro eiusdem speciei cum marino est qui in stagnis quibusdam falsedinem habetibus nascitur, ætate uideli-

cer aquis æstu ex ijs absumptis, cuiusmodi est Tragastus, non procul à Sminthio. Confluit enim illuc ante aquas spontaneas, quæ admodum sunt calidæ, copiosa aqua stagnans non amplo in loco: & eaestate omnis absumit, à sole uidelicet arefacta. Porro quoniam locus ipse falsedinem continet, quod reliquum est omne, sal est, cognominatone à loco pariter & aquis fortitus. Nam spontaneæ & ipsæ illis in locis aquæ Tragastæ nuncupantur, potentia summe excitatoria: & sanè qui in ea regione sunt medici, ad hoc illas accedunt. Porro dictum est & de Sodomis in mari mortuo prouentibus, in quarto libro, quæ si quis librum diligenter perlegerit, illi tantum refricare memoriam nunc opus est, ut exposita gustus qualitate, ipse medicamentum facultate cognoscat. Igitur cum qualitas falsa digerat simul & contrahat contacta ab ipsa substantiam, aphronitru in hoc differt, quod in ipso uero modo saporem exuperant sit uidere, quem uocant amarum, uim habentem digerendi, haud etiã contrahendi uti sal. Nam hic quicquid in corporibus humidum inest, id quodammodo absumit: & quod reliquum est substantiæ solidæ, adstrictione contrahit: ac proinde etiã conditura sua carnes seruat, & à putredine tuetur. Quippe quæ putrescunt, excrementitium continent humorè, substantiamq; tum dissolutam, tum minime compactam. Quibus ergo corporibus nulla prorsum est humiditas superflua, ceu mellis optimo, & corpus solidum & compactum est, ceu lapidibus, ea ut putrescant est impossibile: ac proinde in his salis non probatur usus: uerum in ijs in quibus suspecta est putredo.

Salustus. Cap. 51

Sal ustus digerit quidem potentius quam ustionis expers, quanto scilicet subtilius ipsum corpus accepta ab igne facultate redditur: uelut et in alijs quæ combusta sunt, euenire diximus: uerum non perinde ei qui non est ustionem expertus, solidam ipsam substantiam contrahere cōstringereq; potest.

Litrum. Nitrum. Cap. 52

Litrum, Ostensum est & hoc medicamentum in medio salis & aphronitru uires habere.

Halos anthos, hoc est, salis flos. Cap. 53

Halos anthos, quidam diuidentes halos anthos nominant. Est autem hoc medicamentum liquidum, tenuius etiam quam sal ustus: tum acris qualitatis, & admodum digerentis facultatis.

Halos achne. Spuma salis. Cap. 54

Halos achne, spumosa est salis efflorescentia, multo tenuioris naturæ q; sal ipse: quare & extenuare & digerere multo plus ipso potest: uerum quod substantiæ est reliquum, contrahere ut sal nequit.

Asphaltum. Bitumen. Cap. 55

Bitumen, unum & ipsum est ex ijs quæ in aqua marina proueniunt, & in alia quapiam quæ non est marina: dissimilis, ut in Apollonia Epiri, et per alia id genus loca multa aquis sponte nascitur: ceu spuma quædam innatans hoc medicamentum reperitur: & molle quidem est dum innat, postea uero relicta cum pice sicca durius efficitur.

Bitumen

Bitumen proueniens in mari mortuo.

Optimū uero bitumē in mari quod mortuum uocant, prouenit. Est autem id stagnum salsum in Coele (hoc est caua) Syria. Ceterū medicaminis ipsius uis est tū siccatōria, tum exsiccatoria in secundo ordine. Merito itaq; eo utitur et ad glutinationes uulnerū cruentorum, & ad alia omnia quae exsicari debent cum modica exsiccatione.

Spongios, id est spongia. Cap. 56

Spongia uita acris est & digerētis potētis. Vtebatur ea praeceptorū meorum quidam ad sanguinis eruptiōes, quae manuali opera indigēt: in quē usum semper eam paratā habebat siccam & exarscā: cū uero res posceret, bitumine in primis imbuebat, sin eo careret, pice. Porro admouebat eam partibus sanguine profluentibus etiam nū ardentem, ut & crūsta parti induceretur, & ipsum spongiae corpus ceu operculum acciperet. Ceterum spongia noua, nō sicut lana aut linamentum (quōd μόνον τιλλόν, id est carpinatum uocant) materia duntaxat est quae humores irrigandos excipiat, sed etiam manifeste desiccet. Id quod scies, si ea utaris in uulnere cum aqua, aut oxycrato, aut uino, pro diuersitate uidelicet corporū, uti est an-

re dictū. Glutinabit siquidem ea similiter atq; medicamenta quae uocant enama. At si nō noua sit, sed usui accōmodata, palam cognosces quātum a noua superetur, si uulneribus eam imponas siue cum aqua, siue cum oxycrato, siue cum uino. Nec mirū est, cum in spōgia noua seruetur etiam nūm ea quam a mari accepit facultas, modice corpora exiccandi. Atq; hęc quidem praestare potest, cum etiam nū seruat maris odorem. Nā temporis spatium, etiam si nunquā usui accommodata sit, tamen & odorem maris amittit, neq; aequē desiccet.

Garus, uel garum. Cap. 57

Garus facultatē habet multum & calidā & siccam, ac proinde eo quidam ad ulcera usi sunt putrescētia: tum dysentericis ischiadicisq; iniiciunt.

Halme. Salsugo. Cap. 58

Salsugo pisciū salforum similiter garo & ad putredines accōmodat, et ad ischiadas dysenteriasq; infundit. Et acrimonia quidē humores coxā instantes attrahit, ac proinde per intestina euacuat. Putrescētia uero ulcera in dysenteria colluit atq; desiccet. Maxime uero salsugine salforū silurorū et mænidū ad talia usi medici quidā assolēt, et nos sanē ad ulcera in ore putrida accommodauimus.

CL. GALENI LIBER DE SVBSTITVTIS MEDICINIS

IVL. MARTIANO ROTA INTERPRETE.



De substitutis medicinis cum & Dioscoridē & Philistionem & Euryphontem scripsisse cōstet, nos quoq; pauca de his tradere non recusabimus. substitutas medicinas appello quae in alterius locū subrogari queunt. Has medicinas notas esse multum opis affert. euenit enim plerūq; ut ea medici desiderent quae ad salutem alicuius plurimum conferre iudicant, nec illa interim aduertant quae in eorum locū subijci possunt, quod ne contingat, medicinas omnes in unum contuli, quas uiribus easdem esse compertum habeam, idq; ideo feci, quo prōptum semper quibuscunq; in morbis conueniens remedium foret. Occasionem autem librum hunc cōscribendi nobis attulit id quod tibi Diogeniane uehementer

ista scire cupienti nunc referam. Alexandriae cum essem, mulier quaedam graui morbo periclitabatur, morbi causam explicare cū nihil interit, nūc opus non est. Huic opem allaturus lysimachiam herbam cum quaesuissem, nec reperissem, nisi statim Aegyptiae spinæ semine lysimachiae loco usus essem, perisset mulier, quae illo prope dato, suppresso sanguine, mox conualuit. Hoc factum medici pleriq; accedentes cum mirarentur, interrogarunt me, quid moriturae foeminae pro lysimachia exhibuissem, quibus ego, Aegyptiae spinæ semen cum respondissem, idq; in compluribus fieri posse dixissem, non destiterunt mecum precibus agere, quo ad medicinas quae in aliarum locū substitui possunt, unum in opus conferre promitterem. sic itaq; libellum hunc De substitutis medicinis composui, in quibus recēdendis quō magis expeditum usum haberent, seriem literarū seruaui, principiumq; ab earum prima sumpsit.

A	Origanum
Abrotono	Abrotonum
pro Absinthio	Succus lentisci
Acacia	Radix asari
Acoro	Aphroselenus
Amianto	Calamus odoratus
Agallocho	Euphorbium aut epithymi
Agarico	Anchusa

Aloe indicā	Āloes uiridis folia, uel glaucium, uel simus ibis, uel lycium uel centaurium
Alumine	Sals silis
Ammi	Anisus
Ammoniaco suffitū	Propolis
Ammoniaco sale	Cappadocus sal
Amomo	Acorus
Amylo	Pollen siccus

Amygdalis amaris	Abſinthium	Dauci ſemine	Sij ſemen
Anchuſa	Hyacinthus	Dictamo	Saluia
Aniſo	Daucus	Diphryge	Phrygius lapis
Araco	Sefamum	Dorycnio	Alterci ſemen
Ariſtolochia rotunda	Ariſtolochia longa	Dracontio ^E	Aron
Argemone	Seriphium	Ebeno	Loti arboris lignum
Armenio lapide	Attramentum indicum	Ebiſci radice	Folia mori
Asbeſto	Atarce	Elaterij ſucco	Eiuſdem herbæ fuccus
Aſphalato	Ericæ ſemen aut uiticis	Elleboro nigro	Papyri radix
Aſphodelo	Succus betæ	Enneaphyllo	Potamogiton
Aſaro	Zingiber	Epithymo	Colocynthis ſemen
Aſio lapide	Gagates aut fal ammo- niacus toſtus	Ericæ fructu	Galla immatura
Auripigmento	Sandaracha	Erini folijs	Stercus ibis
^B		Eruca ſemine	Eryſimi ſemen
Balauſtio	Malicorium	Erucis pini	Veſpæ cum cedria
Bdellio	Sphagnus odoratus	Erugine	Attramentũ metallicum
Bitumine	Pix brutia humida	Eryſimo	Struthium
Brutia pice	Pix in aceto ſeruſa	Euphorbio	Stercus colũbæ agreſtia
Buccino	Oſtreum	Eupatorio ^F	Chamaepitys
Bupreſſi	Blatta aut hiruſo	Fece uini uſta	Sandaracha
Butyro ^C	Lac bulum concretum	Felle cameli	Fel ſtellionis
Cadmia	Leucographis Aegyptia	Felle muſtelæ	Fel cameli
Calamintha	Menta agreſtis	Felle hyenæ	Fel perdicis
Calamo odorato	Sphagnus	Felle uiperæ	Fel ichneumonis
Canchri	Lauri bacca	Flore aris ^G	Squamma aris
Cantharidibus	Phalangia	Gentiana	Radix apij odorati
Capparis radice	Ericæ radix aut myricæ	Glycyrrhizæ ſucco	Mori fuccus
Cardamomo	Cyperus	^H	
Cafia	Cinnamomi dimidiũ	Hedera ſucco	Perſeæ fuccus
Caſtorio	Silphiũ aut agallochũ	Hedychroo	Amaracinum
Cedria	Ladanum	Hyacintho	Floſ iſatidis
Ceraunio	Leucographis	Hyenæ adipe	Vulpis adeps
Ceruina adipe	Anſeris adeps	Hyofcyamo	Cynosbati fructum
Cera	Faba freſa cum propoli cocta & trita	Hippuri	Aiuga
	Caprinum	Hyperico	Anethi ſemen
	Scoria plumbi	Hypocyiſtide	Acacia
	Sagapenum	Hyllopo ^I	Thymum
	Lapathi radix	Iriſſirica	Helenium odoratum
	Anthemis	lunco odorato	Cardamomum
	Semen coriandri	^L	
	Cinis foliorum oliuæ	Lapathi radice	Pyrethri radix
	Rhodoïdes	Lapide phrygio	Lapis argyrites aut pyrri
	Cafia duplum	Lapide apite	Gagates lapis (tes)
	Helionopium	Lapide pyrite	Lapis pyrobolos
	Viticis ſemen	Lauri baccis	Serpillum aridum
	Ricini ſemen	Lathyri	Granum cnidium
	Pix nauibus detracta	Lentiſco	Polygonij radix
	Moly aut ſymphytum	Lepidio	Rubia
	Cedri fructus	Lepidij radice	Folia capparis
	Anacardium	Lepore marino	Lepus fluuiialis
	Aphrodiſias	Lini ſemine	Fabarum fuccus
	Crocomagma	Loti ſemine	Betæ ſemen
	Agallochus indica	Lupi adipe	Vriſi adeps
	Canis marini adeps	Lyguſtico	Paſtinacæ ſemen
	Braſſicæ ſemen	Lylimachto ^M	Spine ægyptiæ ſemen
	Solani ueſicariæ ſemen	Magnete	Phrygius lapis
	Iuniperus magna	Malabathro	Nardus indica
	Carica combuſta	Malo cydonio	Meliſlotum
	Eringium	Malua	Fœnumgræcum
		Mandragora	Dorycnium
		Manna	Thuris cortex

325
Mastiche
Medulla cerui
Meliloto
Melle
Melle atticò crudo
Meo
Molybdena
Mori succo
Myrsinite uino
Myrobalano
Myrrha troglodytide
Myrti oleo
Myrsi cyprio
Myrsi tosto

N
Nardo syriaca
Napi
Nepita
Nucleis pineis
Nuçe pinea

O
Ochra
Ocympo
Ocymoide
Oenanthes succo
Oesypo
Oleo cicino
Oleo uetere

Oleo sabino
Olea lacryma
Omphace
Opobalsamo
Opopanace
Oryza
Ormino
Ornithogalli

P
Papaueris succo
Phu
Pice liquida
Pipere
Pipere albo
Polij femine
Polypodio
Polytricho
Pompholyge
Populi nigrae gemmis
Propoli
Pssyllio
Pumice
Pyrethro

Q
Quercus uisco
R
Rapa
Raphanino oleo
Resina pini
Rhodoide
Rosis siccis
Rhus syriaco

Lentisci succus
Vituli medulla
Lorus herba
Sapa
Mel despumatum
Myrobalanum
Lithargyrium
Rubi folia
Succus mori
Glaucium
Calamus odoratus
Mori succus
Ochra cypria
Diphyges

Iuncus odoratus
Rapae semen
Agrestis menta
Cucumeris semen
Cucumeris semen

Myrsi cyprium
Silybrium
Menta agrestis
Vitisgineus succus
Vituli medulla
Sordes ex palæstra
Ferufestum dupli cum
adipe fuillo
Cicinum
Hypocystidis succusa, ca
Galla immatura (cia
Gutta myrrhae
Lac fycamini
Farina hordei
Lini semen
Anthyllis

Mandragorae succus
Sphagnos
Opopanax
Zingiber
Nigri duplum
Erucae semen
Chamaeleonis radix
Absinthium
Cadmia usta
Sampfucus
Ladanum
Lens palustris
Terra cretica
Zingiber

Chamaeleonis uiscum
Heliotropium
Ricini oleum
Terebinthi
Sinopsis
Perseae folia sicca
Oxyacanthæ fructus

Rubigine
S
Sagapeno
Saluia
Salamandra
Sale ammoniaco
Sambuco
Sampfuchio
Santonico
Satyrio
Scamonio
Scinco
Scylla
Scoria plumbi
Scoria cypria
Semperuiuo
Sepiae testa
Serapiade
Serpillo
Sesamo
Sesamoide
Sinapi
Sifone
Sisymbrio
Solano uescaria
Sphagno
Spondyllo
Stercore uulturis
Stercore turturis
Stercore felis
Stercore muris
Stibio
Struthij radice
Succo carpassi
Succo peucedani
Succo rhododaphnes
Succo cyrenaico
Succo papaueris
Succo salicis
Succo fici
Succo panacis
Succo polygoni
Sulphure uiuo
Symphyto
Sori

T
Terra samia
Terra eretria
Terra alana
Terra ateri
Terebinthina
Thapsiae succo

Thymo
Tithymallo
Thure
Troxinis hoc est intubis
V
Verbenaca
Viola
Vino rhodio

Squamma ferri
Resina pini sicca
Calamentum
Lacerta uiridis
Sal cappadocium
Spinæ uiridis folia
Rhus culinarium
Abrotonum
Erucae semen
Ricini semen
Satyrium
Bulbus qui edendo est
Scoria argenti
Melantheria ægyptia
Lactuca
Pumex
Pæoniam
Potamogitona
Lini semen
Amaranthi expressio
Nasturcium
Anisus
Ocympum
Semē hortensis solani
Iuncus odoratus
Folia oliuæ
Columbi sterctus
Stercus columbi
Ichneumonis sterctus
Muscaram tantundem
Aeris squamma
Ellebori nigri radix
Succus myrrhae
Glycyrrhizæ succus
Viscum quercus
Syriacus succus
Mandragoræ succus
Hederæ nigrae succus
Succus mori
Lac fycamini
Succus plantaginis
Sandaracha
Centaurium
Lithargyrium

Leucographe ægyptia
Calx thebaica
Plumbago
Cimolia
Mastiche
Chamaeleonis nigri
succus
Satureia
Chamaeleon
Ampelitis terra
Lactuca
Chamaeleuce
Flos radiculae
Vinum austerum

Vino falerno	Vinum mendesium
Visco quercus	Chamaeleonis albi uiscum
Vulpis adipē	Vrsinus adeps
Vulturis stercore	Columbinū sterqus
Vua domestica	Pulpa dactylorum sy-

	riacorum
X	
Xylobalsamo	Radix uiolarum albarū aut lygustici
	Z
Zingibere	Pyrethrum

ARGUMENTA CAPITVM LIBRI, DE PURGANTIVM MEDICAMENTORVM facultatē, in quo probatur, uim propriū humorem attrahendū purgantibus medicinis inesse: non medicinas in humores conuertit, aut quēuis humorē à quouīs pharmaco ductū. Nam super-purgatio, ubi proprius primū medicamentō humor, deinde ut quisq; faciliōr eductū fuerit, excernitur, non medicaminis trāctione efficitur, sed meatuum debilitate atq; relaxatione.

Cap. 1. Quod Hippocrates & alij ueteres multas absurdas opiniones non reprehenderint, quoniam modesteiore adhuc seculo à nemine asserbant: & quod Asclepiades ac Erasistratus primum de medicamentis purgantibus improbe senserint. 2. Ratio qua suam tuta bantur opinionem Asclepiadā. Vide Galenū de facultatib. naturalib. lib. 1. & super Hippocrate de natura humana, sect. 1. comment. 28. 3. Quas occasiones considerare conueniat probe uacuatos. 4. Summa argumentorum Asclepiadarum Erasistratorumq;, ac eorumdem dilutio, exēplis morbi arquatū, atq; subtercutanæ aquæ: (de qua uide plura apud Galen. sect. com-

ment. 28. de nat. hom.) 5. Confutatio cuiusdam perperam pronunciantis de medicaminibus purgantibus sententiam. 6. Esse etiam pharmaca quæ sanguinem ciant & uacuent, quod probat historia supplicio affecti in Thracia, qui herba quadā data, quæ sanguinem uacuabat, homines occidebat. 7. Colligit ex effectu propria à medicamētis trahi: & multimodis exemplis ratum facit: ab ictero, hydropē, exāthematis, alopecia, inchoante elephante, & cancerosis affectibus, uertigine, epilepsia, melancholia, fluxuq; muliebri, & facris ignibus: quos morbos omnes conuenientibus cathartis curatos à se testatur.

CL. GALENI DE PURGANTIVM MEDICAMENTORVM

FACVLTATE.

IULIANO MARTIANO

ROTA INTERPRETE.

Vim propriū humorem attrahendū purgantibus medicinis inesse.

Cap. 1.



A mihi de causa prauas opinionēs uetustissimū medicū ireprehensas omisitse uidentur, qua & legū latores antiquissimū maxima scelera inulta reliquerūt. nam cū per id tēpus hominū malitia intra mediō Critatis terminos stetit, nec

quisquā aliū supremis iniurijs afficere, aut manifestissima quæq; impudēter abnegare auderet, & pacto quis uel nodū perpetrata castigare, uel nō adhuc dicta reprehēdere debuit: postea uero unā cū tēpore adauitā hominū malitia, cū neq; inausum amplius quicq;, neq; nō dictū inueniret, coacti sunt & legū conditores noua supplicia aduersus maleficos excogitare, & ueritatis obseruatores uarijs reprehensionū formulis sciolos coarguere, id quod in presentia facere nos quoq; decreuimus, eos medicos cōfutando, qui purgantibus medicamētis uim admittūt, qua humores q̄s euacuāt, ē corpore trahunt: quicq; uim aliā ipsi attribuant qua æquabiliter humorē quēcunq; attigerint, imutare dicūt, qua de re Hippocrates ne uerbum quidē id circo fecit, q̄ ea tēpēstate neq; Asclepiades uixit, qui tā impudēter loquēs ueluti in certa mē cōtra ueritatē descendit: neq; Erasistratus, qui tamen nō sine modestia, uerū tamē de purgantibus medicamentis caput euerit, cū a cūiā ma-

xime ac naturæ consuetam attrahendū uim nūquā suis in scriptis agnoscat, sed eius loco ea quæ uacuum cōsequitur inanitione uti maluerit. Pars est autem facultatis propria attrahētis uis ea quæ in medicamentis sita est, quemadmodum & illa per quam bilis & urina in sua receptacula deriuantur, compluraq; alia quæ non modo dum sana sunt animalia à natura, sed etiam per morbos, & dum ad sanitatem reuocantur cum à medicis, tum præcipue ab ipsa natura absoluuntur. Hippocrates itaq; cum nihil aduersus eos dixerit qui attrahentem uim ē mediō tollere gestiunt, quia auctores tam peruicaces quam postea plures, isthac opinio non habebat, æquum esse uidetur me de rei ueritate pro Hippocrate contendere debere, ac primum quid nam ipsi dicant commemorare, deinde peruerse eos sensisse commonstrare.

2. Est autē ipsorū oratio eiusmodi. Medicamentum omne cui purgandi uis inest, quemcunq; attigerit humorem in suam naturam conuertit atq; transmutat, nam flauam nigrām uel bilem facit id quod bilis est huius uel huius, ut ipsi appellant, eductiūm. Similiter pituitā, aquosamq; substantiā, quod uel pituita uel aqua eductiūm istorum uocabulo nuncupatur. Postremo, ut summatim dicam, cōmutatio est omnium qui in uenis sunt humorum, non unius alicuius euacuatio, illa quæ purgatio appellat, ut istorum oratio introducit. Verum si ita uultis, illud modo obijciemus, siue quis flauam, siue quis atram bilem, siue pituitam,

siue aquam educēs medicamentū sumat, omnes in uenis humores euacuari. atqui hac una in re so- lum distat purgare aliquē tali medicamēto & ei- dem sanguinē mittere, q̄ aperta uena quale prius inerat euocāt, purgante autē medicamēto non so- lum colore, sed etiam cōpage immutatū educif. Etenī & quæ aquā purgant, humida omnia & tenuiā reddunt, quæ in uenis attigerint, etiāsi cras- sissima prius fuissent, & quæ nigrā bilē euacuunt, crassa ac solida quāuis antea tenuissīma, uersa uicē faciunt. quam obrem quoties hunc purgare, il- li sanguinem mittere, uolemus, alio q̄ ad ipsam euacuandorum naturam respiciemus.

3 Quidam igitur aliud spectabimus, nisi cō- plures ad uenarū sectionē propensos, quosdā pur- gantibus medicinis aptos magis esse: quē admo- dū alij quiduis potius, q̄ uenas incidit, sustinerēt: alij abscidit membrū aliquod sibi potius q̄ medi- camentū exorberet tolerarent. aliquibus em̄ sum- pto purgante medicamēto uentriculus subuertit- tur, nō paucis id ipsum sine molestia facientibus. Hæc ergo respiciēs his sanguinē detrahemus, il- lis medicamentū exhibebimus, nō quæ Asclepiā dis sequaces putant contentos quidē in uenis hu- mores æqualiter omnes euacuari sanguinis missio- ne credēs, purgando autē nō omnes sed unū ali- quē, ac solū illum quē ducere existimā: unde & purgari sanguinē ab eiusmodi medicaminib. aiūt non euacuari, quemadmodum fit ad aperta uena: hæc uestra decreta nolitis uelitis, absurda sequun- tur. Subiungam autem ipsorum capita.

4 Asclepiadis sectatores aperta uena cōten- tos in uenis humores indifferēter omnes exire, in purgationibus nō omnes, sed quosdā eximi, san- guinemq̄ purū reddi hoc pacto autumāt. Qui ue- ro Erasistratū sequunt, uniuersos aiūt tam in pur- gationibus, q̄ sanguinis egressū pariter euacuari, undeneq̄ purgare re uera quicquam, sed cum im- mutatione quadam, & euacuandorū corruptela, inanire dicūt. Atq̄ cauillatores hi omnes mihi si- ue medicocriter, siue magnopere impudentes in certamē procedant: ac mecū ueluti in stadio con- tendant, nō uerbis, neq̄ prolixis nugis, sed operi- bus, ad quæ ipsos hac in populosissima urbe, pro- uoco, in qua quotidie penē innumerī morbo re- gio & aqua inter curiē laborātes inueniri possunt, siquidē mihi de his primū sermonem facere satis erit. Ducat aliquis ad me quēpiā sine febre cui in uniuersū corpus amara bilis redūdarit, spectetq̄ post aliquot dies cū hominē preparauero, mihiq̄ iam tempus instare usum fuerit exhibendi medi- camētū alicuius quod bilem expurget, quo pacto naturalem corporis habitū eiusmodi purgatione ipsi restitūā, etiam si nondū extrinsecus quicq̄ ad mouero. Hæc ipse non semel bisue, sed sæpe ad- modū, semideprauatus quibusdam ostendēs, mul- tos ad meliora reuocauit, neq̄ tamē in eam senten- tiam hæc dico, ut te pessime cauillator testibus fi- dem adhibere uelim, spectes ipse cū uolueris uni- ca ex purgatione morbo regio laborantem pristi- num colorem accipere, cumq̄ hoc factū uideris,

A audebis lepidū caput in coronis hominum præ- conis instar, uocē attollere, ac discipulis tuis pro- lixas nugas quales sepe deblaterasti intonare. nō detrahi quispiam certi ab ullo purgante medica- mento: uerum quicquid in uenis repertum fuerit qualecunq̄ sit, in id mutari in quod uirtus medi- camētī ipsū cōuertere suapte natura ualet, atq̄ hic qui nūc est arquoato morbo liberatus, nō bile- ducta, sed euacuatione tantum facta conualuit. Videre itaq̄ quo pacto aliū ego ita affectum uel secta uena, uel alia data purgatione iuuabo. Hæc cū assereueris ipse, deinceps mihi ē duobus arquis tui sanguinem mitte, alteri purgationem ali- quam porrige ex his quæ cæteri omnes nigram bilē euacuare, tu uero nō euacuare sed gignere it- dicas, atq̄ si ægro tū subleuabis, aut pallorem de- cute eijcies, me tibi omni supplicio deuinctū tra- do. sin autem non modo quicq̄ non profeceris, sed hominem in extremam perniciem egeris, ad meliores sententias redi, & Hippocratis artem se- quare. Ac de morbo regio laborantibus hæc te- nus: nunc ad aquam inter cutem habentes transi- tu facto, confidera rursus, hunc quoq̄ nō eodem modo sanguine missio, & medicamento quoda- quam detrahit exhibitio affici. nam si nō mōstra- uero aquā aqualiculo cōprensam medicamento euacuari, tum antiquā opinionē cōdemnes licet, quæ non gigni ut tu putas medicamēto, sed ē cor- pore trahi eiusmodi humorem affirmat, ac de no- bis tuo modo decerne. Sed profecto si quod nigrā aut flauā bilē educit dederis, uētris tumorem nequa q̄ minues, atq̄ ita ut singulū quodq̄ medi- camentū propriū quendam humorem ē corpore trahat apparet. tu uero si omnes eodem modo im- mutari persuasum habes et medicamētī opus cō- munem euacuationem credis, uenam adaperias licet. Hæc si quis apud Indos scribens accerferēt, difficile esset ipsum redarguere: nunc autem cum singulo quoq̄ die à nobis conspiciatur, atq̄ ad ip- sam ex operibus redargutionē accerferet, nescio cur blaterare nō erubescatis. Nolo autē nūc cōme- morare ut ipse, q̄ plurimos regio morbo laboran- tes unica purgatione, flaua bile detracta libera- rim, multorū em̄ hac de re testimoniū extat. q̄ si impudētissimi isti cauillatores uniuerso populo nō credere se fingunt, rem ipsi quouies uoluerint, intueantur. Sed quid ego dico intueant: ostendi enim iam sæpenumero hoc ipsi.

D 5 At nescio quem memini tales nugæ respō- disse, non unum aliquod humoris genus à singu- lis medicamētis trahi, sed simpliciter unū quodq̄ ipsorum trahere, uelut fugentia solent: atque hac tractione in humoribus tenuissimos primum, deinde in corpulētos magis, ultimo crassissimos etiam extrahi. medicamentum itaq̄ cuius uis ce- leriter euanescit, a quo fa deijcere, cui amplius du- rat, flauam bilem educere, & nigram quæ cun- que ambobus robustiora fuerint. Hunc sodales cum sapienter respondisse iudicassent, acclamarunt. at ille cōcitato gressu me relicto discessit, probe no- scens, opinor, si mansisset, se à nobis confutatū iri.

postero autem die libellum in quo tam temeraria responso refellebatur eius affeclis porrexi, neq; postea ipsis etiam tanta in existimatione amplius fuit, cum nostras obiectiones diluere nesciret. erat autem hae eo in libro scripta. Heri tu quidem disceptionem subterfugisti similis pugili, qui antea q̄ luctet, coronam rapit & aufugit: hodie uero quin redarguaris subterfugere non poteris. consequer enim te libellus iste qui in manus tuorum sodalium incidit. neq; em̄ minus cum illis quam tecum sermonem instituit, qui nunquam antea te ulla in re prorsus attrahentem facultatem concedere audierant, & heri quaecumq; in uenis continentur in differenter medicamento trahi consistentem audierunt. par quippe fuit ut non modo dictum hoc tuum non admirarent uel prorsus laudarent, sed prodidisse etiam causam tuam te existimarēt. nam quo pacto urina & utraq; bilis in sua loca descendant, aliaq; permulta in corpore fiant, longo sermone frequenter exponitis, quiduis potius concedentes quam unumquodq; corporis membrum facultatem quadam a natura insitam habere, qua sibi convenientia adducit atq; rapit. nunc autem non modo quorundam, sed indifferente omnium attractione esse dicitis. quod profecto longe maius est q̄ certa quaedam attrahi concedere. siquidem ut facultas quaedam animantibus inest qua aliena a se repellunt, sic aliam qua sibi convenientia trahunt, unicuiq; corpori inesse probabile omnibus uidetur, nondum hanc uestram sapientiam edoctis. At omnia siue cognata, siue contraria quippia ex equo ad se trahere, ratione nullam prorsus habet, atq; ita non solum attrahentem uim coefferes, uerum etiam quod multo deterius est, non aliqua solum, sed omnia indifere trahi fateris, idcircoq; mihi non tam a tuis discipulis extollendus q̄ expoldendus uideris. Caeteru purgantibus medicamentis manum te nunquam admouisse, ac uulgarem quaedam, medicinae q̄ imperitum esse, paucis monstraturum me confido. Quaecumq; nigram bilem purgat, statim a principio eam educunt: differunt tamen inter se purgationes eo q̄ liquidiora primum, deinde corpulenta magis semper euoluunt. idem in euacuantibus pituitam & flauam bilem euenit. trahunt namq; medicameta omnia in primis quide sibi obnoxia liquidiora, deinde crassiora etia, non tamē, ut tu putas, primam matellam quispiam aquosis replet excrementis, secundam flaua bile, tertiam pituita, atq; ita tandem nigra bilis egerit. qua de re, patet medicamentum ante omnia suum quodq; humorem elicere, quem commitantur aquosa excrementa. redundantia. Hoc aut tibi nunc spectare, si nunq; antea, licet aquosa & biliosa plurima, medicamentibus ad id faciētib; purgatos homines emittere, at nigra bilem deicientibus, simul omnia pauca esse. oportebat autem, si tibi constare uis, ab hisce medicamentis quae atram bilem expurgant, plura semper educi, pauciora uero ab euacuantibus aqua & bilem detrahi, cum ad fortitudinem & imbecillitate medicamentorum, speciem eorum quae euacuantur

A distinxeris. sic itaq; atram bilem euacuantia quonia ipsa reliquis fortiora constituisti, q̄ plurimum euacuabunt, & primum aquosa omnia, deinde bilem, postea pituita, demum atram bile. Debilia uero medicameta aquosa tantummodo subtrahere poterunt, quoru tamen cum nihil fieri appareat, sensus ipse tuum sermonem confutat. libet tamē in terea ex te scire, si inter exeundum corpulenta semper ad tenuia consequuntur, cur nigra bilis ante sanguinem exeat, praesertim cum sit eius uelutis edimentum, qualis in uino fax est;

B Sed quares forsitan & tu, num aliquid medicamentu statim a principio sanguine educens inueniatur: inuenis sane, o bone, nec eo quisquam inuenito uteret. quomobrem inquires fortasse; quia hoc iugulare non purgare homines foret. na quae purgant purgantia passim idcirco nuncupantur, q̄ sanguinem ab antedictis humoribus puru constituant. atqui nemo est adeo imprudens medicus, ut uniuersum sanguine euacuare, reliquos autem humores intus ommittere uelit. quare medicamenta quae per uenas intestinoru & uetris sanguinem deiciunt, uenis admuerant. Consentaneu aut erat, si modo quae doces uera sunt, neque haec primo sanguinem euacuare. quibus aut nominibus eiusmodi medicameta nuncupent, etiam si constanter scirem, literis comendare nolum. illud tamen quod in Thracibus Bithyniam incolentibus, me adhuc puero contigit, sine periculo cuiusquam dici potest. Inuenit homo quidam herbam, quam si quis assumpisset, sanguine primo, tum uita emittebat. multis itaq; hoc pacto morientibus, cum facinus hoc diligenti inquisitione dignu arbitrarentur, ueneficum comprehendunt, & ad gentis magistratum ducunt. is cum non solum homine necare studeret, sed & si quis alius herbam aut didicisset ab ipso, aut docuisset ipsum, a nullo se quidem ipsam didicisse ueneficum asseruit. uerum in suburbano cum aliquando suillum iecur deferret, urgete ventre, super herba quadam iecur deposuisse, qd aliquanto post cum sustulisset, uidisse ex uniuerso iecore sanguinem sanie ad herbam confluere. ex hoc coiectura facta corpori sanguine ea detrahi posse, periculo mox in obuio quodam facto, ut uerū coepit, quod fore speraret, ad malos usus herbam deinceps transfulisse. se tamē alicui alij eam monstrasse negauit. haec ueneficus ille diu inter quaestiones habitus retulit. Populi uero magistratus, cum plura illis in locis nasci haec herbam ex rei dictis accepisset, uinctis oculis ad supplicium ipsum duci iussit, ne cui inter eundem herbam indicaret. ex his ergo lepidu caput multa medicameta ea uim habentia, ut sanguinem a principio statim eliciant, inueniri constat, reticere aut ipsa melius est, quae admodum & alia uenena tacent quicunq; ratione aliqua praediti sunt: quanquam & haec olim nonnulli abunde docuerint, miram quandam ueram diuersaru misuram ostendentes, ac qua uia quodq; uenenum conficiatur, scribentes: qui mihi cerebrum non habuisse uident, quemadmodu & uos, si me interrogetis quanam sint sanguinem educentia.

7 Sed ut unde digressa est, eo rursus nostra redeat oratio. Qui humores omnes ex aequo trahi, & primo liquidiora, tū alia excerni asseuerat, propriam causam prodit, cum attrahentē facultatem rebus in esse fateatur, quā eius socij impudēt abnegant, & de bilis ac urinā secretionē, deq; distributionē ac alijs huiusmodi, aliena dicere sustinet. Insuperq; cōtraria his que apparent ponit, uelut paulo ante mōstrauimus. nam si uerum est quod discendum proponunt, quæ educentur medicamentō nigrā bilem euacuante, plurima erūt, quæ ab aquosum incrementū purgante, pauca. At milies si modo artis opera inspicere uelis, ostendam tibi perditē ueterator, aquosa purgantibus, plurima; nigrā bilem euacuantibus, pauca semper incrementa desijci, ac nigram bilem statim inter inētia extire. Qui ergo omnes humores ē uenis æqua biliter duci asserit, stolidus hæc tenus et imperitus est: qui uerō immutari dicit, in eo quod nullum discrimen faciat, inter sanguinem mittere, & bilis medicamentum regio morbo laborātī exhibere, et num aquam inter cutem habenti uenā aperiat, an medicamentum aliquod aquā educens porrigat. Deinde non sunt turpia eiusmodi: Num merito deridet uulgus, dum talia inter se discēptātes medicos audit? Num omnes sermonem talium damnant, & utcunq; quid dicāt, uerbis tenus medicos ipsos appellāt? nam quod semper dicere solitus sum, id & nunc tēpestiue dixero: imperitum quenq; effluxura caustillatoribus meliorem esse. nam si nulla alia in re præstet, cōmunes saltem animi notiones admittit, quas isti longa consuetudine deprauati negant. Nuper itaq; homo quidam mini me stultus cum pustulę ipsi toto ē corpore subito erupissent, ulcerosæ & male coloratę, medicū adiuit, rogans se quam primū purgatum iri. at eo sanguinis missionem potius iubente, nō infans, inquit, uerisimile siquidē est una cum prauis bona quoq; effluxura. cæterū qui omnia potius q̄ uerba Hippocratis uera esse uolunt, cōmunes animi notitias uincēdi studio tollūt, nobisq; ac si me dilaniare uellent insilium, atq; ipso rerū euentu postea redarguti, egre ferunt. Aequum aut fuerat, ut quæ admodū nos sustinemus & docere conamur eos, qui Hippocratem in his quæ nō intelligunt calumniantur, sic & ipsi rationes contra se factas

A tolerarent, docētesq; plurimum, si fieri potest, diligerent, aut si id fieri nequit, odio penitus nō haberēt, ueluti nuper medicus quidā efusmodi demētia præditus, is simul atq; nouit me sola purgatiōe cōplures à desultuio capillorū alopecia dicta liberaisse, ilico prosequi me odio cœpit. Item alius, cum incipiēs carcinoma, quosq; elephātes appellat, & depascētia, multaq; alia ulcera curatu difficilia sanassem: et alius quia solis purgationibus uertiginē patiētes conualescere feceram: & adhuc alius, propterea quod infantēnes, comitiales, melancholicos, & insuper non paucos ditino capitis dolore uexatos purgando tantum liberaassem, ut & coxendices et longis dolorib. alijs in partibus infestatos, atq; hunc nuper quem tanquam colo uexaretur, tribus iam mensibus medici tractauerāt in peius quotidie abeuntem: hunc ego omnia quæ illi imposuerant abijcere iussī, ac solis purgationibus sanitati restitui. Muliebri fluxum præterea nobilis cuiusdam Romanæ matronæ, ita hæc arte suppressi, ut & multas alias ignobiliores fœminas nō solum ab hoc morbo, sed etiam ab alijs uteri ægritudinibus exemi. Quid uero me cōmemorare opus est, ut nullū remediū sacro igni, *φυσικήλαττ* Græci dicunt, efficacius adhibeatur q̄ bilem expurgās: nullum magis aduersum, q̄ pituitam educens. Diem hunc totum contererem, si q̄ admiranda opera purgantibus medicamentis absoluātur, referre uellem, quæ tamē istos ignorare uerisimile est, artem tractandi medicinas expurgantes nunquam edoctos, nam cum nec quicquā extare penitus arbitrent, quod purget, quo pacto, uel quibus in morbis purgationibus utendum, uel quo modo intelligēt: hæc de causa quamplures sola experiētia ducti ægrotaantes medicantur. nostri autē isti sapientes qui rerum rationes tractant, nō quod aliquid experiētia inuentis addant, sed ut eam subuertāt, longe perniciosius his qui solo usū nullaq; ratione ducunt, medicam rem exercent. cæterum horū omnium principium atq; fons unus est, conceptum aduersus Hippocratem odium, ex quo ceu fonte cum alia multa absurda manant, tum præfens hoc consilium, uim attrahentem abnegandi, cuius pars, si uespecies, aut quo quis alio nomine appellare uelit, purgantis medicamenti facultas est.

ARGUMENTA CAPITVM LIBRI, QUOS PURGARE CONVENIAT, & quo tempore,

Cap. 1. Sanos integre hand esse curandos. 2. Sani, ualitudinarijs tamen proximj, uacuandi sunt. Quos morbos purgationibus sustulerit. (Vide lib. 6. aphor. comm. 47.) 3. Quæ legitimam purgationem antecedere debeat. (De præparatione ad ueratū, uide etiam aphor. lib. 4. comm. 13. & Epidem. lib. 6. sect. 1. comm. 7.) De nominib. & q̄ his qui angusto sunt pectore nō conueniat. 4. E quibusnā uacuandi ratio sumēda sit. De purgationibus in hydropē & ictero. (Vide lib. 1. de feb. ad Glauconem. De temporum ratione Hipp. aphor. 4. sect. 4.) 5. Cura horum qui iam ualitudinem aduersam inciderunt. (De cōsuetudine expectanda, uide lib. 1.

aphor. 22. & de turgentib. morbis, lib. 4. aph. 10.) In morbo acuto non facile purgandum. De pharmaco diacolycoynthidos, de quo uide etiam super Hipp. de ratione uictus in morbis acutis, lib. 2. comm. 11. 6. Cathartico sumpto sorbendum esse pisanā cremorem, non amplius autem purgatione iam inchoata. 7. Cur inter dum propinato pharmaco alius nō deficiat. 8. Quid miscendum sit cathartico, quo minus lædant uentriculum (uide Galen. de rationib. in morb. acutis lib. 2. comm. 11. & 12.) & quod inæqualiter, id est alia citius, alia tardius purgantia, commiscenda non sint.

CL. GALENI QVOS PURGARE CONVENIAT, QVIBVS MEDICAMENTIS, ET QVO TEMPORE, LIBER.

CAMMENTIS, ET QVO TEMPORE, LIBER.

IVLIANO MARTIANO ROTA INTERPRETE

CAPVT PRIMVM



VI sano corpore sunt, si purgētur molestias sentiūt. nam & uertigines, & tormina patiuntur, & egregiū purgatio succedit, & cum hoc etiā celeriter exoluuntur. causa autē horum omnium medicamentū est, quod cum sibi obnoxium hu-

morē educere cupiat, nec ipsum reperiat, sanguinē & carnes colligat, ut ex eis qđ suū est eliciat.

2 At sani quidem adhuc, sed nisi euacuatī fuerint, & egrotaturī, praeueniendi sunt, & ineunte uere inaniti, uel misso sanguine, si multitudine, uel per purgationem, si humorum corruptela, morbis capi soleant. Nos etenim podagram & articulorum dolores inter initia tamen, qui non adhuc circū articulos nodos fecerāt, eiusmodi euacuatione complures annos inhiuimus, non paucos insuper, comitiales, artonitos, melancholicos, & huius generis alios diutinos affectus, quo diximus modo, euacuando sedauimus. Multis itaque pituitam, alijs amarā bilem, quibusdam nigram, non paucis aquosa excrementa, ad impendentis morbi essentiam, expurgare conducit. Velut ecce melancholia quidam, nisi purgatus fuerit, singulo quoq; anno capitur. hunc purgo non solum uere, sed autumnō etiā. Item foemina quādam cancrum in mamilla quōdam habentē quotannis aduentante uere similiter euacuo, quam ad sanitatem reuocauī, usus medicamentū nigram bilem ualidius subtrahente. Hæc si quando assumpta purgatio non fuisset, dolore mamillam sentiebat in alto infestari, quin & incipientem elephantiam misso primū sanguine & per purgationem in alio sanauī. deinde huic quoq; unica purgatio in singulos annos sufficit, quæ intermissa morbuū statim reuocat. Atq; hoc genus ægritudinum, nigros humores subduci postulat, comitiales autē, artoniti, quiq; ægre spiritum ducunt, pituitosos. Velut articularū dolores si multo cum calore infestent, amarā bilē, sin tumeant frigeantq; pituitū extrahi uolunt, alius quidā æstiuo tempore febre tertiana semper corripiebatur, qui multos iā annos febrem non sensit, nostro consilio decedente uere flauā bilem antea subtrahendo. hoc em̄ tempore id genus homines inanire melius est, quē ad modum comitiali & articularū morbo laborantes, & melancholicos, ac quicumq; humorū crassitie in morbos incidunt, inchoante uere.

3 Oportet autem prius quā purgans exhi-

beamus medicamentū crassos humores attenuare, tenacesq; dissecare, & meatus recludere, per quos traici atq; deduci queant, si purgatio succedere debeat, cum in reliquis omnibus, tum præcipue in elleborum assumptibus. Vis enim medicamentū lancinatoria cum humoris affectis membrīs altius inhaerentes excutiat, & ob hoc longis morbis profit, facilius opus surum absoluit, prius attenuatis humoribus, quod qui negligenter, molestas obibunt purgationes, hoc est non sine torminibus, interdū & uertigine quadam, multaq; nausea, malo pulsu, exolutione, & difficultate. Elleborum itaq; sumpturi naturam prius experiri debemus quo modo illa se habeat ad supernas expurgationes, eas dico quæ uomendo fiunt. Experimur autem si quæ uomitum medio criter prouocant exhiberimus, qui enim facile hoc pacto nō purgabitur, hic nisi præparatus ad elleborū agendus non est. præparatur autem cum uomitu ipso sæpius factū, ita eo qui elleborum accepturus est uomere promptius assuescēt, tum melius etiam, si corpus humidū antea faciemus. Humet autem corpus partim multo cibo, partim quiete, ac quietem quidem istud facere nemini dubium esse potest: quando ut exercitatio membra exsiccat, ita quies cum uacatio quædam & exercitio contraria sit, humiditates conseruet: at cibus quātis læge ingestus non omnis hume erat, sed is qui uehementes qualitates non habet, hoc est nec falsedinem, nec acrimoniā, nec amarum, aut acerbum sit. Nos itaq; acetum multum aliquando bibendum exhibuimus, in quo ellebori albi ramusculos per integrum diem ac noctem raphanis infixos dimiseramus, effectq; hæc ellebori leuis expurgatio, ceterum qui solidum thoracem habent, & ictero compressum, ad euomendū ineptissimi sunt, cum alijs uomere facientibus, tum præcipue ueratro. Vasculum enim aliquod ex his quæ respirando usui sunt, disrumpent.

4 Conuenit insuper amarā bilem per superiora, pituitam per inferiora fecernere, quāuis interdum cōtrarium facere oporteat, si in uentriculo pituita, in intestinis aggelita bilis consistit. nā atra bilis per inferiora semper est eijcēda. Quod autē ad anni tēpora attinet, in Aphorismis Hippocratis scriptū est, æstate superiores, hyeme inferiores uentris partes medicamēto purgandas esse, & regiones calore frigoreq; distinctæ ad anni tempora æstimari debent. Idem est & in ætatis sentitendum. Consuetudo quoq; haud parū euacuationis modum ostendit: nam qui assuescunt uomere, per superiora purgari facilius tolerant, non assueti pericuum subeunt, præsertim si elleboro

boro purgentur. Morbi præterea genus spectandum crit, is enim cui solida corporis particula in pituitam resoluitur, Græci hunc *ὑπόφρον φλεγμονή* appellant, et medicamento pituitam educente, ac primo quidem per inferiora, deinde per uomitum, postremo per nares & palatum. cum enim noxius humor in uniuersum corpus redundat, omnes euacuationum species admoebimus. At aquam inter cutem habentem, quippiam aquam detrahens offeremus, uelut regio morbo laboranti, aliquid quod bilem educat. nam & his multifariam bilem euocare opus est, sursum, deorsum, per urinæ meatus, per palatum, & nares. eodem modo si bilis atra supra modum excreuerit, ut in melancholia, cancro, elephantiasi, aliquid quod nigram bilem detrahat exhibemus. nam comitales, pituitam inanientibus expurgamus. Ex his itaq; planum est, morbi conditionem ostendere, & humorem euacuandum, & locum per quem educere ipsum conueniat. Deniq; inflammationem habentibus in iecinore, simul atque maturuerit, alium subducemus cum in simis iecinoris partibus ea incubuerit. at si in gibbis extiterit, urinam ciemus; idem & in reliquis spectabimus, humorem exuberantem & locum humore infestatum ex quo tanquam causa, uis morbi confurgit: hæc enim & quid euacuandum, & quo modo, & qua parte euacuandum indicabunt, & ad hæc omnia tempus etiam monstrabunt. si quidem inter initia morbi, tenues & aquosos humores euacuabis: ubi crassi & tenaces fuerint quales suapte natura sunt pituita & nigra bilis, concoctionem expectabis. Accessiones quoq; quo modo euacuandum sit doceat. nam dum accessio infestabit, à superioribus educes; ubi defuerit, quod intermissione dicimus, ab inferioribus trahes; Nam & quæ sua sponte prodeunt, hoc modo prodire solent. multis enim per accessiones uomitus excitatur, et sanguis è naribus stillat, non paucis intermissione facta lotium & aluus fluit. præcipue uero quo tempore accessiones & iudiciales dies adueniant, obseruandi erunt, si quando per inferna purgare molieris. nam si ad superiora humores inclinauerint, purgantibus medicamento efficacia impediatur.

5 In his autem qui iam ægrotant, si diuturnus fuerit morbus, expectanda semper erit concoctio: si breui solouendus, inter initia, si modo à cocitatis pendat humoribus, purgare licet. At eo quod quæcumq; purgant latentem caloris excitandi potestatem habent, & febris ut febris est, & secundam suam rationem, non sicca neq; calida, sed hisce summe contraria, humida frigidaq; requirit. non igitur febris gratia feruida qualitate medicamentum, illam enim nos quoq; quantum in ipsa est, lædi scimus, porrigimus: uerum ut humores febre excitantes extirpemus. utilitas itaq; maior esse debet molestanti humore detracto, quam nocentem ab expurgantibus necessario corpori illatum. utilitas autem maior obueniet, si & quicquid lædebat, & sine molestia detractum fuerit. ut autem hoc fiat, ante omnia considerare oportet, idoneus ne sit ad

Galen.

A eiusmodi purgationem qui morbo laborat. etenim qui crudis, multis, tenacibus, & crassis uesci consueuerint, quicq; præcordia tensa & inflata habent, uel eximie calida atq; feruentia, aut in uiscerum locis inflammationes sentiunt, omnes ad purgationes sunt inepti. Hæc itaq; abesse oportet. nam quoad fieri potest, ægroti humores ad fluendum paratos esse se conuenit, hoc est tenues minusq; tenaces, ac meatus per quos traiciuntur apertos esse. hæc enim nos quoq; antea facere moliemur cum aliquando purgare uolemus. In acutis uero morbis si statim inter initia primo die uel non ulterius secundo, purgatione uti uelimus turgente materia, huiusmodi præparationi locus non est, nisi quis forte nactus fuerit occasionem aquam multam incōmistam exhibendi, in qua hyssopum origanum uel aut tragoriganum uel pulegium uel quippiam aliud attenuans incoxerit. quocirca raro in acutis morbis, modo ratione adhibeamus, ab initio nobis medicamenta usui erunt, cum neq; affligentes humores plerunq; concitati sint à principio, neque, si hoc adfit, ægrotus aptus sit purgationi, uel se præparandi tempus idoneum nobis præstet. concitari uero & turgere humores dicuntur, cum motu uehementi agitantur, ac ab uno loco ad alium confluentes inter principia morbi hominem uexant, doloresq; ac titillationes afferendo ægrum quiescere non permittunt. Hos ergo humores euacuare conuenit, in motu, agitatione, & fluxu positos. qui uero aliqua in parte corporis confederent neq; ullo alio auxilio neq; medicamento prius mouendi sunt, quam concocti fuerint. tunc enim & naturam euacuationi adiutricem habebimus. hæc enim simul atq; concoxit, humores excernere atq; superflua reserare conspiciuntur. quo tempore iudicatio morbi quoq; quam crasim appellat, celebratur. uerum quoties natura euacuationem absoluti, nulla opus est medicina. cum autem ipsam mediocriter ac lenius peragat, quod deest medicos supplere conuenit. Illud uero non ignorare par est, raro euenire ut ab uno membro ad aliud humores confluant, sæpius accidere, ut aliqua in parte quiescant, ibiq; concoquantur toto morbi tempore, quoad usq; soluantur. cum ergo non solum morbus acutus fuerit, sed etiam maxima cum febre, cauenda est purgationis exhibitio. præcipue cum ægrotantis natura nobis incognita fuerit. alij namq; difficulter purgari solent, alij modica medicamenti portione ebibita, copiose soluntur. cum ergo febris uehemens non fuerit, ægriq; naturam noueris, medicamentum dabis elleborum nigrum aut aliud simile quippiam quorum est etiam diacolocynthidos appellata confectio, quam nunc usitato nomine hieram, hoc est sacram appellant. hæc cum uarie conficiatur, que ueratrū assumplit, nec scamonium habet, medicamentum est eximie purgans.

6 Post assumptam uero purgationem statim hordei puluerem, hoc est præsanā sorbere esse fit, ut Hippocrates inquit. nam purgas medicamentum ut exiguum etiam fuerit, in fundum uentriculi descendat oportet: in descensu uero & stomachus, & quicquid circa uentriculū summum est, non solum medi-

tom. 5

p

camentū

camenti qualitate sed etiā substantia inter deglutendum appulsā inficitur & magnopere læditur. quare utile est hordei, hoc est prisanā succū deinceps sorbere: propterea quod abstergere & inferius trahere potest id, quod trāseundo se meatibus implicuit, & temperare atq; immutare medicamenti qualitatē, quæ mēbris insedit: ob hæc igitur Hippocrates iubet ab assumpta purgatione ægrotos hordei pultriculā hoc est prisanā statim bibere, nō tamē eā dare cōsultat, cū purgatio fieri incipit, timens ne purgationis opus dissoluatur.

7. Quamuis interdum data purgatione alius nō egerit, uel ob ægrī naturam eiusmodi, uel quia quod purgare debet exiguum fuit. plerunq; etiā stercus densatum atq; in aliquo intestino exiccātū, quod per clysterē subdici potuit antea quam medicamentum exhiberetur, euacuationem prohibet. potest insuper natura ad urinā uergēte purgatio nihil efficere. Interdū quoq; cum euacuatio frustratur, præter hoc quod nōcūmētum aliquod corpori non adfert, in nutrimentum etiam transit. interdum tamen in perniciē & uenenū mutatur.

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI AD PISONEM,

De theriaca.

Cap. 1. Præfatio ad Pisonem, uirum quidem è magistro, sedulo tamen & cupide cum in philosophorum, cum medicorum scriptis uersatum, à quo etiā hic ipsum commendat. Pisonis filius abscelso peritonæi laborās à Galeno curatus, non sine magna cura & diligentia patris. 2. Commendatio & usus theriaci antidoti, & quibus modis probetur: à multis enim adulterari. Magister stratus in fontibus theriacā experti: quomodo ipse eam expertus sit. 3. De imperatoribus Romanis theriaca usis: eorum q; commendatio, qui suos non alijs modo rebus, sed etiam medicamentis communicatis demereri & iuare uouerint. 4. Non temere & casu theriacam antidotum inuentū esse, sed ratione: de qua per digestionem pluribus agit contra Empiricos. Ratione enim uel sola, uel unā cum sensibus, tum simplicia rectē usurpati, tum composita misceri. 5. De purgantibus medicamentis. Contra Asclepiadem dicentem non humores à purgantibus, quales prius erant, euacuari: sed tum primum ab ipsis mutatos. 6. Ratione simplicium pharmacorum uires differentiasq; cunctas reperiri: Vt, quædam una quædam ui propria agere: quædam etiam mixtas & cōtrarias sibi possidere facultates. Quædam hominibus uenena, alijs alimenta esse. Quædam unum peculiariter membrum iuare aut lædere: addit autem exempla singulorū. Hippocratis uerba de simplicium remedium cognitione triplici, facultatum, usus, & apparatus. Quod idem pharmacum alios aliter afficiat. Sunt enim quidam philosophi, alijs misopharmacii.

7. Simplicibus ante cognitio ratione ueteres composita machinatos esse, inter quæ maxime sapientissimèq; theriacā: De compositionum causis & scopis. Nihil inter tot tantq; hominum mala grauius esse uenenis & mortibus, quod subito opprimta declinari nequeat.

Historia & stragegema de serpentibus ollæ inclusis, instar telli in Romanorum castra trāscētis. 8. Antiquissimam esse theriacam, & semper studiosè ambitiosèq; à medicis locupletatam, donec Andromachus Neronis medicus uiperarum carnes ceu manum extremam operiam absoluto addidit, à quarum cōmixtione, nō mor-

8. Cum uero medicamenta omnia quæcumq; purgant, uentriculum lædant, & maxime eius ostium, quod neruis quamplurimis constat, & acute sentit, excogitatum est beneolentia purgantibus admiscere, ne sola atq; sincera eorum uis ostium uentriculi attingat. oportet autem admista semina talia esse quæ & medicamenti malitiam retundere possint, & eius opus impedire nequeant, quæq; attenuare & incidere ualeant, ut et crassos humores secare, & uias per quas educi debent aperire & patefacere possint. oportet præterea ut commista sibi inuicem medicamenta consentiant, neque ulla in re discrepent. discrepant autē non cum hoc bilem, ut ita ponamus, illud pituitam trahit: utraque enim pari modo euacuari possunt, uerum si hoc celeriter, illud tardius ab assumptione, purgatione incipit: ita nanque inæqualis euacuatio fit, quæ uis simul accepta sint. inæqualem autem euacuationem dico si cum hæc desuissit uideretur, euacuatio alia rursus incipiat.

do quod ad uirulentorum morsus ualeat, nomen indicium uideretur. 9. De usu & compositione theriaci phar maci, elegia Andromachi, quæ etiam libro 1. De Antidotis habetur. 10. Cur solæ uiperarum carnes, nō ullius serpentis, theriacæ miscantur: nempe q; omnes reliqui ali quid præ uiperis maligni habeant, quod induritione probat, basiliscus, druiuo, hamorrhō, dipside, acontia, & aspidibus descriptis, cū historia mortis Cleopatæ ex aspidis ueneno, & damnatorum in Aegypto, quorum pectori aspides admoventur. 11. Cur capita & caudæ uiperarum præcidantur, reliquis solū ad theriacam assumptis partibus: nempe q; caput præ cæteris uenenū contineat, ui quadam quæ receperit in uenenum mutandi, ut inammæ sanguinem in lacsermen quoq; maris (ut fertur) hac parte recipit, quo recepto maris caput ori suo inditum præcidit. Caudæ uero cum uicinis partibus absconduntur, q; nimirum corporis ea pars foedior sit, & deterior è succo copiosiorēq; motu continuo attrahat. 12. Non esse mirum si præcisissimis capitibus cum caudis, in reliquis partibus uis salubris & medicamini theriaco idonea relinquatur. Sic enim in alijs quoq; plurimorū animalium partibus fieri ostendit, ut una præ cæteris eximium quippiā polleat: Sunt quibus integras ad remedia utamur. Quædam uis uoluo aut supergressa afficere possunt. 13. Vnde fiat, q; uiperæ, cum uenenū habeant letale, rursus sui uenenū sint antidotū. An sicut uulgo Empiricis per sua uisum est, morsu quidem & sanguinis contactu interimūt, non itidem esu? Aut potius, ut Galeno placet, quia caudæ & caput uenenosiora abscissa sunt, reliqua autē & coctiora parantur, & infinitis alijs adiectis uim pristinam non eandem retinent. resultat enim in compositionibus uis quædam noua à singularibus diuersa. A disjunctur & aliorum uirulentorum exēpla, quæ uel ipsa tota, uel aliqua sui parte, seorsim aut cum alijs pota imposita ue morsus sui remedium sunt. Et primum de helenio apud Dacos & Damasatas rebus uenenosus non esu: mox contra uulgos & Empiricos, qui ratione nihil inquirunt. 14. Vt pluribus pharmacis mixtis totis per totum, quatenus hominum artiff

artificio fieri potest, diuersa à singulis his produciuntur. Sic etiam natura mixta omnino elementis corpora omnia generat: non autem ex fortuito atomorum concursu, sed inuicem appollicatà, nō per totum mixturā, nullam passionem mutationemq̄ subeuntem. Docet autē principia rerū non esse impassibilia, ex magnis frequentibusq̄ rerū omnī mutationibus. Obiter adijcitur historia mulieris quæ ex patre deformi pulchrum peperit infantem, qualem pictum aspexerat. Quo d si in natura id negat fieri, Epicurus, Democritus, & Asclepiades, magis sanè illi negauerunt ea quæ hominū in industria misce, agentia patientiaq̄ mutuo penitus misceri, & unam eo modo uitam nouam resultare. Sed hæc sententia facta erat explosa lib. 1. De temperamentis. 15. De uiperarum ad antidotum electione: nam circulariores quidam eas uidentes saepe fallunt. 16. De medicaminum simplicium, quæ theriacam constituunt, electione: quam exempli gratia in cinamomo solum, casia, & longo pipere docet. Potest enim uel unius neglecta malitia totam uitare compositionem. 17. Andromachi compositio nis theriacæ descriptio. 18. Quid alij quidam (ut Xenocrates, Damocrates, Magnus, Demetrius) ab Andromacho uariarint, nempe pondere: nō enim aliter uariant. Galenus Andromachum reliquis præfert omnibus. 19. Apparatus hedychoi magmaris, & pastillorum è scilla. 20. Quando & quales uiperæ eligi debeant. Differentia maris à femina. Caput & cauda digitorum quatuor latitudine præcedantur. Quod si etiā relictis capitibus adhuc diu moueatur, sanguinēq̄ fundant, optima fuerint. 21. De coctione & reliquo apparatu uiperarum. 22. De reliquorum preparatione, quæ huic antidoto commiscetur. De uino, mellis modo, & ualīs in quæ reponatur: quæ uitrea & argentea esse uult, non replenda, & saepe aperienda. 23. De tempore theriacæ usus, & quæcum dures, & q̄ post quinque annos usq̄ ad triginta, in magnis causis nempe uenosis danda sit: in alijs autem minoribus affectibus, uel ad sexagesimum usq̄ annum satis efficax fuerit: Et quod adhuc ualida sit quidam experiantur, si mox post ca-

tharicum data, uim eius impediatur. 24. Modum exhibitionis, & liquores, quibus diluitur, uariare. 25. Quot quantiq̄ morbi à theriacæ adiuentur ordini ne quodam enumerans ostendit: & quod mixti atque contrarij eius effectus sint. 26. Podagricos & articulares dolores theriacæ uisat, fluxiones cyclicas: hydropi & malo habitus, elephantiacis, melancholicis, & quarta narisis prodest. 27. Aduersus aquæ metum & rabioforum canum morium theriacæ potu impostiue professe. Contra methodicos, qui causam non inquirunt sed tanquā aliud uulnus, canis rabidi morium sanant. Signa canis rabiosi, & morsum eius sanandi ratio. 28. Vnicum esse pestis remedium theriacam, cum historia Hippocratis, quomodo pestē fugarit. 29. Etiam sanis frequentem theriacæ usum salubrem esse, excrementa consumere, actiones naturales roborare: peregrinantes contra frigoris iniurias armare, sensus & mentē acere, corpus à uenosis alijsq̄ noxis præseruare & ægropassibile reddere. De Mithridatis pharmaco, & mortis eius historia. 30. Quando, quo modo, & quæ ætate usum theriacæ. Historia pueri, quem intepesius usus theriacæ perdidit. 31. De salibus theriacis, quibus similiter uiperarum carnes admiscetur, sed non tam efficaces sunt, quàm prædicta antidotens. 32. Quantum theriacæ, quæ sales theriacos constituant, urantur: nō tamē ideo uim profusæ euandā habent, quod multorum aliorum exemplo docet, quæ etiam meliora & ad usum commodiora ignis commercio redduntur, ut aurum, ferrum, obsonia, unum. Chalchitis etiam & lapis phrygius dum urantur nimiam acrimoniam remittunt. Spōgia cinis. 33. Quæ salis sit potentia per se. 34. Apparatus salis theriacis. 35. Quomodo Galenus hos sales parauerit, uiperarum caribus nō usis, sed in pastillos formatis, ut ad theriacam, etsiq̄ reliquis urendis adiectis, quæ & efficacior, & gustu coloreq̄ gratior superiore est compositio. 36. Epilogus operis ad Pisonem, cum Pisonis commendatione.

CL. GALENI DE THERIACA AD PISONEM LIBER

IOANNE ANDERNACO INTERPRETE.



QVANDO QUIDEM theriaca inter omnia alia medicamenta, maximo studio expetit, propter uim efficaciam quæ habet, & eo q̄ etiam sanis ad multa utilis theriacæ usus existit: librū hunc quoq̄ de Theriaca optime Piso, magno cum studio, omnibus uidelicet accurate perpensis examinatisq̄, composuit: idq̄ hoc potissimum nomine, q̄ te ad cognitionem eius indisplicendam haud frigide affectum cognouerim. Nam ædes tuas aliquando pro more meo ingressus, complures sanè & alios familiares libros tibi propositos offendi. Quippe soles & alioqui, postquam ciuiliū actuum expeditis negotia, ueterum philosophorum scripta reuolueres, hisq̄ animam appli-

Galen.

care. Porro cōmentarium quendam de Antidoto hac cōscriptum, tunc non sine uoluptate legebas: & me tibi assantem, ilico amicis intuitus oculis, comiter etiam alloquebaris: ac deinde iterum me audiente librū relegebas. Auscultabam uero et ipse, quoniam cōmentarius non indiligenter, sed cura erat compositus abs quodam Andromacho nomine, qui artem non modo rerum experientia probe calluerit, sed etiā sermonis elegantia rationem in ipsis curiose exercuerit. Itaq̄ præfectū esse ipsum nobis, q̄ in his rebus plurimum ualeret, illius ætatis reges, meo quidem iudicio, uolebāt, forsā patria quoq̄ non nihil ad medicinam exquisitè discendam ipsi opitulante. Cretensis siquidem erat natiua: ac uerisimile est Cretam ut pleurasque alias herbas, ita etiam ad unum quoddam medicamentum idoneum illiusmodi uirum hominibus produxisse. Porro cum tu illius scripta perlegeres, dici uix queat, quantum gauisus, ue-

reçq̄ sim admiratus, quòd diligenter adeo mentem
 ijs quæ ab illo dicebantur attenderes. Quæ de cau-
 sa etiã multum fortunæ nostræ temporis homi-
 num gratulabar, qui te tanto artis studio teneri cõ-
 spicerem. Siquidem bona aliorum hominum por-
 tio, solas aures medicinæ uerborum lenocinio cupit
 demulceri: tu uero non solum ea quæ dicuntur
 libenter audis, uerum etiã quæ non exprimuntur,
 propria insitãq̄ prudentiã ingeniose inuenis.
 nonnulla opera quoq̄ tam accurate noscís, & per-
 spicís, ut nos, qui diligenter ac studiose didicerim.
 Quod nimirum ego in te contemplatus non
 potui non obstupere. Contemplatus autem sum,
 cum filiorum tuorũ charissimus ex quadam equi-
 tandi necessitate intercapedinis ani ac scroti affe-
 ctu laboraret: ut qui sacris administrãdis publice
 esset præfectus, carimoniarũ gratia, quæ diuis Ro-
 manorum tunc necessario fiebat, quamobrem uel
 generosissimos quosque pueros cõcinne equitan-
 tes, saltantesq̄, tanq̄ equis sacra quædam & ipsos
 obire oportebat. Cum igitur filij tui admodum teneri
 locus hic undequaq̄ cõtusos uiolenter, à subie-
 ctis partibus abscederet, ac deinde pure colle-
 ctio, incisione etiã opus haberet: puer sanè tan-
 quam uir iam tum esset, patienter omnia sustinens,
 dextre curabatur: ceu ex quodam philosophiẽ stu-
 dio, tolerantia ac fortitudine ad præsens malũ pro-
 be instructus exercitatusq̄. At tu in curationem
 incumbens, animum diligenter omnibus, quæ à
 nobis fiebant accommodabas. ut si quando non-
 nihil etiã neglectim ac oscitãter fieret, statim ac-
 curatius exquereris, admoneresq̄ secundũ Hip-
 pocratem, non temere quid committeremus. At ego
 uel enimixis spectãs, quod abs te curiosus fieret
 anima duerti: nempe si quãdo & medicamentum
 quoddam à medico impositum suo in loco minus
 recte hærebat, id tuismet digitis transpositum, a-
 pte uulneri applicabas: ut miraculum esse uideretur,
 te tam repente ex tuo erga filium amore, & natu-
 rali solertia, artis absolutionem manibus ostendisse.
 Atq̄ id ipsum tibi usu uenire cõperio, quod
 Plato sapientissimus cõmemorat, in multis, ut est
 consentaneum, frequenter speculatus, & ueri gau-
 dens necessitate. Hæc autem ipsius est sententiã:
 Disciplina, rerum sunt recordatiões, animusq̄ ui-
 detur omnium habere notitiam, quæ tunc nimirũ
 apparet, cum usus postulat.

2. Quemadmodum autem in te quoq̄ filij soli-
 tudine, præsens artis experiẽtia, præter nostram
 opinionem apparebat: nec id sanè immerito, cum
 sis adeo honesti amans atq̄ ingeniosus: ita neque
 in hoc medicamento Theriaca fuisset negligẽtiõ:
 uerum & facultatem ipsius & misturam scire stu-
 disti: ad hæc, tempus, mensuramq̄ usus adamus-
 sim perdiscere. Siquidem hoc est proculdubio a-
 pud uniuersos homines celebratissimũ, tum quòd
 pollicito neminem frustretur, tum ob ipsius actio-
 nis efficaciam. Siquidem nullum unquam à feris
 quæ hominem solent interimere, cõmorsum, hæc
 statim epota antidoto, perisse, memoriæ est prodi-
 tum. Nullus eadem præsumpta, haud multo post

A morfu impetitus, belluẽ ueneno ceu illam superã-
 te interiit: quod subinde nonnulli prætores etiã,
 penes quos uitæ & necis potestas est, experiũtur,
 atq̄ medicamentum probare uolentes, an quod
 promittat, præstare quoque possit, in hominibus
 iam ob praua quædam & illegitima facinora ad
 mortem iudicatis, de ipso faciunt experimentum,
 nos autem cum in hominibus id non possimus, in
 alijs quibusdam animantibus idem facientes, ue-
 ram medicamenti probationem inuenire conemur.
 Nanq̄ gallis qui domi non enutriti, neq̄ nobis
 sunt contubernales, sed potius agrestibus, &
 sicciorẽ præditis corporis temperamento, captis,
 feras obijcimus: & qui inter illos non hiberint ex
 medicamento, protinus intereunt: qui uero bibe-
 rint, conualescunt, & à mortu uitam retinent. In-
 B terdum uero, medicamentum num aduiteratum
 sit, hoc quoq̄ modo probare conuenit. Si epota
 Theriaca non purgetur qui purgans sumpsit me-
 dicamentum, hoc ipso iudicamus antidotum esse
 præstantissimam: quoniam purgationem ei qui
 medicamento usus sit purgante, impediẽti, ut ta-
 li experimẽto à ueri medicaminis inuentione nun-
 quam aberrauerimus. Multa siquidem à subdolis
 improbisq̄ in hoc quoq̄ fraudes fiunt: ac uulgo
 sola antidoti opinio deceptum, ab ijs quibus ars
 est mercenaria, plurima pecuniã medicamen-
 uel prave confectum redemit. Non desunt enim ex fa-
 nis etiã, qui tota, omnĩq̄ ipsorũ uita asiduo me-
 dicamentum usurpent, præsertim qui ob inhu-
 C nos, illiberalesq̄ mores nõ citra sollicitudinem de-
 gunt, sed perpetuo suspicionem habent, facile ab
 inimicis sibi strui insidias.

3. Nonnulli uero corporis iuandĩ gratia quo-
 tidie medicamentum assumunt, quemadmodum
 sanè diuum Marcum nos quoq̄ nouimus, qui le-
 gitime aliquãdo imperium gessit, & adamusim,
 ut erat uir prudens, corporis sui temperaturam in-
 tellexit, asfatim, & ueluti delicijs quibusdam,
 medicamine esse usum. Ab illo nanq̄ uiro potius me-
 dicamentum bonæ existimationis cepit initium,
 & uirtus ipsius actiõnis hominibus innotuit, qui
 pe imperatori secundam ualetudinem emoluit
 antidotum, auxiliij fidem potissimum compar-
 uit. Verum illius principis tempore, ad eorũ dun-
 D taxat cognitionem, qui uiderant, Theriacæ opus
 perueniebat. sub huius autem seculi maximis im-
 peratoribus usus eius prodiit in publicum. Omnibus
 enim licet nobis, ipsorum bonis probe uti, &
 liberaliter curari, alio ab alio medicamentum ca-
 piente: quoniam non solum hoc nomine cæteris
 omnibus præcellunt, quòd imperium à dijs sint
 adepti, sed etiã quòd uniuersa bona uniuersis li-
 benter impartiant, sicut & dij ipsi tãtum ex aequo
 gaudij concipiunt, quantus eorum numerus extiterit,
 qui ab ipsis redduntur incolumes. Præterea
 censent maximam esse regni partem, commune
 omnium salutem: quòd sanè in ipsis etiã sum admiratus.
 Non enim in hoc duntaxat medicamine cõficiendo
 ponunt industriã, sed ita sunt in omnibus in
 commune benigni, munifici, ut si quan-
 do ami-

do amicis aliquibus usus uenerit, mirum sit quam prompte, ac quanta alacritate medicamenta com munitent: ea que non ubi usus necessitas ingruit, tunc conficiunt: sed ad ipsum temporis articulum expromptam quoque illorum compositionem e gregie possident. Cum igitur Antipaterus qui græ cas ipsorum epistolae facere commissum habebat, & propter morum grauitatem, & absolutam in di cendo facultatē, magno in pretio habitus, nephri tico infestaretur affectu, grauemq; ex eo & intole rabilem dolorem conciperet, studium ipsorum a micis seruandis quauis laude dignissimum cogno ui, mirificamq; circa medicinam, animi contentio nem, ita nanque uarijs differentibusq; symptoma tis obstrictes cum morbo longe pulcherrimis me dicamentis certabāt, præstansissimorum medi corum instar, qui uel omnem uitam in ipsius exer citatione contriuerint. Iam uero Arriam in omni bus mihi charissimam, quæ & ipsa supra modum ab eis commendabatur, quod diligenter philoso phia nauaret operam, & Platonis maxime libris gauderet, in lecto quandoq; grauius decumben tem, utpote stomachi dissolutione affectam, iacen temq; adeo supinam, ut ne cibum quidem potue rit capere, atq; ideo in atrophica ut cibum non sen tiret periculum ueniret, non aliter quam medi ci expertissimi mulierem curauerunt, propinan tes eiusum, meo consilio, ex absinthio confectū. Huius siquidem potu silico stomachum ab imbec illitate uindicauit, & sine mora appetitus officiu m recuperauit. Cæterum quid in filio tuo eueni rit, nimirum adhuc in memoria retines. Cum enim factio abscellu, tu quidem ut benignus pater, tardior ad sectionem esses, tempus autem humorem contentum excerni postulasset, ipsi medicamine exhibito, magna nos ipsius sollicitudine liberarūt. Applicatum nanq; emplastrū, locum quidem in cumbentem celerius quam scalpellum, diuisit: totum uero humorem subditam euacuauit, ut puer hinc non amplius dolorem perferentia. Hac igitur circa ista medicamina, uti uides, honestate reg ia præditi, haud immerito quoq; Theriacem dili genter præparant, singula quæ miscēt, accuratius probantes ipsi, quod nihil prætereant. atq; hanc ob causam mirifica antidotum opera edat.

4 Etenim uaria ut nostri cōstat mīstura, & mul tiplicem in operibus usum exhibet; quo nomine illum qui primus confecturam ipsius molitus est, admiror. Quippe uidetur mihi nō temere, sed ex acta quadam ratione, atq; explorata admodum cura compositionem ipsius inuenisse. Non enim si cuti medicī, qui se à professione Empiricos appel lauerūt, neglecta naturarum ratione, unumquen que sine artificio curant, turpiter quædam ex som nijs, quædam uero ab ipsa fortuna ad ipsam ar tem medicamenta capere se pronunciantes, ita nos quoq; medicinam tractamus; uerum quæ ratio ipsa prima solaq; potest inuenire, eadem ex ac te omni consideratione disquirentes, magno stu dio comperimus. At quæ inuenire nequit, ea sen suum experimento iudicamus; plerunq; ne ipsi

Galeni,

A quidem soliac unio sensui iudicium de eis cōcre dentes. Neq; enim calcē quod candida sit, quem admodum nix, usū dumtaxat frigidam iudicare sa tis esse censemus, neq; rosam quod rubra sit ideo etiam calefacere ipsam ilico pro certo habemus; sed unam cum usū sensum quoque tactus adhiben tes, illam quidem calefacere, adeo ut urat, certo inuenimus; hanc uero quod frigiditate e contra rio in ea tactu percipiamus, ex refrigerantium nu mero esse firmiter habemus persuasum. Atq; hoc pacto reliquorum adamussim medicaminum sin gularum uirtutem ipso sensu iudicantes, inueni mus aliud esse salsum uel acidum, aliud amarum uel dulce, gustatus nimirum probatione. Quod autem aliud calefacit, aliud refrigerat, aliud hume rat, aliud exsiccat, tactus subsidio est condiscere.

B Multorum uero ex ipso odoratu probationē mo limur, & facultatis robur ex uehementi odoris ex halatione deprehendimus, imbecillitate uirtu tis ex remisso odore. At probatum ne sit an mi nus quod libet medicamētum simplex, sensus ip sius iudices statuente cognoscimus. Atque his primum illa experti, & fide ex usu sensu que astru ctata deinceps experimēto rationem adiungen tes, ac in omnibus ueluti ducent ipsam sequentes, tum simplicibus medicamentis congrue utimur, tum compositionem ipsorum rationis artificio præ stantissimam reddimus. Nam morbi cuiusque natu ra comperta, ac uarietate, differentiaq; tempera menti simplicium medicaminum cognita, sic

C composita præparamus, unicuique morbo quod congruum est, uaria ipsorum compositione distri buentes, singulisq; hominibus pro corporis ipso rum statu, ut medicamentaria pars medicinæ præ cipit, artificiose adaptantes.

5 Multa nanque, uti non ignoras, penes nos est ad usum parata medicamentorum facultas, adeoq; diuersa, ut non solum in compositione uirtutis di uersitas uideri queat, sed etiam simplicium medi caminum alia ex tota ipsorum substantia unam quandam simplicem uirtutem indicent; quem ad modum Scammonia bilem flauam trahere appa ret: Epithymum, quod ab Attica importatur, atræ bilis humorem per aluum purgare cernitur. Coc cus enidijs pituitam, & omnem aquosum humo rem conspicue educit. Hæc siquidem medicamen ta ex tota ipsorum parte, totaq; sua substantia ho rum humorum educationem moliri conspiciunt: Non enim fidem Asclepiadi Bythino medico ad hibemus, cuius sententia est, Cum homo iam pur gatur, tunc etiam humores hos statim quandam subire mutationem. Quippe quoniam autor fuit opinionis de molibus ac meatibus corporis, ut propterea necessario naturæ opera tolleret, consentaneum erat & hunc de humoribus sermonem ipsum dicere, adeo id quod ab eo adducitur, à ra tione est alienum, & omnino fieri nequit. Quis enim sanæ mentis crediderit tam subito quam me dicamentum corpus attigerit, humoris qui excer netur, substantiam generari? Quis contra non fa cile sibi persuaserit humores hosce prius quoque

tom. 5

p. 3. secum

secūdam naturam corporibus inesse? cum uideat A
Arquato morbo laborantem, eo tempore quo me-
dicamentum biliosum humorem purgās cepit, &
bilem subito copiosam excernere, & affectu expe-
dite liberari? Eum uero qui aqua inter cutem affli-
gitur, medicamento quodam simulac fuerit assū-
ptum, omnem aquam uentriculo insidentem cito
admodum uacuari, atque ex tam subita uacuatio-
ne nullum sanē humorem, aut certe paucissimum
in particulis infartum habere. Verum hæc Ascle-
piades, pueriliter dogmatis necessitati inseruiens,
ambitionis studio, ut dixi, uidere se dissimulat, om-
ninaq; probabilibus potius figmētis conatur in-
uenire, quam propriam cuiusq; medicamenti fa-
cultatem uere confiteri.

6 Nos autem cum hæc uideamus, & per ratio- B
nem inuiscuiusque naturæ medicamentorum po-
tentiam sciamus, hic quoque medicamenta natu-
ra quadam facultate conuenientem sibi succū at-
trahere, compertum exacte habemus: quemad-
modum etiam ex eo quod Magnes lapis ferrum
ad se attrahit, uirtutem quandam attractricem ei
inesse natium uidelicet, rationabiliter nobis ipsis
peruasiuimus. Quum enim uelut deus sit natura in
nobis, secundum Homerum, & similia ad similia
adducat, hoc modo diuinas suas uires indicat. Ac
reliquorum omnium naturam pari studio exami-
namus, ut uim quoque ipsorum per quam operan-
tur, exquisite perdiscamus. Nam dum examen il-
lorū molimur, alia, sicut dictum est, per totas ipso-
rum substantias functionem obireprehendi-
mus, alia mistam quoq; in substantia uirtutem ha-
bere, et duplici fungiactione tam manifeste sape,
ut etiam quammaxime contraria ab eis fieri in cor-
pore conspiciamus, atque id miraculū esse uiden-
tibus apparet. Laphathi igitur folia comesta uen-
trem cient, semen autem assumptum astringit. Si-
militer & brasicæ succus, & uetulorum gallorum
ius, & cochlearum marinarū humores assumpti,
alum mouent. Olus autem ipsum brasicæ, & il-
larum carnes comesta, uentrem comprimunt. A-
loe, squamaq; aris supererfcentes ulcerum car-
nes adstringunt; & fluxiones quæ sub ipsis nascun-
tur, subinde exsiccant. Assumpta uero per os, uni-
uersum corpus purgant. Lac ubi a nobis diuidi-
tur, contrarias in usu facultates ostendit. Nam fe-
rum ipsius bibitum, uentrem resoluit. Caseus in-
gestus, exacte ipsum cohibet. Nonnulla uero tam
inopinabile quippiam in temperatura facultatum
quæ commiscetur efficiunt, ut auditoribus quo-
que nullo fieri modo posse uideatur, nisi suis ipsi
oculis id quod accidit, contueantur. Trifoliū ita-
que herba, quæ hyacintho similis est, cū uere par-
turit, & semen agresti Cnico persimile obtinet; de
cocta admodum, deinde moribus phalangij, uel
uiperæ quoque ex aqua fotu adhibita, ipsis mede-
tur, & dolores statim sedat. Sin autem in alio non
commorlo sanum locum eodem fotu circunde-
deris, similem sensum, similesq; dolores ijs quos
morbus inuehit, omnes conciliat: ut reuera mira-
culo dignum opus esse uideatur, eandem uideli-

cet herbam & morsum sanare, & ferarum modo
sanam partem prae afficere. Iam uero ex medica-
mentis quadam hominum nutritioni minime cō-
ueniunt. Cicuta enim sturnos quidem nutrit, & le-
talem in ipsos uim non exercet; nos autem, quem-
admodum probe nosti, interimit. Veratrum, co-
turnicum cibus est; homines male corrūpit. Non-
nulla uero partes etiam quasdam corporis priua-
tim uisitant. Nam lepus marinus pulmonem exul-
cerat. Cantharis uescicam peculiariter afficit. Econ-
trario pleraque medicamenta quibusdam corpo-
ris partibus eximie curandis sunt idonea. Patien-
ti igitur iocinori saepe Eupatoria herba perstre-
nue auxiliata est. Glans unguentaria, Myrobala-
non uocant, lienem adiuaat. Sarxiphagon, & Be-
tonica, renibus pulchre faciunt. Et similiter alia a-
liarum, ut experientia obseruauimus, propria sunt
medicamina; quæ nos, ut dictū est, diligenter per-
scrutati, sic cuiuslibet morbo, ut conueniunt admo-
limur, Hippocratem magistrum longe optimum
in his quoq; ut in alijs omnibus, æmulantes. Quod
enim exactissimam de medicamentis artem fece-
rit, cum ex alijs plerisque ab ipso cōscriptis est cer-
nere, tum ex ijs qui secundo de morbis publice
grassantibus libro in hunc modum prodita reli-
quit. Medicamentorum modos scimus, ex quibus
qualia, & quæ sunt. Non enim omnes similiter,
sed alij aliter componuntur. Et alibi citius, aut se-
rius, in manu tractationes assumentur, uelut
est aut siccare, aut tundere, aut coquere, & huius-
modi. Omitto plurima, quæ unicuique, & in qui-
bus morbis, & quo tempore morbi, artem, spe-
ciem, uicium, qualis hora anni, & quæ, & qualiter
procedat, & eiusmodi. His enim, uti uides, genera-
lius nos docet, ut qui & medicamentorū naturas
discere nos adhortetur, & tempus exquirere, quo
medicamenta debet assumi; deniq; eorum qui as-
sumūt, temperaturas inspicere. Sunt enim nonnulli
proculdubio, qui tam facile ea possunt capere, ut
etiam sapius cōcoquant, uel nihil ab ipsis incom-
modi, sed aliquando nutrimentum experiantur.
Quidam tam inepti medicaminibus assumentis
existunt, ut nequaquam uti ipsis possint, & stoma-
chus auersetur, ac ante usum facile dissoluatur.

7 Hæc igitur ut ego arbitror & ueterum D
medicorū præstantissimi ab ipso edocti, optimas sic
& medicamentorum compositiones effecerunt,
ex singulorum natura confecturæ artificium inue-
nientes, quæq; intensa sunt ipsi qualitatis, alio-
rum mistura remittentes; simili ratione acra he-
betantes, & ut summam comprehendam, pro re
liqua cuiusque uitij differentia, & hominum tem-
perie, medicaminibus cum artificio utentes. Quæ
re ut animum in ducum eum, & Theriacen hanc,
de qua totus hic liber ampliter differet, ex pluri-
mis, optimisq; medicaminibus præpararūt. Cum
enim considerarent morbus noxiarum ferarum esse
incurabiles, & uenenosorū medicamentorum
symptomata letalia; ad hæc, cum perpēderent ho-
minum naturas permultum inuicem differre, & ali-
ud alij medicamē idoneum: merito exactam ip-
sius

sius, & uariam fecerunt misturam, ut huius rei gratia, certo ipsa in his omnibus finem assequeretur: atque ob usum necessitatem, magno studio ab hominibus affectaretur. Nihil siquidem inter uitae mala difficilius esse mihi uidetur uirulentis medicaminibus, & feris noxijs. Etenim ab alijs etiam grauissimis fuga nos praeseruamus, illa maxime hominibus imponunt, quod uidelicet aliquis nulla praemunitioe adhibita, frequenter uenum nesciens imprudensque assumit; deinde comorsus a fera quadam, subito interijt. Ego autem ex quodam historiae libro accepi, quomodo aliquis bellu contra Romanos gerere uoluerit, nulla militaris ordinis potentia munitus. Homo uero hic, inquit, Carthaginensis, complures ollas feris quae repente possunt occidere, refertas, aduersus hostes proiecit. Illi autem non intelligentes quis mitteret, eo que neuiquam sibi cauentes (quippe tales emitti sagittae inter hostes non solebant) protinus collapsi perierunt. Atque propterea homo ille frequenter eiusmodi belligerandi altitia, tanquam & ipse fera quadam existeret, inimicorum manus effugit. Quamobrem putauerim & uobis primatibus, & exercituum ducibus ad tales usus hoc esse habendum medicamentum: quod nonnunquam bellandi incidat necessitas.

8 Olim itaque citra ferarum quoque mistionem confectum medicamentum, similiter ad huiusmodi misce faciebat. Cum autem medici semper in huius preparationem certatim incumbere, ac aliud commiscere cogitare, in hunc modum quidam considerauit, miscuitque ipsi belluas. Aiunt autem Andromachum hunc uirum fuisse, medicum mehercule memoria dignu, haud multo ante nos natum. Quippe Neroni conuixit, cui etiam ipsam dedicauit, tum uires, tum confectioem carmine complexus. quod tibi hic subiungam, ne ipsius historia careas, tam studiosus alioqui & cupidus literarum. Illud tamen praefabor, Theriacem non solum quod ferarum moribus probe conueniat, sed etiam quod ferarum ipse deinceps in confectura misceantur, congrue ex utroque significato esse nominandam. Versus autem hi sunt.

ANDROMACHI SENIORIS, NERONIS ARCHIATRI, ex Viperis theriace, cui nomen est Galene.

Accipe quas habeat uires, clarissime Caesar Antidorus multis consociata modis. Accipe securae Nero libertatis alumne Magna salutiferarum robora theriaces. Dicitur haec Graijs Hilar, Eudios, atq; Galene: Ad potus diros haud medicina leuis. Nec si meconis perfrigida pocula succi Hauseris, insignem uin negat illa suam. Nulla cicuta potest hac uincere, nullu aconitum: Nullus frigidior succus hyoscyami. Feruida non thapsus, leralia pharmaca Medae,

A Sanguineumq; ualent ulcera cantharidum. Viper a nigrescens icetu, infestusq; cerastes, Arida seu diplas non superare potest. Scorpis aduersum hac, itide nil promouet Aspis Quae in reliquis uirus exitiale tenet. Improb a et illa pyras contra hanc occurrere pugna Non audet, latebris sed manet utiq; suis. Dryinum, nec non haemorrhui, sanguineum qui Humorem effundit, haec medicina domat. Non hoc offendunt inimica phalangia potu, Quae horrifico uexant sumpta dolore uirum. No hydrys, aut epicherus agens, dum feruet aquae Sub calido caucit sydere obesse potest. (uis Ille inquam labijs chersydrys pestifer atris, Qui occurrens, animam non sinit esse diu,

B Huic fidens Caesar praeto oblectare per aestum, Nec Libyae curae tunc sit arena tibi. Nulla tibi amphibiae nae nocet, siccusq; subintrans Campos, exitium nulla robora feret. Quin stomachu curat medicamen, cu aestuat egru: Assidue uexans, insuper asthma citum. Vel cum uentriculus turbatur flatibus, undam ut Interius surdam concitet ipse chyli. Vel cum difficili uertuntur tormine uenti Intestina, colon tensio ubi exagitat, Vel cum iam toros confuso felle per artus Ut proprius nequeat esse colos oculis, Regius infestat morbus, non ulla ciborum Cura adlit (quamuis Iuppiter annuerit Tempora longa) animo sed tristes limina uitent Eius qui medicam polliceatur opem.

C Si uides pallore malo candentia membra, Tollel hydropa suis uiribus antidotum. Et fuscata statim lustrabit lumina, rebus His quoq; si incipiat, non uereare phthisin Sola etiam Tetanui, Tendonum spasma, profund Theriace haec adimet pondus opisthotoni. Vel cum succingens costas membrana laborat Pulmones reprimens desuper ipsa leues. Vel quando horrificos patitur uesica dolores Vlceris, illius praedomituscq; porus Impedit urinam, coles & reddere eandem Appetit, & uanam proruit in uenerem. Cum renum sauit crucians iniuria lumbos: Hoc poterit potu tristis abire dolor.

D Pectoris & labem saniosum pellit aegri Multos usq; dies potus is antidoti. Pestiferamq; luem curat, quae tempus in omne Spiratu grauis est, intima conficiens. Atq; canis rabidi uirus, lympharq; timorem, Latens odorata fugeris antidoto. Hinc tu sume fabae podus, qua lymph a creauit Ex umbra, coeno & tecta simul folijs. Nempe fabae Nili, grauitatis nomine, ternis Antidoto calidam confocians yathis. Sumito, quando capis somnum, uel luce reuerfa, Vno uel pariter pocula bin a die. Luce sibi tent ipsam quibus est sol tristis, ut inde Lenimenta mali quod grauat, accipiant. Nocte, quibus tenebrae gratae minus ordine uerso, Ante thorum pulchre sumpta medela facit.

Exitiale animans quos laesit uulnere dūro,
 Aut cui letalis portio capta fuit.
 Apponens Hilarem affectū pocula, eodem
 Noctū & luce simul fac medeare modo.
 Quin & perpetuo spiranti nocte quietem
 Præbebis Cæsar, hoc placidam antidoto.
 Principio expertus uir in arte uenabitur angues
 Audaci, mīros celleritate, manu.
 Hos, cum tristis hyems abijt, non amplius arctas
 In terris latebras cernis habere suas
 Mīsis iam latebris, subeūt memora ampla, uirētis
 Quæsitum marathi femina grata oculis.
 Hæc uisum refovent serpentibus, atq; bulbulcos
 Subtimidos magno sæpe dolore grauant.
 His ipsis caudas, & colla referta ueneno,
 Præcide, & uacuos uentrīculos adime.
 Quippe uenenatos utraq; ex parte dolores
 Mittunt, nam caudis hī quoq; uirus habent.
 Ergo feces ipsis ceruicem, atq; extima, quantum
 Intus in pugnum tenditur arcta manus.
 Diffluit ad uirus pariter cum sanguine, quod si
 Vitaris, lætum tu experire diem.
 His tibi sic factis, carnes in sicile mittens,
 Vnā corā politas igne parabis acri.
 Lymphæ quod satis est infundes, germen anethi
 Cum anguina iunctum carne coquens pariter.
 Ast ubi spina cadit cocta de carne recurua,
 Desuper atq; feræ noxia terga tument,
 Exime, quo feruens frigeſcat mistio flammis:
 Infestas carnes dimoueasq; procul.
 Abſtrahe serpentum spinas, uirus redolentes,
 Quas perſentiscet non male docta manus.
 Carnibus adſicias ſicci panis & bene piſti
 Quantum paſtillos fingere ſufficiat.
 Verum ubi iam iſta piſæ fundo conuſa rotundæ,
 Formaſti, umbroſo ponito cuncta loco.
 Protinus hic etiam pilolo cortice ſcylla
 Illita cuiſ circum maſſa ſit, incaleat.
 Dum ſic aſſetur, nec fiat durior inde
 Cortice, nam ardeſcit leniter igne cinis.
 At poſtquā calefacta nimis diſrumpitur, ipſam
 Deponiſ, carnis portio tripla manet.
 Atq; eruum gyro duplici demittis æcerbum,
 Piſtilloſq; moues, quod teris inferius.
 Auferſ, & riguos paſtillos inde figuras,
 Quos ſiccans umbra, à ſole reponere procul
 Quatuor at decadas drachmarū, & bis quater in-
 Sed de Theriacis ſumito dimidium. (de,
 Tot piperis longi, meconis, magmaſ adde,
 Magmaſ hedychoſ par modus inſicitur.
 Bisq; roſæ ſenis ſiccæ folia ingeris inde
 Drachmiſ, coniunges irin & ſilyricam.
 Hoc glycyryza modo, necnō opoballama odora,
 Scordion, & dulcis ſemina buniados
 Sumuntur, cinamomū et pondere ponere eodem
 Non oblitus eris, nec ſimul Agaricum.
 Sed myrrha & coſtus, crocus & qui ducitur antro
 Corycio, binas accipient triadas,
 Iam caſia & nardus quæ extremis fertur ab Indis,
 Iuncus apud Arabas uictima facta deis.
 Thus, piper atrū, albū & dictāni germina, theon,

A Marrubium, ſcechas, zingiber atq; calens.
 Et terebinthina, & calamintha, & petroſelinum
 Quinq; ſimul ſolium, ſingula pondus idem.
 Actutum poliſ quaternas ponito drachmas,
 Tot ſtyracis faciens, atq; chamapityos.
 Totq; mei drachmasq; racemiferi addis amomi,
 Nardi & quam generat Gallica terra ſimul.
 Lemnia creta pares, phu pōti, itidēq; chamædryſ
 Semina Cretenſis malabathi folia.
 Torrida chalcitis, & aniſum, & gentia radix,
 Succus hypocitiſtis, pondus idem capient.
 Balſameum fructum, gummi, ſemēq; marathi,
 Et cardamomum quod tenet Indus ager,
 Cœruleæ aſt ſpine lachrymā, hypericū, ſagapenū,
 Thlaſi, ammi, ſeſeli, tot quoq; ſingula petunt.
 B Caſtorium, terræ malum, nigrumq; bitumen
 Iudaicum, dauci ſemen, opopana,
 Galbana opima itidem, necnō centauron æquet
 Tu binis drachmiſ ſingula conſocias.
 Omnia permulto ſubigantur in orbe ſalerno,
 Quæ lachrymas referunt humiditate chyli.
 Sed lignoſa teres, Acteo melle perungens,
 Omnia quæ miſces Theriacæ antidoto.
 Phœbe tunc munus prompto comitare fauore,
 Seu nunc te oblectes per iuga Theſſaliæ,
 Seu Rhodō, aut Burinnā habitas nūc, aut Epidaurū
 Des hilarem regi perpetuo antidotum. (rū,
 Nempe tuam gnata Panaceam, nam ipſe ſalutem
 Abs te ortam ſacro ſemper honore colet.
 10. Cum iſta uerſus hī non ſine ingenij dexte-
 ritate à uiro ſint cōpoſiti, neceſſarium mihi uide-
 tur inſpicere, cur tandem in tanto talium ferarum
 numero, nō alterius quam uiperæ carnes in miſtu
 ram eſſe idoneas cēſeamus. Ipſe enim nihil de his,
 uti uides, ſcriptum reliquit. ego uero has minus a-
 lijs feris tabificam uim obtinere autumo. Nam ba-
 ſilicis, bellua ſufflaua, & triplici frontis apice mu-
 nita, uisus etiam ſolum, conſpectuſq; ut aiunt, &
 ſibilo auditus homines perimit. Atque ex alijs a-
 nimentibus ſiquod illum extinctum attingit, &
 ipſum ſubito interit. quare omne aliarum ferarum
 genus propinquitatem ipſius deuitat. Dryinus
 uero ſerpens ſic nominatus, q̄ in radicibus quer-
 cum uiuat, tam malignus ad perſendendum prodit-
 tur, ut eius qui ſupergreditur cutis à pedibus ex-
 corietur, tota crura œdemate admodum intume-
 ſcant, & quod magis mirificum eſt, manus quoq;
 ipſas curantium eodem modo perſiclitentur. Siau-
 tem quis aggrediatur eum perimere, olfactu a-
 deo mulſtari aſſit, ut quemlibet gratum odorem,
 prauum eſſe exiſtimet, nec alterius præterea rel-
 queat ſentire. Hæmorrhūs & hæmorrhoiſ ſuiſi-
 pſorum nominibus ſimilem hominibus pernici-
 em inferunt. quippe percuſi, ſanguine per os &
 nares totōque corpore effuſo ſic intereunt; quem
 admodum & à diſpade commorſi, qui & cauſus
 appellatur, male conſiciuntur. Nam & multa ſi-
 ti, & æſtu uehementi uexati, interdum & dirup-
 ti, diem obeunt. Acontias ſerpens, ubi ſe mul-
 tum extenderit, ceu ſaculum quoddam corpori-
 bus inſiliens, ſic perimit. Inter Aſpides nominata
 ptyas

pyas ceruicem exporrigens, & interualli metita longi tudinem rationalis cuiusdã animalis modo minime aberrans, uenenum corporibus inspuit. Harum igitur ferarũ una (nam triplex Aspĩdũ species est, hæc uidelicet, & chersæa, id est terrestris, & chelidonia) perhibet reginam Cleopatram cum uellet latere custodes, statim & citra suspicionem mortem sibi cõsueuisset. Cum enim Augustus deũs deo Antonio eam capere incolumem uellet, ac uiuere, studiosiusq; (sicut par erat) seruare, ut Romanis tam insignem mulierem in triũpho ostenderet; hæc, aũt, re intellecta, optauit regina adhuc ex humanis potius decedere, q̃ priuata Romanis uideri. Et tunc molita est sibi hæc bestia mortem consciscere. Præterea memoriæ produnt ipsam duas omnĩ fidissimas mulieres ad se uocasse, quæ ad pulchritudinem corporis mundo subministrado erant accommodatæ, nominabatur Naera, & Carmio ne; hæc comam deceter implicabat; illa extremos ungues dextre præcidebat: deinde iussisse ut ferã uis sicubusq; tectam importaret, quod, ut dixi, custodes falleret, prius expertura in ipsis mulieribus an subito posset perimere, & hæc cum actũ perijissent, deinde ipsam sibi exitũ attulisse. Ob quã rem Augustum uehementer fuisse attonitũ commemorant, partim ob harum erga reginam amorem, ut cum ea mori non dubitarint, partim quod illa generosam potius mortem oppeteret maluerit, q̃ in seruitute uiuere. Etenim aũt ipsam, manu dextra capiti adnota, & diadema, sicut est consentaneum, tenente, fuisse inuẽtam, ut uel eoufque spectatoribus regina esse uideretur: quemadmodũ & tragicus poeta describit nobis Polyxenã & ipsam morientem, quæ tamen accurate operam dedit, ut cũ decore caderet. Porro qui mulieris properum ut falleret custodes conatũ, ferã autem ad occidentum pernucitatem sermone nobis uolunt ostendere, referunt ipsam sumẽt brachiũ magno admodum morũ, eoq; alto, uulnerasse, & belluæ uirus in uase quodam ipsi allatũ, uulneri infudisset; quo sic transmissõ, haud multo post nescijs custodibus prompte interijisse. Verum hanc historiam animi gratia cõmemorare uisum est, quod te in omnibus disciplinã diligenter dextrũq; uideam; ad hæc, ut intelligamus q̃ subitam hæ feræ necẽ concilient. Etenim exitũ inferendum haud dubie sunt præcipites. Ac in magna Alexandria subinde suum contemplant, q̃ celeriter perimerent. Cum enim aliquem hæc poenæ lege damnatũ, humaniter, citroq; uolunt occidere, adijcientes ipsius pectori feram, iubentesq; paululum obambulare, ita sine mora hominem tollunt e medio. Vides igitur q̃ nos deceter nullam ex huiusmodi feris, quod tantam habeant in ipsorum corporibus uim noxiã, medicamento admiscemus.

11 Atq; ipsarũ uiperarum corpora nõ integra antidoto immitimus, sed amputatis capitibus, caudisq;, ita reliquis ipsarum partibus in mistura utimur, idq; non obiter, nec sine ulla facientes ratione, sed quoniam capita pessimũ humorem, nempe ipsam uirus, in se continent, ideo ipsa præcide-

re conamur, ut minus ex ipsorum uirtute medicamentum recipiat, cum natura eorũdem uim quandam mutatricem in uirus obtineat: quemadmodum & in seminarijs meatibus, quæ parastate Græcis dicuntur, semẽ fit, in mammis lac, dum mutatur, Viperã autẽ inter omnes alias feras caput habet perniciosius. Siquidem aiunt ipsam os aperite ad suscipiendam maris genituram, quæ accepta, caput illius abrodere. Atque hunc ipsis esse prauũ complexus modum. Deinde fœtus ex semine prognatũ, naturali quadam ultione, parentis uterum erodere, & foras prorumpere feruntur, ac ita ipsos patris uindices, matrem perimere. Quod nobis egregius Nicander uersibus suis ingeniose scriptũ reliquit. Sunt autem hi.

B Ne sis in triũijs cum morsus Vipera coniuæ
Fœmellæ fugiens agitæ uulnera abhorret,
Et cũ dente caput magno maris amputat atri
Fœmina dira nimis, labijs & mordicis hærens.
Sed catuli ultores patris sunt protinus, ut qui
Perrumpant latera occisæ iam rara parentis.

Caudas, atq; ipsa extrema corporis tollimus, tãquam caudæ partes, & ut arbitror, fordidiorem substantiæ portionem magis trahentes: adeoq; crebrius, motus gratiã trahentes, quemadmodum partes quæ proximæ sunt caudis piscium, minus pingues esse ob frequenter motum dicuntur.

12 Nem mireris si his amputatis reliquæ animantium partes efficacius reddant medicamentũ, natuã ad salutẽ uirtute etiam carnibus ipsarum inditæ: ueluti & in alijs animantibus, plerãq; partes non paucos affectus strenue sanare nouimus. Nonnullis igitur capita murũ cõbusta, ex melle illita, alopeciã curare possunt. Et milui caput aũt similiter podagricis auxiliari, si quis ex eo usto sine plumis, quantum sub tribus digitis inspargere possit, cum aqua uolet bibere. Et partium non nunquam solæ articule aliquos morbos perferant. Itaq; camelii cerebrũ aræfactum, potũq; ex aceto, comitiã libus morbis medetur, & mustelæ similiter. Item hirundinis cerebrum ex melle ad suffusiones oculorũ facit: & ouillum simili modo confectum, ad dentitionem infantũ est utilissimum. Taurini cornu rasura cũ aqua pota, sanguinis eruptionẽ cohibet, femoraq; uisa sanguinẽ stringunt, & sæpenumero solutã aluum ea ipsa listat. Ceruini cornu ramentum adustum, & cũ uino tritum, deinde circumlitũ, uacillantes dentes confirmat, sicut & bouis talus idem posse traditur. Idem educit rotũdos lumbricos cum melle potus: ex oxymelite lienem consumit, & leucas uisiliginis genus tollit illitus: ad hæc mediocriter uenerere est. Et castoris testiculi similiter poti, cõuulsionibus medentur. Iam uero nõ desunt animalia quorum fel homines potest inuenire, adeps, medulla, lac, cutis, sanguis ipse, & serpentis seneectus. Quin & stercora ipsorum quibusdam auxiliata uisimus. bouillum itaq; stercois aridum, cõmbustũ, tribus cochlearijs hydropticũ iuuat: Murũ stercus cũ aceto tritum, alopecias curat: in potu autẽ sumptum, uesicæ calculos cõminuit, Adeps anserinus, inflammatiõibus ex

rosaceo medetur. Et cerui medulla, blādissimum est medicamentum. Vaccinā lactis potus dysentericis adiuuat. Fel hyænæ cū melle uisum exacuit, illitū suffusioēs discutit. Hippopotami cutis uista, & ex aqua leuigata, si corpori admouetur, phymata digerit: quæ admodū & uiperæ pellicula in puluerē redacta, imposita; alopecij, mirifice pilos regenerat. Aspīdis exuuiū ex melle tritum, & illitum, acutissimū uisum conciliat. In summa, multa est taliū materia, quæ nūc perscribere tēpestiuum non esse iudico, ne liber fiat prolixior: cum etiam sola quæ prædiximus, ad sermonis demonstrationem sufficiat. Illud uero scitū est necessariū, tota ipsorum animalium corpora frequēter hominibus auxiliari. Cæcer enim fluuatiūlis tritus, illitusq; spicula & surlculos extrahit. Squilla similiter leuigata, cum bryoniæ radice pota, lumbricos educit. Scorpius si alius cum pane comeditur, conterit uesicæ calculos. Terræ intestinū ex uino assumptū, idem facit. Sin autem ea in melicrto cōtrita quis regio morbo laborans sumat, statim purgatus liberatur. Sæpe etiam cum rosaceo cerato imposita, podagricorum inflammationibus conueniunt. Accipitur in susino unguento decoctus, hebetudini oculorum medetur. Scarabæus in oleo decoctus, si in aurē stilletur, dolores ipsius medicatur. Alauda uista si editur, mirifice colicos subinde iuuat. Et quomagis uim in ipsorum corporibus admireris, illud tibi studiosius percensebo. Multa namq; & uisa solum, robor suū ostendūt. Stellio à scorpionibus uisus ipsos suffringit, atq; ita perimit. Amphibæna (est autē animal biceps, quemadmodū sanè & nauigia utriq; prorā habentia, cui natura ex superfluo substantiæ bina capita est largita) hoc in quā animal, aiunt, si mulier grauida supergressa fuerit, male abortū facit. Quare nō est mirabile, si etiā uiperarū corpora, amputatis illis partibus, similiter adhuc auxiliandi robor obtineat. Namq; ostēdit, ut puto, diligenter & tota animalū corpora nonnūquam hominibus auxiliari: interim etiam solas ipsas partes: aliquando partium quoque ipsarum particulas minimas.

13. Illud autem sermone perscrutari magis est necessarium, quod et uulgo admiratione dignum esse uidetur. Si quidem ipsæ feræ cum sint corporibus inimicæ, & tam subito hominē perimant, quo modo iterum moribus ab ipsis factis possint succurrere, & solæ hominē ex tali periculo perferuere. Vetus quidam sermo est, quædā animalia ubi inter mordendū, sanguinem humanum ex uulnere manantem cōtigerint, cōmorfos occidere: ubi uero sanguinē non gussauerint, sed ita uorantur, morfos seruare incolumes posse: licet etiā de Helenio à Græcis, ab inquilinis uero nico appellato, idem memoriæ proditū esse dicunt. Nam Dacas inquit & Dalmatas id telorum cuspidibus circumspargere, atq; sic postquā sanguinē uulneratorum attingerit, posse necare: eum uero ab ipsis, esse innocuū, neq; mali quicquā ipsis facere. Ad hæc ceruas ab ipsis sagittarū icū trucidari, neq; ipsas comestas, mali quid edenub. adferre perhibēt. Ve

A hæc ratio non mihi uidetur sufficere, ut quod quaerimus, possit inueniri, cū experientia nitatur, & solum quod accidit, cōmemoret. Etenim Empiricos ipsos nō recipio, quoniā & ipsi idiotarū modo propositum speculantes, rem quidē admirant, cæterū causam ipsius ignorāt. Nam qui neutiq; requirūt dicere, sed detrectāt ipsam ratione inuenire, ac solū facta probātes, experientiā sapius uisoriū satis esse medico affirmāt, eundem admiratio nis modū cum idiotis, ut est uidere, obtinent. His autem diligentiores fatentur, oportere quidē medicos eruditius aliquid idiotis merito habere, sed cum nequeāt inuenire, et inquirere superuacuum esse arbitrantur. At nos multo accuratius in medicinam incumbentes, ac quæ sunt, uulgi duntaxat more nolentes inspicere: neq; experientiam repudiamus, sed ei rationem coaptantes, cum datur occasio, absolutam ita, & rationalem necessario redemus artē, non ut solum disquirendi studio quomodo fiat, assequamur, uerū ut etiam aliquid utile ad curationem ex inuento condiscamus. At hinc inde insistemus rationi, ut rei quæ sit, causam inueniamus. Miraculum enim uideri queat, q; si exinquirendi ipsius studio prompte & ipsa tanquā respondens subito reperiatur. Et ut magis sermoni fidem adhibeas, ex alijs quibusdam, quæ manifesto ex operibus apparēt, demonstrationē producam: insuper ex ijs quæ foris imponentur duntaxat, & per os sumunt. Nam à Crocodilo læsis, ipsius adipem uulneri impositam, summo esse præsidio nouimus. Itē muris aranei morsus, æque letales, ab ipso rursus in puluere redactō superpositoq; citra dolorē iuuari. Similiter quī ut uiperæ uisum percussū, periculum effugiūt, si trita ipsarū corpora uulneribus ipsis applicuerint. Nec talia citra rationē in nobis, ut dixi, eueniūt, nec tantū obtinent uirtutis, ut possint perimere, per distributionem facultatis in altum penetrantis: quemadmodum sanè in cataplasmatis itē quoq; fieri cernimus, uirtute in corporibus ipsorum moderata, quæ mederi deinceps queat, non autem occidere. uerū quod in theriaca accidit, manifestiorē habet rationem. Dico enim propterea feras has necantes ab ipsis commorfos iuuare, q; copiosior uis tabifica simul cum capitibus amputatis tollatur. Ad hæc uim in alijs partibus reliquā confectionibus nos obtūdimus, dum ipsas coquimus: & salis anethiq; nō parū aquæ miscentes, nec cōdimentis solius gratia talia contemperantes, sed ut corpora eliqueant. atq; hoc modo ipsa pauca uirus, aut nullum prorsus habere facimus: plurimum autē uirtutis auxiliatricis præparatio exhibet. Quomodo igitur feræ tot & talibus misce medicamētis, amplius queat perimere, cum malitia ipsorū corruptrix sit exoluta: Insuper uerū or ratio uidebitur, si in quibusdā quoq; similibus demonstrationem adferam. Cantharis namq; sola exhibita, uesicam exulcerat, & inimicū uirtuti me dicamentum, et ualida sæpenumero uirtute hominem iugulat: mista uero alijs quibusdā e contrario ipsius uesicæ fit auxiliū, & uehementer urinā pro-uocat. Liqueor autē papaueris, q; per se potus ex-

gialis sit, neminem latere existimo: sin autē cū alijs nonnullis sit preparatur, egrotos ita subinde iuvat, ut maxime salutarerū ipsius medicamentum esse uideatur. Itaq; Phreneticorum deliria haud raro strenue curauit, ex perusgijlijs uirtute priuatos, somno recōciliato mirifice restituit. Iam à phalangijs cōmorfos, ipsa phalangia trita, & cū uino pota, malo liberat: ut hinc maxime possis quod à me dicitur, credere. Si namq; uel solum uinum feris mistum à periculo reddit securos, nimirū et Theriaca ex tot talibusq; confecta, salutarerū quoddā medicamen potius q; exitiale hominibus reddidit. Illud enim in medicaminū misturis fieri sciēdum est, puta singulorum quæ miscentur uirtutē non amplius conseruari, ita ut eadē maneat, nec mutetur, nec in ullam qualitatem transeat, sed quandam omnium unionem effici, tota ipsorū temperie per tota mista, & una quadā alia ex illis uirtute profecta: quomodo etiā in mulso, quod Græci *οινομελι* uocāt, fieri cōspicimus. Cum enim exacta utriusq; temperatura facta fuerit, neq; mellis gustum mel mistū omnino repræsentat; neq; unū amplius uinum esse in mistura appareat; uerū statim duobus cōgressis diuersum quiddā, id iam ipsum mulsi naturam induens, ex tēperatura perficit. Idem utiq; cū in alijs omnibus medicamentis, tum in ipsa Theriaca fieri arbitrator: nō adhuc uniuersisq; mistorū uim & qualitatem eandē manere, sed uniuersis omnibus confusis, & in unitatem quamdam naturā coeuntibus, unam, diuersamq; à reliqua ex omnibus quæ miscentur medicamentis naturam procreari.

14. Si etenim ex atomo, id est in diuiduo & uacuo secundū Epicurū & Democriti opinione consistant omnia, uel ex quibusdā molibus siue corpusculis, & meatibus secundū medicū Asclepiadem (nam ita permutatis solū nominibus, pro atomis in diuiduis corpusculis, pro uacuo meatibus dicens, eandem cū illis rerum essentiam esse uoluit) merito pharmaca manerent inalterabilia, quæ in nihil mutari, neq; omnino suam ipsorū qualitatem exuere possent. Sed quia sermo hic ueritati repugnat, ut ostendemus, & omnia, ut dixi alterant, mutantq; facile, & mutuā inter se temperaturā suscipiunt, necesse est omnibus quæ miscent, per tota cōtēperatis, ualidius imbecilliori præpollere. Cuius rei gratia nos artificialibus misturis, cū usus postulat, qualitates medicaminū in alteramus: quod fieri nō posset, si exigua quædā & impatibilia, immutabiliaq; substantiæ corpora essent. Atq; ideo iam sæpe ego sum demiratus, quomodo cū in uniuerso tam subitas fieri cōuersiones, tantāq; temperamentorū mutationē uiderent, sustineat deinde euisimo di uniuersorum principia statuere, & præcipue iam citatus medicus Asclepiades, ad hūc em peculiariter uerba potius habebat: quoniam manifestiores etiā in corpore cōuersiones, mutationesq; non indicat. Quid nāq; sibi uult, quod solo digito in frigidā impositio, totius corporis mutatio actutum oritur; uel quod pro uentorū uariatione corpora nostra simul mutantur? Ego itaq; ex familiaribus quandam noui in lecto adhuc decubentem

A ex capitis ipsius consensu uenti flatum cognouisse. Si quando enim capitis grauitate laboraret, statim uentū qui spirabat, Ausitrum esse deprehendebat. Iam mulier grauida solo tonitru exaudito, & horribili quodam spectaculo uiso, infantē eiecit. Interdum cum repente uolumus auxiliari, & uelocem prædidij sensum egro moliri, celerimā in corporibus mutationē fieri uideamus. In quibusdā igitur uirtute admodum dissolutis, admirandus ille Hippocrates, subitā animi cōcitationem aliquam fieri consulit, ut incitationis robore, solutionis imbecillitatem medeamur. Subinde etiam paucum aliquod oblatum ipsius alimentū statim refocillat, uiresq; eorum restituit, corporis mutatione, sicut opinor, statim uergente in melius, non autē corporibus impatilibus existentibus, & propterea sensum nobis talium exhibere nequeūtibus. Quis enim in tantillo tēporis momento corpuscula composituerit, aut quis sic ex impatilibus constructus corpusculis repēte occurrētia perceperit? Etenim certa corpusculorū transpositorū cōpositio, figuræ quidē solam efficiat mutationē, ceterū alteritatem, qualitatemq; aliā ex alia generare neuitquā potest. Atq; huius rei gratia arbitror uirum non modo quod in medicamentis sit, cōsequenter ob placiti sui consequentiā tollere: sed naturā quoq; ipsam omnia in nobis dispensantē, nihil esse arbitrari. Singula enim quæ sūnt, ex corpusculorū compositione & cōplexu fieri uult. Quamobrē etiam mirari mihi subit quoties ad ipsum mentē dirigo, quā tam mirifica naturæ opera, potissimūq; artes quæ in ipsius hominis generandi initio sūnt, nō uideat quomodo quidē infans in utero loco formet, quomodo formatus iam dextre nutritur, quot & qualibus uinculis tenerrimis ipsum ad maturum usq; parum intus cōtinet, quali uero diuina arte & similitudine imaginē in ijs quæ generatū efficiunt qua re præsertim corpusculorū quoq; hypothēsīs ipsius nō citra dedecus coarguitur. Non enim solis parentibus, sed proauis etiam quibusdam fœtus reddunt similes. Porro mihi uetus quædam historia indicauit, q; cum deformis quidā opibus potens, formosum uellet procreare puerum, depinxit in lato ligno elegantē alium puellū, dicebatq; mulieri inter coeundū, ut illam picturæ figurā inspiceret. Hæc autem defixis intuentis oculis, & ut ita dicam, totā illum mentem aduertens, infans non quidem patri, sed picto similem peperit, uisu opinor, naturæ non corpusculis quibusdam picti imaginē transmittente. Quoniam autem uir huiusmodi naturæ mysteriorū imperitus esse corpusculorū gratia sustinet, & propter uisus obscuritatem, incertitudinēq; suos ipsius discipulos tam mirificis operibus fidem accommodare nō sinit, ad externa ipsum, omninoq; apparētia traducere cogito. Quis nāq; artes ab animalculo araneo factas inspicens, nō credit etiam telam per dilucida adeo, tenuiaq; fila ab eo parari? ut etiā aliqui dicāt, texēdi artem homines primū ipsi referri acceptam. Quis non adducitur ut mirabilem quandam rem naturam esse pronunciet, si opus uideat quod ab

urfa efficitur: Etenim hæc omnibus quæ generantur animantibus similiter parit: caro aut sola generata, informis & inartulata est, nullâ obtinens figuram: statim uero à parente, naturali arte figuratur. namq; lingua ueluti manu quadam utens ediditum foetum effigiatum reddit. Verû contra hos sermonem finiam: quippe consueui in contentiosis orationibus ceu freno quodam equum solito ferocius currentem, mensura sermonem ipsum ualde coercere.

15 At cum manifesto, ut animum induco meum, ostenderit, ne amplius tibi sit mirabile, posse eandem feras & perimere, & auxiliari, propter uariam tum cõfectionem, tum misturam medicaminum quæ ipsi contèperant, deinceps antidotum præparare aggrediar. Nõ em̄ ars quoq; est exigua qua confecturâ ipsius molimur. Siquidem & dolus quæ in feris sæpe uenatores ipsarû machinant, & in alijs misturis præparantur imperitia, inutile frequenter medicamentû effecerunt. Pleriq; enim ipsorum uenandi artem ostẽtare uolentes, & præsertim qui etiã medicamenta quædã ad res huiusmodi inuenire profitentur, habere quidem se medicamina mentiunt: haud enim unquã nos, ipsos habẽtes inuenimus: dolo aut in belluis, uidentibus, imponunt: primû ipsas haud cõgruo tempore uenantes, sed multo post uernationẽ cum non amplius uigẽt. Captas autẽ ipsas crebro sibijpsis alluefaciunt, & cibis nõ solitis enutrit, immo carnes ipsis permittentes, & continue mordere cogentes, sic ut uirus ex earum ore uacuetur, efficitur. Quin etiã mazas quædã obijciunt, quæ dentiû foramina obstruant: atq; hac ratione morsus fiunt imbecilles, ut uidentibus magnum sit miraculum, talis ipsorû ad fraudẽ parandã artificij imperitis.

16 Simili modo etiam in medicamentis, misto rum haud medio cris, ut dixi, est inscitia. Quid multum opus est: in optimis quæ immittuntur, Casia dico & Cinnamomo ipso haud modica inuenit differentia, & multos ex ijs qui præparant, solet decipere. Nam quod uocat cinnamomû mentitur, uero simile est, nisi q; gustu & odore longe sit inferior. Atqui xylocinnamomum hac re differt, q; lignosum sit, ualidaq; habeat uirgulta, nec similem suae uolentiam præ se ferat. Porro inter ipsius ueri cinnamomi genera aliud in montibus nascit, non tenue, nec longû, magis rubens colore. Aliud aliquantulû nigricat, & tanquam fibris quibusdã intertextû. Aliud adamusim albû reperitur, nõ durû, ex facili fragile, parua radice. Est & aliud quoddam casia rubenti simile, leue, & odoratum. Præstantissimum omnium est, quod ab indigenis mo sylion dicitur, cinereum colore, uirgultis gracilibus, ramusculis frequentibus, uehementerq; odoratum, quod etiam potissimû nos præponere consueuimus. Est enim odore longe optimû, suauissimûq; & gustu acre nobis apparet, mordax admodum. mansum, rutam præ se ferre uidetur. ad hæc, leue est, & facile potest confringi. Casia uero itidẽ nisi in dijudicando fueris expertus, frequenter solet imponere. Est enim & pseudocasia quædã, hoc

est mentita casia, mirum q; ueræ similis, sed odorem minus grato coarguit, corticẽ medullæ adhaerentem obtinens. Nam optima laudatissimaq; fuluescit, & rosam expirat, licet etiã dulcem gustû præfert, fistulis plena, & uinû obolens, et aromatû modo uehementer odorata. Atq; hæc Gizi ab indigenis nominat. lam uero & in pipere oblogo dolo fieri, te ignorare haudquaquã par est. Siquidẽ nõ nulli adulterates ipsum æquale cum uero longitudo dinẽ habẽs, pyrethri uel sinapi modico indito, ita gustus mordacitate gustantem fallit. Verû in his exercitatus, & qui gradus in cibis, acriusq; gustu nouit deprehẽdere, nec nõ arboris radicẽ ei adhaerentẽ curiosius inspicit, germanû piper inuenit, & falli ab ipsis nequit. Porro quẽ multa in alijs quoq; uniuersis fit examinatio, quemadmodû in his pariter tibi percẽsui, ego sanẽ uel hæc ad libri cõmentationẽ sufficere existimo, ne sermo nobis fiat prolixior. Cæterum consuluerim singulis ipsis accurate exploratis, ita medicamentum præparari. Nam unius alicuius uitium omnia subinde corrumpit.

17 Scriptura autẽ ipsius, ne hoc etiã ignores, uarie apud medicos inuenitur. Etenim Andromachus in medicamentis accuratus, cuius etiam prius mentionẽ feci, in hunc modum medicamentû præparauit. Pastillorû Theriacorum drachmas uigintiquatuor. Pastillorû scylliticorum drach. xlvij. piperis logi, succi papaueris, spissamẽti hedychoi, singulorum drach. xxiiij. rosarum siccarum, iris illyrica, glycirhizæ, feminis napi syluestris, Græci buniaða appellat, scordij, opobalsami, cinnamomi, agaricij, singulorû drach. xij. myrrha, costi, croci, calic, nardi, schein, id est iuci odorati floris, thuris, piperis albi & nigri, dictamni, marrubij, rhei, stœchados, petroselinæ macedonica, calaminthæ, terebinthinæ, zingiberis, quinquefolij radicis, singulorum drach. vi. polij, chamæpityos, styracis, amomi racemi, mei, nardi gallica, sigilli lenuj, plu pontici, chamædryos cretica, soliorû malabathri, chalcitidis tosta, gentianæ, anisi, hypocistidis succi, balsami fructus, gûmi, foenicula feminis, cardamomi, seselis, acaciæ, thlaspis, hyperici, sagapeni, ameos, singulorum drach. iij. castorij, aristolochiæ tenuis, dauci feminis, bituminis iudaici, opopanaeis, centaury tenuis, galbani, singulorû drachmas duas, mellis libras decẽ, uini falneri quod satis est.

18 Porro Xenocrates & ipse nõ mediocri studio in huiusmodi uersatus, in reliquis sanẽ Andromacho similiter antidotû præparauit, solum uero pro quatuor sagapeni drach. ij. medicamentû cõmisisuit. At Damocrates præstantissimus ipse quoq; medicus factus, ac integrû librum De antidotorû confectura uersibus eleganter cõplexus, omnes misturas his similiter in medicaminis præparatione temperat: sed in miscendorû mensuris ab ipsis discrepat. Nam quædam ex ijs quæ illi singula drachmis quatuor medicamentû inijciunt, hic duabus sigillatim miscet, cõtrã ex quibus binas drach. singulis tẽperant, ipse unam drachmã immittit. Magnus, qui nostro tempore medicus princeps euasit, alia omnia sicut hi uiri, in confectura seruans, solo

cinnamomo ab ipsis euariat. Nam duplicatum hu-
ius pondus medicamento ipse adiungit, ita uero in
chalcitide, ita quoque in sagapeno, ab Andromachi
sententia discordat. quippe duas drachmas, ueluti
Xenocrates, in medicamentum coniicit, cum An-
dromachus quatuor mittat. Verum in sagapeno
Democrati etiam refragatur. Etenim hic unam
drach. Magnus duas medicamento inijcit. Appo-
nit autem & uini mensuram, quippe duos sexta-
rios infundendi censet, alij ut usus postulat, qui-
licuncque uini mensura utentibus. Demetrius qui &
ipse nostra tempestate primarius medicus consti-
tutus est similiter in omnibus alijs iuxta Androma-
chi sententiam medicamentum preparat, solo Scyl-
liticorum pastillorum pondere ab eo discrepat, &
alijs uniuersis scriptoribus. Si quidem ille tri drach-
mas xlvij. mensuram complectantur, solus hic qua-
draginta sex drachmas dumtaxat antidoto admi-
scet. Nam cum tanta in scripturis sit differentia, nos
Andromachi tanquam praestantissima uitumur, & in re-
gios usus ita praeparamus. Porro coeactura ipsius
hunc in modum consistit. Etenim utile puto ut praepa-
rem tibi ipsam sermonis praescripto, ut si quando
medici inopia, dexteritate ingenij praeditus uoles
conficere, quam optime conficias, loco magistri praepa-
rationis, ipso sermonis adminiculo fretus.

19 Caeterum ante illam confectionem conueni-
ebat etiam spissamenti hedychroi, quod ei indi-
tur, scripturam pernouisse. Est igitur laudatissima
preparatio apud Magnam hinc uerbis expressa: a-
spalathi radice corticis, calami aromatici, iunci
odorati floris, plu, costi, asari, xylobalfami, casiae,
singulorum drach. sex. cinnamomi drach. xxiiij. a-
momoliantum de amaraci 3. xx. nardi indicae drac.
sexdecim. foliorum malabathri drach. sex. myrrhae
drach. uiginti quatuor. mastiches drach. sex. croci
drach. nouemdecim. excipiuntur uino salerno o-
pobalsami contactu. singis pastillos, & in umbra
desiccas. Simili modo scylliticis quoque pastillos
preparare conuenit; sumitur scylla recens, non ad-
modum magna, oblitur non (ut quidam uolunt)
luto, nam id sordidum esse mihi apparet, sed fermen-
to. nam facile tenerrimo torretur, ut interea nonni-
hil etiam ipsius assumat. Deinde ubi probe in fur-
no, uel in cacabis ubi panes coquuntur, ut aequalis
fiat tostio, afflaueris, sumptis interioribus, ipsius par-
tibus tenerrimis, leuigare diligenter oportet. erui-
t quoque farina laudatissima, recetissimaque, pari por-
tione admiscebis, ut Democrates praecipit. Nam
Magnus dimidiam partem immittens, partem mi-
hi admiscere uidetur: Andromachus autem duas
inijciens portiones, multum. Aequalis autem modus
singulis pastillis optimus est. atque hac ratione trita
cum eruo squilla, orbiculos formabis medicos, &
in umbra repositos in usum seruabis.

20 Deinde post haec uiperam ipsam quae ad totius
confectionem copiam sufficit, ut sumenda sunt, non
quouis tempore, sed potissimum ueris initio captae,
cum latebris relictis foras in apricum prodeunt, &
non adhuc uirus tam prauum habent. Intus enim
delitefcentes, cum nulla ex parte digeruntur; ma-

Galeni.

ligniore etiam uim tabificam in se contrahunt: quan-
do etiam seniu dictum solent, sicut omnia serpen-
tium genera, colligere, quod est crassissimum quoddam
integumentum, tempore quo delituerunt contra-
ctum, atque tunc magis ex latibuli tempore, quam
animantis aetate senium existens. quapropter non
statim ipsas capere oportet, sed permittere aliquam
diu & aere frui, & consueto cibo uesci. Porro ues-
cuntur haec ferae tum herbis quibusdam, tum ani-
malibus, & quibus affuerat solent nutriri, cuiusmo-
di sunt buprestes, cantharides, & quas uocant pi-
tyocampas; haec enim idonea ipsarum sunt alimen-
ta; Porro animalia sunt colore sufflata, admodum
agilia, collum maxime porrigentia, oculis subru-
bentibus, inuerecundis, serinum cementibus, ca-
pite latiore, corpore toto & uentre uastiora, gres-
su ad extrema magis caudae, quae non inuoluta est,
sed potius contorta, in cessu quieti proximo. Hac
enim re foemina a masculo differt, ad haec quod ca-
ninos dentes duobus plures habeat, quemadmo-
dum sane & Nicander hisce uersibus dicit,

Masculus emittit, notus color, ipse caninos

Binos perpetuo monstrat, sed foemina plures.

Et sane hoc tempore captis, primam capita & caudas
amputare quatuor digitorum longitudine conuenit;
dum autem partes has abscindis, diligenter inspi-
cere consiliu est, num his amputatis, exanguia pro-
tinus, immobilia, prorsusque emorta esse animalia
uideantur. Nam si tales offenderis bestias, nihil ad
medicaminis missionem conducere ipsas censeto.
At si motum quandam in ipsis residuum conspicias,
& sanguinem conseruare aliquandiu posse, has ceu
praestantissimas antidoto praeparando immittes, ut
quae haud ignauam, exolecentemque, sed ualidam
ad seruandum uim habere appareant.

21 Deinde tota adamussim cute ipsas detracta,
adeps ceu nullius momenti, omniaque interanea, tan-
quam excrementorum receptacula eximetur, mox
reliquum corpus in uas quoddam fictile quod elegan-
tissime constructum, uel in lebetem probe extersum,
splendidumque indet, ac prunae impositum, ut citra nido-
rem elixatio earum fiat, ex aqua fontis incoquet, sale
receti cum medicoribus. anethi non aridi utrugulis adie-
cto. Deinde carnibus iam bene coctis (sit autem tibi
cocturae mensura cum spinax ab illarum carnibus se-
iunguntur) tunc lebetem ab igne deposito, diligenter
carnes a spinis segregas, tritisque ipsis panis quod maxi-
me puri, & ex syncerissima facti simillagine, quan-
tum pastillis formadis sufficiat, admisceto, quemad-
modum etiam Andromacho placet. Nam Magnus
& Democrates definita quandam huius mensuram
ipsis adiungit uolunt. aequali siquidem panis modum,
aequali carni adiungentes, ita ipsas cum pane simul
coerunt. Postea iusculi quod satis est affuso, sic pa-
stillos medicos cofinges, opobalsami contactu
inter effingendum utens, in umbraque repositos, ad
totius medicamentum confectionem referuabis.

22 Dein quaecumque alia cotundi & cribrari ex-
pedit, cribro quod licet subtilissimo cocernenda, nam
leuia admodum insigniter tuare mihi uidentur, quod
corporibus facilius apponantur. Porro quae consper-

tom. 5

q genda

genda sunt leuigandaq; hæc quoq; tenuiter cõtere-
 re, & uino conperges, quod laudatissimū est fal-
 lernum: non dulce faustianum, sed acre, & quod
 omnibus uocatur A. c. rum. Deinde omnibus hunc
 in modum contritis, mellis quantum satis est adijci-
 tur: erit autem satis, quemadmodū scripturæ cõti-
 nēt, libræ decē excoctæ mediocriter, ut quicquid
 in eo cerēt est, statulentumq; in coctione separe-
 tur. deligendum autem mel hymettion nuncupa-
 tum, quod apes probatissimū efficiū, thymū hoc
 in mote, cui nomen Hymetto, nascentē depasta:
 iam uero resinā, galbanūq; seorsum prius eliquata
 medicamini in mortario sic adiunges, ac deinde o-
 mnibus in uinitate redactis, tritisq; diligenter: rur-
 sus manu in opobalsamū modicum intincta, ita an-
 tidotum in uitræ aut argētis uasis repones. non
 autē uehemēter ipsa replebis, sed relicto quodam
 spacio, quo medicamentum perspirat, ad hæc fre-
 quenter operculum detrahes, ut & liberius exha-
 let, & maturior usus tibi ipsius contingat.

23 Quippe haud modico tempore ad coctio-
 nem indiget, ut quādo usus postulat, antidotū pro-
 be sit concoctū. concoquitur aut plurimū duode-
 cim annorū spacio. qui uigētiore ipsa, ualidioreq;
 uti uolunt, etiā quinto anno & septimo exhibue-
 rūt, præsertim in ijs qui a uirulentis bestijs, & a ca-
 nerabido cõmorbi sunt, præterea in medicamētis
 letalibus. hi enim cū grauem ab eiusmodi noxam
 acceperint, potētiore etiā medicamētū præsidio
 indigent. Est autem potens medicamētum ad usq;
 triginta annos. nam in alijs affectibus ubi tāta no-
 xæ causa nō est sufficere uidetur, cum usus exigit,
 sexagenariū. admodū enim tantū spacij terminus
 exile imbecillūq; ad opem ferendam medicamen-
 tum facit. Pleriq; igitur dum uim ipsius uolūt ex-
 periri, primū medicamentū quoddam purgās ex-
 hibentes, deinde nonnihil ex antidoto propinan-
 tes, sic de ipsa faciunt iudicium. Si nanq; ualida ui-
 gensq; fuerit, neutiquā purgationem fieri permit-
 tit, sua ipsius potentia medicamini purgatorij ef-
 ficaci euincens. quod si ita fuerit purgatus, ut qui
 antidotū non assumpsisset, liquido cõstat uires ef-
 se inualidas, & uetustate consecras, ut ne quidem
 medicamini uirtutem superare poterit.

24 Cæterū mensura ipsius potus in omnibus
 eadem nō est, quemadmodū neq; liquor, quo ip-
 sum exhibiturū diluimus. Siquidē in prædictis a-
 uellanæ nucis magnitudine ex tribus uini cyathis
 dilutam, propinare affectis cõsueuimus: in alijs au-
 tem uitijs & mēsuræ, et liquore uarie utimur. Nam
 ad affectuum differentiam ea adaptantes, tum me-
 dicamentū quantitatem metimur, tum congruum
 misturæ humorem iudicamus.

25 Nō enim solum ad ferarū morsus, & letalia
 medicamina auxiliari solet antidotum, uerum ad
 maximas etiā alias affectiones præsentaneū esse
 remedium, experiētia ac usū ad nobis comperitum
 est. Itaq; Galenus ipsam in propositis uersibus An-
 dromachus ideo arbitror uocauit, quoniā ceu ex
 quadam affectuū tempestate tranquillitatē quan-
 dam, ipsam nempe sanitatem corporibus concil-

liat. Capitis igitur dolores longos & uertigines sa-
 nare, ad hæc auditus difficultatem, & oculorum
 hebetudinem sedare potest. Nonnunquā uero &
 gustus instrumentum laborans reficit. subinde in
 phreniticis mentis alienationē generose somnum
 inducens sedauit. in super animi perturbaciones et
 implexas imagines somnis abigit. Comitialibus
 quoq; ipsis uehemēter solet auxiliari, copiosam
 ex capite humiditatem absorbens, & liberū spiri-
 tū transitū efficiens. Iam & suspiciosos iuuat, cum
 crassæ quædam pituitæ in pulmonis fistulas impa-
 ctæ respirare hominem prohibent, prompte disse-
 cans, ut facile egerantur, attenuansq; fixos uis-
 cososq; humores. Danguinem reijcens admodum
 iuuat, si quis ipsam cū symphyti decocto dilutam

exhibuerit. Sæpe stomachi uitijs mederi solet, &
 nausea laborantē, cibumq; non capientē suauiter
 restituit: interdum etiā appetitū sine ratione in-
 tensum, ex mordaci quadam & acri substantia ip-
 sum infestante, ualide repressit. Insuper lumbricus
 intestina occupātibus, eoq; stomacho ipso insatia-
 biliter cibū appetēte, medicamentū hoc, illis ene-
 catis, magna fame egregie liberauit. Præterea ma-
 ximū latūq; helminthem, id est lumbricū genera-
 tum, qui omnē assumptum cibū depascit, eoq; re-
 liquū torū corpus emaciāt, mirabiliter ab intesti-
 nis educit. Hepaticos quoq; et lienosos affectus se-
 pe curat, obstructions aperiens, & iocinoris lien-
 isq; affectibus utilis. Itē arquatū ex aliquo seco-
 ris uitio oborientē, strenue persanat, bilem expur-
 gans, & ueluti abstergēs, tū ut secur bilē a sangui-
 ne examussum segreget, efficiēs. Aliquādo lienes
 scirrhus induratos soluit, paulatim sordidam super
 fluamq; in eis substantiā absorbens. Conterit & re-
 nū calculos, & quicquid terreū sordidūq; in eis cõ-
 tinetur, facile expurgat. In uescia difficultatem uri-
 næ sedat, & exulceratiōibus in ea subinde est præ-
 sidio & difficilem uetriculū concoctionem, imbeci-
 llitatēq; reficit, uentris osculū exalfaciens, cõfir-
 mansq;. Ad intestinorū ulcera, ipsasq; dysenterias
 & lienterias est utilissima; ileosis quoq; & diuturno
 coli uitio obnoxijis prodest, præsertim cū inte-
 stina uacāt inflammationibus, acres ipsorū humo-
 res cõsumens, & intestinorū flatus per uaporem
 discutit. Est cū cholera affectis egregie cõducit,
 corporis coagmentū corroborās, multasq; fluxio-
 nes sistens. Porrò maximū ipsius opus sæpe in car-
 diaci innotescit: quippe dum corpus multis cõl-
 nuisq; sudoribus distillat, & robur ipsius dissolutū
 est, quū neq; uinū sepe affectionē superare possit,
 antidoti potio & sudores sistit, & uirtutē collabē-
 tem ueluti erigit ualidatq; efficit. Iam uero in mu-
 lieribus etiā menses educit, & utri sedisq; hemor-
 rhoïdas suppressas subinde aperit. Mirifice uero
 & immoderatas sanguinis excretiones cohibere
 cõsueuit. Succurrat enim quod mistā uariamq; ip-
 sius facultatem, in superioribus diximus, ideo aliā
 diffundens extenuasq; cogit excerni, alia quæ ob
 naturæ uirtutis imbecillitatē superfluo excernun-
 tur, uiribus partū confirmatis solet inhibere.

26 Quinetiam podagricos, omnesq; in articu-

los fluxiones tunc potissimū adiuvant, cum aug-
 menti tempus præterierit, & uigoris status acce-
 ferit. Nam dolores epithematis lenientibus miti-
 gans medicamentū propinabis, ut fluxiones cohi-
 beat. quippe hoc antidotū iam infartas digerit, &
 alias inuehi prohibet. Maxime prodest etiā sano,
 si frequenter assumat. nam humorū superflua con-
 sumit, & totā corporis temperiē inalterat. Alia uero
 medicamenta quæ podagrici in morbi auxiliū
 bibunt, ad pedes quidē humores ferri uerant, sed
 horum superflua humiditatē non discutientia, ma-
 iorem quendā morbū faciunt. Nam fluxione per
 corpus oberrante pulmo semper ob respirandi ne-
 cessitatē motus, ac propter corporis sui raritatem
 ad illam excipienda facilis, totū ipse ad se trahens,
 ita hominē suffocat, quod ego in multis cōtempla-
 tur experientia didici: atq; huius rei gratia omīno
 ab hisce medicamentis abstinere consulerim. The-
 riaca uero in talibus uti etiā uehementē adhortor.
 etenim humorū superfluitates exsiccans iuuat, &
 alias colligino permittit. Pleriq; igitur initio alsid-
 ue hac uli potioē, in totū ab affectu liberati sunt.
 atq; hac opinor ratione etiā aqua inter cutē labo-
 rantes, multū subinde adiuuat, dum humorē ipsos
 affligentē absumeret, & insitum calorem perfrige-
 ratum excalefaceret. præsertim hydropas, quos a-
 narfacas & leucophlegmatias appellāt, insigniter
 adiuuare consuevit, in totum se corpus distribuēs,
 & unde quæq; corporis humiditatem exprimens.
 Quapropter etiā prauo corporis habitū, quam
 cachexiam dicūt, optimum est remedium, ut quæ
 corporis habitū transmutet, superflua digerat, natu-
 ram ad suas functiones fortiter obeūdas præparet.
 Hoc auxiliū modo etiā elephanticis crebro
 succurrimus. nam cū multus humor sit corruptus,
 cuius uis totam corporis molem putrefacit, anti-
 doto morbum solet euincere, dum fluxiones, &
 sanguinis corruptionem impedit. Ad hæc, tetanicos
 haud raro persanauit, neruus calefaciēs, & ten-
 siones ipsorū relaxans: quemadmodū etiā partium
 resolutiones sæpe curans, spiritu recreato, in
 naturalem statum reduxit, & motus particulis red-
 didit. Mirari uero antidotū licet, cum non modo
 ipsum corpus ægrotum sanare cōspiciamus, sed etiam
 animo subinde affectibus noxiō posse auxiliari.
 Quippe uitia ex melancholia sedat hoc medi-
 camentū continue exhibitum, ceu exhauriens extingensq;
 atrā exualis & liene bilem, sicut & bestiarum
 uirus: quare ad febrem quartanam potissimū
 pulchre conuenit. Siquidem febris hæc ab atra bile
 oborta, prompte antidoto tollitur, præsertim si
 artificiose ipso utaris. Ego igitur multos quartana
 laborantes, hoc præsidio usus facile a morbo uin-
 dicaui. Nam uomitu prius a cœna ipsos uacuans,
 deinde in sequenti die abstinthij succum exhibēs,
 ut bilis edulcescat contempereturq;, ita horis duabus
 ante accessionem antidotum exhibeo, ac mis-
 scisse ipsum frequenter uidi proficere, ut protinus
 qui caperet, sine morbi accessione maneret.

27 Et aquæ pauorem morborum pessimum,
 hoc medicamentum sæpe tollere consuevit, & mi-

Galen,

abiliter tantorum malorum concursui resistere.
 Non enim corpus duntaxat ipsis inarefcit, & con-
 uellitur interdum, febricq; acri intus uritur, sed ani-
 mus etiā delirat, & grauissimum ipsis adfert sym-
 ptoma. Quippe aquam timet, ac propter multam
 siccitatem humidū tenentur desiderio, & a potu
 abstinent, quia mente alienatū, id quod auxiliari
 possit, non considerant. Fugientes enim aquam,
 pauentesq;, miserimo mortis genere intereūt. In
 quibus potissimum methodicos sum demiratus,
 qui causas ad curationem esse inutiles dicit; haud
 enim scio quomodo his queant mederi, cum sim-
 plex morfus existat, & similis à nō rabioso cane il-
 lato appareat; quem enim curatiōis modum ipsis
 indicabit uulnus corporis obiter aspectum, nec in
 teriore causa ab eis examinata, nec ipsorum oculis
 anima uersa, à rationali autem medico sola rati-
 one, & diligentī examine adiuuent? Quamobrem
 qui in methodicū curantē male incidit miser,
 ceu irrationalem quandam & ipsum bestia exci-
 stentem, omīno moriturus est, merito pro illius se-
 ctam occumbens: quoniam ob dogmatis sequela-
 lam, causam inquirere dignatur. Qui uero rati-
 onali medico feliciter incidit, neq; tam prauis
 symptomatis facile corripitur, & mortē propter
 illius artificium euadet. Nam huiusmodi medicus
 eo qui cōmorfus est, suscepto, statim accurate per-
 quirit qualisnam canis fuerit qui ipsum momor-
 dit. Si enim audieris gracilem corpore, & siccum,
 oculis rubentibus, cauda demissa, spuma ex ore
 C
 effluente, præterea lingua foras prorecta, & tanq; hi-
 le colorata, obuuium quenc; insiluisse, citraq; ratio-
 nem curruisse, deinde rursus subito cōsistentem,
 cum ira quadam magis furenti, non ipsi præuifos
 momordisse: hæc inquit si in eo sic habere audieris,
 statim rabiosum canē fuisse intelliges. Itaq; uul-
 nus haud simpliciter, quæadmodū Methodicus,
 curabis, sed confestim ipsum etiā amplius efficies,
 carne multo interuallo orbiculari figura præcisa,
 ne facile ad cicatricē perueniat: sed foramē diu mi-
 nimū quadraginta diebus pateat, ut per hoc canis
 uirus emanet. Caute igitur admodū cādentibus
 locū adurere solemus, & alijs uti medicamentis
 quæ extrahendi uim obtinent, nec uirus intra car-
 nem manere sinunt. Ego autē considerans aliquan-
 do, & antidotū ipsum oleo ex rosis cōfecto diluī,
 & ceu medicamentū, quod linteolis cōceptis exci-
 pitur (emmoton Græci uocant) in uulnus indi-
 di, ut cucurbitulæ cuiusdam modo exurgeret, & ex
 alto, quod corrūpendo corpori erat, extraheret. In
 summa, theriaca & extrinseca imposta, & epota
 rabiosorum moribus præsentanē medicaminis
 cuiusdam instar exacte opitulatur.

28 Caterum nobis etiā in pestifera lue soluti
 hoc antidotū malo correptis prodesse adeo uisum
 est, ut nullum aliud præsidium tanto malo resistere
 fuerit idoneum. Namq; pestis, tanq; & ipsa exci-
 stat quedam bellua, haud paucos interimit, uerū
 ciuitates quoq; totas depascēs, male cōficit. Quip-
 pe praua quædam acris ad corruptionem prom-
 pta mutatio efficitur, & homines cum respiratiō-

tom. 5

q. 2. nis

nis necessitate periculum euitare nequeat, ipsum a
aerem ueluti uenenū quoddam ad se per os attra-
hunt. Quamobrē etiam Hippocratē illum multis
modis admirandū laudo, qui luem illā ex Aethio-
piā Græcos inuadentē non aliter curauerit, q̄ aeris
mutacione alterationēq̄, ne talis amplius inspi-
raretur. Cum igitur ignē per totam urbem incēdē
iussisset, non simplicem lignorū materiam, uerum
ferta floresq̄ suauissimos alimentū ipsius esse con-
suluit, unguentaq̄ pinguisima & odorifera ipsis
superfundit, ut aerem purū hoc modo redditum,
homines in mali subsidium respirarēt. Similī ratio-
ne Theriacen, cui ipsa quoq̄ ignis quidam purga-
torius existat, præsumētes in pestifero aeris statu,
neutiquā malo corripis finire nouimus, correptis
iam, posse mederi, aeris inspirati malitiam inalte-
rantem, mutantemq̄, ut quæ corporis temperatu-
ram insici magis prohibeat.

29 Quapropter consulo tibi ob has tam repē-
tinas aeris constitutiones, aliasq̄ nozarum causas
oborientes, in prospera quoq̄ ualitudine crebro
antidotum assumere, quō & externis accidētibus
corpus resistat, ac ubi iam fuerit affectum, illud cu-
ratu facile inuenias. Hoc enim ueluti bonā quan-
dam temperiē salubrēq̄ statum corporibus indu-
cit, dum humorū superfluitates absumit, partes re-
frigeratas recalcificat, & insitā uirtutē corroborat,
quo naturales actiones probe perficiat. Cū enim
natura ualida est, tunc etiā sine impedimento uen-
triculus cibos concoquit, ac uenæ ipsos prompte
in sanguinem redigunt, secur bilem ex facili segre-
gat, corpus purum sanguinem suscipiēs, uniuerso de-
inde, ut iam nutrire queat, corpori transmittit; ex-
cretiones ipsas moderate molitur; recemēta cor-
poris per totam respirationem salubriter digerit.
Maxime uero in peregrinationibus antidotū sum-
ptionem cōsuluerim, cum in frigido aere per hye-
mem iter aggredieris. Erit enim ceu salubre quōd-
dam uiscerū indumentū, & multū calorē præbere
ipsis idoneū. Iam uero ad animi prudentiā acrimo-
niamq̄ nō esse inefficacē perueni. quippe sensus
ualide suo fungi munere efficit, mentemq̄ uapori-
bus liberatā, subtiliorē reddit. Breuiter, totum cor-
pus ita ab iniurijs securum facit, ut nec à deleterio
quopīā possit insici. Namq̄ uaria & tanta misturæ
medicaminis uirtus, eiusmodi firmitatē producit,
præsertim cum bestiarū mistura constat. Prodiē
enim & Mithridatē magnū illum bellatorem, non
Theriacam, ut quæ necdum esset, sed aliud antido-
tum uarijs quoq̄ misturis compositū, ipsiusq̄ di-
ctum nomine (Mithridatū enim appellat) præsum-
mentem, ob firmā corporis constitutionē ex illo
preparatā, non potuisse ueneno potō interire. Cū
enim bellū aduersus Romanos gerēs, à Pompeio
uictus, in extremis medicamētū ueneno sanus mo-
ri cogeretur, medicamētū epoto, eoq̄ copioso, ip-
se quidem non interijt: filliæ autē ob eximio erga
patrem amorem, cum eo mortē uolentes oppete-
re, eiusdē medicamenti potu subito conciderunt.
Deinde cum mortem ille obire statim nō posset,
ueneno propter antidotū præsumptum inefficaci

uocato quodā ipsius amico nomine Bystoco, in-
iunxit ipsum iugularē. Atq̄ sic medicamētū opus
ferro absoluens, mori ipsum uolenter coegit. Vi-
des igitur quantum efficaciz ad firmam corporis
habitudinem conciliandam uariæ mistionis medi-
camina obtineant, & potissimū Theriace, ob tan-
tam, ut dixi, bestiarū uirtutem.

30 Ceterum medicamen hoc meo consilio su-
mes proba fruius cōcoctione, nec cibis repletus;
Mētura autē aliās alia recte uteris. interdū enim fa-
bæ Aegyptiacæ magnitudinē cū duob. aq̄. que cy-
athis capies, ubi exiguū ad concoctionē ipsius in-
teruallū erit; interim uero auellanæ nucis magni-
tudinē bisbe tribus cyathis temperatū, cum plus
temporis ad medicamenti distributionem habitu-
rus es. Porro inspice simul & anni tēpus & regio-
nem ubi medicamentum assumes. Nam per æsta-
tem neutiquā id capere cōsuluerim: quippe statu
aeris calido, etiam ex antidoto corpus longe ca-
lidius euadens, offenditur. atq̄ hoc maxime mirabi-
lis ille Hippocrates cōsiderans, medicamētū exhi-
bitiones ante caniculæ ortū, & sub ea difficiles es-
se tradit; quoniam febrim hoc potissimū tempus
hominibus aduehit. Quapropter & ætate florenti-
bus, et multo naturali calore præditis, neq̄ multū,
neq̄ sæpe exhiberi medicamen est consiliū; quē-
admodum ijs quo iam declinant, & plurimum &
crebro, nō ex aqua, sed uino magis assiumi profue-
rit, ut corporis uirtus iam emarcescens, & genui-
nus calor extinctus refocillari, accēdiq̄ ipsius pos-
sit beneficio. At in pueris omnino medicamētum
est uitandum: quippe cuius magnitudo illorū uir-
tute maior sit, & corpus ex facili dissoluat, nati-
uumq̄ spiritū cito extinguat, quem admodū sanē
& lucernæ flammam oleum igne copiosius adhi-
bitū prompte extinguit. Ego itaq̄ ex historia me-
mini puellum aliquando ex intempēstio antido-
ti usu dissolutū. Etenim diuturna febrī laborabat,
gracilis admodum corpore & uiribus imbecillis,
ut qui uix multa diligentia posset superare. Quæ
cum ego ex medica ratione cōspicerem, etiam ue-
hemētē ipsi medicamentū dari prohibebā. Nam
quidam eius curationi præfectus, qui uidelicet pa-
trem se esse diceret, & tyrannicam imperiā faci-
litate potius haberet, q̄ ex ratione consilium au-
diret, temere & uolenter admodum me compu-
lit ut infanti medicamentū exhiberem. Quod iam
assumptum concoqui non potuit, fortius uideli-
cet eius uirtute qui ceperat. Verum totū ipsius ha-
bitum dissoluit, aluumq̄ fecit profluentem: atque
ita, propter irrationalem medicamenti usum, noc-
tū infans periijt. Porro si in calidiore nonnunquā
uerferis regione, caue medicamine utaris, aeris ca-
litate illic sufficiente. Qua de causa etiā homini-
bus sub primo solis ortu degentibus cum sint cali-
dissimi, & multa inde siccitate prædit, medici-
amentum esse mihi uidetur incongruum.

De salibus theriacis.

Cap. 31

Præparantur & sales quidā ex his bestijs. Nam
illorū etiam meminisse necessariū mihi uisum est,
quō nihil in libro desideretur. Faciunt ἵδema ad

omnia prædicta, modice lōgōq; temporis spacio præsidium præbere habiles: continuo autem usu paulatim adiutæ: quocirca pleriq; ex ijs qui uidentur, ubi non uelox ab eis præsidium sentiunt, nequaquam posse opitulari arbitrantur, maxime quia igne corpus ipsorum in cinerem redigitur, di-centes auxiliatricem eorū uirtutem per uisionem euanescere. Ego quidē affirmo sales, & si uim theriacā imparem habeant, nō tamen omnino robur opitulatorium in eis obliterari.

32 Multa siquidem ignis commercio redduntur meliora: interim latētem ipsorum naturam in apertū ignis ducit. nonnulla uero ad quem uolumus usum accommoda efficit. Aurum itaq; per ignem iudicamus: & adulterinū igne coarguitur, atq; flamma exacte purgatū, probū esse apparet. Iam ferrum igne mollescit, & flexū nobis ad multos uitæ usus habile esse uidetur. Nonne etiā plurima quæ in corpus ingeruntur, nutriendis nobis ignis beneficio reddunt idonea? Panis siquidem, & animalium & piscium carnes crudæ adhuc, appetitus usui sunt inutiles: coctæ, tunc etiam corporum alimenta fiunt. Iam uinum ipsum statim ab uuis expressum, crudum in cōcoctumq; est: solis autem aestu coctum, tūc & suauissimum & maxime potabile redditur. Porro multa in arte medicamina quamdiu ueterem ipsorum naturam retinent, acerrima esse, & corporibus inimica, experientia docet: domita uero ignis necessitate, curationi sunt congrua. Itaq; chalcitis, cruda quidē in corpora urit, & facile crustas excitat: tosta uero, cicatricem ulceribus inducit. Itē lapis phrygius crudus acerrimus est: ignitus autem, & cum alijs quibusdam tritus, bonum sit oculorum remedium. Spongiae combustæ cinis, sanguinis fluxionem potenter inhibet. idem mihi etiam in Theriacis salibus fieri apparet. Omnes enim simul combustæ, ac integre accensæ bestię, prauam uim corporibus inditam ex uisione deponūt, & ab igne auxiliij symmetriam sortiuntur.

33 Peculiariter autē & sales medentur affectibus maxime summa in cute obortis, leucis dico, lepris, impetiginij agrestis. nā superfluitates cuti subditas acresq; potissimum discutunt. Plurimi igitur ipsos manducantes, sudoribus largiter diffusiunt, ac corruptam uacuant substantiam, ut peduculos quoq; uocatos quosdam eijciant ex corruptione proprie nascetes: quos ideo, ni fallor, Græci phtiras appellant. Dentes optime abstergunt, & flaccidas partes densant, fluorem ipsis illabentem reprimunt, à putrilagine dentes præseruant, erodī ipsos non sinunt.

34 Hunc in modū præparatur, conabor enim tibi rursus horū quoq; confectionem sermone describere. Vipera prædictis similes, & eodem tempore capta, numero quatuor, nō biduo plus post uenationē adseruat, sumentur: uerum si fieri possit, eodem die quo sunt captae. Deinde salis ammoniaci, sin minus, communis, colore albi, & leuiter splēdescētis, modius Italicus: mox cū ipsis crassius uidetur Gentianæ creticæ libra una semis. Aristo-

Galen.

lochiae rotundæ libra una semis, Cētaurij tenuis comæ librae duae, Cardamomi seminis, Marrubij, singulorū uncia sex, Scordij, apij, Chamædrys cretica, singulorū libra una, Rutæ satiuę seminis libra una. Melle attico hæc uniuertur, & selibra ipsorum in ollā fictilem nouā coniicitur. Deinde quatuor uiperæ uiuæ, mox scyllæ teneræ, & uehemētē recētes quinq; minutim cōcisa, ita reliqua aliorum pars dimidia adijcitur, ac ubi cooperueris ollam, lutoq; diligenter obliueris, quatuor ipsam foraminibus aperies, ut per ea uapor coctionis mēsuram indicet. Nam primū fumus exire uidebitur copiosus, obscurus, admodūq; turbidus, notans ignem iam bestias inuasisse: quādo te animū quoq; diligēter aduertere moneo, ne tādē momentum huius sumi aerem ex uiperarum exhalatiōe infectū inspīres. Postea ubi uapor cessauerit, & tenuē quandā flammam per foramina eijci cōspexeris, tunc ipsa cocta esse quamoptime cenfero, atq; ita ollā de igne tollito, tota die & nocte refrigerans. Deinde apertos exēptosq; carbones diligēter tūdito, & cū hisce misturis cribrato. rutæ agrestis seminis, hyssopi cretici, singulorū uncias nouē, foeniculi seminis agrestis, nardi gallicæ, spicæ scythicę, singulorū uncias sex, petroselinū macedonicū uncias iij, amomū racemū uncias tribus, origani heracleoticū summatarū uncias nouem, hormini seminis torrefacti uncias tribus, thymi atticū summatarū uncias nouē, malabathri indicī foliorū uncias quatuor, baccarū iuniperi laconici carnis libris duabus, coriandri satiuę seminis uncias sex, pipēris albi & nigri singulorū libris duabus, laseris radicis uncias decē, zingiberis non forati libris duabus, satyrj feminis uel radicis, pullegij montani, fesseli massaliotici rufi, tordilij montani, feminis mentæ, singulorū uncias sex, castiæ optimæ uncias duabus, cinnamomi uncia una. Conare autem ipsa contusa cribrataq; rursus cōtundere, & cribro frequenter incernere, ut adamussim fiat leuiora: atq; sic in uasis uitreis reposita non statim usurpare conuenit, sed post decem ferē dies.

35 Porro ego ipsos præparauī bestiis nō combustis, sed ipsarū pastillis, quemadmodum in Theriaca ostendī confici, miscens ipsos quoq; ijs quæ cū belluis cōburentur, ut quam habeant in se amarulentiam, eam in adustione deponant, tanta pastillorum mensura adiecta, quantum uiperarum numerum habere cōiecturabam, & facti sunt longe præstātissimi, nec cinerem ex adustione in gustu referentes, nec colore nigri, sed etiam qualitate in usu suauissimi redditi, & uires, ad ea quæ dixi peculiariter ipsos facere, euidentiores obtinentes.

36 Hic est De theriacis & salibus theriacis liber, diligēter, si quid iudico, à me examinatus, hæc maxime causā, quoniam & tu in omnes disciplinas studiosè incūbis. Memini enim te cū eloquentiæ studijs egregie inter ciuilita adhuc negocia uacares, uel legeres quoddā problema, iudicasse oratores nō nunquam ut desinerēt multas conari occasiones inuenire ad disputandū. Etenim deos aiebas dum nō uaticinānt, nihil eloqui, interdum uero etiam oracula silent. Est cū & mare tempestatis

tom. 5

q

3

bus

bus nauigari non potest, agmina fluuiorū sistunt, & paulo post rursus fluere incipiūt. Item terra fructus nō semper producit. Quare tuum ego exemplū imitatus, nihil ex his quæ de theriaca quarum

tur omisit: simulq; te adhortor, ut libenter medicamento utaris, quoniam longæuū uitæ tempus usum ipsius exhibere obseruatū est: quod merito ut tibi a dijs contingat, exopto.

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI AD PAMPHILIANVM.

Caput 1. Præfatio, & argumentum libri, ad Pamphilianum cum laudibus ipsius. 2. Quisnam usus præter uim contra uenena theriaca esse poterit? Præfata commodam senectam, longauitatem, acumen sensuum, sanitatem conferuare, à morbis præseruare, sanguinē bonum efficere, aeris & aquarum uitia emendare. Tempus uita: quo quidam Romæ utuntur theriaca cum melle & aqua. 3. Theriaca præstantia contra pestilentem contagionem: nullo alio remedio iuuante, aliquando, nullos qui prius ea uisissent, peste tētos: plurimos uerò postquam correpti essent demum bibentes euasisse. Quod non omnes uulgò de theriaca magnifice sentiant, quoniam antiquata sæpe sit. 4. Quo tempore theriaca à prima confectione sui, quibus in morbis cōueniat, quo modo uis eius probetur. Qua mēsurā exhiberi debeat,

quo cū liquore, in quibus morbis. 5. Quomodo theriaca sit salubris hydropicis, ictericis, abscessū uoci, spurto cruento (ubi etiam de medicamine ex subere) nephriticis, dysentericis, calculosis, anhelosis, hepatis & lienis affectibus, cholericis, cardiacis, epilepticis. 6. Contra eos qui circulatorie prædicant theriacam, etiam ad parua uitia eam cōmendantes, quibus minori sumptu efficacioribusq; remedijs parabilibus facilius succurritur. 7. De apparatus theriaca: & primum de hedychroo. 8. Pastilli scillitici quòs fiant. 9. Theriaci pastilli quomodo parentur. Viperarum electio & apparatus. 10. Reliquorū theriacam constituentium compositio. 11. Ex Critonis sententia, quales quo tempore uiperæ eligendæ. Modus panis cum carne earum. Scilicet quomodo erudenda.

CL. GALENI DE VSV
THERIACAE AD PAMPHILIANVM

THERIACAE AD PAMPHILIANVM

SED NON EST GENVINVS HIC GALENI LIBELLVS.

IULIANO MARTIANO ROTA INTERPRETE.



VAESISTI sepenumero Paphisiane arte componenda theriacæ & usum ex me cognoscere, sed quæ olim à nobis præsens ipse audiui, cum neq; te amplius meminisse existimē, neq; tum satis à me dictum fuisse, nūc oculū nactus omnia

quæ dū essem Romæ uidi per præceptores meos ab hac antidoto effecta, quæq; nos experitè cognouimus, in memoriā reuocauī, redactaq; in exiguū hunc libellū ad te misi, & unā doctū, quo modo, quo tēpore, quibus in morbis, theriaca uti conueniat. quæ si quis ad unguē seruauerit, nunquam à cōcepta spe decidet. ualde em̄ rusticū quiddā mihi esse uidef, occultare ea quæ ad salutē pertinet, pro qua omnes Metropolitæ uota faciunt, utpote qui & priuatim beneficij afficiunt, & publice ornantur per ea opera cōmunis utilitatis, quæ urbi prospiciens moliris. Sed & alias omnes urbes creticas noui animi tui moderationē & omnib. in rebus mansuetudinē, non solum cōmendare, sed etiam amore summo prosequi. nam in Aegypto, Aegyptiq; regia urbe Alexandria, plures uni tibi Cretenlium amici sunt q̄ cæteris omnibus. quamobrem iure quispiam fortunā quoq; miraretur, quæ tuis moribus tam cōueniens nomē imposuit, perinde atq; præfagiret te cūctis amabilem fore. Sed ad theriacam redeo, quā tu tibi liberaliter et à multis facile comparabis. usus uero peritia nostrī in te

studij pignus & beneuolentiæ monumentū erit: ut enim si lyrā aut tibiam aliquis possideat, nec usum noscat, tantumdem est ac si eam nō haberet, sic qui antidotorum aliā uue medicinā domi continet, nec uti sciat, nullam ex eo utilitatem capiet.

2. Quod si theriaca, sicut apud omnes iam inuoluta, ad morsus serpentū et ad uenena tantūmodo faceret, oportebat eam domi repositā tanquā rem preciosā adseruatā negligere, nullo usu, sed sola uetustate cōsumendā. Cū uero præter supradicta, senectā placidam, uitam longā, sensus uegetos, sanitate stabilem promittat, nec solū ab instantibus morbis liberet, sed etiā ab imminētibus. præseruet, nō ab re facturū existimo, quisquis theriaca sanus etiā uti uelit, malitq; potius impendētē morbum preuenire q̄ iam uexantē arceret. Hac de causa Romę principes uiri cōplures alij primo die lunę theriacā accipiūt, alij quartū eligunt, & tribus præcedentibus diebus cōcoctioni dorā operā, curatoq; leniter antea uentre circiter horā tertiā, ex uno cochleari mellis duobus aquæ calidæ cyathis admisto tantū theriacæ sumūt, quantū est Aegyptiæ fabæ magnitudo, nō ut aliquo morbo liberent, sed ne prorius in aliquē incidant, nec sua eos fallit opinio: nam sanguinē theriaca bonū reddit, non quia malam sanguinis qualitatem excernat, sed quia eius contumaciā uincat, et ex inimica amicā efficiat: oris quoq; si quam urbem aut regionem morbosam esse conijciat, uel aquas malignas esse intellexerint, eodē pacto theriacā assument, & eā tanquā lorica quapiam corporis sui statum tuentur.

3. Referam quæ uetustissimū omnium eorum

qui me docuerit, dicere audiui, uirum & medicum A facultatis experientia prestantissimum, & singula ri quadam humanitate insignem Aelianum Mee- cium. Italia olim pestem inuasisse, qua celeriter & multi intercipientur. timētibz igitur omnibus, ut fit, & medicis & principibus autēctorem se fuisse, uel sola theriaca uterentur, nam cætera nihil contu lerant. tunc itaq; ex ijs qui ægrotabant, quamplu res assumpta theriaca conualuisse, paucos in qui- bus uis morbi nimium inualuerat, occidisse; reli- quos omnes quos nondū pestis occupauerat, non modo periculum euasisse, sed ne in morbum qui- dem incidisse. atq; mirum hoc alicui uideri non de- bet, quādo, si haustum uenenum superat, pestilen- tiam quoq; uincere possit: ær enim est, qui corru- ptum cum sit, homines perimit, quod & cōplures medicos & imperitos omnes nescire ne mireris, cum illud etiam eos lateat, inutile ētate theriacam reddi: radices enim, succi, cortices, lachrymæ, semi- na, flores, & carnes sunt ea ex quibus cōponitur, atq; ut hæc singula tempus exinanire potest, ita & quod ex eis confectū est medicamentum antiqua re ualeat: hinc fit, ut qui medicinas uenales habent hoc sensu præditi, inueteratū nimium theriacam alijs uendant, aut etiam amicis donent, ipsi uero cum res postulat, uiribus & ætate præstantē pro- munt, fieriq; non potest, quin ipsi opem afferen- tibus res ex uoto succedat.

4 Subiungam deinceps alias tēporis præscri- ptiones, alia morborū genera, in quibus si quis uti theriaca uoluerit, nunq; frustrabitur. nam percus- si a uipera, uulneratis a serpente, ictis ab aspidē, cōmoris a rabido cane, demū læsi ab aliquo ani- mali quod dentibus aculeo uel contactu frigorifi- co uenenum relinquat, recēs theriaca satis superq; efficacis remediū est. recēs autē est quæ sextū & trigelimum annum nondum attingerit, quo tempore uenenis etiā alijs confert. nam ab eo tempore om- nib. his affectionib. auxiliatur, de quibus mox re- feram, quum multō plures sint alia respectu nu- meri earum quæ sunt relatæ. Efficaciam uero & inefficaciam ipsius hoc pacto deprehendes. medi- cinam quæ uel aluum subducatur, uel uomere faciat, scammonium aut eliborum, uel quiduis aliud hī- sce etiam ualētius exhibe, perinde atq; si aliquem purgare uelles: huic postea bibendum trade tan- tum theriacæ, quantū Aegyptiæ fabam æquet. si bona erit, nō solum nō purgabitur qui assumpsit, sed ne cōmotionem quidem ullam sentiet. sin con- trarium uenient, uetustate deprendes antidoto ui- res concidisse. Sed tempus est theriacæ usum do- ceamus. datur ex tribus cyathis uini, nucis auella- næ magnitudine tam post uenenū uenenosorūq; animalium ictus, q̄ ante, si quis ueneni suspiciōnē habeat. eodem modo illis etiam subuenit, qui ex interna causa & incerta cōsumuntur, tanquā si ue- neno aliquo petiti forent. Tusi sita nouæ q̄ anti- quæ, & quibus costas aut pectus dolor infestat, au- xiliatur ex mullō, si non febrant: si febrant, ex aqua mullā, ad noctē data fabæ Aegyptiæ magni- tudine, quæ quantitas inflatione etiam stomachi,

tormina uentris, dolores intestinorum & colli se- dat: ex aqua tamē & primo mane sumēda est. Ma- gnum insuper comedendū desiderium remittere, prostratumq; idem excitare potest, singulis qui- busq; naturæ functionibus intra consuetū operan- di modum reuocatis. bibere uero oportet horum gratia supradictam antidoti uero quantitate ex aqua uel diluti uini cyathis neq; pluribus tribus, neque paucioribus duobus. Bona est etiā hoc modo ad tollendum omnis typi febrilis rigorem, & perfrige- rationem, & bilis uomitū in aaccessionibus exacer- bationum quandoq; coincidentem. Si quis ue- ro ter uel quater ad summum ante febris annota- tionem aduentumq; theriaca utatur, febrem om- nino tollet, modo uictus ratio non repugnet. Nul- lum enim tam efficacis remediū medicina habet, quod solitum auxiliū afferre queat, si ei uictus uel resistat, uel non cooperetur. creditur etiam re- tentos mulierum menses ducere, mortuos foetus eicere, quos natura etiam si multoties tentet, ex- pellere tamen non potest, his datur ad fabæ Aegy- ptiæ magnitudinem, in colæ ciborium ciboriumq; nominant, ex passo uel aqua mullā in qua dictam- num uel ruta prius feruerit.

5 Utiles insuper est aquam inter cutem ha- bentibus, & regio morbo laborantibus, ex asā- ri decocto. quidam tamen aquam inter cutem ha- bentibus, ante cibum solam theriacam deglutire præcipiunt: alij eam uni cyatho postea commiscēt: ita nanque magnopere illorum sitim leuat, & uni- uersum corporis habitum firmiorem facit, & cum hoc, quōd aquā inter cutem minuit, ipsam etiam exsiccationi paratiorem reddit. facit præterea ad uocem retusam sola & hausta, & ore detenta: qui tamen eam bibere uolet, tragacanthi duplum ad- misceat, et ex mullō uel passo hauriat. qui uero sub lingua continere, colligefaciat medicamentū paulatim oportet, quo modo in alijs quoque præ- cipere solemus, quæ arteriaca à meatu in pectus descendente, nominantur. His etiam qui sangui- nem ē pectore uel pulmone reijciunt, theriaca cō- uent: atque si recens hoc malum sit, ē postea bibenda est: sin antiquum, ex aquæ tribus cyathis: longe- tamen præstantius remediū fiet, si herbæ sym- phyti modicum, aquæ incoxeris. sumi uero debet ad fabæ Aegyptiæ magnitudinem, incipientē noctē, & illucelente die. Romæ quosdam ē præcep- toribus meis obseruauimus in ita affectis homi- nibus, eo etiam remediō cōsueuisse uti, quod ē su- bere constat, cuius compositionem oportuno ma- gis loco, cum opus fuerit, describam. abunde ergo pectus circumquaque ante & retro, hæc medi- cina fovebant, atque ita ferē semper morbum hæc arte superabant. Prodest insuper renem uitijs, uesicæ calculis, intestinorum excoriationibus, ægre spirātibus, demum in fecinore aut liene duriciem habētibus, aliudūe aliquod inueteratum malum, in duritiem habentibus ex aceto mullō dandum est: acetum mullum sumemus, quod ē fauis conse- ctum sit: id enim Hippocrates commodum arbi- tratur in eo libro quem De acutis morbis edidit.

difficulter autē spirantibus ex aceti scyllitici cyatho uno & dimidio; lapidem in vesica habentibus ex apij petroselinū decocto, renū uitio laborantibus ex mulso, excoriationē intestinorū patientibus ex decocto Rhōis Syriaci, comitialib. quoq; si macilenti fuerint, & parū sanguinis habeant, ex aqua mulsa; sin corpulenti & multi sanguinis, ex aceto mulso dari solet. quidam uero approbati medici comitales iubent prius sinapim gargasilare, tum nocte superueniente theriacā quæ fabā graecam æquet ex aqua sumere. demū, ut paucis multa colligā, in quibus alia remedia uī morbi superata nihil cōtulerint, in his theriacā exhibita præter omnem expectationē egregie operatur; quāobrem & cholericis desperatis, & cardiacis præ dolore stomachi deficientibus exhibita tanquam ad uitam eos reuocauit.

6 Cæterū omnia uerbis cōsequi non possum, nec si possem, deceret, cum ex hisce quæ hæcenus recensuimus, deducta usus ratiōe, feliciter uti theriacā quis possit in alijs etiā morbis qui supersunt: nam qui ipsam adhuc magis extollere uoluerunt, reprehendendū sunt, q̄ ei non medicas, sed circularias promissiones attribuerit, dum aurū theriacā dolores tollere, grauem auditū meliorē facere, hebetes oculos acuerit, demissam columellā suspendere, & oris ulcera obducere, narrant. calūnias siquidem ista laus antidoto potius q̄ commendationem affert: nam si minutos hosce morbos uili remedio fanare melius possumus, ignaui est id ipsum pretioso antidoto minus consequi uelle.

7 Sed missa hæc faciamus, cum adhuc de præparatione theriacæ dicendū super sit; indiget enim & hæc industria quadam, siquidem Menecrates confuse ipsam protulit, quam nos in præsentia distinguemus: ac cum hedychroū medicamentū pastillos ex scilla, itemq; alios ex uiperā capiat, nos prius hæc explicabimus quæ cōposita sunt & ipsa, tū alias simplices medicinas ex quibus theriacā misceat, subiungemus. Hedychroū medicamentum ita cōficiet: corticis radicū aspalathi, calami aromatici, costi, affari, ligni balsami, phu herbæ, amaraci, mastichis singulorū drach. vi. florum iunci rotūdi odorati drac. xij. cinnamomi drac. xij. amomi, casia, rha pōtici sin. drach. xv. nardi indicæ folij sing. drac. xvi. myrrhæ croci sing. drac. xij. uino falerno excipe, & dum concorparas, opobalsamo inunge, tum ut in umbra siccescant finito.

8 Pastillos scylliticos ita conficiemus. Scillam luto circum quaq; tege, rectam in ignem quo balneæ calefiūt, inijce, sequēti die eius quod intus est drac. cxx. cape, & farinæ erui drac. lx. ubi commiscueris in pastillos redige.

9 Pastillos autē theriacales ita cōpones: uiperas quatuor uel quinq; flauas accipe, melius est aut tem paulo ante captas sumere, q̄ diueretas: nam quæ multo tēpore detentæ fuerint, magis ueneno sã sunt. cōijcere hoc ex ieiunis hominib. licet: deinde ad quatuor digitorū mensurā utriq; .i. caput & caudā amputa, coriū detrahe, uiscera & intesti-

na abijce, quod superest, in ollam nouā cōijcito, a-nethū adde: serueat, cū cocta fuerint spinas diligēter exime, latent em plerunq; carnes ubi exquiritte collegeris, panis sicci quidē, sed puri tantūdem adijcis, cōmicebis, opobalsamiq; contra ctū, mas-fam totā in pastillos diuides, q̄s in umbra siccabis.

10 Ipsa uero antidotus cui ab Andromacho qui primus ipsam composuit, nomen Galene, hoc est tranquilla, inditū est, quāuis alij qui ipsam ab eo suscepērūt, ut Crito & Critonē secuti, q̄ uiperæ carnes acciperēt, theriacā appellarint, hoc modo cōficitur. Pastillorū scillinorū drac. xlvij. pastillorum theriacalū drac. xxiiij. pastillorū hedychroi drac. xxiiij. piperis nigri drach. xxiiij. succi papaueris drac. xxiiij. cinnamomi, iridis illyricæ, radicis dulcis, opobalsami, rosarū rubearū, scordij cretici, seminis napi, id est rapi agrestis, agarici sin. drac. xij. croci, myrrhæ, zingiberis, rha pontici, radicū quinquesolij, calamēthi, marrubij, petroselinij, scœchadis, costi, piperis albi & longi, dictami cretici, florū iunci rotūdi odorati, thuris masculi, terebinthinae chiæ, casia fistulosa nigra, nardi indicæ sin. drac. vi. sumitōs polij cretici, styracis, seminū sefeleos, thlaspeatos, ammeos, trixaginis, chamæpityos, succi hypocyttidis, malabathri, nardi gallicæ, radicū gētiana, anisi, mei, seminū feniculi, sigilli lemnij, chalcitidis ustæ, amomi, carpo balsami, phu pontici, hyperici, acaciæ, cardamomi, gūmi sin. drac. iij. seminis dauci, chalbanij, sagapeni, bituminis, succi pangacis, castorij, centaureæ tenuis, aristolochiaefing. drac. iij. mellis atticij libras x. uini falerni sextaria duo. his ita paratis in mortario conijce succum hypocyttidis & glycyrrhizæ, myrrhæ, opium, saga-penum, styracem, acaciā, opopanax, melq; paulatim instillando simul omnia contunde & dissolue, tātum q̄ uini demum infunde, ut superferatur, hæc tribus diebus ita macerato, postea cinnamomum, crocum, casiam, nardum, thlaspim, malabathrum, sigillum lemnium, chalcitium ustam. hæc enim nigro colore theriacam commendat, si cite combusta fuerit, amomum, bitumen, castorium, si gillatim quodq; contusum & cribratum in pilam mitte, & affundens uinum, ac si collyrium faceres, diligēter commisce: postea quæ in mortario sunt, in pilam transfunde, diligenterq; commiscēdo uinumq; infundendo sicca omnia superadde, atque in unum corpus redige, deinde mel, terebinthinam, chalbanum, opobalsamum in cacabo tepescita superinfunde ijs quæ in pila sunt, omniaq; in unū corpus redige, & in uase stanneo argenteoue repone & utere.

11 Crito hoc plus de theriacā scriptum reliquit, Uiperas uere finientes uel autūno, cōprehendas esse, eligendasq; illas quæ magnæ & corpulentæ sint, anethoq; imposito elixandas. carnis autem decem uiperis collectis, unam panis siliginei unciam admiscendam censet, atque ita pastillos theriacales appellatos conficere. rursus scillas mensis tempore colligendas iubet, quod eo tempore præcipue uigeant.

De antidotis.

Cap. 1. Quæ dicantur antidota. De Mithridatio, ex quo nata est theriaca aurore Andromacho. Theriaca & Mithridati comparato. Dosis & tempus antidotorum, cum historia Mithridatis. 2. De Opio. Quomodo imperator Antoninus theriaca sit usus: & Galenus eam ipsi parauerit. 3. Contra illos, qui dum parant theriacam pluribus imbecillibus pharmacis unum aliquid in suo genere uehemens adijciunt, cuius deinde uim totum compositum præ cæteris refert. 4. Optima & uera medicamenta à minus bonis & adulteratis, non ex libris, sed frequenti inspectione oculari discernit: aut ab aliquo perito doceri. Item quomodo comparare nobis optima medicamenta debeamus, uel per amicos, uel peregrinatione propria, ea præsertim quæ tota uita seruari possunt, qualia pleræque omnia metallica sunt. 5. Peregrinationes Galeni propter simplicia. Bitumē, carpobalsamū, & xylobalsamum adulteri non possunt. Terra Lemnia, eiusque adulteratio, & Indici Lycij. De Lemni amicis in uarijs partibus orbis ad medicamenta mittenda.

In Italia Putolis habetur ærugo, cerussa, & æris squama: Romæ lithargyrus. 6. Quod Creta plurimis simplicibus medicamentis abundet, quæ ad plurimas gentes mittuntur: & quod nihil a dulteri in Creta solcat, præter succos aliquos, ut absinthij. Quomodo quæ in unoquoque genere optima sint cognoscantur. 7. Nota optimi mellis: & quod mellis uitio theriaca uinosa tancē fiat: quod Cnidio melli accidit, licet Hymettio simili assit. 8. Quod theriaca acceat uel panis uitio, qui non bene paratus & nimis uiperinæ carni miscetur: uel propter uini quantitatem, qualitatem, ætatem. De uinis aquosus: de uinis fortibus. Surrentinum Phalerno æquiualeat. 9. Quomodo uina a quos diu conferuntur acceat: obiter de stoebe herba. 10. Quale uinum sit injiciendum theriacæ, & priuatim de phalerno, cuius alterum genus uinosius est, alterum dulcius Faustianū dictum. 11. Iterum de melle quod non nimis uetustū adijciendum sit theriacæ, amariū enim & nigris sit uetustate, non multo autem densius sit quidem bonum sit. Et quibus in locis optimum habeatur. Mel de cytho.

12. Ad theriacam omnia medicamenta præstantissima esse oportet: ad minores compositiones, non ita. Romæ facile haberi copiam medicamentorum omnium. Apud principes, imprimis imperatores Romæ, ob rerum copiam theriacam optimam parari posse. Opobalsamum. Falerni delectus. 13. Iterum de mellis Hymettij delectu, & eius adulteratione. 14. Iterum de uini electione, si phalernum desit: & quibus in locis nascantur optima. Tale est suluum, tenue & translucentū, non nouum, nec ita uetustum ut iam amarefeat: odoratum, & dulce. pleræque enim alia theriaca pharmaca amara sunt. 15. Medicum peritum esse debere stirpium omnium, aut plurimarum saltem & quæ in frequente sunt usu. Tempus cogedi. 16. Theriacæ descriptionem in multis exemplaribus corruptam & ponderibus uariam haberi: ideoque laudandos esse qui ipsam aut carmine describunt: aut prosa quidem, sed uocabulis integris numerorum. 17. De theriacæ, id est medicamenti ex uiperis, quod & Galene uocatur, compositione Andromachi senioris Elegia: In qua primum copiose docet contra quæ uenena, quos serpentes, quos & quot morbos theriaca proficit: dein de apparatus eius docet.

18. Eiusdem descriptio soluta oratione Andromachæ

junioris. Notandū quod senior Andromachus non meminuit erui in scilliticis pastillis: & quo loco iunior aurore, senior sagapenum habet: in piperis etiam generibus & ponderibus, &c. differentia quædā sunt. 19. Apparatus pastillorum theriacorum. Viperas capiendi tem pus: cauenda grauidæ, maritimæ, mares: & feræ similes uiperis ut ammodites, hamorrhus, seps. de sale & pane admiscendis: Quod tenues fieri debeant. Vbi, quomodo, & quando desiccari debeant. De uasis ad recedendum aptis. pastilli theriaci quantum durent. 20. De pastillis de scilla perandis. 21. Hedychoi apparatus: a quo diuersi sunt & inter se qui ad Pisonem & Pampilianum scribuntur. 22. Docet posthac singulorum simplicium pharmacorum theriacam constituentium electionem, seruatō Andromachi ordine. Primum autē de pipere longo, & sagapeno: quod quia aliquando fit optimo galbano in ipsum degenerare, per occasionem digreditur ad similem casum in cinamomū, & myrrhæ in opocarpalum uenenum conuersione. Multa exercitatione opus est ad discernenda & eligenda simplicia. Galbanū & sagapenum ex galbano æquipollent. Opocarpalum, rosa. Locus exsiccandi. 23. Deiride, quæ ex Illyria omnium est longè præstantissima. Quomodo unumquodque in suo genere præstantissimum deprehendatur.

24. De succo dulcis radices, femine napi agrestis, & scordii, Dioscoridis commendatio. Et quod ipse ea tantum hic tradat in simplicium electione quæ ueteres omiserunt. 25. De opobalsamo, & eius adulteratione.

26. De cinamomo, & quam diu duret: nota optimi cinamomi.

27. De agarico, myrrhæ, costo, croco.

28. Quod duplex casus in uicem simplicis cinamomi possit accipi: de carpesio, quo Quintus medicus loco cinnamomi utebatur. Tum de casu differētis.

29. De nardo Indica, iunco odorato, thure, pipere, rheo & stœchade. (Aglæia Andromacho, quasi Galenus quid sit ignorat. Ianus Cornarius uir plurimæ lectionis piper album interpretatur.)

30. De petroselino & terebinthina. Zingiberi, quinquefolium & polium non adulterari. Chamæpitys & chamædryis. 31. De styrace, Celtica nardo, Lænia terra, thalpsi, Centauro, & aristolochia.

32. De confessione theriacæ. Sæpius uis differe oportet optima quæque. De electione generali radicum, seminum, liquorum & succorum.

33. De mortarijs, & quanquam in eis contundi debeant.

34. Quæ laugari cum uino debeant, ut myrrhæ, crocus, succi omnes, thus, gummi.

35. De his quæ liquefunt, & reliqua omnium commixtione. Opobalsamum omne absumentum inunctio pistilli.

36. De colore theriacæ, & chalciditis apparatus.

37. Theriacæ descriptio senarijs à Democrate comprehensa, quorum hæc summa est. Theriacæ usus ad uenena: Ad bestias uirulentas: De dosi & frequentia utendi: Enumeratio morborum ad quos conuenit. Qua mensura & quibus adiectis: & quando singulis in morbis propinetur.

Apparatus antidoti, primum quidem pastillorum ex uiperis, deinde de scilla: Mithridatis historia: Rei quorum simplicium cum ponderibus suis enumeratio. Modus apparandi: Vasa ad reponendum.

38. Alia theriacæ compositio uersibus heroicis.

39. Critonis scripta de theriacæ: nempe de uiperis capiendis & parandis: de scillinis trochiscis: de modo tundendi & cribrandi.

CL. GALENI DE ANTI- DOTIS LIBER PRIMVS

IVL. MARTIANO ROTA INTERPRETE.



MEDICAMENTA, quæ a
nō extrinsecus imposi-
ta, sed intus assumpta
malas corporis affectio-
nes sanāt, antidotos me-
dici uocāt, quarum tres
sunt omnes differētiæ:
nam aduersus exitiales
pōtiones quædā faciūt,
quædā ad feras ualent,

quæ uenenū ictu morsuue relinquūt, quædā exci-
tis mala uictus ratione morbis auxiliānt, nōnullā
uero trā hęc simul pollicēnt. cutusmodi est quam
theriacā uocant, quæ ab Andromacho medico re-
perta Mithridaticam penē antiq̄uauit, ita & ipsam
ab auctore suo dictā. Mithridates em̄ iste, quem ad
modū et apud nos Artalus omnīū fermē simplicīū
medicamentorū, quæ uenenis aduersant, sedulo
uim expertus est, in hīscē homīnib. qui morti con-
demnati fuerāt, reperit itaq; priuatim quædā pha-
langijs, quædā scorpionibus, quædam uiperis ad-
uersari. Item eorū quæ ad exitiales potiones faciūt,
illa aconito, hæc lepori marino, alia aliq; aliq; ue-
neno remediū esse. quę om̄ia cōmiscens Mithrida-
tes, medicamentū unū effecit, ex eo se sperās auxi-
lium uenenis omnibus præsens habiturū. subsecu-
tus aut̄ multis post annis Andromachus inter Ne-
ronis medicos primus nōnullis additis, quibusdā
ademptis, theriacen quā appellat, cōposuit, haud
exiguā partē carnīū uiperæ quibus Mithridatica
antidotus carebat, ceteris admiscēs, saneq; idcirco
theriaca ad morsus uiperæ plus Mithridatica ua-
let: ad reliqua uero om̄ia nō modo quicq; illa plus
nō potest, sed est in quibusdā inferior etiā. neutra
tamē eam uim habet post uenenū accepta, quā an-
te sumpta habuisset: nā portio antidoti quæ prius
& semel hausta, tutū à morte quemp̄s præstitisset,
ca uenenū subsecuta, nisi in quadruplum quincup-
lum ue aucta, nō iuuabit; neq; id semel tantū, sed
bis singulis quibusq; diebus hausta, faciet. Quod si
quis singulis dieb. quæadmodum tēpestate nostra
Aurel. Antoninus imperator, uel sicut olim Mith-
ridates solebat, antidotū capiat, nullis noxijs po-
tionib. lædet, id qd ipsi Mithridati cōtingisse ferūt,
qui cū poti⁹ ueneno mori q̄ in potestate Rom. ue-
nire decreuisset, nihil inuenit qd se necare posset.

2 Atq; hoc quidē Mithridatici euenisse accepi-
mus, nos autē Antoninū scimus, quo se in primis tu-
tum à ueneno præstaret, singulis diebus tantū the-
riacæ quantū est Aegyptiæ fabæ magnitudo sum-
pisse, interdumq; sine aqua aut uino eam deglu-
tisse, interdum uero liquidū quippiā admiscendo
ebibisse. sed cū ipsūm quotidie inter uitæ func-
tiones quoq; profundo somno corripia accidisset, pa-
paueris succū eximi iussisse, quæreretur euenit,
& quia mos eius ita antea fuerat, q̄ naturalē tem-

peraturā corporis siccorē haberet, & quia multo
iam tēpore exciccantē antidotū accepisset, pluri-
mā partē noctis insomnē duceret, quāobrem coa-
ctus est denuo theriacā allumere quo papaueris
succū haberet, iam aliquo modo inueteratā. dictū
est autē à nobis aliās saepe huiusmodi medicamēta
inueterata, mitorē eum succū habere. Fuit autem
hoc, quo tempore suscepto aduersum Germanos
bello, & ille in prouincijs, quæ secus Istrum sunt,
degeret, & ego me illum eō subsequi posse excusa
uerā. uerū quia imperator antidotū laudabat à De-
metrio medicorū primario consecrā, eo uita sun-
cto Euphrati medicæ materię uēditori, à quo sim-
plices omnes medicinas ad theriacā conficiendā
ille acceperat, per literas significauit, ut sibi renun-
ciaret quis nam medicus imperatoriā antidotum
conficienti Demetrio affuisset. ab eo itaq; cum in-
tellexisset me semper Demetrio quoties theriacā
cōponeret, astitisse, tum quidē eam me per literas
cōponere Antoninus iussit, Romāq; postmodum
reuerus, q̄ ea præcipue delectatus fuisset, percon-
tarus est, quānā simplicīū conuenientia ipsam mi-
scuissēm. cui ego rem ita ut se habuerat, aperiens,
retuli primum me quicq; eorum quæ ab antiquis
imperatorū medicis imponi consueūt fuerat, neq;
omississe, neq; addidisse: deinde causam exposui,
cur mihi ipsi ea cōpositio maxime placuisset; de
qua nunc quoq; dicere cum nobis decretū sit, eor-
um quæ tunc facta fuerunt, mentionem feci. nam
Antoninus cum singulis quibusq; diebus magno
cum studio theriacē sumeret, eius uirta uirtutesq;
exactissime dignoscebat.

3 Conficitur autem pulcherrime & hæc, & al-
ia fermē quæcunq; medicamenta, si eorum quæ
imponuntur uirtutis & facultatis inter se propor-
tio seruata fuerit. pleriq; uero, primum omnīū ne
sigillatim quidem unumquodq; eorum quā bonum
malum uel sit diiudicare sciunt. quare nec uir-
tium inter sese proportionem scire possunt, & id-
circo ubi plurima uel tempore uel genere debilia
interdum immiserint, ualidum ac potens aliquod
postea commiscunt. ueluti olim quidam qui cum
ab Aegyptijs petitum Thebis opium (id autē est
potentissimū) imposuisset, & gustu & uiribus si-
mitem Philonio theriacam fecit. idem rursus, cum
myrham quā optimam pluribus inualidis admi-
scuisset, ut cæteris ipsa dominaretur effecit. alius
quoque similiter in croco peccauit, & alius in sa-
gapeno, ut & alius rursus in asphalthis & galbano.
nōn pauci uero & duo & tria sic, ut diximus, uali-
da debilibus admiscentes, in causa sunt ut inuali-
dis fortia præualeant.

4 Atq; artem quidem antidotos conficiendi,
si quis acuto uir ingenio uel semel tantum inspex-
erit, facile discet, ut uero eorum quæ imponuntur
notitiam consequamur, non semel, bis uel, aut ter,

sed sapius admodum sigillatim quæque obseruasse necessarium est, etiam si quis attentius ab aliquo comonstrante ac verbis docente cuiusmodi sint, quæ sunt optima, discat quod si nullo monstrante, ex libri aliqui cuius lectio, quod genus est, opus Heraclidis Tarrentini, item Crateæ, Dioscoridis, Nigri, Iollæ, Rufi Ephesii, aliorumque quorundam, in eorum cognitionem peruenire aliquis uelit, longe maiori ipsi opus est inspectione, prius quam exacte singularum medicinarum uirtutes ac uitia diiudicare sciat. nam qui simplices medicinas diuident usque adeo calide illarum qualidam concinnant, ut exercitissimos etiam quosque ea in re uiros decipiant. quapropter optimum est multo ante eas sibi per amicis inspectarum fidei sibi comparare, ubi electissimam prouenire solent, uel illuc semel accedendo secum in uentum earum asportare, quantum per totam uitæ spatium sufficere possint, cuiusmodi sunt ferme omnia quæ metallis nuncupantur.

5 Cyprum itaque & nos hac de causa uisere uolumus, ubi amicis magnæ auctoritatis hominem eum haberemus, sordalem procuratoris, qui Cæsaris nomine metallorum fodinis præerat, & cadmiâ, & diaphrygem, & spodiû, & pompholygem, & chalcitum, & misy, & sori, & æs usum, inde multum asportatum, quemadmodum rursus est Palæstina Syriæ balsami liquorem purissimum, nam bitumen iudaicum ne fraudes quidem ullas admittit, sicut neque balsami fructus, neque lignum. Nauigauit quoque in Lemnû insulam, diu norunt, non alia de causa quam ut lemniam, siue terram quis uelit ipsam nominare, siue sigillum, agnoscerem. dictum est autem à nobis satis superque de hac in nono De simplicibus medicinis libro, hanc inquam siue terram, siue sigillum quis appelleret, adeo quidam interpollant, ut ueram à ficta dignoscere queat nemo, uelut & quod lycium indum appellatur, aliaque complura quæ non nisi magna cum difficultate secerni possunt ab adulterinis. atque hæc per eos qui talibus in locis diuersantur cõquirere opus est, uel per præfectos & senatores, qui illis regionibus præsunt, uel saltem per amicos sibi habitâtes, quomodo me facere uisidisti, apporantur namque mihi quædam ex magna Syriæ, quædam est Palæstina, quædam ex Aegypto, nonnulla est Cappadocia, ex Ponto alia, pleraque est Macedonia, & ex prouincijs ad occidentem positas quas Galli habitant & Hispani, & oppositas oras incolentes Mauri. quænam igitur quocumque in loco medicamenta optima proueniât, cum alijs, tum Dioscorides uerissime scripsit. nos uero, ut dicebam, ipsa comparare opus est, eo quo diximus modo, præsertim si Romæ habitemus, quo ex uniuersis generibus quam plurima quotannis aduehuntur. multa quoque per ipsam Italiam partim sponte nascuntur, partim arte fiunt, uelut Diæarchiæ Puteoli nunc dictæ, arugo, cerussa, æs, æris squama, quædam alia: & Romæ, lythargyrium, hoc est argentis puma. Non pauca uero penè singulis quibusque diebus Romam importantur, quæ est Sicilia & magna Libya quotannis æstiuo tempore aduehuntur, præsertimque est Creta.

6 Multa namque herbarij qui in Creta à Cæsare aluntur, non solum ipsi Cæsari, sed & toti Romano ciuitati uasa hisce rebus plena mittunt, quæ quæ uimibus cõtexta sint, textilia uocant. tam multa itaque uasa Romæ & in nationes alias est Creta afferuntur, ut nullius rei prorsus quæ sibi nascatur egeamus, non herbarij, non fructuum, nec seminum, non radicum, non succorum, ac reliqua licet omnia sincera quidem inde afferantur, succos tamem aliquos adulterari, quamquam raro, cõtingit. nam cum herbarum copiam insula gignat, fraudulententer concinnare quicquam non admodum curant herbarij qui in ea degunt, nec si curarent, magna, quemadmodum in alijs ea fraus esset. nam in succum absinthij quem solum conficere debuissent, marrubij quoque expriment, aut exiguum quissimum hoc genus interpollant, quam ob rem Romæ si quis unguentarios adeat qui singulis quibusque annis uasa illa textilia herbarum plena emunt, ab eis primo omnia hæc cognoscere poterit, etiam si nunquam antea ipsa uidisset, deinde ex frequenti inspectione quale sit optimum quodque per seipsum intelliget. qui enim memores sunt eius quod superiori anno emerit, cum aliud melius illo uidet, facile hoc illi præstare diiudicat. ex herbis siquidem quæcumque unâ cum semine sunt mis ramusculis adherente apporantur, pro cuiusque tamen conditione, plurimum seminis habentes, non habentibus, uegetas exilibus, plenas raris ac lenibus, compactas flaccidis, tempore non consumptas, cito absumptis potiores arbitrantur. alius planè is esset, qui ista cogitare nesciret, atque ut hæc percipere difficile non est, ita nec gustu & olfactu quid optimum sit diiudicare laboriosum erit, hisce tamen qui eadem sapere inspererint, nam qua in re medicamentum gustu olfactuque tentatum excelsit, id ea in re ualidius sui generis alijs est.

7 Mel itaque quod optimum esse perhibetur, dulcissimum est & acerrimum, eo quod mellis natura acrimoniam dulcedini iunctam habet. quoties igitur mustum est dulcibus uuis expressum ad dimidias tertias uel coquendo deferuerit, quauis dulcedine mellis non cedat, ut aqua tamem obtusum est, nec sensum uellicat. atqui mel eiusmodi non est, sed acrimoniam ita dulcedini iunctam habet, ut præstantissimum id sit quod hisce duobus excelsit. ac primæ quidem optimi mellis notæ ex hisce sunt uirtutes, secundæ uero ex accidentibus colliguntur naturam eius consequentibus, colore, odore & compage ac partium inter se conuenienti habilitate. colore namque luteum mel sit oportet, compage uero neque crassum, neque concretum, neque ualde dilutum, sed uniformem totum, atque ita tenax, ut si digito particulâ ex ipso sustuleris, defluereque permiseris, perinde atque uiscum descendat, non distractum, neque abruptum. quancumque ob ista mel optimum quidem non est, sed cum suaapte natura optimum est, tum hæc se consequentia signa semper habet, ipsumque idcirco optimum esse ista significat. Quam ob rem simplex quodque medicamentum sapius quicque contempletur admoneo, quod memoria teneat quantum quodque dulcedinis, aut acrimoniam,

aut alicuius sensilis qualitatis habeat, neque enim qualitatum gradus uerbis ullis explicari queunt. accedit præterea & aliud quoddam iudicij genus, quod uis uiscuicuisq; medicamenti penditur, longa experientia comparatū, quod oratione declarari nō potest. mel quippe ē Cnido aduectum, si quis signa quæ modo retulimus attendat, optimum adeo censebit, ut id thalio & hymettio proximum esse iudicet, quod tamen ubi consensuit, ut tium haud paruum ostendit. uini namq; conditiones assumit. idem quoq; rhodio accidit. unde quidam theriacā rhodio melle cum admiscuisset, de indeq; tertio post anno ipsam mihi non modo gustu, sed etiam odore uinū redolere inuentā ostendisset, & eam ego cōspexissem, id quod uenerat, ex melle quod impoferat accidisse dixi, mirabatur autē ille. tum ego rursus eum interrogauī, nunquid et mel plurimum coxisset, ipsum' que diutius despumasset. quæ fecisse cum fateretur, ob hoc etiam mirabatur, ac si recōditū quippiam ex me audiuisset. hic ipse suam temeritatem damnare cepit, quod ex sola librorum lectione theriacem conficere ausus foret.

8 Alius quoq; theriacā mihi uidentam obtulit quam composuerat, acidā factam, cauſamq; sciscitabatur: cum ergo ex me cognouisset se plus uini quam par fuerat impofuisse, nec optimi nec antiqui, forsancq; & plus panis q̄ decebat nō rite cōfēcti uiperinis carnisbus admiscuisse, sicq; rem se habere cōfessus, suam proteruitatē damnauit. In primis itaq; prouidendum est, ut id uini genus imponamus quod firmisimum esse nobis experientia compertum sit, tum ut ualidum quoq; quod non amplius mutatum iri per multos iam annos exploratum nobis sit. nam & debilissima uina, & ueluti quispiam diceret, aquosissima, uel magnopere auſtera, quæq; præ cæteris acescere solent, primis annis acida facta, ita de cætero manent: est autem uino commutationis tempus aliq; aliud. aquosis quidem non multorum annorum: ita enim uina appellant colore alba, compage tenuia, atque ut diluantur nō multæ aquæ indigā. demum talia cum sint, ut nec caput omnino perunt, ita nec corpus plane calefaciunt, nec uentris uenarumq; concoctionem euidenter adiuuant, nec deniq; bene alendo corpori conducunt. celerrime omnium uina hæc inueterantur. appellant autem cito inueterari peritū harum rerum, ante tempus antiqui uini conditiones assumere: sunt autem, acrimonia primum qua plane calefacit, tum amaritudo quoq; ad quā subinde transit, interdum tamen & aquosa quædam uina ad uetustatem peruenisse uidimus, si primis tribus annis uel quatuor non acida facta fuerint. At potentia & auſtera & alba uina, crassa tamen, quandoque post decennium etiam nō rite seruata acescere contingit, contingit & quam plurimo tēpore uetustescere. talia sunt in Italia tiburinum, signinum, marsum & surrentinum, tiburinum tamē & marsum, auſterū est, & si improvide reponatur, acescit facile. signinum uero ualidius, & minus acescit, inueteratumq; optimum euadit;

A de surrentino autē quid me dicere opus est: quod omnes iam sciunt ante annū ferme uigesimalū crudum adhuc esse, uigesimo em tandem anno uiget, potuicq; aptū diu perseuerat, nec facile amareſcit, præstantiaq; cū salerno cōtendit. contrarias ihs dispositiones aquosum uinū subit, albanū, sabinum, & quod in Gaurō monte nascitur, quæ parte Puteolos urbem spectat, quodq; in collibus Neapoli uicinis oritur, amarinum quidem nūcupatum, sed tenue, nec tale quale in Sicilia et Bithynia nascitur amarinum. nam licet apud has gentes non nihil tenuis & aquosi uini gignatur, non tamen ualidum abest à Sabino quod in Italia nascitur, neq; ab arſino & titacazeno quod in Asia prouenit, aut ab eo quod à nostris tibenū uocatur, ita à regione Tibi in qua conficitur, denominatum.

9 Atq; hæc omnia uina facile contrarias qualitates suscipiunt, acidam dico & amaram, acidam quidem à principio, amaram uero si postea perdurauerint. locus tamen in quo uinū reponitur multum facit, ut ad alterutram qualitatem mutetur. optimus itaque inter iniſia locus frigidus est, tum calidus, uel ē contrariū multum calidus primo; quoniam tepidus locus uina facile acidā reddit, quamquam uina quæ duobus aut tribus annis frigidō loco reposita, bona manserint, in cellam calidam satis transferri postea desiderant, nec unquā repida temperataq; indigent. reperiuntur tamen quædam uina uſque adeo aquosa & debilia, ut frigus ne à principio quidem ferant, quæ pater meus experiendī gratia cum in calidissimam cellam detulisset, stoebe cum multa tum calida plenas lagenas contexit, uotiūq; compos effectus, nunquā uelinceps acidum uinum habuit: sed quam celerrime uetus effectum. quo modo autem unusquisq; cellam uinariam calidam sibi comparare possit, ut & pater meus, iam exponam. Apud nos omnibus in agris atria magna extruuntur, quæ focum in quo ignis accenditur, in medio habent, nec procul inde iumentorum præsepia sunt uel utraq; ex parte dextra & sinistra, uel ex altera saltem. furni autem foco iuncti sunt ab anteriori parte quæ ad fores totius domus spectat. tales itaq; sunt domus omnes in agris etiam si frugaliter ædificatæ sint. nam quæ maiori cura fabricatæ sunt, exedræ habent ē regione iniuria sitam ad parietē qui intus est, & utriūq; cubicula, quibus aliæ cellæ, quemadmodum & in multis cauponis circuitu trium & sæpe quatuoratrij parietum dispositæ superincumbunt. ex his autem omnibus cellis ea plurimum ab utroq; latere contegitur, quæ exedre instat, quamq; pater meus uino reponēdo eligebat, quod in dolijs deferuisset. nam ut firmiora uina priusquā feruere in fide lias transferre, sic infirma calido in loco seruare uoluntates solent. melior autem ad id ea cella est quæ ad meridiem spectat, & à septentrione auersa est. herba uero quædā apud nos inuenitur fruticosa, calida, & acris ualde, parūper ar omata redolens, quæ incolæ colymbadem, aliq; stoeben appellat, ad præseruandum uina aptissima. in hac itaq; fidelias rustici collocant, atq; parietem unum superioris cellæ

cellæ qui in atrium respicit, in quo furnum & focum esse diximus, amplius fenestras aperiuunt, agnoscētes calorem per fenestras ingressurum celam in qua fidelitæ repositæ sunt. Cella igitur uinaria partim calore ex atrio ascendente calefacta, partim herba stoebe confortata, uinum quodcumq; repositum accescere non sinit. quod si quis magis adhuc hoc consequi, nec unquam aberrare desiderat, uinum fidelis infundat non nouis, sed alijs e quibus antiquum uinum iam exhaustum sit. similem quoq; morem seruandi uinũ & in Italia obseruauit, in agro Neapolitano & Neapoli uicino colle, quem Trifolinũ appellat, multisq; alijs in locis Italos accepit, ita uinum calefaciendo præseruare: uerum eiusmodi uinũ ut firmius euadit, sic & capitis dolore facilius parit, eamq; ex fumo qualitatem acquirit. fugienda sunt autem omnia eiusmodi uina nec medicamētis admiscenda quæ corpus intrat. nam in emplastris & id genus alijs medicaminibus quæ foras admouentur, si optima desint, talibus quoq; uti nihil prohibet.

10 Eligenda sunt itaq; in conficiendis antidotis uina supra naturam firma, inter quæ Falernum non hac re solum excellit, uerum et omnibus alijs dotibus antefat, eligēdumq; ex Falernis id quod nondum esse uetustate amarum, ut aliqui faciunt, hac in re ab ijs qui theriacam rite conficiunt, aberrantes. cum em audierint id quod semper ab omnibus dici solet, senescere cætera temporis diuturnitate præter uina, summe uetustum uinum admiscēt. neq; uero hac in re una delinquūt, sed in alia etiam peccant, dum ex eo quantum admiscere debeant, cōiectare nesciunt, quod in libris medicinarum compositionem continentibus quantum uini infundere conueniat expressum non sit, cum autem Falerni genera duo reperiant quæ sese uirtute nihil superant, dulcius, quod Faustianum proprie appellant, gratiores antidotũ facit. quem admodum ergo qui fugiens uinum & accescere solitũ antidotis adhibent, magnopere peccāt: nam tamen nullum de se uitium habeat, commissum tamen rebus alijs plerumq; accescit: sic & qui Falernum eximia uetustatis immittunt, errant. ipsũ namq; antidotis amaras reddit.

11 Mel quoq; uetus admodum alijs quidam medicus, ut & de Falerno uino diximus, imponat, tali ratione motus. si mel quod optimum antea uidebatur admistum antidotis uinum effectum est, tutius est multo illud mel admiscere, qd sicut & uinum temporis longitudine consuet in corruptum esse. Atq; hoc sanè mel uetustate subamarum tum fuit, posteaq; plus etiam quam par fuerat coctũ, magis adhuc amarũ euasit, id quod omni uetusto melli, simulatq; decoctum fuerit, euenire solet. Atq; hoc admirabile non est, cum etiam si coctum non sit, dulcedinem tamen cum amaritudine uetustate cōmutet. Pater meus mel quoddam habuit ita amarũ, ac si in Ponto natum foret, eo in tractu, ubi ex absinthio apes mel colligunt, id ipsum tamen & Atheniense & optimum fuisse dicebat, uerum temporis diuturnitate ama-

rum euasisse. Hoc quoniam inutile mihi uidebatur etiam post patris obitum, nũc usq; seruamus, amarumq; adhuc plus quam tũ fuerat effectum est, & nigrius, non tamen crassius multo euasit, id quod mellis optimi præcipuum indicium est. Si quidem mel quod in Eleunte Chersonesi nascit illo in loco, ubi Protefilai sanum extat, quamuis diu easdem condiciones habeat quæ & Hymettium, crassius tamē & cōglobatius processu temporis efficitur. Conscienda sunt igitur in antidotis mella quãtum fieri potest, optima Hymettia, Thasia, aut certe Attica, quibus si careamus e Cy cladibus aduectum mel imponemus quodcumq; similis Attico fuerit. quanquã in Isthmo quoq; bonum mel prouenit, ita Isthmiacum, a loco ubi nascitur, cognominatũ. sicut & Tubreum, quod et ipsum, nomen adeptum est. Celebrata autem mella hæc sunt. nam mel in alijs etiam regionibus optimum conficitur, sed cum ob exiguitatem ab incolis totũ absumatur, in alias prouinciis nõ exit, nomenq; idcirco ullũ non habet nostra siquidem in Asia collis quidam inter Pergamũ & Eleam urbem maritimam porrigitur, thymo scatens, in quo apes optimum mel reponunt, quod ibidem totum absumitur. Occurrit autem collis iste à læua Pergamo Eleam abeunti, uia tamen uicinis non est: in Mysia quoq; qua parte nostræ prouinciæ finitima est, tractus occurrit, quem Britũ nominant, in quo mel Attico simile penitus magna cum admiratione cōspexi, quamquam deteriora planè mella ibi quoq; proueniant. extabat autem ibi quoq; monticulus quidam non magnus, saxosus totus, thymo & origano plenus, ad cuius radicem agri cytiso quam plurimum abundabant. ex eõ collis dominus mel usque adeo dulce colligebat, ut hac in parte Atticum etiam superaret, acie tamen, ut Atticum non erat: statimq; idcirco se gustantes auertebat, & nauseam cito commouebat, si paulo liberalius comestũ fuisset: hoc siquidem de cytiso scriptores uno ore tradunt. Apes ex cytisi floribus plurimum mellis excerpere. fruticosã uero planta cytisis est eam altitudinem attingēs, ad quam myrtus crescit.

12 Dicta autem à nobis hæc sunt, non solum ad utilitatem medicorum qui Romæ diuersant, quod singulis annis optima quæq; ex omnibus prouincijs compertantur, sed etiam ad cōmoditatem eorum qui in cæteris orbis terrarum partibus degunt. nam si rerum optimarum notas agnoscent, eximia quæq; eligere sciēt, quæ apud ipsos in suburbanis & uicinis agris populis uel nascuntur. Philonium igitur si quis conficere uelit, aut aliquantulum minorem antidotum, medicinis non eget omnino bonis. at si uel Mitridaticam, uel theriacam, uel aliquam aliam maiorem antidotũ componere moliat, quæ & multa comprehendat, & cinnamomum accipiat, optimis quibusq; indiget medicinis, quæ quoniam alio in tractu quam Romæ haberi non possunt, propterea tales antidotos Romæ conficiunt non solum optimi quique medici, sed etiam unguentarij, qui tamen omnes

in earum compositione nunc plus, nunc minus im-
pingant, eas tamen usui non inutiles conficiunt,
quo tempore igitur Antoninus imperabat, theri-
aca à multis diuitibus parabantur, deerant q̄ idcir-
co nonnūquā eorum quę difficulter haberi pos-
sunt, simplicia quaedam. Est enim admiratione di-
gnum quantopere diuites principum morēs ue-
l imitentur, uel, si non imitentur, uideri saltem ue-
lint. Postquam uerò ex humanis Antoninus ex-
cessit, pauci amplius aut theriacam aut Mithrida-
ticam conficiunt. Cæterum ut Romę potius q̄ a-
libi medicinæ simplices optimæ, omnes haberi
possunt, sic quoq; ab eo qui Romę Cæsarium anti-
dotos conficit, singula multo magis perfecta ha-
bentur. uinum Falernum, mel Hymettium, opo-
ballamū syriacum, quod à loco in quo plurimum
& optimum prouenit, alterum quoq; nomen ac-
cepit, sagadinum q̄ dicit, cunctis alijs melius quę
in Palæstina prædijs colliguntur. quantum uerò
Falernum uinū eo quod caupones uendunt, præ-
stantius est, tantum Aegypto opobalsamo saga-
dinum uocatum antefat. Is igitur cui theriacam
Cæsari conficere obtigerit, ut & mihi cōtingit, mo-
do singulas medicinæ cuiusque dotes exacte no-
scat, optimam proculdubio antidotum conficiet,
nam cū optimā quęq; imperatoribus uideantur
asserantur, ex optimis quoq; denuo præstantissi-
ma seligent. Equidem ipse uini Falerni ætate per-
lecta quę singulis in fidelijs descripta fuerat, id
tantum quæstabam quod uigesimali annum ex-
cessisset, indeq; initio facto ad id usq; perueniebā
quod subamarum nondum foret. Id enim uinum
optimum quoad ætatem censeo, quod uetustissi-
mum quidem est, nondum tamen amaritudinem
aliquam assumpsit.

13 Ex mellis quoq; hymettij copia quę in im-
peratorum apothecis plurima erant, bimum gu-
stabam, idq; rursus eligebam quod dulcissimum,
& acie plus esset: hoc enim & recentis & magis in
ueterato præstat. Cæterū quia non modo regiam
luculentiam habentibus, sed omnibus quoq; alijs
medicis hanc componendi artem utilem esse uo-
lumus, idcirco quædā adhuc subiungemus, in pri-
misq; illud, mella Athenis multa diuendi quę thy-
mum multum in imo uase occultatum, atq; ideo
aspectui nō obuium habent: acrimoniam autem
id mellis parit, et processu temporis in superficiem
enatat, quædammodū & quicquid aliud mellis inci-
dit, tale aut mel est penè omne quod Romę uena-
le proponit, nisi ipsum qui afferit uersuti sint, thy-
mūq; quod supernat omne auferat, ut uulgo uel
ex gustato melle thymi saperet q̄ plurimū perci-
pienti facilius imponat. uerū hic sapor non nisi in
uitiato melle cōtingit. quāobrem si quis thymi sa-
porem habere mel senserit, modo expositas frau-
des subesse intelligat. Mel siquidē optimū quāuis
thymi acrimoniam præ se ferat, nō tamē eius odore
reddit, aut gustū tantopere uellicat. Ac de mellis
quidē optimi conditionibus hætenus: nā quoad
usq; coquere ipsum conueniat, mox docebimus,
cum de theriacæ compositione loquemur.

A 14 Interea uerò de uino subiungemus quæ
paulo ante dicere omiseramus. In Asia namque si
antidotos conficere uolueris, aut aliquā alia in ge-
te, uinoq; ad medicamentum requisito carueris,
uinum cōquies fultuū quidem colore. nam neq;
nigrum, neq; album, neq; rubicundum, eiusmodi
antidotis cōuenit. compage autem ita tenue esse
debet, ut oculis peruium sit & trāspareat. gustum
uerò talem præ se ferat, qualem modo Falernum
habere dicebamus, nondum quidem amarū, non
tamen adhuc obiuuentam crudum. subiiciam au-
tem in exemplum quenam uina talia sint, nomi-
natimq; ipsa commemorabo. Antiqui enim me-
dici qui nostra in Asia nati sunt, etiam antequam
Romanorum imperium creuisset, & Falernū ui-
num famam adeptum esset, eorum nomina suis li-
bris commiserit, suntq; hæc in Asia tria à medicis
celebrata uina. Ariusium in Chio, ab eo tractum in
quo prouenit cognominatū. Lesbium, ita de no-
mine totius insulæ in qua orit, appellatū. & Tmo-
lite à monte Cilicia unde aduehitur, cui Tmolus
nomen est, uocabulum adeptum. perspicuum au-
tem est ex his optimum eligendum esse per ea si-
gna quæ superius exposui. Nā, ut de melle quoq;
dicebam, quemadmodū id quod in Attica nasci-
tur omne ferè bonū est, & inter Attica mella Hy-
mettium principatum obtinet, & ab Attico Tha-
sium: sic cum multa uina in Lesbo gignantur, id
quod fultum nec crassum est, & bene olet, mini-
mumq; constipat, & dulcedinem modicam qui-
dem, nō tamen obscuram habet, Lesbium proprie
nuncupatur, optimumq; in Eræso urbe huiusmo-
di uinum prouenit: deinde ab hoc secundū in Me-
thylna, & tertium Mitylene, gignitur, quorū om-
nium præcipuum is eligit qui notis antedictis ui-
num diiudicat. Vinū enim id ex omnibus aptius
erit ad cōponendum antidotos, quod & odoratū
& dulcius & tenuius fuerit. Quod genus est
Lesbium & Ariusium, quę duo partim inter se disse-
runt, at Tmolite & Falernū eiusmodi nō sunt, sed
duo uini genera, alterum dulce, alterum nec dul-
ce nec austerum, sed inter dulcia & austera medi-
um. Inijciemus ergo in theriacam uinū quod est
dulce, non quia præ cæteris uim aliquam antido-
tis afferat, sed quia illarum gustum gratiorem red-
dit, cui operam dare conuenit, in hisce medicinis
quæ intro assumimus, præsertim cum amara in se
quamplurima continuerint, quod genus est the-
riaca & Mithridatum. nam & omnes alias simpli-
ces medicinas, quas longa experiētia serpentibus
aduersari compertum est, amaras esse constat: ue-
lut cum eas tractabimus amarebit. Homerus au-
tem, ut ex uerbis eius colligitur, quæcunq; dolo-
res etiam amouent, amara putat. inquit enim, ra-
dicemq; addit amarā. Compressam manibus, cum
ctos quæ sola dolores Abstulit.

15 Medicus igitur omnū stirpium, si fieri po-
test, periciam habeat consulo: sin minus, plurimum
salte, & quibus frequenter utimur. sunt aut ipsarū
genera uel si sic ea denominare uelis differentia,
hæc arbores, frutices, herba, spinæ, uirgulta, hæc
enim

enim quisquis toto ætatis illarū decursū nouerit
multis in partib. orbis terrarū, reperiet, ut & ego
in Italia multis in locis inueni, quæ nec quādo pul
lulant, nec quādo crescunt, nouerūt isti qui siccas
stirpes tantūmodo cognoscunt. nullus itaq; Ro
mæ unguentarius extat, qui Creta allatas herbas,
& ipsarū femina nō agnoscat. at in suburbanis ur
bis nō paucas ex ipsis nascentes prorsus ignorāt,
idcircoq; nec quo tēpore semen ferant, obseruāt.
ipse uero, & chamæpityn, & chamedryn, & thla
spim, & centaureā, & hypericū, & pollū, & id ge
nus herbas alias Romæ uidi, quas obseruato tem
pore quō uigent, neq; æstiuo solē arefactas, neq;
citius q̄ par fuit euulsas collegi, nondū cocōctis
seminibus aut maturis. Compositarū namq; me
dicinarū uirtus ex simpliciū uigore confurgit, par
ua quādā interueniente differentia ex cōponen
diarū, ad quam explicandam mox deueniemus,
si prius quo pacto simpliciā medicamētā inter se
apte componi possint expressero.

16 Quoniā uerō quædam formulæ composi
tionis artē continentes, mendose cōscriptæ sunt,
dum alij illarū descriptiones petentes exhiben
do dedita opera mentiuntur, alij exemplaria quæ
à maioribus integra acceperunt, peruersa minori
bus tradunt. Libri uerō qui in bibliothecis repositi
sunt, cum numeros notis designatos cōtineant,
facile deprauantur. Nam ε faciunt θ, quemadmo
dum etiā η. Et ε faciunt γ, unius lineæ adiectio
ne; quemadmodū rursus γ faciunt ι, unius detra
ctione. Idcirco sicut Menecrates librū cōscripsit,
quem hologrammaton autocratora; hoc est ex in
regis literis imperatorē inscribit, in quo septena
rium numerū per duas syllabas επτα, non per lite
ram ζ solum; uiginti uerō per tres syllabas ενωστ,
non per λ solum; triginta per quatuor τριάντοστ,
non per λ solum indicauit, & reliquos similiter:
ita & ego faciam. Andromachum quoq; summo
pere cōmendo, qui theriacam ipsam, ut & alij qui
dam carminibus celebrauit, nā Damocrates non
theriacam solum, sed quas cunctas etiā alias medi
cinas uerbis conscripsit, recte sanē. ita nāq; ab
improbis perueriti medicamētā minimè possunt.
Verum Andromachi primum nos in præsentia
carmen subiungemus.

ANDROMACHI SENIORIS THERIACĀ,
quæ uiperas habet, & Tranquilla cognomi
natur, ad D. Neronem.

Antidotum multis insignem uiribus audi
Cæsar, qui nobis otia tuta facis.
Tranquilla hæc, Hilarisq; suo pariterq; Serena,
Nomine, cyaneos non timet una sinus.
Non si quis cupidis expressa papauera labris
Hauserit, exitium pocula sumpta ferent.
Non si quis gelida compleuerit ora cicuta,
Si quis hyoscyamum, siue acōnita bibat.
Non si cantharides, aut præsens morte uenenum
Colchitium stumat, feruide thapsæ tuum.
Arida non dispas, non clarus fraude cerastes,
Non feret impresso uipera dente necem.

Galen.

A Incassum cauda consurget scorpium unca,
Nec subitōs luctus apsis iniqua dabit.
Non pytas audebit calido progressa cubili,
Ut prius aduersa cominus ire uia.
Non dryina ferox, nec ab ictu gutta cruenti,
Ut solet, hæmorrhī, sanguinis ulla cadet.
Claudere nec cogent odiosa phalangia summum
Concussu tremulo frigoribusq; diem.
Non hydrus, nec ubi torret sol æquora cancro,
Cum petit arua minax, concitus atq; furit:
Ora trahens multa chersydrus cæde cruenta,
Supremum uitæ ducet in exitum.
Hæc fidens æstu per rura uagabere Cæsar,
In Libycō quamuis progrediare solo.
Nil oberit sicci tibi rursus alumna rubeta,
Nil geminum tollens amphibia na caput.
B Hæc rursus stomacho præsens medicina tument
Hæc ab anhelanti pectore tollit onus. (est,
Aut intus toto cum spiritus undiq; uentre
Fluctuat, & furdis uiscera pulsata quis.
Diraq; cum miserū disrumpunt tormina uentri,
Et saluum tensi membra dolore colli.
Vel si quis luteo suffusus forte colore
Ora, genas, oculos, pectora, colla, manus;
Arquatum patitur miser, & conuulsa temnit,
Et, si promittat tempora longa deus,
Abnuat, atq; animo tantum demissus oberrat,
Ut saeuus medicam negligat unus opem.
Inuadet quoties hydrops, male corpora pallor
Insicit, hæc fies liber ab antidoto:
C Hinc hebetes oculi sibi pristina lumina fument,
Hæc pthihis incipiens uicta recedit ope.
Sola potest collī neruos laxare rigentes,
In mentum, in scapulas, in latus, atq; humeros;
Nec sinit ut membrana, leues quæ pectus ab imo
Sepsit pulmōnes, uicta tumore premat.
Hæc etiā magno uelica dolore leuari
Horrifici stimulis ulceris icta solet.
Sola potest clausos penīs referare meatūs,
Morta quos urit, sollicitatq; uenus.
Cinxerunt lumbos renū quandoq; dolores,
Hauriat hæc aliquis pocula, sanus erit.
Sola potest eadem multis accepta diebus
Tollere de cæso pectore puris onus:
Neur te dira lues, neu lædat noxiūs aer;
Hanc cape, cum primo est solē reuecta dies.
Hæcq; canum rabiem fatō impendente fugabis,
Cum trepidat moriens, & sicut æger aquas.
Insomnes demū quibus est mos ducere noctes,
Conciliat somnum, peruigilesq; leuat.
Pondus erit quantū creuit faba, quam pater atro
Atq; restagnanti flumine, Nilus alit:
Ipse tribus cyathis præscriptum dilue pondus
Antidoti, cyathis igne calentis aquæ.
Sic commissa, tibi uel claro mane bibatur,
Vell nox cum primam protulit ora facem.
Morbi certa dabit crudi solatia, mane
Sumpta, quibus tristis lux solet esse magis.
Vespere, cui magnos nox aduehit atra labores,
Languenti cuitos atq; leuamen erit.
Atqui calcati morsu serpentis anhelat,

tom. 5

1

2

Ignæ

Ignarusūe doli toxica nigra bibit
 Et cum mane nouū, & cum iē sol abdidit undis,
 Aequali fumar ponderē theriacen.
 Hac tenus & pondus, uiresq; & tempora, Cæsar,
 Quod superest, dicam quo faciēda modo.
 Vipera principio cura obseruata procaci
 Protinus est celeri corripienda manu.
 Namq; ubi tristē hyemē pepulit clemētior aura,
 Arctā solet cæcæ linquere lustra domus:
 Et passim uiolis carpit uernantia prata,
 Dum uiridis quærit semina foeniculi.
 Nam facit hæc cernant serpentes acrius herba,
 Quos alit in cladem tarde bubulce tuam.
 Deprensus igitur summum caput, imaq; cauda
 Demenda, hinc quicquid uenter inanis habet.
 Infert nam fauos hinc atq; hinc uipera luctus,
 Et squammis caudæ dira uenena tegit.
 Ceuicisq; ideo tantum caudæq; secabis,
 In pugnum quantum est alta reducta manus.
 Sanguine sed mistum caueas stillante uenenum,
 Vere hilarem nam sic experire diem.
 Hæc ubi rite tibi fuerint perfecta, subinde
 Vipereas carnes fictilis olla coquat.
 Ante tamē mices frondē graueolentis anethi,
 Et satis est quantum prouidus indis aquæ.
 At cum panda fluunt resoluti corporis ossa,
 Cumq; tument flauæ noxiæ terga feræ,
 Exime uipereas, confusa cadauera carnes,
 Exemptas longa uentilet aura mora.
 Hinc spinas racita prudens subducito mente,
 Quas bene si tractes sentiet apta manus.
 Adde laboratam panem, ne uipera formam
 Tusa neget rotulis, ne pereat iē liquor.
 Namq; ubi mista cauo dudū hæc uersaris in orbe,
 Finge rotas, aptum det quibus umbra locum.
 Inde capillato scillam cum cortice sumptam
 Pulte linas, medio constituasq; foco.
 Ac cineris rutili cumulos superingere, donec
 Reddat rotæ scillæ mollitus igne caput.
 Signa dabit, seruens positos cum discutit ignes,
 Excute, ubi leues dempseris exuuias.
 Tres scillæ partes, erui compone duabus,
 Pistilloq; creper concaua pila diu.
 Ac minimos tandem confusa premātur in orbes,
 Quos procul à radijs mitior umbra tegat.
 His igitur lancem primum cumulabis, & octo
 Bisq; decem drachmas accipe, bisq; decem.
 Dimidium superadde, rotæ quam uipera fecit,
 Et pipæris longi sit quoq; pondus idem.
 Sitq; opij tantum, tantum medicaminis eius
 Quod grati nomen magna coloris habet.
 Inde quater ternas mutato pondere drachmas
 Iridis, & sicca protinus adde rosæ.
 Addaturq; tui radix dulcissima succi,
 Et dulcis tantum seminis inde napi.
 Scordion ijs iungas, & odoribus inclyta semper
 Balsama, qui syrio mittitur orbe liquor.
 Tum quæ suspendas æquata cinnama lance
 Conijce, & agarici par quoq; pondus eat.
 Hinc superest myrrhā, costūq; specūq; reuulsum
 Corycio, fragrans imposuisse crocum.

A Et casia calamos, & quam tulit India nardum,
 Teq; Arabi schœnum gloria prima soli.
 Inde nigrum piper atq; album, thurisq; nitorem
 Diuite quod felix rure Sabæus alit.
 Nec tu Dictamnum, nec tu quoq; Pontica rheon
 Defueris, stœchas, marrubiumq; uirens,
 Atq; apium petris quod naceris, & calaminthe,
 Afracq; lachrymæ nec terebinthe tuæ.
 Nec folijs gramen quinuis, nec zingiber ardens:
 Singula sed drachmas sex tibi quæq; trahant.
 His etiam polium drachmis se quatuor addet,
 Addet se polio proxima pinus humi.
 Cumq; racemifero celtarum nardus amomo,
 Et styracis lentor, seruidaq; herba meon.
 Atq; humilis quercus semen, Pontoq; petita
 Phu, quibus accedet lemnia terra comes.
 B Nec non malabathi folium, miscabis & assam
 Chalcitum, fibris non sine gentiāide.
 Inde tenax gummi, preffaq; hypocythide succus
 Adsit, & hinc fructus balsamæ parue tui.
 His etiam ansium, seselimumq; his iungere mollem,
 His carum amomum, foeniculumq; uelis.
 Atq; atram lachrymam, Nilī quam spina remittit.
 Quæq; suo thilapsis femine nomen habet.
 Hypericon rursum, pallens miscabis & ammi,
 Nec drachmis totidem plus sagapenus eat.
 Pondere dimidium tum quos sibi Castor ad lstrum
 Ore secat, testes imposuisse decet.
 Quis nec aristolochi radix, sic cumq; bitumen,
 Candida nec desint femina dauce tua.
 C Deniq; cum panacis succum, centaursion atq;
 Addideris, sinem chabbanus ipsa dabit.
 Antiquo primum solues tamen omnia uisno,
 Humida quæ fuerint, ut liquor & lacrymæ.
 Tum quæ sicca uides postquam cōfusa minutim
 Cecropio pariter iungere melle uelis.
 Hæc qui nos primus docuisti maxime Pæan
 Adsis, seu Tricæ te iuga summa iurant,
 Seu Burrina magis, Rhodos, aut Epidauria tel-
 Adsis, & regi fer tua dona meo. (lus,
 Stirpe tua natam Panaceam, namq; salutem
 Ille datam puro semper honore colet.

ANDROMACHI IUNIORIS THE-
 riaca e uiperis Galene dicta.

D 18 Hæc quæ senior Andromachus de theria
 ca conscripsit, Andromachus filius in eo libro cui
 titulus est De medicinis intrō assumendis, his uer
 bis explicat, non tamen equestris, ut pater, sed pe
 destri utitur oratione. Antidotus Galene, id est,
 tranquilla cognominata, ad omnem malam in
 ternamq; corporis affectionem, præcipueq; ad
 uentriculi uitia & uenena, febresq; per circuitum
 inuadentes. Habet autem pastillorum scillico
 rum drach. xxxvij. pastillorum theriacalium,
 spissamenti hedychrol, pipæris nigri, opij, singu
 lorum drach. xxxiij. rosarum siccarum, scordij cre
 tici, seminis napi, iridis syllyricæ, agarici pontici,
 cinnamomi, succi radicis dulcis, opobalsami, sin
 gulorum drach. xij. myrrhæ, eroci, zingiberis,
 thei pontici, radicum quinqueq; solij, nepitæ, quam
 Græci

Græci calamînthen uocant, marrubij, petroseli-
ni, stoechadis, costi, piperis lôgi et albi, diætami,
florum funci, rotun, odorati, thuris, terebinthinae,
calisæ fistulæ, nardi indicæ, singulorum drachmas
vi. polij cretici, seseleos, styracis, thlaspeos, ame-
os, chamæathrys, chamapityos, succi hypocyli-
dis, malabathri, nardi celticæ, radicum gentianæ,
anisi, mei athamantici, seminis foeniculi, rubricæ
lemniæ, chalcitidis usfæ, amomi, plu pōntici, fru-
ctus balsami, hyperici, acaciæ, gummi, cardamo-
mi, singulorum drachmas iij. seminis dauci, chal-
bani, lagapani, opopanaxi, bituminis, castorij,
centaurij tenuis, aristolochiæ tenuis, singulorum
drach. ij. mellis artici drachmas noningentas sexa-
ginta, uini drach. trecentas octoaginta quatuor.
Hæc Andromachus iunior soluta oratione cum
scribat, potest qui nō intelligit, omnia quæ senex
Andromachus elegiaco uerſu tradidit, hinc ea
conquirere. Quamobrem & nos eorum quæ ob-
scurius tibi dicuntur expositionem omisimus, ope-
ris prolixitatem ueriti. Vnum tantū demirati su-
mus, iuniorẽ Andromachum, dum connume-
raret simplices medicinas, quæ antidotum hanc
faciunt, in locum calamethi, nepitam retulisse, sic
enim Romani calamenthum uocant, non deſcūt
autem ipsum quæ cætera Græca scribebat, hanc so-
lam Romanā uocem Græcis uocabulis interpo-
nere. una autem in re tantū hæc ab ea differt quæ
carminibus descripta est, q̄ illa piperis lôgi drac.
xxiij. nigri sex habet, hæc autem prosa oratione
descripta nigri xxiij. longi, vi. cōtinet. Quoniam
uero, ut dixi, multa exemplaria medicinarū pon-
dus mendosum habent, idcirco ipsum non notis,
sed integris uocabulis primū apposui. Menecra-
tis iudicium hac in parte secutus. Deinde etiā per
uerſus in metricè expressum. Verū quia Andromachi
uerſus obscuriores uidebantur, Damocriatis
iambo etiam de re apte admodum cōscriptos
subiungere decreui. uerum hoc paulo post fiet, in
presentia namq̄, quoniam ex simplicibus medi-
camentis quæ huic antidoto imponunt, à nobis
aliquot iam expōsita sunt, reliqua deinceps sub-
nectere melius esse uisum est.

Pastilli ex uiperis, Cap. 19

Viperas non, ut aliqui faciunt, æstate mediã,
neque statim ubi cauernas egressæ fuerint, uenari
conuenit: æstate siquidem earum carnes sitim ex-
citât, statimq̄ ab ingressu frigide sicca & extenua-
tæ sunt. Oppōrtum itaque tempus est quod his
mediū intercedit, quodq̄ Andromachus ipse si-
gnificauit, quo tempore & qui Liberò patri sacra
faciunt, uiperas lacerant, uere quidem siniente,
nondum tamen æstate incipiente, uel si uer quod
ad magnam sui partem hyemale fuerit, circa prin-
cipium æstatis, non multo post pleiadum ortum.
Viperas autē quæ pregnantes sunt, reijcere opor-
tet, aliarū uero caput ac caudam abscindere, quæ
partes uenenatæ etiã plus esse uidentur & aspe-
ræ, paucasq̄ carnes continere. Sufficiet autem in
magnis uiperis si id quod utrinq̄ amputabimus,
quatuor digitorum mensuram non excedat. His

Galeni.

A peractis reliquum corpus intestinis exemptis pel-
leq̄ detracta aquis primo ablundum, atq̄ in uas
sicile conſiciendum est: deinde aqua pura super-
infusa, & anetho quod tunc uiget, ollæ prunas ut
coquatur subiiciemus: uel arida ligna, quæ quod
fumū nō emittat, *εκαπνα* uocât: uel quod melius
adhuc est, uitium sarmenta. Salis autem in suo tem-
pore uiperas ceperis, tantillum immittere opor-
tet: sin æstate iam incipiente, nihil, omittere inſu-
per eas conuenit quæ maritima loca quærue in ali-
qua falsa aquarum lacuna degūt. antidotum enim
quæ eiusmodi uiperas acceptit, sitim excitabit.
Viperas igitur cum ita coctæ fuerint, ac si quis ip-
sas comedere uellet, ab iure primum eximemus.
deinde illarū carnes ita à spinis auellemus, ut spi-
nam aliquam non accipiamus, auulsas carnes ex-
quisite conteremus, & panis ex purissima farina;
optimeq̄ confecti, qui præcipue & bene ferment-
tatus sit, & in clibano, non in furno coctus, modi-
cum quiddam admiscebimus. nonnulli tamen in
commiscendo panem uiperis hanc mensuram ser-
uandam præcipiūt, ut panis pondus uiperinarum
carnium dimidio minus sit, alij ne tertiam partem
excedat malūt, ego uerò quandoq̄ quartã, quan-
doq̄ & quintam panis imposui. Ceterum nisi bene
coctus fuerit, periculū est ne acorem aliquem
medicamento affricet. Melius est igitur panem
hunc ita coctum per aliquot dies loco aliquo sic-
ciori prius exiccasse. Verum cum uiperas & pa-
nem continxeris, diligenterq̄ adeo subegeris, ut
nulla uiperinæ carnis particula non confusa re-
manſerit, pastillos ex ea massa cōficcito, qui tenu-
es sint. nam crassi cum difficulter siccescere sole-
ant, & carnem putrere, & panem acescere sinunt,
quam ob rem panem quoque antè siccatum tere-
re satius est, & non quemadmodum ante nos qui
Cæsari theriacam faciēbant, uiperarum iure ma-
ceratum. quam rem ipse quoq̄ diu feci, sed mihi
postea melius esse uisum est, panem antea contri-
tum, uiperarum carnibus exacte iam subactis ad-
miscere. citius namq̄ pastilli siccantur qui siccum
panem non madidum accepterint. sit autem cella
in qua pastillos siccabis, in superiori domus parte
ad meridiem cōuersa, uel saltè ad septentrionem
non respiciat, ut solis radios tota penè die accipi-
at. tali enim in loco cōmode siccescēt, statim à cō-
pōsitione sibi collocat, quo solares radij perueni-
re non possunt. frequenter autem ipsos conuertere
opus erit, ut æqualiter utraq̄ue ex parte sicces-
cant, quod facere si quis omiserit, superior quidē
pars celeriter arescet, inferior autem humida diu-
tius permanebit, periculumq̄ erit ne marcescant.
postea uerò quàm exiccati fuerint, inaneant ad-
huc aliquot diebus eadem in cella longitius quàm
prius à solis radijs, sepeq̄ denuo cōuertantur. suf-
ficient autē ad hæc omnia quindecim dies ad sum-
mū, post quod tempus donec theriacā conficere
uolueris, recodi debēt in uase stanneo, aut uitreo,
aut etiã aureo. uitro siquidem & auro nihil frau-
dulenter admisceri potest, stannum autem plum-
bo adulteratur, quod uitare conuenit, nō solum

tom. 5 f. 3 18

in hac antidoto, sed & in quibuscunq; alijs medicinis, quemadmodum & argētum si purum non fuerit. Vasa namque ex eo fabricata celerrime rubiginem contrahūt. purum autem argentum Romanī candidum uocant. Cæterum longe melius est haud multo postquam pastillos confeceris, ipsi uti. quanquam non multum detrimenti capiunt, etiā si peracto anno, atq; etiā multo post eis utaris. Recte namq; à principio siccati, ad tertium quartumq; annum integri perseuerāt, dummodo tamen apte reponantur, & subinde puluisculus quidam qui ipsis obnaſci conſueuit, mundis mantilibus interdum abstergetur. Is namque si diutius inhæreat, pastillos perforabit, perspicuum est autem inutiles eos tum deniq; reddi, cum perforati fuerint, quemadmodū antea quā hoc accidat, etiā si multum tempus interceſſerit, non inutiles esse.

Pastillorum scilliticorum compositio. Cap. 20

Sive scillitici, sive scillinos quis appellare uelit, cōfectos ē scilla pastillos, rotulasq; aut orbes, nihil refert. neq; enim medicamento quicquam officit, quomodo libet inditum nomen: modo errorem aliquem in eorum compositione non admittas. quod ne contingat, ego tibi eam dilucide nūc explicabo. principio scillā probe coaltam ac plenā de terra uelles, cuius folia penitus sã & scapus aruerint. huic deinde cortice detracto duriorē puluiculā induces ex tritico nouo, quātumq; fieri potest exquisito confectā, ipsam postea multo calidiorē cinerī subiectam non prius extrahes, quoad usque circumposita puluicula crusta plane fiat. quod si ubi hæc agis furnus aliquis adsit, unā cum pane scillam illuc inferre potes, inde cum obducta pulsam exaruit, ipsam extrahes, & contres. satis sciam uerō scillam intelliges, si festucam immisſam admiserit. scilla namq; cum bene toſta est, surculos facile excipit. ubi uero scillā diligenter attriueris, candidam erui farinā admisce: nam quæ candida non est, amara supra modum est. Cognitum autem unicuiq; existimo prius oportere tenui cribro farinā excutere, ac præterea diligenter eā leuigare. scilla uero seſquipondere farinam superet opus est: dico autem seſquipondere, ut si duas farinæ partes, scillæ tres accipias. quam rem cum & Andromachus iunior aſſerat, nescio quare ratione ductus uelit erui farinam drach. octuaginta esse, scillam uero centū uiginti, cum satis sit dicere, scillā erui seſquipondere superet. postremo uero simulatq; rotulas tenues ex hac mixtura conformaueris in cella, sicuti paulo ante dicebamus, ad meridiem uergente repones, quas tamen non in solis radijs collocabis. uerū sicut de pastillis uiperæ dictum est, ita in his quoq; cætera perage.

Magmatis hedychroi compositio. Cap. 21

Cum superius theriacam Andromachus conficere nos doceret, quomodo uiperini scilliticiq; pastilli conficerentur, ipse quidem satis superq; exposuit: quo pacto autē Hedychrom magna componeremus, neq; Andromachus docuit, neque complures alij, qui tamen de medicinarum

A compositione tractarent, tamen cum theriacam describerent, Hedychroi compositionem omiserunt, adeo ut medicus quidam Romæ qui theriacam conficere nunquam uiderat, ipsamq; se ex sola librorum lectione cōpositurum fidebat, ab unguentarijs Hedychrom peteret, existimans illud herbam esse quampiam, uel simplex aliquod aliud medicamentum. sed ego spissamentum hoc etiam indicabo, ab Andromacho in eos qui nunc quoq; Cæsari ipsum componunt, perpetua serie deriuatū. quod ut ipsum quoq; peruerti non possit hexametro carmine subscribemus:

Magna quod Hedychrom læto dixere colore
Asphalathi drachmis, asariq; marisq; duabus
Constat. nec plures attollit amaracus illis.
Tres calamus, late fauues qui creuit in aruis,
Tresq; Arabū passum qui creuit iuncus in aruis,
Tres costum redolens. tres toto cognita Ponto
Phu, quibus æquale fragrantia cinnama pondus,
Et lacrymę, et farmēta dabūt, quæ balsamus edit.
Rursus sex foliū drachmas, sex indica nardus,
Sex casia calami, sex myrrhæ gutta leuabit,
Sexq; croci flores, bis sex attollet amomum.
Mastiche solidā tātum trahet ultima drachmā.
Omnia tu uino simul hæc conſunge falerno.

Hæc ubi inter se miscueris, rotulas uiperinis et scilliticis similes figurabis, ipsasq; eodem modo exiccabis. Hæc autem Hedychroi magmatis conficiendi ratio, ueluti diximus, ab Andromacho per manus multorum ad nos usq; peruenit. Nam quas alij cōscripsere aliqua in re ab hæc nostra differunt. quæ siquidem Hedychroi descriptiones ab eis traditæ sunt, qui medicamentorum experientia dant operam, rerum insectarum pondere ab hac euariant, alia uero neq; marum neq; amaracum profus habent. quædam alterutrum tantum continent. neq; enim duo hæc unguentarij omnes noſcunt, eo quod herbas solum Creta aduectas emant, & earum semina atque succos. ego uero & has duas herbas scio in Asia facit, ac in alijs quidem regionibus raras esse, sed in Cyzico frequentes. in Italia quoq; ut & alias quoddam herbas, ita & amaracum uidi, quæ odore multū à maro superatur. marū enim ualde redolet, putaretq; forsā aliquis sola nominis appellatione ductus unguentum amaracinū quod in Cyzico faciunt, amaraci plurimum capere, sicq; forsitan ab antiquis id unguentum conficiebatur. sed nūc solum marum imponunt. Hanc herbam aliquid cum ipse degustassem, ac eā amarā quidem plurimū, sed acrem parum deprehendissem, hortatus sum quendam eorum qui amaracinum conficere solēt, ut amaraci tantum immitteret, quantum & mari. uisumq; est mihi id unguentū, minus quidem redolere, sed peius nihil operari. hæc itaque à nobis obiter dicta sint.

22 Nunc quo pacto antidotis hæc confici debeat, explicabimus, eo ordine singula quæq; imponenda commemorantes, quo suis in elegijs Andromachus recensuit. Is enim rotularum scilliticarum drachmas octo et bis decem, rursusq; bis

decem imponi iubet, quod perinde est, ac si quadraginta octo diceret, harum dimidium, hoc est vigintiquatuor drachmas, theriacalium pastillorum, opij, piperis longi, & magmatici Hedychoi præcipit. ac de tribus quidē, iam dictum est. piper autem longum fraudulenter concinnatū depren- des, si cū aqua maceraueris. soluitur enim hoc pacto quod subornatum est, quod autem fraude caret, indissolūtū manet. est autē id quo piper longum adulteratur, herba quædā fulua ab externis regio- nibus aduecta, quæ piperi longo, aspectu quidem proxima, nō tamē gustu similis est, quo etiā ab eo distinguitur facillime potest. Sagapenum quoq; quod uocant & ipsum in aqua seu uino dimissum cognoscitur, uerum namq; statim dissoluitur. quod autem tale nō fuerit, indissolūtum manet, siue autem utrispiam ut neutrum nomen sagapenum, siue ut masculinum, proferat, & totum hoc sagape- num succum intelligat: (est enim uerua succus fe- rula cuiusdā panaci similis) nihil refert. cæterum panacis succus simile quicq; non habet chalbanū particulæ cuidam albiori. nam chalbanū pars quæ- dam re uera in sagapenum transit, quæ spumosa & leuis est. quædā uero chalbanum optimum est sagapeno æmulum. densum autem hoc est, & reli- quod chalbano longe magis compactum, quo uti debemus, seu optima chalbanū particula. quoniā uero ad sagapenum ex chalbano trāsire diximus quodcunq; spumeum constans & album est, hu- moriq; immixtum facile diluit, superioribus quæ- dam adhuc subiungere opus est: præsertim cū ob similitudinē optima casia cinnamomum eua- dat. uidimus enim alias frequenter casia elata, & au- ctia tantum, ut fructicis magnitudinem equaret, ra- mos quosdam cinnamomo penitus similes aspe- ctu, corticis tenuitate, et præterea hisce signis quæ cinnamomum certissime ostendūt, ac gustu olfa- ctuq; percipiuntur, ad hunc modum & in optima myrrha opocarpasium reperit, quod tamen a myr- rha differt. atq; secundum hæc tria, sagapenum di- co, opocarpasium, & cinnamomum quædam pro- ueniunt. quæ neq; chalbanū, neq; casia, neq; myr- rha quidem amplius sunt. nondum tamen sagape- ni, cinnamomi, aut opocarpasii naturā exacte consecuta, quam obrem sepe numero perspexerit oportet, qui similia internoscere ac discernere cu- pit. nam quemadmodū gemellos atq; consimiles inter se fratres qui consuetudinem cum ipsis non habent, distinguere nesciunt: quod tamen contu- bernalibus facillimum est. sic in omnibus medici- nis qui inter ipsas enutritus fuerit, & eas frequen- ter aspexerit, facillime illarum diuersitates uel mi- nimas etiam inueniet atq; comprehendet. at qui se- mel tantum aut bis inspexerit, eas tanq; indistin- ctas intuetur, neq; unam ab alia internoscere ua- let. cum tamen signa quibus distinguantur mani- festissima nonnūq; habeat, illi usq; adeo exposi- ta qui sepe numero cōspexerit, ut per unū eorum facile quamq; medicinam agnoscat. sagapenum itaq; ē chalbano confectum eundem odorem nō habet, quem uerum sagapenum possidet. nam id

A odoris genus quod harum rerum periti hircinūm appellant, sumptum ē chalbano sagapenum non deponit. quanq; inter uerū sagapenū, & eufusio- di chalbanum non multum interfit, etiam si quis antidotos cōponat. ambo namq; ad id apta sunt, & serpentibus ac uenenis ambo aduersantur, & si chalbanū sagapeno minus. At opocarpasium ex- itiale est, multosq; nos forte quadā nouimus nos- tra in ætatis decursu mortuos esse, q; myrrhā cū opocarpasium admixtū esse nesciebant, assumpsi- sent. de industria namq; qui antidotos cōficiunt, tanq; optimam talem myrrham imponebant, eo q; uiderāt ipsam in collirijs optimam fuisse medi- cinam. nempe saniem absq; mordicatione exte- riuat, & interdum incipientes oculorum suffusio- nes & adhuc tenues aufert. atq; siue in emplastrū, siue in ceratum, siue in extenuans aliquid medi- camentum foris imponendum talem myrrhā cō- ijcies, remediū uim augebis. at intra corpus alium pta exitium affert. hæc uberius ideō narrāuimus, non solum quia orationis series ita expositaret, sed etiā quia hæc nosse plurimū cōducit. Verum iam tēpus est, redeamus ad ea cōsideranda quæ sunt in tertium ordinem simplicū medicinarum ab Andromacho relata, inquit enim: Inde quater ternas mutato pondere drachmas. Hæc igit quō tempore uigent, proculdubio colliges. rosas pri- mum ut de pastillis dictum est, exiccabis, illas de- cerpens, quæ plus alijs bene olebunt, & rubicun- diores fuerint. uitabis autē cellas subterraneas, nec ullum medicamētum in ipsis repones, præsertim uero in humidis, in quibus recondita celeriter ca- riosa fiunt.

23 Rosis Andromachus iridem illyricam ad- iungit, quæ uerba non tanquam inaniter prolata negligenter excipienda sunt: ueluti nec cum alijs medicinis patriæ nomen apponit, de quibus pau- lo post edisserēs quid quoq; in genere optimum sit demonstremus. polium ergo & chamædrys, duo hæc Romam afferuntur, natis in Italia parum meliōra. in aliquot siquidē Italiæ locis, hæud mul- tum deteriōra proueniunt illis annis quo uniuer- sum uer humidum non fuerit, sed sicuti sæpe con- tingit æstiuo tempore simile. quod si ueris cōstitū- tio sicior obuenerit, multa quæ in Italia nascunt pluribus Cræta allatis paria erunt, ueluti chamæ- drys, chamæpitys, hypericon, gentiana, thlaspis, elleborus niger, & id genus alia. at uero quod ad iridem pertinet, secus ser es habet. si enim iris Ly- bica quæ plurima ex Africa Romam affertur, illy- ricæ comparetur, tantum ipsi cedit, quantum ca- dauer uiuo corpori, non tamen alijs in gentibus orta tam multum ab illyrica degenerare iris uide- tur. iridem igitur uelut & reliquis medicinis odo- ratiorem semper eligito. unumquodq; enim opti- mū est, quod sui generis odorem uehementiorem habet. is autem ex multorum inspectione manife- stus unicuiq; sit. ac de gustu quidē perceptis qua- litatibus eodē modo censendum est. id enim opti- mum medicamētum esse constat, in quo id quod suo generi propriū est, exuperat. pessimum uero

ro quod sui generis alijs & tenuius & exilius est. meliora namq; sunt omni in specie, quæcũq; nec rugosa, nec exilia fuerint, uelut etiã quæ cõueniẽtẽ libi magnitudinẽ excellere, peiora sunt ijs quæ bene quidem nutrita, sed tamen alstrictiora sunt. quam ob rem ut dixi, medicinas simplices multas & sæpius inspersissẽ operapretiuẽ est, & maxime optimas quæ longo iam tempore sui experientiã ipsi nascẽdi in ijs præbuere, quæq; uno ore à peritis medicis materiẽ auctoribus cõmendant. omnes igitur herbarij unanimes scripserunt, iridem in Illyrio natam, optimam esse. petroselinum uero, quod in Macedonia prouenit. Bitumen è Iudæa aduectum, item & opobalsamũ, idẽ & in reliquis fecerunt, quoruẽ dotes à regionibus acceptas cum priuatim de unoquoq; loquimur, nõ omittimus.

24. Subiũgit deinde radicis dulcis succũ & agrestis nasũ semen, quæ duo, nobis è Creta quam optima afferuntur, præcipueq; radix dulcis & ipsa & eius succus. Scordiuẽ quoq; pulcherrimũ Creta mittit. quanq; in alijs regionibus etiã minime contemnẽdum scordiuẽ reperias. Literarum quippe monumẽtis traditũ est à quibusdã celebribus uiris, cũ in prælio interemptorum cadauera multos dies insepulta iacuisent, quæcũq; supra scordion forte fortuna ceciderant, multo minus alijs computruisse, ea præsertim ex parte qua herba à tigerant, ob quam rem sanẽ persuasum est omnibus tam reptilium uenenis q; noxijs medicaminibus quæ corpus putrescere faciunt, scordium aduersari. Ac de omni quidẽ medica materia satis superq; est à Dioscoride quinq; libris disputatum, à quo discere licet, unicuiq; cũ alias omnes notas, tum gustu olfactuq; perceptas, quibus probata medicina, certissime cognosci, & ab improbatissimis fecerni queunt. in quibusdam uero oculis quoq; perceptæ qualitates haud parũ utilitatis afferunt, sed consiliũ meum non est quæ ab alijs recte cõscripta sunt, hoc in opus transferre: uerum quæ il li plane omiserunt in modũ adducere.

25. Meminit postmodum Andromachus cinnamomi & opobalsami, in quib. post notas à Dioscoride traditas præcipuum illud est uidere prius ipsa, quibus in locis optima nascuntur. quemadmodum ego feci, qui sciẽs balsamum usque adeo pluribus artibus aduiterari, ut internosci uix queat, ipsum ex arbore sua residuã apicere uoluit, & ex eo particulam tanq; regulam cæteris agnoscẽdi apud me semper habere. didici quoq; quo pacto multis modis adulteratum peritissimos etiam quosq; falleret. quam rem qui sciunt diuulgare non consulo, ne obiter improbi fraudes discant, & in malos usus conuertant. nam neq; illos approbo qui noxiãs medicinas describunt, & publicat. si quis igitur probationes à Dioscoride scriptas, & ab alijs quicunq; de omni medicamentorum materia docuerũt, agnoscendis simplicibus medicinis ad moueat, ipseq; suum ex multa inspectione collectum iudicium adhibeat, exacte quæcunq; fecerni possunt distinguet. quædam enim, ut dixi, uel nullatenus, uel non exacte ab adulteris

nis fecerni queunt, usq; adeo falsis uera sunt utrorumq; confusa indicia: ueluti de quo nunc loquimur opobalsami.

26. De cinnamomo uero contraria ijs quæ de opobalsamo narrauimus, cõpertum habeo. persuasum namq; mihi est ipsum cognitu facillimum, ex omnibus esse illis qui sæpe optimum cinnamomum uiderint. optimum uero consequi nemo potest, nisi repositum ab imperatoribus intueatur, sed generibus quo dammodo distributum. siquidem & in hoc ipso uelut & in casia optimi ad deterrimum tam magna differentia est, ut suprema casia ab infimo cinnamomo parũ distet. neq; uero cinnamomi uirtus ad usum apta longo tempore durat. ad triginta siquidem annos quam à principio uim habuit, integram non cõseruat. niganatur enim qui cinnamomũ ex hisce medicinis esse dicunt, quæ senectutem non sentiant. Atqui ego non centum neq; ducentum annorum interuẽtu, sed pauciorum si quis ad tãtum numerum conferrat, uetustius factum obseruauit: quo tempore siquidem Antonino imperatori theriacã paraui, uasa lignea in quibus eiusdem generis cinnamomum inerat, multa conspexi: alia Traiani, quædam Adriani, nonnulla Antonini, qui post Adrianũ imperator fuit, ætate reposita, omniaq; hæc sese & saporis, & odoris imbecillitate uehementiaq; tãtum planè superabant, quantũ & tempore differebat. olim è barbaroruẽ terris arca cubitos quatuor & medium longa Romam perlata cũ fuisset, in qua cinnamomi primi generis integra arbor erat, ex eõq; M. Antonino imperatori antidotũ quãdam cõposuissẽ, ipsam cæteris multum præstare deprehendi, a deo ut imperator quoq; ea degustata medicinẽ concoctionẽ, uelut in alijs fieri solet, expectare noluerit: sed statim ea usus sit nõdum integre duobus mēsis elapsis. Antonino subsecutus est Commodus, qui nec theriacæ, nec cinnamomi curam ullam habuit, sub quo nõ solum arboris illius quod superauerat omne dissipatum est, uerum etiam quodecunq; post Adriani temporã comportatum fuerat, quo factũ est, ut nunc imperator noster Seuerus cũ me sibi theriacã eo modo conficere iussisset, quo M. Antonino confeceram, ex cinnamomo Traiani & Adriani tempore reposito sumere coactus sim, imbecilliusq; planè mihi uisum est, & tamẽ nondũ anni triginta intercesserãt. Hic non optimi cinnamomi notas quãdam necessarias subijcere uolumus. summopere ipsum bene olere, in explicabilẽq; præ cæteris bonum se multũ odorem spirare, ac calidũ gustantibus se multum exhibere. non ita tamẽ ut mordicando tristitiẽ palato inerat. colorem deniq; talem habere, qualem si quis lacti fuscum colorem admisceat, atq; cœrulei quem uocant aliquantulum addat. ex hoc igitur quantum uolebãt, ut mos mihi fuit, cum accepissẽ, ramusculos aliquot apud me deposui, in ea apotheca in quare meas omnes pretiosas seruabam. uerum ipsa combusta, qua tempestate & templum Pacis incensum est, & hæc & alia quinq; cinnamomi species quas mihi conquit

conquiescam perire. Nunc itaq; cum imperato-
ri nostro Severo theriacam componerem ex cin-
namomo Adriani tēpore posito quod optimum
uisum est elegi, de quo etiam utile quiddam lectu-
ris subdere, cum possim, id facere non grauabor.
superfunt adhuc ibi multa uasa lignea quæ uarias
cinnamomi species continent, quarum nulla tam-
en ueluti truncus in ramos plures diuisus mul-
tum attollitur, sed ellebori figuram præ se fert. im-
mo uero damafonij quod è Creta ad nos affertur.
quæuis autem cinnamomi species ab una radice
ceu frutex quidã paruus confurgit, emittitq; hæc
sex, illa septem uirgula, uel paulo plura pauciora
uere non equali tamen omnia longitudo in sunt, ue-
rum quod maximū est, pedis Romani dimidium
non excedit. uniuersa autem cinnamomi natura
similis est quodammodo optime casia, quam qui
asserunt barbari bisyllabo nomine uocant, cuius
prima g et i constat, secunda z et i continet. Ac de
cinnamomo quidem hæc tenus.

27 Agaricum sequitur, quod fraudem nullam
admittit, de quo illud modo dicere sufficet, quod
est ab autoribus ante nos productū, optimum id a-
garicū esse quod leuissimū esset, dēsum uero, gra-
ue, & lignosum, abiectum. quod aut̄ inter hæc me-
dicum est quantum signis tantum & uirtute ab u-
triusq; distabit. subscripta sunt deinde myrrha et co-
stus, nequæq; cognitur difficilia hisce qui prius uo-
catus uiderint, nouisse tamen opus est myrrham
quam troglodyticā appellant, antidotis idoneam
esse. hanc quidē minæam uocāt, à loco in quo op-
timam nasci ferunt, maxime uero hæc bene olet,
& ut modo dicebamus, opo carpsali quicquam ad-
mistum nō habet. crocum uero coryciū cum om-
nis antiquitas, tum poetæ quoq; laudant. ego ue-
ro & antrum Coryciū in quo gignitur, & crocum
ipsū accuratius inspexi, uegetum quidem nō ta-
mē odoris magnitudine uel diurnitate cunctos
alios excedentem. quibus signis & uos optimum
ab ignauo diiudicare consulo, non autem quia si-
pra modum uegetum sit ac plenum. perspicuum
est autem optimum crocū summe flauū & plu-
rimū redolens esse ac longo tēpore utraq; hæc
seruare. quoniam uero crocum quoq; adulterari
à quibusdam solet, neq; facile id deprehenditur,
nisi ab his qui sæpe optimum inspexerunt, satius
esse ducō crocū multum ante emptū aliqua in do-
mus cella, ad id apta repositum habeamus. quem
admodum paulo ante faciendum docuimus: ma-
gnū siquidem probitatis indicij est, si tale per-
maneat quale repositū fuit. adulterati namq; cro-
citam color quam odor citissime aboletur.

28 Quod ad casiam uero attinet ea me cōme-
morare nunc opus est, quæ in multis de medicina
libris scripta sunt, duplum casia si quis cinnamo-
mo egeat iniiciendū. Hoc dictū irrident Satyros
magister meus unā ex Quinti facetijs ipsum esse
dicebat affuerāt eos qui duplū casia imponere
sūbent, si cinnamomo careamus, similia illis face-
re, qui nos cēsent quādo falerno caruerimus, illius
quod in cauponis uendit duplicata mēsurā bibe-

re, sic panis siliginus desit, fursuracei duplū cō-
medere. mihi uero hæc Quinti facetia si de re una
quapiam qua per se sola uti uelimus afferat, uera ir-
reprehensibilisq; uidetur: si in re quæ in societa-
tem multorum ueniat, nō est eodem pacto uera.
nam cuiuscumq; quod solū corpori admoeri de-
bet, rhus puta, ablinthium, iris, gētiana, uel id gē-
nus alia aliqua medicina: si quis minus boni dup-
lum loco præstantissimi accipiat, & corpori uel
extra uel intra admoueat, duplicato etiam uoce-
bit: at si multis unum aliquod optimum commi-
scendum fuerit, quod se aucturum aliorum uires
spondeat, si præstantissimum desit, peius nihil erit
uti duplo illius qui proprietates eiusdem generis
habeat, etiā si deterius hoc illo uideatur. Casia si-
quidē cinnamomo genere proxima usque adeo
est, ut ex ipsa quandoque cinnamomum oriatur,
spectenturq; nonnunq; casia arbores integræ, in
quibus aliqua cinnamomi uirgulta è casia ramis
prodeant, simileq; istud est, non uino aut panī, si-
cuti Quintus dicebat sed uitæ functionibus in ex-
truēda domo, in fabri cāda nauī, in tollēdis et trās-
ponēdis oneribus, in om̄ibus deniq; uitæ actioni-
bus, in quibus quod peragēdū erat ab uo hominē
robusto, si ablit, à duobus imbecilliorib. perficit.
Hæc aduersus Quinti dictū obiecta sint, eo q̄ mi-
hi reiiciendum omnino non uidetur eorum præ-
ceptum, qui pro cinnamomo duplum casia impo-
nendum censent, quanquā ego semper cinnamo-
mum imposuerim. nam quibus ego Romæ anti-
dotos composui, cum uel imperatorum amici uel
diuites essent, facile fuit illis quidem à regibus per-
tere, ijs uero cinnamomo emere. Quibus illud
etiam addidisse quādo imperatoribus antidotos
composui, me cinnamomo nunquam eguisse, su-
peruacaneum planè fuerit. at Quinti sententiam
quam de carpsio habuit, commemorare tem-
pestiuum est. ipsam namq; nō solum à Satyro, sed ab
alijs etiā Quinti discipulis accepti. imponebat igitur
Quintus, ut aiunt, quoties cinnamomum dee-
rat carpsium. perinde atq; uiribus optima casia
non inferius: egoq; carpsium idcirco multum
mecum attuli ex ea peregrinatione, qua orientis
prouincias adij, diligenterq; repositum nunc usq;
plurimum seruo, quod odorē etiamnum & sapo-
rem si non ualens prius habebat, certe nondum
extenuatum retinet. Est autem carpsium herba
phu appellato genere similis, ualidior tamen atq;
aromaticum quiddam plus spirans. plurimū hæc
in Sida urbe Paphylia nascitur, emittitq; propterea
illuc utilissimo pretio. quocirca si quis uestrum
illuc accesserit carpsii multum emat, cum id si-
bi longo tempore duraturum nouerit. tenuia au-
tem quædam carpsii sarmēta cinnamomi uirgul-
tis similia sunt, eius duo genera reperit̄ur. unum
quod laertium, alterum quod ponticum nomina-
tur, à monte in quo nascuntur utraq; nomen ade-
pta: sed ponticum melius est, quod cū plurimum
habere permultis medicamentis admiscui, in qui-
bus phu uocata imponi debuerat. Est enim carpe-
sium, ut dixi, phu simile ualidius tamen, & quali-
tatem

tatem quandam aromaticam, gustatum, odoratumq; remittens. inter tam multa autē quæ de casia retulimus, necessum est illud etiam in primis explicemus, quæ casia theriacæ iniiciēda sit. nam gizzi nuncupatam præcipue laudant, secundo autem loco moro dictam. sunt & qui arebo daphnitēq; probent. ceterū gizzi, quum uocant in omnibus cinnamomo simile esse superius quoq; diximus. hæc est quæ ab aromatum peritis perinde atque cinnamomū asiduo uenditur. quanquā Andromachus iunior casiam à quibusdā fistulam appellatam imponendam arbitratur: hæc omnibus cognita est. nam & uilius ceteris uenditur, cuius exterior cortex fistula appellatur, quia obuoluit ipsam repræsentet, sapore & odore ualidū habet. interior autē pars debilis adeo est, ut nullum usum præstet. in carminib. itaq; patris paulo ante à me transcriptis casia nomen absolute pronunciatum est. in soluta uero filij oratione fistulæ nomen casia adiectum est. atq; ab eo series per eos qui ante nos theriacam imperatoribus cōposuerunt, in nos usq; deriuata fistulæ nomē nunc usq; appositum seruat.

29 Iubet deinde Andromachus indicam nardum imponere, quam ex eo quia spicæ figurā imitetur, nardi spicam nominat, quamuis radix sit: in qua cauisse oportet, ne quis elutā uocatam nobis uendat. est autē hæc nardus quæ prius ab unguentorum structoribus in ipsorum coctura elixata, ut ipsorum mos est integra uenditur. quam ob rem omphas barbara uoce dictam emere conuenit, cuius radici terra adhuc adnexa si contrectetur, nardi odore habet. Schoenū, id est iuncū ex Arabia petitū, ad hæc idē imponere autor præcipit, nescio qua de causa, schoenatū, id est iūci florem à uulgaribus appellatum. nobis siquidem cū florum copia non adsit, iunco utimur ex Arabia cōportato, cuius summamatem cameli sæpenumero abroserūt. iucū dissimile namq; hunc iuncū cameli pascūtur, secus uias ibi plurimū nascētur. est autē iūcus iste exigui pretij medicina, solaq; odoris integritate diiudicāda: quoniā celeriter ipsius odor expirat. Subscribit postmodum Andromachus, inde nigrū coniunge piper, thurisq; nitorē, quo in loco non opus est, inquiramus quid nitor sit, perinde atq; cuiuspiam alterius medicina nomen, cum & ex theriacæ descriptione prosa oratione ab Andromacho iuniore prodita: & ex cōpositionis instituto, quod ab eo ad nos usq; peruenit medicamentū nomen nitor non sit. & ea omnia quæ sex drachmarum pondere hoc pharmacum recipit, consonē tum seniori, tum iuniori Andromacho sint relata, & omnino nihil extra illa additum sit, ad quod Aglaia nomen referendum quis putet, ut fortassis Aglaiam epitheton thuris, elegiæ auctori apponere uisum fuerit. Meminit deinde piperis nigri, dictamni, marrubij, rhei, rerum omnibus cognitarum, theriacæ tamen descriptio quæ nobis per manus tradita est, graue piperi adiectū habet. magnitudine uero piper hoc aliud superat, corticemq; subtiliorem & minus ru-

A gosum habet. In rheo quoq; frans cōmittitur. nā quibus in locis nardus, simul atq; euulsum est, ipsum elixant, quò succum remittat, ac tam succum ut sincerum & aquæ impermistum, quam rheum exliccatum ut non elixum ad nos postea mittit, quam ob rem scientia opus est, uerūm ab adulterino secernendi, quam facillime consequuntur, qui per se naturale rheum aliquando uiderint. nā elixi pars quæ sub aspectū uenit, densa per totum & compacta non est, sed rarior & gustu tentatum saporem adstringentem, uel nullum uel obscurum remittit. cum tamen si adulteratū non sit, uehemēter adstringat, cito tamen & ipsum foraminosum efficitur. Stœchas autē multa pluribus in locis provenit, plurima uero in Creta et in insulis Stœchadibus quæ in Ibero mari sitæ sunt. unde & Stœchadi nomen deductum est. quæ autem in prædictis insulis oritur, uegetior Cretica & melior est.

B 30 Quod ad petroselinū attinet, laudatissimū macedonicum est omnibus cognitū. hoc estreaticum etiā quidā appellant, à loco in quo nascitur nomē imponentes, uerū exiguū est prorsus quod ibi provenit, cum & præruptus & angustus locus sit. estreaticum itaq; seu Macedonicum hoc quod in omnes gentes affertur, paucum & ipsum in Macedonia gignitur. sed idē in petroselino macedonico accidit, quod in attico melle & uino falerno contingit. mercatores siquidem in uniuersa ferme orbis terrarum oppida, ut mel atticum, tinū falernum, sic petroselinum Macedonia aduehunt. cū tamē in Macedonia petroselinū tantum non oriatur quantū populis omnib. satis esse queat. uerum in Epiro petroselini multū gignitur, in Cycladibus mellis plurimū. atq; ut mel ex insulis Athenas afferit, sic petroselinū ex Epiro in Macedonia cōportatur, plurimūq; immo penētum Thesalonicam: unde tanq; Macedonicum quocunq; asportatur. idem in uino falerno cōtingit. nam cum in exiguo quodam Italiae agro falernum proveniat, complura alia uina in falerni speciem à uini magistris concinnantur. quæ perinde atq; falernina in omnes prouincias imperio Romano subiectas exportant. tibi uero si petroselinum estreaticum quādoq; deerit, ne peiorē existimes theriacam futuram si aliud imposueris. non enim uelut mortiferis uenenis, & uenenis eiaculātium bestiarū plagis cōducens iniicit, sed ad imbecillē stomachū, & hydropicos, & alios huiusmodi affectus, quos in primis sanare theriacā non promittit. adhæc estreaticū petroselinū amarā etiā plus theriacā facit, præsertim cum recens adhuc imponit. nā ut acrimonia, sic amaritudine hoc alia superat.

C Resinā postea terebinthinā addit, quā nescio cur Andromachus omiſſa chīa libycā esse uoluerit. Chīa namq; penē omnes meliorē iudicant: quanq; laudo & Libycā si bona sit sed proculdubio bona semper non est, quæ admodū quæ est Chio uenit. nascit quoq; et in Ponto, et in alijs aliquot locis optima terebinthina: uerū chīa reliquas & odore & sapore uincit. Retulit subinde inter cōponentia theriacam Andromachus zingiberē &

pentaphyllum, hoc est quinquofolium herbam, quae duo fraudem non admittit, & ab omnibus cognoscitur. meminit ab his polij quod omnibus cognitum est, nec simile sibi quo adulterari possit quicquam habes. deinde chamæpityos de qua illud tantum referat, multis in locis & odore & sapore præstantiorem chamæpityon gigni, quam in Creta nobis emi inde afferitur, eaq; omnes qui Cæsari antidotos conficiunt, utuntur. Romæ liquidem in suburbanis prædijs & chamæpityon, & chamædryn reperi multo plus redolentes quam Creta aduectas, si tamen continuis imbribus obrutae non fuerint. Illud hoc loco non ignorare nos conuenit, cum Creta nobis herbae afferuntur chartis obuolue, in quibus earum nomen scriptum est, quædam inuolucra solummodo inclusa herbae nomen inscriptum habere. quædam uero præter herbae nomen campestris quoque uocabulum additum continere, ac campestris quidem generosiores inuenies, etiam si in planis locis herbae ferme omnes inbecilliores proueniunt.

31 Manifestum insuper est, hysracem qui in calamis e Pamphylia apportatur Andromachum præcipere, perexiguus autem illic styrax nascitur, tantumque ab hoc uulgari distat, quantum a uino quod in tabernis uendit salernum. accipere uero styracem oportet maxime pallidum, quem & odorem & saporem quoque uehementissimum habere perspicuum est.

Nardum ab hoc Andromachus commemorat, quemadmodum ipse scribit ex Gallia petita, quæ regionem orbis terrarum perit Celticam frequenter appellant. tria namque nullo discrimine unius generis uocabula sunt, & eos populos aliqui Galatas, aliqui Gallos, quidam Celtas nominant, sed usitata nomina apud eruditos Celtarum nomen legitur. De reliquis autem deinceps ab Andromacho conscriptis, partim alibi est a nobis in superioribus libris disputatum, ueluti de lemnia terra, & rubrica: nam terram potius ipsam quam rubricam appellare conuenit. est enim lemnia rubrica res alia quædam in Lemno nascens, ad alios usus apta, non ad quos lemnium sigillum quod uocant, sed de hoc quoque sicut etiam de reliquis a nobis est in libris De simplicibus medicinis discipatum, partim uero sunt medicis omnibus cognita, nec fraudes ulla admittunt, eorumque nonnulla sunt in theriaca pedestri oratione conscripta, dilucidius explicata, ueluti illud, Atque aram lachrymam Nilij quam spina remittit. Acaciam namque ex Aegypti spina collectam Andromachus significat, hoc loco unum hoc præterire non possum. utitur omnes ferè thlaspi, quæ Creta afferitur, aut ubique nascitur, colore inter luteum & laeuum medium, figura rotundum, exiguum adeo ut multoties grano milij cedat. melius est autem e Cappadocia comportatum thlaspi imponamus. hoc ad nigredinem quam plurimum inclinatum, figuramque non exacte rotundam habet, & ante dictum magnitudine permultum superat, atque ab uno latere paruum quandam ueluti compressiorem præfert, unde & nomen obtinuit. prouenit autem ut hoc, sic & illud in Cappadocia quam-

A plurimum. ideoque non absolute quod inde importatur optimum censendum est, sed quod peculiariter in Sauro nascitur, nec Cretico, nec palsim nascenti simile. Si quid adhuc aliud superest, quod minus dilucide sit ab Andromacho patre elegiaco uersu dictum, planum fiet theriacam legitimum ab eius filio soluta oratione descriptam. quod enim ille cecropium mel obscurius appellat, hic articum aperte nominat: centaurion ille nulla adhibita distinctione in carmine pronunciat, hic in prosa tenuer apponit, eo quod aliud quoque centaurium extet crassum appellatum. idem & in aristolochia fecit, cum præter tenuem aristolochiam, alia quoque reperitur quæ crassam radicem habeat, & rursus tertia quæ rotundam.

De compositione theriacæ.

32 Dictum est a nobis & supra eum qui theriacam comiscensibus animam semel intenderit: non iterum neque tertio id facientem uideat opus habere. at optimas quoque in genere medicinas ut idem agnoscat non semel, bis, aut ter, sed multoties, & saepe, quæ singulis in locis optima prouenire feruntur, inspexerit, oportere: nec satis hæc sunt. præcepta quoque ad usum earum pertinentia habere conuenit, de quibus et si in superioribus iam egimus, de nouo tamen per capita de omnibus dicere tempestiuum erit. Radices igitur medicinarum quæ in usum ueniunt extento cortice sint oportet, non rugoso. hoc enim earum maciem significat. fructus autem uirgulta & germina uegeta pluraque esse debent. ite & quicquid semen includit, tegmina, cortices, inuolucra, semina uero uegeta sint conuenit, quod ex eo quia tentum corticem habeant conijciemus. liquores & succi neque diuturnitate arefacti sint, neque suas qualitates obscuras habeant, has dico quæ gustu obfactuque percipimus. fructus igitur una cum germinibus & inuolucris, floribusque ac folijs, quotquot ipsarum sunt, in Theriacam mittunt, harum herbarum, scordij, nepitæ, marrubij, stoechadis, dictami, polij, chamædrys, chamæpityos, hyperici, cetaureæ. Radices autem hę, zingiberis, iridis, rhei, quinquefolij, costi, nardi Indicæ, nardi gallicæ, gętiang, meri athamatici, phi, aristolochiæ renuis. Semina uero hæc, napi, petroselinij, thlaspi, aneoes, anethi, foeniculi, dauci, cardamomi.

D 33 Hæc itaque tria rerum genera mortarijs Aegyptijs imponi debent: durissima enim sunt. itaque minus periculi est, ne aliquid essentiae ipsorum inde inter contundendum medicinis affricet. antedictis autem hæc quoque addenda erunt, pastilli scillitici, pastilli uiperini, magma, hedychromi, piper nigrum & albu & longum, rosæ siccae, agaricij, crocus, modo siccus sit, terra lemnia, chalcitis ista, aromonium, cinnamomum, calia fistula, balsami fructus & succus; acacia modo tenera aut humidam non sit, castoriū denique, & asphaltus, siue femininum siue masculino genere quis ipsam esse reuelit. diximus namque sepius alias non animaduertendas esse huiusmodi uerborum minutias.

34 Vino autem macerata dissolued, hæc erunt, myrtha, crocus, si tamen ita facere tutius tibi ui-

lum fuerit, nec ipsum quia humidus sit cōtuderis. Succī autem omnes ideo uino macerantur, ut & dissolui & comminui aptius possint, sagapeni dico, panacea, papaueris, cuius liquorem & meconium & opium uocat. acacia quoque cū humida tibi uisa fuerit, nec ad contundendum facilis, hypocistidis item & radicis dulcis succus. thlaspi autem & napi semina primo quidē sicut & ante alios fecisse uideram in mortario unā cum alijs contūdentis ipse quoque conijciebam. inde uero cū ipsa pilā adhaerere ob tenacitatem animaduertissem, melius esse duxi sola in alio mortario prius atrita uino superinfuso macerare quoad exacte dissoluerent, dissolutaque postmodū ceteris quae peculiariter uino macerant ac diluunt admiscere. thus quoque per se solū in mortario seorsum leuiter cōminuere satius est, ne in placentam coeat, tū ubi comminueris promptum habere, quod reliquis uino maceratis cū placuerit ipsum inspergas, nam gummi & uino macerare & ipsum per sese uel cum thure necesse est. Hac igitur quo diximus pacto omnia praeparantur, atque humida quidem ex uino dissoluantur, sicca uero in puluerem redigantur.

35 Quo tempore autē cuncta simul admiscenda erunt, resina terebinthinam in uase duplici primum cum melle colligabis, tum styracem & chalbanum antea pistillis ferreis rutabulis uo dico melle crudo instillato confusa, & postea digitis explanata, adijciatur autem & mellis adhuc aliquid ad colligatam resina. atque ita uase cooperito ea rursus liquari permittes, melius est enim his rebus impositis, mel non amplius mouere, sed adoperito uase quod aqua innatat ut elixentur permittere. interea dum ista liquefunt maceratis ex uino siccas medicinas eatenus adijcies & commiscabis quousque spissa satis esse uideantur. atque ita paulatim liquefacta, tepida his quae in mortario sunt affundes, ita ut fortis aliquis uir ipsa per magnum pistillum uniat. ac postea quam bene inter se commissa, atque in unum corpus redacta fuerint, densaque iam quodammodo uideri coeperint, mellis & moderate decocti & proculdubio despumati partem quandam superimittes. postea cōtularum medicinarum portionem quandam, deinde rursus mel inferes, postea liquefacta, sed tepida infundes. postremo quicquid pulueris & mellis supererit, admiscabis uehementer omnia magno in mortario magnaque tudicula commiscēdo. cum uero tudicula ductu in mortario omnia coarserint, tum in pilam transferenda sunt. atque ferreis rutabulis diligēter exteris nequid rubiginis insillat sine intermissione contundenda. Rutabulum autē opobalsamum subinde perunges, ne subigēdarum reum tenacitate obtineatur, neue difficulter se inde attollentibus resistat. ut igitur opus expelite procedat, imas rutabuli partes opobalsamum saepe in unum conueniet, atque opobalsamū haec una in re totum absorbere, melius est autem in sole contundere, sic enim citius in unum corpus omnia conuertuntur, dumque hoc faciemus pilam in qua antidotus habet, operiemus, ac post quatuor

A aut quinque dies rursus in sole ipsam eodem modo contundemus, idemque sex, septemue dierum spatium interiecto iterum atque deinceps repetemus, donec menses duo uel quadraginta dies saltem compleantur.

36 Haec uero quae cumque conscripsimus ad theriacam uim augendam pertinent, quae uero mox subiungam, ad colorem. danda namque est opera, ut nigram theriacam efficiamus. nam hoc & si quo pacto in consuetudinem uenerit, nesciam, quisquis tamen hunc colorem non consequitur, irridetur, quamquam nulla coloris qualitate medicamento uis immutetur. nigra uero theriaca non erit, si chalcitis flaua luteaue dum urit, euaserit. chalcitidis enim particula quantumuis minima colore suo, theriacam inficit. ne quis igitur hac quoque in re frustretur, istis quae dicam, mentē adhibeat. quatuor chalcitis drachmas cum theriaca solummodo capiat, multo plures afflare cōueniet hoc modo. cōijce in exiguam ollam chalcitis crudae drachmas non pauciores quadraginta, postea succensis carbonibus ollam absque operculo, in medio prunarum statue: cumque liquefacta chalcitum uideris, ac quae leuissima & spumosa pars eius est innatae, statim ollam ab igne amoue, humique colloca, nec ut aliquando solemus, sicuti qui ignem accendunt, ipsi insufflabis. mirandum est enim quantum ita faciendo luteus flauusque color emergat. Imo neque in sole collocanda erit, sed in umbra donec frigeat, omittere danda. hinc postea id solummodo capies quod superne spumeum fuerit, quodque neque luteum, neque flauum, neque pallidum est. deinde experientia gratia aliquantulum eius quod probaueris, accipe, atque comminue, & num quis ex supradictis coloribus appareat, inspicere. nam si qualis accepta est, uiridis aut cinerea maserit, drachmas quatuor ipsius impones. talem namque chalcitum exiguam inuenies, etiam si multam exusseris.

37 Quae ad componendam conficiendamque theriacam requirebatur, omnia iam absoluiamus. cum uero Democrates atque Crito in quibusdam ab hisce discrepent, opportunū mihi quae ab hisce quoque autoribus conscripta sunt, subijcere uisum est. ac prius quidem Democritus theriacam qui omnem eius usum dilucide explicuit. ea autē est iambicis uersibus ut mos hominis fuit, descripta, commoditatemque hanc habet, ut non solum memoria facile contineri, sed nec in rerum pondere ac symmetria peruerti possit. in eo itaque libro in quo antidotos describit, ab usu ipsarum communis & a theriacae formulae initium sumēs ita exordit.

Damocrati theriaca.

Antidotos paratas habere has decet
Venena contra cuncta quae letalia,
Quorum repertae & haec uidentur gratia.
His nam uenenis obutes letalibus,
Illis propinans ante, cui metus subest,
Ne quid ueneni sumat amissum tibus.
Post uero & illis, qui putauerint simul
Ferale quicquam se indidisse cum cibo,
Ingestam ubi reicerint escam tamen,

Illas bis atq; ter iubens pafsis dari,
 Donec uenient signa permanent mali.
 Has læsit ut serpens quos obuius, dabis.
 Letalis dentes uel quibus imprefsit fera,
 Apis, Ceraſta, Diplas, atq; Hydri graues,
 Echidna triftis, ſpumei canis furor.
 Hæc quippe morſu cuncta letali nocent.
 Obſtat marinis omnibus hæc beluis,
 Et quas minutas beſtias uocant, Apeſ,
 Crabrones, ueſpas. & rigentes ſcorpious.
 Mures araneos, rapax phalangium.
 Huius antidoti, plus una drachma dato,
 Quantum nux parua, ſed parumper amplius,
 Admiſtiſ uini puri, cyathis decem.
 Male commorſis, non ſufficiet ſemel
 Haurire. metu ſi quis abſolui uelit,
 Neceſſe antidotum ingerat frequentius.
 Hæc uſum ad omnes comòdum morbos habet.
 Qui corpus longa male afficiunt mora.
 Ad febris orbe tranſeuntis impetus,
 Rigorem quoq; qui longum tempus manet,
 Membriſ perniciosi afferens præcipuis.
 Incluſumq; utero flatum, & flatum coli.
 Et quos ueſica torſit, uel renes diu,
 Siue adſit uleus, ſiue torqueat lapis,
 Miſcebis & quos hepar infeſtat male.
 Et qui è pectoris ſanguinem reſeſibus
 Aut ſæculenti uirus excreant ſputi,
 Feratur undecunq; ſit pulmo licet,
 Inſunde ruptis, atq; conuulſis, quibus
 Inſitus diſruptum eſt atq; conuulſum aliquid.
 Sic cura triftis, ſiccq; pelletur dolor.
 Hanc, ægre ſumptum cum coquit calor cibum,
 Quamuis des modicum, coquet calor cibum,
 Quosq; irâ motu ſemper aſperat graui.
 Iter proſectus longius, quibus diu
 Vti neceſſe tabidis lymphis erit,
 His uero, pendent quantum oboli tres, dato,
 Caldeq; cyathos quatuor aut tres aquæ
 Miſcebis ante cibum tres horas, uel amplius.
 Læſa eſt quibus ueſica è paſſo dabis,
 Et ſputo ſanguinis, & ſtomachum ulceratis,
 Quibus at totum ſtillat in pectus fluor,
 Exaqua, in qua coxerit pugillulus
 Polij teuthrij, præſtat hoc cretico
 Præſtatq; ſcytico, pontico eſt præſentius.
 Nam continèbis fluxionem citius,
 Tribus cyathis præbe, ut eſt dictum modo.
 Quidam ſi magnus urget aurium dolor,
 Paſſo diſſolunt antidotum cretico,
 Et ſic meatus illita lana obſtruunt.
 Optimam quiſquis theriacen caput,
 Selecta cuncta cum reliqua habeat,
 Tum uero paſtillos uiperæ quos uocant,
 Sicut docemus, ita inſtructus paret,
 Nam hi inter commiſcenda præſtant admodum.
 Aestate grandes uiperas bis decem
 Venator captas quas recenter attulit
 Sumat, uel plures etiam, nam parum eſt
 Quod inde tollens ponat in antidotum.
 Nempe qua caput inſtat, abſcindat primum

A Quod æquet digitorum menſuram trium.
 Qua cauda uibrat, amputet plus parum,
 Id dum recentes, dumq; uigentes adhuc,
 Agat oportet, poſt ut anguillas, exuat
 Pelle, tum pingue & inteſtina abſciat,
 Quod reſtat, lauet, in ollam mittat, atq;
 Anethi ſicci congerat manipulum.
 Aquæ quod ſatis. hinc ferueant tam diu,
 Facile donec recedat à ſpinis caro.
 Ollam tepenti tunc ab igne transferens
 Solam reuulſis oſibus carnem legat.
 Aequali carnem panis æquet pondere,
 Polline panis conſectus triticeo.
 Hæc ſoluens ambo, dum leuigas, modicum
 Iuris affunde, mox inde placentulas
 B Paruas conſinge, quibus ſiccis utitor.
 Paſtillos hætenus diximus è uiperis.
 Dicemus ſcillæ. cum meſiſ falce cadit,
 Et magnam bene & albam ſcillam cape.
 Vndiq; ſiccum detrahitò corticem.
 Radices, quod lignoſæ, cunctas amputa.
 Nudata puluis ubi loricam feceris
 In furnum mittes. cum aſſam ſatis duxeris,
 Sumes exemptæ quod libræ pondus leuet.
 Contundes, leuigatæ diſigentius
 Adde farinam, libræ pondus medtæ,
 Erui farinam parum per uſtulat.
 Statim ut eruo ſcillam obligaueris,
 Paruas, ſicut dixi, conſicies rotas.
 Et mox ſiccatas conde quo uafe libet.
 C Miſturam iſtam ſumere ut nuper inuentam,
 De theriaca loquor, ſi ambigis, audi.
 Ferunt hæc uſum *Mithridatam* quoq;
 Deuictus ergo uenenum cum liberis
 (Coegit fatum per uicax) hauſit miſer.
 Nullamq; ſolus uim ueneni pertulit,
 Sed enſe uitæ terminauit circulum.
 Natas iam ferox abſtulerat potiò.
 Ne tardes igitur, ſcillinòs orbes quater
 Denis aſſume bisq; drachmis quatuor.
 Paſtillos uiperæ pendat ſenas quater.
 Opium quoq; nigrum piper, & magna
 Quod olim ueteres dixerunt hedychroon.
 Radicis ſuccum dulcis exſiccatum
 His adde, drachmas impleat duo decimi.
 D Tantundem pendat ſiccæ pondus roſæ.
 Et cinnamomum, & baſami præſtans liquor,
 Et iris, quam ſuperbum fert Illyrium.
 Napiq; ſemen, & albens agaricum,
 Cretenſe ſcordium, ruruſ dimidium
 Pontica radix pendat, petroſelinum,
 Et myrrha, & ſtoechas, & corycium crocum,
 Radix pentaphylli, & quam nepitâm uocant.
 Marrubij ſemen quod globuli continent,
 Album piper, longum piper, nardi indicæ
 Spica, & terebinthina, thuſq; malculum,
 Atq; album coſtum, diſtamiq; herba etiam,
 Et iunci, non feſtuca, flores arabi.
 Et ſiccum, & incorroſum eritq; zingiber,
 Cortices demum nigræ iunge caſia.
 Senas impoſito drachmas iſtorum quoq;

Inde quæ drachmas singula pendant duas.
 Contusa thlaspis, polium, phu pontica,
 Gummi, chamædrys, atq; lentescens styraç,
 Et gentiana, & acorus, mæon etiam,
 Et cardamomum, & semen fœniculi,
 Hypocystidis succus, asfa chalcitis,
 Semen hyperici, creticum sit tamen,
 Acaciæ succus, cum humens, tum bonus.
 Celtica nardus, & sigillum lemmium,
 Et ammi, & chamæpitys, atq; felisil,
 Anisi dudum siccati semen quoq;
 Racemum anomii, malabathri folium.
 Cuiusq; drachmas nos imponimus duas,
 Fructusq; balsami totidem duas.
 Quaternas quidam, sed non recte faciunt.
 His rursus panax, lachrymæq; chalbanii,
 Addatur, semen dauci, Creta genitum,
 Nuperq; lectum sagapenum, & castorium,
 Centauriumq; non recens, sed creticum,
 Aristolochia tenuis & sicca probe,
 Impone drachmam singulorum hinc unicam.
 Aequumq; statue pondus asphalthi bonæ.
 Duas huc quidam conferunt, quod improbo.
 Confeci sæpe quo diximus pondere.
 His tu salernum quod satis, funde optimum,
 Mellis recentis atticæ libras decem.

Horum cum succi quædam sint, illa semina,
 Folia hæc, radices ista, illa lachrymæ,
 Gignanturq; in metallis haud compluscula,
 Mero dissolue lachrymas, succos, atq;
 Metallâ, donec mellis acquirant modum.
 Immitte quæ supersunt, sicca omnia,
 Contusa, densiq; transmissa cribro.
 Mel rigans adde, bis ter quod deferbit.
 Repone, & serua uasculis non ligneis,
 Sed uitreis, argenteisq; & corneis,
 Et stanneis, & testaceis, densis tamen.
 Trades bibendum antidotum nec protinus,
 Nec moræ quam siccauerit prolixitas.
 Id si contingat, isto corriges modo.
 Infunde mellis quod sat, quodq; ferbit.
 Nam ipsum postquam commiscueris diu,
 Utile habebis quod corruerat dies,
 Peiore at multum forte q; mistum semel.

Ipsæ igitur se Damocrates ab Andromacho dis-
 sentire significat, cū inquit, Quaternas quidam,
 sed non recte faciūt, & rursus. Quas huc quidam
 cōferūt, quod improbo: illud quoq; perspicuum
 est, apertam esse magis theriacæ descriptionē ex
 ijs quæ à Damocrate scripta sunt.

38 Cum uero aliâ etiâ theriacæ descriptionem
 apud me haberem carmine & ipsam cōprensam,
 mihi eam quoq; nō omittere fatius esse uisum est,
 sed quo modo ipsam à superioribus medicis acce-
 pi subscribere, seruata singularum medicinarum
 in ipsa symmetria. est enim ceteris omnibus et pla-
 nior, & concisa magis hæc descriptio.

Alia theriacæ descriptio.

Pondera quæ rerum, rerum quis possit acerruus
 Condere theriacen, paucis aduerte docebo.
 Semina principio dauci, panacisq; liquorem,

A Et tenuem, inuentum Chironis, centauream,
 Ortaq; Syriaciis graueolentia chalbana terris,
 Serpentesq; fugans olido nidore bitumen,
 Nec non immeritis exempta uirilia fibris,
 Et longam, Lucinæ munus, aristolochian
 Difficiles tenui partus a radice leuantem
 Accipies, geminas suspēdant singula drachmas,
 Inde meon, selesimq; breuem, poliumq; senescēs,
 Fœniculū, gummi, chalcitim, thlaspin, amomum,
 Balsameos fructus duplicato pondere sumos.
 Atq; humilem quercū Graij dixere chamædryn.
 Et pinus similem folijs & odoribus herbam,
 Quamq; bonus primusq; manu rex Gētius olim
 Montibus in patrijs radicem uulsiit amaram,
 Conspēctamq; suo donauit nomine, quamq;
 B Lemnus habet terram, pharetræ signa Dianæ,
 Atq; paretonium fudit quem spina liquorem,
 Cōpressumq; rubra flauū ex hypocyotide succū.
 His folium stagnis fœcunda quod India nutrit,
 His styracem iungas, inimicæq; flatibus ammi,
 His & ab Assyria Sagapenum gente petitum.
 Et cardamomi præcluso cortice semen
 Hypericiq; comas, nardum quam Gallia mittit
 Phu quam Pontus alit, Creteci ruris alunnum
 Anisum multis celebratum laudibus addes.

Rursus quæ drachmas attollant pondere senas
 Marrubium capies, dictamum, zingiber album,
 Hinc longūq; piper, casiamq; ctoicumq; rheūq;
 Et nepitam, et myrrham, & costū, iunciq; rotundi
 Diues odoratos quos dat Panchaia flores,
 C Atq; apiti, petras quod amat, numerūq; suorum
 Quinq; tibi referens foliorum nomine gramen.
 Emitsumq; tuo frondens terebinthe liquorem
 Stūpitem, & hinc alio stillantia caudice thura.
 Hesperioq; marini nascentem stœchada, quamq;
 Proxima iam nostris nardum tulit India terris.

Hinc noua cōgeries sequitur, syluestria primū
 Semina buniadis, cinamomum, scordionis herba
 Alia quæ redolet, tantumq; imitatur odore.
 Adde nigrum dulci pressum radice liquorem.
 Adde etiam illyricis crescentem in collibus irim,
 Quæq; Palæstino de palmite balsama sudant.
 Siccaramq; rosam, lectum leuitate lo coq;
 Agaricum, senas bis tollant singula drachmas.

Inde piper capies geminato pondere nigrum,
 D Atq; suo fundunt quem secta papauer succum
 Vulnere, tum læti nomen sortita coloris
 Magmata, rē nostro memoratâ carmine, nec non
 Vipereos orbis, scillæ quos pondere duplo
 Pastilli superent, spumati deniq; mellis,
 Et uini quantum satis est infunde salerni.

Reliquum adhuc mihi uidetur ad explendam
 uniuersam theriacæ doctrinā, siquid Crito uelali
 ter quàm supra diximus, sensit, uel omissum ali-
 quid addidit subiungere.

*Que Crito de theriacæ scripsit in tertio De
 medicamentis libro. Cap. 39*

Quod ad pondus itaq; medicamentorum atti-
 net, cōiicit quidem et ipse piperis nigri drachmas
 uiginti quatuor, quemadmodum Andromachus
 filius, & longi sex, imponitq; chalcitidis uisæ dra-
 chmas

chmas quatuor, & mellis atticī libras decem. uipe-
ras autem uere iam desinente, restateq; incipēte,
aut uindemiā tempore comprehendere iubet, ut
tans nimirū aestate omnem, excepto principio,
usq; ad canis ortum, & inde sequēs tempus quod
aliqui oporā, id est, fructuum prouentum peculia-
riter uocāt, quādo in hominibus quoq; bilis pluri-
mū excrescit. uindemiā aut tempore, quod autē
mediū est, colligēdas primo apprehendēdasq;
uiperas cēset, quā magnā corpulentāq; sint, ane-
thoq; impolito elixādas, deinde carnē ex decem
uiperis collectā, unis siliginē partis uncijs cōmi-
scendā, atq; ita pastillos conficere suadet, ad hunc
modum & scillas mēsis tempore quo prācipue
uigent, euellere iubet. Planum est aut mēsem ip-
sum appellare, illud aestatis spatium quo triticum
rustici metunt. euillas deinde in furno quo ad fa-
ris sit, allare prācipit gypso lutōue circumtectas,
calido cineri subijcere, donec planē tostāe sint, tū
extractis medullam excipere. ita em̄ Crito scillā

A meditullū nominat, eamq; atterere, unamq; crui
partē duabus scillā admiscere, rotulasq; sic demū
cōficere, & eas in umbra siccare mādāt. Quod ad
contundenda uero medicamenta pertinet, accu-
rate singula docuit. nā mortario pellem obstricte
circumligandā prācipit, atq; ita in medio perforā-
tā, ut per id foramen non modo rutabulum impo-
nere possis, sed etiam eo sublato, manū quoq; &
cochlear immittere, quo per eum contusa & quā
cribranda sunt, eximi queāt. rursus quoq; alia pel-
le opus fore dicit, quā angustius foramen adhuc
habeat, ut per ipsum tudicula solummodo demit-
ti possit ad contundendū ea quā in mortario fiē-
rint, hancq; priori superimponendā dicit, nec pri-
us adimendam q̄ excicatus inter cōtundendū
B puluisculus subfidat. eodem modo quoq; cū per
cribrum cōtusa transmittemus, desuper contege-
re que excutimus, nos admonēt, nec ea prius ape-
rienda q̄ cribrū mouere pridē desuerimus, deq;
sublato cribro quicquid inhesit, penna deducere:

ARGUMENTA CAPITVM SECVNDI LIBRI DE RELIQUIS ANTIDOTIS, IN
primo enim de theriaca solum per excellentiam appellata docuit. Descriptus autem est secun-
dus hic liber magna ex parte, ex Andromacho, Damocrate, Asclepiade & Hera.

Cap. 1. Mithridatij potentia, eiusq; cum theriaca
comparatio. 2. Compositio Mithridatij. Vide etiam
cap. 10. & 52. & 65. 3. Alia eiusdem compositio secun-
dum Antipatrum & Cleophantum. 4. Urbani Indi
antidotus ad fœtus eijciendos. 5. Antidotus Panacia
ex sanguinibus plurimā promissionis. Vide etiam cap.
14. & 49. 6. Antid. asyncretitos ad omnes internos affe-
ctus. Hanc & Astuarius habet. 7. Aelij Galli antidoti
multi usus. 8. Ant. Zopyrios. Vide aliam cap. 48.
9. Iacenus ex Andromacho: Deinceps Damocratis
Antidotus sequuntur. 10. Mithridaticū Damocratum,
senarij descriptum. Vide cap. 1. & 2. 52. 65. 11. Cypri
compositio senarij eiusdem descripta. 12. Aliud anti-
dotum, per senarij eiusdem. 13. Aliud Damocratis
ueribus descriptum. 14. Aliud ex sanguinibus car-
mine. Vide etiam cap. 5. & cap. 49. 15. Aliud Char-
nedicū, carmine. 16. Idē aliter, carmine. 17. Ali-
ud carmine. 18. Aliud carmine, aequipollens præsri-
pto. 19. Rosaceorum confectio, senarij. 20. Croco-
pogonis cōpositio, senarij. 21. Antidotus prognos-
tica, carmine. Quod etiā infra describitur profa. ca. 43.

Sequitur de antidotis ex Asclepiade.

22. Quenam uocentur antidota: & de uarijs eorum
differentijs, & Asclepiadis ordine, quem in suo de anti-
dotis libro sequitur est. Remedia uenenorum ex Ascle-
piade. 23. Ad papauerum lachrymam. 24. Ad me-
conium. 25. Ad aconium. 26. Ad hyoscyamum.
27. Ad coriandrum uiride. 28. Ad leporē marinū.
29. Ad toxicum. 30. Ad ephemerum. 31. Ad do-
rycnū. 32. Ad fungos. 33. Ad ixiā. 34. Ad bu-
prestim. 35. Ad cantharides. 36. Ad cerulam. 37. Ad
potum argenti spūmā. 38. Ad gypsum. 39. Ad lac
coagulatum. 40. Ad sanguinē taurinum. 41. Ad hi-
rudines. 42. Aduersus eos qui composita uenena pos-
siterant scripta reliquerunt.

Adhuc de Antidotis ex Asclepiade.

43. præsriuatium a uenenis remedium. 44. Aliud
præsriuatium: quod supra etiā habetur carmine, cap. 21.
45. Codij Tusci antidotus. 46. Alia Apellis. 47. A-
thanasia Michridatis antidotus. 48. Ambrosia Philip-
pi Macedonis. 49. Zopyrios antidotus. Alia est su-
pra cap. 8. 50. Antidotus ex sanguinibus ad uenena &
ictus uirulentos. Aliam uide supra cap. 14. 51. An-

tidotus Mithridatis Eupatoris diascinae dicta. Vide
etiam capit. 2. 3. 10. & 53. 52. Mithridates theriaca. Vi-
de pracedēs caput. 53. Hecatonstigmatos. 54. An-
tidoti Aelij Galli. 55. Alia eiusdem. 56. Alia Galli.
57. Ambrosia Archibij hiera. 58. Antipatri thesia-
ca. 59. Aelij Galli theriaca. 60. Alia eiusdē. 61. Eu-
clidis palatiani theriaca. 62. Zenonis Laodiceī the-
riaca. 63. Antidotus ad uulsos, ruptos, hæmopticos;
&c. 64. Antidotū Mithridatum. Vide etiam in prin-
cipio huius libri, & sequente capite. 65. Antidotus ty-
rannus. 66. Ad quartanarios.

Remedia pro morbis a cane rabido.

67. potus ad morsum canis rabidi. 68. Aliud ad eū-
dē. 69. Alysi herba remediū. 70. Aliud acithrea;
ex cancris. 71. Cratippi, Heræ, Galli, remedia ad idē.
72. Zenonis ad idē. 73. Aliud Cl. Apollonij. 74. Me-
nippi ad idē. 75. Menelai ad idē, & ægilopas, & om-
nis serpentis ictum. 76. Leuce emplastrū Baphulli.
77. Basilica ad morsos a cane rabido.

Remedia ad scorpionum ictus; & phalangiorum.

78. primum Diophanti remedium. 79. Aliud, cum
alijs 4. sequētib; 80. Antidotus scorpiciaca. 85. A-
lia Zoile. 86. Epithema ad ictos a scorpio, cum alijs
4. sequentibus.

Remedia priuatim contra phalangia.

100. Remedium Charitonis & aliorum, ad phalangi-
orum, & aliorum reptilium morsus: usq; ad 101.

Ad uiperā & aliarum ferarū morsus.

102. Dorothei remediū pro morsis a uipera. 103. Ali-
ud rustici. 104. Aliud Eudemi carmine elegiaco. Hoc
lapide in limine adis Aesculapij incincti paulo aliter
exposuit Plinius in sine libri 26. naturalis historia: Idē
tūde infra cap. 122. 105. Heraclidis Tarentini ennea-
pharmacum. 106. Dorothei experientia probatū ad
omnem ictum. 107. Aliud Hybristæ. 108. Theriaca
ad omnis feræ ictum. 109. Epithema ad morsum uipe-
ræ: cum alijs 3. sequētib; 113. Damocratis senarij ad
idē. 114. Psyllorum antidotus, carmine. 115. Anti-
dotus ē coagulo hinuli & uino Falerno, carmine.
116. Antidotus ex cancris pro morsis a cane rabido:
primum autē symptomata morsorū exponit. 117. De
simplicibus medicamentis ad morsos a cane rabido: ut
est Lycium ex aqua, Britannica, Vrsi fel. 118. Empla-

strum ad canis rabidi morsum, et alia quædam uenena. A
119. De iaculorum uenenatorum uulneribus.

Antidota, quæ Heras scripta reliquit.

120. Marci theriaca. 121. Aliud Antiochi philome-
toris, uersibus elegis. Idê uide supra ca. 105. 122. Aelii
Galli antidotum: (simile est supra ca. 60. & 108. Sed ali-
quid uariant tum ingredientia. tum promissio uirium:

quare omissa ab alijs nos addidimus in Latina uersio-
ne. 123. Aliud ad uiperæ morsum. 124. & 125. Alia
ad phalangia. 126. Zopyrios Heræ. 127. Antidotus
ad omnia uenena, & morsum canis rabidi, &c. 128. alia
ex terra Lemnia. 129. Cum tribus sequentibus
remedia ad hydrophobos. 133. & 134.
Ad podagricos remedia.

GALENI DE ANTIDOTIS

LIBER SECVNDVS.



PROPOSITA à nobis integro
uolumine theriaca, ut reli-
quis antidotus breuibus ex-
plicemus, efficiet quas mihi
hoc in libro recensere propo-
situm est ab ea quam Mithri-
datam uocant, initio sum-
pto. hæc em aduersus quam

plurima uenena plus etiam quam theriaca ualet,
quamuis ictus uiperæ sanare minus possit. Quo-
niam uero Andromachus & hæc, & deinceps op-
timas quasq; ferme antidotus literarū monumen-
tis commissit, cum de medicamentis ageret, quæ
intra corpus assumuntur, idcirco & ipse eas om-
nes quo ordine ille conscripsit, subiungam.

Andromachi antidota. Cap. 2

Antidotus Mithridatica, priuatim ad omnia ue-
nena faciens, & ad malas internasq; corporis affe-
ctiones efficax. Radicis dulcis drach. vii. ob. iiii.
opij drach. iiii. ob. ij. castorij drach. vi. oboli ij. polij
drach. v. obol. ij. costi drach. vi. obol. ij. spice nardi
drach. vii. ob. iij. casie drach. v. ob. ij. thuris drach. vi.
sefeleos drach. v. ob. ij. succi hypocyttidis drach. vi.
acori drach. ij. scordij drach. vi. ob. ij. folij drach. iiii.
alij drach. v. ob. iij. alij drach. vi. immittunt. cyphe-
os drach. v. ob. ij. myrrhæ drach. vi. croci drach. vii.
ob. ij. cinnamomi drach. vii. ob. ij. styracis drach. v.
ob. iiii. seminis dauci dra. vi. ob. iij. zingiberis dra.
vii. ob. ij. phu pontici drach. ij. petroselinii 3. iiii. ob. ij.
nardi gallicæ drach. iiii. seminis foeniculi drach. iiii.
nardi indicæ drach. iiii. hyperici drach. ij. acaciæ
drach. ij. gentianæ drach. iiii. alij uero duas imponit.
anisi drach. iiii. thlaspeos drach. vi. ob. iiii. mei atha-
manticæ drach. iiii. alij drach. ij. rosarum sicca-
rum drach. iiii. gummi drach. ij. cardamomi drach. iiii.
alij drach. ij. iucci odorati drach. vi. ob. ij. opoponacis
drach. vi. obol. ij. opobalsami drach. vi. obol. iiii. gal-
bani drach. vii. scinci drach. ij. obol. ij. terebinthinæ
drach. vi. ob. ij. uini chij quod satis est, mellis atticci
despumati quod sufficit.

3 Aliter mithridatica hæc antidotus componi-
tur ex Antipatri & Cleophrantis traditione. Myr-
rhæ drach. vii. ob. iiii. alij iij. spice nardi tantum dem
croci drach. vii. ob. iij. opij drach. iiii. ob. ij. s. styracis
dra. v. castorij drach. vi. ob. i. cinnamomi drach. vii.
obol. iij. polij drach. vi. ob. iij. scordij drach. vii. ob.
iij. zingiberis tantundem. costi drach. vi. ob. iij. pi-
peris longi drach. vi. ob. iij. piperis albi drach. v. ob.
ii. sefelis 3. v. ob. ij. petroselinii drach. xiiii. seminis
dauci drachm. vi. ob. iij. casie drach. v. ob. iij. thuris

drach. v. ob. ij. succi hypocyttidis drach. vi. obol. iis.
nardi gallicæ drach. iiii. seminis foeniculi drach. iiii.
foliorum malabathri 3. iiii. acori, phu pontici, sa-
gapeni, fructus balsami, hyperici, iridis syllyricæ
singulorum drach. ii. rubricæ lemnis, cypheos, lum-
borum scinci singulorum drach. vi. acaciæ, gummi,
cardamomi, securidacæ singulorum drach. ij. semi-
nis thlaspeos drach. vi. ob. iiii. gentianæ drach. iiii.
alij iij. anisi drach. iij. rosarum exsiccatarum dra. iij.
mei athamanticæ tantundem. florum iunci rotun-
di odo. drach. vi. ob. iij. opoponacis drach. vi. chalba-
ni drach. vi. ob. iij. opobalsami tantundem. aristolo-
chiæ drach. i. hyssopi drach. iij. marrubij drach. i. cha-
mæpityos drach. iij. roris marini drach. v. terebinthi-
næ dra. vi. ob. iij. mellis atticci quod sufficit, uinum
ne iniicit.

4 Antidotus in Orbanū Indum relatâ ad foetus
eiçciendos. Myrrhæ drach. xv. croci drach. xvi.
nardi indicæ drachmæ sedecim. cinnamomi, ca-
siæ, panacis singulorū drach. xiiij. amomi drach. viij.
scordij drach. v. florum iunci odorati drach. viij. mei
athamanticæ drach. iij. succi rosarum, drach. xij. ob.
iij. phu drach. v. ob. iij. hyperici drach. v. zingiberis
drach. vi. piperis nigri drach. vi. piperis albi dra. viij.
styracis drach. v. ob. iij. seminis foeniculi syluestris
drach. iij. ob. iiii. piperis longi drach. v. alij drach. vi. co-
sti drach. vii. ob. iij. seminis trifolij drach. v. gentianæ
drach. iiii. aristolochiæ rotundæ drach. iiii. polij dra.
v. radicis trifolij drach. v. ob. iij. cardamomi drach. v.
radicis echij drach. iiii. thuris 3. vi. petroselinii dra.
vi. uerbasci drach. v. sefeleos drach. v. cumini athio-
pici drach. iij. fructus balsami drach. iiii. nardi celticę
drachm. viij. terræ sigillatæ drach. iiii. opij drachmæ
quatuar. oboli tres. cachryos dra. iij. cypheos dra.
iij. iridis syllyricæ tantundem. succi mandragoræ
drach. vi. ob. iij. sagapeni dra. iiii. opoponacis dra-
cii. anisi drach. iiii. succi hypocyttidis drach. vi. tere-
binthinæ 3. v. ob. iij. castorij drachmę quinq; opo-
balsami drach. xvi. seminis rutæ syluestris drach. iij.
chalbani drach. iiii. seminis napi tantundem, me-
dullæ ceruinæ 3. vi. ob. iij. unguenti nardini drach.
xx. sanguinis hædini exsiccati drachmæ quinq;
oboli tres. sanguinis asferici tantundem, sangui-
nis anatis drachmæ iij. oboli iij. succi buphtal-
mi Aegyptij drachm. viij. uini chij, mellis atticci
quod sufficit.

5 Antidotus panacea qua uot multa promit-
tens ab Aphrodisa accepta. Cinnamomi drach.
viij. amomi drach. iiii. casie fistu. nigre, drachmæ
sedecim. croci drach. sedecim. iunci rotundi odo.
drach.

drac. v. thuris drach. v. piperis albi drach. iiii. ob. o. iiii. piperis longi drach. i. oboli tres, myrrhae drach. xi. oboli. ij. nardi indicae. drach. xi. oboli iiii. nardi gallicae drach. xvi. obol. ij. rosarum exsiccatarum drach. vi. costi drach. ij. obol. iij. s. opobalsami dra. iiii. obol. ij. succi cyrenaici drach. iij. alij drachmae quatior. s. stoechadis drach. v. oboli ij. radicis trifolij drach. iiii. uel eius seminis drachm. iij. florum scordij drach. xi. oboli ij. polij cretici drachmae vi. oboli duo, asari drach. ij. acori 3. iij. ob. iij. s. feminis dauci tantundē. s. anisi drachmae duae, cumini aethiopiici tantudem, rhei pontici drachmae quinque ob. iij. s. feminis napi syluestris drach. iij. uel feminis rapi fatiui tantundem. phu pontici drac. ij. mellis despumati quod fatis est.

6 Antidotus incomparabilis quam ipse composui, faciens ad omnes malas internasque corporis affectiones ex Nicoftrati traditione. Radicis dulcis, folij malabathri, opobalsami, agarici, cinnamomi, singulorum drachmae xiiij. zingiberis feminis trifolij, amomi, feminis ruta syluestris, baccarum iuniperi immaturarum & exsiccatarum, singulorum drachmae quindecim, petroselinii Macedonici drachmae octo. succi papaveris tantundem, castorij, piperis longi, succi hypocyfthidis, cyphos singulorum drachmae xij. obol. ij. polij, piperis albi, feseleos, bdellij singulorum drachmae xv. ob. iij. florum iunci odo. costi singulorum drachmae xij. s. feminis dauci, thlaspeos singulorum 3. xij. spicae nardi drac. xxiiij. radicis callicae nigrae dra. xvi. thuris, panacis, opopanaxis singulorum dra. xij. acori dra. v. scordij dra. xvij. foeniculi, nardi gallicae, gentianae, florū rosarū, gummi, succi cyrenaici, cardamomi, thymiamatis ammo niaci, radicis echij, succi aparines singulorum drac. viij. sagapeni, hyperici, succi acaciae, iridis illyricae singulorum drachmae xiiij. myrrhae quae stacte dicitur, drach. xx. croci drach. xxx. styracis dra chim. xi. ob. ij. phu, mei, dictamnii s. napi calami odorati singulorum drachmae viij. aut x. anisi, asari, agarici, scinci singulorum drachmae vi. terebinthinae drach. xiiij. ob. iij. galbani drach. v. sanguinis anatis foeminae, sanguinis hoedi singulorum dra. vij. piperis nigri, piperis longi singulorum drachmae xxiiij. crocomagmatis tantundem, radicis quinquefolij, origani syluestris, marrubij, stoechadis, ammeos, chamaedryos, chamapityos, centaureae mi. aristolochiae mi. singulorum dra. vi. sigilli lemnij, dra. xxx. sanguinis anserini, testudinis mariae, rhei pōtici, singulorum dra. vij. mellis attici quod sufficit. Datur ad magnitudinem fabae ex aqua, facietiam ad quartanam, caterū ad uenena plus alijs antidotis ualet.

7 Antidotus Aelij Galli qua Caesarem liberauit, hac & Charmes utebatur ad ebibita morsuque illata uenena faciens, quaeq; si loca in quibus reptilia diuersantur, asperseris, ea fugabis: ualet etiam ad fluxiones, oculos, aliudue quoduis corporis membrum instantes, eas enim exsiccet, tristem animi habitum & longas intermittetesque febres soluit, mulieribus praeterea quae difficulter

A purgantur, auxiliatur, foetus sine dolore eijcit, tabidis demum ex quatuor aqua cyathis ad nucis auellanae magnitudinem sumpta prodest, ut à uisera percussis ex uino. Myrrhae, drachmae xij. croci, drach. xiiij. nardi, drachmae xiiij. iunci rotundi odorati, drachmae duodecim, cinnamomi, drachmae ij. amomi, drachmae iij. chalbani, drachmae undecim, terebinthinae, drachmae v. piperis albi, drachmae x. piperis longi, drach. xxxij. costi, drac. viij. thuris, dra. xij. succi papauae tantundem, scordij, drach. viij. polij, drach. iij. succi hypocyfthidis, drach. duodecim, feseleos, dra. viij. opobalsami, dra. xij. castorij, dra. xij. petroselinii, dra. xvij. feminis dauci, dra. xvi. opopanaxis tantundem, mellis attici festaria duo.

B 8 Antidotus zopyria. Cinnamomi, drachmae iij. myrrhae quae stacte dicitur, drachmae v. nardi, drachmae v. croci, casiae, singulorum dra. iij. floris iunci rotundi odorati drachmae ij. piperis albi fesequidrachmam. Thuris dra. i. costi drach. i. mellis quod fatis est, exhibetur ad nucis auellanae magnitudinem ex tribus aqua cyathis semel per annū.

9 Quas haecenus antidotos descripsimus, omnes sunt ab Andromacho conscriptae. cum uero quae carminibus explicatae sunt, ad ponderis sinceritatem medicamentorumque memoriam maxime conducunt, idcirco conscriptas quoque à Damocrate antidotos memoratu dignas subiunximus, principio rursus à mithridatica sumpto.

10 Antidota à Damocrate conscripta.

C Antidotus quam uiri quidam insignes admodum, Mithridaticam uocant, medicamen ad omnes malas corporis affectiones efficax quamque omnis antidoti uicem praestare dixerunt: accipit autem.

Myrrhae arabicae troglodyticae drachmas decem. Croci decem, agarici decem, zingiberis decem, Cinnamomi decem, spicae nardi decem, Thuris decem, & item thlaspis decem.

At feseleis, & succi balsami, & iunci odorati, Stoechadis, costi, chalbani, terebinthinae, Piperis longi, ac castorij pontici, Succij hypocyfthidis, styracis bonae, Opopanaxis, & folij malabathri recentis, Pares singulorum bis quatuor drachmas capit.

D Casiae uero nigrae septem, & polij septem, Piperis albi septem, scordij tantundem Cretici tamen, & seminum dauci tantum. His pendet fructus balsami drachmas pares, Aequale pondus cyphi praedictis dabit. Sunt qui par uelint bdellium adijcere.

Hinc nardi celticae repurgatae, & gummi, Et petroselinii, & opij, meconium quod uocant, Et cardamomi, & seminum foeniculi, Et gentianae, & foliorum rosae, Drachmas imponunt singulorum quinas. Parumper tamen descendat laix propensius, Pendat dictatum creticum tantundem.

Rursus anisi & asari cape tres Acoricque, phuque, sagapenicque tres, Maricque athamantici, & acaciae,

Et ventris scinci, & seminum hyperici.
Singula drachmas hæc pendant duas semis.
Vini & mellis adde quantum est fatis.
Satis est quantum hæc apte iungas simul.

*Quoniam uero Damocrates Cypheos mentionem facit,
idq; etiam ipse componit, re erte ideo illius quoq; composi-
tionem ascripsit quam deinceps subiiciam. Cap. 11*

Simplex nihil Cyphi putabis optime
Nec terra profert ulla, sed nec succus est.
Aegyptus quosdam hoc cum placat deos,
Incendit, & quo dicemus parat modo.
Passillam uuam & albam sumunt & pinguisimam.
Corticem demunt, eximunt uina cea.
Pulpæ contusæ & inde subactæ diu
Drachmas capiunt & quatuor, & bis decem,
Exusta terebinthina pondus idem
Adduntq; myrrhæ, & iunci odori duodecim.
Hinc Cinamomi quatuorq; unam croci
Tres unguium bdelli, aspalathi duas semis,
Tres spicæ nardi, tres calix bonæ,
Tres lecti cyperi, baccas iuniperi quibus
Adiungunt aquas, pingues & magnas legunt.
Accedit drachmis calamus flagrans nouem,
Mellis quod sufficit, & uini prorsus parum,
Bdellium, uinum, myrrham, in mortarium
Mittunt, & terunt, quò ad mellis crassitiem
Liquentis iuncta reddant, tum mel postea
Affundunt, uuas miscent, demum cætera
Imponunt, sed contusa, paruos inde
Conspingunt orbes, quibus deos fumigant.

Rufus nos cyphi sic parare docet
Vir probus ualde & peritus medicus.
Quidam, si desit cinnamomum sibi,
Tantumdem miscent cardamomi seminum,
Et hac utuntur æque ac priore.
Quidam si pulmo uel iecur uel ex extis
Aliud ullum, ulcus habet malum,
Huius propinant pharmaci denarium.

*Cum uero Damocrates alias quoq; antidotos memoratu dignas
& ob expositas commoditates, carminibus ab eo proditas con-
scripserit, illas quoq; subiungere mihi fatuus uisum est quam in
taliis omittere, nam theriacam quam uocant quo ritu ipse com-
ficiat in precedente libro docuimus, nunc que deinceps
expositæ sunt antidoti subiiciemus. Cap. 12*

Antiquæ phthisi alia ualde bona,
Et sputo sanguinis, & clam febricitis,
Necnon & pectus imbecille habentibus,
Stomacho, & renibus, & iecori prodest.
Omnibus quæ dixi ualet, delicatis tamen
Quòd possit mitius, conueniet magis.
Libenter sumpta hac Augustum ferunt
E longo morbo conualuisse breui.
Pectore multum costisq; affectum male.
Accipit psylli & subrubentis casia,
Indæq; nardi, & gallicanæ puræ,
Et cinnamomi, atq; recentis croci
Drachmas duodecim, opobalsami decem,
Myrrhæ quam stacten dicunt, crassæ, sedecim.
Hinc iunci tenuis, & sigilli lemnij,
Radiciæ ponticæ, & seminum ruta.
Syluestris melior multo est ruta tamen,

A Amomi quoq; & siccæ rosæ tantum
His album piper adde, semen napi.
Incultis locis hoc non subactis lege.
Quater hæc duo drachmam, ter uero thus trahet,
Aequabit thus dictamum creticum, satis
Siccatum quidem, sed tamen adhuc recens,
Thuri cuminum ex æque thebaicum,
Alia cribro tusa exarces tenui,
Immitte solum in mortarium psyllium,
Multo plus tamen, ut inde quantum uelis
Sumas, nam totum comminui nequit.

Confice hoc pacto. myrrham mitte bonam
In pilam latam, uini quantum est satis
Falerni pinguis affunde, atq; dilue
Myrrham parumper, opobalsamum dein
B Admisce translucidum, nam id est bonum.
Hinc, ubi tusa conperferis alia,
Combibant sines humorem tantisper,
Donec feruorem bis teruè mel efferat.
Assuso melle unies antidotum,
Repones uase qualem descripsi modo.
Sic quibus dixi hinc remedium dabis.

13 Alia ualde bona ad quæ dixi omnia,
Prorsusq; hanc dicunt ad status meliorem,
Stomachum longo qui infestatur tempore.
Tollit rugitus qui uentrem & colon
Perturbant intestina discurrentes.
Acutos quoq; reddit oculos senum.
A feris morfos summa leuat ope.
Ita hanc conficies, sed miuentia hæc habe.

C Succu cyrenaici boni drachmam cape,
Acori, phu, castorijq; & asari,
Seminis cardamomi, gummi arabici,
Liquoris acacia, iridis optima,
Sagapeni puri, cretenis hyperici,
Propensa lance drachmas iniice duas,
Tres opobalsami pellucidi, parem
Mensuram psyllij opobalsamo subdes,
Tum albi piperis, & spicæ, & nardi celticæ,
Petroselinu, ac recentis folij,
Cumini quoq; seminum Aethiopsis,
Meiq; athamantici, & amomi boni,
Meconis opij, gentianæ, & balsami,
Appendo singulorum drachmas quatuor,
Styracis quinq; liquidæ & triobolum,

D At albi costi, thlaspeos, & selis
Nigræq; casia, uno obolo minus,
Schœni & polij drachmas quinq; tres obolos,
Item dictami Cretæ quam tellus alit.
Pondere eodem conijcito scordium,
Masculum thus, lemnij terram, longum piper,
Myrrhæ, glycyrrhazam, chalbanu, terebinthinæ,
Anatis recentem sed siccatum sanguinem,
Succum panacis, ac semen sceniculi,
Folium rosæ siccum, hypocyttidis
Expressum pulchre succum, dein agaricum,
Dauciq; semen Cretici electum adde,
Anisi quoq; semen, & scincum quoq;
Bis tres cuiusq; pondera denarios.
Demum zingiberis cum sicci, tum boni,
Et cinnamomi atq; croci bis quatuor.

Omnium pondus uel geminet, chium
 Infunde uinum quod esse putas satis,
 Siue falernum uetus quantum chij,
 Miscebis hanc antidotum, ut te parum
 Antè miscere theriacam docui,
 Utq; illam dixi, sic hanc omnibus dabis.

14 Alia ex sanguinibus quā quidā dicunt

Cæteris amplius ad uenena conferre,
 Continet anserini sanguinis sicci duas
 Drachmas, tres marinæ testudinis,
 Hædini tres, tres anserini sanguinis
 Anatis fœminæ sanguinis præstat tamen.
 Drachmas præpinguis myrrhæ iunges decē.
 Liquenti myrrhæ spicam nardi æquabis.
 Nam cinnamomi bis tres erunt satis,
 Bis quatuor foliorum siccæ rosæ,
 Iunci rotundi, costiq;, & thuris una,
 Amomi tres, piperis albi totidem.
 At longi piperis unam & dimidiā,
 Croci duodecim, casiaë bis quatuor,
 Quinq; radicum trifolij, & polij,
 Opobalsami tres, petroselinij quatuor,
 Baccarum iuniperi pinguium, & acori duas,
 Rhaponticæ, meiq; & dictamni duas,
 Cuiusq; drachmas dico, & plu itidem duas,
 Ammoniaciq; thymiamatis similiter,
 Et fœniculi, agarici duas semis,
 Tres ruta siluestris, dauci duas quoq;
 Anisi, & asari, unam cum dimidiā.
 Aequabis ante dictis ammi, & semina
 Cumini, Thebæ quod exusta procreat:
 Tres seminum siluestris drachmas napi,
 Prædictis addes, quinq; uero scordij,
 Quod Creta gignit (diximus) id melius.
 Omnium pondus mel atticum duplicet.
 Partim confusa, partim soluta omnia
 Excipe melle cocto, serua pyxide.

Post antidotos huiusq; descriptas Mithridaticā Damocrates subiunxit, quā nos paulo antè recensuimus: igitur ea omissa quas deinceps cōscripsit ille, nūc ipse subiiciā. Cap. 15

Antidotus quam recentes charmen uocant,
 Affectus sanat, qui molescatunt diu,
 Et quibus nullum medicamen profuit.
 Myrrhæ hæc optimæ habet, & opobalsami,
 Succihypocystidis, & thuris boni,
 Opopanaxi sinceri, & croci noui
 Drachmas duodecim, in singulis pares.
 Albentis costi, pontici castorij,
 Terebinthinæ puræ, florum sœcœni inijce
 Drachmas bis quatuor singulorum atq;
 Amomiracemorum, & polij quatuor,
 Et cinnamomi quoq; totidem boni,
 Cretensis dauci seminum bis tres,
 Dauco par pondus seminum seseleos,
 Rufaq; casiaë corticum bis nouem,
 Aequabis casiaë, petroselinij semen,
 Piperis longi & noui bis duodecim,
 Abrosium carie nam uetus reperies.
 Piperis albi decem, chalbani decem,
 At spicæ nardi electæ drachmas sedecim
 Drachmas recentis bis uiginti & quinq;

A Adiunge scordi quod tellus Creta parit.
 Res siccas pondus mellis ter adæquet.
 Commisce, sicut antidotos alias
 Te pridem monui, & similiter dabis.
 Hanc Charmes autor bis quingentis atticis
 Vendebar drachmis, nec totam libram dabat,
 Dareq; gratis uidebatur insuper.

16 Quidā fide dignus Charmidis discipulus

Scripturam hanc dicebat probatissimam,
 Quæ nardi indicæ drachmas sedecim capit,
 Et myrrhæ pinguis, & succi papauerum,
 Hypocystidis succi, succi balsami,
 Succipanaxis, recentis & liquidi,
 Et thuris, & castorij, singulorum
 Drachmas bis senas, ac chalbani quatuor,
 B Terebinthinæ quinq; polij quatuor,
 Bonæ, sed nigra casiaë bis quatuor,
 Albi piperis duas, oblongi unam,
 Et duos obolos, croci corycij decem,
 Vnam prædictis addes, & bis quatuor
 Sœcœni attriti, sed amomi quatuor
 Duas cinnamomi, item & seselis duas,
 Sex dauci drachmas seminum Cretensis,
 Petroselinij seminum bis nouem.
 Hinc scordij drachmas bis quatuor comæ,
 Bdellij unguinum unam sed pellucidā,
 Mellis infunde libras quinq; plus parum.
 Confice hoc pacto. succos dissolue prius
 In mellē calido, atq; resinam optime.
 Cribrata post hæc admiscebis reliqua.

C Corpus in unum rediges. ex hoc dabis
 Quantum auellana, sumere quibus expedit.

17 Hæc si cōponere uis, impetū cohibet

Infra supraue prorumpentis sanguinis.
 Hanc si accurate facis, habebis optimam,
 Capit cilicij croci, recentis, & boni
 Drachmas bis octo, & tantundem opij,
 Sinceræ myrrhæ, & thuris infra cti,
 Cuiusq; drachmas accipiet sedecim,
 Corticum octo, radicum mandragoræ,
 Hysocami seminum ter quatuor,
 Bis ternas adde seminum papaueris,
 Tres cinnamomi drachmas appendo boni,
 Succipataricæ, aut syriacæ rhois
 Ter uiginti quinq;, alterius bis duodecim.
 D Miscebis ita. primo selectum crocum
 Cretico & albo, & dulci uino madeat,
 Ad summū dies duos, cum frigidum uideris
 Et mollem ualde, confice in mortarium,
 Et cocleari subige, dum leuigatum facis,
 Adiunge myrrhæ, thus, simul & opium.
 Seoruum rhois succus, ma defecat quoq;
 Quem maceratum prædictis adicies.
 Subinde leuigata, & comminuta
 Cætera cuncta pariter confundes,
 Ac mellis cocti & atticij quod satis,
 Paulatim fundens in unum acruabis.
 Aceruum è mortario in uas uitreum,
 Vel stanno factum, transferes, & oblines.

Ex hoc ijs dabis, qui sanguinem reijciunt
 E uentre, gutture, pectore, pulmone,

Quantum tres oboli pendunt, aut plus parum,
 E tribus uini cyathis diluit
 In uino myrtis factis, & saxis aqua
 Astricta. renes, aut uesica, sanguinem
 Remittit, quibus hanc medicinam dabis.
 Quod si ieiunium, siue intestinum, aliud
 Subtrile, siue colon, siue uenter fluat:
 Huius antidoti, quantum est drachma, dato.
 Febriat si quis pluuia ex aqua,
 Non febrienti, ex uino dabis quoq;

Diluto, uel myrtaceo, uel dulci cretico.
 Si quis non multis mistam habere uelit,
 Sed paucis conditam antidotum rebus,
 Ita componat sedulus aptissimam.
 Infirmo stomacho, nec appetenti cibum
 Squallidis, macris, tarde concoquentibus,
 Dolores omnes inueteratos pectoris,
 Et uentris tollit infixos iam diu.
 Verunt Augustum hac usum Tiberium,
 Villam nec unquam peribisse aliam.
 Continet nigri piperis quinque uncias,
 Crocomagmatis quindecim, rosæ decem,
 Excussa cribro excipe melle omnia.

18 Alia faciens ad eadem, quæ & prior,
 Rosarum constat uncijs bis quatuor.
 Cætera uero quæ & superior capit,
 Contusa ea omnia, & per cribrum adacta,
 Melle despumato excipe ualde bono.
 Ad magnitudinem auellanae, ex hac dabis
 Emulso, uel recenti melicrato
 Bene decocto, & commisso bene
 Percussis à serpentibus, seu ueneno
 Petitis, quantum nux iuglans, exhibe
 In septem uini cyathis diluti.

19 Passillorum è rosis apparatus.
 Hos te oportet pulchre struxisse prius
 Quo dicam modo. recentes carpe rosas,
 Carptas siccato in umbra dies duos,
 Vel tres ad summum, tres deinde libras cape,
 Et tunde missas in pilam, quantum est satis,
 Schoeni uiginti, bisque sex myrrhæ diu
 Contuse drachmas, bis quatuor adde croci,
 Inspersgens, simul commiscebis omnia
 Rotulas finge magnas siccatas bene.
 Desumes quantum satis in antidotum.

20 Crocomagmatis compositio.
 Crocomagma si habere bonum cupis,
 Misceto diligenter hæc cuncta simul:
 Primum Cilicij drachmas centum croci,
 Myrrhæ dimidium pinguis, inde rosæ
 Tantundem siccæ, post amyli candidi,
 Et gummi drachmas bis quinque & uiginti.
 Cuncta hæc tusa atque excussa bene,
 Vino odorato Coo insperge parum.
 Vbi fatis maduerint, finge rotas.
 Sicca, utere ut bono cum opus fuerit.

21 Antidotus prognostica.
 Prognosticam antidotum ita conficies,
 Quam si quis prius cepit, si uenenum sumat,
 Euomet ipsum statim & cibum simul.
 Qui uero, ne sumpserit uenenum, timet;

A Si hanc susceperit, reijciat escam
 Vnâ cum nuper hausto medicamine.
 Quod si nil prauum, nil noxiu, inter
 Dapes propolitas sumpserit, nauseam
 Ne sentit quidem, atque epulum retinet.
 Hæc quoque medicina ad dolores facit
 Lateris, dorsi, renum, & uesicæ, impetum
 Sanguinis cohibet absque molestia,
 Undecumque feratur etiam è pulmone.
 Ita conficias: lemmiam terram cape
 Inscriptam signo, inde sigillum ductam.
 Pendat hæc drachmam unam, duos obolos:
 Aequent iuniperi baccæ drachmas duas.
 Dissolue diu fundens olei parum,
 Quod dulce & bonum, quodque sit recens satis.

B Emulsa, quantum nux auellana magna est
 Offeres, quibus offerre hanc erit opus.
 Si profluentem sistere uoles sanguinem,
 Emulso aceto quod diu ferbit, dabis.

*De antidotis ab Asclepiade conscriptis in quinto lra
 ternarum affectionum libro, qui Mnasonis
 inscriptus est. Cap. 22*

Mos itaque iunioribus medicis est antidotos ap-
 pellare, non modo quæ aduersus mortifera medi-
 camenta, quæque ad morsus ictusque uenenosos ex-
 hibent, sed etiam quæ contra malas corporis affe-
 ctiones, præsertimque diuturnas ualent, ex aliquo
 uiscere aut abcessu consurgentes. Hæc autem cum
 Asclepiades describeret, in tria genera distribuit,
 quorum primū ea continet quæ febribus per circū-
 tum inuadentibus conuenire dicit, quibus & in-
 unctiōnes quasdam, ita enim eas ipse συλλεσμαι-
 να uocat, subiungit. Atque hæc omnia λησιφάρ-
 μακα & λησιπύγετα, hoc est solui morbia & febril-
 fugia cognominat. Secundum uero medicamen-
 ta complectitur, quas theriacas appellat, ad mor-
 sum canis rabidi, scorpionij, phalangij, & uiperæ fa-
 cientia. Tertium autē genus in duas partes & ipsum
 ab eo diuisum est. quorum alteram medicamenta
 à uenenis liberantia nominat, alteram à uenenis
 preferuantia inscribit, Andromachi ordinem hæc
 in parte minime seruans. His enim, ut est à nobis in
 ter initia huiusce libri dictum, in libro quem de
 medicamentis intra corpus assumentis inscribit,
 prius antidotos omnes ad uenena, uenenatasque
 feras facientes disponit, deinde medicinas subscri-
 bit ad quamcunque affectionem, non solum con-
 tra abcessus, sed etiam ad fœtus eijciendos, sto-
 pus fuerit, propinanda. nam & hoc medicamen-
 ti genus antidotum etiam uocat. ad cõuulsa quo-
 que & rupta, atque (ut summam dicam) ad om-
 nes malas internasque corporis affectiones, qua-
 cunque in parte corporis incubuerint. atque hæc me-
 dicamenta in huiusmodi affectionibus bibenda,
 potiones etiã idem autor appellauit, cum circa fi-
 nem libri quarti Mnasonis ea describeret. postre-
 mas itaque hoc est in fine librorum quos Mnasonis
 inscripsit, antidotos Asclepiades collocauit, quæ
 uel eos qui uenena iam ebiberunt liberant, uel ne
 ab ebibendis lædantur, tutos præstat. Ego uero ta-
 les antidotos primas hîc describere statui: simul
 quæ

quia paulo ante traditis affinia sunt, simul quia ip-
 sis plurimū utimur. nā & ad abscessus quoscunq;
 in uiscere, internaue corporis parte infederint, om-
 nes faciunt, quarum aliquarū corporis imbecillita-
 tem subleuant, in dolentiam procurant, humo-
 res uitiosos quidem emēdant, incoctos uerò con-
 coquunt. atq; eos uel per cutim insensibiliter, uel
 per alium urinamq; sensibilibiter. item & per spu-
 tum transmittunt, ut quacumq; pulmonem & pe-
 ctus, per tussim expurgant. plurimā uerò humo-
 res crassos attenuare, tenaces dissicare & abster-
 gere possunt: quibus sequitur, ut & obstructiōes
 adaperiant. quæ quidē in iecinore assidue, in alijs
 aut uisceribus, & corporis particulis aliquādo fie-
 ri solēt, finis enim ipsarū est humores attenuare et
 abstergere, clausaq; meatuum ora patefacere.

*Asclepiadis remedia ijs qui uenena ebiberunt, ipsiusmet
 auctoris uerbis descripta. Cap. 23*

His igitur qui papaueris liquorem hauserint,
 confert hydracēon, hoc est aquam oleo mixtam,
 calidam subinde bibendam exhibere, atq; ut uo-
 mant cogere: uel aquam calidam & acetum mul-
 sum dare, & uomere facere: competet etiam al-
 uum clysteri inanire.

24 Qui autem cicutā biberint, ijs statim me-
 rum plurimum exhibendum est, aut piper, aut na-
 sturtium, aut cardamomū ex uino. proderit quo-
 que lac asininū, bubulumūe haurire, & farina tri-
 ticea uel hordeacea uino cōmista decoctaq; uen-
 trem emplastrat, ac mītoribus uti clysterijs.

25 Aconitum uerò si quis assumpserit, rutā
 manipulum tritum ē uino puro bibat. Ius quoq;
 gallinaceum pingue auxiliatur.

26 At qui Apollinarem herbam biberint, ijs
 lac bibere conferet, asininum præpue: quod si
 non adierit, aliquod aliud lactis genus uel solum,
 uel cum aqua mullā calida.

27 Coriandrum aut uiride qui gustarint, ij ui-
 no puro iuuantur, & iure gallinaceo pingui.

28 Quod si leporem marinū ederint, lac po-
 tent asininum in primis: uel si desit, bubulum, aut
 caprinum, malux quoq; caules diutius elixatos
 comedant, aut etiam pulegij manipulum ē passō,
 uel maliterra radicem uino commistam hauriāt,
 uel deniq; cedrinam pondere unius aut dimidij
 oboli passō maceratam deglutiant.

29 Sin autem toxicum biberint, auxiliū as-
 ferēt uinum dulce, oleum rosatum, sanguis hirci-
 nus, semen napi contusum ex uino.

30 Ephemero accepto prodest polygonij suc-
 cus, plantaginis uē, aut origani, uel thymi etiā ali-
 quantulum uino admixtum.

31 Dorycnis aut si quis biberit, lac bubulum
 bibat, & passum, & conchyliorum ius.

32 At si malos fungos assumat, raphani cru-
 di dandi erunt, utq; ex eis plurimum comedat fu-
 bendum, uinum purum insuper dandum, & ē ui-
 tis samentorum cinere factum lixiuū, nitrumq;
 in aceto dissolutū, aut uini sex uita & cōrita ex a-
 qua, absinthium præterea, aut ruta aceto cōmista,
 quamuis & ipsa per se ruta comesta proficit.

A 33 His autem qui Ixiam in potum acceperūt,
 opem affert absinthium ex uino sumptum, casto-
 riumq; & ruta. confert etiam acetum mullum bi-
 bendum exhibere, postea uomitum irritare. con-
 fert denuo uiriganū ex uino haustū. utemur quoq;
 hac compositione quæ habet rutæ 3. sex. resinæ
 drachmas quatuor, castorij drachmas duas, cha-
 melææ drach. ij, omnia hæc contere, & aceto cali-
 do misce, & utere.

34 Buprestin autē quisquis ebiberit, passum
 multū primo hauriat, deinde uomat: ius demum
 carnis suille, et lac calidum forbeat, prodest etiam
 ad saturitatem non edere: dandum est quoque si-
 cum decoctum, uel nitri rubri drach. iij. contu-
 sas ex aqua bibendas trade.

B 35 Cantharides autē si quis assumpserit, pas-
 sum oleo mistum, et seum in aqua decoctum at-
 que colatum bibere proderit, tum uomere eniti:
 proderit quoq; lac plurimū bibere, nucleosq; pi-
 ni multos comedere, aut eorum plurimos attere-
 re, & ex mulla propinare, uel rutam tritam atq; iri
 non unguento mistā dare, uel deniq; cantharidum
 alas & pedes ex melle lingere.

36 Quod si cerusam quis fortē biberit, oleum
 calidum fumendum est, deinde uomendum. utile
 etiam erit lac caprinum & malux elixæ succus ex
 pressus cum mulla calida, uel oleo, aut ficuum de-
 coctum cum oleo, uel sesamum tritum ex uino,
 quinque uē nuces iuglades ex oleo, lixiuumūe ē
 uitis samentorum cinere factum.

C 37 At si spumam argenti quisquam hauserit,
 piper, apium, myrrha in uino dissoluta & bibita
 proderunt.

38 His uerò qui gypsum biberunt, lixiuum
 ē uitis samentorum cinere cōfectum dandū est,
 thymumūe ex aqua contritum.

39 Ad lac autem concretum in grumos ace-
 tum ualet, opusq; erit coagulō etiam ex aqua fon-
 tis uti, uel laserpiij, & nitri aquas partes ex aceto
 mullō bibendas tradere.

40 Taurino autem sanguini epoto, remedi-
 um est acetum bibere & uomere, uel laserpiij o-
 bolum semiobolomūe fumere, aut nitri obolos
 duos in uino dissolutos, uel caprisici grossos ace-
 to dilutos. Proderit quoq; uentrem subducere, e-
 undemq; lupinorum farina & nitro in oxymelite
 decoctis contegere.

D 41 Hirudines uerò si quis degluterit, alij mu-
 riam, quidam niuem superbibere suadent. Ascle-
 piades autē calido lauacro uti monet, mollemq;
 spongiam frigidā madafactam faucibus immitte-
 re, ut hirudo spongia infiliat & extrahatur. pos-
 tea lentis succum exhibet, & ceruicem extrinse-
 cus emplastris refrigerantibus operire docet. A-
 pollonius autem cognomēto Mus, acetum acer-
 rimum propinabat cum muria: quī uerò niuem
 dabant, eam calefaciebant, & dissoluta utebātur,
 cibumq; & potum ad subducendam aluum op-
 portune adhibebant, ut hirudinem eijcerent, sa-
 penumero namque aiunt unā cum excrementis
 ipsas quoq; deferri.

42 Atq; de simplicibus quidem uenenis hæc tenus à nobis dictum sit. De compositis autem postea dicitur. nam eorum compositionem docere improbi hominis est, quamuis hæc multi conscribere sint aggressi: inter quos est Orpheus theologus cognominatus, & Horus Mendesium, iuniorum dico, & Heliodorus Atheniensis, qui tragœdias quoq; cōscripsit. Aratusq; & alij quidam huiusce notę scriptores, quos sanè quispiam commendatiōe dignos iudicauerit, quod talia carminibus illustrare adorti sint: reprehend autē, ac merito quidem, ob genus materię susceptum. nam cum ligillatim quodq; uenenum parare doceant, improbos magis instruunt, & pronos ad malum ducūt, quam obrẽ qui pulchra hæc poemata conscribere, uerit̃ ne publice pleterent, lectoribus inter initia suadere conantur, se neq; perditis moribus esse, neq; eiusmodi letalia conficere, sed uitate docuisse, ueluti Heliodorus, qui cū se ad Nicomachum purgat, ita exordiens fatur.

Mit̃a per Tricēnā habitantiā numina testor,
Quisq; deos late conspergit lumine Phœbum,
Scep̃trigerumq; Iouem Saturno rege creatum,
Nec me muneribus quisquā, nec uiribus ullis
Flexit, amicitia uinclum uē abduxit ut ista
Conscius efferrem, at tollens ad sidera palmas,
Immunem sceleris mentem pro pectore seruo.

Ex his itaq; libros eiusmodi legentibus, quod dicebamus persuadere moliantur, metuentes ne à multitudine læderentur. Atqui nec dici potest, oportere propterea talium uenenorū instructionem sciri, quo quis aprius indigētibus succurrat: falsum est enim hoc. nam qui simplici ueneno petitis auxiliari nouit, is etiam priuatum unūquodq; superueniens symptoma, distinguens, compositis affectos optime tractabit, ingeniose obseruando id quod inter reliqua symptomata excellit: sed ad id quod restat redeamus. Si incognitum nobis fuerit uenenum, quod quis biberit ederitue, hydraleon calidum dabimus, utq; ex eo multum bibat iubebimus, tum uomere ipsum faciemus. Vt ille insuper erit fomnos quoq; circumscribere. Venuntamen ut & ab his & ab alijs quibususcunq; uenenis caueamus, subscriptis antidotis utēdū erit.

Apollonij Muris medicamenta à uenenis præseruantia. Cap. 43

Rutę folia uiginti, nuces iuglandis duę, salis grumium unum, carica duę, hæc si teiunus aliquis comederit, à uenenis lædi non poterit.

44 Antidotus quę exhibita accipientem tum à uenenis reddit. Baccharum iuniperi drac. duas. terrę lemnia drach. duas. obol. duas. hæc ubi in puluerem redegeris, oleo aut melle commiscebis, & repones, atque cum opus fuerit ex aque mulsæ cyathis duobus, quantum est iuaellana dabis. Hac antidoto Nicomedes rex utebatur, si quando suspectos habuisset qui se uocarent. nam si uenenum nō subsit, quieta manet: sin adsit, nauisæm cōcitat, & euomere cogit, ita ut uenenum quoq; cum antidoto rejiciatur.

45 Antidotus Codij Tusci, quę & Craterus

utebatur. Marrubij, herbæ sacraę, seminis rutę agrestis, scordij, corticum radicum rhamnii, singulorum pondus æquale: hæc melli commisce, indeq; drachmas duas exhibe, ad serpentū quidem morsus ex uino, ad uenena autē, ex mulsio & oleo.

46 Ad idem alia, ut Apelles tradit. Dicta mni drachmas duas, polij drachmas tres, piperis longi drachmas quatuor, rutę syluestris drachm. sex, scordij drachmas tres. Hæc melli commisce, atque, ut modo dictum est, utere. bona est etiam laterum morbo, trium obolorum pondere exhibitā, menstruaq; mulieribus detrahit, drachmę unius pondere.

47 Antidotus Mithridatis Athanasia cognominata, faciens ad uenena, & omnium uenenatorum morsus, quibusq; cibis in uentriculo acerbis, sanguinemq; rejiciūt. anti quas insuper tusses, hepatis, lienis, uescicę, & uteri morbos sanat. continet autem piperis albi grana quadraginta, costi, mei, asari, acori, seminis dauci cretici, petroselinij, nardi indicę, agerati lapidis, singulorum drachm. quatuor. croci, myrrhæ, singulorum drachm. viij. cinnamomi, casie, singulorum drachm. xij. mellis atticij desumptati quod sufficit. datur ex hac ad auellanę quāritatem cum mulsio diluto. in alio exemplari sic se huius antidoti compositio habet. Spicę nardi, piperis albi, costi, mei, asari, acori, opobalsami, seminis dauci cretici, seminis petroselinij, singulorum drachmas quatuor. croci, myrrhæ, florum iunci odorati, singulorum drachmas octo. cinnamomi, casia, singulorum drachm. xij. mellis quod satis est. Item in alio rursus hoc modo se habet. Piperis albi grana quadraginta, costi, mei, asari, agerati, scordij, dauci cretici, petroselinij, singulorum drachmas quatuor. croci, myrrhę, singulorū drach. octo. cinnamomi, casia, florum iunci odorati, singulorum drachmas duodecim. mellis quod satis.

48 Ambrosia quę dicitur Philippi Macedonis antidotus ad uenena, omnium uenenosorum ictus & internos corporis morbos. accipit autem styriacis galbani, piperis albi, piperis longi, cinnamomi, singulorum drach. duas. seminis apij, anisi, iunci rotundi odorati, costi, cumini Aethiopicij, seseleos, cypheos, rhei pontici, cardamomi, amomi, nardi, myrrhæ, casia, singulorum drachmas quatuor, palmulorum eiectis nucleis, carniū iuglandium, singulorum drachmas sex, croci drac. viij. uuæ passia, demptis uinaeis drach. xij. mellis atticij quod satis sit, confice ut mos est.

49 Antidotus zopyria quę facit ad uenena & reptiliū morsus. De hac talia ferunt. Zopyrum per epistolā Mithridatē monuisse, ut antidotum hęc ita experiret. accersiret unū ē condēnatis, iuberetq; primo uenenū haurire. deinde hortaretur antidotū bibere: uel prius antidotū assumere, postea uenenū bibere. idē ut percursus à serpentibus, & in uulneratis à sagittis toxico illitis faceret, horatus est. uerū omnib; ita peractis hominē cōtigit illegum permāsisse. iuuat autē uitio uentriculi acidū rucitantes, sanguinē rejiciētes, cæliacos, dysenteri-

eos, comitiales, iecoris, lienis, renunq; morbo ue-
xatos, uteri demū & uelica affectioib. medetur,
emortuos foetus & secūdas morantes trahit. cōfi-
citur aut hoc modo. Opobalsami drach. iij. nardi
indicæ, myrrhæ troglodyticæ, florū iunci odorati,
cinnamomi nō adulterati, costi recētis, piperis lō
gi, hypocythidis, polij, piperis nigri, scordij, mei
cretici, cardamomi, singul. drac. iij. thuris mascu-
li, carbobalsami, dictāni, singulorū drac. vi. petro
selini, casia fulg. singulorū drac. vij. croci corycij
drac. viij. mellis attici quod sufficit. datur hæc an-
tidotus ad magnitudinem nucis auellanae, non fe-
brientibus ex uino, febrientibus ex mulla.

50 Antidotus diæmaton, id est ex sanguine ap-
pellata ad uenena uenenatorūq; omniū morsus.
habet aut. Piperis longi, piperis albi, costi, acori,
croci, phu, mei, dictāni cretici, ammoniaci, agari-
ci, singulorū drac. ij. amomi, opobalsami, seminis
rutæ syluestris, cymini æthiopici, anisi, sanguinis
anatis maris et foemine sicci, sanguinis hedini, san-
guinis anserini, seminis napi syluestris, singulorū
drach. iij. gentianæ, trifolij, florū iunci rotundi odo-
rati, thuris, rosarū siccarū, singulorū drach. iij. pe-
troselinū drach. v. polij cretici tantundem. cinnamo-
mi drac. vi. florū scordij drach. viij. myrrhæ, nardi,
singulorū drach. xij. casia drach. viij. omnia hæc
diligenter contusa, ac per excussorium cribrū tra-
iecta, melliatrico despumato commiscebis, com-
mistaq; in argentea pyxide repones, atq; hac ut ma-
gno aliquo medicamento uteris.

51 Antidotus Mithridatis Eupatoris ex scin-
co cognominata, facies ad uenena, omniumq; ue-
nenatorū materiam mortem inferentē, omniūq;
uenenosorum animalū iustus, & malas internasq;
corporis affectioes. mulierib. cōcipere nequeunt
tibus opitulat, menses ducit, emortuos foetus, at-
que retentas secundas trahit, febres per interual-
la inuadentes soluit, resolutos, tremulos, coxendū-
ces in scapulis rigētes, podagricos, & id genus re-
liquos neruorū morbos iuuat. cōficūt aut hoc pa-
cō. Scinci, sagapeni, acori, phu, costi, hyperici,
acaciae, iridis, mei, gummi, singulorū drach. ij. rosa-
rum siccarū, gentianæ, cardamomi, singulorum
drach. iij. seminis papaueris ob. ij. styracis drach.
viij. polij, casia nigra, seseleos, bdellij, balsami, pi-
peris albi, singulorum drach. v. ob. ij. succi hypo-
cythidis, opopanax, myrrhæ, thuris masculi, ca-
storij, piperis longi, cyphæos, foliorū malabathri,
singulorum drach. vi. scordij, florum iunci odora-
ti, chalbani, terebinthinæ, singulorum drach. sex.
obol. iij. nardi syriacæ, opobalsami, thlaspi, dauci
cretici, singulorum drach. vi. obol. ij. croci, cinna-
momi, zingiberis, singulorum drach. vi. obol. ij.
succu glycyrrhizæ, agarici, singulorum drach. viij.
obol. iij. mellis quod sufficit, uini optimi quod sa-
tis est ad succos dissoluendos. Construitur au-
tem hoc modo: cyphi, hypocythidis, sagapenum,
gummi, opium, styrax, opopanax, uino chio ma-
ceratur die non octūq; quoad pēnitū dissoluta sint,
reliqua uero interim contusa, tenui cribro excu-
tiuntur, illisq; tam maceratis ac dissolutis commi-

A scentur, commistaq; attico melle ad crassitū usq;
despumato excipiuntur, opobalsamoq; superim-
misso, demum in uas argenteum transferuntur,
atq; ad multos usus reponuntur. Datur autem ex
hac antidoto quantum æger tolerat. Nos autem
ut ualidius medicamentū hoc faceremus ad men-
strua prouocanda, utq; sine periculo foetus educi
possent, imposuimus dictamni drach. iij. ammo-
niaci drach. tres. seminis rutæ syluestris drach. iij.
cumini Aethiopici drach. vi. seminis trifolij drach.
iij. napi syluestris drach. iij. chamædryos drach.
iij. rhei pontici drach. tres. succi cyrenaici drach.
duas. His additis medicamento usus ad multa uti-
lis redditur. quadrimestres enim foetus corrup-
pit, & trimestres educit.

B 52 Mithridatis theriaca. Hac Mithridates
rex semper usus est, ut se à uenenis tutum præsta-
ret. itaq; à Romanis obsessus, bis epoto ueneno,
cum mori non posset, seipsum ense traiecit. Facit
aut ad pernitiosa uenena, omniūq; uenenatorum
morsus, et internas corporis affectioes: hæc et An-
dromachus postea usus est, cōponiturq; hoc mo-
do. Pastillorum scilliticorū drachmæ xlviij. pa-
stillorum uiperinorum, piperis nigri, spissamenti
hedychroi, succi papaueris nigri, singulorū drac.
uiginti quatuor. rosarum siccarum, scordij, semi-
nis napi, iridis illyricæ, agarici, cinnamomi, succi
glycyrrhizæ, opobalsami, singulorum drach. xij.
oris marini drachmæ viij. myrrhæ, croci, zingib-
beris, rhei pontici, radicum quinquefolij, nepitæ
montanæ, marrubij, petroselinū * oboli duo. stoe-
chadis, costi, piperis albi, piperis nigri, thuris * ca-
sia nigra drach. iij. costi drachmam unam. croci
drachmas quatuor, piperis albi drachm. unam. pi-
peris longi drachmam unam, iridis illyricæ, iunci
rotundi odorati, polij, scordij, rosarum siccarum,
sanguinis anatis, singulorum drach. tres. mellis at-
tici despumati quantum sufficit.

C 53 Antidotus centena quatuor, quæq; Casa-
ri cōposita ad omnia, præsertimq; ad uenena. Abro-
toni, drac. ij. & semis. aristolochiæ drach. xx. aca-
ciæ drac. iij. baccharum iuniperi, tantundem. cro-
ci drach. ij. asari drach. iij. anisi drachm. iij. amomi
drachm. vi. agarici, drachm. tres. carbobalsami,
drach. ij. bdellij, drach. tres. balaustij drach. ij. gen-
tianæ drach. iij. succi glycyrrhizæ, tantundem. se-
minis rapi drach. iij. aliq; habent viij. terræ samiaæ,
drac. i. seminis dauci, drach. iij. radicis dracontij,
drachm. tres, obol. tres. seminis trionis, drach. xx.
iridis illyricæ, drach. ij. myrrhæ drach. septem. ob.
iij. zingiberis, tantundem. radicis eryngij drach.
quatuor, obol. duo. thlaspeos drachm. uiginti. co-
nizæ tenuis, drachm. sex. obol. tres. cyperi, drach.
sex. acori drachm. sex. seminis cicutæ decorticati,
drach. i. ob. tres. ammeos drach. quatuor. seminis
cnici, drach. septem. ob. duo. cinnamomi drac. sep-
tem. costi drach. septem. obol. duo. casia drachm.
vi. ob. duo. succi centaureæ drachm. quatuor. ob.
v. castorij drach. vi. calami aromatici drach. qua-
tuor. gummi drach. duo. cardamomi drach. qua-
tuor. cachryos drach. iij. ob. iij. cyphæos drach. vi.
chalbani

chalbani drac. sex. oboli duo. foliorum libanotis, drac. quatuor. saluæ, tantundem. seminis lonchitidis drac. duo. oboli tres. seminis lithospemidis drach. tres. thuris, drach. vi. oboli iij. seminis foeniguli drac. vi. succi papaueris drac. vi. rubricæ lemnisæ drach. unam. malabathri drach. x. mei drach. vi. sanguinis anatis, tantundem. nardi syriacæ drac. sex. oboli tres. nardi celticæ drach. viij. xylobalsami drach. iij. succi panacis, tantundem. seminis hormini, drach. viij. erui albi, tantundem. radicum panaceæ drach. iij. opobalsami drachmas quatuor. securidacæ drach. vi. polij drach. v. oboli ij. foliorum polygonij drach. ix. radicis elenij drac. v. ob. iij. petroselinij drach. vi. ob. ij. quinquefolij drach. viij. succi peucedani, tantundem. piperis nigri drac. v. ob. iij. piperis albi drac. iij. ob. iij. piperis longi drac. iij. scindri drac. iij. terebinthinæ drac. ij. rosarum exiccatarum drach. vi. sagapeni drac. octo. stoechadis drach. quatuor. pinæ nucis torrefactæ drach. vi. iunci odorati drach. iij. ob. ij. uiræ passæ sine uinacis drac. quatuor. seseleos drac. v. ob. ij. seminis pastinacæ drac. quatuor. fellis taurini drac. v. fellis ursini, tantundem. chamæpityos drac. iij. seminis psyllij 3. iij. chamædryos tantundem. seminis sesami tostij drach. sex. radicis consolidæ drac. ij. summitatum scordij drach. iij. ob. iij. herbæ pedicularis drach. v. styracis drach. v. ob. ij. fructus trifolij 3. decem. seminis torhilli, drach. ij. foliorum teucrij drach. quatuor. succi hypocyttidis drac. ij. & semis. fructus hyperici drach. ij. seminis alterci drach. ij. rhei pontici drach. ij. phu drac. octo. rhus opsoniorum drach. quinque. ob. tres. radicis umbelicis ueneris drach. una. obol. tres. uini & mellis quod satis est, ego uinum non adhibeo.

54 Antidotus Aelij Galli cum ad alia, tum ad canis rabidi morsus. Nardi syriacæ drach. iij. myrrhæ drach. ix. cinnamomi drach. xij. casia nigra, tantundem. croci drach. octo. costi drac. iij. seminis dauci, tantundem. mei, tantundem. alij drach. una. petroselinij drach. iij. piperis albi, grana xl. carpobalsami drachm. iij. acori, asari, tantundem. iunci rotundi odorati drach. viij. alij ipsum non immittunt. mellis despumati, quantitas quæ sufficiat. hæc per se sola deglutienda est.

55 Eiusdem alia ad internas affectiones multum efficax. Cinnamomi drach. sex. croci drac. duas. obo. tres. piperis albi 3. quatuor. obol. duo. piperis longi drach. tres. obo. tres. opij drac. tres. nardi indicæ drach. quatuor. myrrhæ drach. quatuor. ob. duo. acori drach. tres. nardi gallicæ drac. quatuor. styracis drach. unam. obol. duos. chalbanij drach. quatuor. castorij drach. tres. ob. duos. costij drach. duas. ob. duos. omnia hæc mellis commisceto, indeq; pilulas conficito, portione ue aliqua diluito. Concoctione em & indolentia procurat.

56 Aromatica optima Galli ad omnia faciens. Cinnamomi drach. una. casia drac. una. croci drach. semis. amomi drach. quinç. malabathri drach. dua. myrrhæ drach. semis. alij drach. una. iunci rotundi odorati, drac. una. costi drac. semis. piperis drach. tres. mellis attici quod sufficit. Ego

A uero inquit, cinnamomi duplum immitto, meliorq; efficitur.

57 Antidotus Archibij, quæ Ambrosia & sacra cognominatur, ad omnes internas affectiones, qua uitor, continet autem. Anisi drach. quatuor. seminis apij, tantundem. myrrhæ drac. unam. panacis, tantundem. cinnamomi drach. duas, seminis loti amari drach. duas. casia 3. duas. nardi drach. duas. croci 3. duas. obo. tres. piperis ob. iij. succi papaueris, 3. quatuor. mellis quod satis est, potio hinc conficitur. ad intestinorū tormina quidem ex uini myrtini, & aquæ quarta hemina parte, ad hepar autem ex aquæ mulsæ hemina dimidia. Item ad uigilias, ophthalmias, & lateris morbum ex aqua mulsæ, ad stomachi demum uitia, ex uini granatorum cyathis duobus, & aquæ totidē.

58 Antidotus Antipatri, quæ & theriaca nuncupatur, & ad morsus aspidis ualet, ante & postictus exhibita, qua uitor, habet autem. Gentianæ dra. quatuor. radicis trifolij drach. quatuor. seminis eiusdem drach. ij. polij drach. quatuor. aristolochiæ tenuis dra. ij. radicum peucedani, tantundem. chalbani dra. duas. petroselinij, dra. quatuor. rutæ syluestris, drachmas tres. pyretri drachmam unam. herbæ pedicularis, tantundem. radicum uitis albæ drachmas duas. piperis albi, tantundem. acori, drachmas tres. thymiamatis ammoniaci, drac. unam. obo. tres. uerbasci ideij, chamæpityos, chamælezæ, marrubij tenuis, costia tenuis, cymij næthiopici, succi papaueris, castorij, seminis feniculi, agarici, casia rusæ, florum iunci odorati, rhei, singulorum drach. duas. dauci cretici drach. unam. obo. tres. opopanax, tantundem. sagapeni drach. duas. obo. tres. abrotani drachm. unam. obo. tres. dictamni, tantundem. styracis, tantundem. cinnamomi drach. tres. nardi, tantundem. myrrhæ drach. quatuor. thuris drach. unam. croci drach. octo. anisi drach. unam. succi cyrenaici, tantundem. coagulij hinnuli 3. tres. mellis attici, quod satis est. ex hac sumitur quantum est nucis auellanae magnitudo, ut se quis à ueneno tutū reddat.

59 Aelij Galli theriaca qua uitor, optima ad scorpionem ictus, & alia quæ ueneno morsu resingunt, ad rupta cõuulsa, colic inflationes, & huiuscemodi cætera. hanc Gallus ex Arabia rediēs Cæsari obtulit, qua multos ex commilitonibus suis seruauerat. habet autem. Radicis uitis albæ drach. xvi. seminis trifolij, opopanax, singulorum drach. octo. aristolochiæ tenuis drach. xij. radicis libanotidis, tridis asyricæ, zingiberis, opij, singulorum drach. octo. seminis rutæ syluestris, drach. xij. cumini Aethiopici drach. xvi. myrrhæ, casia, castorij, seseleos radicis, eryngij, serpillij, succi cyrenaici, singulorum drachmas sex. medicij drachmas duodecim. sagapeni drachmas sex. croci drachmas quinque. farina erui drachm. uiginti quatuor. cum aqua hæc in pastillos trium obolorum rediges, & ex uino dabis.

60 Eiusdem alia theriaca ualde efficax, quæ ex his constat. Seminis trifolij drach. xij. aristolochiæ drach. sex. magmatis hedychoij drachm.

vij. quinq; folij drach. iij. echij herbae drach. vi. philanthropij, id est lappae drac. v. sagapeni drach. iij. polij drac. vi. castorij drac. iij. croci drac. viij. seminis apij, anisi, foeniculi, petroselinij. sing. drac. vi. opopanax drac. iij. opobalsami drach. sex. sefeleos drachmas quatuor, cumini aethiopicij aut thebaici drac. v. myrrhae, scordij, phu, mei, singulorum drac. sex. seminis alysi cretici drachmas sex. faitinae erui drac. octo. Tritis unum affunde Ariusum, orbescq; confice ponderis quatuor oboloru, quorum unum dabis ex uini chij meraci ac maris exortis herina dimidia.

61 Theriaca ad dolores internos Euclidis Palatiani; qua, ut ipse dicebat, ad morsus aspidu copo sinit facit tamen & ad pleuriticos & quartanarios magnitudine nucis auellanae exhibitae, si prius euomuerint tussientibus insuper & sursum exscreantibus ex aqua, percussis a serpentibus ex uino, pleuriticis & sanguinem reijcientibus ex aqua cyathis duobus & acetuius datur. habet autem. Castorij drac. vi. opopanax, sagapeni, sefeleos, cachryos, chamadryos, chamapityos, marrubij, sing. drach. xvi. styracis, bituminis iudaici, myrrhae, singuloru drac. viij. succi papaueris drac. viij. mellis libram unam. Percussis a serpentibus, si fieri potest, fac ut prius euomant, deinde ex hac cum plurimo succo fraxini, uel si desit, cum uino drachimam unam exhibe, uel plus etiam; quartanarijs autem ad nucis auellanae magnitudinem dato.

62 Zenois Laodiceae theriaca quemadmodum tradit Menutianus qui eam ab ipso accepit. habet autem. Cardamomi demptis inuolucris, serpilli, seminis apij, radicis uitae albae, seminis trifolij, anisi, petroselinij, radicis & seminis foeniculi, ammeos, aristolochiae tenuis, fariuae erui, opopanax, singulorum pondus aequale. separatim primo quaeq; contunde, tum commisce, & ubi ea uinum austerum affundens subegeris, orbescifictio, qui simul atq; in umbra exsiccati fuerint, trisium obolorum pondus impleant. horu unu ex duobus aqua cyathis dato ter interdum, semel noctu, interdum uero & saepius, praesertim ijs qui frequenter euomunt, quandoq; per nares etiam insfundendi sunt; si eos aegrotus deglutire nequeat noxio somno grauatus, aut aliquo alio paruo symptomate correptus. loca uero demorsa, si quoda cum tumore nigricauerint, ac carnem alioqui diffluentem habuerint, ueluti uulera maligna procurato.

63 Antidotus quae ad conuulsiones & rupta facit, sanguinem reijcientibus, lientosis, ictericosis, uescicae doloribus, uoluuolosis auxiliata, uetriculij uitio laboratis & coeliacos sanat, inflationes discutit, & arquatos liberat. datur ad hec omnia ex mullis oliuae magnitudine. Cinnamomi, costi, sin. drac. sex. nardi styracae drac. uiginti. croci, myrrhae, malobathri, sing. drac. octo. casiae drac. xij. piperis albi drach. x. thuris drach. quatuor. functi odorati drach. xv. iridis illyricae drac. xij. terrae lemniae drach. xx. mei, sefeleos, singulorum drach. viij. seminis apij drac. iij. pinearum drac. xij. trionis drac. vi. seminis cucumeris torrefacti drac. vi. terebinthinae drac. iij.

Galen.

A petroselinij drac. iij. amomi drachmas tres. scordij, polij, opobalsami, gentianae, cumini Aethiopicij, singulorum drachmas quinq;. seminis rutae syluestris drachmas iij. anisi, tragacanthi, singulorum drac. viij. phu, stoechadis, cneori, singulorum drac. ij. fritionem linteolo conuolutum in aqua primum coquito, ut ipsum deinde reliquis omnibus comminutis admiscere possis, tragacantham postmodum aqua macerataam superimmitte. datis ex hac antidoto quantum est Aegyptiae fabae magnitudo, febricentibus quidem ex aqua, non febricitibus autem ex mullis cyathis duobus.

64 Antidotus Mithridatica, ut Xenocrates ait apud Nicofratrum, ad uenena omnia, uenenatos icetus, difficiles concoctiones, inflationes uentriculij, & uentris morbos facies, icoreq; & liene & coxendicibus ac renum lateris & pulmonis uitio laborantibus subuenit, continet autem. Succij hycopocystidis drac. vi. scordij drac. v. castorij drac. iij. petroselinij drac. v. sefeleos drac. i. thuris drach. vi. polij drach. ij. dauci cretici drac. x. piperis albi 3. i. ob. iij. piperis longi drac. i. costi 3. iij. ob. iij. cinnamomi drach. ij. croci drach. v. obol. iij. casiae nigrae drac. iij. nardi drac. viij. myrrhae drach. viij. iunci rotundi odorati drac. iij. amomi drac. ij. chalbani drac. duas. terebinthinae drachmae unum. ob. iij. succi papaueris drach. xx. mellis attici quod sufficit. ex hac dabis quantum & e reliquis.

65 Antidotus Tyranis appellata & ut inquit Nilus, ab Antipatro composita ad calculosos & eos qui inter spirandum suffocari uidentur facit. secundas & foetus retentos efficit. comitialibus, podagricis, articulorumq; & coxendicum morbo laborantibus prodest urinam crassam plurimam educens. hanc dabis ad fabae magnitudinem ex mullis etiam contra uenena, a uerius autem serpentium icetus ex uino: comitialibus uero, si febrant, ex mulla. habet autem. Scindi drach. viij. myrrhae 3. xxviij. rubricae lemniae drach. iij. nardi drac. viij. iunci odorati drac. iij. cinnamomi drac. xxiiij. radicis dulcis drachmas xxviij. myrrhae drac. uiginti. eryngij drach. xxiiij. amomi drach. xij. cardamomi drach. viij. croci drac. viij. baccarum cedri nigraru drach. xij. melliloti drac. xij. seminis hyacinthi drach. iij. piperis longi drach. iij. piperis albi, grana lxxxv. spondylii drac. xij. stoechadis drachmas v. pyrethri drac. vi. seminis maluae sylue drac. xij. seminis leuocostij 3. iij. opobalsami drac. vi. costi drach. viij. obolum unum. ammeos drach. xij. radicem umbilicis ueneris drac. xiiij. seminis dauci drac. xij. carpobalsami drac. iij. xylobalbami drac. iij. casiae drac. viij. cumini Aethiopicij drachmas quatuor. seminis ocymij drac. octo. acori drach. viij. florum labrufcae drachmas octo. seminis apij drachmas xij. sagapeni drac. viij. radicem capparis drach. quatuor. gentianae drach. xiiij. radicis perilymeni, drac. viij. thuris drac. viij. styracis drac. i. milij agrestis drachmas xxiiij. radicem smyrnij drac. iij. thymiamatis ammoniaci drac. xvi. sefeleos drac. iij. cachryos drac. iij. iridis illyricae drach. iij. anisi drach. iij. chamadryos drach. xv. chamapityos tantu dem. seminis

tom. 5

t. smyr-

smyrnij drac.viii. zingiberis drach.xiiij. centauree A
tenuis drac.viii. seminis pastinacae, mei, singulorū
drach.octo. radicis calami drac.iiii. uini boni coty-
la una. mellis Attici quod satis est.

66 Antidotus Harpali ad quartanarios. Myr-
rhæ drac. quatuor. piperis longi drachmas duas. la
chrymæ papaueris drachmas duas. castorij obol.
tres. & semis. cardamomi drac. quatuor. sagapeni
drac. duas. Comminuta hæc omnia & aqua cō-
mista rotulas ponderis duorum obolorum cōfin-
ges quas per interualla febricitibus dabis ex adri-
anæ uel amminæ uini cyathis duobus, & aqua fon-
tanæ quæ deferuerit cyathis quatuor, febricenti-
bus autem sine intermissione ex hydromelite toti-
dem cyathis. facit quoq; ad reliquos febricitū circui-
tus. Quoniam uero ad morsus ictusq; uenenofo B
rum animalium superscriptis antidotis tam Ascle-
piades quàm Damocrates quædam insuper alia
addiderūt, idcirco mihi quoq; ea hoc in libro subiij
cere potius quàm omittere uisum est, ac primo
quidem ab Asclepiade prodita.

*Remedia ab Asclepiade conscripta in quinto Mnaso-
nis ad serpentium noxas. Cap. 67*

Potio demorsis à rabido cane hominibus amu-
letum ualde generosum, præseruat enim ne in ra-
biem incidant. Lycij indicij quamoptimi obo-
los tres ex aqua dabis, uerbenacq; parumper im-
mittes. diebus autem tot id facies quoad securum
esse ægrum arbitraberis. datur et sine aqua lycium
solum in ouo forbili.

68 Alia. Castorij drachmam unam. ex uini
rosacei albi cyatho bis singulis quibusq; diebus bi
bēdum dabis, quod cum facere desieris, absinthij
decocto ægrum euacua, salisq; tātum immittes, ut
clyster uehemens reddatur.

69 Antonini Coi. Alyssum herbā contusam
& cribratā repone, huius cū opus fuerit à rabido
cane morsus cochlear exhibebis ex aqua & melle
cyathis tribus statim à primo die usq; ad quadra-
ginta, sin minus saltē primis septē diebus. Alyssus
aut herba est marrubio similis, asperiores tamē &
magis spinosos in furculorū summitatibus orbes
habet, florē ad cœruleū uergentē profert. hanc in-
ter canalicæ estus colligere oportet, exsiccatq; &
cribrata seruanda est, ut exspirare non possit.

70 Alia. Mithræ, quæ recipit cineris cæcro
rum fluuiatiliū uitis albæ farmentis exustorum
atritorumq; mystrum unum, radicem gentianæ,
myrra duo. ex hac antidoto singulis quibusque
diebus quoad sextus adueniat cochlear unum ex
uini puri antiqui cyathis tribus plus minus uē da-
bis. ætatem nanq; & uires infirmi spectasse cōue-
nit. ijs inquam cochlear unum dato, quibus simul
atq; à rabido cane morsu fuerint, medicij copia af-
fuit. quōd si quis primo uel altero die remedio ca-
ruerit, si secundus dies is sit, antidoti duplum ca-
piat: si tertius, triplum. nam uinum satis idem sem-
per erit, tribus postea subsequētib; diebus tan-
tum assumat, quantum prima die sumpisset. hoc
medicamentum bibentem satis superq; tutū red-
dit, ne in aquarum formidinem incidat.

71 Antidotus Cratippi uiri & celebris, & alean-
dis canibus dediti. Cancrorum drac. xx. myrrhæ
drac. ij. croci drac. i. & semis. gentianæ drac. i. piper-
is albi, grana x. uini quantū satis est ad cōmiscen-
dum. dabis ex hac drac. unam. ex uini aqua dūni
cyathis tribus. Alia qua usus est Heras Cappado-
x. Scordij drach. ij. piperis albi drach. ij. s. opij
drach. iij. succi cyrenaci drach. iij. semis. cachryos
drach. iij. gentianæ, seminis rutæ syluestris, rubri-
cæ lemnis, sing. drach. v. myrrhæ drac. vij. opobal-
fami drac. vij. hæc primū uino infunde, tum melli
despumato commisce, postremo opobalsamum
iniice. robustioribus quod bis ægyptiæ fabæ ma-
gnitudinem æquet dato ex aqua calida cyathis
tribus. Alia Aelij Galli quæ, ut Blechionius in-
quit, à Cæsare sumpta est. Polij, succi cyrenai-
ci, singulorū drac. tres. semis. cachryos, seminis ru-
tæ syluestris, singulorum drach. iij. gentianæ, ru-
bricæ lemnis, singulorū drac. v. myrrhæ drac. vi. opo-
balsami drac. vij. scordij, piperis, singulorū drach.
xij. melli omnia hæc admisceto.

72 Antidotus Zenonis Laodicensis ad mor-
sum canis rabidi quæ etiam haec theriaca. Se-
minis petroselinæ, ameos, anisi, serpilli, radicum ui-
tis albæ, seminis foeniculi, farinæ erui, aristolochiæ
longæ, seminis trifolij, opopanax, medullæ carda-
momi, detractis folliculis, singulorum drachmas
iij. ita uero conficitur. Opopanax emino dissolu-
tum in promptu habe, reliqua uero ubi contude-
ris, ac per minutum cribrum traieceris, inspergen-
do subige, subactaq; opopanax commisce, rotulas
inde confice, quas postquam in umbra siccaue-
ris, drachmæ unius pōdus ex uini meri cyathis tri-
bus totidem diebus exhibebis nuper à rabido ca-
ne morsus. quōd si diu iam commorsus quis fuerit,
ex aqua frigida pōdus idem dabis. Antidotus hæc
in Dionysium Milesum refertur.

73. Claudij Apollonij medicamentum accō-
modatum aduersus canis rabidi morsum quod &
theriaca est. Seminis trifolij, radicum foeniculi,
sing. drach. sex. foliorum scillæ aridorum, aristolo-
chiæ longæ, sing. drac. v. scinci, furculorum serpilli,
sing. drac. iij. cardamomi à cortice depurati, radi-
cis dulcis, sing. drach. tres. ameos, radicis rutæ,
singulorū drach. ij. opopanax, succi cyrenaci, sing.
drachmam unam. uini falerni, sestaria tria, & can-
crorum marinorum exustorum, lib. tres. cæcros in
uinum coniectos macerari sinas, quod ubi combi-
berint, ipsos accurate dissolutos promptos habe-
res autem siccas cōtusas & per minutum cribrum
transmissas cancris admisceto, rotulasq; inde confin-
gito, quarū tres obolos propinabis ex uini puri
cyatho uno & dimidio tribus diebus. ac de his quod
dem hæctenus. nam quæ foris quoq; admoueri de-
bent subiungenda uidentur.

74 Menippi emplastrum ad morsum canis ra-
bidi, quo Pelops utebatur. Picis brutiæ libram
unam. opopanax unci. iij. aceti sestarium unum.
opopanax in cyathis quatuor aceti diluito, aceti
quod superest unā cum pice decoquito, ubi con-
sumptum id uideris, tum opopanax addito, sed
cauto

caueto ne efferueat, cum fatis inter se commissa uidebuntur, plagellas permagnas inde conficito, loceq̄ demorfo superindito. neceffe est autem ulcus per quadrāginta dies apertum feruare.

75 Menelaf quod ualet ad morfum canis rabidi, ggylopasq̄, & omniū reptiliū ictus. habet autē, Nitri rubri drac. ij. facis uini combuftæ drach. viij. thymiamatis ammoniaci 3. vij. seui caprini lib. i. olei lib. i. & semis. ceræ lib. duas. aquæ festarium unum. ammoniacū in aqua diffolue sic ut frigmentum crassitiem habeat, reliquū uero aquæ feruete nitro & fece immiffa. quod cum densatum fuerit, ea quæ collquantur inijcies; ubi diffoluta fuerint, ab igne uas amouebis, ammoniacumq̄ impones, indeq̄ utraq̄ in mortarium transferes, diligenterq̄ subijges. ex eo cum opus erit uteris.

76 Album Bafuli. medicamentū ad morfum canis rabidi, quod & extrinsecus ulceri imponif, & per os intrō affumif maxime ab ijs quibus tam rabies dominatur, pilula ad magnitudinē auellanae nucis cōfecta, ac quotidie quadrāginta diebus deglutita. statim enim à periculo liberat. imponitur autē loco demorfo, nec nisi secundo quoq̄ die soluitur, & idcirco opus est alternis diebus uulnus soluere, & ulceris nigredinem spongijis abstergere, idq̄ tam diu facere quoad usq̄ medicamentum album permaneat. ita autē cōficitur. Ceræ ponticæ lib. ij. spumæ argenti, ceruffæ, sin. lib. i. myrrhæ, medullæ ceruinæ, ling. unc. ij. thuris masculi, unc. i. olei ueteris festarium unum. Argenti spumam oleo decoque, quam cum transmūtata uideris, ceram inijce, & cerullam insperge. cumq̄ ad id uenerint, ut manus non inquinent, igne subducto medullam impone, myrrhæq̄ & thus inijce, atq̄ ubi cuncta bene subegeris utere.

77 Basilica aduersus canis rabidi morfum cōposita que in aquarū formidinem ægros incidere non permittit. hanc Augustia apud se cōpositam semper habuit. continet autē, Salis ammoniaci, succi cyrenaici, ling. drac. ij. quod si cyrenaicus desit, syriaci duplū accipito. coaguli leporini drach. iij. iridis illyricæ, castorij pontici, ling. drach. v. lactis caprificus cōgelati aridi, tantundē, aut si siccus desit, liquidi duplū impone. adipis hyenæ drach. viij. resinæ terebinthinæ drach. ix. sanguinis canis nigre, drach. xi. ceræ ponticæ drach. xxxvi. olei antiqui cyathos duos. aceti scillitici, cyathos tres. arida contrita aceto commisce, liquanda uero liquefiant prius, deinde attritis addantur atq̄ in oportunos usus omnia reponantur.

78 Ad scorpionū ictus subscriptis antidotis utendū erit. Hac Diophantus utebatur in scorpionum ictibus, & in cōmorfis à phalangijs. habet autē, Aristolochiæ 3. iij. piperis 3. ij. opij 3. i. pithetri 3. ij. cōtusa hæc & melle excepta in rotulas ad fabam ægyptiæ magnitudinem rediges, quarū duas deglutendas trades ex uini puri cyathis duobus.

79 Alia ad scorpionū ictus noxiōsq̄ aliorū animalū morsus. accipit autē, Aristolochiæ, zingiberis, sin. drac. viij. nepitæ, seminis rutæ syluestris, sin. ob. ij. piperis, ob. ij. hæc primū testudinis sangu-

ne subigito, tum rotulas inde trium obolorū pondere confingito, atq̄ ex uino puro dato.

80 Alia quæ constat ex cymini æthiopici, sulfuris uiui, piperis albi, ling. drac. ij. castorij, silphij, trifolij, ling. drach. i. hæc inter se uino commisce & ex uino puro forbenda præbe.

81 Antidotus ad eos, qui in periculum deuenerunt ob ictū scorpionis phalangijæ aut alterius cuiusq̄ reptilis. assumit autē, seminis rutæ syluestris, seminis erucæ, pyrethri, styracis, sulfuris uiui, singul. drach. vi. castorij drac. ij. omnia hæc testudineo sanguine subacta ex meri uel aceti dimidia cotyla propinabis quatuor obolorum pondere.

82 Antidotus quæ dolorē sedat ijs qui à scorpionibus phalangijs cæterisq̄ reptilibus percussif fuerint, quæq̄ cū difficultate parietibus auxiliatur, huius nomē est Callista, hoc est optima. cōtinet autem, myrrhæ, castorij, styracis, sin. drac. i. opij, drac. ij. chalbani, drac. iij. seminis apij, acetabulū unū, anisi tantundē. piperis grana xxx. hæc inter se uino conficta ex una uini cotyla dabis pondere unius drachmæ. antidotus autē hæc eximie bona est.

83 Antidotus Abascanti medicā arte Lugduni exercentis. accipit autē, piperis albi grana xx. castorij, opij, croci, myrrhæ, iridis illyricæ, herbæ pedicularis, chamædryos, radicū uitis albe, pyrethri, singulorū partes æquales. omnia hæc uino commisce, & drac. i. ex uini puri cyathis tribus exhibe.

84 Antidotus quæ à scorpionibus scorpiacæ dicitur, quæq̄ medicantē minime fallit, magna cū difficultate nobis à quodā accepta, qui in Africa degens hac utebatur, & percussos à scorpionibus tutos ab omni periculo reddebat. optime quoque præseruatur bibita à nondū percussis in securitate euētus. habet autē, sulfuris uiui, sulfuris fossilis, sin. drach. ij. piperis albi drac. iij. opopanax, sabinæ herbæ, thuris masculi, ling. drac. iij. aristolochiæ rotundæ, peucedani, myrrhæ, centaurij, serpilli, chamædryos, chamæpityos, herbæ scorpiacæ, anagallidis, bituminis, ling. drach. ij. betonicæ, medullæ ceruinæ, carnis crocodili terrestris, siue appellati scinci, ling. drach. i. singula quæ enumerauimus cōtusa, ac per minutissimū cribrū primo traiecta, deinde simul omnia commista ita seruanda sunt ut respirare nō possint. cū uero percussis opitulari uolueris, cochlear unū huiusce pulueris ex uini puri cyathis duobus exhibebis. præseruationis autē annæ gratia semel ex hac antidoto bibant qui se tutos à periculo seruare uolēt. oportet tamē eos qui primo hoc medicamentū præseruationis gratia bibent, die illo nec lauari, nec uenere uti.

85 Antidotus à Zoilo sumpta qua Epap hroditus Carthaginensis utebatur, statim autē hæc & ægros à dolore liberat, & per annū quam pulcherrime quoq̄ præseruat, semel ebibita. continet autem, sulfuris uiui drach. iij. thuris lib. i. sabinæ, stochadis, aristolochiæ, ling. drac. vi. myrrhæ drac. v. medullæ ceruinæ, opopanax, ling. drac. iij. dictamnii cretici drac. iij. bituminis, serpilli, scordij, thei, trifolij, centaurij, chamædryos, piperis albi, abrotani, betonicæ, polij, coaguli hœdini, anagallidis,

ling. drach. ij. crocodili terrestris 3. x. confice ut dictum est, & percussis cochlear unum bibendum præbe ex uini puri cyatho. præseruat eadem singulo quoq; anno semel exhibita.

Quæ extrinsecus imponenda sint percussis à scorpionibus. 86

Lauri folia in uino cocta & confusa impone, uel liliorum radices attritas ex aceto.

87 Aliud. Aristolochiæ in uino decoctæ, rutæ summitatum & nitri partes æquales atteres, & ex uino impones.

88 Aliud. Cancrorum fluuiatilium, cachryos, herbæ pedicularis, rutæ partes æquales ex uino superimittes.

89 Aliud. Chamemelî nigellæ, nitri rubri partes aquas contunde & ex aceto admoue.

90 Arabæ Thebani medicamen ad ictus scorpionum excogitatum. habet autem, chalbanî, terebinthinæ, singulorum drachmas duas. herbæ pedicularis, pyrethri, sulfuris uiui, singul. drac. i. myrrhæ, piperis, singulorum drach. i. & semis, picis liquida quod satis est.

91 Charitonis circulatoris antidotus ad phalangiorum morsus, quæ habet, seminis spondylii, calaminthæ partes æquales. hæc simul attrita ex uini cyathis duobus bibenda dabis pondere drachmæ unius, sæpius quoque die. hæc medicina utebatur Charito, frequenterq; in cõuentus hominû ueniebat ut à phalangio demorsis opem ferret.

92 Alia Simmiæ Medij quæ cõtinet, succi cyrenaiici, seminis dauci cretici, mêtæ siccæ, nardi indicæ sing. pondus æquale. hæc aceto cõmissa, ex aceti puri cyathis iij. dato drachmæ unius pondere, bibentesq; in aquam calidam descendant.

93 Antidotus Andrææ ad phalangiorum morsus, habet autem, herbæ pedicularis, pyrethri, myrrhæ, opij, uitis albæ, chalbanî, singulorum æquas portiones uino odorato. hæc simul admisce indeq; ex passî cotyla una drachmam unam dato.

94 Alia nobilis admodum quæ cõtinet, Cachryos, seminis rutæ syluestris, piperis albi, herbæ pedicularis, myrrhæ, sing. drach. i. radicem cyperi drach. ij. omnia hæc uino odorato commisce, indeq; drach. unam, ex passî cyathis quatuor mellisq; uno forbendam dato.

95 Antidotus ad phalagiorum, scorpionum, aliorumq; reptilium ictus, qua Diophantus utebatur. accipit autem, Castorij, piperis albi, myrrhæ, succi papaueris, singulorum pondus idem. hæc in uino dissoluta, atq; in orbem redacta trium obolorum pondere dabis ex uini puri cyathis tribus, ut & Diophantus faciebat.

96 Alia. Corticij radicis mandragoræ, piperis albi, castorij, succi papaueris, singulorum partes æquales confice & exhibe sicuti supra diximus.

97 Alia ab Apollodoro sumpta quam & Heraclides Tarētinus describit in eo libro quæ ad Astydamantem mittit, ad omnes uenenatæ feræ morsus, doloresq; uehementissimos, & uteri strangulationes. accipit autem, succi cicutæ, alterci, sing. drac. iij. castorij, piperis albi, costi, myrrhæ, opij, singu-

lorum drac. i. hæc comminuta passî cyathis ij. additis in sole tã diu cõmiscibus quoad densificat, inde rotulas cõfinges quæ magnitudinẽ fabæ græcæ nõ excedat. harû singulas ex uini cyathis ij. tradito.

98 Alia Heraclidis Tarentini ad phalangia omniumq; reptilium morsus quæ tam imposita quam ebibita prodest. accipit autem, Cachryos, seminis rutæ syluestris, piperis albi, myrrhæ, cocci enidiij, costi, pyrethri, herbæ pedicularis, singulorum pondus idem, cyperi duplû. hæc aceto dissoluta mellesq; excepta superimpones.

99 Alia ad phalagia omniumq; uenentorum ictum, quæ cõtinet, Herbæ pedicularis, pyrethri, myrrhæ, succi cyrenaiici, sing. drac. iij. radicij uitis albæ, chalbanî, singulorum tantundem. aceto hæc dissoluta melli commiscebis & impones, eadem quoq; pota summopere iuuat.

100 Alia quæ ictibus phalangiorum aliorumq; reptilium & imposita & ebibita prodest. hæc Simmiæ circulator utebat. habet autem, sulfuris uiui, chalbanî, sing. drach. iij. succi cyrenaiici, nucum auellanarum repurgatarum, sing. drach. ij. hæc in uino diluta melleq; excepta superimittenda sunt.

101 Alia quæ recipit, seminis rutæ syluestris, herbæ pedicularis, seminis erucae, cachryos, seminis uiticis, pilularum cupressi, singulorum partes æquales. hæc aceto dissolue, melli commisce, & impone, pota quoq; auxilium præstat. Verum de his hæc tenus, quibus autem à uiperis morderi cõtigerit, infra posita remedia admouebimus.

102 Dorothei Helij remedia aduersus uiperarum morsus. ita em ipse inquit, potionib. ego planè simpliciter usum sum ijs quæ ex aceto dant, acetum nanq; calefactû & per se potû quantû hemina dimidiû continet, iuuat; item corticum aristolochiæ drach. ij. ex uini, aut aceti, hemina dimidia, & seminis trifolij, ob. iij. ex dimidio uini cyatho. profunt etiã panacis chironiæ drac. ij. ex aceto, item hinnulorum coaguli drac. i. ex uino, & sanguinis marinæ testudinis exsiccati drach. ij. ex aceto. ex cõpõlis uero Antidotus quæ ab Apollodoro confecta est, & à Sofstrate, atq; alijs qui ipsam ab eo exceperit cõmendata. hæc est quæ à testudinis sanguine non men accipit, & cõtinet, seminis cumini syluestris acetabulum, sanguinis marinæ testudinis exsiccati drac. iij. coaguli hinnulorum, aut si desit, leporis drac. iij. sanguinis hædini drac. iij. hæc simul admista affusq; optimo uino consumpta repones. cum opus fuerit hinc quantum est oliuæ magnitudo sumes, dilutq; ex uini quam optimi cyatho medio bibendû trades. quòd si paulopost egrotus antidotum uomat, denuo quantum est oliuæ dimidium ita, uti diximus, modo præbebis, & rursus si reijciat, quantum est ægyptiæ fabæ magnitudo tertio propinabis quo prædiximus modo.

103 Rustici medicæ antidotus ad uiperæ morsus. Accipit autem trifolij, stachyos, erui moliti, seminis rutæ syluestris, aristolochiæ rotunda, sing. drach. viij. hæc uino commista in rotulas redigis, quarum drachmâ unam ex uini cyathis tribus dabis bis ter' ut singulis quibusq; diebus.

104 Alia uersibus ab Eudemo cōscripta quæ a Antiochi Philometoris theriaca inscribitur, cuius principium hoc quidem est.

Discite medelam istam serpentum, matris amicus
Expertam uictor quam docet Antiochus.

Conficiendi autem modus is qui sequitur.

Radices conuelle mei qui pondera drachmæ

Duplent, serpilli sit quoque pondus idem.

Sit panacis succi tantum, nam drachma triphylli

Imposita fructus sat erit una tibi.

Hinc apium, anisumq; hinc ammi, fœniculumq;

Semine quodq; suum compleat oxybaphum.

Post orobi tenuis duplum super adde farina,

Et coeant chio necitare cuncta simul.

Tum paruos facias æquati ponderis orbes.

Quisque trahat drachmæ pondera dimidiæ.

Hos quicumq; chio miscabit, & hauriet orbes,

Temnet echidneæ dira uenena fera.

Officient unquam nec seua phalangia, nec qui

Scorpius oblique spicula tenta gerit.

Singula uero quæ hisce carminibus continentur

hæc sunt. Radicum mei, serpilli, opopanax, sin-

gulorum drachmæ duæ, seminis trifolij, drachma

una, anisi, fœniculi, ammeos, seminis apij singulo-

rum acetabulum unū. farina ærum tenuissimæ aceta-

bula duo. uini antiqui quantum satis est ad cōmiscē-

dum ut rotulas hinc conficere possis, quas in um-

bra siccatas ex tribus uini cyathis trium obolo-

rum pondere dabis.

105 Antidotus enneapharmacos. i. ex nouenti

rebus Heraclidis Tarētini quam ipse in suo de ser-

pentibus libro tradidit. Habet autem, myrrhæ tro-

glodytica, opopanax, succi papaueris, singulo-

rum drachmas duas. radicem uitis albæ, drac. qua-

tuor. Hanc aliqui bryontiam, alij psilothron, alij ui-

tem agrestem, alij madon, alij chironiam, alij cerci-

dem appellant. corticum aristolochiæ longæ tan-

tundem. Cortices enim radicum, in uniuersum cō-

modiores sunt medullis ipsarum radicum. pyre-

thri tantundem. seminis rutæ syluestris, cumini æ-

thiopicæ, seminis trifolij, singulorum acetabulum

unum. Omnia hæc postquam attriueris ac per cri-

brum traieceris aceto commiscebis in quo gum-

mi maduerit, ut agglutinandi uisum quandā habeat,

tum rotulas inde conficies quas in umbra siccabis.

cum ipsis uti uolueris, dimidiā dabis ex uino uel

aceto in quo rutæ folia deferbuerint, hoc licet sæ-

pius diebus singulis peragas, integrum tamen an-

tidoti pondus drachmas duas impleat. nam supra

hanc mensurā exhibita, uomitū excitare solet, qua-

re plus duabus drachmis, dare non consulo, quod

si uomitus insurgat, nihilo minus pluries adhuc

singulis quibusq; dieb. antidotū exhibebis. opus

est insuper ægotū alere, & uino diluto recreare,

hocq; sapius die uno facere. locus quoq; demor-

susclata diu fouendus erit, & his perfundendus

quæ ipsū iuuare possunt, quod dum fit, ita collo-

candus erit, ut deorsum inclinēt.

106 Antidotus Dorothei ad omniū reptilium

ictus excogitata, quæ cōtinet, Corticū radicis uer-

basci fœminæ, seminis trifolij, sing. drac. i. opopa-

Galen,

panacis, serpilli, mei, coagulū hinuli, sing. drac. ij. semi-
nis apij, ameos, seminis fœniculi, seminis anisi, sin-
acetabulum unū. erui in farinā redacti drac. ij. res
siccas contusas & cribratas uino ariusio coniuges,
in quo prius ad coagulū, & opoponacē dissoluē-
ris, orbesq; inde conficies quos pro uiribus ægro-
tantium dabis. nam uehementer ad ueneno detētis
drach. i. alijs obol. iij. ex uino cotyla tribues. uba-
tur quoq; Dorotheus hac medicīna ceu nobili ad
modum ad intestinorum affectiones, & eos qui-
bus noxiā materiā ad uescicam fluere uolebat,
ad tusses etiam & morbos alios, cæterum percuf-
sis quidem a uenosis animalibus ex uino, cæte-
ris autem ex aqua tribuenda antidotus est.

107 Alia Hybristi Oxrynychitæ cognōmēto
ad omnium serpentium ictus reperta, atque ab
Apollonio Memphite descripta, quæ continet,
Aristolochiæ, panacis, seminis uiticis, singulorum
drachmas quatuor, cachryos, myrrhæ, piperis, fe-
seleos mastaleotici, nardi indicæ, castorij, cinna-
momoni nigri quā tenuissimū, piperis longi, succi
cyrenaici, iridis, seminis rutæ syluestris, singulorū
drachmas duas. hyperici drachmam unā. omnia
hæc contrita & per tenuissimum cribrum excreta
uino maris experte affuso subiges, rotulasq; inde
conficies, quas in umbra siccatas ex uino puri co-
tyla una & aquæ cotylis quatuor drachmæ unius
pondere sorbendas trades. unā præterea ex hisce
rotulis contusam ac uino dissolutam cōmoræ par-
ticulæ super impones, adiectis aristolochiæ in te-
nuissimum puluerem redactis drachmis duabus;
itemq; pollinis polētæ drachmis quatuor. his nan-
que diligentius attenuatis comminutisq; ulcus o-
peries, ac folio ficulneo desuper immisso uitam
demum circumligabis.

108 Antidotus quæ aduersum uiperæ mor-
sum theriaca est; facit tamen & ad aliorum serpen-
tium ictus. Hanc Gallus ex Arabia reuerfus Cæ-
sari obtulit, qua multos ex commilitonibus suis a
rabido cane demorsis, & a scorpionibus, phalan-
gijs, cæterisque serpentibus percussis seruauerat. ac-
cipit autem erui in farinam redactis drachmas xxv.
radicem uitis albæ, drach. xvi. seminis rutæ sylue-
stris, drach. xij. iridis, opopanax, aristolochiæ lon-
gæ, succi papaueris, zingiberis, singulorum drach-
mas octo. cumini æthiopicæ, myrrhæ, eryngij, suc-
ci cyrenaici, croci, serpilli, costi, sagapeni, singulo-
rum drachmas sex. uinum aminam insperge, su-
bige, rotulas confice, confectas pro conditione ui-
rium ægotantis da. sunt autem tres oboli, pondus
antidoti integrum. ad percussos quidem a uiperæ
ex uini meraci, ad reliquas uero affectiones ex
nulli hemina una.

109 Medicamentū uiperarū ictibus imponen-
dum, quod habet, Sagapeni, piperis, succi cyrenai-
ci, opopanax, singulorū partem unam, chalbani,
sulfuris uiui, singulorum partes duas. res quidem
siccas contunde, ac per tenuissimum cribrum ex-
cute. succos autem ubi in aceto dissolueris, siccis
superinfundes, atque omnia ad emplastri crassi-
tatem rediges, læto mēbro superimmittes, & ficus

urticæ uel folio extrinfecus imposito conteges.

110 Aliud. Cardamomi, radicum eryngij, sulfuris uiui, piperis, singulorum pars una. myrrhæ, chalbanî, singulorum partes duæ, confice ut supra diximus.

111 Aliud. Centaurea, herbæ pedicularis, radicum peucedani, singulorū partes æquales. hæc contusa, cribrata, & ex aceto subacta chalbano cōmifce, & quo diximus modo utere.

112 Aliud. Cachryos, herbæ pedicularis, radicū uitis albæ, aristolochiæ, singulorū partem unam. myrrhæ, opopanacis, singulorū partes duas, hæc quoq; cum aceto ueluti docuimus subige.

113 Quoniam uero quæ carminibus conscriptæ sunt medicinæ facilius memoria continentur, & earum pondera sincerius incorrupta seruant, ideo mihi satius esse uisum est Damocratis uersus hoc in loco subiungere qui ita se habent.

Nunc autem tradere medicinas uolo,

Quæ morsus tantum uenenatos sanent
Cornutæ, uiperarum, aspidis, cherydri,
Ictus ferarum, & puncturas quoq;
Apum, uesparum, scorpion, phalangij.

Hac arte struas. iridis bis quatuor
Assume drachmas primum, tum zingiberis,

Succi panacis, & succi papauetis,

Radicum libanotidis, semen trifolij

Cuiusq; creticum tamen, bis quatuor.

Aristolochiæ longam dico, & rutæ

Agrestis seminum drachmas duodecim.

Radicum uitis albæ sex & decem,

Serpilli uero pariter & smyrnij,

Pontoq; missi nobilitas castorij

Tantundem, sed eryngij, & seminum apij

Aethiopicæ præsertim, & adhuc noui

Cuiusq; drachmas appendo ter duas.

Eruicq; candidi & mundi bis duodecim.

Hæc cuncta sicca & transmissa cribro

Excipe uino, paruos inde fac orbes

Rotas uel paruas, unicam drachmam dabis

Huius medicamenti ex hemina meri

Bonî, non cōmisti, pinguis, & non noui.

Facit dimidium resolutum aqua

Tumori uentris, atq; turgido colo,

Et quibus incerta causa quicquam dolet.

Alia. Cap. 114

Valde bonum remedium, quo usos etiam

Ipsos bibendo noui commorosos male

À uiperis nuper captis, quos uocant

Psyillos (gens hæc natura non ferme solet

Pati serpentes, neq; assueta timet)

Dedit sicq; alijs ualde commorosis male.

Mollem, siccabis umbra mellissophyllon,

Siccatum tunde, moxq; drachmas accipe

Inde bis octo, tum longæ uel rotundæ

Aristolochiæ, drachmas adde decem.

Siccæ tamen, chamædryos decem quoq;.

Myrrhæ & bonæ, & troglodyticæ item decem.

Isthæc contusa subtili cribro excute,

Mellis quod satis dulcis adde, & unias.

Dato quod pender drachma uel plus parum,

A E uini purioris cyathis decem.

Quidam è longo atq; recenti folio

Exprimunt succum, sicq; mensura pari

Vino coniungunt, utq; bibatur iubent.

Mensura utriusq; sint cyathi decem,

Parum uel minus aut parumper amplius.

Impostum quoq; folium attritum prodest.

Alia. Cap. 115

Cum hæc ad alias serpentes feras quidem,

Tum uero est uiperis efficax remedium.

Semper repositum habeas coagulum

Ceruini pulli, recens sit præcipimus.

Antiquo recens stomacho plus conuenit,

Drachmam repositi cyathis duobus

Vini falemî, & aquæ sat quæ uideatur,

Admifce. præbe quibus dentes intulit

Serpens, mox uigilent ambulentq; impera.

Ac, si demorfa non hoc prohibeant loca,

Balneas petant, ubi per tempus aliquod

Maneat, egressiq; haud multum postea

Rursus, ut dixi, capiant coagulum.

Alia. Cap. 116

E genere eorum quæ aduersantur uenenis

Antidotus ea est, quæ ad rabidi morsum canis

Facit, la trandi morsum inferentem amentiam,

Eraq; & potus omnis inanem metum

Vsq; uadeo, ut si aquæ tantillum uideat,

Et conuellatur æger, & statim tremat,

Hic & uigilias inter & stantias

Iuges degendo, commonetur breui.

C Ac quamuis primo effugiat metum aquæ,

Tamen mox ipsum tales heu casus manent

Repente, quales solent commorosos diu.

Ergo ne tales in pauores incidas,

Velim tam sacram medicinam par es,

Nam si quis ipsam quo dicam bibet modo,

Nullam commorosis sentiet insaniam.

Confice hoc pacto. caneros fluuiatiles

Sarmentis uitis albæ, ut uocant, simul

Combure, & tere, tritos serua pyxide,

Rursus cribratam bene gentianam

Alio conde uase, cum uti opus erit,

Inperge cyathis uini suauis tribus

Mystra duo parua cancorum cineris, &

Gentianæ unum, sicut dixi, contrita.

D Ieiunus hoc commistum sorbeat tribus

Aeger diebus nullo intermisso iube.

Lux prima si quo casu præterierit,

Duobus alijs simplicem mensuram

Trades, secundo duplum die porriges

E uini cyathis, ut dixi, modo tribus.

Quibusdam rursus & transacto tertio

Uidetur, tantum morsu uastatos graui

Tres semper gentianæ dandos obolos,

Secundus adlit donec & uigessimus,

Tribus è uini cyathis uel plus parum.

Alia. Cap. 117

Hanc quoq; ad eos qui timent aquam sibi

Dicebat Niceratus constare, & simul

Amicis, qui mirandas iudicare

Medicinarum proprietates queunt.

Lycij patarici optimi tres obolos,
Præstaret indicum, si id adesset tibi.
Dies iubebat uiginti duos dare
Ieiunio, ut dixi, nuper morso, & ex aqua.
Facere succus britannicæ fertur idem
Datus quo lycium præcepimus modo.
Hoc quidam etiam multum admirantur. duo
Vrsinæ fellis mystra, duobus aquæ
Admixta cyathis, diebus tribus datum,
Mane, cum primum illucescit, ante cibum.
118 Ad morsus rabidi canis, præsertim ubi
In rabiem complures incidunt canes,
Emplastrum quo aduersus saniem utor, habe,
Quæ è morfu exit, iurabit, & si quid nigrum
Vulneribus inest, aut liuens. uulnus ubi
Circumsculpseris, emplastrum pone super
Per longum tempus, atq; uulnus dilata
Medicamento quod crustam & ulcus ducat,
Facit ad aliarum ferarum nihil minus
Quæ uirus lingunt, icus atq; morsus.
Et tela prauo madefacta toxico
Et ulcus omne, sic uocant, moris mali:
Terræ ampelitidis nigrae drachmas cape
Bis quinque, bis uiginti, bis adde argenti bonæ
Tantumdem spumæ, & tantundem bituminis.
Tribus prædictis par sit pondus olei,
Attica pendat propolis decem quater.
Aristolochia, & symphytum, & marrubium,
Eliumq; & chamæleon bis hæc duas.
Tres iris alba sicca, tres & smyrnium,
Tres galla non matura, sex alumen, &
Posium, quæ chalbanum uno uincat obolo,
Decem & duas thus pendat & dimidiam.
Chalcitis uista drachmas tantum quatuor
Pendat, centaureon tenuet ter duas.
Bis quinque & decem affunde mellis atticæ.
Confice diligenter, & præfens astra.
Nam ualde si contempnas uritur cito.
Ergo ampelitim terram & argenti spumam
Concrede uasi fictili magno & nouo
Oliuo affuso, mox igne leni coque.
Densari cum uidebis, alumen, atq;
Chalcitim sparge, uasq; seorsum aliud
Colliquet mella, chalbanum, & propolin,
Ac si quid aliud liquandum adfit, liquet.
Hæc ubi satis serbuerint, transferas.
Oliuo iuncta cum serbuerint parum,
Nec plus inquinant, insperge puluerem
Quem rufa radix, quem caulis herbæ dedit,
His actis, statim uas ab igne transferas,
Et commiscendo ubi refrixerit parum,
Effusum ualida emplastrum subiges manu,
Subactum serua, sed contextum corio.
119 Vulneri cuspis quod intulit hoc prodest
Veneno cuspis illita: prodest quibus
Serpens uenenum intulit, atq; fera.
Vnusq; idcirco est omnium curæ modus.
Omnibus carnem uulneratam protinus
Scalpello circumcide, uel igne amputa.
Ventosam post hæc, ni locus uetet, infer,
Acutisq; & urentibus medicinis

A Vulnus seruabis latum multo tempore.
Hoc nos in libro docuimus alio
Illis scribentes qui medicinas uolunt
Conficere quæ urentibus & scalpro fiunt.
Utatur idem antidotis quas docui
Bibendas illis quos commorsit uipera,
Bibendum trade, & hinnuli coagulum.
Bibendam trade & gentianam rabido
Cane commorsis, ac quæ dixi reliqua
Istis prodesse, nam hæc conueniunt quoque.
Cyrenes succus, is si non adfit, dabis
Quem Medii mittunt, quantum pendet obolus
Duobus è calentis cyathis aquæ,
At gentianæ quod tres obolos trahit,
Multum radice succus est præstantior.

B Antidoti ab Hera scripta qua et theriaca sunt
quasq; et nos experti sumus. Cap. 120

Theriaca qua Marcus imperator utebatur hæc
recipit, feminis trifolij, quod bitumen plurimum
oleat, aristolochiæ rotundæ, rutæ syluestris, erui per
moliti pondus æquale, omnia hæc inter se uino cõ
misce, rotulas confice drachmarum quatuor, qua
rum unam dabis ex uino & oleo.

Alia Antiochi Philometoris: Hæc supra etiam posita est iisdem
uerbis. Cap. 120. quare hic omittitur. Cap. 121

122 Alia. (Hæc licet eiusdem autoris nomine,
& eadem ferè inscriptione superioris bis posita: hic
tamè cum ab utraq; superiore differat, omitti non
debet.) Theriaca ad ictus scorpionum, & ad om
nem morsum uenenosum: ad rupta, conuulsa, colli
inflationes, & ad multa similia. Hanc cõpositio
nem Gallus ex Arabia reuerfus Cæsari dedit: qua
multos ex commilitonibus seruauerat. Bryo
niæ albæ radice drach. viij. trifolij feminis, iridis,
chalcitidis (supra iridis chachedoniæ scribitur) ari
stolochiæ tenuis, libanotis radice, opij, zingibe
ris, singulorū drach. iij. feminis rutæ agrestis drac.
vi. serpylli, cymini Aethiopicæ, eryngij radice, sin
gulorū drach. iij. erui farinæ albæ drac. x. uini Chij
marina non diluti quantum sufficit. Forma pastil
los drachmales, & propina ex cotyla uini meri.

123 Alia ad uiperæ morsus. Fraxini folia con
tunde, exprime, expressum succum bibedum da,
quod ab expressione superest uulneri impone.

124 Alia ad phalangiorum ictus. Vni rotu
le trigoni pastilli, pipæris grana tredecim admisce,
& feminis trifolij grana quadraginta, cõmissa ex
uino diluto calefacto bibēda trades quotidie usq;
ad tres dies.

125 Alia quæ ad idem facit: Aristolochiæ cre
ticæ loge, drach. unā. cumini Aethiopicæ (alsas Ae
gyptij) obolos tres, feminis rutæ syluestris, drach.
vi. succi cyrenaicæ, drach. iij. & semis. rubricæ lem
niæ, drach. x. myrrhae, drach. vij. opobalsami, drac.
viij. pipæris albi, drach. ij. & semis. cachuyos. drach.
iij. hæc tusa & cribrata mellis incorporato, & ex
aqua calida dato magnitudine fabæ Aegyptiæ. q
si impensius obniti uolueris, duplum porriges.

126 Alia post theriacales antidotos conscri
pta. Nescio tamen quo pacto Asclepiades ordine
non seruato posteaquã potiones duas ad coxend
t 4 dices

dices scripsit, rursus ad antidotos reuertat, describatq; eam quã Zopyriam appellant, & aliã quãdam ex multis rebus compositam uenenis omnibus, ut inquit, aduersantẽ tam ante q̃ post assumptam, utiẽ in super demorsis à cane rabido, laborantibusq; morbo laterali, & internis dolorib. omnibus, ita ut muliebres affectiões quoq; leuet, post hanc rursus aliã plurimĩ usus subiungit ex centũ rebus cõflatã excellenter, ut ait, ad uenena & eos qui sumpta cerussa suffocantur facientem. dein de ab his aliã adhuc ex rubrica lemnia cõfectã, de qua dudum antea mentionẽ feci, cum Damocratis uersus transcriberem. illa igitur quã ex centũ rebus est omiõsa satis mihi fecisse uidebor si Zopyriam uocatã huicq; aliã subsequẽtẽ, & ultimã illã quã à rubrica lemnia cognominatur, exponam, prætermiõsa, ut dixi, cẽtum rerum antidoto, quã eadẽ est cũ illa quã Andromachus cõscripsit.

Antidotus Zopyriã faciẽs ad omnia, sed præcipue ad uenena, icoris morbos, uentris inflatiões, & incipientes aquas inter cutem effundi, maxime uero quãdo plus flatus q̃ aquã affuerit, accipit aut, myrrhã, drach. v. spicã nardi, drach. v. & semis; croci, drach. iiii. & semis, florum iunci odorati, drach. ij. & mediam, casia, drach. iiii. cinnamomi, drach. iij. pipëris albi, drach. unam & mediam, thuris, drach. unam & obolum unum, costi, drach. unam. ex his melle attico exceptis rotulas cõfice, nucis auellanae magnitudinem non excedentes, quas ex uino aut aqua dabis.

127 Alia antidotus quã ad omnia uenena tam ante q̃ post assumpta cõfert, demorsos quoq; à cane rabido, lateris morbo laborantes, internis doloribus uexatos sanat, ac mulierũ dolores morbosq; subleuat. habet autem, radicis dulcis, drach. vi. ob. i. semis, feminis dauici cretici, drac. vi. obo. i. semis. opij, drach. iiii. obo. ij. castorij, drach. ij. obo. i. pipëris longi, drach. vi. ob. iiii. costi, drach. vi. ob. ij. spicã nardi, drach. vi. ob. i. semis, casia nigra, drach. v. ob. ij. thuris masculi, drach. i. & semis, seseleos, drach. v. ob. ij. scordij, drach. vi. ob. ij. semis, succi hypocyftidis, drach. vi. acori, drach. ij. foliorum malabathri, drach. vi. obo. i. sagapeni, drach. ij. fructus balsami, drach. v. ob. ij. myrrhã, drach. vi. croci, drach. vi. ob. ij. styracis, drach. vi. cinnamomi, drach. vii. obo. ij. zingiberis, drach. vij. ob. ij. pipëris albi, drach. v. ob. ij. phi, drach. v. petrofelini, drach. iiii. nardi gallicanae, drach. iiii. obo. ij. semis, hyperici, drach. ij. succi acaciae, drach. ij. gẽtiana, dra. iiii. iridis illyrica, drach. ij. anisi, drach. ij. thlaspeos, drach. vi. ob. ij. semis, rofarum siccarum, drach. iiii. mæi, drach. ij. gummi, drach. ij. cardamomi, drach. iiii. florũ iunci odorati, drach. vi. ob. ij. opopanacis, drach. vij. opobalsami, drach. vi. & semis, chalbanĩ, drach. ij. ob. ij. terebinthinã, drach. ij. ob. ij. agarici, drach. vij. & mediam,

A cypheos, drach. vi. bdellij, drach. vi. scinci, drach. ij. amomi, drach. iij. polij, drach. v. obo. ij. dictamnĩ, dra. vi. feminis rutã syluestris, drach. iiii. sigilli lemnici, drach. ij. semis, irionis, drach. iiii. Hæc omnia ex uino salerno & attico melli commisce.

128 Alia antidotus quã tam ante uenenum q̃ post assumpta hominem à morte liberat, quãq; si cum alijs medicinis exhibeatur, impedimentum nullum affert, quoties autẽ exhibita fuerit eouq; nauëam concitat, quoad mortiferum omne excutiat. habet autem, rubricã lemnia sigillo obliõgata, drach. ij. & obolos totidem, baccarũ iuniperi, 3. ij. hæc minute cõtrita oleoq; quãoptimo cõmita ex mullõ dabis nucis auellanae magnitudine.

129 Adeos qui à rabidis canib. morli in aquarum formidinẽ deuenerunt antidotũ à Aphrodisia sumptum, Lathyridis unciam unam, castorij, drachmas tres, cõminuta hæc ex hemina uinotofaci bibenda trade.

130 Autoris eiusdem ad aquarũ formidinẽ. Pilula castorij, drachmam unã & mediam. & lathyridis granã nouem, commisce & exhibe.

131 Ad idem antidotus alia à Nicoftrato accepta quã continet, Castorij drachmas octo, lycij in dici drachmas quatuor. gẽtiana drachmas duas. cancrorum exustorum drachmam unam & mediam. cuncta hæc melli commissa dato.

132 Ad aquarum formidinẽ admirabile si quis aquam in qua fabri ferrum intingũt artificẽ incio bibendam præbuerit, ualde mirabitur. ut autẽ qui iam in aquarum formidinẽ deuenerũt bibãt, pannulo supponito, & bibet. gẽtiana quoq; per se ipsam ex aqua data cõfert trium cochlearium mensura.

133 Amaranti grammatici ad dolorẽ pedum antidotus qua & ipse utebatur, habet autẽ. Rhei pontici drac. x. pipëris albi drach. viiij. petrofelini, agarici, hyperici, acori, eryngij, singulorum drac. xvi. cardamomi, thlaspeos, acaciae, succi glycinthi zæ, rofarũ siccarum, singulorum drac. iiii. feminis scœniculi, aristolochiã longã & rotundã, singulorum drach. ij. baccarum rusci, drach. iij. feminis apij drach. iij. feminis napi syluestris drach. iij. zingiberis drach. iij. gẽtiana drach. vi. scinci drach. ij. thuris drach. v. phu pontici drach. iij. irionis drach. vi. iridis illyrica drach. iij. casia, ligustici, florum iunci odorati, spicã nardi, sri, scorpiuri, singulorũ dra. vi. melis quod sufficit. ex hac singulis annis datõ quantum est nucis auellanae magnitudo.

134 Alia qua utor. Chamædryos drach. iiii. scordij drach. iij. petrofelini drach. iij. cardamomi, drach. ij. marrubij, gentiana, singulorum drach. iiii. centaurij drach. iiii. & semis. aristolochiã rotundã, tantundem. mellis quantum satis est. dabis ex hac singulis annis nucis auellanae magnitudine.

proximum. De indicationibus curandi & medicamen-
torum compositione in genere iam prius se docuisse in
hoc uero opere quomodo quis secundum singulas cor-
poris partes medicamenta aptè componat, aut ipsa quæ
alij composuerint rectè utatur. De pilis & eorum ge-
neratione. Capillorum affectiones: & quòd sine me-
thodo adhibita, non modo non prosint, sed etiã lædãt.
Caput I. De alopecia, caluitie, & ophiassi. 2. Ad alo-
pecias compositum pharmacum, ex euphorbio, &c. &
ad curam eius ratio communis. 3. Composita à se-
nioribus Galeno medicis, & primũ ab Hera. De phar-
macis moderatis & medijs. De oleo lucernarũ, & for-
dibus in candelabris experimenta. 4. Aliud Hera
pro pueris. 5. Crito quæ scripserit ad alopecias.
6. Quæ Heraclides ad inueteratas alop. 7. Cleo-
patra. 8. Archigenes. 9. Aesclepiades Bithynus.
10. Soranus. 11. Compositio ænigmatica authoris

incerti. II. De capillorũ defluuio. 2. Compositio-
nes Hera. 3. Archigenis. 4. Cleopatra. 5. Quo-
modo comptoria ab exornatoria medicina parte disse-
rat. 6. Quæ Crito ad conseruandos ac augendos ca-
pillos scripsit, itemq; quæ à defluuio ipsos præseruẽt: &
ad caluitiem. III. De tincturis capillorum. 2. De
pharmacis capillos denigrantibus. Archigenis. 3. Ca-
pita Critonis de ornatu librorum 4. IIII. De phar-
macis pilos corrumpentibus. 2. Psilothra Critonis.
3. Quæ pilos aboleant. V. Quæ pilos attenuant.
VI. De surfuribus. VII. De morbo pediculari.
VIII. De achoribus, id est ulceribus capitis ma-
nantibus. 2. Medicamenta Archigenis. 3. Apollo-
nis. 4. Critonis. 5. Cleopatra. 6. Sorani.
IX. Ad psydriacia & achoras, pustulasq; ulcerosas,
helycdria Græcis appellatas, & eruptiones in capite.

CL. GALENI DE COM- POSITIONE PHARMACORVM LOCA-

LIVM SIVE SECVNDVM LOCOS, LIBER PRIMVS.

IANO CORNARIO MEDICO INTERPRETE.



VOD non solum affe-
ctus qui curat̃ curatio-
nem ipsam indicet, sed
tum ipsius ægri tempe-
ramẽtum, tum affecta
particulæ natura, nõ pa-
rum illam simul demõ-
stret, id ipsum sanẽ ante
in curãdi methodo do-
cuimus: quemadmodũ

etiam quomodo quis ex simplicibus medicamen-
tis per se compositum aliquod faciat, compendio
quidẽ in illa ipsa methodo, fusius uero in septem
libris ante hunc item editis, totius disciplinæ adhi-
bita ratione ostẽdimus. Nũc uero quomodo quis
per se ex methodi ratione pharmacorum compo-
sitiones præparet, ad singulas corporis partes cõ-
ueniẽtes, & quomodo à prioribus medicis inuen-
tis rectè utatur, percurrere propositum est, à capi-
te in initio factio uelut omnes etiam ante nos Medi-
ciferunt. Accidunt autẽ capiti plurimę affectio-
nes cum reliquis omnibus partibus cõmunes: ue-
rum capillorum affectionem, cũ paucis commu-
nem habet: propterea quod pilosum esse iuxta pri-
mam rationem non multis inest. Generatio enim
pilorum eadem est quæ terræ nascentium, quem-
admodum in libris de temperamentis est demon-
stratum. Quemadmodũ enim ex istis quædam ar-
te & arbitrio agricolæ: quædam uero iuxta natura-
les causas proueniunt: Eodem modo & in anima-
lium corporibus contingit, quum aruo quidẽ ali-
cui triticum, aut hordeum, aut aliud quoddam ce-
realium seminum, in se insita habenti, caput adsi-
miletur. Alijs uero herbis quæ iuxta humidiores
regiones proueniunt, reliqui totius corporis pili

similem generationem habeant: non enim secun-
dum primam rationẽ, sed per accidens quoddam
natura eos generare solẽt. Et pili quidẽ palpebra-
rum ac superciliorum non paruam utilitatem ani-
malibus exhibent, uelut alibi est ostensum: menti
uero & pudendorum pili minoris utilitatis gratia
producti uidẽtur. Quapropter etiam affectiones
pilorũ in oculis & supercilijs, præcipue nos ad cu-
ram sui ipsarũ impellunt: secundũ uero locum ca-
pitis capillorũ affectiones habent, deinde menti
& pudendorũ. Sunt autem pilorum affectiones,
perfecta perditio, & coloris ipsorum alteratio, ue-
lut in utiligine alba, Leuce Græcis appellata, fieri
consuevit. Ad hæc etiã in alopecijs & ophiassi non
modicum atq; indecorum detrimentum simul ca-
pillis accedit. Quidam igitur promiserunt ueluti
has, sic etiam incipientẽ caluitiem, se ne augetãt
prohibituros: sunt autem qui hoc impossibile esse
dicunt. Itaq; ad alopeciarum & ophiassi curatio-
nem progressi, pharmaca scripserunt per quæ per-
fectam ipsarum sanationem pollicentur. At uero
pleriq; medici ex ipsorum usu aliquando non so-
lum successu longe frustrãtur, sed etiam uehemen-
ter nocẽt, ut affectio ipsa incurabilis reddat̃: quod
sanẽ ipsis etiam circa alia pharmaca cõtingit, qui-
bus citra methodi rationem utuntur. Ego uero id
quod Hippocrates præcepit, in artis operibus fa-
cere semper annitor: nimirum ut quod auxiliũ lo-
co adhibetur, uelut ille scripsit, iuuet, uel certe nõ
noceat. Quod uero pharmacorũ citra methodum
usus non solum non prosit, sed frequenter etiam
obstet, ex illo sanẽ discere licet. iam uero ordiendũ
quod proposuimus tempus adest.

De Alopecia, Caluitie & Ophiassi.

Cap. I.

Quemadmodũ plantæ aliquæ ob humoris ino-

piā resiccata corrumpuntur, aliquæ uero ob humores alieni ab ipsarū natura attractionē; eodem modo & capilli aut propter humorū ex quibus nutri ri cōsueuerunt inopiā, aut propter eorundē uitiationē corrumpuntur. Et propter inopiā sanē humorum caluities contingit, propter uitiatos uero humores Alopecia, & Ophiasis, Vnum quidem ambæ secundum morbosam affectionem malum, nomina autem iuxta figuram habentes diuersa: serpenti enim similis lesa capitis pars in ophiasis appellatur. Alopecias autem ob id appellatas ferūt quod uulpibus frequēter accidant. Nos autem propter quid sic appellari contingit nō querimus, unde uero orientur causam querentes, eam ipsam humorum uitiatorem redundantiam cōperimus. Quales autem tandem sint corrupti humores, ex colore cutis capitis cognosces: aliquibus enim mutata albidior apparet, aliquibus nigror aut pallidor. Quare in istis primum totius corporis purgationem adhibebis, aut pharmaco pituitā ducentē exhibito, aut quod bilem pallidam, aut nigrā trahit, coniectura redundantis humoris ex colore cutis facta. Ego uero semper per hieram purgauī, aliquando uerato nigro adiecto, ubi atræ bilis expurgare uolui humorem, aliquando scammonia, si amara bilis purganda esset: si uerō pituitosorem exuperate cōiecissem humorem, nihil ammisissim. Tales enim præsertim ex capite, hiera ex colocynthide purgare conseruauit, simulq; cum his etiam alios quosdam humores, etiam si scammonia, aut ueratrū nigrum, aut epithymū non addatur. Quin & ex aloë catapotia quæ tum scammoniam tum colocynthidem admixtam habent, commodius ita affectos purgare solent. Cæterum post totius corporis purgationem, apophlegmatismis localibus ex capite detrahere præstat, atq; deinde localibus auxilijs uti: de quorum compositione dicturum me hoc operē recepi. Oportet enim uelut in alijs, sic & in his affectioni mederi, cuius accessio siue symptoma est uitiatos capillus. Si quidem igitur uitiatos humor circa unum locum fuerit collectus, scopus medendi erit ut is quàm celerrime euacuetur, prius quàm ab ipso cutis in quendam malum habitum deducatur: tantum ut etiam si quis uitiatum ipsius humorem euacuet, & boni sanguinis influxum præparetis adeo etiam a malo in ipsa habitu prius inducto corrumpatur. Si itaq; uitiatum humorem in cute euacuare uolueris, contradiccorijs pharmacis opus habebis. Atqui contradiccor forsan aliquis, cōmunem scopum in omnibus affectionibus quæ ex influxu humorum fiunt, contentinā cōsubuertit ratus: repellit ipsos debere afferens partem refrigerando ac adstringendo, nō atrahi calfaciendo: esse autem discursoria omnia facultate calida. Et certe affirmamus nos quoq; uere hæc dicta esse: Incipientes enim ophiasis et alopecias per huiusmodi pharmaca prohibere oportet ne augeantur: non tamen principium ipsorum alopeciam aut ophiasin appellari, sicut neq; pforam aut lepram iam appellamus quæ ex lichene orditur. Ego itaq; quemadmodum nostis, etiam iam

A factas alopecias aliquando sola purgatione sanari, nullo amplius medicamento post ipsam ad locum affectum admoto: ut autem ampliorem eius rei experientiam facerem, ex eiusmodi quopiam successu sum impulsus. Adolescens quispam bonæ habitudinis & exercitijs aduersus hanc affectionem in capite habebat: erat autem satis familiaris mihi, ut dietam ipsius qua iam per tres aut quatuor menses usus erat, probe nossem: explebat enim se quotidie fermē fungis. Hunc itaq; sola hiera ex colocynthide purgauī, bis in quinque diebus: in prima sanē purgatione quatuor ex ea drachmis, in secūda quinque exhibitis. Prius quàm uero ad has purgationes peruenirem, catapotia ex aloë undecim ei præbui, ciceribus ferē magnitudinem parem habentia. Habent autem catapotia hæc: Colocynthidis partem unam, aloes & scammonia utriusq; partes duas, his ego unam partem succi abinthij addo. Antea uero etiā mastichiam & bdellium adieci, Hoc enim modo Quintus utebatur. Verum propter quid ea reiecerim postea, alio sermone explicabitur, quem in compositionis purgantium pharmacorum libros refero. Quum igitur post has tres purgationes homini pituitā e capite deducere per apophlegmatismos uellem, atq; deinde pharmacum quoddam ad affectam partem adhibere, contingit ipsū de repente in profectionem quandam ablegari: in qua quum boni succi cibis, de quibus a me instructus erat, uteretur, post dies forte uiginti rediit ab affectione circa capillos penitus curatus. Ex hoc successu incitatus ego quum in alijs eandem curationem fecissem, expectaui ut uiderem quid citra pharmacorum ad caput adhibitionem, esset sequiturum. Curati sunt itaq; omnes hoc modo, non tamen in iam in ueteratis huiusmodi experientie periculum feci. Difficuler enim eluuntur in his cuti impactis, serosis humoribus, multo uero magis in his quibus iam ipsa cutis ad malum habitum peruenit desperanda est per solas purgationes curatio. Atque hæc quidem necessariō præfatus sum. Ceterum de pharmacis affectioni huic cōmodis iam dicere incipiam. Euacuatio igitur omnino esse oportet ipsa assigētis humoris, uerū euacuare nihil potest quod non discutienti ut sit præditum, eam uero uim citra calefactionem habere non potest. Sed si quidem ex uehemēter calfacientium numero fuerit, cutem exuret: quod si uero non urat, in principio quidem præclare iuuabit, progressu uero temporis cuticula capitis super resiccata talis euadet, qualē in caluis uidemus. Non tamen simpliciter moderate calidū esse pharmacū oportet, intra uidelicet fines scopi propositi contentū. Nam & tenuiū partium ipsū esse cōuenit, quod sanē in altum sit progressurū, unde radices capillorū generationis suæ principium habebit, & ut qualē diximus præditū: propterea quod crasior sit & durior capitis cutis, & ob id medicamēto opus habeat efficaciore. Itaq; si supra hoc quod uitiatos humores discutiat, etiā idoneum sit ad bonū sanguinē adtrahendū, uel ut est thapsia, optimū

sanè pharmacum est censendum. At uero quum thapsia longe calidior sit quam affectioni sit ex usui, merito eius adhibitionem per se uitamus: exulcerationes enim in cute excitare consuevit, & omnino quosdā inflammatos tumores, qua propter necessario quaedam quæ eius uehementiam mitigant admiscemus. Id ipsum uero ceramentum ex oleo apparatus præstare potest, Sit autē tenuium partium oleum quale est Sabinū, præstat item moderate esse uetustū. Ad hanc rem cōfert item oleum cicinū, quod mox ab initio eiusmodi naturā habet, quali præditum est Sabinū in ueteratū. Quod si neutrum horū ad manum sit, ex reliquis Græcis oleis citra olearum germina apparatus quodcūq; tandem admiscemus, præsertim si sit uetustū. Perspicuū itaq; esse opinor oleum ex Iberia, aut Hispania, aut quomodo cūq; quis eam appellare uelit, fugiendū esse, itemq; quod ex oliuis nondū plenè maturis apparatus, Omotribes & omphacinū à Græcis apparatus. Vfus suus autē & sola thapsia uehementi eius facultate larga aqua ammixtio ne exoluta. Verum nosse operæ precium est circa thapsia usum, maximam differentiam esse recentis ad uetustiorum. Vis enim huius pharmaci post annū multum exoluitur, atq; amplius adhuc post duos annos, aulimq; ferè dicere inutilem penitus eius usum ad triennium progressæ. Eius igitur ætatis animaduersione habita imparē aquæ modum admiscebis. Ad recentem enim plurimum aquæ addes, eamq; sæpe singulis diebus illines ad eam uero quæ per tempus imbecillior reddita est; minus adfundes, quo & ob crassitudinem diutius ad hære, & propter liquiditatem non statim desine re contingat. Quin & quum cōpositum pharmacum paras quod thapsiæ ammixtionem requirit, quale est quo ego assidue utor, nō æquale semper pondus thapsiæ ammisceris, sed quantū pro tempore ætatis eius cōuenit, tantum ipsum pōdus augetis. Cæterum de hac tota re paulo post diligentius quum ad cōposita peruenero explicabo, ubi prius simplicia pharmaca affectioni huic familiaria recentiuero. Etenim ex his quæ fortiter calfaciunt est euphorbiū: quæ autem sufficenter, laurinum siue oleum siue unguentum, aut quocūq; tandem nomine id appellare uelis. Nam & his unā cum calfaciendis ac discutiendis facultate inest uis adrahendi sanguinem in locum ab ipsis calefactum. Licet igitur ipsis per se uti, euphorbio quidem in oleo trito ac leuigato, laurino uero solo citra alterius ammixtionem illito: si tamē nimis fluidum appareat, parum ceræ addatur. Quum uero multo calidius sit recens euphorbiū, si quidem eo quod duorum aut trium annorum est uteris, ad libram unam Romanam olei, euphorbij unciam unam inijcias, quæ sanè duodecima olei pars existit. recēti uero euphorbio parce utaris, quā minima eius parte primum ammixta, aut etiam ceræ uncia una insuper addita, quo uideas quantum hominem excalefaciat: licebit enim tibi ubi rursus uti uoles, denuo addere siue oleum siue ceram malis. Eodem modo etiam thapsia utendum est,

A omnibusq; fortibus medicamentis. Peccatū enim infra modum nullum detrimentum asserit, supra uero aliquando exasperat & exulcerat cutem, inflammationemq; suscitāt. Atqui et si in sequentibus cōpositis pharmacis quādōq; euphorbiū aut thapsia scribatur, pondus ipsorū in uigore existentium non ueterum intelligere oportet: Valde enim uetusta omnino fugere oportet, nō solum in his pharmacis, sed omnibus etiam alijs, quæ uide licet succi & liquores, & flores, & folia, et fructus, & radices, & semina existunt, quando sanè etiam Metallica ipsa per longioris temporis situm uires suas amittant. Vt uero tamen quibusdam pharmacis uiginti aut etiam triginta annorum, propterea quod nondum uergentem omnino habeant ætatem: alia enim alia tum uigentem, tum uergentē seu inclinatam ætatem habent, atq; etiam si ita dicere libeat senectam. Vnū quodq; autem proprium uigorem his qui ea sæpe uiderunt indicat, tum ex odore, tum ex gustu, aliquando etiam ex colore, & secundum crassitatem compage. Quemadmodum in alijs omnibus pharmacis non solum quod calefaciant operæ precium est cognoscere, sed & quantā distantia quorūq; ordine id faciant. Sic item in his quæ alopecias conferunt pharmacs nosse oportet quod calidissimum quidem ex eis est euphorbiū, Eo autem minus calidum est thapsia, post thapsiam autem sinapi et nasturtium. Iuxta alium autem modum limnitis nulli horum secundum est, habet autē præter hanc duas alias appellationes: nam & Adarcium & Adarce uocatur. Post hæc succedit sulphur, & niri spuma, ipsumq; nitrum molle usum, & quod Berenicarium appellatur, quemadmodū & Aphrolitrum album, leue, ac laxum, quod nullam in se terram asperitatem habet. Deinde ueratū utrunq; & erucae semen, & laurinum siue oleum siue unguentum uelis appellare. ad hæc alcyonium utriusq; usum & non ultimum præstat tamen usū: & calami radices itēq; cortex, ambo usta. Quin & pix liquida, & cedrinum quod aliqui cedriam appellant, & murū ster cum, ursæq; adeps: præstat autem si uetustior extet, quanquā etiam hyenæ, leonisq; ac pardalis ac anseris adipem conueniunt. & quicūq; tenuium partium substantiam habet, quo proptē in cutis profundum penetrare queant, atq; ad radices usq; capillosum pertingant. Sed & amygdalæ amaræ totæ usæ cōmodæ sunt, & thus aceto acerrimo subactum. Subactum autem intellige quum pluribus diebus & maxime ad solem frequenter cum acri aceto sit contritum. His itaq; omnibus pharmacis licet utaris, ad fortia quidem cerato liquido addito, debilib; uero oleo laurino imbutis. Et in ueteratas quidem ac difficulter curabiles cum fortibus persanare conaberis, incipientes autem & paruas cum debilib;.

Ad Alopecias composita.

2

Cæterum pharmaca composita, quæ partim à prioribus medicis qui alicuius existimationis fuerunt, magnopere sunt laudata, partim uero à nobis ipsis per longam experientiam sunt examinata

ac probata, eiusmodi existit. Euphorbij, thapsia, laurini, singulorū drach. ij. sulphuris uiui, ueratri u-
 triusq; drach. unam. neq; refert alio in nigro uera-
 tro quod ad manū sit utaris. his ammisce cerā dra-
 vi. laurino aut cicino aut ueteri oleo liquefactas,
 utereq; hoc ut fortissimū pharmacū, ad inuetera-
 tas & aegre curabiles alopecias. His etiā aliquid
 nascitur, drach. unā. aut alcyoniū usi drach. i. am-
 misciui, praestat autē in hunc usum alcyoniū quod
 durius est & magis asperum. Quod si thapsia non
 adsit, pro ipsa tātum pondus seminis nasciturij aut
 erucā addes, aut ipsum adeo nascurcium. Si uero
 laurinum nō habeas bonum, picem liquidam ad-
 de: laurinum namq; picem liquidam non multum
 excellit, thapsia uero reliquorū respectu maxi-
 mum excessum habet. Hoc sanē pharmacum om-
 nium quē ad hanc affectionem efficaciter faciunt
 fortissimum & ualentissimū est, quando uidelicet
 affectio aegre recipit curationem. Quae enim par-
 ua est & incipiens etiānum, sola purgatione san-
 natur, & per singula quae recensui simplicia uita,
 laurino aut cedrino, aut liquida pice, aut cicino
 uel ueteri oleo excepta. Ammiscui etiā aliquan-
 do mel pro cerato, minor tamen copia & ponde-
 re, neq; peius euasit pharmacū. Porro quae ex ad-
 i-
 pibus componuntur modica item thapsia ammi-
 xta, similiter profunt, praesertim si euphorbium &
 adarcium addatur. Sit autē adeps triū generum,
 leonij, pardalij, & hyanae, cuiusq; pars una. Si ue-
 ro hyanae adeps nō adsit, sufficit praesentibus reli-
 quis duobus uti, anserino ammixto: Si uero om-
 nes quatuor habeas, simul omnes miscebis, addi-
 to insuper si adsit ursino. Ad totam uero eorū mo-
 lem duo decimam thapsiae aut euphorbij partē ad-
 dere satis est; aut si omnino fortius facere uelis, am-
 bo addas; nam & per experientiam haec ipsa phar-
 maca efficaciam sunt iudicata; Maioris enim experi-
 entiae habenda gratia, petentibus subinde medi-
 cis a me amicis, singulis aliud atq; aliud eorū quae
 experientia cognita habui, rudi modo digestū exhibui,
 & reperta sunt sane plurima ex eis optime cō-
 ducentia. Verum ante omnia methodi meminisse
 oportet circa eorum usum, quae cōmunis in om-
 nibus praesertim fortibus pharmacis existit, quare
 etiā saepe eius mentionem facio, utpote in qua
 magna omnino uis sita est. Qui enim singulis for-
 tibus pharmacis utitur, in principio quidem ipsa
 molliora adhibebit, ammixtione uidelicet eorum
 quae uires ipsorum exoluūt: qualia sunt oleum &
 cera, & ex simplicibus quae diximus debilia, uelut
 est thus, & calami cortex ac radices exustae, & a-
 mygdalae amarae, & quae cūq; eius generis existit.
 At uero post primum usum quū iam secundo ad-
 hibere uoles, intueri oportet qualē alterationem
 in affecta particula prius admotum pharmacū fe-
 cit, atq; illius respectu aut uehementiam facultatis
 eius lenire, aut augere. Velut in hac quam iam tra-
 ctamus affectione, primum quidem capillos no-
 uaeuila tollere oportet, deinde affectā cutem per
 linteolum neq; asperum neq; molle nimis confric-
 care, ac uidere ad quantū ruborem per huiusmodi

A molimen ac frictionem peruenit. Magnam e-
 nim spem successurā curationis tibi inspiciet, si per
 modicas frictiones rubefiat, quae moderata af-
 fectiōis significatio existit. Si uero per multas tan-
 dem, grauiorem tum affectionē, tum curationem
 indicat, praesertim quum quaedā cuticula etiā si
 multum confrices non rubefiant. Manifestum igitur
 tur est has omnium difficillime curari, sicut cōtra
 facillime, quae facile rubescunt: quae uero inter has
 medio modo habēt, tantū inter se differunt, quan-
 tum uel ad pessimas uel moderatissimas accedūt.
 Atq; haec quidem obiter & extra propositū dicta
 sunt, quanquam nō omnino praeter rem sint. Rur-
 sus itaq; ad id quod propositum erat reuersus me-
 thodi te cōmonefaciam, quā usus pharmacorum
 requirit. Post primā igitur pharmaci curus usum
 elegeris adhibitionem, intueri conuenit primum
 quidem, An etiā ante frictionem cutis colo-
 rator appareat: deinde autē an cum pauciore q̄
 prius frictione, aut an cum aequali quidem, magis
 tamen q̄ prius rubicunda fiat. Prae omnibus uero
 animaduertere oportet ne in fortū pharmacorū
 admotione cutis ultra quā conuenit cōcalescat,
 id quod tum ex colore ipsius, tum digitorū tactu
 deprehendes. Colore namq; flauior apparebit, &
 digitorum contactu satis calidam cognosces. Ho-
 rum itaq; animaduersionem habere oportet: per-
 culum enim est iterū atq; iterum repetitū eorum
 usu, cutem exuri. Quare ad molliora transeundum
 est, aut eodem utendum quidem, sed cerati, aut a-
 dipis, aut liquoris cuiusdā oleosi ammixtione, ut
 C ipsius exoluta. Vendū est & olei calidi dulcis in-
 fricatione, & cataplasmate ex pane, fomētisq; & sca-
 rificationibus ac cucurbitis, & ceratis, uirium item
 refectrice diata. Caterum perseuerante affectio-
 ne utendum est assidua rasura, & rubificatorio ex
 sinapi uelut est praedictū, itemq; frictionibus pra-
 scriptis, & sequentibus diebus illita pice aut oleo
 cedrino, & post frictionem scarificationibus.
 Quidā uero aciculas colligātes hoc modo utaciē
 ad cutē urgentem habeant, per ipsas cutē cōpu-
 gunt. Verum post rubificationē per frictionem
 ductā, & post scarificationem, pharmacis quae
 ex alto euocare ac meatus transmutare possunt,
 D Metasyntica Graeci appellant, utemur. In omni-
 bus autem communis scopus hic sit, ut in aere cali-
 do pharmacum ipsum adhibeamus, & maxime si
 fieri possit in loco insolato, qui non habeat auram
 ipsam persilantem. hyemis autem tempore praesi-
 terit in balneo his pharmacis uti.

De pharmacis compositis ad alopeciae affectionem a senio
 ribus me medicis conscriptis. 3

Heras quidem igitur in ferula iuxta dictionis
 scribi sic scribit. Alcyoniū quod asperius est usum
 ac cum oleo tritum ac leuigatum loco illinto, sit
 autem oleū maxime ex lucernis acceptum. Haec
 quidem sunt Herae uerba: Verū nosse oportet me-
 dium esse uiribus hoc pharmacū, & propterea ad
 medias magnitudine alopecias curandas suffici-
 ens. Moderatū equidem pharmacum est si calami
 radicem aut corticem, aut amygdalas amaras, aut

eius generis quippiam uisum cum oleo committas. fortia uero sunt que ex euphorbio & thapsia & a-dardo apparentur. In medio uero istorum est alcyo-nium uisum, sed & ipsum moderatius redditur o-leo ammixto, fortius uero liquida pice aut laurino affuso. Misceat ite predictis adipibus, & sane ego curam quae ad hanc affectionem uisum adipe uisus erit, nec quicumquam profecerat, alcyonium ammisce-re consului, a quo postea breui sanus euasit. Ceterum oleum lucernarum non ob aliam rationem ap-pum est, quod magis tenuium partium existit, id quod ipsi ex lucerna in qua ueluti coquitur accedit, fitque tum ueteri, tum cicino ad simile, ueluti si etiam alias ad ignem oleum uel is calefacere. Itaque & sordes quae in candelabris liquido luto similes gignunt, his qui apud nos ruri degunt cognita sunt, & ad ulcera in medio digitorum pedum curanda effica-ces, quae ulcera frequenter illis oboriuntur propter illuuiem & negligentiam perluendi ea singulis diebus. his itaque sordibus lutosis consului cui-dam rurali alopeciam quam scalpam mihi ostende rat illinire, una cum assidue loci rasura: qui sane ab ipsis per sanatus, etiam alios tentauit hoc modo cu-rare, utpote qui putaret omnem alopeciam ab hoc pharmaco posse curari. Verum ego quam moderatam eius affectionem essem intuitus, speraui ipsam quidem per illas sordes sanitatem consequuturum.

Aliud compositum pharmacum Hera. pueris aptum. 4

Aliud autem deinceps pharmacum Heras post praescriptum, iuxta seriem dictionis hoc modo scripsit. Seminis erucæ, partem unam. nasturtij, partem unam. nitri, partem unam. In aliquibus autem exem-plaribus simpliciter scriptum est. Erucæ, partem unam. nasturtij, partem unam. nitri, partem unam. con-tritis picem liquidam affunde, & loco prius confri-cato impone: atque ubi abstuleris pharmacum, lo-cum spongia calida imbuta extere. auferes autem bis per diem, & in pueris maxime efficacis conspi-citur hoc pharmaci. Fortius enim est priore, Verum inueterata & aegre cedente alopeciam non cu-rauerit, quod ipsum etiam Heras indicat, qui in pue-ris ipsum maxime efficacis adscripsit, hoc est in cor-poribus molli cute praeditis. Ex huiusmodi enim uitiatum humores facile discutitur. Habent autem eosimilem pueris cuticulam eunuchi & mulieres.

De his que Crito ad Alopecias conscripsit. 5

Crito uero in tertio libro eorum quae ad corpo-ris ornamum pertinent, sic scripsit: Ad affectionem alopeciam appellatam quae capillos deuasat, & comuniter deformitatem inducit, subscriptis com-positionibus utendum est, ut Heraclides Tarenti-nus tradit: Amygdalas amaras cum corticibus us-tas ac tritas aceto excipe, modico ite affuso mel-le: usu uero expetente loco per mundum linteolum praefricato, assidue illine. Prodest autem maxime etiam assidue rasura antequam pharmacum impo-natur. Aliud quo Moschus usus est: Herina-ceorum marinorum testas exustas & aqua suba-ctas locis praefrictis impone. In quibusdam exem-plaribus non aqua, sed adipe urfino excipi debere Herina-ceorum cinerem reperi, quod mihi magis

Galeni.

placuit. hoc enim modo efficacius reddi. Aliud. Calami radices uistas adipe urfino excipe atque im-pone. Aliud, Thapsia corticem tritum cum aceteto imponito. Aliud, Chamaeleonis radicem cum aceto diligenter tritam imponito. Haec praefatus Criton deinceps ita scribit. Quod si uero per se ueretur affectio, subscriptis compositionibus utendum est. quibus uerbis plane indicat per praescri-pta medicamenta moderatas affectiones sanari: itaque deinceps quae ad fortiores affectiones conducunt scribit, quae iuxta seriem dictionis ipsius hoc modo habent.

Que Heraclides ad inueteratas Alopecias descripsit. 6

Ad alopecias uelut Heraclides Tarentinus tra-dit. Orestini ad alopecias inueteratas: muscerdae drach. ij. thuris drach. ij. aceto acerrimo dissoluta praeratis locis illine. Aliud, Herina-ceorum marino-rum una cum testis exustorum drach. ij. gallarum omphacitidum, tantundem amygdalarum amara-rum uistarum, tantundem muscerdae drach. i. aceto dissoluta & probe trita imponito. Aliud Oresti-ni, Pilorum urfi ustorum, adianti uisti, radicum cala-mi uistarum, foliorum fici ustorum, panniculi Cili-cij usti, singulorum aequales partes adipe urfino & cedria excipe. Vfus uero tempore, loco foto & per fici folia confrictio, ac per nitrum extero, pharmaco cum quotidie illine. Quod si cutis superficies exulceretur, ceratum ex oui luteo impone, & farinarum triticiae ac hordei succum recentem superline. Aliud Orthonis Siculi accommodatum, Cineris ranarum minimarum in ollula uistarum, partem unam. muscerdae, ueratri albi, radicis calami uiste, piperis albi, singulorum aequales portiones aceto excipe, & ad praefrictum ac praerasum locum utere. Aliud, Cineris unguicularum caprinarum uistarum, succi thapsiae, alcyonij, muscerdae, spumae nitri, myrrhae, piperis albi, zingiberis, singulorum aequas partes probe tritas felle caprino excipe.

Que Cleopatra in libro eorum quae ad corporis ornam-tum pertinent scripsit. 7

In libro Cleopatrae de ornatu corporis, ad alope-cias descripta sunt pharmaca, quae iuxta illius di-ctionis seriem hoc modo habent: Sandaracham tri-tam largoque uisco quercino exceptam, et in linteolum inditam, loco per nitrum prius praeparato im-ponito. Ego uero etiam nitri spumam ad praedicta ammiscui, & egregie efficacis pharmacum reperi. Aliud, Scillae drach. i. ueratri albi drach. i. ex ace-to trita praeratis & nitro confrictis illinito. Aliud, Sinapis drach. unam. nasturtij drach. unam. trita ex aceto, praeratis & nitro extersis locis imponito. praestat autem locum uulnifidum impaetis scariffi care. Aliud, Corticis calami drach. iij. spumae nitri drach. iij. pice liquida exceptis utere. Ceterum locum assidue radere oportet, & cum linteolo confricare, sic enim quam celerrime pilos pro-ducet. Aliud, Muscarum capita contrita affrica. Aliud, Muscerdas tritas illine, loco prius per linteoli affrictum subcructo reddito. Aliud, Amygdalas amaras una cum corticibus exustas cum aceto & melle contere, & loco per defrictio-

tom. 5

u

nem

nem subruento reddito illine, idēq; ipsum assidue
facere perge, & locum nouacula rade: sic enim ca-
pilli cito profibunt. Aliud, Caterum ea quæ
sequitur compositio omnes ui sua præcellit, faci-
ens item ad profluuium capillorum, cum oleo aut
unguento dissoluta, facit & ad rarefcentes in princi-
pio capillos, & in caluitiem probabentes. Estq; om-
nino admirabilis: Murium domesticorum usto-
rum partem unā, panniculi ampelini usti partem
unam, dentium equinorum ustorum partē unam,
adipis urini partem unam, medullæ ceruinæ par-
tem unam, corticis calami partem unam. Hæc om-
nia arida leuigentur, & sufficienti melle ammixto
ad crassitudinem mellis redigantur, indeq; adeps
& medulla liquefacta addantur, & pharmacum ip-
sum in aeram pyxidem reponatur, ex eoq; alo-
pecia donec capillos producat defricetur. Simili-
ter autem & profluui capilli quotidie ex eo illinan-
tur. Porro inter hæc ipsa pharmaca itemq; ea quæ
deinceps describentur, non difficile est discernere
quæ acriora sunt, rursusq; quæ molliora &
imbecilliora existant, modo quis ea quæ in princi-
pio dixi in memoriam reuocet. Ita enim & rectus
eorum usus cōtinget, nimirum ad mediocres alo-
pecias medicoriam ad adhsibitis, ad fortiores fortio-
ribus, uel ut etiam ad eas quæ fortissimæ sunt, for-
tissima remedia admouentur.

Que Archigenes ad Alopecias commoda conscripsit. 8

Archigenes item hæc pharmaca ad alopecias
hac uerborum serie descripsit. Alopecias leues &
in superficie hærentes, nitro confricatas ac linteo-
lo exteras, uerbenaca in sole trita acetoq; diluta
largiter illine. Aut eodem modo exteris betæ fo-
lia impone, in superq; linteolo humecto contenge,
aufer autem ea per loci humectationē. Cæterum
in altum progressas cum aceto, nitri gleba, aut se-
piæ testa, aut aspera squatinae cute, aut fici folijs,
usq; ad dilanationem defricat; deinde deterfo san-
guine, betam ex uino coctam impone, aut caricas
ustas cum uino, aut lentis farinam cū uino pro ca-
taplasmate adhibe. Aut buprestis cū aceto, aut ra-
nunculo, aut ari radice in cerati formam redactis,
& per noctem impositis bullas ex alopecia exci-
ta; mane uero bullas compunctas, allio aut bu-
selino, aut fremij folijs intege. Probe faciunt eti-
am post excitas bullas hippocampi marini us-
ti, & cum modico atramento futuroi crudo trito
in sperli, itemq; ossa maxillarum suillarum usta.
Aut ralis & cum nitri spuma extersis, & cum al-
cyonio ex acri aceto confricatis donec cruēta red-
dantur, nucum ponticarum putamina usta cū mel-
le leuigata illine, atq; id bis in die facito: sed ac si
stit eas ut plurimum in diebus decem. Aut mures
domesticos in olla exustos tritosq;, axungia exci-
pe, & præfrictis cum allio alopecias in splenio im-
pone, idq; donec capilli enascantur quotidie repe-
te. Aut ranunculos paruos similiter exure, eorūq;
cinerē cum pice sæpe usq; quo crassa facta sit fer-
uēfacta illine, loco neq; raso neq; prius confricato.
Aut muscerdas & thus æquali portione cum ace-
to ad mellis crassitudinem redacta loco prius ru-

A bificato illine. Aut ficus aridas ustas cum oleo tri-
tas illine. Aut ueratrum album, piper, muscerdas,
præfrictis & conualptis ex aceto illine. Aut ra-
phano & cepis oblique concisis probe confricatas
illine. Aut alcyonium torrefactum cum digito o-
leo madefacto diligenter affrica, donec morsum
percipias, & correctam alopeciam emendabis.
Aut alcyoniū ad lucernam torrefactum, adipēq;
ursinum similiter liquefactum misce, & præfrictis
ad solem, illine. Aut præpunctis pro more, cepas
tritas cū melle cataplasmatiss modo impone. Aut
raphani cortice eodē modo. Aut facta scarificatio-
ne, calami corticem superiorē quem Aegyptij Si-
phtherium appellant, ustum cum pice liquida cō-
mitte. Spleniumq; impone, & quater aut quinque
B solue, deinde exterge ac aliud splenium im-
pone. Quidam nitri decimam cineris ipsius partē am-
miscunt, ualdeq; eis succedit. Aut squamam sto-
momatis ferri cum aceto & oleo illine eodem mo-
do. Aut felis siue crocodili stercores drach. vi. si-
napis drach. quatuor. cū acri aceto illine. Aut can-
tharidas ustas pice liquida exceptas ad cerati li-
quidi formam redige, præfrictisq; ex nitro asso lo-
cis, & exteris in splenio impone, & per noctem
sine: mane uero tolle, locumq; exicari permitte
usq; quo circum circa rumpatur: ubi uero erupe-
rint capilli eos assidue rade. Aut nasturtium, uel
ut a liij piper, muscerdas, ueratrum album, æquali-
bus portionibus ex aceto illine. Aut cum aspera
squatinae cute, aut folio ficulneo, aut pumice leui,
C superne alopecias cruentas facito, deindeq; amyg-
dalas amaras ustas cum aceto mulso illinito, idq;
assidue facito ac radito; augetur enim statim ca-
pilli. Aut testudinis marinæ sanguinem illine, ex
laudatissimis enim hic est. Aut hippopotami cor-
rium ustum illine. Aut nuce ponticas ustas & sta-
phidas syluestres cum unguento laurino. Hoc en-
nim ab Archigene laudatur. Aut muscerdas & ue-
ratrum album illinito. Aut corticis calami usti &
nitri æquas partes cum pice liquida ad malagma-
tis formam redige. Aut nuce amaras unā cū corti-
cibus ustas ex aceto aut melle crassius illine, idq;
loco prius per linteolū exterso: post uero assidue
radito. Aut ammoniacum thymiana cum succo
tithymalli affricato. Aut felis stercurus aridum ex
D aceto. Aut rhois drach. iiii. uel ij. sinapis drach. ij.
cum acri aceto illine. Aut amygdalas amaras &
pumicem illine. Dionysodorus autem medicus,
Soleam, inquit, nouam ustem cum acri aceto illi-
ne. Egregie autem facit ad inueteratas alopecias,
si thapsia succum aut radicem cerato exceptū lo-
cō imponeris, etiam si nihil præterea aliud facias.
Decedit enim superna cutis et sanie serofa madet,
capilliq; sua spōte subnascuntur. Vides itaq; quo-
modo Archigenes ex thapsia pharmacum collau-
det, neq; enim aliud eo præstantius reperias. Au-
get autem fidem cōmoditatis eius consona histo-
ria experimenti, quapropter & ego omnia apud
Empiricos medicos obseruata hica describo.

Que Asclepiades in libro de Alopecia scripsit. 9

Non recentioris nunc mentionem facio Ascle-

piada, qui memorabiles sanè pharmacorum com-
positiones in multis libris conscripsit, sed uetustio-
ris Bithyni uidelicet. Hic itaq; Asclepiades curan-
di uiam se reperisse gloriatur, per quã multos im-
medicabiles alopecias habentes sanatos dicit. Ve-
rum plus ad curationem totam diertam ualere q̃
pharmaca ipsa tradit. De diæta itaq; hæc scribit: Ab-
stinendum itaq; ab omni uino in totũ propter has
ipsas causas. Manifestum uero est inde, ipsum an-
tea retulisse causas, quas si quis discere uelit ex li-
bri ipsius lectione requirat. Deinde subiungit:
Abstinendum etiam à nimia repletione. Prohibet
autem & carniũ esum, & casei, & lactis, & legu-
minũ, omniumq; simpliciter quæ etiam exigua
copia accepta plurimum nutriũt & inslant. Quin
& exercitiã plurima fugere iubet, uelut etiam assi
dua balnea, & multas exudationes. Cæterum de
pharmacis iuxta seriem dictionis sic scribit. Est au-
tem primum unguentum tale: Spumæ nitri partes
duas. salis ammoniaci partem unam. uista trita ac er-
rimoq; aceto diluta donec strigmentorum crassi-
tudine accipiãt, præscalptæ leuiter alopecie, quo
densetur & cruentus reddatur locus, moderate il-
linimus, defricamusq; donec caput ea concipiat,
& pharmacum in altum probe deferatur, atq; ita
quiescere usq; ad crepusculum sinimus, postea ad
uesperam idem repetentes, similiterd; sequenti ac
tertia die, magnam permutationem reperimus. Si
stitur enim nomen siue ulceratio serpens, & capil-
li uellicati, immo & uis tracti resistunt, & nõ eu-
elantur. Deinde sequenti die præstrictis acetum ca-
taplasmatum modum imponimus, usq; quo bullæ ex-
urgant, & cutis leuem exulcerationem incurrat
post uero pertusis bullis ad biduum aquositatem
effluere sinimus quæ ab ipsis ulceribus prodit. In-
deq; rursus eodem uogeto utimur, ulceratis tan-
tum locis parcentes eosq; transgredientes, Sanos
uero contingentes, eosq; defricantes usq; ad cre-
pusculum quiescere sinimus, quo idem repen-
tes paulatimq; cõfricantes usq; ad septimũ aut o-
ctauum id facere pergimus diem; quo sanè tempo-
re uidemus iam ab extremis alopecie non ampli-
us tenues ut ante, & lanuginosos prodire pilos,
sed longiores & robustiores, consimilesq; postea
paulatim etiam in partibus denudatis crescen-
tes, uicissimq; tenues & imbecilles deficiẽtes. Cõ-
tingitq; simile quiddã quale in ulceratis uidemus.
In ulceribus enim cicatrix ab extremo instium fa-
ciens, postremum in medio ulcere desinit ac cõit.
Ita in alopecia partes pilosæ uicinæ primum con-
ualescunt & dense pilis redduntur, quæ uero in
medio sitæ sunt omnium postremo pilos produ-
cunt. Si itaq; curatio hoc modo processerit, reli-
quis medicamentis nihil opus habebimus, sed uo-
hoc per multum tẽpus semper utimur: ceditq;
benigniter affectio, nisi omnino magna nuditas
existat. Medio autem tempore scalpura per a-
cutum coelum assidue facimus. Aliquando etiam
cuspide acuti spiculi cute pertusa, per fissuras ip-
sas sanguinem moderate elicimus. Hæc his uerbis
præfatus Asclepiades, deinceps de rasura contra

Galen.

quã alij tradit; neque enim assidue sed per inter-
ualla affectam partem radere iubet, ubi iam me-
diocriter desit capilli in ea fuerint exortii; pro deum
tes autem iam & adhuc tenues rasura non digna-
tur. Cæterum post rasuræ factam mentionem, de-
inceps hæc uerba scribit. Quod si uero remoretur
capillorum exortus ad subscriptas cõpositiones
confugimus. Sũt autem tales: Herinacij terrestris
caput aut corium, ustum tritũ ac melle subactum
illinito. Aliud, Hippocampum marinum &
nitri parum coexure, adipeq; anserino ammixto,
loco nitro præparato illine. Aliud, Thapsiam
aqua maceratam illine. Aliud, Muscardas ace-
to tritas illine. Aliud, Calami Cyprij folia in ol-
la exurito, deinde resina pinus cinerem ipsum ex-
cipit, & præscarificatæ alopecie imponito ac ob-
ligato. Aut corticem siue comam calamorum eo-
dem modo præparato, ampliusq; nitri parem ci-
neris modum ammisceto, & pice exceptis utitor.
Est autem non inualidum sed plurimum efficax.
Post hæc uero etiam muscarum Asclepiades me-
minit, iubens quã plurima ipsarum capita mox
ubi captæ sunt, nudis alopecie partibus affricari,
atq; id maxime ubi alopecia fuerit exulcerata. Et-
enim confert, inquit, muscarum sanguis partibus
tunc per pharmaca ex nitro ac alijs composita ex-
acerbatis, nimirum quum non mordant hæc ip-
sas tantum, sed bullas etiam in eis excitent.

Quæ Soranus ad Alopecias conscripsit.

10

Præfatur quædam quæ iuxta propriæ sectæ du-
ctum digessit, meminitq; eorum quæ Asclepiades
scripsit; deinde uero hæc, hæc uerborum serie sub-
textit. Quapropter ubi recens malum est, primum
abstinentia proderit, deinde simplex cibus boni
succij, & irrigatio ex oleo dulci calido, & panis in
cataplasmate, fomenta q; & scalpura, & cucurbi-
tæ, ac cerata. Vires item reparantur. Inueterata au-
tem iam affeãtione assidua rasura, & rubificatio ex
sinapi, & frictiones præscriptæ, ita ut in sequenti-
bus diebus picem superlinas aut oleum cedrinũ.
Proderit item rubificatio ex affricu foliorum fici
aut ceparum, aut linteoli pollicis aut indici obuol-
luti, & post frictionem scarificationes. Quidam
uero acus conligantes ita ut cuspides ipsarum in
eundem locum porrigãtur, per ipsas cutem com-
pungunt. Cæterum post rubificationem per defri-
ctionem inductam, postq; scarificationem phar-
maca conueniunt ex alto euocantia ac transferen-
tia; metasyncritica Græcis appellata, tum illita,
tum emplastri modo imposita. Eiusmodi autem
multa particulatim existunt, Nam & cepe tritum,
& raphani cortex, utrunque cum melle imposi-
tum ualet. Aut spumæ nitri partem unam. rhois
partes duas. salis ammoniaci partem unam. uista
& cum acri aceto trita ad strigmentorum crassitu-
dinem redigantur. Scripta sunt & alia multa, in-
quit, apud Asclepiadem & Heraclidem Tarenti-
num, Elephantidemq; ac Moschionem in libro
de ornatu. Ex quibus sanè & ipse ea quæ ex Ascle-
piade præscripta uidisti exscripsit, & alia itẽ quæ
dam quorum deinceps mentionem faciam: Adi-

tom. 5

u 2

pis

pis urfīni partem unam. cineris foliorum calami ustorum partem unam. squamā stomomatis ferri partem unam, aceto & oleo ueteri subacta illine.

Aliud. Stercoris felis aut crocodili drach. viij. sinapis drach. iij. ex acri aceto. Aliud. Hordei usti & muscerdæ par pōdus ex acri aceto. Aliud.

Nasturtium & muscerdas, ueratrū album, piper, æquali mensura ex acerrimo aceto. Aliud.

Sinapi & nasturtium aut spodylium ustra trita ex aceto illine. Aliud. Ranarum ustrarū drach. xvij. pumicis usti drach. xij. alij. xv. habent. sinapis drach. viij. nitri drach. iij. nucum ustrarum, drach. xxij. Aliud. Præstat & ceratum ex pipere, pyrethro, calce, & oleo myrteo. Oportet autem & partem affectam præficare uel per alcyonium ustrum donec morsum perentiscat, uel per herinacium usti cinerem linteolo inuolutum, donec locus rubefiat. Alia pharmaca quæ partim mihi, partim præceptoribus meis, partim amicis medicis in usu fuerunt. Pumice rubificatorio præficato, præfomentatoq; & thapsiæ succum donec cutis eleuetur illinito, deindeq; fomento adhibito, ce rato rosaceo uitior. Aliud. Foliorum acradicis calami ustorum, pilorum urfi, adianti, adpis urfini, picis liquida, pilorum caprarum ustorum, cedriæ, omnium octo par pondus accipe, liquidaq; cum aridis cōmitte, & præficatis adhibe. Aliud.

Fici folia cum aceto donec lanugo prodierit affrica; deinde uero herbæ quæ Stœbe appellatur succum illine. Aliud. Ranas paruas ustras picis liquida tepidæ insperge, deinde neque prærafis neq; præficatis illine. Aliud. Spumæ nitri, drach. iij. stercoris muris, drach. ij. corticis calami usti, drach. ij. picis liquida excipito, & splenium formato, idq; prærafato ac cum nitro præparato loco imponito, & ante biduum uel triduum non aufero.

Aliud. Sinapis & stercoris felis æquas utriusq; partes, loco præficato illinito. Aliud. Scarificato ac sepię atramentum illinito, aut marrubium uiride tritum illinito. Aliud. Sphæritidis folia torrefacta cum aceto leuigata imponito. Appellatur autem sphæritis, cupressus quæ sphæria, id est, pilulas producit. Aliud. Nuces amaras unā cum putamine ustras, prærafis ex aceto & melle illine. Aliud. Herinaciorum marinorum testas ustras, ex melle & aceto prærafis illine. Aliud. Alcyonium ustrum & murium stercora cum porri succo illine. Aliud. Radicis thapsiæ drachmas quatuor. radicis chameleonis drachmas duas. uisco probe subacto excipe & cataplas matis modo impone, quumq; exacerbatus æger fuerit adime. Aliud. Foliorum calami græci ustorum drachmas quatuor. muscerdæ drachmas duas. herinaciorum ustorum drachmam unam. cum aceto trita illine. Aliud. Salis ammoniaci drachmam unā. nitri drach. unam. utrunq; torrefacito, acetoq; rigata ter in die illinito, loco prius cum nitro præparato. Aliud. Amygdalarū amararum testarum obol. iij. pumicis obol. ij. salis ammoniaci obol. iij. similiter illine ex aceto. Aliud.

Piper, muscerdas, ueratrū albū æquali pondere

cum aceto illine. Aliud. Squamā stomomatis ferri cū aceto & modico oleo illine. Aliud. Loco cum per pumicē proritato, & sulphuris, spumæ nitri, ammoniaci singulorū æquas partes mixtas cū aceto illinito. Aliud. Alcyonij drach. i. sulphuris uiui drach. vi. muscarū ad ariditate torrefactarū cyathum i. muscas per se terito itemq; sulphur, alcyoniū uero aqua coctū unā cum siccis leuigato, selle suillo ac aceto paulatim affusus usquequo strigmento sum reddatur. Deinde axungia à rotis derasam, & manu emollitā ut emplastri forma cōstat misceto, & præraf alopecia ac rubrificata pharmaca cum optimū cōfidenter illinito. Aliud. Alicam aceto maceratā terito, & pauculo succo cyrenaico adiecto, præficato loco illinito. Aliud. Loco præficato ac scarificato caricas affatas cū passo cataplas matis modo imponito. Aliud. Passum illinito, ac deinde ferulam ustram inspergito. Quæ deinceps sequunt duo pharmaca admiranda sunt, & uerbis eius qui ea prodidit inscripta ad alopecias, caluiciē, raritate capillorum ægre curabilē in capite, in mento ac supercilij. Pilorū urfi unci. radicis calami unci. vi. filicis cum radice quadrantem ac uncia dimidium, castanearū hispidi corticis quadrantē, lanarū succidarum q; pinguis simarum sextantem. capita muscarū numero xxxvi. muscas v. capitibus reiectis. Omnia in nouā ollam indita in furnum mitto, deinde cinerē ipsorum terito. Habeas autem in uino Aminæo prius tritaladani unciam unam. myrrhæ unci. unā. adijciturq; olei ueteris sextans, & cedrinū unci. una, malabathri sextans; deinde inspersis aridis tritis medicamentum recōde, atq; ubi linteolo alopeciam præficaueris, deindeq; aut cepa aut scilla uellicaueris, aut fici folio lente exscalperis, pharmaca ipsū illitu affrica. Insequentibus uero diebus lotum rigido ac aspero linteolo cōfricato, atq; hoc modo illinendo usq; ad menses duos progreditor. Quod si amplius in hac curatiōe perseveraueris, etiam caluiciem ea perfanabis. Ad caluicetes præter tatem remedium. Adpis taurini insolati libram unam. adarces unci. unam. succi thapsiæ sesquunciam, alij uncia dimidium habent, myrrhæ bonæ unci. unam. polytrichi lib. dimidium, callitrichi lib. dimidium, membri alinini lib. unam. splenis alinini lib. unam, ladanū tantundem. Ego ladanum in uino modico maceratum contriui; adipem uero aquæ uapore liquefeci, deinde asini membrum asatum donec infumatur radito; splenem uero cum callitricho & polytricho in noua olla torrefacito, contusisq; quæ contundi possunt ac cribratis, omnia gleucino aut sabino excipito, & ante balneum uitior capite prius pectinato. Manifestū uero est quod eadem pharmaca etiam ad menti pilos non enascentes conducunt. Aliud. Fœni græci sextarios quatuor. seminis lini sextarios duos. ladanū besslem, succi acaciæ sextantem. folij malabathri sextantem, gallas numero xx. onychis aromatici sextantem, calami Syriaci sextantem & unci. dimidium, alij unci. unam habēt, bdellij sextantē, myrti ustræ sextarium unum. musci, quæ alij splanchnon,

alij bryon aromaticum uocant quadrantem: iridis astragalitidis, alij illyricę sextantē. Singula per se confundito, ac per cribrū arctius excutito, & dein ceptus præscriptum est misceto. Vñ uero experiente, pharmaci tertiam partem, aut quantum sufficit, in æreum aut testaceum uas coniicito, deinde uini Italici odorati tantum ut liquidum reddatur ammisceto, atq; ita prunis impostum donec se mel ebulliat cum lignea uirga agitato, animaduersione habitata cõburatur. Post uero illines ægro in aquā desiderare iussō, sensimq; in folio sedenti affricabis, ac pro more capite ex aqua persuso pharmacum abluēs. Deinde uentem staphidem sylvestrem per se usam ac cribratam, post quartum usus diē pharmaco ammisceris, similiterq; coques, eodemq; modo illines, parce tamen ac caute ne in oculos destillet. Vngento autem à balneo uteris, olei myrti libra una, cum ladanī trientē contrita. Consians & certa est pharmaci huius facultas, neque citra effectum dilabitur.

11 Aliud ad eadem. Pericalamitidis unc. i. myropissocę, fordīs pilorum barbæ hircinæ utriusq; unciæ dimidium. adipis infantis informis libram unam. succi foliorū dionysiaci tenerorum. succi foliorum ladanidīs tenerorum, succi callicereos. succi herbæ uerbernæ. succi foliorum calami, singulorum cyathos sij. cynomori, herinaciorum marinorum uisorum, utriusq; sextantem aut amplius si melius reddere pharmacū uelis. acanthionis terrestris coniūctum. Hæc omnia ad plures dies in pila plumbea terere oportet, donec omnia probe leuigata uiuantur, atq; etiā donec à pila quapiam detritum eis accedat. Vt ere loco contente ex crudo linteolo ex lino præfricto, ac deinde cū altheæ siue hibisci radice deterfo, illinito. Hoc pharmacū e modo scriptum reperit Claudianus amicus noster in libello ex membranīs cõtexto, eo qui pharmaco usus fuerat uita defuncto. Multi autem faciebāt eius possessionē, propterea quod duos quosdam calliceres iam incipientes ex eo curatos cõspexisset ita ut neq; ulterius caluicies progredere-tur, ipseq; denudatus locus pilis densus redderetur. At uero nos hoc ipsūm obscure & cõfectura liter scriptum nacti, singularim considerabamus quid tandem singulis significaretur, quumq; iam hoc, iam aliud mente cõciperemus, per magnā experientiam tandem nos ueritatē reperturos sperabamus. Verū in præsens quidē quod sentimus scribamus, scripturæ etiā in posterū si quid experientia cognitū repererimus. In præsens autē pericalamitidem, calami corticē dici putamus. Nam & aliās ipsūm eiusmodi affectionibus conuenire scimus maxime usum, nouimus itē alios ex eiusmodi pharmaca cõposuisse, quapropter credibile est quoniam cortex calamo circum adhæret pericalamitin ipsūm appellari. Potest autem etiā id quod ab aliquibus simestrum, ab alijs adarce & adarcium dicitur, pericalamitis appellari, propterea quod calamis adnascat. At uero myropissoce-rum picem & cerā dici æstimamus ungento quo-piam ad huiusmodi affectiones cõgruenti eliquata,

Galen.

uelut est gleucinum & laurinū, nardinum, lentiscinum, sesaminum & cedrinum. Ceterum barbæ hircinæ sordes statim nobis uisæ sunt de ladanō dicitę esse: nam ad hæc affectiones conuenire in confesso est. Et sanē generatio eius circa mētum hircorum in quibusdam locis contingit, quod ipsūm & Rurphus Ephesius per hos uersus indicat: Inuenias in Ereborum quoq; ladanon orbe Caprarum circa mentum, gratissimus illis Succus is ē cisthi folio decerptus amico. Imbuti hoc uilli menti laterumq; madescunt, Non tamē ad morbos hoc præstat laudē ab odore Egregio quo spirat habet, quod plurima mixta Pharmaca Erembi habeant diuinis uiribus aucta, Orta solo & campo longe lateq; patenti, An quidem igitur hoc solum ladanum is qui phar-macum composuit iniicere iubet non satis manifestum est: possibile est autem per unam speciem totum genus ab eo designari. Porro infantem informem uidetur mihi uisam dixisse. Vrsam enim parere aiunt informem quandā uelut carnis molem, uerum post per linctum matris animal formari ac effigiari. Dionysiacū autem uitem mihi dicere uidetur, quanquā & de hedera dici posse aliquis opinari queat. At uero quod ladanidem laurū appellet nemini puto dubium esse. Calliceros autem sœ-nem græcū appellare uidetur; nominatur autem hæc planta apud nos in Asia Aegoceros. Cynomorum deinde rubum canis uerisimile est dici. A-canthiona autē postremo terrestrem, herinacium terrestrem appellatum ab eo existimo.

De defluuij capillorum. Cap. II

Est & alia pilorum affectio quæ ad raritatem cutis, inopiamq; substantiæ pilos generantis lasciuiscit. Quapropter etiā curatio hoc modo lasorum, non eundem scopum quem alopecię habet: in alopecijs enim ut uicitatus humor confirmatur, intentionem summam ac primarium scopum habemus. In his uero ut capitis habitum roboremus, & boni succi allationem procuremus, cutemq; ad densitatem ac raritatem moderatam reuocemus. Quam ob rem sanē ad pharmaca humectantia aliquid moderate adstringens ammiscere oportet, quale est ladanum, quod utraque in se moderate complectitur quæ ad hoc symptoma conueniunt, caliditatem uidelicet mediocrem, & astringendi uim iuxta eandem proportionem. propter hoc ita que oleo mixtum quo illini possit, symptoma, siue accessione defluuij capillorum sistit. At uero manifestum est capitis fricionem necessario huius pharmaci usui præmitti, & multitudinis pilorum refectionem, aut si anni tempus id fieri permittit perfectam ablationem. Ita enim in affricu & illitu robusta & calida reddetur cutis, & moderatam densitatem acquirat, eam uidelicet quæ fecundum naturam est. Consueuit autem hæc circa pilos oblatio sæpe his qui agrotarūt accidere. Raro autem citra morbum, & magis sanē diæta salubri & uires reficente opus habet. Multiq; citra medicamentū perfecte sanati sunt, atq; id breuī. Composuerūt tamen medici eius gratia pharmaca mo-

tom. 5

u 3 dera

deratam densitatem cuti inducentia, ita tamen ut ne simul eam refrigerent: quæ enim uehementer adstringunt, omnia etiam refrigerant, & alimentum influxum reprimunt, propter cuius inopiam capilli defluunt. Intentio itaque medicamentorum est sanguinem affluentem non solum non præpedire, sed etiam prolecare, cogere autem sensim & adstringere rarefactam cutem. Tale autem sponte naturæ est ipsum ladanum, quod quia ceræ similem compagem habet, largo aliquo cõuenienti liquore indiget, quo capiti illini possit. Præstat igitur huiusmodi liquore similem ladano esse, hoc est, ex contrarijs facultatibus mixtum, adtractoria nimirum & coactoria. Nequaquam ergo oleum Sabinum aut uetus aut Cicinum ad hanc rem aptum fuerit, sed in Hiberia aut Hispania, aut quomodocumque tandem appellare uelis, natum. Habet enim & adstrictorium quippiam, atque amplius adhuc eo lentiscinum, sponte naturæ tale existens, quale est ipsum ladanum. Quare neque expertus sum, neque mente concipere possum, ullum præstantius pharmacum fore ad defluos capillos, quam est quod ex ladano & lentiscino oleo permixtum constat. Manifestum autem est quod raso quidem cuiquam, crassius admouere medicamentum oportet: ad ipsam uero cutem præfectos & attonfos habentibus pilos, liquidius. Quod enim comam alere non oportet priusquam quis curetur, euidens puto. Quod si uero large defluant capilli, & coniectare possis multam raritatem cutis capitis factam, non ineptum fuerit in præfens myrteum oleum pro lentiscino ad ladanum ammiscere. Licebit etiam aliquando unguentum nardinum adhibere in ætate frigida, & tempore hyemali. Bonum autem pharmacum ad omnia est dilutum sceminarum unguentum, quod Romæ uocant foliatum. Non minus autem eo commodum est, imò magis quod appellant Spicatum. Quare cum his uel solis diuites ungi iubeto, & cum optimo nardino. Ladanum uero in duplo uase liquefacto, & liquefacto unã cum nardino ex prædictis preciosis unguentis quodcumque ad manum fuerit ammisceto. Atque hæc quidem medicamenta misisti suffecerunt unã cum resectoria ac salubri diæta, quæ in plerisque etiam sola sufficit. Composuerunt autem, ut dixi, quidam ex prioribus medicis pharmaca ad defluos capillos, in quorum relatione ubi inuicem dissentiat exponam. Primum autem referam compositiones ab Hera scriptas, quarum priorem quidem laudo, posteriorem uero curiosam & præter rem auctam existimo. De priore uero ita scribit.

Compositiones pharmacorum ad defluos capillos ab Hera scriptæ.

Hera in serula duo subscripita pharmaca habet, iuxta hanc ipsam dictionis ipsius seriem, ad hoc ut capilli in capite ne defluant: Ladanum in uino austero rigatum terito, & oleo myrteo ac uino uicissim affuso ad mellis crassitudinem redigito. ex eoque ante & post balneum, caput illinito. Præstat autem & polytrichon quod quidam Adiantum uocant, dimidia ladani portione adijcere, & cum myrteo aut nardino uti. Hæc de priore compositione

loquutus Hera, deinceps hæc scribit. Compositio olei ad defluos capillos, quæ & nigros eos facit. Intra calendas & Idus Iulias, nuces uirides centum tundito, eisque olei primarij sextarium unum affundito, & aluminis liquidi libras iij. Hæc simul in uas nouum testaceum præmadefactum indito, idipsumque quam diligentissime oblitum, in loco neque humecto nimum, neque calido reponito, & per menses tres sub terra situm finito, deinde aucto oleoque utitor. Hæc ipsa secundi pharmaci est descriptio, quæ plus quam conuenit ipsum pharmacum adstringens reddidit. Quapropter ut uehementem adstringendi uim ipsius corrigeret is qui primus hoc pharmacum composuit, defodere ac uelut putrefacere ipsum iussit, inde nimirum magis tenuium partium reddere in eo commixta conatus. At uero tale pharmacum in tempore, regio neque ac natura corporis calidis commodum fuerit, adeo ut in contrarijs non tutum sit tali uti. Etenim perfrigeratas eius usum mulieres uidi, ut inde in grauedinem ac raucedinem defluxumque a capite ad fauces delaberentur.

Quæ Archigenes ad defluos capillos conscripsit.

3

Archigenes in primo libro pharmacorum secundum genus ad defluos capillos in hæc uerba scripsit: Ladani & absinthij æquales partes, & iuniperi bacchas decem tritas, in linteolum illigato, et in oleo per dies quinque macerato, ex eoque caput illinito, & neque capilli defluent, neque surfures habebunt. Aut dum capillos pectis, adiantum cum myrteo aut rosaceo oleo adhibeto. Aut adiantum, myrti nigrae æquales partes, gallæ duplum, cum oleo ueteri, aut lentiscino, aut myrteo, ad mellis crassitudinem redige ac utere. Aut thus & misy, & gallam, & adiantum, æquis partibus cum uino maris experte ad mellis spissitudinem in sole terendo redige. Aut molliter cocta donec nigrescant, deindeque cum oleo ueteri, aut lentiscino, aut myrteo mixta in usum adhibe. Aut brasicam aridam tusam cum aqua impone. Aut loti radicem eodem modo.

Quæ Cleopatra in libro de ornatu scripsit.

4

Quæ Cleopatra in libro de ornatu scripta sunt, illius ipsius uerbis sic habet: Ad capillorum in capite generationem, calamosum tenerorum radicem tusam exuccato, & casusque in ollula torrefactis succo admisceto, & adipem ursinum ac oleum cedrinum in unum trita ac unita, ipsidem addito, & ad illinendum exhibeto. Quo uero odorem obtundas unum aut passum affundito. Aliud. Non longe post præcedens his uerbis conscriptum: Quo capilli enascantur lini semen siccum unã cum calamo suo exurito, tritumque cum oleo sesamino illinito. Aliud paulò inferius scriptum hoc modo: Ad defluos capillos terram cimoliam solidissimam uino austero & mororum succo, tanto quantum combibere potest, rigato, eisque hyofcyami tenuissime triti acetabulum adijcito, indeque passillos formato quos in umbra siccatos in uas figillum nouum reponito. Vsu uero postulante aqua dissolutos illinere iubeto, Deinde quæ exauerint per dies quinque eluito, rursusque illinito. Facit ite

ad faciei & colli impetiginas. Aliud, Capillos augens cito, densansq; ac denigrans. Ladanū cum oleo & uino dulci leuigarum ac crassifacium præfrictis illinito. Non longe quoq; postea aliud pharmacum scriptum est his uerbis. Ad defluuiū capillorum citra morbu accidens. Brasīcam aridam trita ex aqua impone, aut loti radicē eodē modo.

Quomodo comptoria ab exornatoriā medicīne partē differat. 5

Comptoria quidem scopus est, ut pulchritudinem ac utilitatem inducat. Exornatoriā uero medicīnae partis, ut quicquid secundum naturam est id omne in corpore custodiat, ad quod consequitur etiam naturalis pulchritudo. Indecoro enim aspectu est caput alopecie uitiatū, uelut etiam oculi pilis palpebrarum denudati, similiterq; superciliorum capillorum defluuium. Non solū uero ad pulchritudinem, sed multo prius ad ipsam partium sanitatem capilli ipsi conducunt, quemadmodum in libris de usu partium est demonstratum. Quid attinet autem dicere de lichenis, aut psora, aut lepra, quum præter naturam talia existant. At uero faciei colorem per pharmacā nitidiorē aut rubicundiorē facere, aut pilos capitis crispōs, aut sulcos, aut nigros, aut quemadmodū mulieres solēt, in longitudinem auctos, hæc ipsa & quæ huiusmodi sunt comptoriā malicie existunt, nō medicæ artis opera. Verum propter societate quanda quam cum illis habent, quandoq; ad regiarū scēminarū, atq; adeo ipsorum regum imperium, etiam comptoria adiungimus, utpote quum his negare non liceat, docendo tamen comptoria ab exornatoriā medicīnae parte differre. Quapropter usum est mihi ea quæ Crito scripsit pharmacā capillos conferantia, eosdemq; augētia, ex primo illius de ornaturilibus subscribere.

Quæ Crito ad conseruandos et augendos capillos scripsit, itemq; quæ ad defluuiū ipsos præseruent. 6

In primo libro Exornatoriorum statim in principio post præfationem Crito hæc uerba scripsit. Ad conseruandos itaq; capillos subscriptis compositionibus utendum est. Heraclidæ Tarentini conseruatoria capillorum. Frenij florem cum oleo tritu illine, idem etiam eos denigrat. Aliud.

Ladanum uino austero maceratū ac tritu oleo myrteo excipe, eoq; pilos ante balneum subline.

Aliud. Verbenacam rectam appellatam unā cum radicibus arefactam contundito & per angustissimū cribrū concernito, deinde oleo ammixto ut firamenti crassitudinem accipiat, uas æreum reponito, atq; ubi cōputruerit, pro oleo similiter uitior. Aliud. Ladanī partes duas, polytrichi quod quidam Adiantū appellāt, partem i. uino & oleo myrteo excipe ac utere. Nos autem pro myrteo nardino usi sumus. Aliud. Quod ipsum & subnigrōs reddit: Baccarum myrti nigrarū quadrante, ladanī tantundem, dissoluta cum acaciæ fructus, hoc est, sili quarum ipsius spinæ appellatarum, decocto contere: utq; ubi limi crassiciem acceperint, nardino, aut myrteo, aut aliquo alio he-

dyssmate excipe. Aliud. Vnguentum conseruans pilos, quod ipsum etiam subnigrōs reddit. Baccarum myrti nigrarum sextarium i. feminis apij sextarium unum. feminis betæ sextarium i. ut gultorum myrti sextarium i. adianti sextarij dimidium, ladanī tantundem. uini nigri sextarios sex. usquequo penitus dissoluantur coquito, atq; ubi tertia pars superferuerit, olei cuiusdam aut hedyssmatis sextarios ij. aut iij. addito, rursumq; coquito. Vbi uero bis aut ter ebullierit, liquorem exprimito ac diligenter per saccum excolatum in hydriam recondito. Vsu uero expente in præfatis penitus uitior, illitis ex eo bis per diem capillis. Aliud.

Palsi cretici sextarium i. ladanū unc. i. corticis nucum pinearum usui sextantem, polytrichi usui unc. i. adipis ursini libram unā. succi betæ cyathos tres. Ladanum & passum donec cogantur in unam cōpagem coquito, deinde reliqua inijcito, & sublata in uas plumbeum seruatō. Vsu aut tempore quantum sufficit in quocunq; uelis hedyssmate diluito. Vsu eius debet esse quotidianus, quidam uero raro capiti pharmacum illeuerunt nullo hedyssmate diluito. Aliud. Ladanū unciam i. palsi sextarium i. corticis nucū pinearū usui drach. ij. alij selquidrachmam habent, spongiam marinam usitam tritam unam. Panniculi Cilicij usui triti cyathos iij. polytrichi usui triti cyathos ij. adipis ursini lib. i. coquito & apparato ut dictum est. Aliud quod pilos cōseruat, & defluētibus quoq; auxiliatur. Seminis apij sextantem. callitrichi sextantem. thuris sextantē. nucis iuglandes numero xv. ladanū sextantem, corticis nucis pineæ lib. i. Omnia in nouā ollam coniecta, & cum argilla probe obturata, in balnei fornace affato, deinde extracta terito, & adfecta adipis ursini libra una subigito, & in pyxide siliacea reponito. Vsu uero expente quantum uelitis uidebitur ex pharmacō accipito, ac quocunq; uelis hedyssmate conuassato, ex eoq; caput bis in die illinito. Quidam uero capite rasō pharmacum illinunt cum solo adipe ursino subactum. Aliud ad caluitiem quo usus est Andromachus tumor. Leporum uentres sex accipito, probeq; siccatos in testaceo uase torrefacito, ad eosq; baccarū myrti quadrante & uirgultorum eiusdem tantūdem consicito, indeq; adianti quadrante addito, omniaq; simul attente torrefacta tundito, ac per angustum cribellum excernito, deinde adipis ursi ac phocæ aquis partibus adiectis subigito, ac emollito, sublaturū pharmacū in pyxidem plumbeam recondito. At uero ubi usus tempus initerit, quocunq; uelis hedyssmate ipsum diluito, ac uitior. Atq; de his quidem hætenus.

De tinturīs capillorum. Cap. III

Quum uero post præscripta pharmacā Crito alia quædam scribat, quæ quidem conseruationem capillorum promittunt, uerum primum ipsorum opus est ut tingant ipsos, quo siue nigri, siue flaui reddantur, usum sane est mihi in principio ea relinquere, quum omnia talia manifeste comptorij generis existant. Quandoquidem haud scio quomodo dogma commune inoleuerit, ut uetula scē-

minæ capitis capillos denigent, tanquam turpe sit canos habere. atq; hoc ipsum etiam maritis probatur, qui onerosum esse aiunt, aniculam uxorem cano capite habere. Quæcunq; quidem prædelictis seipsas ornât, harum nulli tale quippiam à me petenti exhibui. Quæcunq; uero honesti respectu, quo notæ culpam effugerent, & importunitatem maritorum uitarent, pilos suos nigros reddere cupierunt, ne tamen ex adstrictoria uî nigrore inducentium oblæderentur, illis consuluî cedria usum, ita ut tribus aut quatuor horis ante balneum illinirent, & postea detergerent, idq; per quatuor aut quinque dies facere pergerent. Ad hoc enim quod nihil lædit, amplius etiam commoda est eis quæ facile à frigore offendentur. Nimirum pharmacum existens cedria quod abunde calefacit. Oportet autem ipsam citra olei ammixtionem adhibere capitibus uehementi resiccatione & calefactione indigentibus, quibus scilicet humidâ & frigida intemperies per se inest. Alijs uero oleo mixtum adhibere pharmacum oportet. Quin & defluentes capillos corrigit, & nō defluentes auctio res reddit. Cæterum odorem eius uisunt delicate mulierculæ, qui sanè non iniucūdus est his quæ in eius usu aliquandiu perseuerarunt. Porò in Asia apud nos agrestes mulierculæ montana incolentes, non cedria solum illinuntur oleo permixta, tum capite, tum reliquo uniuerso corpore: sed & picem liquidam cum oleo eodem modo permixtam, ad radices capillorū capitis illinunt, uocantq; hoc cōpositum pharmacū pisselæon, hoc est oleū picatū, quod omnino aliud est ab eo quod pissanthos, hoc est, flos picis appellatur, quod ipsum liquidâ picis incumbit & superstat, tenuium magis partium q̄ ipsa pix existens, tum compage, tum etiam facultate. Huiusmodi itaq; pharmaca tarde canescere faciūt, nulla uentium obarsione. At uero quæ ex austeris & acerbis composita sunt, magnopere lædunt. Cæterum materiâ ex qua consunt hæc, adstringentis qualitatē ac facultatis existentē, etiam quippiam tenuium partium habere oportet, quo non in superficie tantum, sed & in profundo cutē permūtent, usq; ad locum radicum capillorū progrediendo. Atq; hæc quidem est Methodus componendī ea: habes autem in simplicium pharmacorum tractatu particulatim materias ipsorum, in quibus facultates & qualitates earum dictæ sunt, quapropter ex illis tum ea quæ iam à prioribus cōposita sunt iudicare ac quali nam uî prædita sint in uentire potes, tum etiâ per te ipsum de integro noua componere. Vtile autē hoc est & ad cognitionem affectionum quas iam incurrerūt aliqua mulieres, & ad futurarum præuentionē, præsentiumq; sanationem. Non solum enim in periculo ueratas sæpe scio sceminas, sed & mortuas, ex perfrigeratione capitis per huiusmodi pharmaca inducta. læsio autem eis maxime accidit, aliquando quidem in stupore attonitum, aut comitiale, aut ueterinum, aut soporem profundiorē, aut animi apprehensionem, Catalepsin Græcis appellatam, delibentibus: aliquando uero destillationibus indiffo

lubilibus apprehenduntur, ut inde etiam pulmo afficiatur, & tabes ex eis consequatur. Offenduntur autem citius quæ frigidius temperamentum capitis habent, tardius uero quæ calidius. Frigida enim particulæ frigidis affectionibus, calidæ calidis facilius corripuntur. Atqui periculum minus subeunt, utpote quum à minore causa lædantur, quæ frigidius temperamentum habent. At uero calidæ propterea quod agere & uix tandem à frigidis causis lædi possunt, quum sanè à magnis causis fuerint exuperata, maiorē læsionē incurrūt, quæ cōmuni & uniuersali rationi subiacet, in Aphorismis ab Hippocrate relatæ. In morbis minus periculum subeunt ægotatēs, quibus congruus natura, ætati, habitui, ac temporis adfuerit morbus, quam quibus nihil secundum hæc ipsa congruerit.

De pharmacis capillos denigrantibus.
Archigenis. 2.

Paulo antè dixi quòd non ex mea sententiâ me dicus eiusmodi pharmaca cōtrectat, Verum quæ regię aliquando scemina, quibus minime negare licet nigros aut flauos capillos reddere expectant, eam sanè ob rem etiam Archigenem puto, quam honestissimum uirum, de illis scripsisse in hæc ferè uerba. Denigrant capillos hæc. Radicem capparīs tritam cum muliebri lacte, aut ut alijs placet alsinino, ad tertias coquito, & adnotem per cataplasmatem imponito. Aut urina canis in quinque aut sex dies adseruata lauat. Aut corticem radicis ilicis donec mollis fiat coquito, eumq; cataplasmatē modo imponito, cum aqua uero decocti lauat. Aut quod in anemona intrinsecus nigrum est, cum oleo myrteo tritum affricato. Aut spumam argenti, cimoliam, alumē liquidum, pari mensura prælotis & siccatis capillis in noctem illinito, & betæ folijs superne obligato. Aut selinistam terram, argenti spumam, calcem, cum aqua ad mellis crassitudinem redige, & capillo ex lxiuio liquido præloto illinito, similiterq; betæ folijs impoſitis obligato. Mane uero distentos pilos defricato. Aut ablinthiū, oſsiū palmarum syriacarum, fabarum ægyptiarū, omnium ustorum cinerem pari mensura cum uino Mendefio ad frigitenti crassitudinem redigito, & cerato myrteo liquido ammixto affricato. Aut corticis salicis succū cum oleo affricato, Summe denigrat. Aut nodos ad racemorū similitudinē ex arbore nucē enatos coquito, & bitumine liquido ammixto utitor. Post prædicta etiâ hæc Archigenes adscripsit. Denigrant barbæ. Suber aridū, & plumbū uſtum cū betæ crudæ succo mellis spissitudine illita. finito usq; ad prandiu, deinde abluto. Aut ferri retrementū ac plumbū in aceto cocta ad tertias, illine citra oleū. Post hæc Archigenes ex cōpriora dānata arte accepta hæc scripsit. Fuluos aut reddunt capillos lupini crudi cū aqua & nitro illiti. Flauos ac crispōs pilos reddentia. Crispōs autē reddes capillos li spuma salis cum myrrha confricaueris. Aut succo carpassi illine, & manebūt crispī ac nigri. Aut myrti baccis ac betæ semine æquali pondere cum oleo tritis utitor.

Aut alphodeli radice cum mero illine. Aut lupinorum cortices ac parum nitri in aqua ad quadratum macerato ac uitior.

Capita Critonis de ornatu, librorum quatuor. 3

Horum pharmacorum mentionē ob id feci ut ostenderē necessariō quosdā etiā honestissimos uirorum talium sibi comptiorum experientia parare. Quando enim Archigenes hæc scribere nō est ueritus, multo amplior uenia Critoni danda est, qui in Imperatoris ædibus uel medicatus. Apparet autem & Heraclidē Tarentinum multa & probata pharmaca cōptoria speculatiōis scripsisse, quanquā nondum tantæ deliciae foeminas occuparet, quantæ nunc sunt. Verū quæ Heraclides, & Cleopatra, & quicumq; alij post ipsos interiecto tēpore medicis scriperūt, ea omnia Crito coaceruauit, ad quem sanē remitto eos qui quomodo capilli nigrescant aut flauescant, & alia huiusmodi, discere uolunt. Scripsit enim quatuor de ornatu libros qui in omnium manibus uersant. Quid igitur ego nunc ipsa frustra trāscriberē: quū possint ex illo discere qui ad eō ea cognoscere uelint. In primo quidem libro omnia quæ ad capillos pertinent statim in principio scripta sunt, reliqua uero deinceps iuxta proprium quodq; ordinem. Quo itaq; facile inuenire quæ sit singula talium pharmacorū absq; longa inuestigatiōe, uisum mihi est capita singulorū librorum indicare. In primo itaq; libro capita hæc sunt.

PRIMI libri Critonis de ornatu Capit. Conseruantia capillos. Augentia capillos. Præseruantia capillos. Tincturæ canorum. Tincturæ flauos & auricolores capillos reddētes. Smeigmata capillorum. Illitiones præseruantes. Faciendæ erugantia. Illitiones faciem nitidam reddentes. Cataplasmata faciem nitidam reddentia. Superciliorum illitiones. Supercilia denigrantia. Oculorum illitiones. Illitiones exstibio. Ad graueolentiam narium. Dentificia.

Manducationes. Ad fetorem sub alis affricationes. Manducationes ad fetorem oris. SECUNDI libri capita. Quæ nigredines collis repurgent. Illitiones ad exudationes sub alis. Illitiones mamillas conseruantes. Ventrē purgantia. Smeigmata manus nitidas reddentia. Ad nigredines à partu. Ad rugas à partu. Ad fistulas à partu. Illitiones ad eminentes umbilicos. Quæ pueros impuberes cōseruant. Quæ uirginitatem conseruant. Ad humectas & frigiditas mulierculas. Ad cicatrices negras. Pilothra capillorum. Smeigmata attenuantia pilos omnis generis. Illitiones capillos disperdentes. Smeigmata totius corporis. Repurgatoria nitorem inducentia omnigena. Conspersiones aromatica uestium. Odorata tincturæ uestium.

Aspersiones thalamorū & ambulacrorū. Suffimentorū omnigenorū compositiones. Illitionum & ungentorū omnis generis compositiones, uidelicet amygdalini, balanini, nucum, sesamini, myrtei, lentiscini, laurini, rosa cæi, gleucini, melini, cenanthini, sampuchini, telini, fusini quod aliqui crinū, hoc est, liliaceū appellant, cicini, irini, nar-

afisini, phœnicini, cyprini, crocini, nardini, amaracini, hedychroi, mendefii, malabathrini. TERTII libri Critonis capita. Ad furfures omnigenos. Ad capitis eruptiones. Ad achoras, hoc est, ulcera manantia. Ad pediculos & lendes.

Ad alopecia. Ad scabiosas faciei affectiones.

Ad lentigines. Ad maculas à sole prouocatas. Lotiones faciei. Ad stigmata. Ad liuentia. Ad fugillata. Ad uaros. Ad pustulas non esse erumpentes. Ad mēti tubercula. Ad mentilichenas, lichenum illitiones. Epithemata excoriatoria. Emplastra uiridia quæ ab excoctatione imponuntur. Emplastra alba ad cicatricem inducentia. Pharmaca emollientia quæ lichenis affricantur. QUARTI libri capita. Ad alphas, id est, uirilgines negras & albas. Ad cicatrices negras. Ad leucas, hoc est, uirilgines albas insidentes. Ad lepras. Ad unguis scabiosos. Ad pruriginosas affectiones. Ad tubercula parua plidracas græcis appellata & ad excoctata. Ad serpiginosas affectiones. Ad scabies.

Ad thymos uerruca genus. Ad uerrucas. Ad fornicarias uerrucas. Ad umbilici inflationem. Ad intestinorum delapsionem. Ad hydrocelas. Ad apellas. Ad procidentes anos. Ad chimeta hyemis tempore oborta ulcera. Ad rimas pedum. In his quatuor libris Crito diligentissime omnia fermē exornatoria pharmaca scripsit, appositis etiam comptioris quæ spuriam pulchritudinem non ueram inducunt, quapropter etiam ego ea relinquam. Solumq; mentionem eorum faciam quæ pulchritudinem secundum naturam conseruant. Quanquam enim uel maxime cognita habeam smeigmata corpori nitorem inducentia, itemq; quæ in uirginibus mamillas conseruant, & quæ impuberum puerorum testiculos ad multum tempus paruos conseruant, similiter & quæ pilorū exortū cohēbent, uerecundor tamē eiusmodi scribere, atq; multo magis eas quas Crito tradidit conspersiones uestiū aromaticas, odoratasq; uestiū infectiones & aspersiones thalamorū ac ambulacrorū, Suffimentorum item omnis generis uarietates, illitionumq; & ungentorum. Extra enim medicinarū documenta talia existunt. At uero ubi decoris secundum naturam cōseruatiua scripsit, si quando locus ita tulerit ea referam, ac primum quidem quæ circa capillos medicis utilia mihi uidentur, docebo.

De pharmacis pilos corrumpentibus. Cap. IIII

Quemadmodum ex pharmacis quæ pilos auergent, alia medicis usus, alia comptorijs existunt. Eodem modo & quæ ipsos corrumpunt. Aliquando enim & his medicis necessariō utuntur iuxta triplicem eorum differētiā, Nempe cum quædam ex eis proprie pilothra appellantur, alia Attenuatoria capillorum, alia uero ipsos penitus extirpantia. Hæc itaq; postremo loco nominata periculosi sunt usus, Ex eis enim illitæ corporis partes, non solum in posterum depiles omnes penitus redduntur, sed & usque ad caput, & mentum, superciliaq;

& palpebrarum pilos nuditas ipsa procedit. Reliqua uero dux differentia usum minime periculosum habet. Et quæ quidem pilorum denudatoria sunt, & proprie, ut dixi, pilothra uocantur, tantum non quotidie in omnium muliercularum, sermè etiam quorundam uirorum, usu habentur. Altera uero quæ tenuiores pilos reddūt & minores, eis conueniunt quæ duros & magnos, multosq; & crassos pilos habent, & ob id suillis non absimiles existunt. Cæterum hæc ipsa secundum excessum & defectum inter se differunt, quum unum genus sit pharmacorum quod in hunc usum compositū est, nimirum eorum quæ erodentem, & uisoriā habent facultatem: præstant autem erodentem facultatem habentia, quod minori periculo admoventur; periculosiora autem quodammodo sunt uisoria, quæ si quis paulo negligentius adhibeat, bullas excitant, & exulcerant, & aliquatū cutē exurunt. At uero particularum eorum sylvam omnem in commentarijs de simplicium pharmacorum facultate tradidit, Sed tamē exempli gratia ea quibus assidue utor recensebo. Ex liquidis igitur est lixiūtum tali ut præditum, Ex aridis autē & metallicis arsenicum & sandaracha, & calx nō extincta, quam plerique utiā, Græci uero etiam solis asuesti nomine appellant. Manifestum itaq; est uehementem ipsorum uim per ammissionem imbecilliorū pharmacorū tum liquidorū tum aridorū frāgi, quorū congruentē mixturā modū coniecturaliter primū faciet uirū eorū expertus. Deinde uero per experientia defectū corriget, aut etiā addet. Quo uero etiā eorū quæ per experientia iudicata sunt notitia habeatis adscribam ea quæ in primo libro de ornatu à Critone sunt relata, ubi prius ostendero etiā medicis sæpiuscule ipsorum usum necessarium esse. Quemadmodum tincturas expentibus, honeste negare possumus, ut quæ cōporijs sint molliciei, Sic depilatoria negare minime licet. Si enim moderatos quispiam habeat capillos, nō subseruiemus ipsi ad superfluas delicias. Si uero multos & longos durosq; habeat, honestum esse uidetur & rationabile ipsos pauiores, & tenuiores, mollioresq; ac rariōres facere. Contingit autem aliquando necessitas, ut eis qui multos & alte nixos, non tamen duros habent, in totum pilos tollamus, quādo aut picatione opus habet totum corpus (quandoque enim hoc presidio iuxta medicina rationē utimur) aut quando pharmacum Emplaston, hoc est quod meatus obducit, imponere uelimus; tunc enim necessario à parte pilos prius tollimus, quod quidem per nouaculam facere licet. Quisdam uero siue reuera siue fide nouacula timorem consentiant, quoniam periculum sit ex ea cutem lauciari, Quisdam autem non citra rationem forsasse metuunt, maxime quæ partes gutturis radi oportet, Quapropter necessarium est medicum etiam huiusmodi pharmacorum experientiam habere, tum quod ad compositionem, tum quod ad usum attinet.

Pilothra à Critone hac uerberorum serie conscripta. 2

Pilothra capillorum; auripigmenti auricoloris

A scrupulos viij. aut x. calcis uiuæ tantundem, amyli sextantem, terræ quæ Romanis Selinuisa appellatur unciam unam. Omnia trita & per angustissimū cribrum excussa reponito. Vfus uero tempore ex pharmaco quod sufficit acceptum aqua conquesato, deinde illinire iubeto ac animaduertere ne exurat. Aliud. Euestigio leuem reddit; Calcis uiuæ partes ij. auripigmenti partem unam. hæc in mortarium plumbeum coniecta, aqua aut pitifane succo affuso terito, atq; ubi nigra reddentur, calefacta illini maxime in balneo iubeto, leue enim corpus reddunt. Quod si uero tenuis capillus enascens subeat, calcem coquito, & auripigmentum cum aqua terito, & in uas fictile non picatum coniecta coquito, atq; ubi coacta fuerint, nigraq; reddita illinito. Paridis saltatoria pilothrum, Statim pilos auferit; Sandarachæ unc. i. calcis uiuæ sextarii. Trita cum aqua diligenter coquito, atq; ubi ebullire coeperint, ablatis utitor. Experimentum huius facies, si pinnulam in ipsum pilothrū immergas, breui enim glabra fiet. Aliud. Amyli unc. i. calcis uiuæ unc. i. auripigmenti unc. i. contusa & cribrata reponere, uterēq; ut dictum est. Heraclidæ Tarentini pilothrū. Euestigio pilos tollit; Calcis uiuæ sextarii i. cimolij sextarii i. pumicis usti sex. i. auripigmenti partes iiij. trita ac leuigata reponito. Vfus uero tempore aqua dilutis, ut dictum est utitor. Hæc quidem igitur Crito scripsit. Cæterum eorum usus melior est quemadmodum nunc mulieres utuntur, post corporis uidelicet illitionē in tepidam balnei domui ingredientis, atq; ubi exudare coeperint, strigili pharmacum ex aliqua corporis parte detrahentes, deinde quæ simul auferri pilos senserint, reliquū corpus omne abluētēs.

Quæ pilos disperdant. 3

Scriptum quoq; de his est, quæ pilos disperdant in comptorijs libris, quæ sane iam ex medica materia exciderunt. Quapropter & ego simplicium tantum ex eis faciam mentionem, in simplicium item pharmacorū tractatu à me relatorum. Iuxta rationem enim proposita pharmaca componunt. Ex lepore marino, hepate thunni putrefacto, cedria, ranarum in uiridibus arundinetis degentium cruore siue mucō, marinæ testudinis sanguine, lachryma hederæ, similiterq; bryoniae, ac oleo quod insulsum appellat. Ex marinis item scolopendris, urticaq; marina, & stellis marinis, nitro ac amurca ad hæc ammixtis. Quin & fortiora his ex herinacis & salamandra cōponunt in oleo coctis. Ammiscēt autem ipsi & alcyonia & sandarachen, & quæcūque alia eius generis existunt.

Quæ pilos attenuant. Cap. V

Vterur etiam aliquādo medicus uelut dixi, his quæ pilos attenuant, quæ non eandem cum depilatorijs facultatem habent, Quam enim in simplicium pharmacorum commētarijs extersoriam facultatē appellauimus, eiusdem sunt etiam ea quæ pilos attenuāt. Quemadmodum autem in omnibus eiusdem generis pharmacis, differentia secundum excessum & defectum existit, Sic etiam in extersorijs habet. Ordei itaq; farina, & fabarum, amyli

pliusq; erui, spuma nitri, ac ipsum nitrum, familia-
 risa pharmaca sunt omnibus ad tollendasordes u-
 surpata. Alsiduus autem eorum usus etiam pilos
 attenuat. Quæcūq; uero fortiori uel exterforia præ-
 dita sunt, in his qui ualde duros & magnos pilos
 habent adhibere conuenit. Eius itaq; generis phar-
 macorum est nitri usum, & nitri spuma, & aphro-
 litum spumofum. In alsiduo autē usu faciunt item
 Nigra appellata uasa Alexandriotica, contusa ui-
 delicet & tenui cribro excreta. Cæterum pauperi-
 bus ego etiam fistulium, & clibanorum in qui-
 bus aliquid sub textu coquitur, testas, itemq; pu-
 micem usum, ac non usum indicauit. Vili autem
 & gratis habuerit quis circa mare degens, aut ur-
 be quapiam nō longe à mari sita, testas usas, tum
 buccinorum, tum purpurarum, aliorumq; ostreo-
 rum, Sepiæ uero testam etiam citra uisionem. atq;
 hæc quidem pro ualde egenis indico, pro alijs ue-
 ro alcyonium, & herbam lanariam, utrunq; uera-
 rum, Bryoniæ itemq; dracontuli radicem, aristo-
 lochias, canchry, & panacis radicem, & quæcūq;
 eius generis existūt: plura enim, ut dixi relata sunt
 in simplicium pharmacorum tractatu. At uero si
 hæc ipsa odorata facere uolueris, cyperum, & me-
 lilotum, rosasq; siccas, & iunci odorati florem, tri-
 dem illyricā, melissophyllumq; & cydoniam her-
 bam, eis ammiscibus. Et si pro diuitibus paraueris,
 spicam nardi indicam, celticamq; & montanā inij-
 cies, & terrā Eretriada. Adde etiam folium ma-
 labadri, amomum, myrrham, crocum, costum, &
 hedychrom. Qui uero preciosiori materię paran-
 da non sufficit, ei uiliores hi qui exornatoria com-
 posuerunt, excogitauerunt. Quorum etiam Crito
 meminit in primo de ornatu sic scribens: Ollam
 nouam figulinam magnam, operculum habentem
 accipito, in eamq; cimoliæ glebas pro situs ra-
 tione consicito. Componantur autem hæc quan-
 tum fieri potest ad theatri formā, ut in medio ipsa-
 rum locus uacuos relinquantur. Inter glebas autem
 uicissim mala cotonea recentia uiginti locentur,
 hæc autem per interualla uariare iubeto, deinde
 operculo imposito marcescere ipsa mala sinito.
 Vñ autem expetente quantum satis uidebitur ac-
 cipito, terito, acuti iubeto. Post psilothorum ue-
 ro impositionem, sruam quandam odorem habet.
 Aliud. Rosas quam odoratissimas per
 diem unam in umbra refrigeratas, quo humor sal-
 tem ab eis desiccetur, in uas figulinum componi-
 to, eodemq; modo ut dictum est glebas cimoliæ
 indito, ita ut rosæ substernantur, rursusq; inter gle-
 bas eadem imponantur, deinde operculo addito,
 combibere sinito. Vñ iam demonstratus est.

De fursibus. Cap. VI

Quibusdam fe scalpentibus, fursibus similia
 ex capitis cute decidunt, & propterea fursures me-
 dici hanc accessionem siue symptoma appellant,
 à uitiatis scrofis humoribus prouenientem, quos
 cōsumere scopus est eis qui malum hoc sanare uo-
 lunt. Manifestum igitur est discussoria & exterfo-
 ria pharmaca adhibenda esse præparato prius uni-
 uerso corpore, si uitiatis humoribus repletum ut-

deatur. In omnibus enim huius rei meminisse oportet,
 etiamli aliquando in sermone relinquatur. Ammiferunt
 autem quidam prædictis pharmacis quædam astringenti-
 a, quo per ea affectū mem-
 brum corroboretur, ut ne facile in seipsum fuscipi-
 at influentes humores serofos, sed resistat eosq;
 repellat: & ob hoc sanè Archigenes in pharmaco
 ex atramento sutorio composito hæc uerba adie-
 cit. Hoc inquit adeo efficax est, ut neq; in posterū
 fiant. Crito equidē in tertio libro de ornatu, eius-
 modi pharmacorum sylum scripsit in principio
 statim ipsius libri, quare uelut paulo antè dixi, mi-
 nime necessarium est me ipsa hic rursus describere,
 quum omnes illius habeant libros: Cæterū quæ
 Archigenes scripsit indicabo ob id maxime, quod
 quibusdam ex eis adscripsit, Quod non permit-
 tant symptoma hoc rursus fieri. Scribit autem hoc
 modo suis ipsius uerbis: Dieta eis constituitur fla-
 tus experts, nihil ex crassis succi cibis habens admi-
 xtum, quales sunt tubera, fungi, bulbi, legumina,
 carnesq; maxime bubulæ, ac quæ similia existunt.
 Sint autem cibi quibus uescuntur boni succi, faciles
 concocti, & mel isdem addatur. Intinctus cō-
 ferunt, acetum cum sapa. Condimenta, cuminum
 & foeniculum. Alijs parce utantur, & à bellarijs om-
 nibus maxime abstineant. Vinum conducit eis
 album & tenue: uoluptatis uero gratia dulce, & u-
 num mustum. Ex fructibus optima est uua arefa-
 cta, deinde ficus, quibus ante cibum reliquū uesci
 præstat. Verum ante omnia bonæ concoctionis
 cura habenda est. Deambulationes lenes plurimæ
 & mane & uesperī optime sunt, lauatio ex frigida
 balneis præstat. Si uero quis calida lauit, incon-
 grua ei est longior in aere mora, & perfusio capiti-
 tis præ folio est eligenda, postea uero largita frigide
 adfusionē refrigerato. Dormire ad fatigatam usque
 utile est. Ira, indignatio, uersatio in sole, & ue-
 hemens refrigeratio uitanda, omnia item quæ ca-
 put replent. Archigenis ad fursures capitis.

Quibus fursures caput occupauerunt, his cum fœ-
 no græco, betæ succo, ac nitro præfrictis & exter-
 sis, cimoliam felle bubulo aut suillo acetoq; suba-
 ctam illine. Deinde post horam ablue, atramen-
 tumq; sutorium ac nitri cum oleo trita illine. Aut
 myrbalanum & fabaceam farinam æquali pon-
 dere trita, in aqua coque, & affrica. Aliud. A-
 mygdalas amaras decorticatas cum aqua aut ace-
 to affrica, quumq; exaruerint capilli calida ablue.

Aliud. Aut maluanum sylum streum aqua marina
 ad decimæ partis residuum coctam terito & affri-
 cato. Aliud. Aut nitri spumam & atramen-
 tum sutorii, æquis partibus cum uino, ter ut qua-
 ter in mense affricato. hoc adeo efficax est ut ne-
 que in posterum fiant. Aliud. Aut uini Rhodij
 fecem, & pumicem, & nitrum, pari pondere
 cum lupinis affrica. Aliud. Aut cimoliam
 cum fœni græci cremore adhibe. Aliud. Aut
 nitrum assatum & bulbum. Aut hæc omnia simul
 pari pondere affrica. Aliud. Aut ubi picis li-

quidæ serum illeueris, alu-
 men insperge.

De phthiriasi, hoc est morbo pediculari. Cap. VII

Pedicularum generatio quibusdā in capite contingit aceruatim, ex multis uidelicet humoribus calidis quidem, sed non ad tantam caliditatem progressis, ad quantum perueniunt acres & serosi humores. Quare manifestum est in profundo cutis, pedicularis morbi affectionem fieri, ubi etiam animalia hæc generari possibile est, non in superficie cutis, in qua furfures consistere diximus. Pharmaca itaque ipsorum necessarîo exsiccantia sunt & quæ ex alto trahere ac euacuare possunt, magis utiq; quam ea quæ surfuribus conueniunt. Atque hæc quidem methodus est ea componendi, Verum sylua eorum quæ experientia constant (oportet enim, ut dixi, in omnibus maxime attendere ac cōfidere his quibus experimentum testimonium præbet,) in tertio libro Critonis de ornatu scripta est. Apponam autem etiam nunc ego ab Archigene scripta hac serie uerborum. Remedia morbi pedicularis: Morbo pediculari affectis hæc conferunt. Staphidis syluestris partes duas, sandarachæ & nitri utriusq; partē. i. cum aceto & oleo capiti illine. Aut Rhoen qui in obsonia additur cum oleo tritum similiter illinito. Aut oxylapathi radicem cum oleo eodem modo. Aut ueratrum albuim, & staphidem syluestrem, & nitrum pari pōdere cum oleo in balneo adhibe. Aut cum aqua marina, aut muria meraca cū aceto perfundito. Quod si nuditas pilorum adfit, syluestrem staphidem cum oleo & aceto imponito. Aut alumen tritum cum oleo illinito.

De Achoribus, hoc est ulceribus capitis manantibus. Cap. VIII

Inter affectiones cutis capitis connumeratur quoq; ea quæ Achor appellatur, ex genere tumorum præter naturam existens: propriam autem & singularem appellationem nacta, ob accessionem quæ ad eam consequuntur proprietatem: ualde enim tenuibus foraminibus eroditur, quæ tenuem in se humorem modice uiscosum complectuntur. Ad similitudinem uero eius proxime accedit alia cutis affectio quæ fauus, græcis Cerion uocatur: maiora tantum foramina habēs, in quibus humor hymettio mellis similis continetur. Generatio ipsius ex humore mixto est, qui partim tenuē serosumq; ac mordacem, partim uero crassum succum in se habet. Tenuis itaque humor utpote mordax, primum quidem ad scalpendum ipsos impellit, progressu uero temporis ad scalpura tum tumor augetur, tum foramina circa ipsum erumpunt. Manifestum igitur est euacuare oportere humores affectionem ipsam operantes. Qui si etiā insinuant amplius, prohibendus primum est ipsorum influxus, per capitis euacuationem, præmissa totius corporis purgatione, uelut in alopecijs est proditum. At uero si parua affectio existat, sola localia & partialia appellata remedia, citra totius corporis euacuationem suffecerint. Conuenient autē ipsis ob crassitudinem uidelicet & uiscositatē humoris eas generantis, pharmaca quæ ipsum incidant, quæq; facultate sua necessarîo discutiant & repellant. At-

A qui acetum ex incidentium ordine existens, ultra hoc quod discutit, præcipuum quiddam in se habet, quo reprimatq; ac quod influit depellit, utpote quod substantia sua modice calidum est, plurimum uero frigidum & partium tenuium: tali namque facultate præditum esse, in primo de simplicium pharmacorum facultate demonstratum est. Sit itaque acetum exquisitè acidum, in quo nulla penitus uini qualitas appareat: hoc ipso sanè pharmaca metallica appellata, modo hoc, modo aliud imbuens, achoribusq; ex eis medeberis. Incipere autem ab imbecillioribus præstat, præsertim si dolores simul ipsis adfit. Cimolia igitur ad hanc rem apta est, & Cretica lemniacq; terra, pompholyxq; & spodium, spuma argenti & cadmia tenella. Quod si neque ex his quiescat malum, pharmacum ex charta siccum aceto dilutum illinito. Neq; obsecrum est tollendos prius capillos anteq; talia admoueas. Si uero acrius tibi ex charta pharmacum appareat, miscebis ipsi argenti spumam: si quidem sufficienter mordacitatem eius exoluere uelis, pari copia si uero modice tantum remittere uelis, minor, quem admodum etiam si plurimum eius uim exoluere placeat, maiorem eius copiam addes. Porro cum aliquando ruri degenti mihi pharmacum ex charta ad manum non esset, conspecta in agri domo inuiti aliās charta facultā postulauī, exuitaq; charta ac aceto diluta, locū affectum illeui, hominemq; ad me postridie uenire iussi: sciebā enim quod quum durā carnis esset pharmacum ferre posset, qui ubi uenisset, parū aberat quin curatus esset: quare ad aliud pharmacum non transiui, sed eodem uti iussim, postera die perfecte sanitati restitutum conspexi. Prudenti igitur uiro, quod sæpe iam dixi, opus est, & qui tum curandorum morborum substantiam, tum agri naturā probe norit. Insuperq; pharmacorum facultatem nō iuxta genus tantum, sed & iuxta quantitatem cognoscat, quo singulis diebus quali præsidio opus sit coniectet. In extendenda enim aut exoluenda pharmaci, quod prioribus diebus admotum fuit, facultate in quantum sanè affectio ipsa indicat, congrua curatio consistit.

Ad Achoras inflammatos. Quod si quādo in ulcus manans inflammatū simul & dolorosum incidas, lenies primum per humectum concoctoriumq; ac emolliens & acrimoniā arcens pharmacum dolorem, Tale autem est parygrum appellatum, ab Hera alijsq; plurimis descriptū. Sanis manifestum autē est quod ipsum in manu per speculum latum cum rosaceo emollitum & ad ungenti formam redactum, non emplatri forma, qualem à principio habebat, adhibere oportet. Conueniunt etiam hoc tempore, ea quæ ad sedem ex ulceribus aut rupturis dolentem faciūt, de quibus priuatim destinato sermōe ac tempore dicetur. Sicut etiam conueniunt ea quæ canceros mitigant. Hæc igitur omnia ubi prius consideraueris, etiam particularem pharmacorum uarietatem utiliter cognosces. De qua ego quoque dicere aggrediar, quæ apud præstantissimum quenq; medicum laudata repeti pharmacaca deinde scripturus.

Ad achoras Archigenis. 2

Archigenes in primo pharmacorum iuxta genus, ad Achoras sic scripsit. In quibus achores, aut papulæ feruidæ, aut eruptiones circa caput ulcerosæ sunt, ab omni acris & falso abstineant, itemque acido. Deinde de rasæ capillis, aut ter; aut sæpius quotidie ex calida in qua myrtus, aut lætiscus, aut rubus, aut bryonia, aut sycomorus, aut lupini, aut lentes, aut asparagi radix incocta sint, lotis & maxime ubi multa sanies effluxerit, salicis folia ex aqua imponito, aut lentem cum melle, aut asparagi radicem coctam eodem modo. Aut foenum græcum betæ succo maceratum pinguis emplastris usu cognitis admisceto ac utitor. Aliud præclare faciens. Pinus corticē cum cerato. Aut cadmiæ cum oleo ueteri illinito. Aut cinnabari similiter tritum imponito. licebit & myrti bacca, aut ordium ustum, aut argenti spumã, aut cerussam, aut ostreorum testas uitas ammiscere, singula etiam cum oleo ueteri illinire. Aut spodium & mannam ex uino. Egregie constanter facit & chalcitis cum aceto & oleo ueteri illita. Aut betæ decoctum cum modica cimolliã, sale & uino ammixtis, in balneo affricã. Aut hyoscyamellũ & semperuuium minus, trita cum rosaceo mellis spissitudine illine. Aut ulceribus ex sinegmate quo piã repurgatis, terram cimolliã torrefactam cum uino, aut facem uini rhodiũ ustam cum uino ueteri, aut radicis cucumerum syluestris decoctum ad fundito ac proluo. Aut tragacantham aut argenti spumã, aut sandarachæ duplum, cum uino, aut etiam cum oleo myrteo, ut pingui quo piã illinito. Aut argenti spumã & calcem pari pondere cum aceto & oleo illine. Aut chalcitidem cum myrteo oleo uel suillo felle liquido illine. Hæc quidem Archigenes scripsit, doctrinam tradens non modo empiricam, sed etiam indefinitam. Inuenire itaque est apud Empiricos, qui sanè non in contentioliis sermonibus uitam controuerunt, sed in medicæ artis operibus, diligenter uersati sunt, quod in quibusdam apparentibus cognitionibus euidentiã discrimina retulerunt, qualia & ego paulo ante in alopecia feci. faciam autem & nunc in his quæ Archigenes scripsit pharmacis. Quædam enim ex eis incipientes achoras, citra humorum in uniuerso corpore uitiatione, aut eorundem multitudinem reducantem, sanant, adstringentem nimirum & repulsoriam uim habentia. Quædam uero ubi magnum quoddam malum minantur achores, eos augeari prohibent, simul & quod influit repellentia, simulque quod iam in eis continetur concoquentia & discutientia, quæ euidens est mixtæ facultatis esse oportere. Quædam autem eis quæ in superficie hærent, paruisque tantum auxiliantur, quæ moderatis uiribus prædita esse oportet, & nihil quod irriter habere, ex discussoria nimirum facultate. Alia autem uiribus omnino robustissimæ sunt, adeo ut etiam achoras ex crassis ac uiscosis humoribus abortos, inelutibilibiterque cuti infartos euacuare possint, atque id adeo ualide ut etiam si obduratum quid habeant, id ipsum de-

Galen.

A turbare ualeant, quamuis ipsum cutis habitum in eiusmodi malum habitum inducant, ut quod influit corrumpatur, etiam si comodum id existat. Hæc autem sunt ex efficacissimis pharmacis composita, quale retulit Archigenes ubi salem ad reliqua discussoria ammiscit. Sal enim & chalcitis, & uini fax usta & sandarachæ, & calx uiua fortissima uiribus pharmaca sunt, calfacientia, mordentia & discutientia. Eius generis est etiam fel calidorum & siccorum animalium, quorum non me dicitur Archigenes, sed unius suilli tantum, quod omnium moderatissimum existit: ad cuius facultatem etiam proxime cinnabari accedit, propinquum deinde locum habent conchæ usta, & hordeum, & post hæc oleum uetusum. Quemadmodum autem hæc emouent, secant & discutunt uio lenter impactum, sic repellunt adstringentia: aliqua quidem simpliciter citra contrariæ facultatis ammixtionem, aliqua uero per dominiũ adstringentis in eis facultatis. Myrti equidem earumque bacca, & pinus cortex, ex eorum numero sunt quæ non habent contrariæ facultatis ammixtionem, uelut etiam rubus & sycomorus, quamuis moderatius adstringant, quam myrti earumque bacca, sed tamen adstringendi uim sensibiliter in se habent. Mixtæ autem facultatis est oleum myrteum: Nam & ex oleo, & ex baccarum myrti, aut ipsius etiam myrti succo est compositum. Oleum autem ipsum emollitum habet facultatem, myrtus autem eiusque bacca adstringentem, non mollire, sed cogere & stringere natam. Rosaceum item quam minus quam myrteum adstringat, tamē & ipsum mixtæ facultatis existit. Quemadmodum autem hæc per præparationem mixtas uires habent, sic alia sponte naturæ talia sunt, uelut lentiscus, cyprus, & lentes: quod ipsum in sermone de his est demonstratum. Cæterum discussoria & repurgatoria, citra sensibilem caliditatem, facultate præstant ex eis quæ iam Archigenes retulit, beta ipsa, & cimolliã usta. priusquam uero uritur imbecillior uiribus quam beta est, sed fortior his est cucumeris, & bryoniæ ac asparagi facultas. Spuma uero argenti præstatis quidē quæ cimolliã usta phar macum est, multo uero debilius quam ad propositæ affectionis sufficiat medelam. Cadmia autem moderate habet ad mediæ magnitudinis achoras. Citra mordacitatem uero rescicat spodium. Mâna autem etiam concoquit. oleum uero, ut iam dixi, laxantem quidē habet uim, sed eam non adeo forte, atque ob id per mixturam facile exuperatur. Itaque ubi fuerit cum obducentibus meatus & refrigerantibus permixtum, uelut est cerusa, possibile est hanc magis uim suam demonstrare, quæ est cogere, oppilare, & adstringere substantiam corporum quæ cõtinuã. Porro hæc omnia in Archigenis sermone confusa sunt, neque in quibus achoris, neque quando eis utendum sit ipso demonstrante. Vtitur autem et uino in eodē sermone, neque apponit quale probet. At qui multijuga circa uinum differentia existit: aliud enim austerum, aliud acerbum, aliud dulce, aliud acre manifeste est; aliqua etiam plures qualitates simul esse se-

tom. 5 x officinæ

ostendunt, nimirū & dulce quippiā & adstringēs & acre complectētia. Quando igitur simpliciter quis scribat, dilui debere quippiā uino, lectorem coniectare oportet, quem scopū pharmaci compositio habeat, & ad illū respiciēdo, id quod aptū fuerit uinū eligere. Astringens quidē ubi repellere uelit, acre uero in quib. discutere. reliquis item utemur quemadmodū uniuscuiusq; uim demonstrauimus in loco ubi de uinorū differētis docuimus. Acetum uero in omni occasione ad achoras aptissimū est, utpote crassos & uiscosos humores fecās, atq; id quod influit discutiensq; & repellēs. Verum ipso non utiq; per se quippiā utetur, siquidem non proluere aut lauare achoras uelit, sed ad diluēda cum eo pharmaca, moderata quidem in quib. incipit & adhuc parua est affectio, fortia uero in maiorib. & diuturnioribus, fortiora autē adhuc in inueteratis, & iam agerrime curabilibus. Verum differentia pharmacorū iuxta fortitudinem iam ante a me relata est. Ceterū ex relatis ab Archigene pharmacia, in totū nō uti exoptē semper uiuōq; & cerusa. Illud enim strenuū refrigerat quā conuenit incipientes achoras refrigerari. Cerusa uero modicā quidē habet frigiditatē, & ex pharmacia est obducentib. meatus, pro ea autē uti possumus spōdio & pompholyge.

Quæ Apollonius in primo de parabilibus ad achoras scripsit. 3

Apollonius in primo de parabilibus ad achoras primum quidem sic scripsit: Rosaceo oleo caput illine. & deinde post hoc betæ succum misiliter illine. tertium deinceps, testudinis sanguinem eodem modo adhibe. quartum, laurino oleo caput illine. & quintum, crocinum unguentum inunge eodem modo. Ex his sanē primum debilissimum est pueris & mulierculis teneræ ætatis in principio affectionis utile existens. Concoquit enim et discutit atq; repellit, eaq; omnia moderate facit. Secundum uero ubi betæ succo uti consulit, efficacius quidem est rosaceo, discussoriam uim habens, nō tamen ad fortes ac iam obfirmatas achoras sufficit. At uero testudinis sanguis curiosum & superuacantē est pharmaci, neq; unquam tenatū eius periculum facere. Quod uero deinceps scriptū est, laurinū fortiter calcificet & discutit, opusq; habet totius corporis & capitis euacuatione, quo discutiat humores achoras facientes. Crocinum deinde unguentū discussoriorū quiddam habet & adstringens, & concoctoriū: atq; ea tria fortiora in ipso sunt, q̄ in rosacei natura: ex eis igitur quæ de illo dicta sunt, etiam de hoc ratio cinari licet. Post hæc autem ipsius uerbis ita scriptum est: Tauri urinam affrica. deinde sequitur, facit & camelī urinā eodem modo. Vtendū autē eis, inquit, ad plures dies. Verū ego utiq; dixerim ad ipsum, Non esse quod ad multos dies, sed ne ad unū quiddem, purus homo tolerare queat, ut ullius alicuius eiusmodi animalis urina capit affundat, præsertim in affectione adeo parua, & quæ facile curari potest. Bis enim per omnia (quod dicitur) distans est, rosaceo uidelicet uti, quod penitus exiguam habet ad propositū symptoma facultatē, &

tauri ac camelī urina quæ acerrimæ grauissimæq; & penitus insuicundæ existunt. Deinceps uero tale quoddam pharmaciū his uerbis scriptū est: Fur furū chœnicem dimidiū in aquæ heminis diabus madescito, posteaq; terito ac succum excolato, cumq; dimidia acetī hemina ad limi spissitudinem coquito, & ex eo caput fricato: deinde aqua in qua beta, aut scœnum græcum, aut lupini cocti sint, abluito. Vnguento autē irini fece utitor. Hoc pharmaciū discussoriorū est citra mordacitatē, exre purgantibus atq; extergentibus appellatis cōpositum. Eiusmodi enim facultatis sunt furfur, beta, & lupini: discutit autē simulq; calefacit non uehementer scœnum græcū: ex eo autem genere est & irini unguenti fex. De acetī uero facultate antea quoq; dictum est, quod aptum sit ad achorum affectionem, quare hoc ut conuenientissimo & efficacissimo pharmaco utendum est. Aliud deinde post hoc pharmacū scriptum est ab Apollonio his uerbis: Cucumeris syluestris radices decoquito, & succum affricato. Didicimus autē cucumeris radicem plurimum discussorie facultatis esse. Et postea hoc pharmaciū scriptum est: Terræ cimoliz, sulphuris uiui, par pondus cū aceto terito, & in balneo affricato, calidāq; abluito. Hoc illine etiam conuenit pharmaciū, non solum ut dixit in balneo adhibere. Omnes enim habet facultates quibus affectio indiget, aceto quidem ipsas habente, uelut antea est dictum. Solum uero sulphur ulterius q̄ conuenit exalfacere & discutere potest. Quapropter cimoliam ei ammiscuit, quæ cōpositionē ex utroq; ad moderatā tēperaturā reducit. Ceterū quod sequit̄ pharmaciū ubi inquit, Maluam exccatā & tusam in urinā inspergito & affricato, reprehendo, in quantum etiā superius uinæ usum detestatus sum, etiam si facultatē eius affectioni conuenire non negauerim. At quod deinceps scriptū est, in q̄ sic ait, folia in aqua coquito, & aquam sub diuo per noctem exponito, iniectaq; in ipsam fece usta affricato, post hæc uero re purgantibus pilos, eluito. Acre ualde hoc extensoriū medicamentū est, quod si in balneo tantum adhibeatur, non uehementer ualet achoras irritare, præsertim si quis, ut ipse deinceps iubet proluat, hoc est ex aqua dulci caput perfundat. Ad illationē uero eiusmodi pharmaco uti periculosum est. Est enim plurimū acre medicamentū fex usta, quemadmodū in libris de simpliciu medicamentorum facultate est cōmonstratū. Quod uero sequitur pharmaciū securi usus est, eoq; confidenter quis utetur ex spuma argenti laurinoq; cōposita. Miror autem quomodo, ut laurino simile, oleum simplex ammiscet, sic quodāmodo scribens, Argenti spumā cum oleo albo, aut laurino tritā, ubi calidā prælaueris circumlinito. Longe enim defecit a laurini facultate, oleū cōmune quod albū appellatur, ea ipsa usus est a laurino distinctionē. Quin & quod post hoc scriptū est, confimilē habet absurditatē: pro spuma enim argenti cerusa utit̄, diluit autē ipsam myrteo aut laurino, cū multam omnino differentiam hæc pharmaca habeant: aliterum

alterū enim repulſoriū eſt, alterū uero plurimum caſſacit & diſcutit. Vſuſq; eorū eſt repulſoriū quidem in principio, diſcuſſoriū uero ubi humor qui achoras generat iā eſt firmatus. Amplius autē dein ceps cū rubi canini folia contundere & exuccare iubet, deindeq; oleo miſcere, imbecille eſt pharmacū, & incipienti affectioni ſolūmodo aptū, ut pote cū rubus caninus aſtringat. Tale pharmacū eſt etiā plumbago cum ceruſa, uino ſubacta, uſq; quo ad compagē quæ illini queat redigant. Porro cōtrariæ prædictis facultatis ſunt quorū equaliter, nulla diſtinctione apoſita memini, id uide licet quod ex naſturtio, & quod ex ſcilla conſtat. De priore quidē hæc uerba tradens. Naſturtij & ſalis parē modo dū adipi anſerino admiſceto, terito ac uulor. De altero uero ſic ſcribit. Scilla in fornace uelut cucurbita cinere obruito, cumq; mollis fiet exprimito, deinde ad ſuccū oleo nō multo ad mixto, illinito. Maniſteſtum uerō eſt multo uehementius eſſe quod ex naſturtio apparat. Quod uero deinceps tradit ex mitigatoriū pharmacorū genere eſt, quod ubi dolor quiſpiā uehemens circa achoras exiſtit, donec eū leniat, cōueniēter adhibet. Si uero duros & inueteratos achoras diſcutere ueſtimus, omnino imbecille eſt. ſcripſit autē in in hunc modū de eo Aſclepiades: Olei q̄ optimi heminā in pilam plumbeā inſundito, et plumbeo piſtillo terito, donec craſſum & ſubnigrū reddat. Deinde ſorſim ſpumæ argenti librā i. & ceruſæ tantundē terito, oleoq; admiſceto. Poſtea uero eloto & ſiccato capite pharmacū illinito. Neq; uero ex ſimplici tantū oleo, ſed quandoq; roſaceo, quandoq; myrteo apparatus, & ad rugas ani intumefcentes rimasq; ac fiſſuras ſedis, ad ulceraq; dolentia, omniaq; alia quæ ex fortioriū pharmacorū uſu exacerbata ſunt, optimū medicamentū habebis. Egregie enim ea lenit, etiam ſi ſerpendo excedentia, aut etiam canceroſa, aut quomodo cumq; maligna, exiſtant. Nequaquam itaq; eius compositionem nunc ſcribere oportuit, ſeu quemadmodum ego antea dixi, ſufficiebat illud dicere, quod dolorifici achoreſeiuſmodi pharmacis mitigant. Commune enim hoc eſt in omnibus dolore affectis, proprie autem faciens ad achoras. Deinceps autem tale pharmacum ſcripſit: Spumæ argenti drach. viij. foliorum rutę tenerorum drach. v. olei drach. viij. aceti heminæ quartā partem, ſimul trita capiti illinito. Hoc ſanē pharmacum multo uſu habemus exploratum. Propinquum autem ipſi facultate eſt id quod conſequenter ab eo eſt conſcriptum, iuxta hanc commenſurationem. Ceruſæ drach. vi. ſpumæ argenti drach. quatuor. ceræ tantundem. ſulphuris drach. ſex. olei roſacei aut myrtei quod ſatis eſt ut ceratum liquidum fiat. arida cum cerato committito, caputq; inde illinito. Hoc autem & ad omnes in toto corpore eruptiones uehementer commodum eſt, ut rite ſit ab Apollonio conſcriptū. Quin & quod poſtea ſequitur plurimum diſcuſſorium eſt, ut quod ſpumam nitrī habeat multam, ad eō uſi niſi olei multitudinem caſtigetur, acrius ſit quam conuenit. Iubet autē

Galen.

A ad unam ſpumę argenti partem, quintuplum ſpumę nitrī admiſceri, hiſq; dum teruntur paulatim oleum ad fundi, donec ad compagem illitioſam aptam redigantur.

Que Crito ad achoras pharmaca ſcripſit. 4

In methodo de curandis morbis uniuerſales facultates pharmacorum ad ſingulos morbos reſerui, uerum paucorum infinita materia exemplorum mentionem feci, dilata tum multitudinis ipſorum commemoratione. At uero in præſenti, quam nunc in manibus habemus, tractatione, omnia quidem quæ omnes pharmaca ſcripſerunt, longum fuerit recēſere. Quæ uero à probatis medicis per experientiam tradita ſunt, ea omnia uifum eſt mihi cōducibilius enumerare, quo etiam inter ſe propinqua, & quę omnino eadē apparēt, paululum uerō iuxta apponderationem aut præparationem euarient, hi qui in hiſ ſcripſis uerſantur cognoſcant, eaq; maxime præparent quorum materias in promptu habent. Contingit enim aliquando ut aut in totum ea quæ in cōpoſitionem miſcentur non reperiāmus, aut talia reperiāmus, ut ipſa inſicere non audeamus. Cæterum eius maxime in componendis pharmacis cura habenda eſt, ut bona integraq; & in uigore ſint omnia quę admiſcuntur. Ob id igitur etiam ſam omnium quæ Crito tradidit mentionem faciam: nam is ſanē diligentius achorum curam tractaſſe mihi uidetur. In quinque itaq; ſermones doctrinam de ipſiſ diſtinxit, quos priimum & ipſe recenſebo. Prius Critonis ſermo de achorū curatione. Scribit itaq; Crito hæc uerba: Ad achoras in capite contingentes, quę plerunq; furfuribus præcedentibus ſiunt, & ſerme etiā ſcabie, in principio ſubſcriptis compositionibus utemur. Ad achoras recentes, gluten fabrile aqua coctum obline. Aliud, Papaueris ſilueſtris & hyoſcyami folia cum oleo impone. Aliud, Fici uirgulta aut folia tenera trita cum aqua imposito: in inueteratis uerō cum aceto terito. Aliud, Nucum amararum nucleos in aquam tepidam iniectos & decorticatos cum aqua terito, et cerati craſſitudine prægratiſ imposito. In inueteratis cum aceto diluito. Aliud, Recrementi ferri & roſarum par pondus cum uino terito, & imposito. Quidam uerō trita cerato roſaceo excepta adhibent. Secundum ſermonem ad achorum affectionem hiſ uerbis conſcripſit. Circumtenſa autem cute, & ob id moleſtiam inferente, ſubiectis compositionibus utendum eſt. Lipara ſeu pinguis compositio ad achoras, pſydracas, papulas feruidas, intertrigines. Eſt comoda quoque uitijſ ſedis. Spumæ argenti drach. quinquaginta. foliorum rutę tenerorum drach. xxv. aceto diluito, & roſaceo aut myrteo excepta, cū penna illinito. Alia, Spumæ argenti drach. cc. ceruſæ drach. cl. rutę drac. ſtaphidis ſylueſtris drach. xxv. aceti ſextarios iij. myrtei lib. iij. particulatim ſingula terito, & affuſo liquore, ut diſcum eſt, componito. Alia, Ceruſæ drach. cl. ſpumæ argenti drach. centum. rutę drach. centum. myrtei ſextarios iij. particulatim tritiſ liquo-

Tom. 5

x 2 rem

rem affundito. Alia, Cerusæ uisæ drach. centum. rutæ drach. centum. mānæ thuris tantundē. corticis pinus drach. l. olei myrtei sextarios duos. acetū tantundem similit̄ cōponito. Alia, Reremētī plumbi drach. centū. pampinorum uitis drach. centum. thuris drach. centum. myrthæ & spumę nitrī tantundem, acetū & myrtei quantum sufficit. In tertio autem hæc tradit. At ubi affectū inueterata fuerit, subscriptis compositionibus utendū est, & deinceps ita scribit. Democratica compositio ad achoras humectos & inueteratos. Ladani drach. octo. cerusæ tantundem. sulphuris uiui drach. quatuor. uino & myrteo oleo subactis utitor. Alia, Spumę argenti drach. octo. pampinorum uitis drach. octo. lucci hypocyttidis drach. quatuor. spumę nitrī drach. ij. gallarum drach. ij. aut ij. ex aceto & myrteo adhibe. Alia, Malicorij, gallarum, acacię fuluę, Malicorium & gallas uino macerata coquito, acaciām uero uino dilutam reliquis probe tritis adijcito, cumq; recte omnia cōparata fuerint, myrteo excipito. Alia, Spumę argenti, cerusæ, hyoscyami, misyos, ramulorum cicutę, æquales portiones, thuris uiti, ramulorum oleæ tantundem. aceto & oleo lentiscino exceptis utere. Alia ualde commoda. Cerusæ uisæ drach. viij. spumę argenti drach. viij. atramētī futori j drach. quatuor. Rhos rubri drach. quatuor. sulphuris uiui drach. ij. opij drach. ij. myrthę drach. ij. aceto & lentiscino oleo excipe. Quartū uerō sermonem de achoris curandis hac uerborum serie cōscripsit. Quando uerō ex his quę ad achoras scripta sunt pleraque resiccant, magisq; dolorem inferunt, ut prope cute in ipsi affectus circumtensa, itaq; subscriptis compositionibus utendum est per quas post hæc omnia citra dolorem emendari. Leuce emplastrum album in exuperabile, faciēs ad humectos achoras, & qui ægre tolli possunt, facit & ad papulas feruidas & intertrigines. Spumę argenti drach. centum. cerę drach. c. alij l. habent. cerusæ drach. c. thuris drach. xxv. aluminis scissi drachm. xvi. terebinthinę drach. xxv. piperis albi drach. ij. olei sextarium unum. arida tumēto. Oleum uerō & argenti spumam ac cerusam in ollam nouā cōiecta ad prunas coquito, atq; ubi mutationem ac ceperint, ceram & resinam addito, ac donec non inquitet amplius manus agitato, deinde ab igne ablatis, et quodāmodo refrigeratis arida adijcito, & in pilā translata diligenter emollito. Vitor aut in linteolum impactis, solutoq; tertā die. Magis autem commodarit pharmacum hoc si cum Melino emplastro Passionis fuerit permixtum, ita ut emplastrū in exuperabilis, Anicetum Græci hoc appellant, partes duę, Melini autem Passionis una pars committantur. Alia, Cerusæ drac. cxx. spumę argenti drach. lxxx. cerę drach. xxiiij. terebinthinę drach. xij. manę drachm. xvi. aluminis scissilis drach. viij. olei heminas ij. committe ut dictum est. Melinum Leucię emplastrum, quod omnem fluxum resiccet, faciēs ad achoras inueteratos & humectos. cerę drachm. viij. sandarachę

A drach. iij. adipis utulini drach. iij. terebinthinę drach. ij. thuris drach. i. myrthę drach. i. aluminis scissi uiti drach. i. corticis pinus drach. i. olei myrtei quod satis est liquefacta cum aridis commixto. Aliud Melinum Hygieni, resiccans omnem fluxum. Spumę argenti lib. i. cerusæ lib. i. salis fossilis lib. i. aluminis scissi librę dimidium, atramētī futori j sexuncem. olei sextarios duos. acetū sextarium unum. Oleum, salem, cerusam, spumam argenti donec non inquitet manus coquito, arida uerō tusa, cribrata, acetoq; diluta, ad refrigeratum pharmacum addito paulatim assillando ac assidue agitando, deinde in pilam translata ac probe emollita, tollito ac utitor. Thebei emplastrum ad achoras humectos. Spumę argenti drach. xlvij. cerusæ drach. xxiiij. corticis thuris drachm. xij. gallę omphacitidis drachm. xij. cerę drach. viij. resinę terebinthinę drach. xvi. olei selquiheminam. composito ut dictum est. Quintum postremum sermonem de achoris Crito ita orditur. Caterum ubi affectio decreuerit, & cicatrix perfecte fuerit obducta, ad totius mali translationem subsequenti bus compositionibus utendum est. Deinde inegmata plura scribit, unumquodq; iuxta hanc cōpositionis formam. Smegeta ad achoras, furfures, asperitates & scabies. Terrę cimolię lib. i. nitrī rubri lib. i. retrimentorum quę ab expressa myrobalano reliqua sunt sexuncem, alij lib. vi. habent. myrthę drach. viij. piperis albi drach. viij. nardi celticę drachm. quatuor. casię drach. quatuor. costi drachm. quatuor. contusa & cribrata repone, ac utere in balneo. Aliud, Nitrī rubri lib. quatuor. terrę cimolię, tantundem. retrimentorum ab expressa myrobalano lib. ij. cypri lib. i. alij iij. baccharum lauri lib. i. iridis aridę lib. i. radice bryonię, alcyoni j, amygdalarum repurgatarum, cornu ceruini uiti, singularum lib. i. Composito ut dictum est. Aliud, Facis uini uisæ, quam Romani facculam, nos tyrga appellamus lib. xxiiij. aquę pluuialis sextarios xlviij. thuris lib. ij. terrę samię lib. ij. olei sabini lib. iij. alij sextarios iij. cerę lib. tres & dimidiā. Facē & aquam in dolium sigulinum non picatum comiecta ad dies septem madescere finito, et ter in die cum ferula agitato. Sequenti deinde die dilutum & sacco excolatū liquore in uas areū stanno oblitum transferto, & igni impositum coquito, licet lentiore autem igne utaris: atq; ubi tertia pars reliqua sit, oleum & ceram insice, rursusq; ad lentum ignem decoque: postquam uerō iniecta fuerint liquefacta, thus, & terram samiam trita addito, conquassato, & in uitreum uas robustum transferto. tenuia enim rumpuntur. Vfus autem tempore affectos locos circumlinens, & diligenter confricans, abluere iube, præstaret quidem in balneo id facere, quod si fieri nequeat, in domo abluatur. Commodum est pharmacum ad omnes sordes, asperitatemq; ac scabiem cutis, itemq; ad sichenas. Aliud, Facis uini uisæ lib. i. aquę pluuię sextarios septem. thuris albi lib. ij. mastiches lib. ij. alcyoni j. lib. i. ammoniaci thymiamas

tis lib. ij. terræ samitæ lib. ij. olei rosacei lib. ij. ceræ
Tyrrenicæ albæ lib. ij. facē in aqua, ut dictū est,
macerato, ter singulis diebus cum ferula strenue
agitando. Deinde excolatum per saccum liquo-
rem in uas stanno oblitum transferto, postquam
ad ignem ad dimidiā partem coquito, deinde li-
quescibilia adijcito, atque ubi dissoluta fuerint, al-
cyonium tenuissime tritum infarcito. Habeas au-
tem ad manum prompta, in facis aqua dissoluta,
probeq̄ trita, thus, ammoniacum, mastichen, ter-
ram samiam, eaq̄ strigmenticiam prædita crassitu-
dine, reliquis infarcito ac diligenter cōquassato,
& ablatis utitor. Aliud, Diapsmyrum appella-
tum. Facis usq̄ lib. xxiiij. aquæ pluuialis sexta-
rios xlvij. olei fabini lib. quatuor. ceræ lib. iij. ter-
ræ samitæ lib. ij. thuris lib. ij. mastiches lib. i. ammo-
niaci thymiamatis lib. i. myrrhæ drach. viij. Com-
ponito ac utitor, ut dictum est.

Que Cleopatra in libro de ornatu ad achoras scripsit. 5

Porro quæ Cleopatra ad achoras scripserit, ea
deinceps referretur illius ipsius uerbis, Fæno græ-
co tenui cocto, & in betæ nigre succo macerato,
caput eluatur: aut betæ decocto, aut terra cimolia
in his macerata. Post ablutionē uerò myrto cum
uino & oleo trita illinatur, superneq̄ betæ folia
imponantur. Aliud ad ualde ulceratos. Ceru-
sæ frictæ drachm. ij. thuris drachm. ij. sulphuris
drach. i. trita ex oleo illinito. Aliud, quod & ad
furfures facit. Nitri, atramenti sutorij, utriusq̄
drachm. i. terito affuso oleo, & illinito. Aliud
ad achoras. Myrrham & myrti albæ folia uiridia
uino trita illinito. Aut terram cimoliam torre-
factam cum uino nigro illinito. Aut cerusæ &
plumbaginis æquales partes cum myrto tritas il-
linito. Aut sulphuris uiui, drach. sex, thuris ma-
sculi drachm. i. aluminis scissi, staphidis silyestris,
erucæ, spumæ nitri, singulorum drach. i. atramen-
ti sutorij drachm. i. rutæ ramulos tres, terito aceto
moderate affuso, itemq̄ laurino, aut myrteo, aut
crocio, aut oleo ueteri adstillato, quo pinguis
compositio fiat, eamq̄ ubi prius hoc smegma af-
fricaueris illinito. Smegma, Hyssopi chœni-
cem unum, lupinorum chœnices duos, præstant
chœnicem unum, fabæ frise chœnicem unum, ra-
dicis cucumeris silyestris drachm. quatuor. Hæc
trita misceto, & affricanda præbeto. Idem & ad le-
pram, & ad uaros facit.

Que pharmaca Soranus ad achoras scripsit. 6

Quandoquidem uero & Soranus de achoris,
tum in quarto de medicina, tum in unico meden-
di libro, quem Monobibulum inscripsit, pharma-
ca quædam tradidit, quæ etiam nobis per experi-
entiam constant, partim quidem proprio, partim
uerò præceptorum, aut medicorum amicorum
usu cognita; ideo etiam ea ipsa hic apponemus
iuxta ipsius dictionem hoc modo tradita. Vbi
multus sanie fluor existat, & uexatio doloris ue-
hementer incumbat, lenticulam coctam tritam
cum modico melle cataplasmatim modo imponi-
to. Aut panem cum coriandro, aut plantagine, aut
solano, aut seride, aut polygono, aut perdicio her-

Galen.

A ba. Soranus quidem igitur uelut in implicata affe-
ctiōe, eiusmodi remedia adhibet, iuxta propriam
sectam ratiocinatus. Apparent autem reuera cō-
moda in principijs & circa generationes, cōmū-
ni repellendi ratione. Deinceps uerò inquit, Vbi
autem exacerbationes remiserint, radēdi sunt lo-
ci, & fœni græci decocto aut betæ, & similibus ex
aqua, non urina confricandi. Quemadmodum et-
tiam nos prius reprehēdimus eos qui per urinam
eiusmodi mixturas faciunt. Postea uerò pharma-
ca scribit etiam nobis, ut dixi, cognita. Plumbagi-
nis, sulphuris uiui, æquales partes terito, & affuso
rosaceo, aut myrteo, aut leniscino, donec frigi-
mentosum reddatur, illinito. Aliud, Sulphu-
ris uiui, spumæ argenti, cerusæ, omnium æquales
partes, croci dimidiā, trita cum passo cretico il-
linito. Aliud, Rutæ leuigatæ drach. iij. spu-
mæ argenti drach. viij. aceto & oleo rosaceo am-
mixto illine. Aliud, Spumæ argēti drac. xx.
calcis uiuæ drach. xx. acetii heminam unam, teri-
to ac uelut liparan aliquam seu pinguem compo-
sitionem illinito. Aliud, Chalcitidis drach. ij.
sandaraches drach. iij. spumæ argēti drac. i. uino au-
stero et myrteo oleo simul trita illinito. deinceps
uerò Soranus aliud forte pharmacum cōscripsit,
quod pro sua secte instituto Metasyncreticū, hoc
est, quod ex alto euocat humores ac transfert, ap-
pellauit: conuenit autem in inueteratis & egre ce-
dētibus achoris, ex eiusq̄ usu quispīam medicus
nobis amicus magnum nomen adeptus est. Olet
cedrini sextariū unū, acetii acris sextarios tres, cō-
quito donec exhalet acetū, deinde adijce adipis
suilli ueteris sale seruati lib. ij. eōq̄ liquefacto, ollā
ab igne aufereto, & nitri triti bessem, sulphuris ui-
ui sexuncem, sandaraches unc. i. infarcito. Postq̄
uerò illitum pharmacum exaruerit, in balneo per
prædicta smegmata confricari iube, perq̄ uinum
& oua ac nitrum, & per radicem cucumeris siluē-
stris decoctum: aut facie rhodia, & pumice, cum
aqua calida.

*Ad psoriasis, & achoras, pustulasq̄, ulcerosus, helcyaria Græcis
appellatæ, & eruptiones in capite. Cap. IX*

Ad præscriptas affectiones conuenienti digēta
uti oportet, corporisq̄ ac capitis purgationē ad-
hibere, per pilulas ex aloë, colocynthide & scam-
monia, ita ut brasicæ succo coactæ ex his pilulæ
exhibeantur. Deinde ipsa locali curatione uten-
dum est, cuius generis est, adiantum cum rosaceo
illitum. Aut fœni græci decoctum affricatum. Aut
malua cum farina ordeacea pro cataplasmate im-
posita. Aut mellilotum cum farina fœni græci ex
uino impositum & cicerum decocto, ipsūmq̄ ci-
cer cōtum impositum, nuces amare commansæ
& illitæ. Discutit autem maxime & lilij radix affri-
cta, & thus cum uino & aqua, & lupinorū amaro-
rum decoctum affricatū, bulbi cum nitro affricati,
thus ex aceto illitū, putamen mali punicū cū tra-
mitum. Aut anchusæ radicē ustam & tritam
cum oleo donec strigmenticiam crassitudinē ac-
cipiat, cum pinna illinito, &
ægrium suauis.

tom. 5

x 3

Caput I. De omni capitis dolore, dimidiâq; eius partium affectione uniuersalis doctrina. 2. Apollonij remedia ad capitis ex ardore dolorem. 3. Ex frigore rursus de ardore curando Galeni doctrina. 4. De in ueteratis capitis affectionibus, calidis & frigidis. 5. Apollonius ad capitis dolorē ex ebrietate & meri potu. Vide lib. 2. cap. 2. sect. 4. 6. Idem ad dolorem capitis ex plaga aut casu. 7. Condependens ex præcedenti Apollonij doctrina, ad temporum ac totius capitis dolores, citra manifestas causas obortos. 8. Archigenis ad capitis dolorem remedia. 9. De his qui ex stomacho caput dolent. 10. Rursus Archigenis scripta cum Galeni censura. 11. De capitis dolore ex bile. 12. Per consensum. 13. In febribus. Cap. II. De cephalæa, id est capitis dolore antiquo. 2. De apoplegma

usmis Archigenis. 3. Idem de cataplasmatibus in capitis dolore. 4. Idē de his qui ex ebrietate caput dolent. Vide lib. 1. cap. 1. sect. 5. 5. Eiusdem amuleta quæ capiti coronam modo circumposita, & alligata, dolorē eius arcent. 6. De fissuris & cōtusionibus in capite factis. 7. Aesclepiades ad capitis dolorem. 8. Pastilli ad capitis dolorem. 9. Epithemata. 10. Archigenis, Apollonius, & Aesclepiades, de apoplegmatibus, & quæ naribus infunduntur. 11. Crito de apoplegmatibus. 12. Idem de eribus ad ictericos. 13. Quæ Aeneas per experientiā pituitam detrahentia tradiderit. 14. De usu omnium fortium pharmacorum. Cap. III. De hemicrania, id est dimidij capitis affectione. 2. Heras ad capitis dolorem.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

PHARMACORVM SECVNDVM LOCOS, LIBER II.

De omni capitis dolore, dimidiâq; eius partis affectione, uniuersalis doctrina. Cap. I.



VICINQVE CAPITA distinctionem indiscriminatimq; doloris capitis auxilia scripserunt, maius detrimentum quam emolumentū his qui eis fidem habuerunt, attulerunt. Neque enim omnes ob unam affectionē caput dolent, sed tum ipsæ affectiones plures sunt, tum curatio ipsarum singularum propria existit.

Vna etenim affectio est iuxta intemperiem simplicem citra humorum complexum. Alia iuxta humorum qualitatem, uelut etiam tertia quæpiam alia iuxta multitudinem tantum ipsorum humorum contingit. Quibus accedit ea quæ fit, quum humores transiit liquorum ac uaporum obturarint. Et ad hæc alia est, quum in quibusdam capitis partibus, propter imbecillitatem, flatuosus spiritus innascitur. Quandoque etiam ob causam aliquam externam & lacessentem, procatartice Græci appellant, uelut est ardor, frigiditas, ebrietas, plaga, capitis dolor contingit. Vehementissimi igitur capitis dolores siue iuxta caliditatem & frigiditatem, maxime cum inæquales existant. Moderati uerò iuxta siccitatem. Ad humiditates uerò nullus consequitur dolor. Eodem modo quum ob redundantem humores siue iuxta omnes capitis partes, siue iuxta unam quamcunq; tandem, siue duas, dolor cōtingit, uehementior quidem ob calidos & frigidos, moderatior autem ob resiccantes citra caliditatem aut frigiditatem manifestam oboritur. Humectantes uerò penitus nullum dolorem inducūt, quantum ad qualitatem ipsorum attinet, ob multitudinē sane instrumentalem partium morbos faciūt, non tamen similium partium ullum aliquem, in quibus solum affectiones iuxta intemperiem simplicem fiunt. At uerò affectiones ob humorum multitudinem, citra quidem obturationē, caput grauant: cum obturatione uerò, si quidem ea moderata fuerit, moderatē dolorosæ: in fortis, fortiter contingūt. Quod si etiam mordacem qualitatem

humorum multitudinem complectatur, etiam iuxta hanc dolorem augebit. Atq; hæc quidem differentie sunt affectionum, quantum ad causas attinet eas producētes. Alia uerò sunt iuxta affectarum partium naturam. Aliquando enim extra caluariam affectio est, aliquando intra. Et quandoque quidem omnium exteriorum aut interiorum est, quandoque non omnium, sed unius tantum corporum generis, arteriarum uidelicet, aut uenarum, aut neruorum, aut membranarum, aut cutis, aut ipsius adeo cerebri. Itaq; difficillimū est affectum cognoscere locum, siue unus, siue plures uno existant, aut qui tandem hi ipsi extant: nec uerò affectionem inuenire promptum est, sed & hoc exercitatio homine indiget, qui tum per rationis exercitium, tum per multam & assiduum affectionis ægrorum inspectionem, eam cognoscat. Proprietates enim aliqua quidem omnino dici non possunt, quædam uerò ægre circa ægrotantia corpora ostendi possunt, utpote que tantum his qui eas sæpe uiderunt cognobiles existant. Non parum uerò ad affectionis cognitionem faciūt quædam ex causis lacessentibus & externis, quæ priuatim procatartice medicis Græcis uocantur, uelut quum manifestus sensus & offensa ægros ardores aut frigoris contigit: & facile sanè eiusmodi affectiones recentes sanantur: probeq; & rite ab eis initium sumpserunt medici, qui præsidia ac auxilia morborum cum distinctionibus descripserūt. Multa quidem igitur a uetustioribus pharmaca simplicia & composita ad huiusmodi affectiones descripta sunt, mihi uerò etiam hic satis erit excellentioribus apponere, qui sanè tum ea quæ ueteres inuenere, conscripserunt, tum ipsi etiam alia quædam addiderunt. Equidem uniuersum curationis scopum singularum affectionum ratio nos docet. At uerò materiæ facultates experientia ipsa demonstrat. Per hanc igitur auxiliorum copia progressu temporis augetur. Atque adeo nunc tempus adest sermoni, propria auxilia iuxta singulas affectiones describēdi, initiū ab his quæ secundum qualitates solas à naturali cuiusq; particula statu discesserunt, facturo.

Que Apollonius ad capitis, propter ardorem, dolorem conscripsit. 2

Apollonius igitur in primo de parabilibus ad capitis dolorem propter ardorem sic scripsit: Rosaceo assidue caput irrigato. Aut lana siue linteolum rosaceo tingito & imponito. Aliud, Naricisino ungento similiter utitor. Aliud, Meli no ungento eodem modo utitor. Aliud, Aut mori succo per linteolum expresso, cum pari rosa ceo utitor. Aliud, Portulacæ folia trita, per se, & cum polentæ flore imponito. Aliud, Cypresii folia trita per se & cum polentæ flore imponito. Aliud, Solanum per se & cum polentæ flore imponito. Aliud, Sesamum terito & rosaceo adstillato imponito. Aliud, Vitis folia cocta trita cum mulla aqua imponito. Aliud, Folia ricini contusa & in octo aquæ heminas cõiecta sub diuo per noctem exponito & cum aqua caput perfundito, & posthæc descripta tam ante imponito. Aliud, Conyza odoræ fasciculum decem & sex digitorum, in aquæ heminas octo coniectum sub diuo per noctem exponito, & leniter aquam effundito. Utendum & cibi subtractione & uentris euacuatione, somnoq; & quiete. Vitanda autem maxime uinum, sol, & balneæ. Amplius autem & fomenta, clamor, cõtentio, omniscq; mentis perturbatio, & percussio. In loco autem qui probe perfatur degendum est.

Ad capitis dolorem ex frigore. 3

Iriuo ungento calido caput irrigato. Vtere etiam lanis ac linteolis in eo madefactis. Aliud, Laurino ungento similiter utere. Aliud, Farina cocta cum aqua mulla utitor. Aliud, Lauri folia tenera cum iriuno ungento trita capiti infunde. Aliud, Samsuco cum uino trita aut rosaceo similiter utitor. Aliud, Cyperum tusum adipe anserino ammixto, capiti illinito. Aliud, Cornu cerui exurito, eiusq; acetabulo, uinum odoratum dupla mensura ammixto, terito ac illinito. Aliud, Conuenient & fomenta per spongas calidas imbutas & expressas, maxime si lauri folia tenera in aqua fuerint incocta, aut samsuci, aut cyperi, Et lanarum mollium fasciculi ungento iriuno & uino rigati, capitiq; circumpositi, Item tegmina, & tepor, & ciborum subtractio, ac uentris euacuatio. Amplius autem & somnus & quiete, & corporis tranquillitas ac læticia. Vitanda uero similiter clamor, contentio, uini potus, & frigiditas. Hæc quidem auxilia aduersus capitis dolorem ex ardore itemq; frigore obortum Apollonius scripsit. Appellat autem ardorem ex sole æstiuo circa caput facta perseverantē caliditatē. Omnes em homines in sole æstiuo diutius uersantes capite incalescunt, nō tamen omnibus æqualiter caliditas permanet, sed statim quiescit, quibusdā etiam ante balneum, pleriscq; uero post lotionem: quibuscumq; autem permanserit, affectionem capitis ita iuxta habitum nō simplicem modo cõtractum factam putantes, ardorem appellant. Aliquando igitur sola intemperies cõsistit, affectione circa caput calidiorē facta; aliquando uero etiam

A humorum aut uaporū multitudinem ad ipsum caput decurrunt: & maxime quum redundantia quædam humorū, quam Erasistrati sectatores plethoran, hoc est, plenitudinem uocant, in toto corpore oberrat. fit autem hæc quatuor humoribus ex æquo auctis, aut etiā sanguine solo. Nā quū alius quispiam humor redundarit, uelut est pituita, & flaua bilis itemq; nigra, eiusmodi auctio nem siue redundantiam, nō plenitudinem, neq; simpliciter multitudinem, sed cum appositione, pituitæ, aut bilis flauæ, aut nigre, in corpore factam multitudinem dicunt. Cæterum eis qui ex ardore caput dolent, cutis tactui aridior ad primum cõtactum apparet oculosq; rubros habet, frigidiscq; tum perfusionibus, tum illitionibus gaudent. Principio igitur repulsoiuratione utendū est, ex refrigerantibus & adstringentibus cõstante. Postea uero mitigatoria & cõcoctoria pharmaca ad repulsoia ammiscere oportet. Deinde etiā ex discussorijs quicquid addendū, paulatim detractis pharmacis quæ repellunt. Optima sunt autem cõsensa quæ tenuium partium substantia prædita adhibentur. Quæ propter in principio quidem melius est rosaceo probe apparato quàm frigidissimo caput perfundere, lanæ fasciculo in orbem circumposito, iuxta frontem quidem, ubi pilosa eius pars desinit, iuxta utrunq; uero eius latus, ubi pili ipsi aures cõtingunt: & retro in loco post uerticem, nō tamen longe inferius. Neq; em facile exurit capitis ea pars quæ occipit, & græcis Inion appellatur: neq; etiā citra molestiam, refrigerantia sustinet, propterea quod isthic principium medullæ spinalis existat, ad stiptis modū in multos ramulos diuisæ, in sexaginta puto iuxta numerū nervos. At uero regio capitis iuxta sinciput, propter laxitatem coarticalionis iuxta coronalem futurā, & ob osium tenuitatem & raritatē, facile tum caliditatem tum frigiditatem omnium quæ adhibentur pharmacorum in trō distribuit, Quare si uer refrigerare oporteat ex caliditate ardorem, siue calfacere frigiditatem, aptissimus est capitis iuxta sinciput locus. Optima autem in principio refrigeratio ex rosaceo frigido, æstiuo tempore existente, in quo maxime ardoris affectio oboriri cõsuevit. Dicitū autem est mihi de rosaceo iam sepe, quod optimum est ex oleo crudo, quod Omotribes & omphacton bifariam appellant, citra salis admixtionē cõfecto, rosiscq; plurimis in eo maceratis præparatum. Sit autem rosaceum nō uetus, sed eo ipso anto cõfectum, siue in uere, siue in principio æstatis. Proximū à rosaceo chamæmelinum locū habet, in his corporibus quibus uehementem frigiditatem inducere ueremur, qualia sunt sceminarum, & eunuchorum, ac puerorum, & quicumq; molli carne præditi albumq; habentes colorē, solis sunt infueti. Mensuram autem tum rosacei tum chamæmelini, quod ad refrigerationē attinet, ex prædictis corporis habitibus, & ex ardoris magnitudine inuenire oportet, cõsiderata simul ægri ætate, et amibiētis nos aeris tēperie, nō minus autē & domo in qua æger decubit. Refrigerabis autem quæcumq;

adhibere uoles, in aqua uehementer frigida collo-
cata: quæ si nõ adfit, niuem uasculo circumpones.
Hoc auxiliũ siue humorum siue uaporũ multitu-
dinem in caput impetũ faciat, præclare auxiliatur. Re-
pellit enim eos infraq̃ in corpus detrudit, adeo ut
ego in sexcentis hoc mededĩ modo usus, nullo al-
lio habuerim opus. Nã & frigidorum fontiu mul-
ta Romæ ubertas est, & niuis apud nos in Perga-
mo, & in plurimis Asiæ Græciæq̃ ciuitatibus. At
uero in calidis regionibus qualis est Aegyptus, in
qua & fontium frigidorũ & niuis penuria est, ne-
cessarium est præfrigerato rosaceo, per expositionẽ
nẽ sub diũ per integrã noctẽ, & per obuersionẽ
ad auræ alicuius afflatum, ita demũ addere ei sem-
per uiui succũ, aut portulacæ, aut lactuca, aut psyl-
lij, aut polygoni. Quin et solani aliquandã paululũ
& pampinorum uitis, & uuarum immaturarum.
Tales enim sunt adhuc tempore æstatis. A papa-
ueris uero et mandragoræ succo abstinendum, nõ
enim citra damnum refrigerat. uitãda etiam quæ
cum refrigeratione manifeste adstringunt: quare
si quãdo necessitas postulet, parum quiddam ex
eis ad refrigerãtia ammiscere oportet. Propterea
sanẽ & Solani succũ, aut nunq̃ penitus, aut omni-
no modicẽ ammiscemus: sic etiam mali punici, &
mali cotonei, & mespilii. Ad hanc tamen rẽ malo-
rum punicorum acidorũ succus præstantior est,
magis enim refrigerat. Porro quum aliquando ru-
ri degerẽ nihilq̃ horum ad manũ esset, cucurbi-
tæ ramenta exsuccata ad uix immaturæ succum
ammiscui. Poterit autẽ quispiã in tali loco etiã feri-
dis succo uti, lactucaq̃ tum hortẽsis, tũ syluestris,
quam proprie Thridacinen Græci appellant: hor-
tensem enim Thridacem uocant. Quin & moro-
rum succus aptus ad refrigerandum. Sint autẽ nõ
ualde matura. Quod si caluus sit æger, aut omni-
no breues habeat pilos, maxima ubertas refrige-
rantium existit. Quæcumq̃ em̃ ad Erysipelata au-
xiliana scimus ex cataplasmatis & liquidis ceto-
matis, ea omnia ab ardore exussis cõueniunt. Cæte-
rum Apollonius ricini folia tenera tusa in aquã
cõijcere iubet, & deinde per totã noctem uascul-
um in quo cõtinentur sub diũ exponere, & pos-
tera die uti. Ego quidẽ igitur nõ ualde expertus
sum ricini facultate, uerisimile est autem Apollo-
nium qui lōgo tẽpore in Alexandria uixit, per mag-
nã experientiam uisũ eius cognouisse. Atqui ole-
um ex ricino factum manifeste cognouit calidius
esse facultate oleo quod apud nos est: quare
etiã si nõ præsens sit, ueteri utimur. Puto autem &
potamogetonem et Niliacum Stratiotem quiddã
refrigerantium habere, mirorq̃ eorum Apolloni-
um nullam mentionem fecisse. Quin & Tribulus
apud nos, uelut etiã Polygonum, quiddam refri-
gerans habent, tenera uidelicet, & nondum dura
ac sicca facta. Conyzam autem nõ solum refrige-
rare impossibile est, uerum et moderatẽ calfacere
potentẽ noui, & miror sanẽ cur Apollonius eã in-
ter refrigerãtia reuulerit. Quod si et ab arborib. &
fruticibus auxilia ad caput præter naturã calidius
petere oporteat, uitex cõuenientior ad hoc exi-

stit, & uitis, & lentiscus, & platanus, si quis eorum
teneris germinibus acceptis, dein de tritis, ab ipsis
succum exprimat. Erasistratus uero magnũ quod
dã præseruatium in calidis habitib. tradit, quum
uidelicet eos solem perferre oportet. Si spõgiã
latã & densã ac cauam in aqua madefactã,
& probe expressã capiti imponas. Porro signa
dolẽtium caput ob frigiditatem, cõtraria sunt eis
quæ ex ardore oboriuntur. Nam & incõtractã mi-
nimeq̃ arefacta, et decolor ipsorum facies existit,
& frigidus neq̃ gaudent, neq̃ ab eis iuuant. Quẽ-
admodum autẽ ardor non ægre solubilis affectio
est, ita neq̃ frigiditas ex ambiente nos aere cõtra-
cta difficulter curatur si recens est, sed sufficit ole-
um rutaceum calidum, sicuti ut dictum est assu-
m, perfecte hominem liberare. Si uero uehemẽ-
tiori calfactione opus sit, Euphorbium ad oleum
cõijciatur, & quæcumq̃ ex pipere pharmaca con-
stant. Inungenda autem est facies & nares hisce
ungentis, maxime quidem irino & amaracino, &
nardino. Quin & comptoria ungenta ex calfaciẽ-
tiu numero existunt, atq̃ adeo ipsa opulentiarum
fœminarum preciosa ungenta, quæ foliata & spi-
cata Romæ appellant. Opobalsamum uero sæpe
expertus sumus, nullum manifestum cõmodum ad
ullam aliquam affectionem calfactione indigen-
tem cõferre. Quemadmodũ autem rutacẽum cõ-
uenire dixi, Sic etiam samũchinum & laurinum
laudo, itemq̃ serpyllinum, sæpe & in plerisq̃ ipsis
usum. Dandum etiam uinum tenuium partium, &
motus corporis præcipiendus, lauacraq̃ calida, et
quandoq̃ a raphano uomitus.

De inueteratis capitis affectionibus calidis & frigidis. 4

In inueteratis capitis doloribus a calfactionibus
necessariõ pilos radimus, aut ualde ad ipsam usq̃
cutẽ præsecamus, pharmacaq̃ tẽ emplastrorũ ac
ceratorum forma, tum etiam liquida adhibemus:
atq̃ ea quidem quæ emplastrorum ac ceratorum
formam habẽt, rasus penitus adhibemus, liquida
uero his quib. breuissimẽ præfectos pilos habent.
Est autẽ & horum materia multiformis, quod par-
tim quidẽ magis, partim uero minus refrigeratq̃
& calfaciat. Ea igitur quæ frigidificiũt, ex his quæ
erysipelata curant transferenda sunt, calfacientia
uero ex pharmacis calfactorijs cõponenda. Quo-
rum simplicissimum est ex euphorbio preparatũ.
Sufficit autem unciã euphorbiũ unã, ad tres
cerã liquefactã in olei libra una cõijcere. Ven-
dunt autẽ oleo ad omnes affectiones calfactione
opus habentes, neq̃ omphacino, neq̃ eo q̃ uul-
go ab omnibus hispanũ appellatur, neq̃ omnino
eo quod cũ olearũ germinibus præparat. Sed eo
quod ex maturis oliuis cõficitur apud plerisq̃ gẽ-
tes citra germinũ infectionẽ. Optimũ autẽ ex eis
quæ ego noui, est sabinũ, nõ procul ab urbe Ro-
ma in Sabonorũ regione prognatũ. Cæterũ phar-
maca quæ recentiores medici seipsos Methodi-
cos appellãt, Metasyncritica, hoc est, ex alto e-
uocãtia ac trãserẽtia appellãt, ea omnia ad huius-
modi affectiões cõmoda existũt, ex quibus opti-
ma in septimo libro huiuscemodi tractatiõis, que
ante

ante hanc à me edita est, relata sunt. Tempus igitur scit me ad aliam capitis transire affectionē, ad ipsum primo quæ ab Apollonio cōscripta sunt quæ iuxta illius dictionem hoc modo habent.

Quæ Apollonius ad capitis dolorem, ex ebrietate & meri potu, scripsit. 5

Vtendum est omnibus descriptis auxilijs ad dolorem capitis ab ardore abortum. Quod si dolores amplius inualescant, rutæ folia cum aceto & rosaceo trita strigenti crassitudine capiti illinēda. Aliud, Nuces amaras cum aceto & rosaceo ad strigenticiam spissitudinem tritas capiti illinito. Aliud, Iridem siccam ac uiticem aridum cum aceto & rosaceo, eodem adhibe modo.

Aliud, Lauri baccam & rutæ folia cum aceto & rosaceo trita adhibeto. Conueniet autem somnus, fames, quies, corporis tranquillitas. In potu aqua calida, aqua mullā, & euacuatio. Hæc quidē Apollonius scripsit, atq; huius rei gratia laudare uirum decet, quod cum discrimine de unoquoq; auxilio scripsit, quū neq; Archigenes id ipsum fecerit, quæ quū posterior Apollonio natu sit, apponere quidpiā ad discriminum certitudinē oportebat uerū quæ ipse in priore de pharmacis libro cōscripsit, paulo post referent. At uero quæ ego per longam experientiam de capitis dolore ex uini potu cognoui, iam exponā, utpote qui spē quidē utilitatis ipsorum ex affectione inueni, diligētē autem comprobationem per multam experientiam feci. Capitis itaq; dolorem ex uinorum temperatura calidorum productū indicat, quod ipsum caput omnino uaporibus repletur, quandoq; etiam humoribus calida temperie præditis. Nam & citra uini potum eiusmodi ad caput prompte deferuntur. Curatione itaq; opus est, quæ scopum primum uniuersalem & cōmūnem omnibus habeat, nimirum euacuatione indigentem. Quum uero calidi sint qui caput repleuerūt humores, etiam refrigerante eos medela opus erit. Iubendū igitur sunt, si crudum adhuc in eis uinum permaneat, ut tepida aqua hausta uomāt: quod si etiā post concoctionem caput doleant, refrigerantibus utendum est ac repellentibus. Quale est rosaceum per se & cum aceto, aut hederæ aut brasiicæ succo. Quin & ipsa brasiicæ folia calida macerata, capitij circumposita ac obligata, naturaliter ebrietati resistent. Cæterum somni ac quietis cura imprimis habenda est: quod ubi factū fuerit per totum diem, ad uesperam lotū, boni succi cibis, non tamen calcicibus nutrire oportet. Sunt autem tales pitianæ succus, & sorbitio ex alica, & panis ex aqua, & oua forbilis absq; garo: ammifceat autem eis ex melle quantū ad edulcandum satis fuerit. Si uero ad mel accipiendū nō fuerint appositi, sales aromati cōdimentis ad saporē edulcati, pro eo addantur. Ex holeribus est lactuca, utpote boni succi & refrigeratoria, & brasiica, ut quæ uaporē resificet. Sic & ex leguminibus lēs est. Potu uero omnino aqua utendū est. At uero quum stomachus in quibusdā propter aquæ potū subuertat, malū puniū eis insuper exhibendū est, aut solum

A per se, aut cum alica flaccida calida, probe cocta. Quin & mala cestiana appellata in urbe Romana, citra cocturā quidē sunt austera, post cocturā uero stomacho cōmoda sunt. Coquēda autē sunt ipsa in ollam nouā aqua calida infusa, deinde malo in olla suspensio, igne q; sub ollam cōiecto, quo uapor ex aqua calidus sublatus cocturam ipsi malo præbeat. Uuæ passæ etiā et pira, aliqua quidem cruda, aliqua uero ut malum ipsum cocta, stomachū corroborant. Abstīnēdum uero à glandibus palmarū, proprietatem em̄ quamdam habent capitis dolorem inducendi. Quod si uero post hæc probe dormire nō possint, ad balneum postridiē q; celerime inducant, calidāq; aqua eis in balneo sæpe affundatur, deinde ubi dormierit aut omnino nō interposito tēpore quieuerit, rursum ad balneū ducendi sunt, deinde ueluti pridie cōnutricendi. Si uero moderate habeant, & aquā bibere non possint, permittendus est eis potus dilutus ex uinis aquosis, quale est in Italia Sabinū, in Asia Tiacazenū, & Arsyenum, & Ariusū. Quin & moderate habētibus gallorū testiculi, & alæ, & ex piscibus petrosi, & teneris carnis præditi exhibebunt, & columbarū pulli. Hæc uero omnia citra garū & uinum, in albis ac simplicibus iusculis coquant, in quibus aqua sola cū oleo, & anetho, ac modico porro, cocturam perficiat, modico adiecto sale, nō statim in principio cocturæ, sed quum iam aliquo modo flaccida facta fuerit ac uicta. Manifestū uero quod tum hoc, tū omnes qui caput dolent, augete adhuc & uigente dolore, quiescere melius est: remittēte uero ac decrescēte, in locis aptis deambulare. Apti sunt autē his qui calidiori opus habēt loci calidiores, qui frigidiori, frigidiores. Et ante cibū quidē pluribus deambulationibus utendū, post acceptū uero cibum breuius & lenit. Oportet autē neq; multa comedere, neq; statim deambulare, sed post duas aut tres aut etiā plures horas. Quod si quādo ex uaporibus & humoribus in caput sublatis reliquæ quædam relinquunt tenuibus poris ac meatibus impactæ, & ob id etiam capitis dolor perseueret, à rosaceo quidē abstīnere expedit. Utendū est autē primum quidē chamæmelino moderate calido, postea uero in irino: maximo opere em̄ huiusmodi affectiones iurant. In balneo uero caput calida perfundatur, nō solum ob id ut quippiam circa ipsum discutiat, sed & somni cōclīandi gratia, quapropter etiā secundū, aut tertium etiā, ad uesperā balneum apparatus est, acceptis ab eo lactucis ex aceto, modico aut omnino nullo addito garo, uerū aqua affusa multa, ut acetū planē exæquet, nisi omnino aquosum sit acetum. nam & huiusmodi magis q; acerrimo opus habent. Caliditate enim in se aliam quam tale acetum cōplectitur. Post hæc uero postera die, quæ magis caput calcificat adhibēda, ita ut ad irinum aliquando Amaracinū ungetum ad damus, aliquando uero Nardinū. Quandoq; etiā preciosa, quibus opulētē fœmine etiā nihil habeāt malū, uti cōsueuerunt. Per huiusmodi sanē medicatiōis ductū, capitis dolores ex uini potu abortos

in totū perſanaui, nullo ab Apollonio præſcripto pharmaco uſis. Quum enim per ea quæ iam dixi ſcopum cōtingerem, in nullo ab Apollonio ſcriptorū ſpem aliquam poſui, tãquam rite ac probe ab ipſo relata eſſent, & ſuperuacaneum amplius erat eorum experimentum facere. Cæterum poſt prædictas tres affectiones capitis dolorē inducētes, Apollonius quartam hanc inſuper addidit.

Ad dolorem capitis ex plaga, aut caſu. Apollonius. 6

Rofaceo & aceto tepefactis caputrigato.

Aliud, Roſis ſiccis maxime coctis, aut certe in paſſo maceratis, aut aqua muſſa tritis pro cata-plaſmate utitor. Aliud, Meliloto ſimiliter apparatus utitor. Aliud, Myrti albæ folia tenera cum uino & myrrha trita imponito. Aliud, Iri no ungento & aceto illinito. Aliud, Abſinthii um tritum cum uino & myrrha itidem trita imponito. Aliud, Pulegio trita ex uino ſimiliter utitor. Aliud, Pulegium & myrrham trita ſimiliter adhibeto. Aliud, Apij comas cum uino coctas ac tritas imponito. Aliud, Mala cotonea cocta ex uino imponito. Conuenient & fomēta per ſpongias aqua calida imbutas. Et mollium lanarum faſciculi aceto & roſaceo conſperſi. Ad hæc & quies, & corporis tràquillitas. Subtraçtio cibi, euacuatio, fuga eorum quæ offendere poſſunt, qualia ſunt ſol, balneum, uini potus, clamor, contentio, & ex his quæ alimentis loco exhibentur, acida & acria ac falſa. Hæc quidem Apollonius ſcripſit de capitis doloribus ex cōſpicua plaga obortis. Verum operæpretium eſt noſſe nos, eiufmodi affectionem nullam aliam quam inflā-mationem eſſe, quæ non ex plaga ſolum aut caſu, ſed citra etiam manifeſtam cauſam, iuxta omnes corporis partes, propter humorum influxionem fieri conſueuit. Si quidem igitur plaga vulneris aut contuſionis cauſa exiſtat, plures ſcopi erunt ad remediorum inuentionem. Vnus quidem in uulnere, ad quod conglutinantibus & inflā-mationem arcentibus pharmaciſ uti oportet, poſtq̃ ulceris labia fibulis impoſitis conſtrinxiſimus. Alter uero in contuſione, & tertius in doloribus, qui quandoque in ipſis ſolis percufſis partibus ſiunt, plerunq̃ uero etiam ad uicinas partes extenduntur. Etenim pellicula quæ caluariam ambit, & cutis quæ forinſecus circumtenditur, utraq̃ propriam ſubſtantiam cōtinuam habet per omne caput extenſam: & ob id ſanè ſæpe caput ipſum dolere contingit, præſertim ſi utiq̃ ad pelliculam os caluæ ambientem plaga penetret, quam ducta pellicula caluariam ambiente, oſſeq̃ conſcalpto, iuxta concernationis modum curare oportet.

Quod ſi per communionem membranæ caluam ambientis, quam ad duram cerebri membranam circa futuras habet, etiam intra caluariam inflā-matio ipſa diſtribuat, non abſq̃ periculo eiufmodi capitis dolor exiſtit. Contingit autem non parum ſæpe in caſu præſertim ex ſublimi facto, ut quædam circa cerebri aut membranas eius, partes abrumpantur: quod ubi contingit, etiam amplius capitis dolor inualeſcit, ipſaq̃ affectio tota

agre curabilis reddit, & periculum ingens ac præceps imminet. Optimū itaq̃ fuerit in his, niſi ætas prohibeat, et niſi uitalis facultas debilis appareat, a uenæ ſectione irrationis inuitiſi facere, & conuenientibus capitis irrigationibus uti, ex lana nimirum oleo dulci imbuta, capiteq̃ ex ea contecto. Quod ſi quippiam horum, ſiue ætas, ſiue uirium debilitas, aut etiam ambo ſimul, ſanguinis detractionem fieri præpediant, aliu per clyſterem euacuabimus, tum ut ſuperflua in ipſo recremēta extrahamus, tum ut humores qui ad affectas partes in de ferri conſueuerunt reuellamus, atq̃ inde auxilijs ad inflā-mationes cōmodis utemur. Si uero mēbrana cerebri fuerit uulnerata, egregie ipſam conglutināt, inquit Archigenes, calaminthæ ſucus inſuſus, & farina milij arida inſperſa. Deinde butyrum & roſaceum, ac ad eps ſuillus inſuſus uod tuſ, tepefacta ac mixtim inſuſa. Ceterū hoc modo affectos à uino & cibis craſſiorib. abſtinere oportet, maxime ſi febris ſint correpti. At qui prædicta euacuationem cōſulit etiam Apollonius, qualem aut fieri oportet nō oſtendit. At uero acetū roſaceo amiſceri iubet, quemadmodum in phreniticis & letargicis in principio plurimi medici facere conſueuerunt, uerum non recte mēſuram utriuſq̃ dicere reliquit. Empiricorum ſimili tranſiitio ne uſus, nō indicatione dogmaticum. Affectum enim ipſa nobis indicat auxilia. Quantitatem autem ſingulorum, & particularem materiæ differentiam ſimul tum affecta particula, tum ægri temperamentum indicat. Et ad hæc uitalis facultas, deinde ætas, & ambientis nos aeris temperatura, iuxta regiones, anniq̃ tempora, & prædominantem anni conſtitutionem euarians. In phreniticis quidem igitur, quum omnia quæ extra caluariam, circaq̃ cutem & pelliculam caluariæ ambientem ab affectione immunia ſint, ueteres conuenienter acetū amiſcuerunt: ea ratione perſuaſi, quā in commentarijs de pharmacorū compoſitione per longū recenſui: quādo uidelicet ad affectiones in profundo corporis obortas, pharmaca diuerſa ab his quæ ad affectiones in ſuperficie hærentes deſtinata ſunt, adhiberi oportere dixi. Exoluitur em̃ omnium iſporū uis in tranſitione per profundum, & ob id ad propria affectioni auxilia, aliquando cōtrariæ & nocētis facultatis pharmaca amiſcemus. Quum nāq̃ inflā-matio dolorē inducat, maxime contrariū eſt acetū reliquis auxilijs amiſceri, utpote quod neq̃ mitigandi neq̃ laxandi uim aliquā in ſe comeditatur. Sed quū per ſinciput, (neq̃ enim per aliam quampiā capitis partem tranſitus patet) pharmaci facultatem intra penetrare uelimus, tunc ſanè ad amixtionem alioſius eorum quæ propria natura auxiliantur ac in profundum ducunt, deuenimus: tenuium partium ſubſtā-tiam quandā inuenientes, quandoq̃ quidē frigidam, uelut acetū; quandoq̃ uero calidā, uelut euphorbiū, affectione que cura-tioni ſubiactæ cōſiderata ac perſpecta, nū calfacētib. opus habeat an refrigerātib. Iuxta hæc igitur ratiocinationē, ſi quidē cræſſæ cerebri mēbrana

nuda rosaceū offeratur, quemadmodū in his qui bus capitis ofusciorum aliquid excisum esse fieri conseruit, solū ipsum leniter tepescitum adhibemus. Quum uero citra denudationē, per capitis iuxta sinciput partē, sana & integra existente caluaria, rosaceū ad cerebri membranā peruenire uelimus, acetū ei ut eod perducatur ammiscemus, Cuius itē rursus uehemens facultas tum per uiarum trāsitionē, tū per rosacei mixturam exoluif. Quapropter Apollonius in eo quod acetū rosaceo indefinite ammiscere iussit, peccauit. Cutis enim capitū aut quæ post eam est membranæ caluariam ambientis inflammationes, citra quidē uehementem dolorem abortat, per modici fanē acetū ad rosaceum ammixtionem iuari possunt: lædentur autem ubi magna fuerint, dolore quō uehementem induxerint. Deliquit amplius Apollonius, quod neq; tempus usus singulorum ab eo descriptorum auxiliatorum apposuit. Quædam enim incipientibus & nascentibus adhuc inflammationibus auxiliantur. Quædam etiam in uigore consistentibus aut decrescitibus, aut etiam induratis opem ferunt. Rosaceum itaq; cum aceto incipientibus. In uigore uero consistentibus, rosaceum solum adhibemus. Quemadmodum etiam in induratis ablinthiumq; ac pulegium ei ammiscemus. At uero quæ citra indurationē decrescunt inflammationes, pharmacis laxantibus appellatis solum opus habent. Relata est autem tū materia, tū compositio ipsorū in prioribus huiuscemodi tractationis cōmentariis, quos edidimus anteq; hoc opus uisum aggressi. Quapropter affecti loci multam indicationē faciūt simul cū ipsis affectionibus ad inuentionem remediorū. Quum igitur affectiones ab Apollonio descriptæ quatuor sint, quæ capitū dolorem faciunt, ob manifestas causas obortat: deinde uero ex ordine transierit ad eas quæ ex obscuris causis producuntur: merito sanē quis ipsum reprehēderit, nō solū q̄ a dogmatica deficiuerit doctrina, sed quod neq; Empirica sit usus. Distingunt em̄ etiam hi affectiones per symptomatū cōcursum syndromas ab ipsis appellatos, qui sanē accessiōnū ad morbos ipsos cōgregationes sunt, quæ omnibus euidenter apparent: in quibus concursibus etiam externas & læsentes causas ipsi comprehendunt, tanq; partes totius concursus existant. Verum nullam talem congregationem, neq; symptomatum siue accessiōnem, neq; signorum Apollonius scripsit, quemadmodū discemus ubi & ad sequentem uiri doctrinam non minus quam ad priorem animū adhibebimus.

Condependens ex præcedenti Apollonii doctrina, ad temperum ac totius capitis dolores, citra manifestas causas abortos. 7

Vnguento Mendefio caput illine. Aliud, Adipem anserinum Mēdesio unguento dilutum illine. Aliud, Myrrham uino quāto optimo tritā, & ad succi pituitæ crassitudinē redactā illine. Aliud, Myrrham unguento preciosissimo tritam similiter adhibe. In pueris autem sinciput dolentibus, myrrhā cū oleo trita utitor. Aliud, Vi-

aticis semen tritū & aqua dilutū imponito, aut linteola illitū similiter imponito. Aliud, Lolij farina cū adipe anserino contritā pro cataplasma te imponito, adipe prius liquefacto. Aliud, Portulacā per se & cū lini semine tritā imponito. Aliud, Oleq; solia tenerrima oleo ac uino nigro affusō terito ac imponito. Aliud, Cinerē quen cunq; habes aceto aut aqua diluito, eoq; caput rigato. Aliud, Solanum & terrā figulinam trita ac leuigata imponito. Aliud, Halicacabi fructū cum adipe anserino, aut unguento balanino tritū adhibeto. Aliud, Lentisci folia trita ex aqua imponito. Aliud, Blitū tritum ac oleo dilutum adhibetō. Aliud, Ricini semē aqua tritū imponito. Aliud, Coriandri semē & anethi trita ac melle mixta imponito. Aliud, Melanthium tritum ac oleo dilutum imponito. Aliud, Cuminum & adipē anserinū trita imponito. Aliud, Succum papaueris fabæ ægyptiæ cā quantitate, & salis partes duas, & pulegij partem unam, cū aceto & unguento optimo trita illi nito. Cōuenit item cibum subtrahere, & aluum euacuare, caputq; cōtegere, amplius uero & quiete agere, omnemq; motū uitare. Quod igitur Apollonius quemadmodum dixi, indefinite tradēdo hæc remedia ad capitis dolores, dupliciter peccarit; neq; ut dogmaticus uir affectiones explicans, neq; ut Empiricus earū concursus, id ipsum ex illius ipsius dictione didicimus. Quod uero & pharmacorū facultates inter se non parum differāt, ex tota uirum ipsorum persensione discere licet. Et tenim primum ab eo descriptum simpliciter est potentia laxantis. Talis enim est Mendefii unguenti facultas. Secundū uero eandē uim intense possidet, in quo ad Mendefium unguentum anserinum adeps ammiscetur. Tertium autem propter myrrham quidem resicatoriū est, unaq; calcacit, propter uinū uero adstringit, utile his existens in quibus redundantem humiditatem simul repellere ac discutere proposuimus. Scimus porrō myrrhæ odorem plurimis etiam sanis dolorem capitis inducere, quare sanē eos ipsos qui iam caput dolēt non parū offenderit. Eiusdem autē facultatis est & quod sequitur quartum. Quintum uero nō prope ad horum uim accedit, ubi scilicet caraplasma ex aqua & uiticis semine componit, quod non solum ab utraq; facultate tum calefacienti, tum resiccandi, quibus ea præstant, quæ ex myrrha cōposita sunt, multū deficit, sed & contrariū facere potest in his qui caput ob frigiditatem dolēt. Quod uero deinde sequit ex lolij farina & anserino adipe compositū, in quibus resiccare intendimus uti le est, neq; in capite solē, sed & in alijs partibus rationabiliter adhibet, id ipsum uero ob anserinum adipem citra molēstiam resiccantē cōtingit. Ab unde enim pharmiacū hoc & mitigat & sedat dolorem. Verū quod deinceps sequitur, de quo hæc uerba scripsit: Portulacā per se & cum lini semine tritam imponito, refrigeratoriū est pharmaceutū, præclare faciens ad affectiones calidas. Quod uero post hoc scriptū est hoc modo: Olea solia tē

nerrima oleo ac uino nigro affuso terito & impo-
nito, dolorem quidem non mitigat, uerum humi-
ditates succorū euacuat. At uero quod deinceps
scriptum est forti facultate præstat, in quo uideli-
cet iubet cinerē aceto aut aqua diluī, eoq; caput
rigari. Si quidem enim ex aceto præparatur, inue-
teratas affectiones & in scirrhum induratas sana-
re potest, non tamen doloris mitigatiuum existit.
Si uero cum aqua cinis diluatur ac percoleatur, for-
titudine quidem plurimū ab eo deficiet quod ex
aceto constat, neq; tamē sic doloris mitigatiuum
erit. Quemadmodum neq; id quod postea descri-
ptum est, ex terra sigulina & solano compositum.
Superfluum autem compositionem Apollonius
in eo quod ex halicacabi fructu constat, ostendat.
ut pote quod neq; prædictis, neq; postea dicendis
quicquam amplius habeat. Quemadmodum sanē
ea quæ deinceps sequuntur singula aliā facul-
tate prædita sunt. Nō rite autem fecit hæc omnia
indefinite tradendo. Quid enim simile habet cata-
plasma ex blitum cum oleo trito, ad illud quod ex ri-
cini semine, aut coriandrī, aut melanthij compo-
nitur. Calefaciunt enim hæc & resiccant, Blitum
uero debiliter humectat et frigefacit. Porro quod
in fine sermonis ipsius scriptum est, primum neq;
ab ullo in usum assumi experiundi gratia cōsulue-
rim, nedum sæpe. Raro enim cogitur pharma-
cis ex opio uti, quum uidelicet præ doloris uehe-
mentia homo de uita periclitatur. quanquam &
tunc solidæ partes ex eius usu offendantur, adeo
ut post hæc correctione opus habeant. Sic & ex
opio collyria multis detrimento fuerunt, adeo ut
debilem oculum reddiderint, & uisus hebetudi-
nem, Amblyopiam Græcis appellatam induxe-
runt; uelut etiam auditus grauitatē inducunt, quæ
cumq; ad uehementem aurium dolorem ex papa-
ueris succo composita sunt. At uero ob capitis do-
lorem uehementem nemo unq; animi deliquio
comprehensū mortuus est, neq; seipsum occidit,
quemadmodum quidam coli dolore uexati fece-
runt. Ut cumq; enim doleat, longē minor ipsorum
dolor est, quam eorum qui coli, aut auris, aut ocu-
li, aut dentis dolore uexantur. Mitigantur illi ipsi
perfusionibus & cataplasmatum impositione.

*Que Archigenes ad capitis dolorem reme-
dia conscripsit. 8*

Relicto igitur iam Apollonio, ad Archigenē
træsamus, qui in priore libro de pharmacis secun-
dum genus ei inscripto, hoc modo scripsit. Ar-
chigenis ad capitis dolores citra febrem obortos.

Communiter in principio auxiliatur eis aquæ
potus, parcitas cibi, solutio alui. Hæc præfatus de-
inceps pharmaca multiformia conscribit. Præ-
stabilis igitur mihi uidetur singulatim unaqua-
que ipsius dictione in manus sumpta, eam consi-
derare, & primum sanē principium eius collauda-
re, in quo manifeste discrimen à febrī inductum
distinxit. Fuit itaq; & Apollonius non quidē uul-
garis medicus, uelut & Mætiās & Heraclides Em-
piricus, uerum ad diligentiam quam circa artem
fecit, etiā hoc Archigeni accessit, quod postērior

A natu illis ipsis fuit. Cæterum maximum hoc cō-
seri debet, his qui artem quamcumq; tandem ra-
tionalem edificare rite uolūt, quum natura apti ad
eam fuerint, ingeniosi q; & a pueris in primis disci-
plinis eruditi. Pleriq; autem ex his qui eiusmodi
artes tractant, non ut ipsi sapientes in his euadāt,
sed ut uulgo tales uideantur studio habent. At ue-
ro Archigenes ut si quis alius, quæ ad medicā spe-
culationem attinent diligenter edificare studuit,
atq; ob id merito scripta quam plurima memora-
bilia reliquit. Non tamē in omnibus sanē quæ tra-
didit irreprensibilis mihi uidetur, uerum uelut
ipse plerq; eorum uirorum à quibus aditus opti-
mum euasit, reprehendit, sic par est ipsum delin-
quentem à nobis posteris redargui. Difficile eni-
m est ut qui homo sit non in multis peccet, quæ-
dam uidelicet penitus ignorando, quædam uero
male iudicando, & quædam tandē negligentius
scriptis tradendo. Quemadmodum sanē & nunc
mihi in distinguendo non febrientes à febricitan-
tibus peccasse uideō, quū non omnes eorū qui nō
februnt distinctiones & discrimina apposuerit.

De his qui ex stomacho caput dolent. 9

Statim igitur primum in his discrimen est do-
loris capitis ex stomacho producti, Quidā enim
etiā mihi modicus quispiam humor acris in uentre,
& præsertim circa os eius cōgegetur, statim ca-
put dolent, atq; ob id si diutius famem tolerant
offenduntur. Augetur enim ipsis in ediam ferentibus
eiusmodi humorum malicia. Eos igitur qui
hoc modo affliguntur sanare oportet, ita ut nihil
remediorum capiti adhibeamus, quādoquidem
neq; proprius est hic capiti affectus, sed ab humo-
rum in uentre malignos uapores excitantium in
ipsum adscēsu affligitur. Quemadmodum alij in
suffusorum symptomata ob huiusmodi humores
incidūt. Quæ igitur horum erit cura? ut uidelicet
affligentes in uentre humores quam celserrime e-
uacuemus. Euacuantur autem ad uomitum pro-
cliuus facile ab aqua potu, Aegre uomentibus ue-
ro difficilius, adeo ut etiam digitorum siue pinnu-
larum immiissione uenter ad uomitum irritatus,
quibusdam nihil amplius effuderit. His igitur co-
nabimur quāmodum cibum boni succi ac sto-
macho commodum exhibere, si res ita ferat à bal-
D neo: si non, ante balneum tantum cibi offeremus,
ut ne lædantur inde postea lauantes. A coena autē
postridie modicū absinthium in potu dabimus,
eoq; modo in postero diatam ipsis constituē-
mus, donec ualde bene cōcoquentes ipsos uideā-
mus, atq; tum sanē modicum panem eis præbe-
mus circa tertiam aut quartam horam, aut paulō
prius uel etiā serius, ut satis amplum spatium ad
consuetam balnei horam intersit. Quicumq; uero
panem citra obsonium edere non possunt, his oli-
uas, aut palmulas, aut uiuas, aut tale quiddam ad-
demus, per experientiam cognoscendo quid ex eis
præferat, quum aliud alio melius sit iuxta naturæ
propriètatē. Cæterum ad uitiosorum in uentre
humorum redundantiam tum facultatis conco-
ctoriæ debilitas, tum oris uentris infirmitas, pluri-
mum

num cōferunt. Quemadmodum etiā sensuum mollicies & ad hæc caput ad eiusmodi humorum vapores suscipiendos aptū, quemadmodum et in quibusdam oculi. Ego quidem igitur sæpe & in multis expertus sum hanc quam narraui, curandi uisā ad capitū ex stomacho dolorem cōmodam. Archigenes uero quum simpliciter ad omnem capitis dolorem citra febrem, cibi paritatem auxiliare scribat, palam scire se nihil de eo quæ ex bilioso humore oboritur scire. Quod sanè etiam amplius quis crediderit qui postremo eius dictionē legerit, quæ hoc modo habet. Archigenes. In his uero qui ex stomacho caput dolent, flatuoseque distenduntur, acerum in quo papaueris capitā incocta sint affundito, aut spōgias eo imbutas imposito, deinde polentā cū menta & aceto frōti pro cataplasmate imposito. Aut pullegium cū iisdem. Aut solani succum cum rosaceo illinito. Stomachum equidem os uentris appellat, quum & medici hanc partem ita appellare sint aduerti, qui etiā stomachicā animi deliquia appellat, & quosdam stomachicos esse dicit à quopiam uidelicet in eoloco oborto affectu ita appellantes, uelut etiā in hepaticis ab hepate, & colicis à colo, & nephriticis à renibus, & splenicis à splene affectos. Vnam autem ex stomacho affectionem dolorosam scripsit quæ caput occupet, eorum quos ipse flatuose distentos uocauit, quam ex uini largi potum magis oboritur scio. Qui enim propter humores caput dolent, mordacem dolorem, non distendentem percipiunt. Fames igitur in distensionibus cōmoda est, at non his qui mordaces humores in ore uentris habet. Quum itaque hic mordax humor fuerit amarus, pallida & flaua bilis appellat, quæ ob naturalem leuitatem ad uentris os sursum fertur. quæ uero potius uisus, aut acidus, aut saluus fuerit, magis in titu uentris spatium continet, quam quod in ore ipsius firmetur. optimum autem fuerit (quantum sanè nunc in his dicere licet) in fundo uentris ipsum contineri: facile enim relicto uentre in intestinum delabitur. Pessima autē sit affectio ubi uitioli humores in uentris tunicas inelubiliter fuerit imbibiti. Quorum optimum remedium est ex aloë pharmacum, quod aliqui picram, hoc est, amarum, aliqui hieram, id est, sacrum ex aloë appellant: in quo eius compositionē aloës drachmas centum coniungunt, & sex uniuscuiusque reliquorum, quodrum etiam sex numero existunt, cinnamomum, picca nardi, xylobalsamum, mastichechia, asarum, crocus. Præstantius autem fit pharmacum ubi minus de aloë additur. Visum namque mihi est, nimiam eius copiam centum drachmas esse, ad proportionem reliquorum quibus hæc adduntur, quapropter etiam per xc. drachmas ipsum composuit, & per lxxx. Quin & per pauciorum aliquando crocum, propterea quod quidam ex eius usu capite lædantur, quod ipsum sæpe ex solo croci odore perpetitur. Quare optima eius fuerit compositio, quæ ex aloës drachmis xc. & croci drachi. v. constat. hæc ego uitor. His uero qui nec croci odorem citra molestiam ferunt, sed ita

Galen.

tim capite replentur, ex quatuor croci drachmis pharmacum compono. Cogor autē assidue hoc pharmacum præparare, propterea quod non solum his de quibus iam dixi, sed & suffusorum speciem patientibus, aut etiam alia symptomata ex stomachi affectione habentibus, id ipsum exhibeam, & præterea his qui aluo adstricta laborant, & mulieribus, quæ non probe purgantur. In quibus maiorē efficacitatem habet, ubi aloës drachmæ lxxx. & croci vi. fuerint cōmissæ. præstat autem & carpesium pro asaro conijcere, quantū etiam utriusque coniectis aliquando cōposuerim. Datur ad summum ex pharmaco hoc drachma una, cum aquæ calidæ cyathis non pluribus, quam tribus. Minimum uero dimidium eius præbetur. Datur & intra hos modos, quantitate iuxta ætatem, corporis magnitudinem, & anni tempus permutata.

Quæ Archigenes consequenter ad primam dictionem scripsit in quibus est etiam Galeni censura. 10

De his quidem igitur qui caput ex stomacho dolent hæc suffecerint. Transendum itaque iam ad ea quæ Archigenes post primam dictionem deinceps scripsit. Faciam autē iuxta singula ipsorum consimilem expansionem qualem circa primam feci, cōnectendo ad ipsa propter rerum cōsequentiā etiam ultimam ipsius dictionem. Sed nunc à secunda initium faciam. Archigenes. Irrigationes autem siquidem à frigore aut hyeme patientur, conueniunt, oleum tepidum. Et, Illitio narium, succus à baccis lauri expressus, aut oleū laurinum, aut unguentum Syriacum, aut cicinum, aut styracinum, aut gleucinum, aut tale aliquod aliud calcaforium. Vigigitur à postremo exordiar; opinor ipsum resinam quæ sua sponte emanat dicere, quæ plurima in Lacedæmone provenit, & Capnelæon, hoc est, oleum fumosum Ciliciæ, & Ammaracinum ac Styracinum in Cyzico, & quod in Perga apparatus irinum: His uero unguētis nares oblinere operæpretium ducit, quo per odore ipsorum caput calefiat, quod ipsum inde euenire manifeste apparet, adeo ut & idiotæ uulgo his utantur, & maxime eis quæ facile parari possunt: Parabilia autem sunt alijs alia, quæ uidelicet apud singulos redundant. Et apud nos sanè in Asia agrestibus & ruri degentibus hominibus cedrinò appellato uti mos est, & si quando eius inopia sit pisse-læo, quo nomine id appellant quod ex oleo & liquida piccè constat. Ammiscent autem tum huic, tum cedrinò, oleum aliqui plus, aliqui minus, in quantum uirium ipsorum uehementiā exoluere uelint. Vtuntur autem omnibus quæ dixi et circa caput, & præsertim circa sinuiput ueluti dixi. Illintur & frontem ex eis, & aurium meatus: quidam etiam uestigia pedum, ac sedem. Caterum quum Archigenes succū à baccis lauri expressum dicit, quod simpliciter laurinum dicitur ipsum nominare putandum est, uelut id quod oleū ammixtū habet, laurinum oleum appellatur. Syriacum uero unguentum, eum dicere Comagenum existimo, quando quidem id ipsum nobis ex Syria apportatur. Archigenis: Aestate uero aut ubi aliās æstuose di-

tom. 5

y

stendun-

stenduntur, per acetum & oleū, aut aquam & rosaceum. Amplius uero & per polygoni succū, aut portulacæ, aut solani, aut aliquo alio ex refrigerantibus irrigato, spōgiasq; posca imbutas capiti imposito. In hoc sanē sermone uidebitur forte quibusdam negligentibus, unam simplicē affectionem Archigenes curare, uerum nō ita habet. Ex eo enim quod æstuose dicit, calidam affectionem indicat: ex eo uero quod addit, distenduntur, affectionē quę hoc modo à flatu uentoso affligitur ostendit: ut nō solum secundum intemperiem mutata sit, sed etiam uaporosi flatus redundantia adsit. In principio itaq; in eiusmodi utriusq; affectionibus, refrigerantium auxiliōrum facultas apta est, quę intemperiem calidam refrigeret, & uentosi flatus allationem repellat & retundat. Atque mea quidem opinione præstiterit diligentior rei inquisitionem facere. Aliquando etenim ex corpore uētosus flatus affertur, quemadmodum in doloribus capitis ex stomacho relatum est. Aliquando uero in ipso capite generat. Venter nāq; interdum ægre solubili modo inflatur. Interdum uero etiam post ipsum sita intestina, quandoque quidem ieiunum, aut tenue intestinum, quandoque etiam cōlum. Nihil igitur mirum est, neq; impossibile eundem affectionem in quibusdam iuxta caput partibus obortam, uentosum flatum generare, cuius generationis in locis circa uentrē causam inuenimus, tanti caloris inopiam, ut ex cibus ac potibus uaporosum, & uētosum flatum generet, propter infirmitatem uero comprehensiuę facultatis, interna ita affectarum partium capacitas inflatur & expleatur, ut propter expletionem quidem distendatur, propter tensionem uero dolore afficiatur. Inuentum equidem & hoc nobis in commentarijs est, in quibus communes & generales dolorum causas cōsiderabamus, quod ob dissolutionem continuitatis similiarum partium, dolor oboritur. Dissoluiunt autem ipsam erodentia, dissecantia, distendentia, & uehementer calidantia ac refrigerantia. Quapropter in doloribus circa caput, ægros interrogare consueui, qualenam eorum qualitas sit. Quidam enim uelut erodantur corpora, doloris sensum percipiunt. Quidam uero uelut distendantur, aut grauentur, aut tundantur, aut solius uehementer inualescentis caliditatis aut frigiditatis. Si quidem enim uelut erodantur aut pungantur senserint, uel humorum uel eiusmodi flatus a credo, causa putanda est. Si uero citra morbum distendantur, repletionem distensarum partium, uel per uentosum flatum, uel per multi humoris influxum, causam putabimus. In quo genere & inflammatio & erysipelas existit. Inflammatio quidem ubi inflammata corporis pars multum sanguinem in se continuerit. Erysipelas uero ubi biliosum continuerit humorem. Quod si ex utrisq; redundantibus pars aliqua expleatur, aut inflammatio erysipelata, aut erysipelas inflammatum oboritur. Et ne quis putet nos longū sermonem de una particula iuxta unū symptomata affecta facere. Cōmunis em̄ omnium dolo-

re affectarum ratio est, quam si quis diligenter in articulos digesserit, promptior ac expeditior ad auxiliōrum inuentiōem, in omni affecta parte fuerit. Artis etenim curandi cōiectura in affectionum cognitione maxime consistit. Quę ubi inuētæ fuerint, curationem nō cōiecturaliter sed scientificē indicat, cum hoc quod & cognoscere datur, quām ægre aliq̄ue affectiones medelis cedat, in quibus rationaliter iuxta indicationē remedijs utimur, etiam si nihil efficere in principio appareant. atq; hoc est quod in aphorismo dictum est, in quo ait, Omnia secundum rationem faciēti, si iuxta rationem nō succedat, ad alia transeundum non est, sed perseverandū in eo quod uisum est à principio. Aliquando enim adeo uehementer in angustijs meatuum flatus uaporosus infarci- tur, atq; eo adhuc magis uiscosus uero crassus humor, ut multo tempore opus sit ad curationē. Etenim quę sic infarta sunt attenuare oportet, meatusq; dilatare per quos excernantur, habita simul prouidētia nequid aliud, puta humor aut eiusmodi flatus, amplius influat: & ad hæc corroborandum est affectum membrum, ut neq; ipsum uētosum flatum gignat. Qui igitur primi ad eiusmodi affectiones pharmacā composuerunt, merito uaria materia opus habuerunt: si quidem influentem substantiam siue humor, siue uapor fuerit, repellere necessarium existit: impactam uero concoquere & attenuare, eandemq; ipsam discutere: atq; nihilominus, imō magis circa affectam partem firmitatem inducere, ne uidelicet quod influit fuscipiat, attenuatum uero excernat, impactumq; concoquat & attenuet. Verū in mixtura pharmacorum hac facultate præditorum, alius alio feliciter cōiectura usus, alius minus, alius magis commo- dam fecit compositionem. Quapropter uelut notis, ad uos enim sodales loquar quibus maxime hæc scribuntur, Duo omnino uidistis mihi preparata pharmacā eundem effectum promittentia, quandoq; etiam tria & quatuor, & ex horum mixtura in ægre curabilibus affectionibus à me sæpe quod oportuit, factum esse. Considero namq; in quo eorum sit simplex pharmacum amplius calfaciens, aut frigefaciens, uel ut etiam resiccans, aut humectans, aut tenuium partium, aut crassarum, Deinde cōtemplans quid effecerit quod ægro iam fuit admotum, secundum usum aut per aliud quoddam, aut per hoc ipsum facio. Sæpe quidem ad aliud quod idē promittit transeo, aliquando uero utraq; cōmitto, ac medium quiddam ex eis conficio. Talia autem omnia abunde à menō uniuersum tantum, sed & particulatim in medendi methodo relata sunt, nosseq; oportet, quod & iam ante dixi, hanc tractationem illam sequi, & cogor tamen etiā nunc rursus meminisse, quomāgis ea quę isthic tradidi affequamini. In prædicta itaq; affectione, calore doloroso prædominante una cū flatu uentoso, in principio quidē repulsoria curatione utendū est, quę ex refrigerantibus facultate cōstat: quod ubi moderate factū est, ex mitigatorijs ac cōcoctorijs quippiā ammiscere adre-

pulsoria oportet. Deinde etiam discussoria addenda, ita ut paulatim repulsoria pharmaca detrahamus, donec ad contrariam mixturam perueniat pharmacum ei quā à principio habuit: hoc est, ut plurimum quidem discussorium sit & attenuatorium, Minus uero concoctorium & mitigatorium, minimum autem repulsorium. Portulacam quidem igitur refrigerantis & aquosae substantiae esse didicisti. Minus ea polygonum. In solano autem tantum ammixtum esse crassae & terreae, quantum ad frictionis. Acetum uero repulsoria simul & attenuatoria, imò & discussoria habet facultatem, ut pote in temperatura à tenuium partium frigiditate exuperatum, quemadmodum exacte serenus aquilonaris aer. Didicisti etiam rosacei facultate, quod uidelicet & repulsorium quiddam habeat, habet autem & concoctorium et mitigatorium, et ad haec etiam discussorium. Merito igitur Archigenes in praedicta affectione eiusmodi pharmaca utitur, ipsum quidem per se solum acetum neque alibi exhibens, neque hic, ob facultatis ipsius uehementiam, ammiscet autem ei uel rosaceum uel aqua. Transseamus autem iam ad sequentem Archigenis dictionem. Archigenes. Si uero augeat affectionem, perfecta cibi abstinentia cogrua est. Deinde uena sectio è cubito, & alui euocatio per ualidum clysterē. De his auxilijs dictum à me prius est, quando Apollonij dicta considerabam, ubi sanè in biliosis causis fami renūciari, uelut etiam uena sectionem in pueris & senibus ac uiribus debilitatis fieri prohibuit: laudari autem euacuationem per clysterem, non solum propter euacuationē eorum quae intestinis continentur, sed etiam ob reuulsionem eorum quae ad caput feruntur: atque ob id probe in his quae scripsit Archigenes non simpliciter dixit, Euacuatio alui per clysterē, sed addidit ualidum: multum enim in huiusmodi clysteri situm est, quantum ad reuulsionem attinet, ultra hoc quod non solum ea quae circa uentrem et Mesaricum sunt euacuat, sed etiam quae circa hepatis sima haerent. Archigenes. Irrigationes autem, Ruta cum aceto & oleo trita. Memores affectionis ad quam auxilia scriberis proposuisti, sic iudicamus unumquodque eorum quae conseruere coepit. Affectionē itaque sic scripsit. Aestate uero aut ubi alias aestuose distenduntur. Deinceps uero refrigerantis facultatis auxilia subiecit, & postea inquit. Si uero augeat affectionem, perfecta cibi abstinentia, & uena sectio, & clyster ualidus adhibeatur. & post haec propositam conscripsit dictionem, in qua cum aceto & oleo tritam rutam adhibere iussit, non apponens an uiridem an aridam uelit. Est enim non parua differentia, quum arida multo acrior & calidior, quam uiridis existat. Mihi sanè uiridem conseruare uidetur. neque enim acuatim à refrigerantibus ad contraria transgressus est. Acetum uero ad hoc quod refrigerat et repellit, discussorium quid habere antea dictum est. Mitigatoriae autem & laxatoriae facultatis existens oleum merito ipsis ammiscuit. Alia, Succus à lauri baccis expressus cum aceto et ruta. haec priore longe efficacior existit.

Galen.

A Ad succum namque à lauri baccis expressum fortiter calcificantem, rutam ammiscuit cum aceto, relicto oleo. Alia, Succus radicum iridis cum aceto. Hoc remedium nihil calfactorium habet, melius itaque fuerat ipsum primum in transitu ad praecleariora auxilia positum esse. Alia, Salicis folia trita cum aqua. Hoc prescripto ex iride imbecillius est, atque his quae omnium primum scripta sunt simile, ut in tempestiue nunc ab eo sit relatum. Alia, Serpyllum cum aceto & oleo tritum. De aceto & oleo prius dictum est: adiecit autem nunc eis serpyllum acris qualitatis pharmacum, et ob id etiam calfactoriae facultatis. Negligenter uero etiam hic reliquit, an uiride aut aridum uelit praestiterit autem fortassis iride intelligere. Alia, Polygonum cum ruta oleo & aceto dilutum. Polygoni succo iuxta primam rationem ut refrigerante uisus est, nam & reuera talis existit, Quare etiam ad inueteratos dolores iuxta primum transitum rationabiliter quis eo utetur, ruta ammixta. Animaduersione autem dignum est in singulis contrariae facultatis pharmacorum mixturis, ut in principio parum ex praestatiore ammiscamus, iuxta secundum uero & tertium usum, copiam augeamus. Alia, Amygdalae amarae delibratae tritae cum aceto & oleo irrigationis modo adhibita, aut cerati crassitudine in linteolo fronti imposita. Et hoc ad primum transitum pertinet. didicimus enim discussoriam citra mordacitatem facultatem amygdalas amaras habere. Alia, Ruta syluestris cum oleo & aceto eodem modo. Inordinate rursus hoc ualde forte pharmacum interposuit, in doloribus multum inueteratis merito adhibendum. Alia, Populi albae fructus cum aceto tritus. Discussoriae facultatis est albae populi fructus. In quibusdam autem exemplaribus non cum aceto, sed cum posca, scriptum reperitur. Alia, Ocyini semen cum aqua. Ocyini semeni calfactoriae & attenuatoriae est facultatis, non tamen uehementer. cum aqua uel sola inueterata affectione minime rationabiliter quis eo utatur, melius etiam erat oleum & acetum, uelut in alijs dixit, etiam huius ammiscere. Alia, Facit & balsamum, peucedanum, castorium, simul & singulatum unumquodque cum oleo & aceto. Hoc pharmacum rursus uehementius est, maxime quam ipsum peucedanum solum adhibeat, citra castori ammixtionem. Quid uero balsamum nunc uocet, non habeo dicere, Num uidelicet plantae semen, aut succum quem opobalsamum uocant, aut ramulos ipsius xylobalsamum appellatos. Melius tamen mihi uideatur opobalsamum accipere, quod tenuius partium & discussoriae substantiae existit, non tamen manifeste calentis. Alia, Lauri folia, & populi albae & uiticis cum oleo & aceto. Et hoc pharmacum ex simplicibus facultatibus differentibus compositum: lauri enim folia calidissima, uiticis uero moderate refrigerantia sunt: in medio utrorumque populi folia existunt. Alia, Panace cum oleo illinito. Nihil hic refrigerantiu ammixtum est, & ob id ualde inueteratis affectionibus & nihil amplius editatis habentibus utile existit, Quapropter me-

tom. 5

y 2

rito

ritò quoque ipsum reprehenderit citra distinctionem pharmaca auxiliaria describentur. Panacem uero negligenter nunc ipsum dicere puto, panacis radicem, neque enim opopanax putandum est ab ipso panacem dictum esse. Differt autem à radice hic non paruo caliditatis excessu. Alia, Viticem aut mentam, amygdalas amaras, iridem, æquali mensura cum aceto & rosaceo mixta adhibeto. Aliorum uires supra relatæ sunt. Mentæ autem nunc primam mentionem fecit, pharmaci causa factoria facultatis. Alia, Aut mororum succo cum aceto ammixto trigato. Hoc pharmacum euidenter apparet refrigeratum medicamentorum generis ab ipso descripto- rum esse, quæ incipiente affectione conueniunt, minimeque recte nunc ad pharmaca auctis affectionibus commoda, ammiscuntur. Alia, Inueterata autem affectione pilis denudato, illitionibusque & rigationibus prædictis, crassius tamen apparatus uitior. Alia, Resinam cum melle temporibus & fronti illine. Aut muscerdas cum aceto & rosaceo. Tertium hoc tempus est & oportunitas in capitis remedijs adhibendis. Primum namque erat incipiente affectione. Secundum uero ut ipse scriptis augefcente. Tertium autem hic quæ aut inueterata, quod ipsum uehementioribus auxilijs opus habet, quorû aliqua non recte prioribus, ammiscuit.

De his qui ob biliosum humorem caput dolent. 11

Signa in his similia sunt eis quæ ex ardore oriuntur, accedit his maior morsus & faciei pallor, & aliquando oris amaritudo. Aetati autem uigoris, & temperaturis calidioribus, & uitæ curiosæ, & his qui flauâ bilem cõgregant, hæc affectio præcipue cõtingere solet. Itaque balnea temperata, & uicinos, et potus dilutus eis exhibenda sunt, omnesque diæta liquidior & boni succi constituenta. Euacuandus item biliosus humor per absinthij cremorè, aut per aloë, et per ipsam picram antidotum per se datam, aut modica addita scamonia, uel per catapotia ex aloë confecta. Illinenda frõs pastillo croceo aut Trigono appellato, aut aliquo alio his consimili.

De dolore capitis per consensum. 12

Si quidem uniuerso corpori caput per consensum coafficitur, illi prospiciendum, tum in temperari, tum materia prædominanti instando, easque urgendo. Et si quidem humorum multitudo & maxime circa uenas fuerit, uenam secabimus. Si uero qualitas magis inualuerit, purgatio pharmaco utemur. Si uero uel alicui parti condeat, uel hepati, aut uentri, aut stomacho, his ipsis auxiliabimur: calida quidem in ipsis subsistente in temperatura, panem ex uino diluto exhibendo, & for- bitiones ex alica. Et foris irrigationes moderate refrigerantes & firmitatem addentes, uelut antea dictum est. Si uero propter uiscosos & crassos in stomacho contentos humores, caput doleant, etiam hoc exturbabimus, acetum mulsam in potu præbendo, tum simplex, tum lulianicum appellatum. Ex hyssopo etiam ac origano potionibus, & quæ his adhuc fortiores sunt magisque incidendi prædictæ, utemur, & uomitu à raphanis, irrigationibusque ac cataplasmatibus calidioribus.

De capitis in febribus dolore. 13

In doloribus capitis qui in principio cum febris irruunt, uena secanda est post primam aut secundam remissionem, nisi quid impediatur, & præsertim in corporibus bonæ habitudinis & multo sanguine reudundantibus. Animaduertendum autem non uapores à uentre sublatos, aut ob aliu suppressionem capitis dolor contingat. Quod si serius post septimum tadem irruat diem, aluo per clysterem qui aliquid opere pretij faciat præuacuata, cucurbita ad occiput siue ceruicem affigatur, caputque rigationibus ex oleo mitigetur, rosaceo quidem in calidioribus ac hora aestiua, et cum modico aceto, Chamamelino uero in frigidioribus habitudinibus ac hyeme, quinta acetii parte adiecta. Illinenda frons ex cyphi in frigidioribus, ex crocomagmate in calidioribus. Cætero ad capitis dolores ob febris magnitudinem abortos, medelæ præscriptæ sunt in febrili tractatu. Porro uitare oportet hæc, non solum in dolore capitis per consensum stomachi abortu, sed omnibus etiam alijs circa caput abortis affectionibus. Sunt autem ea quæ sequuntur. Viticis semen, absinthij succus, lac in potu, glandes quercinæ in cibo, oliuæ nigrae, arbuti fructus maxime cylon Græcis appellatus, erui, quod ipsum etiam articulos dissoluit. Amplius autem ostendunt myrrha, thus, hederæ cacumina. Mentem etiam perturbant iustici fructus, crocus, peucedanum, cyclaminus sicca cum uino potata. Stryax modicus quidem potatus tristitiam uultus discitit, multus uero somnos multum turbolentos inducit.

De Cephalæa capitis dolore antiquo. Cap. 11

Cephalæa inueteratus & ægre capiens capitis dolor appellatur, qui ex facili occasione, maximas exacerbationes habet, adeo ut neque strepitus, neque uocem uehementiorem, neque lumen splendendum, neque uini potum, neque odoramenta caputre plentia tolerare possint, neque item motum, sed in quiete et tenebris ob dolorum magnitudinem decumbere uelint: tanquam à malleo enim pertundendi sibi uidentur. Quidam enim uelut contundantur aut distenduntur ea quæ circa caput sunt sentiunt; non paucis uero usque ad oculorum radices dolor progreditur. Habet autem hæc affectio aliquando quidem continuos dolores, aliquando uero exacerbationes & interualla siue ordinata, siue inordinata. Intermittunt enim quandoque eiusmodi exacerbationes, uelut in comitali morbo apprehensis, interceditque tempus aliquod quod omnino accusari non potest. Manifestum igitur est hæc affectionem consimilem aptitudinem capitis ut facile lædatur, uelut in cephalalgicis habere. Verum maiorem debilitatem deueniunt in hac affectio capitis partes. Et quidam ex eis cerebri inuolucra dolitant, quidam uero membranam tantum caluaria ambientem. Dolores igitur cum grauitate, humorum multitudinem significant, cum mordacitate uero, aut humorum aut uaporum acridinem, cum pulsibus aut inflammationem: cum tensione uero, si quidem citra grauitatem & pulsus fiat, status tenuis & uotosi multitudinem demonstrant; cum pulsibus uero membra

mēbranosi corporis inflammationē. Si uero cum grauitate diffūso fiat, humorū multitudinē intra mēbranulas cōtentam. Et dolores quidē in superficē harentes, mēbranæ os caluæ ambicntis affectionē significant; qui uero in profundo sunt, cerebri inuolucrorū. Quibuscūq; em affectio intra caluariā est, his usq; ad oculorum radices dolores procedunt, propterea quod oculorū tunicę ex cerebri inuolucris habeant ortū. Si uero humor putrefactus calidior fiat, cū febrī caput doliāt: febrī citant aut omnino & qui ex inflammatione dolent. Si quidem igitur humorū aut uaporū multitudinē repereris causam, si quidē propter totius corporis repletionē facta est, uniuerso corpore euacuato capitis dolorē sanabis. Si uero uelut debile existens caput ad se iūblatos humores ac uapores suscepit, materiā reuellere oportet in totū corpus, atq; ita particulā mederi. Per clysteres itaq; reuulsio fit, & ligaturis extremitatū, & pluribus infernarū partium constrictioibus. Interdum etiā sanguinis ex cubito detractio. Quod si amplius sanguis redundare uideatur, etiam ex naribus aperta uena, & quantū sufficere uideat sanguine euacuato. Deinde hierā dabimus exacutam, & postea apophlegmatissimis pituitā detrahētib. & medicamentis quæ naribus indunt utendū est, qualia sunt quæ ex elaterio & cyclamino cū lacte & pitro apparant. Caput autē curabis, quādo quidem reuulsorij uti oportet, per reuulsorias irrigationes. Ceterum post totius corporis euacuationem, iam caput euacuanti ueris, deinde his quæ firmitatē addere possunt ad motis. Repellit igitur oleū omphacinū, & rosacēū, per se & cum aceto, & ex papaueris capitibus, & oleæ teneris germinibus, & hederæ cacuminibus, ac menta ut ridi apparatur. Afferantur autē remedia tepida quidem, ubi frigidior & crudior fuerit humorum multitudo, frigida uero ubi calidior & biliosior extiterit. Discutit autem oleum dulcissimum calidum, & magis inueteratum, itemq; sicyonium. Si uero crasior sit humorum multitudo, spondyliū, aut serpillum, aut pulegij comā aut calaminthen, aut mentam oleo incoquendo, multitudinē euacuabis. Ea dem hęc etiam firmitatem parti addūt, quapropter usq; ad perfectam curationem eis uti conuenit. Omnium porro lōge maxime discutit & perfecte corroborat, uerbenaca recta maxime uiridis, imō & arida cum radicibus & simul cum serpyllo, oleo incocta. Coniicienda etiam ad ea crocodiliadis maximæ iuxta aquas nascentis radix. Quin & ipsam per se uerbenacam si oleo incoxeris, caputq; inde rigaueris, omni capitis dolori antiquo ex frigiditate, aut ex crasis humoribus orto medebertis. Maxime etiam profunt sub aqua riuo uase nascentes aselli, Millepedę appellati, si oleo incoquantur.

Archigenes de Apophlegmatissimis. 2

Post hęc uero Apophlegmatissimi quib. pituita à capite detrahīt, ex sinapi aut hyssopo cū passo cocto, aut ex staphide syluestri cū pipere & melle trita, aut ex oleo ammixto melle, aut ex staphide

Galen.

A syluestri per se uel cū melle trita, cōueniunt. Galenus. Pharmacorū quę pituitā à capite euacuat, & medicis pro more Apophlegmatissimi appellatur, materiā postea referā. Nunc autē tantū ostēdere cōmodum fuerit, qd hocce auxiliū pituitā infestā auxiliare est, quemadmodum sanē & ipsum nomen eius apud Gręcos ostēdit. Archigenes autem calidā & flatuosam affectionē se curaturum pollicitus est, non frigidā & pituitosam. Archigenes. Iuuant aut plurimū lauri, aut rutæ, aut pānacis, aut papaueris capitum, aut baccarū lauri de cocto perfusi. Galenus. Fortibus calefacientibus pharmacis, nō scio quomodo papaueris capitā non infrennue refrigerantia annumerauerit, quū in sermonis cōtextu singulis dictis aliquem per se uti posse ostenderit, & foras etiam aliquando simul mixtis: nō tamen manifestū fecerit, num quippiam ex papaueris capitibus ipsi adficiendū sit, quo uidelicet aliorū pharmacorū uehementia minuat & mitigetur: an & solis aliquando utendum sit, quod sanē incipiente & augete affectione tempestiuus fieret. Inueterata em affectio nō solum nō profunt, sed etiam nocentiora capita papaueris existunt. Archigenes. Cōmodum est & ex salibus fomentū. Galenus. Omnem rationem Archigenes hic cōfudit, quum fomentū mentionem faciat per pharmacū resiccans quidem non strennue, uerū & calfactorium quiddam in se habens. Meminisse em eum oportebat, qd quum calidā affectionem curare assumpsisset, aut semper ab illa ipsa indicatione seruaret, aut de trāsmutatione in diuersam speciem quippiam diceret, iuxta quam temporis progressu calore se dato, obturatio, aut intensio, aut tale quiddam accessisset, quod cōtraria curatione indigeat, et nō ea quæ in principio fuit determinata. Archigenis. Post perfusiones uero aut fomenta suuatur si lini semen rosaceo infartum adhibeas, & lanas sordidas ex aceto rosaceo calidas circūponas ac obligeas. Galenus. Hoc mitigatiuum est auxiliū, quum uehementer infestat dolor, unā cum hoc quod & subiectæ cōmodo det affectioni. Quare ubi ad intensum capitis dolorem remedia scripsit, isthic præstitit etiam de hoc fomento mentionem facere, Verum pro præsentis temporis oportunitate, de qua nunc sermo instat, si quis fomentis aut cataplasmatibus uti uelit, fomenta ex melio meliora fuerint. Quemadmodum em Hippocrates ait, leue & lenem miltū existit. Sales uero ob grauitatē molesti sunt præsertim capiti admoti.

De cataplasmatibus in capitis dolore. Archigenis. 3

Cataplasmatibus uero utere ordeacea cruda farina quæ iridē cōrusam habeat ammixtā. Aut rutæ semine eodē modo. Aut foeniculi radice similiter. Aut cruda ordeacea farina cū aceto mulsio apparata. Aut polenta & pulegio mixtis. Galenus. Et hęc cataplasmata ad secundā temporis oportunitatē perinēt, quā supra augete capitis dolore constituit, nam & hunc mitigat, & affectionē iuuat. Archig. Aut Nilei pharmacum castorij & iridis decima parte ammixta, cū aceto &

rosaceo imposito. Nilei quidem igitur pharma-
cum quod ad emplastri formam paratum est, iam o-
lim nobile & laudatum pharmacum est, & ob id
omnibus notum. Promittit autem reliquiarum infla-
mationum in precordijs inueteratarum cura-
tionem. Verum corum quae ei ammiscentur castorij
delicet & iridis Archigenes obscure mixtionem
conscripsit. Incertum enim num alterius ipsorum
decimam Niliaci malagmatis partem esse uelit,
an utriusque. Verum mihi praestabilius uidetur utri-
usque decimam partem ammiscere. Oportet autem ca-
storium atque iridem probe trita esse, & Nilei phar-
maco diligenter emollito paulatim haec ammisceri,
manibus partim rosaceo, partim aceto madefa-
ctis. Aut nuces amaras decorticas, & rutam, ac
parum ex iride, cum aceto & rosaceo committito,
& malagmatis forma imposito. Quum eiusmodi
multa pharmaca circa secundum propositam affec-
tionis tempus Archigenes conscripserit, facultatis ip-
sorum expositionem in illis feci. Aut uiticis femi-
nis, per se uiridis foliorum & myrrhae, aequales par-
tes cum unguento Aegyptio fronti cataplasmatim
modo imposito. In sola Alexandria per se arbo-
rem uidi, & in nulla alia Romanis subdita gente.
Quidam Persion ipsam appellant, aiuntque in per-
sis lethalem eius arboris fructum esse, qui in Aegy-
ptiorum regione innocuus existat. At uero Aegy-
ptium unguentum, non solum sic, sed & Mendesium
nominatur, Quidam etiam Megaleum uocari aiunt,
utroque cognomine a Megalo, qui ipsum compos-
uit accepto: & ab illius quidem proprio nomine
in denominationum forma Megaleum, a patria
uero ipsius Mendesium appellari. Est autem laxa-
torium & sedat dolores. Aut sulphur, castorium,
baccas lauri, aequis portionibus cum cerato rosa-
ceum infarsa, temporibus & fronti imposito. Hoc
pharmacum multum calfacit, & frigidas affec-
tiones relaxare potest. Aut castoreum & peucedanum
pari mensura. Consimilis est & huius phar-
maci facultas cum praescripta. Quod si affectio
perseueret, uene sectione a naso aut fronte, aut cu-
rbitis ad occiput affixis uitior. Sanguinis a lo-
cis affectis detractiones in affectionibus inuete-
ratis conuenire omnes ferè medicis consentunt.
Verum cucurbita ad occiput affixa, ex reuulso-
rij auxilijs sunt, quum humores ad oculos, aut ad
anteriorum capitum partem ferri consuetos auerte-
re conamur. Aut sternutatio quopiam concu-
tito, fasciolaque collo circumposita spiritum colli-
bere iubeto. Utilitatem ex hoc auxilio indicauit,
per uerbi concutito ad affectionem, Quod uero fa-
sciolam collo circumdare iubet, ad uehementio-
rem affectionem pertinere. Aut per nares purga-
to. Hoc praefatus deinceps ea quae per nares pur-
gant recenset. De quibus ego sermonem faciam,
uelut etiam de Apophlegmatismis, ubi pharmaco-
rum: quae capiti adhibentur tractationem absolue-
ro. At uero in uehementer inueteratis, sinapi ut
moris est capiti adhibere & perire. In omnibus plu-
rimum inueteratis affectionibus quum nihil pro-
fecerint reliqua auxilia, curationem Metasyncriti-

ca à Methodicis appellata, omnes ferè adhibere
consueuerunt, prioribus medicis haud scio quara-
tioneatione primū ad eius usum progressis. Ego
uero quum in temperijs quae priam humida & frigi-
da, aut per se ipsam, in partibus affectis adest, aut
propter eiusmodi humorum frigiditatem fuerit obor-
ta, ex sinapi et thapsia ac similibus adhibeo pharma-
ca. Calidis uero & siccis non adhibeo. Ceterum hi
qui affectiones cognoscere non possunt, ad eiusmodi
pharmaca uelut ad sacra appellatam anchoram
confugiunt, & ob id saepe quod conuenit perfici-
unt, quod periosque hominum eiusmodi affectiones
propter malam & uitiatam dietam infectent.

Archigenes, De his qui ex ebrietate capiti dolent. 4

In his qui ebrietate caput dolent, iridem siccam
& uiticis folia ex aceto & rosaceo adhibere. Aut
apij comas coctas ex uino impone. Aut pulegi-
um ex uino eodem modo. Aut Mendesium un-
gentum per se, uel cum anserino adipe irrorare. Aut
myrrham cum uino Mendefio impone. Aut ru-
tae folia, baccas lauri, uiticem, populi albae fructum,
& aequali mensura trita, cum aceto & oleo tepescita
irrorare. Ceterum Amethysta quae ab ebrietate
praeseruent, eiusmodi esse poterunt, Absinthium
mane ieiunis bibendum praebere. Aut myrtiflo-
rem & myrrham ac rutam trita ex aqua. De his qui
ex ebrietate caput dolent satis dictum à me est: quum
ea quae Apollonius ad hanc rem tradidit expend-
derem. At uero post hanc praescriptam Archige-
nis dictionem, alia sequitur de his qui caput exto-
macho dolent, de qua iam dictum est.

*Eiusdem Archigenes amuleta quae capiti coronae modo cir-
cumposita et alligata, dolorem eius arcent. 5*

Quando quidem uero & Amuleta ad dolorem
capitis Archigenes scripsit, quae quidem nullam me-
dicam rationem habent, ea his qui talia per experientiam
cognouerunt, et secundum mirabilem quan-
dam contrarietatem homini incognitam effica-
cia esse dicunt, relinquunt. Quae uero ab eo iuxta
medicam rationem tradita sunt selecta referam
tantum, iuxta illius ipsius dictionem, quemadmodum
hactenus de pharmacis facere consueui. Poly-
gonum duos ramulos coronae modo imposito.
Quod polygonum calidis & flatuosis capitis do-
loribus conueniat, ipse prius dixit. Nihil itaque mi-
rari est in talibus saepe ipsum fuisse. Nam propter ar-
dorem & ebrietatem dolores capitis assidue con-
tingunt. At uero quod duos omnino ramulos esse o-
porreat, ab illis adiectum est quod polygonum utilitatem
ex incognita contrarietate, & non ex ipsius tempe-
ramento procedere uolunt. Aut cichorium quod
Romani Intubum otus appellant, acri capiti im-
ponito, & maxime si ex ardore doleat. Ego uero
etiam apponam, si ex ebrietate. Sic enim & rosa-
ceae coronae iuuant. Eas igitur uolenti itidem lice-
bit adscribere, numerumque quemcumque tandem
uelit addere, & ex totidem rosis nexam coronam
capiti mederi asseuerare. Deinceps Callitricho
coronare caput operapretium ducit, quod Tricho-
manes, inquit, quidam appellant. Ego uero eos
qui de herbis scripserunt Adiantum magis ap-
pella-

pellare Callitrichum teio quam Trichomanes. Deinde paulo post philanthropo herba coronari iubet, & palmule masculę cortice summo. & post hæc, in hæc uerba scribit. Aut aduersus solē agrū expositū, donec dolor quiescat finito. In Amule torū catalogo & hoc ab eo relatū est, quod quidē ex frigidityate dolens caput iuuare potest, si neq; humorib. omnib. æqualiter redundet homo, neq; ex cruditate laboret, aut aliquē uitiatū humorem in uentre, maxime circa cavitatē eius habeat: uerum calidos capitis dolores, ex quorum numero sunt & ex ardore ac ebrietate oborti, nō parū lædēt. Cōsimilia his deinceps scribēs ad chamæme lū peruenit, cuius experiētā habemus q; capitis dolorē iuuēt, si quis eo, uelut ante dictū est, queat uti. Appellat autē Archigenes anthemidem hanc herbā, quæadmodū alij multi, & ait florē quidem ipsius tritum, olfactu prodesse, folia uerō summe nocere. liberat a capitis dolore uerbenaca herba, quā aliqui hierā, id est sacrā uocāt, tū coronā modo circūposita, tū illita ex rosaceo & aceto. Hoc auxiliū oportebat eum nō nūc inter amuleta, sed prius inter medicamenta referre, si quidem adeo ei cōsidiit, per longā experiētā cognito & probato. aut testudinis palustris quā quidā ammyda, hoc est lutariā uocāt, sanguinē sincipiti instilla. et hoc si quidē uerū est, inter pharmaca & cū discrimine referri cōueniebat. nisi sanē hoc uult q; omnē capitis dolorē iuuēt, id q; omni tēporis occasiōe. Ita em̄ & nos cōtrarietatis testimoniū ei præbebi mus, nō efficaciat quā ex tēperamento habet, absoluto igit de amuletis sermōe, deinceps hæc scribit

Archigenis de fissuris & contusionibus in capite. 6

De uulneribus porro in capite factis deinceps dicit. Parua autem fissura facta, aliqui myrrham aceto trita, aut alio cum linamento indunt, glutinaturq; ita & absq; inflammatione mirabiliter adseruatur. Cæterum in contusionibus citra disparationem ac fissuram circa caput factis, polenta imposita commoda est. Amplius uerō et Oesypum, hoc est lanæ sordas, atq; ipsæ adeo lanæ sordibus sudoris succidat, eodem modo. Magis autem proprie similaginem ex aqua pro cataplasmate impones. Aut origanum cum polenta. Hæc utilia iudicata esse quid attinet referre. Verum aliterius negocij atque operis sunt, quàm ut ob huiusmodi causam caput dolentibus apta esse iudicans ea adscripsisse putandus sit. Sed ut quæ obortas inflammationes curare, aut easdem prohibere possunt. Atqui in aliquibus exemplaribus hæc in totum non habentur, uelut in alijs etiam plura his in huncce modum. In mediocribus capitis uulneribus, aut quæ omnino legitimo medico non habent opus, in quibus quidem nuditas perse non adest, pilos rademus, sibilisq; impositis constringemus, ac glutinantibus experimento cognitis utemur. Egregie glutinat uulneratam cerebri membranam, calaminthæ succus infusus, & farina milij arida inspersa, deinde butyro, & rosaceo, ac adipe susillo ueteri mixtis ac tepefactis infusis. In quibus uerō eo denudat

A tum est, diuisa membrana caluariam ambiēte, os ipsū scalpemus, & per futurā adductionem, tanquam non sit denudatum curabimus. Si uerō non permaneant futura, iuxta carnationem uelut etiam aliorum uulnerum curam faciemus. Referetur autem huiusmodi curationis ductus in proprio loco. Cæterum in quibus uulneribus aut propter paruitatem, aut aliā futuris uti non licet, linamentum conuulsium cum aceto & oleo imposito, aut cum myrti succo, aut lentiseci, aut rubi, aut conyza tenuia folia habentis, ad aliquem eorum modico ammixto melle ita ut linamentum ex his imbutum imponas. Et folijs allicuius ex prædictis pro cataplasmate utitor.

B Aut spongiam nouam aceto & oleo imbutam imposito. Aut lanam sordidam eodem modo. At uerō ad ipsum uulnus brassicæ folia apponito, aut potentam aceto subactā per se imposito, aut cum brassicæ folijs tritis. Hæc quidem Archigenes scripsit ad capitis dolorem, discrimibus simul quibusdam additis, quemadmodum etiam Apollonius fecit. Asclepiades uerō uaria quidem pharmaca scripsit, sed eorum discrimina iuxta affectiones non ita multum apposuit, sed saltem in incipientibus & inueteratis, quanquam neque hoc in multis fecerit, sed in primo solum, & postremis duobus. Postrema igitur credere quis possit inueteratis efficacia esse, utpote ex fortibus simplicibus pharmacis composita: primum uerō ob id fortassis solum quis in usum talem adsumpserit, quod papaueris succum non paucum ammixtum habet: huiusmodi autem didicimus, non propterea quod affectionibus prosint, sed quod sensilem facultatem stupefaciant, dolores mitigare solere. Quare etiam ea omnia deinceps a me conscribentur.

C *Que Asclepiades ad capitis dolorem in primo extermorum scripsit. 7*

Ad recentes capitis dolores irrigatio, qua usus est Nicomedes. Foliorum rutæ drachmas, i. mentæ drachmas duas, peucedani drachmas quatuor, iridis drachmas duas, seminis ocyimi drach. octo, seminis papaueris nigri drachmas quatuor, alij drachm. octo. poscæ heminas duas, ad dimidium coquito, et expressum succum cum rosaceo conuulsato, & caput assidue ex eo irrigato.

D *Aliud, quo usus est Charicles. Amygdalarum amararum depuratorum drachmas duas, seminis utricis drachmas duas, radicis peucedani drachmas duas, mentæ uiridis siue aridæ drachmas ij. ramulorum rutæ drachmas duas, baccharum lauri depuratorum drachmas duas, serpylli drach. ij. sphondylii drach. ij. castorei drach. ij. rosarū uiridiū, aut siccarū drach. quatuor, aceti heminas ij. rosacei quod satis est, apparato ac utere ut dictum est.*

Pastillus ad capitis dolorem, quo usus est Antonius herbarius, qui multa artis experientia clarus fuit. 8

Succi peucedani drachmas sex, succi papaueris drachm. quatuor, croci drachm. quatuor, myrrhæ drach. quatuor, scammonia drach. quatuor, omnia trita cū aceto in pastillos redigito, eosq; in

umbra reficcato. Vfus autem tempore aceto dilu-
tos fronti illinito, a tempore altero initio fumpto
& usq; ad alterum tempus progrediendo. In febricitantibus est aqua stillinito. Quo Alexander u-
fus est sic habet. Peucedani radicis aut succi drac.
unam, croci drach. unā, myrrhæ drach. unam. opij
drach. unam, aceto excipe, ac redige in passillos:
usu uerò exigente, aceto dissolutos locis sensum
doloris perceprantibus illinito. Aliud Antigoni
qui in castris exercitus insignis medicus fuit.
Baccarum lauri siccarum purgatarum tritarum
drach. quatuor, scammonia drach. quatuor, succi
papaueris drach. quatuor, seminis apij drac. octo,
croci drach. octo, myrrhæ drach. quatuor, ompha-
cij drach. quatuor, serpylli drac. octo, aceti quod
fatis est, præpara ac utere ut dictum est.

Ad inueteratum capitis dolorem epithema, quo Charicles usus est. 9

Retrimentorū quæ ab expresso irino unguento
superfunt, peucedani, castorij, singulorum par-
tem unam, baccarum lauri partes ij. seminis uiti-
cis partes ij. rosarum siccarū partes ij. ramulorum
rutæ partes quatuor, aceto dissoluta cerato ex ro-
faceo apparato excipito, deinde linteolo impa-
cta prærasis capillis per omne caput imponito, &
fasciola obligato, atq; usque in sequentem diem
obligata custodito, rursusq; imponito. Aliud
ualde bonum, Amygdalarum amararum, flo-
ris uiticis, peucedani radicis, mentæ uiridis, ramu-
lorum rutæ, baccarum lauri, serpylli, spondylii, ca-
storij, singulorum partem unam, rosarum partes
duas, appara, & utere ut dictum est. Post hæc
præscripta pharmaca Archigenes & Apollonius
itemq; Asclepiades, pharmaca cōscripserūt, quo-
rum aliqua per os, aliqua per nares caput purgāt.
Ceterū quæ Archigenes tradidit hæc sunt iuxta il-
lius ipsius dictionem.

Archigenis de apoplegmatismis, & quæ naribus infunduntur. 10

Post hæc uerò apoplegmatismi ex sinapi aut
hyssopo cum passo cocto, aut ex staphide sylvestri
cum pipere trita, aut ex melle oleo ammixto,
aut ex staphide sylvestri per se, & cum melle tri-
ta. Hæc quidem Archigenes inter remedia do-
loris capitis scripsit. Apollonius uerò de his
quæ ad dentium dolores, in primo parabolium tra-
didit, hæc uerba scripsit. Quæ naribus infundan-
tur in dentium dolore. Radicis betæ succum
per se in nasum infundito, & dolores dentium sol-
uet. Aliud, Cuminī quantum tribus digi-
tis apprehendi potest, & myrrhæ ad magnitudi-
nem fabæ, medullæ cucumeris sylvestris duplū,
trita & lacte muliebris subacta in collyria redigito,
eaq; in utramque narem indito. Deinde quam-
diu quis quinque stadia percurrere possit adra-
here, & postea emungere iubeto. Hoc pharma-
cum & ad aurium dolores facit. Asclepiades
autem in primo exteriorum ita scripsit. Ascle-
piades de his quæ naribus induntur, & de sternu-
tatorijs, & apoplegmatismis pituitam è capite
detrahentibus. Errhina quæ naribus indita ca-
put purgant, commovent etiam ueteri lippitudi-

A ne oculorū infestatis, faciunt & ad comitiali mor-
bo apprehensos. Ducuntq; multam humiditatem.
Melanthij drachmas octo, salis ammoniaci drac.
unam, elaterij drach. unam, trita & quam tenuis-
sime leuigata, sicyonio oleo, aut irino unguento,
aut cyprino excipe quoad ad cerati liquidū crassi-
tudinem perducantur, & reconditis in cornea py-
xide uitror, subtilis inde naribus, atque agris at-
trahere iussis. Aliud, Citra molestiam pur-
gans, doloremq; euestigio sedans. Cyclamini
sicca drach. octo, iridis sicca drach. ij. niri rubri
drach. unam. Ego elaterio usum diligenter tri-
to, & per arundinem insufflato, ægro ipsū attra-
here iussio, atque deinde deorsum pronuere, quo
uidelicet coactus liquor defillet. Post hæc ue-
rò Asclepiades in hæc uerba scripsit.

B De sternu-
tatorijs. Sternutatoria caput purgantia He-
raclidæ Tarentini, Cuminī æthiopicī, piperis al-
bi, struthij, castorij, singulorū æquales partes con-
tusas & cribratas in area pyxide reponito. Vsu
uerò exigente, pyxidem cōcutito, et apertam na-
ribus admooueto, aut cum digito adhibeto, aut e-
tiam per arundinem insufflato. Aliud, Zin-
giberis drac. ij. struthij drach. ij. piperis albi drac.
unam, castiæ drachmā unam, utere ut dictū est.
Ad ueterem uertiginem sternutatoria Ptole-
mæi. facit ad uertiginem & comitiali affectos.
Veratri albi drach. iij. alij unā habēt, radicis cucu-
meris sylvestris 3. i. struthij drac. i. niri rubri drac.
unam, castorij drach. unam, piperis albi drachm.
unam. Vtere ut dictum est. Aliud, Veratri
albi, radicis cucumeris sylvestris, struthij, singulo-
rum partes duas, castorij, a cori, niri rubri, cumini
æthiopicī, singulorum partem unam, euphorbij
partem unam, tritis ut dictum est utere. Atue-
rò post dictorum sternutatoriorū descriptionem
Asclepiades in hunc modū scripsit. Quæ man-
sa caput purgant, & multam humiditatem ducūt.

C Piperis albi drachm. duas, staphidis sylvestris
drach. duas, castiæ drach. duas. Excipe uuarū passa-
rum exacinarum, aut ficuum pinguium came,
& mandenda præbe. Mandentes uerò deorsum
pronuere oportet, & per interualla hiare, quo col-
lectus humor defillet. Post uerò etiam aqua calida
in ore continenda, quæ etiam uili multam per-
ceperint mordacitatem eis exhibenda est.

D Aliud, Staphidis sylvestris, pyrethri, piperis al-
bi, hyssopi, cardamomi, singulorum æquales par-
tes, polente duplum, aqua subigito ac uitror ut di-
ctum est. Porro ex subscriptis pharmacis qui-
busdā præceptores meos usos scio, quibusdā ami-
cos, aliqua etiā ipse in usum assumpsi, ut ex multo
usu fidem suam mihi probauerint. Sunt autē hæc,
Foliorū cucumeris sylvestris succus naribus infun-
ditū per se solus, tū betæ addito decocto aut suc-
co. Aliud, Myrrham melle coctā naribus infun-
dito. Aliud, Aloes, niri, melanthij, parē men-
suram cum oleo ueteri ad stringentorum crassi-
tudinem redacta. Aliud quod manditur. Ni-
tri sexuncem, anisi trientem, staphidis sylvestris
quadrantem, foliorum lauri uiridū, & uuarū passa-
rum

521
 ex acinata pari mensura excipe, & ex hac mixtura pastillos trium drachmarum coge, & singulos usu expetente mandendos præbe. Aliud quod naribus inditur. Euphorbij drach. dimidiam, thapsiæ drach. unam, iridis drach. unam, mellis cocti lequid drachmam, succi radicis betæ quantum sufficit. Ex hoc ad milij magnitudinem accipe, & aqua dilutum specilloq; exceptum naribus infundit. Aliud quod naribus infunditur. Succij cyclamini cyathos duos, succi foliorum hederæ cyathum unum, peucedani obolum unum, elaterij obolum unum. In vitro vase recondito, usu uerò expostulante lacte muliebri dissoluta naribus infundito. Aliud, Myrrha trientem, euphorbij trientem, piperis albi grana uiginti quinque. Myrrham aqua prius dissoluito, unaq; ipsum euphorbium, deinde piper tritum addito, & adiecto olei glicini sexunce utitor. Aliud, quod naribus infusum multam pituitam per os detrahit. Olei communis sextarios duos, saponis libram unam, resinæ frictæ sesquilibram, opopanacis unciam unam, per anchusam colorato ac utitor, ore prius aqua expleto. Aliud quod in os illinitur. Saponem betæ succo dilutum iuxta palatum illinito, atq; itidem iuxta oris columellâ. Idem etiam naribus infundi potest.

Que Criso in primo de pharmacis scripsit his uerbis, Apophlegmatismi. 11

Staphis sylvestris per se & cum pulegio mansa. Aliud, Staphidis sylvestris & origani utriusq; acetabulum, nitri drachm. ij. trita cochlearij mensura manducanda præbeto, donec os pituita repleatur, deinde aperto ore effluere sinito. Aliud, Origani trientem, hyssopi drachm. quatuor, staphidis sylvestris drachm. quatuor, spumæ nitri drach. ij. sinapis drach. ij. pyrethri drach. tres. tritis utere. Aliud, Sinapis partem unam, staphidis sylvestris partem unam, cõtusis utere. hoc pharMACOPOLAE utuntur. Aliud, Hyssopo, thymo, origano, tum per se, tum simul mixtis utere. Aliud, Medullæ colocynthidis in aceto ad multum tempus coctæ, aut etiam per longum tempus in uino macerata, liquorem in ore contineto. Aliud, Allia cum erucæ semine & nitro. Aliud, Staphidis sylvestris drachmas septem, pyrethri drachm. quatuor, hyssopi drachm. unam. Contusa in orbiculares pastillos cogito, eosq; drachmæ pondere formatos manducandos exhibeto.

Que pharMACA naribus indenda Criso ictericis seu arqua to infistatis conscripsit. 12

Pharmacum quod naribus infunditur, & tum per nares, tum per os excernit. Ob id ipsum uerò ne consterneris, si palatum calefaciat aut exasperet. Ex alto enim auocat ac transfert humores. Staphidis sylvestris drach. unam, melanthij drac. tres. Cum aceto trita ad formam strigimentum liquidiorem redigito, & per dies quinque in nares infundito, donec expurgetur æger. Id autem alterius diebus facito. Aliud, Hederæ folia decem, lauri folia decem, cum oleo terendo ad strigimen-

ti crassitudinem redigito, & naribus similiter infillato. Aliud, Egregie facit & elaterium infillatum in ipsorum nares. Cæterum si quis hoc citra detrimentum facere uelit, in calidæ solium ægrum immittet, atq; ita toto corpore præter faciem in eo immerso, elaterium insufflabit. Large enim bilem per nares educit. Aliud, Elaterium ad magnitudinem erui, in lacte muliebri dilutum naribus infundito, atq; ubi purgatio prodierit, in calidæ labrum demittito ac lauato, & per diatam reficito.

Que Aeneas per experientiam pituitam detrahentia tradidit. 13

Quorum experientiam per Aeneæ usum habeo, a quo etiam descriptiones accipi. Pharmacum quod naribus inditur atq; pituita detrahit. Saponis lib. sex, adipis caprini lib. unâ, cere lib. iij. picis aridæ trientem, quidam uerò quadratem habent, nitri tantundem, lixtij acris cyathos ij. Vfus tempore aqua diluta per specillum infundito, attrahereq; iubeto. Caput uerò irino prærigato, & post usum aquam nullam sepe gargarilandam præbeto. Aliud, Euphorbij drach. sex, lycij Indici drach. quatuor, succo betæ excipe, ac melle addito coge. Vfus tempore aqua aut lacte dilue. Aliud, Succij cyclamini cyathos duos, succi cacuminum hederæ cyath. unâ, succi peucedani obolum unâ, elaterij obolum unum. Vtere in balneo cum lacte muliebri. Aliud, Pyrethri, piperis, hyssopi, staphidis sylvestris, parem mensuram in pastillos drachmæ pondere cogito, quorum unum manducandū præbeto, & post factam ab ipso purgatione, sale & melle curato. Sternutatorij, Piperis albi, ueratri albi, castorij, euphorbij, struthij, succi cyclamini aridi, æquali mensura penna præirritatis insufflato.

De usu omnium fortium pharMACICORUM. 14

Quæ uerò ratione de prædictis pharmacis dixero, eâ ad omnia alia quæcumq; fortè usum habent trāsferre oportet. nō em̄ statim à principio efficacissima adhibere cõuenit, sed à debilibus auspicari. Quin & ipsa fortia pharMACA mitigatorij admittitōe lenita, moderata fiūt. & ob id ego quedam ex eis muliebri lacte recentē et aqua diluo, et post hoc oleo dulci, deinde betæ succo, & anagalidis quæ caruleis florē habet itudē succo, atq; ita sensim in usu eorū progredior, donec postremū etiā per opobalsamū talia dissoluo. ac primū quiddē lacte admixto adhibeo, qd ubi leniter ferūt ægri, etiā citra lactis adiectionem admoueo. Porro parabili sepe pharMACO usum sum, qd naribus infundit melanthio, aliquandō quiddē aceto acri trigato ac pridie macerato, deinde sequenti rursus cū aceto trito, & narib. infuso, aut ægro ipsum absorbere in nares iussio. Aliquando uerò oleo ueteri idem melanthium contriui, atque ita usum sum, quo modo etiam Archigeneseo utitur in narium obturatione. Eo uerò quod cum aceto infunditur, Criso utitur ad arquatū morbum.

De hemieria, hoc est dimidiæ partis capitis affectione. Cap. III

Affectio dolorosa circa dimidiã capitis partem

tem, aliquando dexteram, aliquando sinistra con-
tingit, quæ iuxta futuram secundum longitudinem
eius extensam terminatur, & ut plurimum per cir-
cuitum exacerbatur, influxu uaporum aut humo-
rum siue multorum, siue calidorum, siue frigidor-
um, causam dolori suggerent. Quidam igitur ip-
sorum circa temporum musculos uehementer do-
lunt, & pleraque sanè ipsorum pars hoc modo af-
fligitur. Quidam uerò dolorem longe ulterius pro-
gredientem habent. Et quidam ad eodẽ uehementer
dolent, ut neque manuũ contactum facile ferant, in
quibus palam est pelliculam caluam ambientem
esse affectam, & neque cutem ipsam omnino ab
affectatione immunem existere. Manifestum igitur
est uaporum, aut humorum, aut utrorumque
influxum siue per uenas, siue per arterias, siue per
utraq; contingere: quum interdum ea sola quæ
intra caluam continentur, hoc est, cerebrum ei-
usque membrana, quod in ipsis redundat foras
protrudant: interdum uerò corpus infra caput
positum uitiatos uapores aut humores sursum mit-
tat. Quapropter ubi quis hemicraniam curare ag-
greditur, prius qualis purgatione aut uenæ sectio-
ne æger opus habeat, consideret. atque ita deinde
ad capitis auxilia progrediendo, tum per digi-
tos suæ manus, tum per lineum dimidium frontis
partem, & eam maxime quæ circa temporum
musculum est, confricando calfaciat, atque id ante
irritationis tempus faciendum est. Post exacer-
bationem uerò pharmacis hemicranicis à medi-
cis appellatis utendum, siquidem multa caliditas
in doloribus percipiatur, his quæ refrigeras quip-
piam habent: citra uerò hanc, his quæ multum ex-
calfaciant. Vtrisque uerò aliquid ex his quæ fir-
mitatem ac robur addunt miscetur, quod astrin-
gentem uide licet habeat facultatem. Demiror aut
tem, quod neque Apollonius, neque Archige-
nes, neque Aesclepiades quicquam de hemicran-
tibus pharmacis, quæ merito post doloris capitis
tunc pharmaca subiicienda erant, conscripserunt.
Decebat enim ipsos, tametsi nihil priuatim in se
habeant, propterea quod inter ea quæ totius capi-
tis dolori destinata sunt, continentur, id ipsum
saltem annotare. Similiter autem & ab Hera, & à
Critone, uerior de hac affectione tractatio ne-
glecta est. Cæterum per quæ pharmaca inuetera-
to capitis dolori medentur, per eadem cõstat eos
etiam hemicranicis affectionibus auxiliari. Heras
itaque in medicamentario libro statim à principio in
hæc uerba ad capitis dolorẽ pharmaca cõscripsit.

Pharmaca ex libris Heræ ad capitis dolorem. 2

Crocomagmaticam partẽ i. gallæ partẽ ii. trita ex
uino fronti ac temporibus illinito. Pastillus ad ca-
pitis dolorẽ egregie faciens, à tẽpore ad tẽpus bis
aut ter illitus. Croci drachm. xv. atramenti futori
drac. x. aluminis scissi drac. xiiij. myrrhæ drach. iij.
opij drac. iij. omphacij drac. iij. chalcitidis drac. iij.
gũmi drach. xv. tritis uini salerni uulseri quod fa-
tis est affunde, & ut collyriũ tere, indeque in pastil-
los omnia redige. Vfu uerò expetente, posca aut
acetõ dilutis utere, Malagma ad capitis dolorẽ,

Aeruginis rasilis drach. iij. aeris uulsi drach. ij. Iqua
mestomatosis ferri drac. ij. cimolij drac. iij. chal-
citis drac. iij. pumicis crudi drac. iij. terebinthi-
næ unc. i. ceræ drach. xxxvij & dimidiã. olei uete-
ris cyathos ij. Aridis tenuissimæ tritis, liquescibi-
lia affunde, emolliac utere. Quod si durius uidea-
tur pharmacum, oleo amygdalino emollito. Hæc
quidẽ pharmaca Heras ad capitis dolorẽ scripsit.
Utuntur autẽ eis quidam etiã ad hemicranicos do-
lores, quemadmodum etiã alijs medicamentis quæ
prædicti uiri ad inueteratos capitis dolores desti-
nauerunt. nõ tamẽ per omnẽ frontẽ pharmacum
extendunt, sed per affectam solum partem. Cæte-
rum ex præceptoribus nostris quispiam hoc phar-
macum ad inueteratas hemicranias in usu habe-
bat. Piperis albi drach. ij. crocomagmaticis drac. ij.
euphorbij drach. dimidiã, utere. Porro de euphor-
bij facultate iam mihi relatum est, quod cito exol-
uatur. quare in eiusmodi pharmaca nõ uetus con-
ijcere oportet. dictum etiam recens albidius esse,
quod uerò inueteratũ est, flauioris aut pallidioris
coloris reddi. uerũ si nõ ualde uetus sit euphor-
bium, sed duorũ aut triũ annorũ, duplẽ eius adijci-
es, hoc est drach. i. Quemadmodum autẽ euphor-
bium recens coniiciendum est, sic itidem sterco-
ris columbini drachmæ dimidiũ, ex colubis mon-
tanis quas in turribus nutriti sibi ipsi uictũ que-
rentes, nõ uelut quæ in urhibus intra domos nu-
triuñt. At uerò & atramenti scriptoris æqua por-
tio, hoc est drachmæ dimidiũ ad columbinũ ster-
coris inijciatur, atque ad hanc rẽ nostrũ pergamenum
præstat, eo enim semper præceptor noster uteba-
tur. Aut igitur illud ipsum ex Pergamo atramen-
tũ inijcere oportet, aut aliquod aliud optime præ-
paratũ atque ita omnibus his mixtis & probe suba-
ctis, acetoque acerrimo imbutis ac dilutis tẽmpo-
ris musculus, & dimidiũ frontis, & affecta capitis
pars illinenda est. Aliud pharmacũ, quod nõn
solum in hemicrania, sed & in omni inueterata ca-
pitis affectione illinit, in capitis quidẽ dolore per
omnem frontẽ, in hemicrania uerò per mediã ca-
pitis partem affectam. Croci drach. xv. atramenti
futoriij drach. x. aluminis scissi drach. xiiij. myrrhæ
drach. iij. opij drach. iij. omphacij drach. iij. gũ-
mi drach. xv. Omnibus tritis uinum salernũ adij-
ce, & rursus ut collyrium tere, deindeque in pastil-
los redige. usus uerò tẽpore posca dilutas aut ace-
to illine. Aliud, ad easdem affectiones. Scam-
monia drachm. vi. croci drachm. ij. comæ hederæ
drach. vi. sulphuris uiui drachm. iij. feminis anisi
drach. viij. feminis apij drach. viij. diligenter trita
cum ocymi succo in pastillos cogito. Hoc phar-
macum multo rosaceo dissolutum capitis letar-
gicorum rigãdis sit cõmodũ. Aliud pharmacũ,
non isdem solum cõueniens, sed & uertiginolis
auxiliare. Radicis peucedani drach. iij. iridis sily-
ricæ drachm. ij. æruginis drach. i. acori drachm. i.
sphondylij drach. iij. piperis nigri drach. ij. & di-
midiam, castorij drach. ij. & dimidiã, serpylli drac.
iij. & dimidiã. myrrhæ drach. ij. baccarum lau-
ri numero xxxv. rutæ uiridis drach. viij. menta ui

ridis drach. quatuor. opij drachmam unam. aceto excipe, & in pastillis redige. Vsu exigente aceto & rosaceo dilutos illine. Verū cerato rosaceo exceptum hoc pharmacū ut malagma imponitur. Pastillus. Non solum hemicrania laborantibus commodus, sed & coxēdicum morbo affectis auxiliaris. Thapsiæ drach. tres. euphorbij drac. iij. laferis, siue succi medici drac. iij. myrrha drac. i. o. popanacis drac. i. simul cōtusa in pastillis cogito, quos deinde usus tēpore aceto tritos illinito. Hęc quidem composita sunt pharmaca. Sæpe uerò & ex tēpore ac improuiso pharmaca præparare coactus, simpliciter euphorbij illitione usus sum, modica cera compagis acquirendæ gratia adiecta. Sufficit autem in libram olei siue Sabinī, siue alterius ei propinqui, ceræ quadrantem inijcere, &

euphorbij unciam unā, atq; ex hoc dimidiā frontis partem illinere, unā cum tēporis uidelicet muscululo. Cæterum in quibus suspensionem habueris, à calidis uaporibus aut humoribus, dimidiā capitis partis fieri dolorem, in his ne admoeris hoc pharmacum. His uerò qui ob frigiditas causas infestantur, commoditissimum adeo est, ut sæpe semel ante balneum illitū, quàm citissime affectionem perferant, ut à balneo omnino sani ægri euadant. Iuuat etiā hos, si oleū tepidū in aurē instillet, modico euphorbio ad oleū iniecto: nimirū ad librā olei unā euphorbij uncia dimidia, si ualidum euphorbiū existat. Si uerò nō, etiā amplius inijcere conuenit. Verum in corporibus molli ac tenero sensu præditis, etiam si minus quàm dimidiā unciam inieceris, melius res procedet.

ARGUMENTA CAPITVM LIBRI III

Caput I. De aurium affectionibus, & ob quorū causas aures dolore affligantur. 2. De dolore auris ex frigiditate. 3. Ex inflammatione. 4. Ex statu uentoso, aut crasso & uiscosis humoribus. 5. De ulceribus aurium. 6. De audiendi difficultate, & de sonitu aurium. 7. Hera compositio auricularis. 8. Apollonius ad aurium dolores. 9. Archigenes ad eisdem. 10. Andromachi auriculares compositiones, numero 24. 11. Asclepiadæ compositiones. 12. Ad inflammationes cum exulceratione, Charixeni. Vide sect. 17. 13. Ad eisdem cum fluxu. 14. Ad foetorem, & ulcera serpentina. 15. Ad carniū incrementum & affectiones inuaceras. 16. Pharmaca quæ Archigenes post prius scripta subiicit. 17. De auribus exulceratis. 18. De ueribus aurium. 19. De sonitu in auribus. Vide sect. 12. 20. Archigenes ad sonitus. 21. Apollonius ad sonitus, susurros, sibilos, & inflammationes aurium. 22. Idem ad aures exulceratas & purulentas.

23. Ad auditus grauitatem. 24. Apollonius ad eandem. 25. Eiusdem fomenta ad aurium dolorem. 26. Archigenes ad auditus grauitatem & surditatem. 27. Idem de corpusculis quæ auribus illabuntur. 28. Apollonius de hisdem. 29. Critonis auricularia pharmaca. 30. Ad dolores aurium cum humiditate & purulentia. 31. Archigenes ad aurium affectiones extra meatū. 32. Ad exulceratas ex plaga & fractas aures. Cap. II. De parotidibus. 2. Archigenes ad parotidas. 3. Galeni ad eisdem. Cap. III. De affectionibus narium. 2. Archigenes ad ozanas. 3. De polyponarium. 4. Asclepiades ad ozanas & polypos. 5. Lamponis & aliorū, ad ozanas, ægilopas, polypos, & multa alia. 6. Apollonij parabilia & experimenta Galeni. Cap. IIII. Ad eruptiones sarti guinis è naribus, Archigenes. 2. Asclepiades. 3. Andromachus.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

PHARMACORVM SECUNDVM LOCOS LIBER III

De aurium affectionibus, & ob quorū causas aures dolore affligantur. Cap. I



AURIVM dolores aliqui ex frigiditate fiunt, quos sanè in peregrinationibus à frigidis uētis perlati habent: aliqui uerò ex balneis frigidis, & quibusdā medicatis aquis obortunt, in quibus quidā ob delicias lauant, quanq̄ sint qui & ob corporis comoditatē id faciāt. fiunt & auris dolores ex inflammatione, interdū quidē solius circa meatū cutis, interdū uerò in profundū progressa, quādo uidelicet nervus auditorius ad inflammationē peruenit. Qua uerò ratione inflammatione partes inflammatas distēdens dolorē producit iuxta eundē modū etiā flatus uētosis, transitū nō habēs, dolorē excitat. At uerò cōsimilis dolor est ex ferolis & saniosis humoribus in corpore aurium generatis, ei qui ex mordacium humorū lapsu forinsecus factō, contingit.

De dolore auris ex frigiditate. 2

Dolores quidē igitur à sola frigiditate obortos

calfaciētia q̄ celerrime curant: atq; in hunc usum quosdā rurales homines magnas cepas exsculpere uidi, deinde oleo eas explere, & in seruētē cinere moderate calefacere, atq; ita aurib. infundere. quosdā uerò nō cepas tantū, sed & allium in oleo feruefacere atq; ita infundere uidi. Ego uerò euphorbio omnino modico, ad multū uetus oleum admixto utor, uelut etiā pipere exquisitissime trito: Aurium em̄ dolores à frigiditate inductos eustemodi calefaciētia magnopere iuuat. Prodest etiā amaracinū oleū eis infundi, & optimū nardū. Et quod apud Romanos foliatū, itēq; quod spicatum appellat: prodest eis & comagenū: atq; si rutani quoq; oleo nō astringētī ampliusq; tenuis partitū. Incoeris, uelut est Sabinū, magnopere iuueris. Cū uerò ex aqua medicata quippiā circa auditoriū meatū cōtineat, oleū assidue infundere conuenit, quo ipsū eluamus, deinde lana molli extergere, rursumq; infundere. Magnifice autē eos mitigat ouī candidū, quo etiā ad lippitudines utimur, itēq; lac muliebri. Manifestū uerò est quicquid adhibet medio criter calidū esse oportere. plurimū iuuant. quoq; ex adipe aserino atq; itē uulpino.

De

De dolore auris ex inflammatione oborto. 3

Quòd si inflammatio adsit, optimum ad eam pharmacum unguentum nardinum cum modico basilico appellato pharmaco infunditur. idem etiam tetrpharmacu appellatur. Et Comagenum quoque aptum est, & ex adipibus pharmacu, cuius compositionem paulo post describam. Cogente uero dolore, necessarium est etiam his quæ sensum stupefaciunt uti, quemadmodum etiam in his qui collum, aut renes, aut quamcumq; tandem partem affecti, uehementi dolore affliguntur, facere conseruimus. Misceatur autem opium muliebri lacti & oui candido, quæ ipsa & per se sæpe aurium inflammationibus profuere. Misceatur & castorio opium. Verum multo ante usum tempore, siue pari pondere, siue duplo castorio ammisceatur, præparatum id esse conuenit: & misceatur quidem in uehementissimis doloribus pari, in minoribus uero duplo. Liqueur uero quod hæc diluuntur ex musto sapa sit. Multo enim magis quam dulcia uina, dolorem hæc sedat. Statim itaque in principio prædicta pharmaca diligenter trita cum sapa misceantur, castorium quidem diligenter prius tritū & leuigatū, papaueris uero succus ipsa sapa dissolutus, atque ita hæc tria mixta probe leuigentur. Deinde uero usu postulante rursus sapa diluantur, in eiusmodi compagem, ut per aurifusoria specilla ad lucernam tepescata infundi possint. Verum ego nullum pharmacum dolore uexatis infundo, neque etiam per lanam instillo, utpote qui experientia edoctus sim, quod præstat neque omnino contingere doloris tempore auditorium meatum: sed per auriculare specillum lana mollissima obuolutum dolore uexatos foueo, pharmacumq; ita moderato tepore in aurifusoria specillo præparatum inijcio, ut interrogato per nos ægro, num tepidum ei uideatur, & num calidius ipsum ferre possit, ad tantam caliditatem procedam, ut nihil amplius offendat. Tinctum itaque in hoc modo præparato pharmaco specillum, ad principium meatus moderate imponito, et in altum desfluere ex eo pharmacum permittito, & postea iterum iterumq; & sæpius tingito, idemq; facito, nullo tempore intermisso. Palam est autem cum hoc fit etiam foris omnino aliquid effluxurum esse, expleto nimirum toto auditorio meatu: hoc igitur quantum possibile est, moderate excipe, nec aurē contingas. Postquam uero probe foueris, meatū pharmacum expletum finito, & mollem lanam forinsecus tum meatus osculo, tum uniuersæ auri imponito: atq; ubi rursus fomenta adhibere oportebit, incumbentem foris lanam leniter tollito, rursusq; similiter foueto, quantum possibile fuerit diligenter cauens, ne aliquid aliud graue aurem contingat. Ad hoc uero præceptum maxime animum aduertas, utpote quod omnium potissimum sit in aurium cur ratione. Fomenta uero fiant per ea quæ uel dictum est, dolore sedant. Quale est optimū nardinum unguentum paucissimo in eo tetrpharmaco dissoluto: deinde etiam Comagenum et Su-

linum, & pretiosa diuisum multercularū unguenta, quæ ipsæ spicata & foliata appellant. Sunt autem spissiora quam ut infundi queant. Quapropter per nardinum unguentū ea dissoluere oportet, & ætatis tempore, & si caloris sensus ægrum circa inflamatā aurē infestet, per rosaceū bonum; aut si hoc nō adsit, amygdalinum. Memineris autem quod bonū semper rosaceū dico, in quo plurimæ rosæ maceratæ sunt uerum oleum in quo hæc macerantur, omphacinum sit, ex crudis oliuis & necdum penitus maturis expressum, citra salis aditionem præparatum. Imò neq; etiā aliud quicquam ad rosas consiciatur, quemadmodū illifaciunt qui spissamenta stymmata Græcis appellata addunt, quo uidelicet per multum tempus ipsum rosaceum odoratum permaneat.

De dolore auris ex flatu uentoso, aut crasis eius uisio-
sis humoribus. 4

Si uero flatū uetostum, aut crassum aliquē & uiscosum humorē, qui transitū nō habeat, in clusum esse conieceris, etiā ex pharmacis ab obturatione liberatibus quippia admisce. Artificiose em̄ cōiectura causarū huiuscemodi doloris tibi cōtinget, si tum prægressa, tum præsentia percunctatus fueris. Frigiditate enim antegressa flatus uetostus congregatur: grauitate uero capitis, cibusq; pituitosis & mali succi, frigidi & crasi humores. His enim si frigiditas accedat, dolores cōtingunt, eis nimirum quæ prius dissabant propter densitatē inclusis & retētis. In his igitur spuma nitri, & nitru ipsum molle, eiusmodiq; aphroditro, & oleū amygdalinum appellatū rationaliter in auricularia pharmaca misceatur. Ex hoc genere alium item acnigrum ueratū est, & struthiū, ac amygdalæ amare, & ex tribus aristolochiis quæcumq; fuerit ad manum, & iris illyrica. Inijcies autē & cinnamomū si habueris, aut casiam illo nō præsentē, tū eam quæ Zigeres, tum quæ Motodes appellat. Item carpesium, quod plurimū in Sida Pamphylia nascit, & ob id utilissimo pretio ueditur. Quintus sane cum cinnamomi inopia esset, carpesium pro ipso iniicit duplo pōdere, uelut aliqui eius loco cassia exhibere solent. Cæterum aurium meatus ab obturatione liberant etiam quæ lapides in renib; atterūt, omniaq; insuper tenuium partium citra mordacitatem, ut ne dolore exacerben. Ex quorum numero est etiā cucumeris siluestris radix, itemq; bryoniæ & ari, & dracunculi ac centauræ & polij, & omnino omnium amarorum. Citra mordacitatem namque & absque molestia expurgant hęc meatus, disiciuntq; & dissecant obrurata. Verum ob id multa eiusmodi exempla scribo, quamuis sane omnia in libris de simplicium pharmacorum facultatibus retulerim, quod uidelicet omnibus terræ locis remedijs uos abundare uolo, ut ipsorum memoriam in promptu habeatis. Alia enim in alijs regionibus abundant, & meliora his quæ alibi nascuntur existunt. Alioqui sanè ex adipibus compositum pharmacum tibi sufficet, & ex simplicibus quæcumque paulo antè recensui doloris mitigatiua. Mirari porrò subit medicos qui ci-

tra distinctionē ad aurium dolores pharmaca quædam conscripserunt. Quæ em̄ à frigiditate dolent, per calfacientia celerrime curantur; si uero à mordacitate credine, aut à pulsatili inflammatione dolor fiat, maximum detrimendum continget, si eiusmodi pharmaca adhibeantur. Atqui moderate inflammationes & nō pulsatiles, etiā per eiusmodi pharmaca curantur. Quale est acetum cum rosaceo tepescitum, utriusq; diligenter simul commissis. Sic etiam Glaucium in cote medica cum aceto tritū, breuibus inflammationis doloribus prodest. præsertim autē passillum ex glaucio multæ sane utilitatis pharmacū, prius preparatū habere, qui fit ex glaucio probe cum aqua pluuiali trito, deinde in passillum redactū & exciccato. Si uero fragilius uideatur glaucium quā ut in passillos formari possit, parum gummi ei addes. Sufficit autem id duodecimam aut quintam & decimam glaucij partem esse. Quin & collyria ex glaucio eodem modo cū aceto trita, eis profunt auribus instillata, atq; his nihil minus collyria ex croco. Hæc quidē igitur sunt doloris & inflammationis remedia. Cæterum de alijs affectionibus quæ in auribus oboriuntur, ubi pharmaca quæ per experientiam cognouimus reuocauero, ita deinde ad ea quæ à prioribus medicis scripta sunt transibo.

De ulceribus aurium. 5

Vlcera aurium recētia, tum glaucium solū cum aceto tritum, ut iam dictum est, curat, tum collyria ex eo omnia, & collyria ex croco, & ex rosas, medicis appellata, uelut etiā quod Nilo inscribitur. Curat item ea Democritus collyrium ex myrrha.

Quæ uero pure manant citra dolorem, atque id moderate patiuntur, per eadem curantur: uerum quæ fortiter affliguntur, per eiusmodi qualis est passillus Andronij, & passillus Musæ cum sapa & modico aceto dilutus. In quibus componendis uarietas rursus dicitur. Vbi uero & hæc à malo uincantur, Scorla siue recremento ferri ad plurimos dies in sole cū acerrimo aceto trita & leuigata, conuidentur utere. Etiam si præter rationem uideatur, aurem acerrima pharmaca sustinere posse, quam paulo ante dixi necq; mollissimorum insulorū admotionem & allapsum circa molestiam sustinere, sed & hæc ipsa offendere ipsam uideri.

De audiendi difficultate, & de fontiu aurium. 6

Relat itaq; adhuc de audiendi difficultate, & de sono aurium differere, quæ nihil cum doloribus & ulceribus commune habent. De quibus deinceps dicam, ubi prius compositiones auriculares à celeberrimis medicis magnifice laudatas recēsero, iuxta quam rationem eas cōposuerint tandē illi. Initio ab ea quam Heras scripsit sumpto.

Compositio auricularis, Hære. 7

Heras quidem igitur ita scripsit. Compositio auricularis ad omnē dolorem, omneq; ulcus, hæc in febriente quodam usus sum, & ob dolores delyrante, & feliciter successit. Myrrhæ drach. i. thuris drach. iij. alij. viij. spumæ nitri drachmas iij. croci drach. iij. alij. i. succi papaueris drach. iij. galbani drach. duas. amygdalas amaras delibratas. xx. ace-

Galen.

A to excipito. Vfus uero tempore, siquidem dolor adlit, rosaceo diluta instillato; si uero audiendi difficultas adlit, aceto. Heras itaq; unū hoc pharmacum scribere contentus fuit, ad omnem dolorem, ac aurium exulcerationum remedium. Ego uero dolores per pharmacū ex adipibus cōstans, & per nardinum unguentum tetrpharmaco ammixto leniri dico, unaq; & affectiones ipsas iuuari, ueluti etiā uici candido, & lacte muliebris; per papaueris uero succum mitigari solum dolores, nihilq; iuuari affectiones; uerū per accidens, nō primario etiam affectiones inde opem sentire quis dicere possit. Sedato enim dolore, & somno consequente, natura affectiones dolorem efficientes conquit. Cæterum ulcera in auribus omnino cum glaucio ex aceto curauit. Quæ admodum etiā quæ cum fluxione aut purulentia cōsistunt, per passillos, à mitioribus auspicatus, qualis est polydæ, & post eum Andronij, & ab illo Bithynus appellatus, cui similis est meus, hoc est, ex charta usta cōstans, & uelut ego iudico, eo etiā præstantior. Minime uero semper omnī usū opus habemus, sed sufficit omnino unus, si quis ipso uti norit, aliquid quidem per saram diluto, siquidem mitius redere pharmacū uelit, & rursus per uinū dulce, deinde per acerū non acre, deinde etiā per acre, ac postremo per longè acerrimum. Quapropter quum per eiusmodi mixturam aliā aliter parabilem, huicemodi pharmaci uehementiam exoluere possis, fortissimū tantum preparatum habere poteris.

C Verum mirari rite, uelut dixi, licet plerosq; medicos, qui citra discrimen omnigena aurium doloris pharmaca cōscripserunt, eaq; cōmiscuerūt in unū ordinem redacta quæ uel maxime contrarias habēt uires. Quemadmodū statim (à ueteribus enim auspicari præstat) Apollonius Herophilus fenerator, in parabilium pharmacorum descriptione, in principio quidē libri, capitulis doloris remedia scribens, primum omnium ea quæ ex ardore oborto conueniunt, locauit, deinde consequenter ea quæ dolori congruūt ex frigiditate. Deinde ea quæ ex ebrietate & meri potu oborto medentur, sic enim ipse appellauit. Quarto loco ea quæ plagæ aut casui dolores capitis inducentibus adhibenda sunt subiecit. Et postremum iuxta illius præscriptum ea

D quæ ad temporū & totius capitis dolores citra manifestam causam obortos conducūt. Verum in aurium dolore nullam omnino apposuit distinctionem, sed simpliciter Ad aurium dolores titulo præscripto, deinceps pharmaca recenset, aliqua calefacientia, aliqua refrigerātia, quædam humescantia, quædam resiccantia, & iuxta secundas facultates ac qualitates, austera, acerba, amara, acria, acida, salsa, & ad hæc insuper alia discutietia, alia adstringentia & cogentia, ac repellentia inflexiones, alia extrahentia & profunda corporis. Alia ab obturationibus liberantia, alia repurgantia & extergentia, alia sensum stupefacientia. Si quidē igitur una affectio dolorū est causa, rationale est etiam unā esse remediōrū ipsius facultatem. Si uero multæ, tantum remediōrum numerum esse oportet, quāuis

tom, 5

z est effi-

est efficientium causarum. Quum itaq; Herophilus distinctiones in tantum, ut haud sciam si quis alius, laudet: ipse que Apollonius capitis doloris pharmaca distincte scripserit: magis utiq; miror, quod circa aurium dolores ita indiscriminatum omnia tractauit. Et quintum insuper pharmacorum genus penitus indistinctum reliquit, illud scilicet quod postremum ad capitis dolores citra manifestam causam abortos descripsit. Quanquam & huiusmodi capitis dolores necesse sit primum communibus generibus causarum dolores efficientium subiectos esse, solutioni uidelicet co-tinuitatis, aut intemperiei, quemadmodum a nobis est demonstratum, deinde etiam his quae has ipsas operantur. Quae omnia a me proprio huic rei & tractationi loco sunt determinata: nunc autem eorum quae ad aurium dolores pertinent solum mentionem faciam: quum omnium postrema uelut saepe in methodi medendi libris distinctum est, haec tractatio existat. Etenim curandi methodo sic illuc tradens, unum atque alterum particulare exemplum apposui, multitudine pharmacorum quae ex multis compono, in praesentem tractationem relecta. Quare medendi methodum de simplicium pharmacorum facultate libri XI. merito praecedunt: post hos uero XIII. de medendi methodo rite consequuntur, his demum de compositione pharmacorum libri, quos nunc in manibus habemus succedunt.

Quae Apollonius ad aurium dolores scripsit. 8

Quod uero Apollonium deliquisse dixi, in eo quod non distincterit in quali aurium dolore unumquodque eorum quae describit pharmacorum utile existat, ne falso uirum reprehendisse coarguar, ex paucis exemplis demonstrabo. Quum enim praescripserit ut dixi, ad aurium dolorem infundenda, inter caetera scripserit, Anserinum aut gallinaeum adipe liquefactum sensim instilla: Rursus deinceps scribit: Fel taurinum aut caprinum cum porri succo instilla. Adeps quidem igitur horum quae dixit animalium maxime mitigat omnes affectiones dolores inducentes, simulque ipsarum aliquibus, magnifice auxiliatur: fel uero ipsum cum porro, tum ex inflammatione et tum ex acris humoribus abortos dolores auget. Solos autem iuuat ob obrurationem, aut frigiditatem ductos, siue ob nudam intemperiem frigiditatis solidae partes dolore uexentur, siue propterea quod in eiusmodi affectionibus uentosi flatus, & frigidi humores generentur: ex cerni autem prohibeantur, propter continentis corporis condensationem, citra inflammationem factam. Vbi enim ab huiusmodi acris & calidis pharmacis dolorum causa fuerint exclusae, curatio simul & doloris sedatio coniungit. Gallinaeum itaque & anserinum adeps si quidem euacuat corpus inuenerint, & humorem qui inflammata affectione excitat, non amplius influentem, duabus rationibus tum mitigandi, tum curandi profuerint. Si uero influente adhuc causa adhibeatur, affectio non quidem nihil auxiliatur, leniunt tamen doloris accessione siue symptoma, quemadmodum etiam si ob humorum accedentem mordacitas contingat. Verum fel cum porri succo

nunquam in eiusmodi affectionibus quicquam commodum efficere potest. Quemadmodum neque pipere, & tamen eo etiam medicum quemdam usum scio, in muliercula ex calidarum naturae sponte aquarum usu, aurem dolente. Quum enim per omnia parabilem pharmacorum Apollonij libris fidem haberet, & iam ante feliciter saepe ex pipere remedio usus esset, etiam tunc sperauit se in auris dolore optulaturum: uerum adeo ab ipso exacerbata est muliercula, ut parum abesset quin seipsam strangularet. Scribit itaque Apollonius in hunc modum: Piper in uino seruefactum terito, & medio cri crassitudine instillato. Scribit autem consequenter post hoc etiam haec: Lycio & papaueris succo, pari potere lacte muliebri dilutus utere. Et post hoc rursus aliud hoc scilicet: Castorei & papaueris succi pari potus in testa Attica aut, si haberi nequeat, Romana torrefacto, & trita passo diluta instillato. Pharmaca igitur ex papaueris succo omnia sensum stupefaciunt, & ob id sane necessarium cogimur ipsi uti, ubi nullum aliud mitigandi opem tulit. At uero ex pipere pharmacum alterius generis est. Quae admodum etiam quod ex adibus constat. Et uelut id quod deinceps scriptum est hoc modo: Galbanum susino ungeto diluito, & mel acrofaceum ammisceto, atque lanam sordida auriculario specillo obuolutam in eis agitando imbuito, & tepescata instillato. Discussoriu est citra molestiam hoc pharmacum, inflammationibus coddens in quas nihil amplius influit, probe etiam fecerit in his qui ex frigiditate dolore uexantur. Ceterum quare fortassis aliquis quam ob causam, quam non solum Apollonius, sed alij etiam quidam celebres uiri papaueris succum & castorei torrefacere iusserint, quo uidelicet uehementia uirium ipsorum minueretur, ego ad priorem meum sermonem id apponere reliqui, nimirum supra quum auris doloris curandi ratione scribere. Huic ego respondebo in hunc modum. Castorium quidem igitur neque omnino torrerit operae uitium existimo: neque enim tanquam sensum stupefaciunt ad papaueris succum ammiscerimus, sed ob contrariam omnino rationem, ut uidelicet uehementiam refrigerandi facultatis in eo obtundat. Quare qui papaueris quidem succum torrerit tubent non simpliciter id faciunt. In castorio uero omnino absurde id precipiunt: ipsum enim per se concoctum aegre solubilem & in scirrhum induratarum affectionum uim habet. Sufficiens itaque est etiam papaueris succi facultas, si ex eo quod eorum compositio diu ante preparata & iam inueterata sit, ipsius uires leniant: torrefactus enim efficaciam perdit. Si uero castorio mixtus ad tempus aliquid inueterascet, manebit quidem adhuc in eo multa efficacia ipsius facultatis: malignitas uero ipsius extinguitur, ex qua etiam aliqui laeduntur ut obsecutus uideant per multos omnino dies, & capitis grauitatem sentiant, & neque probe concoquant cibos: & ob haec sane eius malignitate plerique medici ad torrefactionem confugerunt. Verum quum rursus in torrefaciendo, efficacia ipsius pessum dari uideatur, id quod saepe sum expertus, melius esse existimauit

intotum quidem miseri, sed post tēpus aliquod, in ueterata iam cōpositiōe, in usum adsumi. Hęc itaq; extra rem dicta sūt, sed quæ tamē utilia existant. Ceterū ut ad id quod propositū erat reuertamur, nō parū noxæ inferūt illi qui indefinitis phar-
 macorū descriptionibus fidem per omnia habent. Porro multū alij iuxta eundem modum in phar-
 macis locis, tum affectiōibus, indefinita pharma-
 ca scripserunt, neq; cognouerūt quātam uim habeat
 certa distinctiō ad artis cōstitutiōem; in quibus sa-
 pē nihil miror quod omnia in indiscriminatū con-
 siderunt, quemadmodū in Apollonio Herophilī
 sectatore mihi accidit: utpote qui norit quod sub-
 bebat Herophilus, Medicum omnino anniti debe-
 re ut sciat, quæ & qualis, & quanta sit morbi cau-
 sa, & ubi maxime ea dominetur, quo uidelicet &
 curationem unicuiq; cōuenientem faciat. Magis
 uero adhuc Archigenem quis miretur, qui & ipse
 non pauca indefinite & indistincte scripsit, quum
 in alijs curationibus, tum in eis præsertim quæ ad
 aurium dolores destinauit. Vna enim tantum in
 ipsis distinctiōe usus est, a uehementia nimirum
 & mediocritate doloris. Atqui & ipsius totam tibi
 adscribam dictiōem.

*Que pharmaea Archigenes ad aurium dolores
 conscripsit. 9*

In priore de phar-
 macis secundum genus libro,
 Archigenes in hunc modū hæc uerba scripsit. In
 aurium dolore, præcedente aliā diætā quam ad ca-
 pitis dolorem ordinauimus. Si quidem moderat-
 us fuerit, simplicia ungenta tepida instilla, uelut
 crocinum, aut irinum, aut rosaceum, aut nucum a-
 mararum succum, aut casia ungentum, aut simpli-
 cem nardum, aut susinum, aut amygdalinū, aut ro-
 sarum, aut mali punice, aut papaueris succum cum
 oleo calido, aut porri semen tritum. Aut uera-
 trum album cum rosaceo tritum, tepidum per strigilem infunde. Aut opij parum cum lacte mu-
 liebri. Aut opij succum eliquatum cum lacte eo-
 dem modo. At uero ubi uehemēs sit dolor, Al-
 uum per clysterem ualide subducatur, & sanguis à
 cubito detrahatur, & quæcunq; similia adhibean-
 tur. In deq; fomentum ex decocto lauri aut simili
 quopiam fiat, aut ex sulphure uiuo in aquā insper-
 so. Exprimentur autem uehemēter spongiae, auri-
 busq; apponant, facillime em̄ ab humore frigescūt;
 quapropter fomenta sicca longe commodiora eis
 existunt, ex sale uidelicet aut milio, aut simpliciter
 lana cōuoluta, aut tenuibus mappis. Aut rutam
 feruefacito, eiusq; decoctum in angusti oris uascu-
 lum transfundito, lanaq; os eius obturato, & auri-
 culæ admoueto, quo uapor inde per lanam ad au-
 rem penetrare possit. Quidam in posca & modico
 oleo rutam coquit, atq; ita liquorem in uasculum
 infundunt, ex eoq; fomentum parant. Post fomen-
 ta uero aurem scalpito, & balsamum cum rosaceo
 dilutū infundito, aut aliquod ex prædictis ungen-
 tis tepidum. Aut aliquod aliud conueniens ad au-
 ris dolorem, ex his quæ mox describentur imponi
 to. Aut papaueris calicē tenuem farina ammixta,
 & in aqua mulla coctum. Aut papaueris calicem

Galen.

tenuem cum ordeacea farina in uino coctum. Aut
 foenum græcum aqua mulla coctum. Aut semen
 lini eodem modo. Summe auxiliatur spongia o-
 cularis melle cocto atque adhuc calido imbuta, et
 imposita. Aut ceratum ex irino, styrace ad ipsū
 ammixto. Egregie facit ad aurium dolorem aloē
 rosaceo permixta, & mellis crassitudine infusa.
 Aut chalcitis uino diluta. Aut perdicij succus te-
 pidus instillatus per se, & cum melle. Aut nitrum
 modica aqua diluito, ammixtoq; oleo tepidū in-
 stillato. Aut aristolochiæ radicē cum oleo. Aut
 ueratū albū cum rosaceo tritū tepidū per strigilem
 instillato. Probe facit opium in testa torrefactū,
 similiterq; castorium, pari pondere, cum rosaceo
 & passo ad mellis spissitudinē redacta, In quibus
 deinde post fomentum, specillum lana obuolu-
 tum intingitur & imponitur. Aut succum foeni-
 culi cum aliquo ex prædictis ungentis in princi-
 pio instilla. Aut anguis senectam cum calicibus
 papaueris coquito & infundito, aut cum quopiā
 ex prædictis ungentis. Aut garum hispanum ca-
 lectatum per strigilem instillato. Facit & acopō
 foetidum tepidum infusum. Aut papaueris suc-
 cus rosaceo, & modico crocino dilutus. Omnibus
 tamen præstat Hiera aromatica cum quopiā ex
 ungentis. Egregie facit & ueratrum albū tritum
 cum melle & rosaceo infusum, meatu per purpū-
 rā lanam obturato. Præclare facit & ueratrum
 cum irino ungento. Facit & cedria cum nardino
 ungento infusa. Seuerus autem Afellos in aqua
 riijs uasis nascētes (Millepedas Latini uocāt) cum
 ungentis tritos ulceratis infundebat. Quidam uero
 frigidam aquam dolenti auriculæ infundūt, &
 confestim quidē longē magis dolitant, paulo post
 uero perfecte à dolore liberantur. Alij melius fa-
 ciūt, & in alteram non dolentem aurem frigidam
 infundunt quemadmodum Lucius solet. Præcla-
 re faciunt & aloē & crocinum cum ungento amy-
 gdalino infusa. Aut æs tritum cum aceto & ali-
 quo ungento. Summē prodest Silphium cum ro-
 saceo, si exulceratio adsit. Mirabiliter confert in
 excellenti aurium dolore, porri fucus, & caprina
 urina, & rosaceum, cum modica myrrha infusa.

Aut Sciuri adeps in strigili tepefactus instilla-
 tus. Aut alumen scissum & mentæ succum cum
 passo instilla. Aut piper album & sale, pari pon-
 dere, cum sapā, sinistra manu, ter aut septies infun-
 de. Aut cochleam siue limacam africanam pu-
 tridam compungito, & rosaceo impleto, & ferue-
 factum calidius per strigilem infundito. Quod si
 ex plaga, externa pars auriculæ doleat, ad micam
 thuris lac affundito, semelq; atq; iterum diffundi-
 to, ac tertio macerari in eo sinito, & agitatum in-
 fundito: statim enim dolorem sedat. Hęc quidem
 Archigenes ualde indistincte scripsit, possit autē
 quispiam mēte præditus, reuocatis in memoriā
 his quæ prius dixi, facile animo concipere quale
 tandē ex prædictis phar-
 macis, singulis relatis au-
 rium doloribus conueniat. Nimirum si memori sit
 facultatis eorum: de qua in simplicium phar-
 maco-
 rum libri mentionem feci. Verum ego iam ad au-

riculares compositiones ab Andromacho scriptas transibo.

*Auriculares compositiones Andromachini
mero XXIIII. 10*

Quatuor & uiginti compositiones auriculares ex ordine Andromachus conscripsit, quarum aliquibus distinctionem quadam, aliquibus nullam apposuit. Et prima quidem ex eis hoc modo scripta est. Compositio auricularis ex libris Galli qua uitor. Myrrha drach. i. salis drach. iij. thuris drach. iij. spumæ nitræ drach. iij. croci drach. iij. succi papaueris drach. iij. amygdalas amaras xx. galbani drach. ij. aceti boni quantū satis est. Descriptio hæc ad Menemachum refertur. Multi usus hanc compositionem auricularem Andromachus scripsit, multis simul affectionibus aurium destinata.

Verum antea à me dictum quod huiusmodi compositiones nihil magnopere corrigūt, neq; etiam error ex earum usu nobis contingit. Quæ uero uniaffectioni congruunt, illam ipsam optime curant, alias uero aliquando, ultra hoc quod nihil iurant, amplius etiam exacerbant. Secundam deinceps compositionem post prædictam scripsit hanc. Compositio auricularis Aetii Galli ad inflammationem, & intensos dolores. Galbani drach. viij. cinnamomi drach. ij. myrrhae drach. viij. croci drach. viij. thuris drach. iij. spumæ nitræ drach. iij. succi papaueris drach. iij. aceti ut mellis accipiat spissitudinem. Oportet autem nitro prius præparare ne pingue quicquam addit, deinde pharmacū ipsum infundere. Et hic rursus ab obturatione liberantia, & concoctoria, & laxatoria & discussoria pharmaca mixta sunt, quæ uehementes dolores sanare non possunt, & ob hoc ipsis papaueris succi ammixtus est. Terciam auricularem huiusmodi conscripsit. Auricularis compositio Laodici regis, qua absidue uitor. Castorei drach. ij. succi papaueris drach. iij. opopanax drach. ij. spumæ lycij drach. i. passo excipe, & tepefactis utere. Hæc euidenter intensis doloribus conuenit, non tamē alijs affectionibus. Ego uero quemadmodum dixi, in unaquaq; affectione proprio pharmaco uitor, semperq; papaueris succum fugio, neq; nisi urgente necessitate, ad eius usum peruenio. Quartam deinceps auricularem sic scripsit. Alia ad inflammationem & purulentas ac ueteres affectiones.

Fabæ Aegyptiæ internæ amara, aluminis scissi, pipæris albi, spumæ nitræ, croci, opij, malicorij, myrrhae, thuris, nardi, singulorum drachmas ij. castorei drach. i. aceti & mellis quantum sufficit. Alij mellis drach. vi. conijciunt. In hac compositione, pharmaca alia discussoria, & resiccantia, & obturatione liberantia sunt, & quedam etiam concoctoria, uelut myrrha & thus existunt. Alumen autem scissile fortiter adstringens pharmacum, ad resiccandum purulenta ammixtum est. Adiectum est & opium doloris sedandi gratia, oppositumq; est ei castorium uelut antea dixi. Sed in eiusmodi affectionibus non solum ut oppositum, sed & ut concoctorium earum, & tanquam resiccatiuum merito iniicitur. Quintam deinceps auricularem An-

dromachus scripsit his uerbis. Alia Xenocratis qua saepe usus sum. Spumæ lycij drach. ij. myrrhae drach. i. thuris drach. i. aluminis scissi obolos ij. spumæ nitræ obolos. ij. trita cum aceto reponito. Vtere cum aceto. Et hæc multi usus est, non tamē in dolore forti conuenit, ut quæ neq; opium neq; castorium habeat, neq; quippiam ad adipibus sedantibus dolorem, neq; galbanū. Sexta compositio auricularis consequenter hac uerborū serie scripta est. Alia Prynæidis concordat cum Harpali compositioe. Myrrha obolos iij. nardi obolos. iij. croci obol. iij. aris ustri obolos v. opij obol. ij. castorei obol. iij. aluminis scissi drach. i. & rotundi drach. i. Excipe passo ubi fluxus fuerit, quum dolor rofaceo. Vbi uero uermiculi generentur, ueratri nigri drach. ij. ammisceto. Probe fecit quod in fine usum eius adiecit, quem nos sanè dixissemus, si ipse adscribere neglexisset. Septima similis præscripta, in hunc modū descripta est. Alia Vgæi compositio consona. Veratri nigri obol. ij. myrrhæ obolum. i. & dimidium. opij. obol. iij. aris ustri, obolos iij. aluminis scissi obolos ij. castorei obolum. i. croci obolos iij. cum passo utere. Octaua præscriptis omnino similis est. De nona uero hoc modo ipse scripsit. Alia qua uitor in doloris uexatione & sonitu. Nitræ drach. i. myrrhae 3. i. rofacei cyathū i. aceti cyathū i. simul tritis utere. Hoc pharmacū nō ad dolorē in inflammatione conuenit, sed ad eos dolores qui ex obturatione, & flatu frigido ac uaposo, similiterq; ex humore oboriuntur.

Decimam deinceps hoc modo scripsit. Adures purulentas Harpocratonis. Florum mali punici, malicorij, aristolochiæ, chalcitidis, misyos cyperi, gallæ, squamæ æris, singulorum drach. i. myrrhae, thuris, utriusq; obolos iij. atramenti sutorij asfati, aluminis scissilis, utriusq; obolos iij. cum passo pastillos formato ac utitor. Quod si etiam ipse pharmaci promissionem non præscripsisset, facillimum tamen erat nobis eam animo assequi, memoria repetētib; ea quæ in principio præfatus sum. Est enim aurium purulentarum resiccatiuum hoc pharmacum quod ipsum malum ex fluxione quam ex capite delabente contingit, ob quam etiā exulcerationes diuturnas accidere uidemus. Vnde decimam auricularem sic scripsit. Auricularis compositio in multis consona. Croci drach. i. myrrhae drach. i. castorei drach. ij. aluminis scissi drach. iij. thuris drach. i. cum passo ad mellis crassitudinē redigito, deinde etiam sic dilutus utitor. Et hæc moderatas affectiones sanat, quemadmodū etiam ea quæ hanc sequitur. Cæterum quæ deinceps post hanc ab Andromacho adscriptæ sunt auriculares compositiones, eas citra meam expositionem adscribā, quū ipsas per se cognoscere possint, qui prædicta memoria tenent. Verū quarū ipse cum distinctione fecit descriptionem, earum nulla amplius nostra interpretatione opus habet. Deinceps igitur omnes describentur. Ne uidelicet amplius altius alterius articularis compositionis, ab aliquo alio medico conscriptæ, mentionem facere opus habeam. In his enim uarietas omnium ipsarum com-

prehēta est. Auricularis ut Solō diætaris. Myr
the drach. iij. aluminis scissi drac. iij. castorij drach.
mas duas. thuris drachmam unam. croci drach. i.
opij drach. i. cum cretico aut uino mulso ad mellis
crasitudinem redige. Auricularis compositio
Antipatri ad doloris uexationes. Croci sextan-
tem, alij unc. i. myrrhæ unc. unam. salis ammoniaci
ciunc. i. aluminis scissi, ammoniaci thymiamatis,
utriusq; oleos dimidium, fecis ungeti irini aut Sy-
riaci sextantē, cum uino mulso aut cretico ad mel-
lis tenuis spissitudinem redige ac utere. Auricu-
laris alia ualde commoda. Opopanacis drach. ij.
succipapaueris drac. iij. spumelycij. drac. iij. casto-
rij drach. ij. aluminis scissis ob. ij. croci. ob. ij. myr-
rhæ drac. i. Vfus eius est cum lacte muliebrī. Ad
aures purulētas cōpositio Spēdusæ. Fellis porci
castrati partes ij. mellis Attici partē i. Vase uitreo
simul indita in ferulido cinere usq; ad dimidium cal-
facito, atq; ita utitor. Auricularis Harpocratis ad
affectiones & dolores. Spicæ nardi drach. vi. myr-
rhæ drach. vi. piperis drach. vi. spumæ niri drach.
vi. floris salis drach. vi. croci drach. xij. nucis ama-
ras. succipapaueris drach. xij. uini ueteris quan-
tum sufficit, stanneo uasi pharmacū infundito. Ad
grauitātē auditus & sonitus. Veratri albi drac. i.
castorij obol. i. spumæ niri sesquibolū. cum ace-
to optimo utere. Alia. Struthij drac. i. croci ci-
licij drach. i. castorij drac. i. ueratri albi drach. iij. ni-
tri drach. i. redigito in pastillos, & usu expetente
uino dilutis utere. Ad aures purulentas. Alu-
menustum & myrrham cum melle terito & præ-
lota auricula pharmacum lana exceptum imponi-
to. Auricularis Chrysanthi Gratiani, ad inflam-
mationes & exulcerationes. Blattas detractis pen-
nis xij. uini ueteris & mellis utriusq; sexuncē, ma-
li punici putamen unum, succi porri sesquicya-
thum. In olla noua donec mali punici putamē flac-
cidum fiat coquito, deinde terito, & ungenti Sy-
riaci unciam unam adijcito, picis liquidæ sequium
ciam, cepearum iij. succum expressum, & contrita
simul reponito; usu uero expetente tepēfacta lana
excepta indito. Auricularis compositio ad in-
flammata & purulenta. Nardi indicæ drach. i. a-
luminis scissi drac. ij. opij drach. iij. malcorij drac.
iij. croci drach. iij. myrrhæ drach. iij. thuris drach.
iij. mellis Attici drach. iij. spumæ niri drach. iij. ca-
storij drach. ij. amygdalarum amararum drac. viij.
piperis albi grana xxx. acetī cyathum i. urinæ suis
slyuebris tantundem, fabæ Aegyptiæ utridis inter-
næ amaræ drach. iij. trita simul in stanneo uase re-
ponito. Vfus tepore cum rosaceo instillato, & la-
næ purpura infecta tomentum indito. Auricu-
laris ad desperata uelut Zoilus ophthalmicus tra-
didit. Seminī hyofcyami obolos iij. aluminis
scissi oboli dimidium, myrrhæ drac. i. castorij obo-
lostres. succipapaueris obolos. iij. gallæ obol. iij.
croci obolos iij. cinamomi obolos quatuor. thuris
obol. ij. spumæ niri obol. ij. sandarachæ obol. ij.
uini recentis cochlearia iij. urinæ suis feræ mascu-
læ cochlearia tria, sanguinis conchylj obol. iij. suc-
ci mandragoræ obol. i. mellis Attici quantum suf-

ficit. conchylio aurem obturato. Auricularis a-
lia ad inflammata & purulenta mirabilis. Rutæ
obol. iij. myrrhæ obol. iij. succi hyofcyami drach. i.
opij. drach. i. croci drac. i. Cum lacte muliebrī ute-
re & tepidum infunde. Auricularis compositio
ualde bona & probata ex Apollonij libris. Myr-
rhæ drac. ij. thuris drach. ij. nucum amaranū drach-
mam unam. spumæ niri drach. ij. aluminis scissis
drachmā unam. malcorij drachmam unam. spicæ
nardi drach. ij. aloes drac. iij. uini mulsi ueteris cya-
thos iij. Arida trita uino mulso ammisce, & cocta
in stanneo uase repone, usu uero exigente tepido
utere.

Compositiones auriculares ab Aesclepiade in primo
exteriorum scripte. II

B Auriculares compositiones ad dolores aurium
recentes, quibus Niceratus usus est. Inter eas opti-
ma hæc est. Asellorum domesticorū. Est autem
animal multipes in aquarijs uasis & sterquilinijs
enascens, quod ad digitorum cōtactum in orbem
se contrahit, horum tres aut quatuor in oleo ferue
facito, & expressum oleū auribus infundito. Facit
& cucurbitæ succus cum rosaceo, aut nardino
mixtus & tepēfactus. Et perdicij herbæ fucus cū
oleo coctus. Et centaureæ succus aqua multa di-
lutus. Et hyofcyami succus rosaceo mixtus. Facit
& papaueris succi parum lacte muliebrī disso-
lutum. Et serofus ruor qui à carnibus bubulis
dum torrentur destillat. Has itaq; crudas recentes
prunis imponere oportet, & crudas adhuc expri-
mere, & expressum liquorem calidum infundere.
C Facit etiā nucum putrefactarum internarum li-
quor, aceto dilutus addito rosaceo. Facit & A-
phricana limaca in propria testa, cum oleo nardi-
no aut rosaceo feruefacta. Facit & suis quæ non
peperit sel, pari melle Attico ammixtū. Aliud.
Succi papaueris, castorij, utriusq; obolos ij. pas-
so diluito, & modico rosaceo adiecto tepida infun-
dito. Aliud. Succipapaueris & succi peucedæ
niæquales partes dissolutas infundito.

Ad inflammationes cum exulceratione
Charixeni. 12

Myrrhæ, opij, castorij, singulorum æquales par-
tes, passo dilutas tepidas infunde. Aliud. Hyo-
scyami succi, succipapaueris, myrrhæ, castorij, sin-
gulorum drach. iij. piperis drach. i. passi protropij
quantum satis est. Ad siccas nō humentes ulce-
rationes. Optime conuenit & in pesto apposi-
tum. Oesypti drac. iij. medullæ ceruinæ drach. iij.
butyri drac. iij. adipis anserini drachmas quatuor.
ceræ tyrrhenicæ drach. iij. terebinthinæ drach. i.
olei cicini cyath. ij. olei amygdalini cyat. ij. olei cy-
prini cyath. ij. pissellæ cyathū i. Componito & uti-
tor quantum sufficit oleo nardino diluto, & ad mel-
lis crasitudinem redacto. Aliud ualde commo-
dum & ad neruorum affectiones. Olei cyprini
cyath. ij. irini, rosacei, amygdalini, olei ueteris sin-
gulorum cyath. ij. pissellæ cyath. ij. ceræ sextantē.
terebinthinæ unc. i. adipis anserini unc. i. componi-
to & utitor. Aliud ad abcessus in profundo, An-
tonij Musæ. Croci drach. duas, myrrhæ drach. ij.

bdellij drach.iiij.nucum amararum drac.viij.succi marrubij,heminæ dimidium.palsi protropi,hemi næ dimidium.Liquores coquito,& ammixtis reli quis reponito.Vtere in passo dissoluens quantum sufficit. Aliud. Croci,myrrhæ,castorij,centau reæ,singulorum drac.ij.spumæ nitri drac.i.amygdalarum amararum depuratarum drac.viij.suci ci helxines sesquifextarium.palsi protropi sesqui fextarium.Componito ac utitor ut dictum est.

Aliud ad inflammationes cum fluxu,quo usus est Cleon. 13

Myrrhæ,aloes,thuris,succi papaueris singulo rum drach.ij.Misyos crudi drac.i.aceto excipe,& usu expetente passo diluta infunde. Aliud Arij Tarsensis.myrrhæ drach.iiij.thuris drach.iiij.Mi syos crudi drach.ij.lycij indicis drach.iiij.aceto exci pe.Vsus iam indicatus est.Quod si multus fluxus oboriatur subscriptionis compositionibus uten dum est,croci,thuris,myrrhæ,opij,seminis uiticis, singulorum drachmam unam.lycij indicis,florum mali punici,florum rosarum singulorum drach.ij.aceti heminam unam.Viticis femen,mali puni ci flores,rosarū flores,in aceto coquito,& ubi dis soluta fuerint reliquis adijcito,& excepta reponi to.Vsus tempore passo diluta infundito. Aliud ad purulentas aures cum dolore,quo usus est Ci mon.Castorij drach.ij.aluminis scissi,croci,myr rhæ,thuris singulorum drac.i.passo aut uino Myr tite excipe,ac utere ad recens malum cum uino multo,ad inueteratum cum aceto. Aliud Clau dij Damonici ad purulenta & inueteratas affectio nes. Croci drachmas iiij.myrrhæ drach. i.nuces amaras depuratas numero xxx.spumæ nitri,nardi syriacæ,aluminis scissi,singulorum drachmam i. thuris obolos iiij.Aceto acerrimo excipiuntur,& per acetum diluuntur.

14 Ad foetorem & nomē siue ulcus depalcen do proserpens,compositio Hispanorum appella ta. Garinigrī quod Romani Sociorum appella nt,sexta,i.aceti scillitici sextarium i.mellis Attici sesquifextarium.Ad compagem coquito,& in ut reo uase repositis utitor. In alijs descriptōibus sic legere est. Succu cucurbitæ sextarium i.cōpo nito,faciat ad foetorem cum inflammatione. Cha rixeni ad corruptiones & foetores. Aluminis Melij drachmas octo.atramenti sutorij drachmas octo.aloes drachmas octo.crocomagmatis drach mas octo.myrrhæ drachmas octo.uini myrtitæ se xtarium dimidium. Alumen & uinum ipsū co quito,atq; ubi in pagem coierint, reliqua ace to dissoluta inijcito,& repositis utitor.

15 Ad carniū incremētum,quo usus est He raclides Tarentinus. Aeruginis rasæ drachmas octo,quam aris drachmas octo.In alio exempla ri drachmas quatuor. mellis hemina dimidium. Arida trita ac melle excepta donec rubefiant co quito,& ablati utitor. Aliud. Aeruginis drach mas quatuor.atramētī sutorij drachmas quatuor. myrrhæ drachmas quatuor.succi marrubij cyath. tres.mellis quantum sufficit,præpara ut dictum est. Chalcedonia ad inueteratas affectiones.

A Veratri albi drachmas quatuor.croci drachmas quatuor.myrrhæ drachmas quatuor.castorij drach mas quatuor.thuris drachmas iiij.opij drachmas quatuor.atramenti sutorij drachmas sexdecim.pi peris drachmas duas.myrrham,opium,thus,ca storium, in aceto cui malficorium incoctum est, usq; ad dissolutionem macerato, deinde ueratū, crocum,piper,atramentum sutorium,confusa inij cito,atque omnia simul diligēter terito: quod ubi probe factum fuerit, uini nulli quantum satis est affundito, ut ad diluti mellis crassitudinem redi gantur. Vsu uero expetente tepesfacta infundito, Ex huius pharmaci usu saepe egregie mihi successit, uerum temporis progressu omphaciū drachi, ad hanc descriptionem adieci.

B *Aegyptiæ ad easdem affectiones etiam si sint comata.*
Amygdalarum amararum depuratarum drach mas ij.fabarum aegyptiarum interioris partis ama ræ,piperis albi,croci,myrrhæ,opij,singulorū drac. duas.thuris drach.ij.omphaciū drachmas iiij.alu minis scissi drac.iiij.castorij drachmas ij.atramen ti sutorij drac.iiij.spumæ nitri drac.ij.Aceto in quo malficorium incoctum est excepta,ad limi crassitu dinem redigito. Vsus uero tempore quantū suffe cerit ex pharmaco acceptum,ac nardino ungen to dissolutum infundito. Ad sanguinis exauri bus eruptiones. Heraclida Tarentini, facit ut ne in grumos coeat. Marrubij succum coquito & ammixto aceto infundito. Aut mali punici in aceto cocti succū exprimito & infundito. Aut polygoni succum cum modico aceto. Autacia m, aut amurcam, aut lyciū cum aceto. Aliud. Botryos sistit sanguinis eruptiones. Succum rubi,et succum gallarum in aceto coctarum,simul mixtos infundito.

Quæ pharmaca Archigenes post prius scripta subiicerit. 16

Pharmaca ad aurium dolores ab Archigene scri pta supra relata sunt. Nunc uero etiam ea quæ ad alias affectiones conscripsit apponam. Hume nibus uero polygoni succū cum pari rosarum suc co infundito. Aut crocum & myrrhā cum pas so & rosaceo tepesfacta infundito. Purulentis au tem prodest quidem polygonū cum rosaceo infu sum. Verum egregie conuenit eis uinum, in quo conixæ tenuia folia habentis folia sint incocta,in stillatum. Quidam etiam thus ad uinū ammiscent.

Aut lycium rosaceo dilutū instillatum. Aut mar rubij syluestris femē cum aceto & rosaceo eodem modo. Aut cumini & croci æquale pōdus cum uino austero. Aut croci & myrrhæ utriusq; drac duas. nuces amaras decorticatas numero xxxv. nuces tritas cum mellis hemina dimidia, & porri succi hemina dimidia commisceto,et reliqua item probe trita in sdem liquoribus diluito, ac simul de inde contrita instillato.

De auribus exulceratis. 17

Cæterum exulceratis auribus & cruentis ac do lentibus,galbanum & opium cum passo & rosa ceo, mellis crassitudine instilla, aut pro galbano peucedani succum ammiscet, & magis succedet.

Aut spodium affatum cum rosaceo tritum infunditur. Aurilicium cum lacte muliebri. Magnifice opitulatur etiā ipsū mel per se tepidum infusum, præsertim si foetores simul adsint. Quidam asellos Milipedas appellatos, qui in aquarijs uasis reperitur, cum unguento quopiam instillant, & eximie opem sentiūt. Aut blattas domesticas cum rosaceo instillat. Probe facit ad omnem auris affectionem, ad epeus uulpius in ueteratis liquatus & instillatus. Aut sphondylii interiorem uel medullam cum melle & rosaceo infunde. Aut elota & cōscalpra auricula porri aut marrubij succum cum melle infunde. Aut lixiuium pileatorum cum melle seruē factum. Aut thus cum aceto in mali punici putamine seruē factum infunde.

Aur gallam tritam linteolo illigatam in uino coquito, & ex hoc instillato, statim a dolore liberat.

De uermibus aurium.

18

Porro in quibus uermes sunt, ueratrū album cum melle immitte, aut aridum insuffla, aut rubi succū infunde. Quod si uero auricula os corrosum sit, fissura retro aurē impacta, ipsū scalpito, deinde urito, ac citra molestiā cicatrici inducito.

De sonitu in auribus.

19

Sonitus quidam ex flatuoso spiritu generantur. Quidam ob exquisitam sensus audiendi subtilitatem fiunt, quemadmodum in oculis imaginariæ suffusiones, propter uapores ex ore uentris exhalantes. Ceterū neutrius affectionis certa cognitio in principio haberi potest, Non conuenit tamen citra artem, aut cognitionē, ut ad curationem auspiciari. Dictum enim iam sæpe est atque etiam demonstratum, non unum coniecturalis spei genus esse: atq; artificialem quandam coniecturam ex causis forinsecus lacessentibus, procatarticiis à Grecis appellatis, facere licet, si quis ipsarū uires norit, quā alia affectio ex frigiditate, alia ex ardore fiat. Quemadmodū etiam ex prægressa plaga, aut tali uel tali morbo: uelut & ex cruditate, aut largo uini potu, aut uiolento & multo uomitu; aliquando & ob pharmacorum auricularium usum, sonitus quidam fiunt. Quin & si uel paulatim congregetur, uel coaceruatim irruat sonitus, id ipsum quoq; ad inuentionem affectionis conducit. Insuperq; si per interualla repetat, uel continenter hoc symptoma perseueret. Verum certa cognitio tempore contingit, post usum pharmacorum artificiali coniectura exhibitum.

Siquidem igitur in febris sonitus fiant, minime intetrandi sunt: ut plurimum enim statim sedantur. Si uero ob flatū uentosum, cui transitus interclusus sit, sonitus fieri suspicatus quispiam fuerit, & ob hanc rem dissecatibus & attenuatorijs ac diffusorijs pharmacis admotis, nihil profecerit, simulq; apoplegmatissimis usus sit, & toto capiti prospexerit: huic merito in hanc suspicionem inclinatus animus erit, sensus audiendi uti delictet subtilitatem sonitus causam esse, præsertim si acuto audiendi sensu æger præditus appareat. In eiusmodi itaq; quendā, qui prædictis pharmacis usus erat, neque quicquam opis senserat,

A quū ego forte incidissem, ex stupefacientibus sensum quippia ammisit, uelut est mandragoræ succus, & papaueris succus, ex eisq; à sonitus symptomate liber euasit. Quæ igitur à prioribus medicis ad huiusmodi symptomata & accessoria mala cōscriptæ sunt auriculares compositiones ex diffusorijs & incidentibus pharmacis constant. Super itaq; in Catalogo & enumeratione cōpositionum auricularium ab Andromacho descriptarū, ex eiusmodi materia compositæ quædam recensebantur, quas ipse ad sonitus conuenire scripsit. Nunc uero eas quas Archigenes ad hanc rem conseripsit recensebo.

Compositiones ab Archigene ad sonitus cōscriptæ. 20

In sonitibus repētinis acetum cum rosaceo instilla. Aut cuminum & oleum crassitudine mellis. Aut radices cucumeris syluestris succum.

Aut ipsam radicem oleo incoctā. Si uero ad multum tempus perseueret, omnibus amaris & acribus, attenuatorijsq; & diffusorijs, quæ ad dolorem ex crasis humoribus obortū descripta sunt, utaris, singulis in aceto coctis & admixto melle.

Aut reclinato ægro, et nitro crudo trito in aurem insperso, ac acetū tepidū infunde, ac postquam feruere desierit, lana scalpēdo exterge, & nucunt amararū succum infunde, & lana obtura. Aut nitrum & myrrham probe unita, cum rosaceo & aceto, ac atramento scriptorio crasso instilla, aut penna in eis immerfa bis in die inde. Aut castorio ac nardino pari mensura cum aceto & rosaceo utere. Aut aceto ac nitro melleq; mixtis collue.

Caterum quibus ob multam sensus subtilitatem sonitus oboriuntur, castoriū & cicuræ semen cum aceto trita instilla. Ex morbo uero obortis sonitibus, ubi fomentum ex decoctione absynthij adhibueris, acetum & rosaceū instilla. Aut raphanij succum cum rosaceo, aut aloen optimam cum uino mulso dilutam. Si uero perdurent, ueratrū nigrum aceto decoctū adhibe. Huiusmodi quidē Archigenes ad sonitus aurij cōscripsit: uerum Apollonius in primo parabellū subscripta habet.

Que Apollonius ad sonitus & susurros sibilosq; ac inflationes aurium cōscripsit. 21

Acetum acre tepidum instilla. Mel Atticum calidum instilla. Laurinum oleum eodem modo. Porri succum cum lacte muliebri aut rosaceo infunde. Cucumeris syluestris foliorum aut fructus succum per linteolum instilla. Cucurbitæ syluestris medullam oleo dilutam infunde. Cuminum tritum cum medulla utulina instilla. Cucumeris syluestris medullam oleo dilutam infunde. Glandem unguentarium terito, & adipe anserino ac resina pari mensura ammixtis instillato. Semen lini tritum & unguento Arabico dilutum instilla. Misy terito & unguento rosaceo dilutum instillato. Rutam & cuminum pari mensura trita & aceto diluta, ammixto melle infunde. Hyssopum tritam & cedrino oleo dilutam instilla. Amygdalarum amararum oleum melle mixtum eodem modo. Quod si efficacius reddere uelis hoc cum priore cōmittito. Viticem & stellionis caput pari ponere

dere trita ammixto oleo instilla. Nitrum & resinam & adipem anserinū, æquis partibus cū oleo ammixto dissoluta instilla. Cepas & allii & adipē anserinum pari mensura trita et excolata infunde.

Eraqua collutis prius calida, nitru tritu infusilla.

Ad aures exulceratas & purulentas eiusdem. 22

Primum quidem collutiones Apollonius scripsit. Secundum deinde locum infusilla habent. Tertium resiccatória, & quartum quæ infusillanē, iuxta subscriptā ipsius dictionē. Aqua calida asidue collue. Lenticula decocto eodem modo.

Aqua mulla calida similiter. Hederæ cremore aut decocto cum uino utitor. Malicorij cremore aut decocto similiter cum uino. Gallæ plene decocto cum uino. Myrto in uino decocta elue. Vino cum modico alumine trito utere. Stœbes semine in uino cocto elue. Vrina & uino mixtis ac calfactis elue. Infusilla: picis serum infunde. Oleæ folia exsuccato, & ammixto melle coquito ac utitor. Papaueris succum passo dilutū instilla. Ceparū succo cum melle utere. Rutæ syluestris succum, cū uino & oleo rosaceo in mali punicij putamine calfactis instilla. Cardamomū tritum cum melle instilla. Peucedani succū rosaceo dilutum instilla. Aloen et crocomagma diluta instilla. Absinthio cum melle trito utere. Myrrham & resinam ac anserinū adipem cum oleo trita infunde. Pinguitudinem caseo in sigillatum uas recēs coacto superstantē tepefactam instillato. Diphryges tritum cum melle instillato. Alumen scissum tritum cum passo & aceto, ad mellis crassititem coquito, ac utitor. Resiccatória. Cedriam melle mixtam instilla. Piperis albi grana trita unguēto Aegyptio diluta, & in parua concha trita instilla.

Crocum et ceruham pari mēsurā trita, et rosaceo diluta infunde. Melanthiū & sulfus pari pōdere terito et rosaceo diluito, et unguēto irino, adipeq; anserino pari mensura additis rursus terito ac utitor. Myrrham & sulfus æquis partibus, trita & oleo mixta instillato. Myrrham & putamē mali punicij dulcis, æquis partibus, trita ac melle diluta infundito. Animalcula ex arboribus, ueluti rubri uermes, trita & oleo diluta instilla. Animalculum quod Intestinum terre appellatur, coctum & excolatum instilla. Resinam & mel ac oleum pari mensura mixta ac dissoluta instilla. Malum punicū dulce accipito, & excocto eius umbilico acinos eijcito, deinde passū cyathum unū infundito, & aramenti sutorij triti obolos duos infarcito, & ad mediocrem crassitudinē coquēdo redigito, ac tepido utitor. Quæ infusillantur: Gallā tritam infusilla. Piper rotundū cū uino contritū insperge. Eodem etiam magis diluto pro infusilli utendum est. Omphaciū & gallam torrefactā æquis partibus trita infusilla. Utendum etiam deambulationibus, & uētris euacuationibus, & ciborum subtractione & purgatione aurium diligentiore.

Ad aures humectas. Ceterū ad aures humore madidas, ita enim Apollonius appellat, subscripta pharmaca cōmoda existunt. Misij linteolo illigatum urito, & cum ipso tritū instillato. Gal-

la usta ac trita similiter utitor. Spodio trito eodem modo. Alumen in testa torrefactum & affuso oleo tritum instillato. Cæterum eadem diligentia circa diætam utitor.

Ad auditus grauitatem. 23

Porro in subfurdis, siue grauior & difficulter audiētibus, aut etiā surdastris appellatis, ut pote qui exiguas uoces penitus nō audiūt, magnas autem uix percipiūt, hoc ipsum symptoma ualde suspectum habere oportet: paulatim enim augetēs temporis progressu perfectam surditatē inducit. Quapropter per hieram purgādū sunt, & per catapotia ex colocynthide, pituitaq; eis per apophlegmatismos detrahēda, ac caput resiccandum est, omniq; modo curandū ut robur ei addatur, quemadmodum iam sæpe est demonstratum. Vtendū etiā attenuatoria diætā. Atq; in ipsam auriculā pharmaca cōiijciēda sunt, quæ crassos & uiscosos humores findunt ac diducunt. Quorum sylvia eiusmodi est.

Quæ Apollonius in primo parabiliū ad auditus grauitatem pharmaca conscripsit, in hæc uerba. 24

Ad auditus grauitatē repentinam, & ex dolore capitis obortā. Absinthiū cum aqua decoquito, et per stipulam fomentū inde facito, quomodo alias per arundinē id fieri demonstrauimus. Baccis lauri aut folijs eiusdem in aqua decoctis similiter utitor. Similiter etiā origano, atq; itē hyssopo. Aqua quoq; marina & aceto eodē modo. Eisdē autem & in olla coctis utēdum est, fomentū uero per ollam quō fiat iam demonstratum est. Aceto alio et aqua pari mēsurā cum nitro trito feruefactis, ad plures dies eluito, atq; inde aqua simplici calida eluito, & sic ea quæ ad hæc rem descripta sunt infundito. Marrubij succū & irinum unguentū mixta instillato. Fel tauri & capræ ac unguētum rosaceum mixta instillato. Ceparū succo & resina oleo dilutis æqualiter utitor. Oleo nucū & resina mixtis pariter utitor. Alumen aceto dilutū instillato. Myrrhā & alumen pari pōdere trita & aceto diluta infundito. Adipē anserinū & fel bouis, ac laurinū pari mēsurā mixta instillato. Hederæ syluestris baccarū succum per linteolū expressum instillato. Veratrū nigrū aceto tritū, melleq; multū cocto exceptū, in parua collyria ad formā glandis redigito, eaq; meatū indito, ac per dies quinque finito. Senectam anguiū aceto tritam instillato.

Eadem & cū felle bubulo, aut caprino, aut testudinīs marine, aut callionymi diluta utitor. Nasusticij quantū sufficit, et nitri parū, carne ficus reiectis granis excipito, indeq; collyriū auditorio meatū congruū formato ac indito, Per tridui aut ipsū eximito. Hoc multas sordes educit, & confestim leuissimū malū reddit. Ceterū reliqui corporis quoq; cura habēda est. Deambulationibus itaq; per uiribus multis utendū est, et capitis reliquorūq; membrorum frictione. Insuper & apophlegmatismis & collutiōibus quæ pituitam extrahere possunt.

Cibis utendū est copia moderatis, & ex genere eorum quæ facile exoluuntur & facile concocta excernuntur. Plurimum autē auxiliatur in huiusmodi affectiōe cōstitutis, spōgia tenuissime cōt-

ta & auriculæ indita. Idem remedium cōmodum est & ad carnem in auditorio meatu enascentem. Post hæc uero, inquit, utendum esse olle fomento iam ante à se indicato. Indicauit aut hoc ipse inter reliqua auditus præsidia, uerum ego ipsum uelut à me condemnatū reliqui, propterea quod ad elotionem quidem præster in aurium dolore, utilitatem autē de se omnino nullam præbeat. Quapropter nunc ipsum apponam: uerisimile est enim surdastros inde iuari, utpote qui cōtrarijs præsidijs opus habeat his qui aurium doloribus uexantur. In doloribus enim affectæ partes exquisita quiete opus habent. Surdastri uero uehementi motu, & ferè dixerim trāsmutatione in contrariā ei quæ iam adest affectionem indigent.

Fomenta ad aurium dolorem ab Apollonio his uerbis conscripta. 25

Fomentis porrò utēdum est per spongias aqua calida imbutas ac sufficiēter expressas. Itemq; per cucurbitas affixas. Amplius uero & per uapotem ex arundinibus perforatis illatum. Oportet autem alterum arundinis extremum concauitati auriculæ congruens esse, alterum uero in ollam perforatum operculum habentem, & undiq; obturatum incambere. Sit autem in olla absinthium in aqua feruifacium, quo uapor inde sublatu ad auditorium meatum perferatur. Similiter & per fermentum in ueru alatum fōmētum adhibendum est. Vehementer etiā subscriptus fomentī modus cōuenit. Urinam tauri maxime, aut certe bouis uentisissimā, in ollam nouam angustī oris infundito, & aceti tertiam urinæ partē, & myrtū cōtufam ammisceto, deinde testas pro olle magnitudinis fatis multas, igni candefactas in ollā conijcito, posteaq; hominem inclinatū apposita ad ollam aure, fomentum admittere iubeto. Circum aurē uero fasciculum ex lana in orbem circūponito, ne uide licet circumfatis partes exurantur. Utendum & farina ordeacea ac triticea in uino cocta, itemq; unguento irino calido, grātia fōmētī. Superne uero auriculæ imponēdæ sunt lanæ molles ac puræ uino & oleo imbutæ, ordeacea itidem & triticea farina, aliquando quidem per se cocta, cum uino & unguento irino, aliquando uero columbino stercore, & aristolochiā tenui, æquis partibus ammixtis. Conferat autem & sibi abstinentiæ, & diæta tenuis, & alui euacuatō largā & memorabilis. Insuper & quies, ocium, capitis uelamē, In potu aqua calida, aqua mulsa, ptisanæ succus cum melle, donec remiserint dolores.

Que Archigenes ad auditus grauitatem, ac surditatem his uerbis conscripsit. 26

In auditus grauitate succū corticis raphani cum rosaceo aut cyprino tepefactum instilla. Aut galbanum cum aceto & melle seruefactum. Quod si surditas succedat, Veratrū nigrum erui magnitudine in coctio melle indito, ac donec quod impedit erodit finito. Aut ubi absinthij decoctio eluearis, mel & oleum instillato. Aut collyrio ex nitro, sicu, & sinapi immisso, per tridū id non extrahimus. Postea uero acutis uocibus assiduis & uicif-

sim grauibus inclamamus, et per tubam sonitu immisso malū depellere conamur. Post hæc & asphodeli radices oleo ueteri incoctas utiliter infundimus, caprinaq; urina assidue eluimus. Cæterū surditate ex capitis dolore oborta, raphani succum cum rosaceo infudi. Aut foliorū cucumeris syluestris succū. Aut castoriū cū baccis lauri & aceto.

Eiusdem de corpisculis que auribus illabuntur. 27

Quod si aqua in aurē illabatur, Auxiliatur acetum, & cum altero pede affectæ auriculæ propinquo exilire, aliquantulum seipsum reclinando. hoc enim modo facile excernit. Quin & excusio simplex per os, aut etiā per stipulam, egregie aquam extrahit: quod ubi factum fuerit, cōcalpta per lanam auriculā, ex prædictis unguentis aliquod instilla. Si uero calculus, aut faba, aut cōsimile quippiam, in auditorium meatum illapsum fuerit, eluito, aut lana circa auricularium specillum obuoluta, & resina tinctā extrahito. Idem & per glutinosum aliquod pharmacū fieri potest. Quod si neq; sic sequatur, sternutatorio in nares iniecto, os ad nares obturato: facta enim spiritus cōclusi extensione, id quod incidit effluit: idq; assidue donec excidat facito. Si enim intus manserit, aure inflammata conuulsiones inducet. Optime etiam confert ad eorum quæ illapsa sunt eiectionem, concussio. Si itaque puer fuerit, pede comprehensum & in caput eleuatum, cū concussione uibrabis, Si uero perfectæ ætatis quispiā ita fuerit affectus, ipsum in tabulam secundū affectam aurem reclinatam, caput ad tabulam firmare iubeto, deinde leuata tabulæ circa caput parte, deferri finito, idq; saepe repetito. Mouebitur enim quod in eisdem, & ad expeditiores meatus partes progredietur, atq; ita angusta & cōcaua specilli parte immissa scite extrahito. Si uero faba aut cōsimile quippiam in aurem illapsum, in ea maneat, madefactumq; & tumefactum, dolores inducat, impossibile quidē est ipsum integrū eximere. Quare per specilli concauū industrie partiti ac diuidere id ipsum oportet, atq; ita particulatim extrahere, deinde sapam aut uinum dulce calidū infundere, ac lenire meatum ex lanciaione offensum. At uero si animal aliquod illapsum sit, scāmōniam aceto dilutam, aut absinthij succū, aut peucedani succum, nitruq; ac sulphur cum raphani succo instillato.

Apollonij de ijsdem. 28

Apollonius autem de ijsdem sic scripsit. Ad pulices & uermiculos in auribus, reliquaq; earum poro illapsa, acerum & oleum instilla. Aut caparis succum instilla. Aut amygdalas amaras terito, & oleosum ab ipsis expressum instillato. Veratrū album tritū inspergito. Aut Aristolochiam tritā inspergito. Aut calaminthæ succū infundito. Aut cinnabarim uiridē instillato. Aut ueratrū albū cum uino infundito. Aut aluminis & seminis cucurbitæ syluestris, siue medullæ eius, quas partes tritas cū oleo cedrino instilla. Aut cepam tritā & cespitū æquis partibus in uino diluito ac infundito. Aut myrrhā tritam, acetoq; ac melle pariter dilutā adhibe. Aut chalcitidē crudam

tritum ac melle dilutum infunde. In uniuersum uero eximendum est quicquid in meatum incidit hoc modo. Per auriscalpium nimirum aut uolsellam, aut lanam mollem specillo obuolutam & resinatam, aut etiam quæ uncinum habeat tenuem appensum. Nitrum etiam afflatum tritum auriculæ inspergito, & acetum instillato, ac lana apposita per noctem finito. Sequenti uero die aqua & oleo calido eluito. Cæterum ad aquam in aurem acceptam, cape succum & adipem anserinum tepefactum instilla. Aut mali punici nucleo carentis dulcis & acidii succum in aereo uasē donec duæ partes superlint coquito, indeq; duas guttas instillato. Aut myrrham ex aceto & melle tritam infundito.

Auricularia pharmaca à Critone conscripta his uerbis. 29

Ad sonitus aurium à morbis. Absinthium in aqua decoctum pro fomēto adhibe, & rosaceum cum melle instilla. Aut raphani corticis succum cum rosaceo instilla. Aut aloen cū uino & melle. Aut thus cum aceto & rosaceo in malicorio ad mellis spissitudinem coquendo redactum. Aut hyoscyami succum cum rosaceo tepidum. Aut radicum calami uiridis succum cum lacte. Aut rhamnii succum cum celtica nardo. Aut gallam nigram cum pari myrrha ex melle. Aut lycium cum uino mulso instilla. Aut uulpis adipem.

30 Ad dolores aurium cum humiditate & purulenta. Vini ueteris sesquijunctum, mellis cōfici unc. i. nitrī rubri unc. ij. dimidiū. lycij indicī unc. i. lycium cū uino & nitro tritū leuigato, ac mel ammisceto, & in uitreo uasē reposita infundito, hyme quidē bis in die, æstate uero sæpius, & tomentum lanæ cōchylīo infectæ indito. Ad aures purulentas. Alumen scissile terito, & affuso aceto ad liquidiorē strigmento compagem redactum lana conuoluta excipito, & resiccata lana, ex ipsa in aurē indito, aut hoc ipsū pharmacū liquidum per lanam specillo obuolutam in aurē demittito, eamq; ex eo quotidie illinito. Expediit & modū cum passum affundere ne pharmacum exarescat.

Archigenes ad aurium affectiones extra meatum. 31

Ceterum ad affectiones aurium extra meatum auditorium Archigenes hæc conscripsit. Ad aures contusas, myrrham, thus, terram nigrā, quæ alī qui se tanquam sine gmate confricant, cum acriacetone probe unita cerati crassitudine imponito, & nequaquā amplius irritato. Aut cerusam & apij semē pariter accepta cum melle obline. Quidam absinthiū pro cerusa scribūt. Aut sulphur uiuū, myrrham, & thus cum pice liquida in splenio imponito. Aut glutinum fabrile & asphaltum siue bitumen eodem modo. Quidam etiam mannam, hoc est, thuris micas ammiscent. Aut cephalico Asclepiadeo emplastro utere. Aut pastillis pudendis destinatis illine. Porrò in quibus contusæ sunt aures, in intrinsicam expeditionem concauitatem cartilagineā, siugulina terra expleto; & sequenti die ubi exaruerit, solanum cum cerusa illinito, usq; quo in integrū restituantur. Verum in aurium uulneribus & fissuris, cartilagine probe coaptata

A fibulas imponito, deinde inflammationem accensibus & reliquo glutinatorio ductu uitior. At uero inflammata in aurium puerorū pulpīs foramina oleum, quod in aerea lucerna æruginem contraxerit, illinēdo per sanabis. Cæterum Asclepiades huiuscemodi ad contusas & fractas aures compositione usus est. Aloes partem unam. glutinis fabrilis cum aceto cocti partem unam. mixta imponito. Alīqui mannam siue micas thuris ammiscēt. Epithemata ad contusas aures. Coryledonis herbæ drach. viij. amygdalarum amararum depuratorum drach. ij. tragacanthi drach. ij. aceto dilue & utisco quercino excepta, et linteolo infarta, impone.

Aut ceræ drach. viij. galbani drach. viij. nucum amararum drac. viij. uisci quercini drach. xvi. thuris drach. viij. misyos affati drach. viij. componito ac utitor. Apollonius autem hoc modo, tum aurium inflammationes in superficie cutis ex humorem impressione aut plaga obortas, tum tumores ac rubores curauit. Butyrum recens excolatum instilla. Aut adipem anserinum & lac muliebre mixta instilla. Aut glandis unguentariæ succum & resinā liquidam tepidā affunde. Aut adipem bubulum ac anserinū æquis partibus liquefactos instilla. Aliud quod illini potest. Papaueris succum aqua dilutum, penna illinito. Aut crocū tritum & muliebris lacte dilutū illinito. Aut argenti spumam cum aqua & nardo tenui tritam illinito. Aut cerusam coriandri aut polygoni aut solani succo dilutam illine. Cataplasmata. Absinthium tritum ex aqua pro cataplasmate impone. Aut sesamum aqua tritū impone. Lentem aqua tritam cum melle impone. Aut mali punici dulcis putamina cocta & trita in uino; hoc ualde cōmodum pharmacum existit. Aut myrrham & adipem anserinū, uel butyrum, uel resinam, & cōchylīj partem internam æquis partibus trita super aurem & propinqua tēpora impone. Cōueniat autem ad hæc ciborū abstinentia, alui euacuatio, insuper quies, & capitis ac reliqui item corporis uelamen. Lōge uero remota esse debēt, ardor, frigiditas, balneū, uomitus, clamor, & omnis distētio.

Ad exulceratas ex plaga & fractis aures. 32

Panem calidum internū cum melle tritum impone. Myrrham cum uino ueteri tritam illine. Cochlearum colla unā cum testis terito, & dimidiā myrrhæ partē addito ac imponito. Absinthij & apij seminis æquales partes tritas cū melle imponito. Picem circūline & sulphur tritum aut thuris micas insperge. Verū ne obliges ista, neq; frequenter repetito epithematū detractiones.

De Parotidibus.

Cap. II

Parotides e genere quidem sunt inflammationum, sunt autē glandulis circa aures affectis; non tamen prima parte curationis partiū inflammatarum in eis utimur. in illis enim ut plurimum curatione rimprimente ac repulsoria à medicis appellata uti cōuenit, atque id maxime quum neq; malignū sit, neq; multum quod influit, neque corpus humoribus ex æquo redundet; Sic nanq; spongia sola ex posca imposita incipiētes inflammationes repres-

reprelsit, neq; quicquā ex eo totū corpus fuit of-
 fensum. Verum in parotidibus ipsū contrarium
 facimus, pharmaca attractoria adhibentes, atq; si
 hæc nihil memorabile efficiāt, etiā cucurbitam
 affigentes, aut fomenta assidua adhibentes. Anni-
 timur enim ut affligēs humor ex profundo ad cutem
 adtrahatur, præsertim si in capite affectio sit
 firmata, humoribus uidelicet in ipso obfirmatis.
 Quā & quā citra capitis affectionē, in febribus
 acutis natura superfluos humores ex uasis effun-
 dens, ad regionem inter cutem & subiecta corpo-
 ra deponit, quando sanè & glandulæ ex effusis hu-
 moribus participāt; melius utiq; etiā tunc uide-
 tur naturam adiuuare, per humorum ex loco in lo-
 cum impetuosis illapsū, febres curantē. At uero
 quum uehementi impetu fluxus illabitur, nihil
 nos curiosius agētes, omnia naturæ permittimus.
 Stenim siue cucurbitam, siue aliud pharmacū hu-
 mores ex alto ad cutem adtrahēs admouerimus,
 uehemens dolor hominē apprehendit, unde & uir-
 giliæ & febres inducuntur, ac uires exoluntur. Mi-
 tigare itaq; tunc & non humorum influxu opitu-
 lari cōuenit, per cataplasmatū maxime lenitiūm
 usum, uelut est quod ex frumentī, aut hordei, aut
 seminis lini farina, cum aqua mulla, aut fœni græci,
 aut altheæ, aut chamæmelorum decocto coqui-
 tur, & quæcumq; ad hoc quod moderate humectā
 habent caliditate, per quā mitigare dolores uale-
 nt, etiā influētēs humores cōcoquere possunt
 ac suppurare, quemadmodum de his in cataplas-
 matum tractatu sermonem fecimus. Quod si eti-
 am sanguis redundare uideatur, per uenæ sectio-
 nem ipsū euacuabimus, præsertim si id uires per-
 mittant. Nunc uero ad pharmacorum composi-
 tionem progredientes, quā etiā à principio nos
 tractaturos recepimus, qua ratione tum compositio
 ipsorum, tum usus consistet docebimus. Si itaq; tu-
 mor non discutitur, suppuratur, pharmacis uten-
 dum est, uelut est frumentī farina cū caricarum
 decocto & oleo. Itē quod ex polline, & quod ex
 fermento consistat pharmacum. Si uero suppurate
 fuerint parotides, tunc aut per sectionem pus elice-
 re oportet, ulcusq; uelut in eiusmodi fieri moris
 est ac omnibus notū curare, aut sanè per phar-
 macum abscessum rumpere, Quale est Smilii appel-
 latum, & quod ex alijs cōstat: aut tētare ut ipsū
 per medicamenta attractoria & tenuium partium
 uim habentia discutiamus, his per diem ipsdē abla-
 tis, & fomentis admotis donec remiserint & laxa-
 ti fuerint dolores. Quādo uero iam plurimū puris
 fuerit discussum, tunc iam primū semel soluere ea
 medicamenta, & fomenta adhibere oportet; dein
 de uero neq; ex re est id facere, sed ipsis pharmacis
 permittere, ut si quid reliquum in profundo hære-
 at, id ipsū discutiant. Quod si durities adsit, ea ip-
 sa quoq; mollienda est, quare hoc tempore ex mix-
 ta pharmacōrū facultate compositio parabitur,
 emollientibus uidelicet ad attractoria ammixtis.
 Postquam uero omnis purulentia fuerit euacua-
 ta, & adhuc durities aliqua relinquitur, emollien-
 tibus pharmacis utendum est, quorum sylvæ siue

materia itemq; compositionis uarietatem, in ma-
 lagnatum sermone demonstraui. Manifestū autem
 est, quod moderatas parotidas, in quibus ne-
 que humorum multitudo redundans in particu-
 las irruit, incantum ut uehementes dolores exci-
 tet, neq; caliditas cū humore adest, facile per hæc
 sanare possumus. Neque enim ad suppurationem
 festinant, neque uehementem dolorem inducunt.
 Verum licet etiā fomentis ex muria uti, & cata-
 plasmata magis calefacientiaq; & discutientia ad-
 hibere, & medicamenta eandem facultatem pro-
 pe attingentia. Quum uero pleriq; medici & pa-
 rotidum pharmaca indistincte conscripserint, Si
 quis prædictis in memoriā reuocatis ad eorum
 usum accesserit, facile intelliget quibus tādē ad
 singulas parotidas utendum sit. Verum præexer-
 citabo etiā ego uos ad hanc rem per exempla,
 quæ Archigenēs in primo pharmacorum secun-
 dum genus his uerbis scripsit.

Archigenēs ad parotidas.

Parotidas dissoluere uolentes, plantaginē cum
 sale tritam assidue pro cataplasmate imponimus.
 Aut caprinum sterus ex aceto. Aut rumicis syl-
 uestris radices coctas in uino, aut sicū tritam cum
 atramento sutorio. Aut ficum coctam, cum absin-
 thio & uino tritis. Aut buccina marina, aut pur-
 puras uistas, melle aut axungia exceptas imponi-
 to, & confestim discutientur. Idem etiā ostreo-
 rum testa uisa & cū melle imposita facit. Aut ce-
 ratum rosaceum siue cyprinum, ruta ammissa, aut
 sulphure uituo addito, emollitū, aut cimolia cum
 aceto. Discutit maxime ficus aqua marina aut mu-
 ria cocta, ac trita imposita. Idem facit & marrubi-
 um tritum cum sale, & lana butyro imbuta ac im-
 posita, in choantibus parotidibus opitulat. Quæ
 admodum huic postremo loco ab eo relato, recte
 Archigenēs discernim appositus, incipientes paro-
 tidas ē butyro opem sentire testatus; Sic cōuenit
 bat ipsū etiā circa alia medicamēta utendū tem-
 pus adiungere, uelut ego pauloante feci. Quin et cir-
 ca hoc ipsū butyrum, non satis est ex solo paroti-
 tidum principio facere discrimen nisi apponatur
 num uehementer aut molliter concitetur, & num
 dolenter uelut cum pulsationibus & uigilijs inse-
 fet, an cum moderato dolore. Deinde qui sit mor-
 bi status, Num magna omnino laxitate opus ha-
 beat, an per minorem iudicari ac finiri possit: tali
 namq; suffecerit butyrū, in corporibus præsertim
 mollibus eunuchorum, puerorum, & mulierum,
 & eorum qui teneram habent carnē. Si uero cum
 uehementi dolore fiat, cataplasmate dolorem se-
 dante opus habet, simulq; assiduo fomento uel per
 solam aquam, uel etiā modico iniecto ad eam sa-
 le. Quandoquidem uero primum omnium phar-
 macum conscripsit, plantaginē cum sale, ab illo
 sanè etiā nos rursus initium faciemus, plantagi-
 nis naturam recordantes ex mixtis facultatibus
 discussoriaq; & repulsoia compositam esse. Ego
 uero nunquam pharmacis ad parotidas destina-
 tis repulsoia ammisceri operæ precium existimo,
 præterquā si aliquando, raro tamen, ad multum
 discussio

discussoriorum copiam parū quiddā ex eis addatur, atq; id tūc demum ubi citra uehementē dolo- rem parotides irruant. Quod uero deinceps scri- ptum est, Stercus caprinū ex aceto, inueterata; ac indurata nullumq; amplius memorabilem dolo- rem habētis parotidis pharmacum esse possit, ue- lut etiam lienis in scirrhum indurati. Tertio dein de loco consequenter, Radices rumericis sylvestris in uino coctas tradidit. Si sanē & qualitatem & æ- ratem uini apposuisse, fortassis & ego tentassem de eo iudicium ferre. Quū uero nō adiecerit, mul- tumq; differat acerbū, aut austerum, aut acre, aut dulce, aut recēs, aut uetus, aut crassum, aut tenuē, aut suluum, aut album, aut nigrū uinum esse, ob id etiam ego nihil habeo quod de hoc pharmaco di- cam. At quum uobis hoc cognitū sit, q̄ maiori di- scutiendi uī præditū sit uetus, præsertim si ex gene- re natura calidiorū sit, uelut sunt in totū sulua, cō- traria uero huic secundū uires tum austerum, tum acerbum, huiusmodi quidem uinum utare oportet. In suluo uero et mediocriter uetusto, et tenuiū partiū, rumericis radices coquetis, et in parotidibus citra uehementem dolorem obortis adhibebitis. Scribit deinceps, ficum tritam cum atramento fu- torio. Discussoria quidem igitur & attenuatorie facultatis est ficus, præsertim arida; recens uero di- scutiendi quidem uim habet, uerum concoquere non potest. Verū atramentum futorium nemo ignorat utraq; facultates fortes cōplecti, quapro- pter etiā uehementia eius uitāda est. Cocta dein de fico nimīrū arida, cū absinthio & uino tritis, uti iubet. His sanē etiā uos utemini in tēpore, ad me- dias magnitudine ac tēpore inflāmationes. Quē- admodum etiā buccinis, & purpuris, & ostris us- tis, in durefcentibus ac uetustis. Est enim pharma- cum quod omnem afflictionē & acrimoniā miti- gat & discutit, nō solū si melle quis eorū cinerem imbuat, sed & multo magis si adipem uetustum a- fibris deputatū ammisceat. Citra omnē enim mo- lestiam omnes inueteratas inflāmationes discutit, etiam si ex influxionis materia sint obortæ. Dein ceptis cerato rosaceo & cyprino cū ruta uti iubet, quod discussoriorum quidem pharmacū est, uerū ni- hil uehementē neq; uolentē in se habet. Paulō uero efficacior sit cōpositio, si sulphur uiuū pro ruta am- misceamus. Quæ sequitur deinde cimolia cū aceto, neq; fortē, neq; dolorosam, neq; magnā parotidē curare potest. Ficus uero aqua marina cocta, in in- ueteratis iam cōmoda fuerit, utpote discussoria uī prædita, uelut etiā si aqua marina penuria, muria quis utat. Simile huic est, quemadmodū etiā ipse Archigenes dixit, Marrubii cū sale. Post hæc ue- ro de butyro scripsit, cuius ut ultimi circa illius di- ctiōis ordinē, paulō ante mentionē feci, post quod rursus ad generosum pharmacū trāsit, Pyrethrum tritū sico excipit subēs. Deinde calce uiua cū mel- le trita uti præcipit. Et post hoc, mustelæ sanguinis illinendi meminit. At uero talia tanquam curio- sa & superuacanea, & quæ magnā rei medicame- naria egestatem indicent, si per alia auxilia, citra sanguinis mustelæ adhibitionem, parotidas cu-

are nequeat, neq; in usum assumpti, neq; eorū ex- perimentum habeo. Sed neque ex amicis nostris quispiam alius uti tentauit. Verum cerebrū illini- re quodcumq; tandem, medio crū parotidum me- dela existit. Post hoc uero hæc uerba scribit. Ace- to feruenti perfundito, aut spongiam in acida mu- ria imbutam imponito. Fofforum ac messorum fortassis ea fuerit medela, non hominum urbano- rum. Deinceps acris mētionem facit pharmaci ex mustela usta, cuius cinerem cerato irino excipi- iussit. Verum eiusmodi pharmacis, quando diu- rant & in scirrhum indurantur utēdum est; ple- raq; enim ab eo scripta ueterascuntium & ægre- fo lubilium parotidum remedia existunt, quapro- pter etiam ipse ad pharmacū hoc adiecit, q̄ etiam Strumas probe sanare possit. Post hoc uero eiu- smodi dictio inordinate inserta est, tum assidua ca- lidæ adpersio, tum assidua crudæ ordeaceæ farinæ impositio. Quod ipsū siue quis per se legat, si- ue prioris dictionis finem, huius dictionis princi- pium faciat, utrunq; male dictum est. Manifestum uero hoc erit ubi præcedentis dictionis finē præ- posuerimus, ut totus sermo eiusmodi fiat. Mirabi- liter discuit & strumas, sæpe etiam parotidas, tum assidua calidæ adpersio, tum assidua crudæ ordea- ceæ farinæ impositio. A parte enim saluum est, stru- mas & parotidas ex assidua calidæ asperione, & assidua crudæ farinæ ordeaceæ impositione discu- ti. Si uero de parotidibus solum dicatur, certa di- scutiō aberit, quæ doceat nos in quibus & quali- bus parotidibus aqua calidæ adpersio, & assidua crudæ ordeaceæ farinæ adhibito conueniat. Non enim in omni, sed quam citissime uelimus suppu- rari, hæc facienda sunt, quemadmodum in superio- ri sermone est indicatum. hoc itaq; uisiose, ut dixi, interseruim est. Cæterum Archigenes ad conse- quentia transgressus rursus pharmaca scribit, non apponens quod induratis & inueteratis salutaria existant, quum nos ex materia ipsorū, ipsa talia esse cognoscamus. Ad scribam autē iam uobis ipsius Archigenis dictionē. Quæ sic habet. Proprie ue- ro lupinorū amarorum farinā cum melle coctam, modica calce uiua addita, pro cataplasmate impo- nito. Egrege discuit & hoc. Plicis brutiæ, man- næ siue micarū thuris æquales partes, terebinthi- næ, palmarū Syriacarū non uetustarū pinguiū car- nis puræ, utriusq; duplū. galbani dimidiū manna. probe unitis utitur. Si uero dura sit resina expecta- to. Aut nitri & rubricæ sinopidis tertiā partem cū ungento cyprino ad strigmentitiā crassitudinē redacta, ac linteolo infarta imponito: Aut calce uiuā cum strigmentis eodem modo. Aut caricas, galbanū, nitrum pari mensura, sulphuris tertiā par- tem, terebinthina, opopanacis utriusq; parū quid- dam. unitis utere. Aut calcem uiuā cum aceto tri- tam impone. Quod si neq; per hæc discutiantur, adiuuabimus permutacionē in suppurationē per largam & frequentē decocti lauri aut baccarum eius perfusionē, aut sulphure uel cōsimili quopiā in aquā insperfo, et per frequentia ex calida crudæq; ordeaceæ farinæ cataplasinata, siue nitro, siue co-

lumbino stercore in ea ammixto. Aut etiã cucurbita cum scarificatione affixa. Deinde ad chirurgiam perueniendum est & crudi abcessus sectionem. Optimum enim in his ut q̄ celerrime fluxio foras euellatur. Hæc quidẽ Archigenes scripsit.

3 Sunt autẽ & multa emplastra quæ parotidas discutunt, aliqua quidem iam inueteratas et induratas: aliqua uero eas in quibus sedato dolore, nulla amplius puris suspicio est. Quemadmodum etiã aliqua quæ iam suppuratas curare possunt: talia uero inter discutitoria emplastra, singula cû urinum suarum professione conscripta sunt, uel etiam ea quæ simplices parotidas curant laxatoria appellata, omnibus nota sunt. Exempla ipsorum sunt, Emplastrũ Mnasæ, & quod ex succis constat, & quod ex pũsana. His adhuc molliora sunt cerati forma, tum ex butyro, tum ex cespso conficta, ostreis aut buccinis, aut purpuris uisidãditis, adipeq̄ porcino, singulis quadrãtis pondere Præstat & hoc. Butyri unc. i. ceræ sextantem et uncie dimidium, ostreorum ustorũ quã tenuissimẽ tritorũ sextantem. liquecibilia liquefacito, ostreaq̄ infarcito, ac unitis utitor confidenter. Efficacissimum hoc ad parotidas existit.

De affectionibus narium. Cap. III

Ex genere tumorum præter naturam, polypodes in naribus generant. Ex genere uero ulcerum ozæna. Secundum genus autem excretionũ præter naturam, Sanguinis eruptiones fiunt in morbis acutis, iuxta rationem earum quas recẽtiores Medici priuatim Superexcretionẽ appellant. Nimirum in quibus natura ad iudicatoriũ auxilium concitata, modũ excessit. Primum itaq̄ de ozænis sermonem faciunt, quæ ex humorum acriũ & putrescibilium influxu generantur: ita ut si acres solum sint, ægre curabilia ulcera producere cõsueverint, non tamẽ graueolentia. Cæterũ cura communis ambobus his est, itẽq̄ polypi, ut uidelicet primum caput sicetur & firmetur, quũ palãm sit ob utitorũ humorem redundantiam defluxũ ex eo in nares protuenire. Quo modo uero caput totum corroborare oporteat, quo nullum recremetum ex eo ad inferas partes delegetur, sæpe iam dictum est. Quum igitur per illa caput ualidum reddideris, ad naris progredieris curationem, Scopu in ozanis proposito, ut affecta pars per mixta facultatis pharmaca tum repellentia, tum discutientia, resicetur. Repellunt itaq̄ tum austera, tum acerbã, quæ communem adstringentium appellationem habent. Discutunt autem calida & sicca facultate prædita, quorum sylvia talis est.

2 Archigenis pharmaca ad ozænas, Quum ozæna in naribus fuerit, calaminthæ succũ infunde. Aut ipsam calaminthẽ aridam per fistulã infusilla. Aut ueratur album cum seminis nasturtii chema quotidie insuffilla: post hoc uero caput perfunde. Obline autem eos uel chalcitide, aut atramento sutorio, aut psõrico cum melle. Aut instillato in narem melle, & per sternuatoriũ facta cõcussione, tectoria ulceri obducta excutito, deinde præscriptũ ex nasturtio & ueratio pharmaca-

Galen.

A cum, per narem adtrahere quã plurimum iubeto, & postea amurcam cum melle illinito. Aut rannuculi succũ cum alumine liquido in narem infunde, ægrumq̄ resupinatum donec ad os penetret adtrahere iube, atq̄ id usq̄ quo percuraueris identidem repete. Si uero uetera sint ulcera, etiam acetum uetus ammisce, aut sulphur tritum. Acritem acetum in uasculũ angustũ oris fufum, ad multum tempus ad respiratiõẽ ipsorum appone, deinde Misycyprium, & dimidium eius nardi indicæ, cum uino chio ad mellis crassitudinẽ redige, ex eoq̄ meatu obline, & per lanam obtura. Ad ulcera in naso. Vlçera in naso, ex malorum punitorum succo in æreo uase ad medietatẽ cõcto perline. Aut malum punicũ dulce integrum in uino cõctum terito, & forinsecus imposito. Aut uolum albam ex aqua asfricato. Aut rubi succum & alumen Melium cum aqua diluta eodem modo. Si uero uetus sit ulcus cû aceto diluito. Aut iridem & sandaracham cum melle oblinito. Aut adipem utulinum & resinam illinito.

De polypo narium.

3

Polypus tumor est qui præter naturam in naribus generat, polypodis carni alsimilis iuxta substantiæ proprietatem. Manifestum itaq̄ est affectionem hanc ex crasis & uiscosis humoribus generari, atq̄ ob id mixta materia medicamentaria opus habet, ut uidelicet partim adstringat, partim secet & attenuet, partim etiam discutiat & cõdenset. Archigenis ad polypodas. In polypode nasturtij tenuis chema, siue drachmam dimidiã, cû ueratio albi obolis duobus, nare adtrahere iube. Vbi uero exciderit linamentis cum anthera siue florido emplastro ex melle utere, aut lyceo eodem modo.

4 Aselepiadæ ad Ozænas & polypos. Aselepiadæ in quinto extorũ sic scripsit. Aridũ ad Ozænas, Aluminis scissi drach. iij. myrrhæ drach. iij. sandarachæ drach. iij. gallæ drach. i. atramenti sutorij usti drach. i. tritis utere. naribus prius uino odorato elotis, & pharmaco per specillũ extremũ siue nucleum admoto. Aliud. Seminis ericæ drach. viij. myrrhæ drach. viij. niri rubri drach. viij. malicorij drach. viij. seminis tamaricis drach. i. crocomagmatidis drach. ij. tritis utere. Aliud. Soreos Aegyptij friabilis drach. ij. chalcitidis ustæ drach. ij. seminis tamaricis drach. i. croci drach. i. myrrhæ drach. i. tritis utere. Aliud. Chalcitidis ustæ 3. ij. atramenti sutorij assati 3. ij. Misycos drach. ij. amomi 3. i. myrrhæ 3. iij. croci 3. i. tritis utere. Alia compositio quæ flauescens appellatur. Aluminis scissi drach. viij. chalcitidis crudæ drach. vi. sandarachæ drach. iij. putaminis mali punici drach. ij. atramenti sutorij usti drach. ij. misycos assati 3. ij. tritis utere. Alia. Atramenti sutorij usti 3. iij. diphrygis 3. ij. calcis uiuæ 3. ij. sandarachæ 3. ij. Arida admoue, aut linamentum tortum aqua madefactum ac pharmaco imbutum inde. Aliud. Misycos assati drach. duas. mannæ thuris drach. ij. chalcitidis assatæ drach. ij. squamæ aris selquidrachmã. æruginis drachmam unã, arida adhibe.

tom. 5

A Lampo-

Lamponis ad Ozanas, azilopas, polypodas & multa alia. 5

Ad Ozanas ac agillos ac polypos, & quæcūq; uelis citra sectionem ac unctionem submouere. Dirimit etiam ossa corrupta, facit & ad ulcera serpentina ac putrida inspersa, & ad sordida ulcera linamentum excepta ac indita cum melle. Scobis gris rubri unc. i. salis ammoniaci sextantem, ammoniaci thymiamatis sextantē, aluminis rotundi quadratē, acetici acerrimi heminas vi. Arida terito, & affuso a ceto, omnia in uas aeris rubri transferto, in eoq; ad solem sub canicula ardore cum aeris rubri radio agitato donec pharmacū exarescat, deinde in mortarium translatum diligenter terito, & in fistili recōdito. Vsu uero exigente, aquā absorbendam dato, deinde etiam in ore continēdam, pharmacū uero per fistulam insufflato. Scribonij Largi facit ad omnia extuberantia. Misys usqi, chalcitidis usq; a tramenti futuri usqi, foreos, squamæ aeris, singulorum drac. viij. Arida admoueto. Oportet autem præcedenti die quiescere, deinde sequenti pharmacum post cibum indere, Illinenda etiam nares antea cum bitumine aut liquida pice, aut myrrha stacte. Philoxeni chirurgi ad polypodas, ozanas, omnem excrescētē carnem, hæmorrhoidas, & quibuscūq; crustam inducere uelis. Aeris usqi, auripigmenti torrefacti, misys usq; fati, singulorum drach. ij. diphrygis drach. iij. chalcitidis usq; a tramenti futuri usqi, squamæ aeris, singulorū 3. iij. tritis utere. Cæterū post pharmacorū adhibitionē, etiā sternutatorij utimur, quo uti delicti tectoria ulceri obducta excutimus, quæ tribus aut quatuor diebus ferè excidere cōsueuerūt. Vbi uero exciderint adipe anserino ac butyro cum rosaceo cerato curantur. Versi Asclepiades in primo pharmacorū exteriorū ficscripsit. Asclepiadæ ad ozanas, quo usus est Megeis. Seminis ericæ drac. iij. myrrhæ drac. iij. nitri rubri drac. iij. putaminis mali punici drachmas quatuor. croci drach. ij. costi drach. ij. trita insufflato. Aliud. Aluminis scissi drach. iij. myrrhæ drach. iij. sandarachæ 3. ij. rhois rubri 3. ij. salis fossilis 3. ij. costi 3. ij. croci 3. ij. trita insufflato. Ante curam uero nares uino odorato & optimo melle eluere canamur. Ad nariū polypos quo usus est Antipater. Aeris usqi 3. iij. minij sinopici 3. i. trita per hardinē insufflato. Quin & per specilli nucleū admoueto. Aliud Antonij Musæ. Atramētī futuri partē unam. sandarachæ partē unam. trita insuffla. Aliud Charixenis post chirurgiam. Cornu cerui usqi drac. iij. squamæ aeris rubri drach. iij. auripigmenti drachmam unā. trita insuffla. Aliud. Bryoniæ radicis usq; drach. quatuor. a tramenti futuri drach. iij. spumæ nitri drac. iij. elaterij drach. quatuor. trita insuffla. Ad ulcera in naribus.

Recremētū plumbi, uini ueteris, olei myrtei, singulorum æquales partes. plumbi recremētum ut quàm leuissimum fiat terito, & adfuso uino rursus leuigato, deinde myrteum addito, omniaq; simul misceto ac conquassato, & in sigulinum uas coniecta prunis imposito, afsidueq; agitato, atq; ubi strigmentosum redditum fuerit pharmacū subla-

tum in pyxide plumbea seruato. Aliud. Plumbi usqi & loti drach. viij. uini rosati quantum sufficit, olei myrtei quod satis est, apparato & utitor ut dictum est. Aliud. Spumæ argenti drach. vi. cerusæ drach. viij. malicomj drac. iij. aluminis scissilis drac. iij. uini aminaci quantū sufficit, olei myrtei quod satis est. Arida tusa & cribrata in mortarium coniecta cum uino ad strigmentitiam crassitudinem redigito, postea uero myrteo oleo affuso conquassato, & ablatis in pyxide plumbea reconditis ut dictum est utitor. Sint autem myrtei hemina quatuor. uini cyathi. iij. Diogenis pharmacum a commodatum. Adipis anserini drac. iij. cæsyphi sesquidrachmam, medullæ ceruinæ drach. ij. ceræ Tyrenicæ drac. viij. plumbi usqi & loti drac. iij. sribij usqi & loti drach. viij. ladani drach. ij. adipsis utulini drach. ij. terebinthinæ drach. iij. cerusæ drach. ij. spumæ argenti drach. i. rosacei quantū sufficit. Liquida cum aridis committito & repositis utitor. Vsu autem expetente quantū satis fuerit tollito, & rosaceo dilutum naribus sublinito.

Ex primo de parabilibus Apollonij. Ad affectiones in naribus. Ad narium exulcerationes, & putredines ac fetores, mali punici nucleo carentis dulcis itemq; acidi succum, in aere uase donec duæ partes superflint coquito, ac utitorq; penitissimè illinendo. Facit & malum punicū dulce cum uino coctum & forinsecus impositū. atq; intro illitum. Ad excrescentem carnem & polypum. Diphryges tritum admoueto & linamentū nares disparato. Aliud. Veratrū terito, eiq; origani par pondus tritum addito, ac naribus bis in die insufflato. Aliud. Veratrum nigrū cum pari sandaracha terito, & ammixto oleo, lana excipito, eoq; narem expleto. Aliud. Florem eris, & æruginem, ac silphij succum pari mensura oleo ammixto terito, & ungenti crassitudine ad dies quinque naribus sublinito; deinde per uolessam trimito. Aliud. Auripigmentum & calcem trita cum specillo large adhibeto. Vbi uero intumuerit & eleuatus fuerit polypus, ueratrō nigro arido trito moderate utitor. Vt plurimū enim in diebus septem nasus ua cuus redditur. Deinde diphryges cū melle usu expurgato. Aliud. Auripigmentum & calcem ac ueratrū album trita cum specillo admoueto. Ad ea quæ naribus illabuntur. Quæ naribus illabuntur, auriscalpio aut uolessa extrahito, aut sternutatorio admoto, os apprehendito, atq; alteram narem comprimito, siquidem non in utraq; nare a defectio existat. Hæc quidem Apollonius quibus ipse usus est tradidit. Verum ut ego usus sum, & in polyphis ac ozanis narium, probatissima reperi subscripita. Ac primū quidem quod ex malis punicis constat pharmacum. Sint autem pari numero ac magnitudine ex tribus eorum differentijs accepta. Aliqua enim ex his sunt austera, aliqua dulcia, & quædam acida. Contundenda itaq; sunt recentia & matura, atq; integra diligenter confringenda, quo succus ex eis exprimi possit, quem in uase stanneo depositum a dseruare oportet, modice coctum siquidē liquidior quæ

oporteat uideatur. Quod uero ab eo reliquum est solidum & crassum, rursus diligenter contundendum est, ut à contusione rursus in pila atteri ac leuigari possit, indeq; collyriorū formæ effingit, quæ congruam ad ægri nares proportionem habeant. Induntur enim hæc in naris quam polypus obfedit meatum, quo citra mordacitatem & consensum, qualem acria pharmacia excitare solent, per longiorem moram ipsum expurgent. Quod si huic melior & mollior tibi appareat polypus, plus ex austeris malis punicis cōiicies: si durior, ex acidis. Quandoquidem uero perpetuo tolerare collyrium moleustum est, ab eius usu interquiescere conuenit, atq; eo tempore quo ipsum non indis, per expressum succum agrū curare, & sanè oris diducto ricubiant, etiam circa illas partes iuxta quas natus ad palatum perforatus est, liquidum ipsum expressum pharmacū illinire, uel cum penna, uel cum lana specillo duos nucleos siue cuspides habenti obuoluta. Cæterum ex aridis pharmacis diaphryge, citra mordacitatē aliquando per multum tempus cōsumptū polypum noui. probatur etiam in ipsis predictū collyriū ex malis punicis effictū, si ubi exaruerit probe contundatur, cribreturq; ac leuiget, indeq; suffletur, aut etiā per specilli nucleum indatur. Omnia autem hæc assidue facere oportet, ut nunquā ab affectu parte pharmacum ablit, quum facile ab humiditate eluatur. Quem admodum igitur in lippientibus, sic & in his semper si possibile est, pharmacū adhibere oportet: ablitur enim facile, ut dixi, ab influente humiditate. Porro quum eumuchus quidam nullius pharmaciferi posset adhibitionem, sed ab omnibus irritaretur, rosis aridis contusis ac probe tritis atque inditis, mirum quam uiderim hominē magnopere citra omnem mordacitatem adiutum. Quare in corporibus mollibus & humidis, aut quibus egre uiscera ipsa sanescunt, rursus eodē pharmaco usus sum, contigitq; ex duobus alterum, aut ut nihil noceret, aut omnino citra molestiam opus suum perliceret. Pleraq; enim eorum quæ polypodas exterunt, eos acerbant ubi à scopio aberrēt. Cæterū ulcera in narium meatibus semper per pastillos curauit, andronium uidelicet, & pasonis, & polyidæ, & bythinum, & per eum quem ego cōposui, his ipsis aliquando uino dulci dissolutis, aliquando aut stero, & quandoq; moderate ætatis, quandoq; ueteri. Interdum etiā acetō dilui uel uinoso, uel simpliciter acido, uel etiā acri ualde & uetusto, iuxta prædictas indicationes, usū pharmacorum secundum symptomata affectuū reperio. In diuite uero quopiam qui odoratum pharmacum sibi adhiberi expetebat in ozanæ curatione, hedychroi usum excogitauit, ipsūq; uino salemo ueteri dissolui, & mirum quam breui affectio ipsa est curata. Relata est hedychroi compositio circa theriaces antidoti descriptionem.

Herulide ad eruptiones sanguinis è naribus, ad Antiochidem. Cap. IIII

Sufficienter quidem de sanguinis eruptionibus in curandi Methodi libris dictum est, uerum nūc Galen.

quæ ex sylua usu cognita cōstant, & à prædecessoribus nostris approbata sunt referent. Vbi grumos sanguinis exuderis, lanā specillo obuoluito, eāq; in lycio aqua diluto imbuito, & sanguine manantem locum illinito. Aut linamentum longum lycio imbutū indito, deinde forinfecus cū digitis apprehesum nasum cōprimito, donec cōstitit sanguis. Aut chalcitidem mediocriter leuigato & linamentum ex ellychnio cōtortū in frigidā aquam demittito, deinde in chalcitide obuoluito. Aut linamentū priapi siue pudendi forma naribus indito. Aut linamento rasili utitor q; penitissime in truso. Præstat aut digitū ad palatum immittere, ne eod linamentū rasile deferatur. Aut thus cōfringito, & polygoni aut feminis porri succo diluito, in eoq; linamentū rasile, aut ex ellychnio obuolutum indito. Aut mentā tritam indito. Aut spongiam siccam immittito. Aut spongiā in acre & feruidū acetum cōiectam forinfecus ad sanguine manantem narē apponito, atq; specillo donec impleatur apprimito. Præstat aut spongiæ principitū filo per acū transmitti, quo facile extrahi possit, extrahito aut quū opus suū perfecisse existimaueris. Si uero inarescat spongia, intusq; agglutinet, per auricularem clysterē frigidā aquam immittito, ac infundēdo humectato, atq; ita extrahito. Verē etiā compositioibus uulnerarijs, & sanguinē sistentibus quæ describent. Accomodatū est & frontē spongijs refrigerare, itēq; capitis partes sublimes facere. Brachia aut & manū iuncturas, femoraq; & inguina, atq; genua cōstringere, in his qui moesto ac defecato sunt animo, quæadmodū in uenarū sectionib. facere moris est, lubēditq; sunt ut ea membra moueāt, manus quidē cōfricādo, pedes uero ambulādo. Expletis em sanguine quæ in eis sunt uenis, nares sanguine manare cessant. In potu amplius exhibēda sunt ea quæ ad sanguinis refectionē cōscribent. Aures quoq; cōtentæ per lineteola accerā obturent, & in ore aqua pluuiialis frigida contineat. Quod si quid ex sanguine deglutitū esse uideat, etiā idipsum ubi multa eius sit copia, per euacuatūū ducito. In uentrē em & intestinis in grumos coactum, incensionem facit.

2 Pharmacia Aesclepiadæ in quitato extenorum ad sanguinis narium eruptiones scripta. Quæ Marcellæ inscribit. Platanī pilulas collectas in umbra exsiccatō, & desiccatas super pannū asperum in discū diffundito, easq; aspera ipsius panni siue tunice parte cōfricato, aut in panno ex pilis siue setis cōposito obuoluito: ac semē quidē pilularū abijcito, tomenta uero collecta in testaceū uas nouum reponito. Vsu aut expetente, ea ipsa lanuginosa tomenta in harundinē cuius geniculi recisi sunt indito, & qua parte excavata est harundo, naribus imponito ac insufflato, compendioso hoc uincit sanguinis eruptionē. Aliud, Atramentum futurium diligenter tritum reponito. Vsu uero postulante, rasuram quāpiam lineteolorū in pharmacum immerfam indito. Aliud, Spongiam cruda pice imbutam exurito, & linamento torto exceptā indito. Aliud, Putaminis oui partem

unā.gallę omphacitidis partē unā. trita linamen-
to torto aqua aut aceto madefacto excipito, & in-
dito. Frontē uero & nasum gypso aut luto figuli-
no integito. Aures autē contentę obturare iubē-
to. Quidam spōgiam aphricanam aceto acerri-
mo incoquūt, deinde exprimunt, eamq; in ignito
lapide frequenter obuoluit, atq; ita suffitūt & ua-
porem excitant, quę naribus attrahere iubent.

3. Quę Andromachus scripsit, Ad sangui-
nis quidem ex naribus eruptiōes nihil priuatum
Andromachus scripsit, Verū inter ea quę sangui-
nem cohibēt, pleraq; etiā hæmorrhagias narium
sistunt, quapropter etiā ego adscribam eiusmodi

pharmaca quō ab ipso descripta sunt. Cōpositio
ischemos, id est sanguinē sistens, quator. Chal-
citis, misyos, manna thuris, singulorū 3. iij. tri-
tis utitor. Aliud. Chalcitidis 3. c. atrametū su-
torij 3. l. misyos assati 3. xxv. aeris ustri 3. xij. & di-
midia, tritis utere. Ischamos magna. Misyos
cyrij, 3. vij. atrametū sutorij 3. vij. corticis pini 3.
iij. squamę aris 3. iij. mānę siue micarū thuris 3.
iij. alij 3. xv. habent, aeris ustri 3. xv. chalcitidis 3.
xv. calcis uiuę 3. xvij. alij xl. gypsi torrefacti 3.
iij. alij vij. tritis utere. Ischamos Aphrode. Chal-
citis 3. vi. mānę thuris 3. ij. resine terebinthine
frictę drach. iij. alij tres accipiūt, tritis utitor.

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI IIII

Caput I. Doctrina affectionum, quę in oculis fiunt, in-
ter quas etiam de pharmacis diuersis in genere & parti-
cularim. 2. De pharmacis mordacitatis expertibus
ac lenibus. 3. De pharmacis acris. 4. De exter-
gentibus siue repurgantibus. 5. De eodentibus.

6. De asfrigentibus. 7. De concoctibus & em-
plastis. 8. De aspritudinibus palpebrarum. Vide
cap. 4. sect. 2. & cap. 8. sect. 8. II. De lippitudine siue
ophthalmia. III. De ulcerib. oculorū. IIII. De
ocularium pharmacorū uiribus. 2. Quę ad scabras
in palpebris affectiones conueniant. Vide cap. 1. sect. 8.

3. Quę induratis auxiliēt. 4. Quę suffusis con-
ueniāt. V. De aridis medicamentis ad oculos. 2. A-
ridū Galeni ad tuendā oculorū ualiditatē. VI. Ari-
ridę pharmaca ad oculos ab Aſclepiade descripta.

VII. Liquidę oculares cōpositiones ad ficosas emi-
nētias, ac omnē extuberantiā carnis: ad carnē circa nasi
angulū excrescentē, & ad incipiētē lippitudinē. 2. Tin-
cturę albuginū. 3. Ad pilos pungentes in palpebris
enascētes, Græci trichiasin appellant. Vide cap. 8. sect.
10. & cap. 1. sect. 8. 4. Ad crithas, & chalazia in palpe-

bris. Vide cap. 8. sectione 16. 5. Aſclepiadis ad ocu-
los cataplasmata, itemq; agglutinatoria, & inunctiōes.

6. 7. 8. 9. 10. Has quinque sectiones, ne quinta (ad quę
omnes pertinent) nimis proluxa foret, addere libuit.

VIII. Archigenis remedia ad oculos. 2. Ad ſtu-
xionem calidam. 3. De chemosi, id est utriusq; palpe-
brę distortionē, ex inflāmatione oborta. 4. Obliti-
ones oculorū. 5. Agglutinatoriū ad fluxionē. 6. Ad
hæmalopos & hypophthalmata, id est cruentatos ocu-
los & sugillatos. 7. Curatio tumorū. 8. Ad oculos
scabros. Vide cap. 1. sect. 8. & cap. 4. sect. 2. 9. Ad eos
qui crassas, callosas, ac rubras, glabrasq; genas habēt,
ptilos Græcis dictos. 10. Ad trichiasin, id est pilos inu-
tiles & pūgēs in palpebris. Vide cap. 7. sect. 3. 11. De
staphylomatosis siue uuis & albuginibus. 12. Curatio
obfuscationis uisus, & suffusionis. 13. De humorum
suffusionibus. 14. Ad pterygia. 15. Ad glaucos o-
culos & nyctalopas, id est luciosos. 16. Ad crithas,
instar hordei oblongos circa palpebrarum pilos ab-
scissus: qui item postea Græcis appellatur. Vide cap.
7. sectione 4.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

PHARMACORVM SECVNDVM LOCOS LIBER IIII

Doctrina affectionum que in oculis fiunt, inter quas etiam
de pharmacis acrimonia carentibus, & medius obdu-
centibus, & de alijs omnibus. Cap. I



NON equidē alia est cōponē-
di, alia utendī Methodus in
his pharmacis, Ipsa enim cō-
positio uelut ad usum relata
conficit, ita ut hi qui pharma-
ca cōponunt scopū habeant
utilitatem ex usu ipsorum e-
mergentem. Verū quemad-
modū in alijs, sic etiā in his affectiōib. quidā inde
finite pharmacorū usus scripserūt. Verbi gratia,
Ad dolorē accommodatū est hoc pharmacū, nō ap-
ponētēs affectiōnē in qua dolor sit obortus. Qui-
dā uero etiā affectiōes adscripserūt, alij quidē ma-
gis iuxta experientia: alij aut magis secundū ratio-
nem. Iuxta experientia quidem magis, quicūq; ex
cōspicuis circa oculos signis discrimē fecerūt. Se-
cundū rationē uero magis qui ex obscure apparē-
tibus, aut neq; in totū apparētibus idem fecerūt.
cōspicue itaq; apparet fluxus multus et modicus,
mordacitas & lenitas, ruborq; plus aut minus, ue-
lut itidē uenę pauco & multo sanguine plenę: &

inflāmatiois tumor minor aut maior, Quęadmo-
dū etiā colores præter naturā uarięgati, & oculo-
rū sordes siue lemę plures aut pauciores, aut mi-
nores aut maiores progrediētēs. Apparēt itē no-
bis manifeste asperitates in palpebris oculorum.
Quid uero attinet dicere, qd & ulcera & pustulę,
tū secundū locos, tū magnitudine, nō paruā diffe-
rentiam habent, itemq; quęcūq; eius generis alia
existunt, Quin iuxta aliū sanē modū, ex eorū quę
conspicue apparent numero, sunt etiam ipsi adeo
dolores, Nihil enim interest siue nobis siue agris
appareant. Etenim quod dolent, & quomodo do-
lent manifestū est. quod enim cum cōpressionē,
aut tensione, aut obturatione, aut corrosione, aut
quibusdā pulsationibus dolent, nobis aperte indi-
catur. Cæterum eiusmodi discrimina non apparēt
(uelut aliqui scribunt) ad fluxum qui ab his quę
intra cranium sunt, aut ad fluxum qui ab his quę
extra cranium sunt, aut etiam per Iouem ad eum
qui ex arterijs, aut ex uenis affertur: & quum qui-
dam dicant distensionem aut obturationē in pro-
fundo oculorū esse, humoribus uidelicet crasis,
aut uiscosis, aut multis impactis, nullū ex his sym-
ptoma adeo agros grauāt, uelut uehemēs dolor
circā

circa quodcūq; tandem membrum, nō sanē circa
oculos solos, adeo ut mortem aliqui ultro elegerint,
melius fore rati hanc semel obire, quā totos dies dolores perferre. Ego uero cū in alijs quibusdam,
tūmi duodecimo De curādis morbis Metho-
di, in uniuersum manifeste scripsi, tū de differētia
affectioinum in quibus uehementer dolent, tum
que causā uniuersiuſq; ipsarū existat, Scripsi itē in
decimo tertio eiusdē operis omnia, que necesse est
medicū de oculorū affectioibus nosse, et quae ad
ipsarū curationes requirunt. Referā nihilominus
tamē & nūc breuibus capitib. tantū repetitis eorū,
que ad presentē tractationē utilia sunt, hoc est
eorū que cū materiā medicā de cōstrina coherent.
Nam & liquores & succi, & semina, & fructus, &
plantarū particule ocularibus cōpositionibus in-
duntur, ueluti etiā nō pauca ex his quae Meralli
ca appellatur, aliqua quidē extreme auſtera & ac-
cerba atq; acria, aliqua uero hīs moderatiora, et ta-
men fortia. Quēmadmodū itē aliqua om̄is morda-
citatē expertia ac lenissima per lorionē reddita.

De pharmacis mordacitatis expertibus, ac lenibus. 2

Pompholyx igitur lota nulli pharmacorū morda-
citatē expertū inferior est, atque ob id ea utimur
ad tenues & acres fluxiones, capite uidelicet prius
simulq; uniuerso corpore euacuato. At uero
manifestū est quod per uenae sectionem ac purga-
tionem totū corpus euacuemus: per apophlegma-
tismos uero caput à pituita uindicamus. Potest en-
im pōpholyx lota, quēmadmodū etiā spodiū,
atq; amylym, simul & moderate humores resicca-
re, simulq; ne per tuniculas euacuet ea quae in ma-
gnis ipsorū uenis superflua humiditas cōtinetur,
prohibere. Quare si quis prius q̄ caput ab humo-
ribus ad oculos defluētibus expurget, obturantibus
pharmacis utat, uehementē dolorē ex disten-
tis tunicis efficiet, & ex multitudine influentium
humorū aliquādo rupturā aut erosionē ipsorum
inducet. Eiusdē generis cū prae dictis pharmacis,
subtennis ouorū liquor existit, ex redundantē po-
tens humiditates abluere, & exasperata oblinere.
Verū obturadi meatus uim cū illis equaliter nōn
habet, sicut neq; uim resiccandi. Atqui foeni graeci
succus quod ad uiscositatem attinet, similis est
albo ouorū liquori, discufforia autem habet fa-
cultatem, & moderate calfaciōriā atq; ob id mul-
tos dolores mitigare consueuit.

De pharmacis acris. 3

Prae dictorū pharmacorū sylvae secundū genus
maxime cōtraria acriū liquorū materia est, ueluti
liquoris Cyrenaci & Medici, & sagapeni, & eu-
phorbi, atq; simpliciter loquēdo, omnium uehemen-
ter calfacientū citra exasperationē: atq; haec
ipsa sylvia non solum in liquoribus, sed & in succis,
& seminibus, & floribus, & plantarum fru-
ctibus continetur.

De extergentibus siue repurgantibus. 4

Tertio cōsequenter post prae dictas, fortis facul-
tas est extergentium pharmacorū qualis squa-
mae aris est, & chalcidii dista, & aris ussi, itē cū
floris eius, & misyos, ac foreos, itē cū stibij.

Galēn,

De erodentibus.

5

His adhuc aliud genus adiacet erodentiū uide-
licet, quale est auripigmentū & sandaracha, & A-
siae petrae flos, participat & misy paululum eius-
modi facultate.

De adstringentibus.

6

Est & aliud genus pharmacorū quod in ocula-
res cōpositiones inijcitur, eorū uidelicet quae na-
tura astringūt. Quae igitur mediocriter hanc uim
habēt, influxiones repellūt. Quae uero uehemen-
ter, ampliorē dolorem insigūt, tunicas exasperā-
do, q̄ uiuent influxionū impetum repellēdo. Mi-
scetur autē aliquādo utiliter ex eis parum quid in
cōpositiones oculorū acie exacuētēs, utpote quae
oculorū substantiā cogant et adstringant. Verum
quae mediocriter adstringūt lippitudinibus com-
modissima existūt: conferunt autē & reliquis ferē
omnibus adfectionibus ulcerū, pustularū & flux-
ionū. Sunt uero eiusmodi. Folia rosarū & flores
& succus, ericae fructus, & nardi spica, ampli-
usq; & malabathi foliū, & crocus, & lyciū, & que
hypocisthis appellat. Porro uehementiorē his ad-
stringēdi uim Acacia habet & omphaciū, quae
& ipsa in succorū genere numeratur. Item balau-
stium, & cytini, & gallae omphacitides ex genere
eorum sunt quae multum adstringunt.

De concoquentibus & emplastis. 7

7

Inflāmationes itemq; alias affectiōes cōcoquētes
haec, myrrha, crocus, castoriū, & thus, & scenigræci
cocti succus, quae etiā discufforia uideantur,
& praesertim ex eis myrrha. Atq; haec quidē est ocu-
lorū medicamentorū sylvia, & quicūq; sanē natu-
rali intelligētia praestāt, ratiocinatiōeq; exercitati
sunt, nihil amplius opus habēt mea instructione,
potētes nimirū ad singulas oculorū affectiōes ap-
tū cōponere pharmacū. Quādo quidē uero pau-
citate existūt, & multorū utilitatis potiorē ratio-
nem habere cōuenit, praestabilius mihi uisum est
cōpositionis ipsorū rationē integre recēdere, ubi
repeti uero prius perspicacitatis gratia, cōmunē in
genere uim singulorū quorū mentionē feci phar-
macorū, quae uniuersim quidē in quinto De sim-
plicitiū pharmacorū tractatione cōmentario à me
relata est, & per cōsequentes sex libros particula-
tim usq; ad extremū. Vtar autē appellationib. facul-
tatū in pharmacis, iisdē quas in prae dicta tractatio-
ne posui, uelut exēpli clarioris gratia. Quaedā sub-
stantia terrestri dico, citra refrigerationē manife-
stā aut caliditatē, in medio quodāmodo utriusq;
cōsistētia: atq; ex his aliqua quidē parū quid ex fri-
giditate aut caliditate cōplectunt: aliqua uero in
totū nullā eiusmodi facultatē ex se ostendūt. To-
tum autē hoc genus pharmacorū emplasticiū, hoc
est, meatus obducens & obturās appellauī, cōtra-
riam uim habēs his quae ab obturatione liberatiā,
Ecphratica sunt appellata, qualis est Samia. As-
ter magis tenuiū partiū existēs q̄ quae simpliciter
Samia terra appellat. Et pompholyx lota, uelut etī
am cinis eius lotus, & cadmia usta ac lota. Videf
autē mihi parū quid extersorū in ipsa cadmia ines-
se, siue post ustionē, siue citra eā lauef. Pompholy-

tom. 5

A 3

gi

gi uero & spodio parū quid adstringēs inest, Quē admodū etiā plūbo, post unctionē & lotionē, Nam & hoc pharmacū omnis acrimonia expers est, parum quid adstringēs habens. Neq̄ refert siue masculino siue muliebri genere pōpholygem dicere uelis. Eodē modo etiā amyllum habet, quod & ipsum lotū exquisitē, mordacitatis expers est, & medū, ut neq̄ adstringentem neq̄ acredinem habeat, hoc est, neq̄ frigiditatem neq̄ caliditatem participet. Quin & cerusa lota proxime ad facultatē usū ac loti plūbi accedit, manifestūq̄ signum per adstringentē exhibetur, quod penitus qualitatis omnis expers sit, & quantū ex gustu ac odore apparet, amyliq̄ est & samij asteris natura. Vniuersum igit̄ huiusmodi pharmacorū genus, siue medicum in gustu aut odore qualitātē exhibeat, siue penitus nullā ostēdat, cōsimiliter ut purissima aqua, Qualitatis expers nominat̄, & per solā terrestre substantiam moderate a natura reficatur. Quapropter etiam lōgiori tēpore cōmoditatē ex se proficiscentē sensui perceptibilē faciūt, utpote quā per primos dies nihil iuuisse putent. Adhibent tamē a medicis tanquā acrimonia expertia, circa egrē curabiles affectiones, in quibus ulcus est siue solū, siue cū erosione corniformis tunica, & prolapsu uuliformis appellata, serosis humoribus lōge mordacissimis affluētibus, In his enim nullū aliud pharmacū cōuenire potest, utpote quū adstringentia cohibeant effluētēs humores, atq̄ per hoc dolorē ex mordacitate ipsorū obortum intēdant, Acrīa uero affectionē simul adaugeāt, siue in solis oculis affectio sit, in cuiusmodi malū habitū partibus perductis, ut quod influit corrūpant: siue etiā ipsum quod influit uitiatū sit, aut propter solum caput, aut etiā ob totū corpus tale existēs, Vnde etiā affectā partē quo ad curationē apta fiat præparamus, tū totius corporis purgatiōibus, tū reuulsionibus, primū quidē ad infernā corporis partē, deinde etiam ad occiput, & capitis cutē. Vtūmur etiam sectionibus arteriarum, quandoq̄ retro caput porrectas circa aures arterias incidentes. Excindimus quoq̄ partem arteriarū in temporibus, tantum ut curem in tunicis oculorum factā affectionē, ob quā etiam bonus sanguis per uenas ad ipsas tunicas delatus corrumpitur. Ad has igitur affectiones solas cōuenire uidet̄ prædictorū medicamentorū genus, citra mordacitatē reficēs in affecta parte uitiatos humores, quā ut dictū est id quod influit corrūpit. Adstringentiū em facultas neq̄ reficcat talē affectionē, cohibetq̄ mordaciū humorū serosorū effluxus, Calidorū uero & acrimonia facultas non solū nihil iuuat, sed etiā simul augēt mordaciū humorum qualitātē. At uero relaxantiū & discussiorū pharmacorū uis euacuare quidē potest quod generat̄, Verū ulceratū neq̄ nutritiū aut ad cicatricē perducere potest, neq̄ qd̄ prociat̄ retrudere & cōcludere, Quēadmodū etiā am neq̄ cōcoquentiū facultas id præstare potest, etiam si cōcoquere affectiones nō paruum cōmodum completatur. Ex eorū uero genere sunt crocus, myrrha, & thus, quemadmodum dixi. Quid

porrō dicere refert, de his pharmacis, quæ acidas aut amaras habēt uires, q̄ mordacia & exacerbatiua eiufmodi affectionū existāt. Verū his adhuc ampliore malicia prædita sunt, quæ nitrosam, aut salfam, aut austerā, uim habēt. Reliquū igit̄ est genus id quod ulcera cū acri fluxiōe curare potest, eorum uidelicet quæ paulo ante mordacitatis expertia pharmaca dixi, quæ longiori tēpore affectę partis uitiatum humorem cōsumunt, Appellantiā a Medicis collyria libiana & cygni, Ob colorem quidē album qualē etiā cygni habēt, præualētē in ipsis amylo, & terra Samia ac cerusa Rhodiaca, Nam & aliās optima hæc est, & colore albidior ac leuior, magisq̄ tenuiū partū q̄ quæ in alio quopiam loco cōficiant̄. Caterū in quibus alia pharmaca prædominant̄, colorem iuxta sui ipsorū substantiā efficiunt, ueluti si quis albo coloris modicum ceruleum ammiscerit. Hæc ipsa uero collyria quidam in cōtibus terūt, boni succi lacte ex nutricum uberibus instillato, ut obductoriā meatuum uim quæ in ipsis ouis est euitent, quum in lacte serosa quedam extersoria uis contineat̄, cuius usus congruens est ad propolitam curationem. Relatū enim in tertio curādī Methodi est, Quod ulcera explenda, citra acrimonia extergentibus medicamentis opus habeant. Quod si huiusmodi lac haberi nequeat, per scenigraci decoctum collyria terere præstiterit, utpote quod extersoriam quandā uim habet, qua uia ipsa in totū carent.

De aspritudinibus palpebrarum

8

Quum ægē curabiles prædictæ affectiones existant, adhuc molestius se extendunt, ubi accesserint aspritudines palpebrarum, a quibus etiam in lippitudinibus oculorū tunica incise, dolore affliguntur: uerū in illis audemus ad inflammationi propria pharmaca, miscere parū quid de extergentibus, uelut est collyrium ex uino aspritudinibus ac cōmodatum, quo primū ea quæ ad palpebras delata sunt, deprimantur, ubi uero inflammatio reliquit, ea quæ aspritudines repurgare possunt adhibemus. In his uero qui ulcus habent cum mordaci fluxione, impossibilis est eiufmodi uti Pharmacis: corniformis enim tunica amplius erodet, & uehemens dolor hominē apprehēdet, augebitq̄ malignitas fluxionis. In huiusmodi itaq̄ affectionū cōplexu Medici ad consiliū inopiā redacti, solū remediū uelut in desperatis repererūt, ut extensis atq̄ uersis palpebris, ipsa citra pharmacorū usum repurgēt & abstergat, Aliqui quidē specilli cōcauo superficie deradentes, deinde molli spongia id quod desluit accipientes, & de cætero palpebrarū aspritudinem moderatiōe reddētēs. Aliqui uero etiā marinarum quorūdā animalū coria in superficie aspera, in eiufmodi usum cōgrue adsumūt. Quidā ex preceptoribus, meis etiā ex pumice collyriū fecit, cum eoq̄ extētis ac uersis palpebris aspritudines deradebat. Manifestum est autem pumicem exquisitē leuigatam esse oportere, atque ubi id factum fuerit cum tragacantha aut gummi in collyrium formari. Caterum ubi temporis progressu per prædicta

dicta collyria fluxio fuerit sedata, audemus iam ea quae palpebras extergent adhibere, parum tamen quippiam ex eis in principio ammiscendo, quod ubi homo perpeti posse uidebitur, paulatim copiam augebimus. Postquam uero fluxus fuerit resiccatus & palpebrae moderate habuerint, caua ulcera collyrio ex thure explere oportet, ita ut in principio paulatim ex collyrio ex uino ei ammiscamus, & paulatim eius copiam extendamus, ut ne palpebrae amplius tunicas oculorum infestent, & ulcera munda reddita exacte implentur, & ad cicatricem perducantur. De his itaque sufficenter dictum est. Transendum est iam tempus ad reliquas oculorum tum affectiones, tum pharmacorum ad easdem compositiones.

De lippitudine siue ophthalmia. Cap. II

Exordium autem a frequentissima oculorum affectione sumam, quam proprie ophthalmiam, hoc est, lippitudinem appellant. Est autem uelut didici stis, inflammatio tunicae os capitis & caluariae ambientis, neque refert si pelliculam quis, aut quocumque tandem nomine appellare uelit. Vocant autem & membranam agnatam, propterea quod alijs quae oculum ipsum constituit tunicis, foris secus agnata sit, ligamentum existens toti oculo ad circumlita ossa, & ob id omnia quae circa oculos sita sunt usque ad malas quandoque in uehementi lippitudine simul attolluntur. In propatulo itaque est, omnia pharmaca huiusmodi affectionem curantia, sub communem omnium inflammatorum curatione cadere, assumeretque necessario quippiam pro partis ipsius natura, quae excellentem molliem & ad hoc ut laedatur aptitudinem, super omnem totius corporis cutem nata est, propter sensus subtilitatem, & substantiae raritatem. Adhibenda sunt autem pharmaca repulsoria non exasperantia, hoc est non uehementem sortita adstrictionem, sed quae tum propria sua substantia sunt moderatiora, tum lenitius liquoris ammixtione adhuc magis talia fiant. Lenitius autem liquores dixi omni candidum, & foeni graeci decoctum, & ad haec amplius ipsum lacticum quo prouidum esse conuenit, ut uinculae simulque boni succi foeminae existat, uerbis ipsis in cotem in qua collyrium fertur expressis, quo calidum adhuc oculis infundatur. Caeterum hoc in uehementi dolore afflictis, aut propter inflammationis magnitudinem, aut ob inflammationum humorum acritudinem, facere cogimur. Vt plurimum uero albus uel liquor cum acrimonia datis pharmacis, lippitudines curare sufficit, per collyria uidelicet Monohemera, hoc est, unius diei, appellata. Ad eodem enim haec non parum saepe magis inflammationes mitigauerunt, ut in uesperam quidem homo in balneo ueretur. Insequenti uero die nardino collyrio ad instaurationem & corroborationem inungeretur. Admiscere autem ei circa primam inunctionem, minimum quiddam acrimum & sistentium medicamentorum oportet, & circa secundam paulo amplius quiddam priore. Sufficiens enim haec duae pharmaci adhibitiones, & deambulatione aliqua non multa ante balneum. Porro collyria Monohemera appellata, quaedam pri-

uatim feculenta dicta, multa in se habent Acaciae. Quaedam siue omnino modicum, siue neque in totum habent, conplectuntur autem alia quidem eris squama, alia uero aes uisum modicum, additis multis alijs quae mediocriter adstringunt, & concoquunt, & discutunt. Talia autem sunt, crocus, myrrha, lycium indicum, castorium etiam & thus citra adstrictionem concoquantur simulque discutuntur. In quibus igitur adstringentia praedominantur, plurimum uel liquorem, & modicissimum pharmacum esse oportet, praesertim si quid ex metallicis pharmacis in se conplectatur. In quibus uero crocus, & myrrha, castoriumque ac thus, & lycium praevalet, paulo crassiore pharmaco utendum est. Fomentum praeterea omnino adhibendum est ipsis per spongiam, si quidem mediocris sit dolor, semel aut bis in die. Si uero uehementior dolor urgeat, praesertim ut quater, & saepius uti, in longis praesertim aestiuis diebus. Fiat autem fomentum per melliloti & foeni graeci decoctum. De lippitudine itaque satis dictum est, deinceps de ulceribus dicam.

De ulceribus oculorum. Cap. III

Ulcera oculorum eandem secundum genus curationem requirunt, quam alia ulcera, eam uidelicet quam per longum in tertio & quarto curaturae Methodi recensui. uerum ob partis naturam quam lenissima adhibenda sunt, ex quorum numero id quod ex pompholyge lota constat esse dixi. Ammiscuntur eis etiam succi quidam non solum omnino mordacitatis expertes, sed qui etiam uehementissimos dolores mitigare possunt, uelut est mandragorae succus. Quidam etiam polygoni succum ammiscuerunt: quemadmodum alij ipsorum etiam ouorum candidum. Manifestum uero est, quod ubi iam propemodum instat tempus praeparandi phar macum, tum demum huiusmodi ammiscerentur, propterea quod facile acefiant. Eodem tempore etiam rosarum additur succus. Caeterum sylvae medicamentorum quae proprie ad oculorum ulcera pertinet, itidem scopum habet, ut ulcus mundum feruetur. Vt pote partium natura ipsum explente & ad cicatricem perducente, quemadmodum in alijs ulceribus est praedictum. Si itaque inflammatio adhuc circa oculum existat, aut quippiam etiam dolor, collyria ex thure, & metallicis lotis, & succis mordacitatis expertibus adhibentur: ubi uero fordida reddita est eorum usu ulcera fuerunt, de repurgantibus quippiam ammiscere oportet. Quale est paccianum ex uino croceum, quo utimur, minimum quid ex eo praedictis pharmacis ad dentes. Habet autem hoc plurimum in se crocum, unde etiam croceum appellatur. Habet etiam ex repurgantibus metallicis aliqua, quapropter etiam aspritudines extirpat non paruas modo, sed magnas quas sycoseis Graeci a granorum ficis similitudine appellant. Attenuat item pterygia, hoc est, oculorum ungues. De his itaque medicamentis paulo post dicitur. At uero ulcera quae per erosionem tunicae corniformis fiunt, ut etiam ex uisiformi quid prouat, manifestum est quod tum propter seipsa, tum ob prolapsionem, repellentibus & adstrin-

gentibus pharmacis opus habent. Conandum est autē ut ex ipsis eligamus quæ nullam aspritudinē faciunt. Verū his contraria pharmaca, hoc est discussoria pustulæ expetunt, & pus quod intra corniformē est generatū. Recentia igitur & adhuc inflāmata, pharmaca ex myrrha, thure, & croco sedantur. Vetusiora etiam ex discussorijs quid deposcunt, quemadmodū item induratae inflammationes tunicarū. In his enim & per acres liquores hæc ipsa pharmaca in collyriorū formam redacta proficiunt. & quæ priuatiā a Medicis inunctiles li quidæ cōpositiones appellantur, quales etiā in his quid suffusionis principijū sentiunt, apparent. In pterygijs uero & sycofi repurgantia, ut dixi pharmaca adhibentur, partim in collyriorū formā redacta, partim arida citra alicuius figuræ inductionem, in quibus aliqui etiā ex erodentibus pharmacis aliquid addiderūt. His uicina sunt quæ scabras in palpebris affectiones perfanant, atq; ob id pforica appellantur. Fortissima uero omniū sunt quæ antiquos callos cōsumunt, & quæ pterygia dicta curāt, ex repurgatib. & erodētibus medicamētis conflata.

De ocularium pharmacorum uiribus. Cap. IIII

Porrō quum iam omniū ferē in oculis affectionum, pharmacorūq; eorundem secundum genus expositionē fecerim, relataq; sint a me pharmaca secundum genus mordacitatis expertia, qualia ex lotis metallicis componi dixi; melius fore mihi uidetur si etiam aliorum ocularium pharmacorū uires exponam. Ex hoc enim existimo ad cōponendum promptiores futuros, & de iam compositis felicitus iudicaturos, eos qui in ipsis fuerint exercitati. Quum igitur mordacitatis maxime expertia sint pharmaca quæ dixi, sintq; acrimoniatō omnis expertes tres liquores, quorū primus sceni graci decoctum erat, alter lac, tertius tenuis ouorū liquor: In hoc genere esse existimandum est, tum gummī, tum tragacantham; & nisi prædicta tria copiaq; & usu prompta & expedita essent, possimus parum gummī aut tragacathæ in multa aqua maceratum in eundem usum uelut illa assumere; ita ut per ipsa in medica cote collyria tereremus, & per sola etiā infusa ferrosos in affectis oculis generatos humores elueremus. Sed tamē etiā nunc ipsis circa omnia ferē collyria utitur, paucissimis em̄ demptis, omnia postquā trita sunt, moderate his ipsis pharmacis madefacta excipiuntur. Vnum sanē hoc genus ocularium pharmacorū numeretur, in tribus liquoribus, tragacanthaq; ac gummī, & lotis metallicis contentū. Alterū uero genus eorū est quæ modicam habent mordacitatem, propterea quod quædam eis ammixta sunt quæ parum adstringūt & extergent. Quia pharmaca sunt rosæ & thus, rosas quidem paucam habentibus adstrictionem, thure uero modicā uim extergendi. Et quum thus medio critere calida ut præditū existat, eam ob rem habet quid concoctoriū & quod dolorē sedat. Ex eodē genere cum ipso, quantum ad concoctionē & discussionē attinet, cēsendus est crocus et myrrha; quæ inter se in eo differūt quod crocus moderate adstringat, myrrha uero citra adstrictionē non in-

generose discutiat & resiccat humiditates. Suntq; sanē hæc uiribus præstantiora thure, & ob id etiā maiorē discutendi uim habent; uerū exterioria nisi carētia, ad ulcerum curationē thure inferiora existunt. Huius generis medicamentorū, cōcoctorij inquam & discussorij, Lycium quoq; est & castorium. neq; obscurū esse putō. Indicē lycium a medicis, non hoc quod apud nostros populos provenit, proxime uero ad horū facultatē accedit farcolla dicta, quæ concoctorij & discussorij est medicamentū, atq; ipsa adhuc magis galbanū prædictas uires habet. Mellisoti uero decoctum ad concoctoriam facultatē adsumpsit etiam quid adstrictorium, eiusdem ferē generis cum croco existēs. Inijcitur etiā in oculares cōpositiones lapis Hemitites appellatus, humores resiccandi uim habens, uelut & Cadmia. Mitius autē pharmacū lapis ipse quàm Cadmia existit, utpote ex humida substantia; non terrestri, uelut Cadmia, generationē adeptus. Hanc enim eius naturam indicat solutio, quæ fit in medica cote, quum per attritionem cum liquore quopiam in succum resoluatur. Quin & quum solus per se citra liquoris alicuius affusionē teritur, nō in terrea fragmēta dissoluī uelut Cadmia, sed in æquialium partiū & coharens corpus. Consimilis est & lapis Schistus appellatus, sed fortiosem facultatem habet. Quod uero stibium appellatur illorū quidem fortem ex se ostentat adstringendi facultatē; lotum uero exoluitur, ut prope ad mordacitatis expertium uim accedat. Vehementē autem exterioriam facultatē æs usum habet, itemq; squama eius & flos. Neq; minus efficax, sed minus mordacitatis expertis chalcitis usta est. Quod filauentur talia pharmaca, exterioria quidem adhuc manent, tanto autem efficacia imbecilliora, quantum mordacitatis magis expertia fiunt. Huius generis sunt etiam Misy & Aerugo, fortissima pharmaca his quæ sycofi & callis cōueniunt ammixta. Quidam uero ipsis etiam gallas iniecerunt, uehementer adstringēs pharmacum: quemadmodum aliqui chalcanthū neutro genere appellatum, atque etiam ut aliqui usurpant chalcanthus, tum ma sculino tum muliebrī genere, quod ad adstringendum unā cum acridinē uehementissimū inter hæc omnia pharmacum existit. Manifestum est autem quod multo moderatius redditur ustum & lotū, ad hanc sylvam pertinet etiam stomomatis squama. At thuris cortex adstringit quidem & ipse nō ingenerose, uerum prædictis omnibus longe inferior est. Atqui & Misy ipsū tum ad easdem affectiones, tum amplius ad scabras palpebras quidā in collyria miscuerunt. Quandoquidem uero & Mannæ quidam mentionem fecerunt, & uidentur aliquibus nihil a thure trito ac leuigato differre, Cognosse operæpretium est, quod Mannam proprie appellant id quod excussum est a thure circa magna onera contracto. Auferuntur em̄ simul ab ipso fragmenta quæda parua corticis Thuris, quare a thure differt tale pharmacum in hoc quod parum quid adstrictorium adsumpsit. Quæcumque igitur ex adstringentibus multam terream compa

gem habent, aspritudines & sycoseis ac callos con-
sumunt. Caterum quæ ex succorum genere sunt,
uelut omphacium & hypocisthis, eluuntur facile
in sublimibus diffunditur simul cum lachrymis.
Ex hoc genere est & glauciû & acacia. Citra mor-
daciditatem uero extergit ceruicornu uisum, uelut
etiam caprarum. Dicitur est autem & thus exta-
tium genere esse, uerum hoc uelut dicitur est, om-
nino exigua participat extergendi facultate, dolo-
ris sedatiuum & concoctorium existens. Cornua
uero prædictorum animalium extergedi quidem
uim habent, sed neq; dolorem sedant, neq; conco-
ctoria facultate prædita sunt, frigidi nimirum &
sicci temperamenti existentia. Habet autem & quod
Armenium uocatur, extergendi uim, quemadmo-
dum & atramētum Indicum appellatur, & ob id
sanæ ulceribus inflammatione carētib; citra mo-
lestiam adhibetur. Mixtæ uero quodammodo fa-
cultatis est aloë, ueluti etiā rosa. Habet enim quid
in se amarum, quod extergendi à natura aptitudi-
nem habet inest autem ei etiā quid adstrictorium,
ut committat & ad cicatricem ulcera perducatur.

Que ad scabras affectiones conueniant. 2

Ex pharmacorum ad scabras in palpebris affe-
ctiones conuenientium numero, sunt sales ammo-
niaci, & lapis Alitus tum ipse, tum flos ipsius, &
quod psoricum appellatur, non simplex, neque
sponte naturæ productum, sed præparationis mo-
dum quandam habens, quem etiam Dioscorides
conscripti, & alij ferē omnes, quide Medica ma-
teria commentati sunt. Ammiscetur his & misy u-
stum, & sandaracha, & quod à ueteribus Græcis
Arthenicum, nostro uero aëo Arsenicum appel-
latur. Ex medicamētis uero aromaticis casia, et ma-
labathri folium, quin & amomum et cinamomum
quidam ocularibus compositionibus ammiscue-
runt, quum diffusoriam quidem uim habeat cina-
momum, reliqua uero etiam adstringendi facultate
te participant. In communi porro de omnibus re-
purgantibus siue extergentibus & rypiticis à Græ-
cis appellatis, medicamentis id nosse oportet, tum
eis quæ moderata sunt, tum his quæ sycoseis & cal-
los eonsumunt, quod hæc omnia etiam ad cicatri-
ces crassas conueniant. Attenuant enim ipsarum
crassitudinem, & substantiam superficiēi dera-
dunt ac remouent.

Que induratis auxilientur. 3

Compositiones quæ ad induratas oculorum tu-
nicas conueniunt, ex succis constant & ammonia
co thymiamate, quemadmodum etiam antea dixi.
Miscetur autem eis moderatiora quædā, quæ
uirtus eorū tamen non obluētur, myrrha uide-
licet & thus, & galbanum, aliæq; consimilia.

Que suffusis conueniant. 4

Ad suffusos uero quidam Medici liquida phar-
maca composuerūt. Ac prima ferē omnium com-
positionum est quæ ex foeniculi succo, & hyæne
felle, ac melle Attico constat: quidam uero etiam
caprinum sel addiderūt. Verum postea alius aliud
sel admiscuit, alius galli, alius utperæ, alius testud-
nis marinx, alius callionymy pīctis. Nunc uero in

A pretio est pharmacū ex felle scarorum. Quemad-
modum & quod ex myrrha stacte cōstat. Promis-
siones itaq; omnium horū pharmacorum magna
sunt. Verum effectus aliquando nullus, aliquan-
do ualde exiguus.

*De Aridis medicamentis oculis condus-
centibus.* Cap. V

Ex præscripta materia medicæ sylua cōposita
sunt à Medicis pharmaca arida, quæ priuatim ab
ipsis arida collyria appellatur. Quorū aliqua qui-
dem callos & Sycoseis consumunt, excrecentem
item iuxta nasi angulum carnem, encanthis a-
ppellatam, & pterygia quæ etiam unguens dicitur.
Alia uero scabris palpebris conueniunt, & ad
palpebrarum defluuia quæ Miphæ appellantur
conducunt, uerū etiam ab acrisbus collyrijs faculta-
tem habent, uelut alia à quibusdā medicis Apo-
dacryca, id est, delachrymata & repulsoria ap-
pellantur, uelut etiam ipsa collyria. Ex his autem
pleraq; etiam obtuse cernētibus, siue per atatem,
siue crassitudinem, aut frigiditatem humorum in
oculis, aut etiam flatu caliginosi redundantiā id
contingat, non parum profunt. Aliqua deinde ex
aridis pharmacis affectionem in oculis congrega-
ri prohibent, impediēdo uidelicet influxiones hu-
moris, ex quibus oculi lædi consueuerunt. Præ-
stantissimum uero horum apparuit, & experiētia
iudicatum est quod ego composui, & ob id apud
multos in usu est, ac ferē per omnes gētes, quibus
imperant Romani. Ac primum sanè ipsius cōposi-
tionem scribā, quum præstantius putem esse, nul-
lis omnino affectionib; corripī, quā eas quæ iam
præoccuparunt optime sanare. Quando uero etiā
Asclepiades plurimamq; & optimam tum arido-
rum, tum liquidorum collyriorum conscripsit syl-
uam, ab aridis primum initio factō; & ego sanè mi-
hi recte facturus uideor, si consimili scribendi or-
dine utar. Quare ubi meum aridū adscripsero, de-
inceps omnia quæ Asclepiades habet in primo ex-
ternorū quem Marcellæ inscribit, iuxta ipsius or-
dinem subiungam. Et post hæc cataplasmata o-
culis accommodata, agglutinatoriāq; & inunctilia phar-
maca ab Asclepiade descripta adiciā. Præstantius
enim nihil uidetur & istorum ordinem in scriben-
do seruare, atque ita ad collyria ac liquida phar-
maca transire, omnibus appositis, uelut Asclepiades
ipse recensuit, illius ipsius uerbis.

*Pharmacum Aridum ad tuendam oculorum ualeitudinem
à me compositum.* 2

Utilissimum sanis oculis præseruatiuū ego cō-
positū pharmacum, quod omnes iam in usu habēt.
Vrii lapis phrygius in minutas partes confractus,
ut maior tamen sit nuce quæ pontica à quibusdam
uocatur, ab alijs nux parua, Modus urendi idem qui
in alijs est, lapide in ollulam nouam cōiecto, deinde
deq; ollula forinsecus luto obturata, operculū per-
foratum uel in solo uertice, uel quod melius est, eti-
am circa alias plures partes imponimus, quo per
ipsa foramina fuliginosæ & fumosæ eorum quæ u-
runtur exhalationes facilius efferantur. Postquam
uero totus lapis ignitus factus fuerit, tunc sanè
oilulam

ollulam in purum quoddam uasculum euacuare oportet, butyrumq; in fundere nō uetustum, & circummagitare usq; lapidis partes, donec omnes extinguantur, atq; tunc cessare, & sic rursus easdem in ollulam coniectas urere, rursusq; prunis candefactis ab igne ollulam imponēdo, ut nihil fumosum in se habeant, uentilatione etiam easdem excitare conuenit, quo citius usq; perficiatur. Deinde quā iam igniti facti fuerint lapides, & nulla amplius fuligo effertur, rursus eosdem eximere oportet, & uino phalerno extingere, aut alio quo fuluo & odorato, uelut est Tmolites, Ariusiumq; & Lesbiū. Deinde rursus in ollulam coniectos, tertio urere, & postquam ignitus fuerit lapis, rursus extinguere melle Attico non multo. Reddetur enim pharmacum non aridum, sed uiscositate aliqua præditum. Caterū pluribus diebus trita & præleuigata in promptu habere oportet, ita ut in tenuissimum puluerem redacta sint, subscripta. aris usq; unciam unam. quod est drachmas viij. piperis albi tantundem, folij malabatri tantundem, stibij hemiolum quod est drach. xij. his ammisce lapidis usq; lib. i. Et postquam omnia probe fuerint leuigata, & reponere medicamentum uelis, adijce opobalsam Syriaci sequisuiciam quod totum drach. xij. facit. Sit uero opobalsamum tenui & pellucida compage, non crassum quemadmodum solet in uasis circa fundū confidere ac spissari: quod enim ita crassum est, ariditatem pharmaci impedit. Porro usus ipsius ad solas palpebras competit cum specillo inducti, circa tunicarū ipsius oculi cōtactum. Ut plurimū itaq; sufficit circa solam infernā palpebrā specillū inducere. Nihil uero uetat etiā supernam palpebrā similiter illinere, ubi præsertim pharmacō opus fuerit, hoc est, ubi iam manifeste perturbationem quandam perceperit oculus: non tamen expectare conuenit donec id fiat. Verū præoccupare oportet circa primū affectionis sensum, in omni tempore diei, etiam si quis biberit & cœnauerit. Et planē frequens eius competit usus, cum cautione, ut dixi, ne tunicæ oculorum eo contingantur. Oportet autem & eum cui inducitur pharmacum palpebras exertas & extētas exhibere, & quum inungitur nequaquā cum ipsis nictare. Hoc sanē pharmacum à me compositum est, non permittens eum qui ipso recte utatur oculorum lippitudine apprehēdi. Deinceps uero quæ ad affectiones commoda sunt medicamenta conscribam, inuitio ab his quæ Asclepiades scripsit factō.

*Arida pharmaca ad oculos ab Asclepiade
conscripta. Cap. VI*

In primo libro pharmacorum externorum quæ Marcellus inscribit, in hunc modum hæc uerba scribuntur. Aridum ex psoricis Heraclidæ, ad circumrosos oculorum angulos. Spodij cyprij, drach. iij. omphaq; aridi drach. ij. nardi obol. iij. piperis fricti grana xv. tritis utere. Psoricum Aelij. Cadmiæ drach. iij. aris usq; drach. ij. cū aceto in sole terito & resiccato, rursusq; leuigatis & repositis utitor. Aliud. Cadmiæ drach. i. aris usq; drachmam unam, nardi indicæ drachmam i. piperis fri-

cti obol. ij. tritis utere ut pharmaco uehementer commodo. Aliud. Chalcitidis partes duas, cadmiæ partem unā, tusa & cribrata terito in sole, adiecto uino sufficienti, deinde resiccato, & leuigatis repositis utitor. Ex libris Philoxeni aridū Achariston. Cadmiæ drach. duas. chalcitidis 3. viij. aloes ob. ij. aruginis ob. ij. piperis grana x. florū sarū drach. i. tritis utitor. Eiusdem ad lippitudinem siccam & sycosin, putrescentia, & excrementem carnem. Cadmiæ drach. x. chalcitidis drachmas octo, piperis grana xv. nardi celticæ drach. i. Cadmiæ & chalcitidem cum uino terito, atque ubi exaruerint nardum & piper inijcito, ac in puluillum redactis utitor. Aliud. Cadmiæ drach. uiginti. chalcitidis drachmas xl. nardi indicæ drach. duas. myrrha torrefacta drach. duas. piperis grana xxxv. cum aceto acerrimo apparato. Capitonis ad lippitudines siccas, & oculos humectos, ac angulos circumrosos & palpebras ficosas. Cadmiām cypriam ad polentæ magnitudinem cōstrigimus, deinde Attico melle subactam in uasculū fictile conijcimus, huiusq; ore obturato ac luto circumlito, foramē iuxta medium oris facimus, quod id quod affatur inde transpiret. Ipsum uero uasculum intra prunas erectum statuētes succenos prunis urimus, atq; ubi exignitum fuerit, exhalationū per foramen elatarum animaduersionē habemus, quæ si nigriores efferātur amplius urimus. Quum uero albidiores apparuerint, assationem sufficientem factam putamus, ablatoq; uasculo & dempto operculo, cadmiām uino Italico extinguimus, & in pilam translata terimus, resiccatamq; ad pharmacī confectiōnem reponimus. Quæ hoc modo habet, Cadmiæ drach. viij. aris usq; drach. viij. stibij drach. viij. tritis & ablati utere, cum specillū extremo palpebris mane & uespere ex eo sublitis.

Aliud. Cadmiæ usq; uelut prædictū est drach. viij. aris usq; drach. viij. stibij drach. iij. armenij drach. ij. tritis & repositis utitor. Nos cadmiā & reliqua adipe uiperæ excepta affluimus, deinde uino extinctis ac tritis usq; sumus. Pharmaca ex lapide Hæmatite ad scabras palpebras accommodata. Capitonis ophthalmici. Cadmiæ cypriæ drachmas xxxiij. lapidis hæmatitæ drach. vi. in alio exemplari drachmas xvi. aris usq; drachmas uigintiquatuor. arida ad polentæ magnitudinem contunduntur, melleq; excepta uelut prædictum est afflantur ac uino extinguuntur, deinde resiccata leuigatur. Vfus demonstratus est. Aliud. Cadmiæ drachmas xx. aris usq; drachmas decē. lapidis hæmatitæ drach. x. tomentorum purpuræ laconicæ drachmas viij. melle excepta & uelut compositio ut dictum est. Sosandri ad palpebrarum deflusiō, & inueteratas affectiones, facit & ad excrementem iuxta nasi angulum carnē. Cadmiæ, stibij, chalcitidis crudæ, misyos peregrini, singulorum drach. viij. cōtusa & melle excepta uelut dictum est afflato, deinde uino extincta tritaq; & resiccata reponit, utitor. Aliud. Chalcitidis crudæ, cadmiæ, stibij, misyos peregrini, singulorum drach. viij. nardi indicæ drachmas ij. croci torrefacti drach. duas.

piperis drach. unam. Metallica melle subiguntur & acuruntur ut dictum est, deinde uino extinguntur & teruntur, adijciturq; his nardus & crocus torrefactus, itemq; piper, postea uero simul leuigatis ac repositis utimur. Pharmacū calliblepharon exomandis palpebris accommodatū. Facit & ad inueteratas lippitudines. Stibij usui ac uino extingit drach. xvi. plumbi usui ac loti drach. viij. fuliginis thuris, spicæ nardi, myrrhæ torrefactæ, croci, squamæ æris, singulorum drach. i. Omnibus tritis ac repositis utitor. Aliud ex croco. Croci unciam i. glucij unc. i. sarcocollæ unc. i. ego etiam opij unc. i. adieci. Aliud Seuerianum. Cadmia usitæ & loræ sextantem. salis ammoniaci, piperis albi utriusq; sextantem. folij drach. ij. probe tritis utitor. Aliud pueris maxime cōmodum. Stibij drach. xvi. plumbi drach. viij. squamæ æris drach. unam. croci drach. i. florum rosarum drach. i. myrrhæ drach. i. nardi indicæ, thuris masculi, piperis albi, singulorum drach. i. palmularum ossicula decē. omnia in sigillatim uas confecta diligenter assata. Deinde in pilam translatis ac tritis opobalsami cochlearia duo adijcto, conuassato, rescicato, & utitor. Aridū Philoxeni ad pruriginosos ac circumrosos angulos. Facit & ad obtusum uisum. Cadmiæ drach. iij. salis ammoniaci drach. ij. piperis albi drach. i. tritis utere. Ego hæc ita apparo. Cadmiæ drach. viij. croci drach. ij. piperis albi drach. i. salis ammoniaci drach. ij. nardi indicæ drach. i. unam. tritis utitor.

Liquide oculares compositiones ad ficosas eminentias, ac omnem exuberantiam carnis. facit & ad carnem circa nasi angulum excrecentem, & ad incipientem lippitudinem. Cap. VII

Compositio qua usus est Philippus in Cæsaria, Misys assati drach. viij. myrrhæ drach. iij. cadmiæ drach. viij. croci drach. ij. salis ammoniaci drach. ij. nardi indicæ, piperis albi utriusq; drach. i. mellis Attici cyathum unum. Aliud, Misys assati drach. vi. atramentum futorij drach. iij. myrrhæ drach. iij. æris usui drach. i. mellis Attici cyath. i. Pancrestos Brasiliatri. Ad aspretudines ac omnes lippitudines, auresq; purulentas, & ad ulcera ægre respicientia cicatricem, & ad nomas, hoc est, ulcera serpentina oris. Aeris usui drach. ij. myrrhæ drach. unam. piperis obolos ij. misys assati drach. unam. croci obolos ij. uini chij heminam unam. pasci cretici heminæ dimidium. Arida terito affuso uino, atq; ubi imbibitum fuerit uinū, affunde etiam passum, & conuassata in æreum uasculum trāsfero, ac ad lentum ignem coquito, deinde in pyxidem æream reponito. Ad callos & omnem eminentiam. Aeris usui drach. ij. misys usui drach. i. myrrhæ drach. i. croci drach. i. omphacij drach. i. uini chij cyathos duos. mellis at ticilibram dimidiam. utitor. Philoxeni liquida uisum exacuēs, cicatrices & callos exterit. Ammoniaci thymiamatis drach. iij. æruginis drach. ij. uino diluta & contrita melle attico excipito.

Aliud. Ammoniaci thymiamatis drach. xij. æruginis drach. vi. myrrhæ drach. ij. composito ut

dictum est. Aliud Phædri Rhinion, id est limula. Ammoniaci thymiamatis drach. iij. æruginis drach. i. alcyonij torrefacti drach. unā. floris lapidis Alsi obolos iij. composito ac utitor ut dictum est.

Aliud. Ammoniaci thymiamatis drach. viij. æruginis drach. viij. floris lapidis Alsi drach. ij. obolos ij. alcyonij 3. i. ob. ij. opij sesquidrachmam, myrrhæ sesquidrachmam, composito ac utitor ut dictum est. Aegyptia ad callos & albugines, auferet etiam pelliculas confestim. Aeruginis Corinthiæ drach. vi. ammoniaci thymiamatis drach. mas sex. obolos quatuor. salis fossilis drach. iij. medullæ colocythidis drach. mas quatuor. fellis taurini drach. ij. nitri nigri sesquidrachmā, piperis albi grana xl. mellis Attici cyathos vi. composito ut dictum est, & in pyxide ilicea reposito utitor. Alia

Aegyptia ad callos & albugines, ac inueteratas affectiones. Aeruginis drach. vi. ammoniaci thymiamatis drach. sex. medullæ colocythidis drach. iij. fellis taurini drach. mas duas. nitri nigri drach. ij. excipe mellis Attici cyathis vi. & utere. Compositio exacuens uisum, faciens & ad glaucedinem. Antonij Musæ. Fellis perdicis syluestris partem unam. In alio exemplari, succi herbæ perdicij. Aliqui succi centaureæ partes iij. mellis Attici tantundem. Aliud. Fellis gallinæ ueteris partem unam. succi centaureæ partem unam. mellis Attici partes tres. facit ad glaucedines. Compositio Largi exacuens uisum. Succu foeniculi radicis partem unam. mellis tantundem. Reponito in pyxidem æream ac utitor. Aliud. Succu radicis foeniculi partem unam. succi chelidoniæ tantundem. mellis Attici tantundem. Aelij Galliad suffusiones. Fellis testitudinis marinæ drach. viij. mellis Attici tantundem. fellis taurini drach. mas ij. croci drach. mas ij. opobalsami drach. ij. contusis utere. Calsij ad suffusiones. Fel taurinū in æream pyxidem euacuatum per dies decem finito, deinde myrrhæ, croci, utriusque drach. duas. opopanax drach. ij. opobalsami drach. duas. piperis grana xij. mellis Attici duplum omnium accipito, omniaq; cum felle misceto, & in æreo uase coquito. deinde in ærea pyxide repositis utitor. Liquida Basilis, hoc est regina, hanc reparatricem appellamus.

Omphacij drach. mas duas. myrrhæ drach. mas duas. fellis aquilæ drach. ij. opobalsami drach. duas. lachrymæ oleæ drach. ij. ammoniaci thymiamatis drach. i. fellis hyænæ drach. ij. excipe melle. Antonij Musæ. Fellis hyænæ drach. i. fellis ursi drach. duas. opobalsami drach. ij. salis fossilis drach. i. croci drach. unam. myrrhæ drach. mas i. mellis Attici cyathos ij. succi foeniculi cyathos duos. Philoxeni. Fellis hyænæ sesquidrachmam adipis uiperæ sesquidrachmam. croci drach. i. omphacij drach. i. myrrhæ drach. mas dimidium, opobalsami drach. i. mellis Attici drach. o. octo.

2 Tincturæ albuginum. Gallam tritam ac leuigatā in prompto repositā seruato, usui uero expente cum specilli nucleo calfacto adhibeto, deinde atramentum futorium aqua dilutum admoueto. Aliud. Malicorium tritū adhibeto, indeq;

atramentum futorium aqua dilutum admouero.

Aliud. Mifyos, atramenti futorii, gallarū omphacinarum, singulorum æquales partes contusas & cribratas reponito. Vſus uero tempore aridum adhibeto. Ad glaucos oculos quo pupillæ nigræ reddantur. Maliciorij dulcis succū infunditō, deinde post temporis interſtitium hyoſcyami ſtorem cum uino aut hyoſcyami ſucco tritum inſtillato. Verum hæc opportuno tempore colligere & reponere conuenit. Aliud. Acacia fructum & gallarum parum quid diligenter trita fremij ſucco excipito, & ad mellis craſſitudinē redigito. Deinde expreſſum per linteolū liquorem reſeruiato ac utitor ut dictum eſt.

3 Ad pilos pungentes in palpebris enaſcētes, Trichiaſin appellant Græci. Antonij Muſæ. Fel auiculæ quæ cinædus appellatur, & aconiti dimidium eius, mixta reponito. Vſu uero exigente, euulſo pilo locum ex pharmaco illinito. Aliud.

Fel piſcis pagri, & aconiti dimidium, cum ſquama ferri lotā, adipē ſubigito, atq; his amygdalini olei parū adijcito, & ſanguinis ueſpertilionis quantum ſuffecerit. Deinde mixtis & repositis utitor ut dictum eſt. Adglutinatoria pilorum, Heraclidæ Tarentini. Cera drach. i. picis drach. i. lithocolle drach. i. ſimul liquefacta reponito. Vſu uero poſtu lante, ſpecilli ſummum candefacito, & quod ex pharmaco diſſoluto adhæſerit adhibeto, eo q̄ pilos agglutinato. Aliud. Reſinæ ſiccæ, picis ſiccæ utruſque drach. i. ſulphuris uiui drach. i. bituminis drach. unam. cera drach. ij. liquefactis utitor. Ad paruos inſtar hordei oblongos circa pilos palpebrarū abſceſſus, Crithas & Poſthias Græci appellant. Antonij Muſæ. Galbani partem unam cum modico nitro mixtam imponito, aut etiam miſyos crudi parum ammiſceto. Faciunt & ficus aridæ in uino mulſo coctæ & tritæ, modico ſi mul galbano cōtrito. Facit & farina hordeacea in uino mulſo coctæ ac trita, itidem modico galbano ſimul cōtrito. Dionyſij Mileſi ad pilos palpebrarum pungentes. Leporem marinum in ſigillino nouo urito, & cinerem tritum ricinorum ſanguine excipito & reposito in cornea pyxide utitor, euulſis antea pilis. Aliud. Salamandræ uſtæ cinerem, terreſtrium herinaceorum felle excipito, ac utitor ut dictum eſt. Quidam caſtorio uſi ſunt cum melle mixto. Aut caſtorio & hirudinis uſtæ cinere. Aut cicuta ſemen tritū ac Thunæ ſanguine exceptum, præuulſis pilis illeuerūt.

4 Ad crithas & chalazia. hoc eſt, inſtar grandinis in palpebris tubercula. Sagapeno cum aceto trito utitor. Aliud ad Aegyloſas. Succus illecebræ, ſucci ſolani, utruſque libri dimidiā, thuris drach. viij. maſtiche quadrantem, galbani libram dimidiā. Succos cum thure coquito, atque ubi diſſolutum fuerit galbanum inijcito; maſtichen enim ſolū probantur. Aliud. Thuris drachmas octo. Iadani drachmas quatuor. aluminis ſciſſilis drach. quatuor. myrrhæ drachmas octo. cæræ drachmas quatuor. ſpumæ niri drachmas quatuor. coaguli leporis drachmas quatuor. Contunditur hoc phar

macum & cum ungenti irini fece mollitur.

Cataplaſmata in eodem libro primo externorum ab Aſclepiade ad oculos deſcripta, itemq; agglutinatoria ex inuſchilla. 5

Cataplaſmata lippientium, ad doloris uexationes ac maximas Epiphoras, quibus uſus eſt Heraclides Tarentinus. Roſarum uiridum aut ſicrarum drachmas iij. croci drach. i. opij drac. unam, excipe meliloti decocto aut paſſo. Aliud. Roſarum, uigularum albarum, meliloti, capium papa ueris, ſingulorum drach. ij. croci drach. unam. opij drac. unam. myrrhæ drachmam unam. oui aſſati uittellum, tritis & paſſo ſubactis utere ut dictum eſt.

Illitiones ad dolores, quibus uſus eſt Glaucus.

Aloes, lycij indicij, roſarū uiridium, croci, opij, myrrhæ, ſingulorum æquales partes uino ſubactas in paſtillos formato, eosq; in umbra ſiccato. Vſu uero exigente paſſo dilutos oculis illinito, itemq; fronti ac temporibus. Philoxeni ad fluxionem multam & dolores. Foliorum roſarum recentium drachmas ij. ſeminis hyoſcyami drach. octo, thuris drach. iij. myrrhæ drachmas iij. farinae polentarum acetabulum, oui aſſati unius luteum, ſucci mandragoræ drach. iij. croci drach. ij. opij drac. iij. uini auſteri quantum ſufficit. In paſtillos redigito ac utitor ueluti dictum eſt. Illitio Antheræ eadem hora iuuans. Croci drach. iij. thuris drachmas duas. cinnabaris drachmas iij. gummi drachmas ij. uino excipito. Vſus tempore terito & ad ſolidum modicum mellis adijcito. Aliud Lychnum inſcriptum. Croci drach. unam. thuris drachmas ij. opij drac. ij. gummi drac. ij. cinnabaris drac. ij. aqua pluuiæ excipito. Alij habent, croci roſas ſpecie referentis drach. iij. cinnabaris drach. ij. myrrhæ, opij, utruſque drach. ij. aqua pluuiali excipito.

Illitiones mordaces quæ eueſtigio fluxionē cohibent, faciunt & ad lippitudinem ſcabram ac aridam. Aeris uſti, drach. iij. croci drach. iij. pipere albi drach. ij. opij drach. ij. gummi drach. iij. cum aqua pluuiæ forinſecus illinuntur. Relidit hoc phar macum maximas Epiphoras. Cæterum cauere oportet ne quid ex eo in oculū præterlabat. Aliud. phloginum, hoc eſt ſtammem inſcriptū.

Aeris uſti & lori drachmas xij. croci drachmas ſex. pipere albi drachmas quatuor, myrrhæ drachmas iij. opij drach. iij. gummi drach. xij. uino Ammiſnæ excipito. Agglutinatoria quæ fluxiones cohibent. Pollinis partem unam, myrrhæ partem unam. mannæ thuris partem unam. candido oui excipe, deinde in linteolum impacta impone temporibus ac fronti. Aliud. Seminis hyoſcyami drach. ij. opij, drach. i. croci drach. i. pollinis drach. iij. ouorum aſſatorum uittellos duos. caſtorij drach. i. omnibus ſimul cōactis utitor. Collyriū ad Epiphoran, & dolores, ac fluxionem multam, quo Moſchoſi familiaris uſus eſt. Glauicij drach. xvi. ſarcocollæ drach. viij. croci drach. iij. gummi drach. ij. tragacanthæ drach. ij. ſucci mandragoræ drach. ij. opij drach. i. aqua pluuiali excipito ac utitor cum ouo. Heronis ophthalmici pſittacus, ad dolores & fluxum largum, eueſtigio ſonnum inducit.

Glaucij drach. xvi. croci drachm. viij. sarcocollæ drach. viij. opij drach. iij. succi mandragoræ drach. duas. tragacanthæ drach. octo. aqua pluuiali excipi. Ad prædictas affectiones Neapolitæ.

Glaucij drach. xlvij. sarcocollæ drach. xxiiij. croci drach. xxiiij. lapidis hæmatitæ drachm. xij. opij drach. xix. succi mandragoræ drach. octo. gummi drach. xvi. tragacanthæ drachm. xij. excipe aqua pluuiali. Sergij Ophthalmici Babylonij. Glaucij drach. xxiiij. sarcocollæ drach. xvi. croci drach. xij. opij drach. iij. lapidis hæmatitæ drachm. sex. gummi drach. xij. excipito aqua pluuiali. Illinito per unum atq; alterum diem, atq; ubi affectio nõ soluitur ad insequentes illitiones transimur.

Aliud diaphnyrum glaucidanum inscriptum. Glaucij drachm. xlvij. sarcocollæ drachm. xlvij. croci drach. xxiiij. opij drach. sex. myrrhæ drach. sex. hæmatitæ drach. sex. tragacanthæ drach. xlvij. aqua pluuiali excipe ac utere cum ouo. Diaphnyrum ex hæmatite. Glaucij drach. lxiij. sarcocollæ drach. xxxij. croci drach. duodecim. opij drach. octo. myrrhæ drach. sex. hæmatitæ drach. xvi. tragacanthæ drach. xlvij. gummi drach. xvi. In alio exemplari drach. xlvij. Excipiuntur aqua pluuiali, usus eius est cum ouo. Phosphorus ad doloris uexationem, omnemq; inflammationem & intensas epiphoras. Glaucij drach. xxiiij. sarcocollæ drach. octo. croci, opij, utriusq; drachm. octo. myrrhæ drach. octo. missyos usqi drach. octo. gummi drachm. xix. excipe aqua pluuiali, utere cum ouo. Euchrum excellentis & mirabilis efficacitæ. Glaucij drach. xx. sarcocollæ drachm. septem, croci drach. septem, myrrhæ drach. septem, opij drach. septem, missyos usqi drach. septem, gummi drach. xij. excipe aqua pluuiali, utere cum ouo.

Pharmacum ex succis, dolorē sedans, facit ad omnem doloris uexationem, somnum euestigio inducit. Glaucij drach. xlvij. sarcocollæ, tragacanthæ, utriusq; drach. xvi. croci drachm. octo, opij drach. iij. succi rosarum drach. iij. lycij Indici drach. quatuor, hyoscyami drach. quatuor, succi mādragoræ drach. quatuor, gummi drach. octo. Excipiuntur meliloti decoctio: cōponuntur aut̄ hoc modo, Meliloti lib. unam, & aquæ pluuialis heminas xij ad tertias coquito, & excolato liquore ad pharmaci compositionem utitor. Aliud, Glaucij drach. xlvij. sarcocollæ drach. xxiiij. croci drach. xxiiij. opij drachm. xij. lycij Indici drach. xij. succi hyoscyami drach. xij. succi cicutæ drach. xij. rosarum uiridum refectis extremitatibus drach. xlvij. gummi drach. xxviij. aqua pluuiali excipe, utere cum ouo. Pharmacum Phæon, id est fuscum inscriptum, accommodatum ad doloris molestias. Cadmiæ drac. xij. aut xvi. æris usqi drach. sex, myrrhæ drach. tres, opij drach. tres, acaciæ drach. septem. excipito aqua pluuiali uelut demonstratum est. Aliud phæon, ad omnem fluxum & omnem lippitudinem. In alio pædicon, id est puerile legitur. Aëris usqi drach. xij. cadmiæ drach. xxxij. gummi drach. xxxij. acaciæ drach. xxxij. myrrhæ drach. quatuor, opij drach. quatuor, aqua pluuiali excipe.

Galen.

Aliud ex libris Philoxeni. Spodij cyprij, drach. xij. æris usqi drach. iij. opij, myrrhæ, utriusq; drach. tres, acaciæ, gummi, utriusq; drach. septem, aqua pluuiali excepta cum ouo in uerum eueniunt, ut dictum est. Pharmacum Berytium inscriptum, quo usus est Berytius ad maximas epiphoras, eue stigio auxiliatur. Aëris usqi & loti drach. xvi. acaciæ drach. xvi. spodij pompholygis drachm. xvi. opij drach. xvi. gummi drach. xvi. croci drachm. xij. myrrhæ drachm. ij. aqua pluuiali excipe, utere cum ouo. Oportet hoc assidue infundere. Aliud ad easdem affectiones. Spodij pompholygis drach. xvi. opij drach. xij. myrrhæ drach. xij. gummi drach. sedecim, æris usqi & loti drach. sedecim, aqua excipito pluuiali, ac utitor cum ouo. Pharmacum Acharistum inscriptum, ad maximas epiphoras. Huius solius usu medici ægyptij feliciter medicantur, in agrestioribus præsertim corporibus. Cadmiæ drach. xvi. acaciæ drach. viij. æris usqi & loti drach. viij. opij drach. quatuor, fructus ericæ drach. quatuor, myrrhæ drach. quatuor, gummi drach. xvi. aqua excipito, ac utitor cum lacte muliebri. Temperatura media est, ubi uerò circa oculos affectio sit, ab hoc collyrio abstinere oportet. Quo ipse usus sum sic habet. Cadmiæ drach. xvi. fructus ericæ drach. ij. æris usqi drach. quatuor, opij drach. ij. myrrhæ drach. unam, acaciæ drach. sex, gummi drach. octo. aqua excipito, usus indicatus est. Aliud, Cadmiæ drach. sex, fructus ericæ drachm. quatuor, opij drachm. sex, æris usqi & loti drach. iij. gummi drach. xx. cōponito, ac utitor ut dictum est. Nectarium Marci, facit ad incipientem lippitudinē, facit ad illationē fluxus tenuis, ad chemoseis, tumores, pellicularum eminētias, & ferē ad omnem lippitudinem facit, & ad palpebras crassas. Oportet autem præ omnibus fomentum adhibere, deinde ipsum infundere, in principio quidem fluxionis cum aquofo uel liquore: ubi uerò successerit hæc curatio, paulatim hæc temperaturā extendere & augere oportet. Caterunt ad palpebras asperas collyrio cū aqua utimur, apud alios Sphragis appellat. Aëris usqi & loti 3. iij. cadmiæ 3. iij. croci drach. ij. opij drach. ij. gummi drach. sex. aqua excipe, ac utere ut indicatum est.

6 Sergij Ophthalmici Monohemerum inscriptum, hoc est una die efficaciam suam commonstrans. Cadmiæ usq; & loti drachm. quatuor, spodij pompholygis loti drachm. quatuor, æris usqi & loti drachmas quatuor, croci drach. duas, acaciæ drachm. sex, gummi drachm. sex, aqua pluuiali excipe, ac utere cum ouo. Temperatura est aquosa. Postquam lachrymæ prolectæ fuerint, candidum uel infundere oportet, & rursum sublinere. Vbi uerò morsus consequeretur, fomentum adhibendum est, rursumq; uel candidum infundendum: postea uerò collyrio nigro inscripto illinito. Sphragis Neapolitæ. Cadmiæ drach. octo, æris usqi & loti drachm. octo, acaciæ drach. octo, spodij cyprij drach. quatuor, croci drachm. quatuor, opij drachm. quatuor, gummi drachm. duodecim. aqua excipe, usus indicatus est.

tom. 5

B Pacci

Paccijs Sphragis. Cadmiæ uftæ & lacte capri no siue muliebri extinctæ ac lotæ, & in umbra sic catæ 3. x. eris ufti et loti 3. x. acaciæ 3. x. opij 3. vi. croci drach. vi. gummi 3. xv. aqua pluuiali excipito. Zolij sphragis cum Paccijs concordat. Phi lotæ Aphroditarium inscriptum. Cadmiæ lotæ drachm. xxiiij. acaciæ drachm. xxxvi. aris ufti & loti drachm. duodecim, croci drachm. duodecim, opij drachmas duodecim, spodij cyprij loti drachm. xij. gummi drachmas xlvij. excipe aqua pluuiali, ac utere cum ouo afsidue infundendo.

Post curationem uerò lauari iubeto, hoc afsidue ufus fum in maximis epiphoris. Aliud Neapolitæ. Facit ad maximas epiphoras, maxime in his qui ægre rigantur & subalbicant circa inflammationes, ut simile quiddam chemosi appareat. hoc nos usi sumus, post illitiones agris lauare iusis.

Lapidis schisti drachm. viij. thuris drachm. vij. aris ufti & loti drach. viij. opij drach. viij. myrrhæ drachm. iij. gummi drach. viij. excipe uino ac utere cum ouo. Temperamentum est aquosum. Sæpe uerò hoc infundere oportet, & post intervalum ab illitione lauari iubere. Fuscum Olymponico inscriptum. Facit ad maximos dolores, facit & ad chemoseis & omnino ex accõmodatissimis collyrijs est: nam statim liberat. Cadmiæ uftæ & lotæ drachm. viij. acaciæ drachm. viij. stibij ufti & loti drachm. viij. aloes indicæ drachm. viij. croci drach. iij. myrrhæ drach. iij. opij drach. iij. gummi drachmas viij. aqua excipe ac utere cum ouo. Temperamentum est crassum. Ego etiam pompholygis ac thuris utriusque drach. iij. adieci. Aliud Zosimo inscriptum odorum. Facit ad dolores & recentes affectiones. Cadmiæ uftæ & lotæ uino Italico, hoc est extinctæ, drach. viij. aloes drach. viij. stibij drachm. viij. aris ufti & loti drach. viij. aut ij. croci drachmas ij. myrrhæ drach. unam, nardi indicæ drachmam unam, opij drach. unam, acaciæ drachm. xix. gummi drachm. duodecim. aqua pluuiali excipe. Hermiæ ophthalmici Lutron, id est balneum appellatum. Ad maximos dolores eadem die ad summum auxilians, facit & ad inueteratas lippitudines. Aloes drach. viij. aris ufti & loti drach. xvi. opij drach. xvi. myrrhæ drach. xij. croci drachm. viij. cadmiæ drach. iij. thuris drach. iij. gummi drach. xvi. uino Mendefio excipe, ac utere cum ouo. Temperatura est aquosa. Oportet hoc per interualla trium aut quatuor horarum infundere, & usque ad mali depulsionem sinere, atque tunc lauari iubere. Theodotio Phlacianum, Harpocratium inscriptum. Ad maximas epiphoras & dolores, liberat citra uenæ sectionem. Succij acaciæ drachm. xxiiij. cadmiæ drach. viij. aris ufti & loti drachmas viij. stibij drachm. xvi. aloes drachm. iij. croci drach. iij. myrrhæ drachm. iij. lycij indicæ drachm. ij. castorij drachmam unam, opij drachmas ij. gummi drachm. xxiiij. aqua pluuiali excipe, ac utere cum ouo. Temperatura est crassior. Hoc collyrium tumorem palpebris inducit. Scylacium pharmacum accõmodatum eadem die curans, euestigio

soluit inflammationes. Stibij drac. xl. acaciæ drac. xl. cadmiæ drach. xvi. aris ufti & loti drach. xiiij. cerusæ drach. viij. myrrhæ drach. iij. nardi indicæ drachm. iij. croci drachm. ij. lycij indicæ drach. iij. castorij drach. ij. aloes drachm. ij. opij drachm. ij. chalcitidis assæ drach. ij. gummi drach. ij. Excipe rosarum decocto ac utere cum ouo. Temperatura est crassior. Neapolitæ Phanton, id est lampris seu facula. Ad maximas epiphoras & doloris molestias, facit & ad affectiones. Cadmiæ lotæ drach. viij. acaciæ drach. viij. aris ufti & loti drachm. vi. stibij loti drach. xx. plimythij drach. vi. myrrhæ drach. ij. aloes drachmas ij. nardi celticæ sefquidrachmam, opij sefquidrachmam, croci drachmam unam, castorij drachmæ dimidiu, gumi drachmas xx. aqua pluuiæ excipe, utere illinendo.

Aliud Phanton Serapiacum inscriptum. Acaciæ drach. xl. stibij drach. xl. cadmiæ drachm. xvi. aris ufti et loti drachm. xij. aloes drachm. iij. myrrhæ drach. iij. cerusæ drachm. xij. opij drachm. ij. croci drach. ij. nardi indicæ sefquidrachmæ, gummi drachmas xxv. aqua pluuiali excepta illinito.

Malabathrinum nostrum, facit ad doloris vexationes, & affectiones in declinatione. Cadmiæ drach. xvi. acaciæ drachm. xl. aris ufti & loti drach. xiiij. opij drach. ij. lycij indicæ drach. ij. myrrhæ drach. iij. malabathi drachm. ij. nardi indicæ drachm. ij. castorij drach. ij. aloes drachmas ij. cerusæ drachm. viij. stibij loti drachmas viij. gummi drachmas xl. aqua excipe, & utere cū ouo in principio affectionum, & in declinatione facta ab illatione pharmaci panchrestii appellati: descriptum hoc inter mordacia collyria habetur. Aliud, Philadelphium inscriptum. Facit ad declinationes inflammationum, & ulcera fordida, & pustularum eruptiones, euestigio auxiliatur. Stibij ufti & loti drachmas uiginti, plumbi ufti & loti drachmas decem, cadmiæ drachmas viij. aris ufti & loti drachm. iij. aloes drach. iij. lycij indicæ drach. duas & dimidiam, myrrhæ drachm. duas & dimidiam, nardi indicæ drach. duas, croci drach. duas, castorij drachmam unam, opij drach. unam, gummi drachmas viij. aquam & ad exceptionem candidum ouorum decem. Collyrium album, ad epiphoras et affectiones inscribitur Trypherum, id est delicatum. Cadmiæ lotæ drach. xvi. cerusæ drachm. viij. amyli drach. iij. gummi drachm. iij. tragacanthæ drachmas iij. opij drachm. duas. excipe aqua pluuiæ. Vfus est cum ouo. Collyrium ex terra Samiæ Terennum inscriptum, ad epiphoras & affectiones. Cadmiæ lotæ drach. duodecim, cerusæ drach. duodecim, terræ Samiæ drach. xij. opij drachmam unam, gummi drach. iij. aqua excipe & utere cum ouo. Aliud dolorem sedans, ad fluxu omnis generis, ulcera, dolores, papulas et tubercula, prolapsus, chemoseis & omnigenas affectiones. Cerusæ drach. viij. terræ Samiæ drac. viij. spodij pompholygis drach. xij. tragacanthæ drach. ij. opij. drac. ij. gumi drac. iij. aqua pluuiæ excipe ac utere cū ouo. Aliud, Diocleu inscriptum, ad doloris molestias, & epiphoras

phoras, ad suppuratos oculos, pustulas, ulcera. Hoc pharmacum delicatius existit. Tragacanthæ drach. viij. gummi drach. iij. amyli drach. iij. spodiij pompholygis drach. xvi. cerusæ drachm. viij. opij torrefacti drach. ij. aqua pluuiæ excepta admoue cum ouo. Pharmacum ex thure, accomodatū ad fluxiones & chemoseis. Cadmiæ drachmam unam, thuris drachmam unam, cerusæ 3. xl. opij drach. sex, gūmi 3. vi. aqua pluuiali excipito. Cæterum nos sic apparauimus. Cadmiæ drachmas x. pompholygis drachmas x. thuris drachmas x. cerusæ drachmas xl. opij drachm. sex, gummi drachmas sex: aqua pluuiæ excepta admoue cum ouo. Aliud, Trypheron, id est delictum inscriptum. Ad inuisiones epicaumata grecis dictas, pustulas, chemoseis, maxime in his qui nullam mordacitatem ferre possunt. Cadmiæ lotæ drach. viij. amyli drach. viij. thuris drach. viij. cerusæ drach. xlvij. opij drach. vi. gūmi drach. xlv. aqua pluuiæ excipe, usus indicatus est.

7 Cygnus inscriptus reginæ, ad maximos dolores & affectiones. Cadmiæ drachm. xvi. cerusæ lotæ drach. viij. amyli drach. ij. tragacanthæ drach. duas, acaciæ drachm. duas, opij drach. duas, gummi drach. xij. excipe aqua pluuiali, & ad excipien dum adijce ouorum crudorum recentium candida iij. Aërianum Diomedii inscriptum, collyrium accomodatū ad epiphoras, & ueteres affectiones itemq̄ recentes. Spodiij pompholygis drach. viij. cerusæ drach. xxx. æruginis drachm. iij. myrrhæ drach. xiiij. thuris drach. iij. opij drachm. iij. gūmi drach. viij. excipe aqua pluuiali ac utere cū ouo. Cygnus ex terra Samiæ. Ad ulcera omnis generis, ad epiphoras, dolores circūcirca molestates, suppuratosq̄ oculos. Spodiij loti drach. xvi. cerusæ lotæ drach. viij. terræ Samiæ drach. iij. amyli 3. iij. acaciæ 3. iij. opij 3. iij. gummi 3. iij. tragacanthæ drachmas duas, aqua pluuiali excipe ac utere cum ouo. Aliud Dionysio inscriptum. Cerusæ drach. xxxviij. æruginis uermiculatæ drach. xvi. succi papaueris drach. viij. gummi drach. iij. excipe aqua pluuiæ, ac utere cum lacte. Aërianum pharmacum nostrum, ad ueteres ac recentes affectiones accomodatū. Cerusæ drach. xxxiij. cadmiæ ustæ & lotæ drachm. x. stibij usti & loti drach. x. thuris drach. x. squamæ aris drach. quinçq̄, opij drach. tres, myrrhæ drach. tres, gummi drach. xij. excipe aqua pluuiali, ac utere cum ouo. Collyrium Gennadij. Cerusæ drach. xvij. stibij drach. xij. myrrhæ drachm. xij. squamæ aris drach. xij. opij drachm. sex, gummi drach. xxxiij. excipe aqua pluuiali. Collyrium ex terra Samiæ, Pacciij Ophthalmici, ad affectiones intensas. Cadmiæ drach. xvi. cerusæ drach. xvi. terræ Samiæ drachm. quatuor, opij drach. ij. thuris drach. ij. stibij drach. quinçq̄, gummi drach. quinçq̄: excipe aqua, ac utere cum ouo. Theri num, id est æstiuum inscriptum. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xx. acaciæ drach. ij. squamæ aris ustæ & lotæ drach. xij. corticis thuris drach. ij. tragacanthi drach. v. gūmi drach. xvi. aqua pluuiali ex-

Galen.

cipe, utere cum ouo. Collyrium Hygidion appellatum. Cadmiæ drach. viij. myrrhæ drachm. viij. acaciæ drach. vi. opij drach. ij. aris usti & loti drach. ij. gūmi drach. vi. fructus ericæ drachmam unam: aqua pluuiali excipito. After anicetus, hoc est inexuperabilis. Ad doloris uexationes, pustulas, staphylomata, ulcera sordida & serpentina. Facit & ad inueteratas affectiones, & cicatrices exierit. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xvi. cerusæ lotæ drachm. xvi. amyli drachm. xij. stibij usti drachm. xij. spodiij drach. viij. plumbi usti ac loti drach. viij. terræ Samiæ drach. viij. myrrhæ drachmas duas, opij drach. ij. tragacanthæ drachm. viij. excipe aqua pluuiali. Libianum. Ad pustulas, inuisiones, rupturas, concauitates, oculos purulentos, chemoseis, staphylomata. Facit et ad circū molestantem dolorem, & affectiones, & cicatrices exierit. Cadmiæ ustæ & lotæ drach. xvi. cerusæ lotæ drach. xvi. stibij usti & loti drachm. xvi. plumbi usti & loti drach. viij. amyli drach. xij. spodiij pompholygis drach. viij. myrrhæ drachm. viij. terræ asteris drach. viij. tragacanthæ drachm. viij. opij drach. ij. & ad exceptionem ouorum albumina decem. Aliud Libianum. Pompholygis drach. viij. cadmiæ ustæ & lotæ drachm. xvi. stibij usti & loti drach. xij. cerusæ lotæ drach. xvi. amyli drach. xij. terræ Samiæ drach. viij. plumbi usti & loti drach. viij. myrrhæ drach. ij. opij drach. ij. tragacanthæ drach. ij. excipe aqua pluuiali. Collyrium ex cornu ceruino. Ad ulcera, pustulas, cicatrices exierit. Cornu ceruini usti & loti drach. iij. thuris drach. iij. plumbi usti & loti drach. iij. squamæ aris lotæ drach. ij. opij drachm. i. gummi drach. iij. excipe aqua pluuiæ. Aliud ex cornu ceruino, Neapolite. Plumbi usti & loti drach. xvi. cornu cerui usti drach. xvi. thuris drach. viij. acaciæ 3. viij. spodiij cyprij 3. viij. amyli 3. iij. opij drach. ij. squamæ aris drach. ij. croci drach. octo, myrrhæ drachm. quatuor, tragacanthæ drachm. unam, gummi drach. viij. hysocyami cremore excipito. Viride ad affectiones. Spodiij cyprij drach. xvi. amyli 3. xvi. croci 3. viij. stibij 3. viij. opij 3. iij. gummi drach. iij. excipe aqua pluuiali ac utere cum ouo. Aliud uiride Zoili Ophthalmici. Spodiij cyprij drach. octo, croci drach. viij. amyli drach. viij. opij drachm. ij. stibij drachm. viij. gummi drach. iij. anagallidis succo excipito. Aliud. Alia exemplaria ita habent Zoili uiride. Cadmiæ ustæ ac lotæ & uino Italico extinctæ drach. viij. croci drachmas iij. stibij usti & lacte extincti drach. iij. amyli drach. unam, gūmi drach. ij. excipito succo anagallidis quæ cæruleum habet florem. Ex libris Scribonij Largi, Pittacinum inscriptum. Ad doloris molestias, pustulas, inuisiones, cicatrices resolutas, prolapsas, confusiones, & ubi multus sanguis æstate suffunditur. Comodat etiā ad alias affectiones, & præsertim in oculis molli sensu præditis, in quibus tenuis lacryma profluit. Cōpositio hoc modo habet. Cadmiæ drach. viij. croci drach. viij. stibij drach. viij. amyli recentis drach. viij. opij drach. iij. gūmi drach. iij. aqua

tom. 5

B 2

pluuiæ

pluuiali excipito, utitor cum ouo. Naucratita pharmacum affectionibus accommodatum.

Cadmia drach. xij. croci drach. xij. opij drac. sex. Squamae stomomati purgatae drachm. v. squame aris drach. sex, succi rosarū drach. xvi. plumbi usti & loti drach. v. myrrhæ drach. iij. nardi drachm. ij. acaciæ drach. ij. gūmi drach. xij. excipito aqua pluuiali. Ante uiride. Cadmie drac. xlvij. myrrhæ drach. xxxiij. croci drac. xlvij. opij drac. xxxiij. plumbi usti & loti drach. viij. squame aris drach. vi. nardi indicæ drach. vi. acaciæ drach. vi. gummi drach. xxxiij. aqua pluuiali excipito. Pharmacum ex Galbano, quo usus est Nicetes. Ad dolores & lippitudines. Cadmie drac. viij. spodij cyprij drach. viij. aris usti & loti drac. viij. opij drac. viij. myrrhæ drach. viij. galbani drach. viij. aqua excipito; hoc pharmacum ex ualde approbatis est, recipitq̄ amplius gūmi item drach. viij. Alia ex- plaria spodium non habent. Aliud, Cadmie drach. xvi. aris usti & loti drach. viij. myrrhæ, galbani, singulorū 3. viij. opij 3. viij. atramēti sutorij drac. vi. gummi drach. vi. aqua pluuiali excipito.

s Collyrium diarodon Nil ex rosifis, uelut Andreas tradit: ad doloris molestias, fluxū uberem, ac tenuem, pustulas, prolapsus. Foliorum rosarum refectis extrematibus drach. iij. croci drac. ij. opij obol. i. nardi indicæ obol. i. gummi drach. iij. alij drach. i. habent. aqua pluuiā excipe, ac utere cū ouo. Temperatura dissoluta est. Aliud ex rosifis Nil, quo usus est Gallio Ophthalmicus. Rosarum drach. iij. croci drac. ij. acaciæ drach. i. opij ob. i. nardi indicæ ob. i. gummi drach. iij. aqua pluuiā excipe: utere cum ouo; tēperatura est diluta. Aliud ex rosifis horum appellatū, ad eandem affectiones. Rosarum refectis unguibus drac. xxxiij. croci drach. xij. amyli drach. vi. balauitij drac. iij. opij drach. iij. traganthæ drachm. viij. hyoscya mi foliorū succo excipe. Aliud, Rosarum drac. viij. croci drach. iij. aris usti & loti drach. i. gummi drach. i. aqua pluuiā excipe, ac utere cum ouo.

Aliud diarodon ex rosifis Terentij, constans ex pompholyge. Rosarum recentium drach. duodecim, spodij cyprij drach. iij. croci drachm. iij. opij drach. iij. nardi drach. iij. gummi drach. iij. excipito aqua pluuiali. Aliud diarodon. Rosarū recentium drachmas ij. croci drach. vi. spodij cyprij drachmas duas, amyli drachmas duas, acaciæ drachmam unam, nardi indicæ 3. i. gūmi 3. ij. traganthæ drach. ij. excipito aqua pluuiali. Diarodon Euelpidion diasmynum appellatum.

Rosarum drac. centum, croci drach. l. opij drach. viij. myrrhæ sesquidrachmā, gūmi drachm. l. uino odoro excipe, ac utere cum ouo. Aliud diarodon. Rosarum drachmas centū, croci drach. l. opij drachmas octo, myrrhæ drachmas viij. gummi drachmas quinquaginta: uino odorato excipe ac utere cum ouo. Ego hoc apparauī pro folijs rosarum, florum earundem drachmas centū inijciens, atque feliciter successit. Diarodon ex rosarum lxxij. drachm. Magnum appellatum. Hoc usus est Lucius præceptor ad doloris molestias,

pustulas, inuisiones, staphylomata, prolapsus, ac oculos purulentos, ad fluxiones antiquas, inueteratas lippitudines & affectiones ægre cedentes. Rosarum uiridum refectis unguibus drachmas lxxij. cadmiæ uste ac lotæ drachmas uigintiquatuor, croci drachmas lx. opij drachmas tres, subij drachmas tres; alij drachmas sex, æruginis drach. duas; alij tres. Squamæ aris drachmas duas, nardi indicæ drachmas duas, myrrhæ drachmas sex; alij quatuor. gūmi drachmas uigintiquatuor. excipito aqua pluuiali. Aliud ex drachmibus lxxij. Rosarum drachmas lxxij. cadmiæ uste & lotæ drac. xxxiij. croci drachmas sex, alij octo. opij drachm. tres, subij drach. tres, myrrhæ drachmas tres, squamæ aris drach. duas, eruginis drach. ij. nardi drac. unā; alij ij. gūmi drach. xxxiij. excipe aqua pluuiā, ac utere cum lacte. Pharmacū ex uiolis albis accōmodatum ad epiphoras & affectiones. Acaciæ drach. xlvij. succi uiolarum albarum drach. xlvij. spodij cyprij drach. xxxiij. croci drac. xxxiij. myrrhæ drach. iij. opij drach. iij. alij vi. succi hyoseyami drach. iij. aris usti & loti drach. iij. gummi drach. iij. excipe uino falerno. Collyriu quo usus est Florus in Antonia Drusi matre, quæ parum abfuit ut ab alijs medicis excogaretur. Acaciæ drach. xlvij. rosarum siccarum drach. xlvij. meliloto rum drach. xlvij. spodij cyprij drachm. xxxiij. malorum mandragoræ drach. ij. croci drac. xxxiij. opij drach. vi. seminis hyoseyami acetabula ij. alij drach. xxxiij. myrrhæ drachm. iij. aris usti & loti drachmas quatuor, gūmi drachmas quadraginta, uini falerni, aquæ pluuialis, utriusq̄ heminas tres. Vinū & aquā misceto, eisq̄ rosas, melilotū, semē hyoseyami, mandragoræ mala: aut si hæc nō adsint, corticē inijcito, & ad dies tres aut quinque macerari sinito, deinde expresso liquore ad pharmaci cōpositionē utitor, probatissimū hoc existit. Melinū delicatū, cōmodum his qui nullam penitus pharmacorū mordacitatem perferre possunt: facit ad pustulas, prolapsus, fluxū acrem & uberē, inuisionesq̄ & ad recentes affectiones. Cadmiæ uste ac lacte extinctæ drach. xvi. cerusæ lotæ drach. octo, croci drach. iij. opij drach. i. traganthæ drach. ij. aqua pluuiali excipito, ac utitor cum ouo. Aliud ad inuisiones, pustulas, prolapsus, dolores. Cerusæ drac. xxxiij. amyli drachm. xij. cadmiæ lotæ drac. x. thuris drac. x. croci 3. viij. opij drach. octo, gummi drachm. x. traganthæ drach. ij. excipe aqua pluuiali & utere cum ouo.

Diarodon inculpabile. Cadmiæ uste & lotæ drach. xxxiij. cerusæ drach. xij. opij drachm. vi. florum rosarum drach. vi. croci drach. vi. lapidis schisti drach. duodecim, gummi drac. x. excipe aqua pluuiā, ac utere ad ulcera fordida cū lacte, ad mēda cum ouo. Aliud, Cadmiæ uste & lotæ drach. xxxiij. cerusæ drach. xij. lapidis schisti drach. quatuor, florum rosarum drach. sex, excipe aqua pluuiā, ac utere ad fordida ulcera cū lacte, ad repurgata cum ouo. Croceum pædicon, id est puerile inscriptum ex pompholyge. Ad epiphoras & molestias doloris, & ad effectiones ex plagijs.

Spodij pompholygis drach. xvi. croci drach. xvi. opij drachm. xvi. tragacanthæ drach. viij. excipe aqua pluuiæ, adhibitis simul albuminib. ouorum quatuor. Collyrium Caij Ophthalmici. Spodij cyprij drach. iij. amyli recentis drachm. xij. croci drachmas duas, myrrhæ drachmam unam, succi mandragoræ drachmam unam, gummi drac. iij. excipe aqua pluuiæ, ac utere cum ouo. Atime-ti Lyliopion, hoc est solenus dolorē. Atramenti futoriij crudi drach. xl. pompholygis crudæ drac. xl. cerusæ drach. xxiij. opij drach. ij. croci drach. iij. Crocus in aquam conijctur ac maceratur, & ex cremore hoc collyrium apparatur. quod uerō reliquum est ex croco teritur, reliquisq; admiscetur, additis item gummi drach. xxxij. Diomedis Lyliopion ad dolores. Atramenti futoriij crudi drach. xxxij. cerusæ drach. xxxi. spodij pompholygis drach. xvi. croci drach. xvi. thuris drac. viij. myrrhæ drach. ij. gummi drach. xvi. aqua pluuiali excipito, ac utitur cum ouo: præclarum est hoc collyrium. Zoili pharmacū faciens ad lip-pitudines antiquas, myocephalos, staphylomata & fluxiones antiquas. Cadmiæ drach. viij. æris usti drach. viij. cerusæ drach. iij. aloes felsquidrachmam, foliorum croci, chalcitidis assæ, atramenti futoriij, opij, lycij, singulorum drach. unā, myrrhæ drach. ij. acaciæ drach. xx. spicæ nardi felsquidrachmam, gummi drach. xx. castoriij drachm. iij. stibij drach. iij. excipe aqua pluuiali. Asclepiadeum Pacciij, ad doloris uexatiōes, fluxū tenuem & multum, inuisionem, pustulas, pellicularum eminentias, aspretudines, inueteratas affectiones, & eos qui à multis illitioinibus læsi sunt, cōfestim opituletur. Compositio sic habet, Cadmiæ drac. xij. æris usti drach. xij. croci drac. xij. squamæ æris drach. xij. myrrhæ drach. iij. nardi indicæ drach. iij. rosarum siccarum drach. iij. opij drachm. iij. lapidis hæmatitæ drachm. iij. piperis albi grana xxxiij. gummi drach. xij. uini Chij quantum sufficit, utere cum ouo. Aliud exëplar habet rosarum drach. iij. piperis grana xxv. Pharmacū accommodatum, Nectarium inscriptum. Cadmiæ drac. xij. squamæ æris cypricæ lotæ drach. xij. croci drac. xij. opij drach. iij. æris usti & loti drach. xij. myrrhæ drach. iij. lapidis hæmatitæ drachm. iij. rosarum siccarum drach. iij. spicæ nardi drach. iij. misyos alsi drach. iij. calsiæ fistulæ drach. iij. piperis albi grana xxv. gummi drach. xij. uino exceptis utere. Antigonij Croceum Leontariū, hoc est, leuculus appellatū, propterea quod leonis imago ei insinueret. Facit ad epiphoras, molestiam doloris, inueteratas affectiones. Est & aspretudinibus cōmodū: cicatrices & callos exterit: maxime uerō pueris cōmodum est. Spodij cyprij drac. xlvij. croci drach. xxiiij. myrrhæ drach. xij. lapidis hæmatitæ drach. viij. opij drachm. xij. piperis albi grana xxxvi. gummi drach. lxxx. uino falerno excipito. Aliud, Spodij cyprij drach. lxxx. croci drach. xl. myrrhæ drach. xx. opij drach. xx. lapidis hæmatitæ drach. xij. piperis grana lx. gūmi drac. lxxx. uini falerni quantum sufficit.

Galen.

A 9 Ex libris Scribonij Largi, Asclepios Machaonis. Ad ueteres affectiones, & oculos suppuratos. Spodij pompholygis drach. xxxij. æris usti drach. xxxij. croci Siculi drachm. xvi. myrrhæ drachmas vi. lapidis hæmatitæ drach. decem, nardi indicæ drach. vi. opij drachmas vi. piperis grana xl. uino Chio excipito. In libro de Athenippis Asclepijs, opij drachmæ viij habentur. Euemeris ad dolores & affectiōes. Aëris usti et loti drachmas trigintaduas, spodij pompholygis drachm. xvi. croci drach. xvi. myrrhæ drach. viij. lapidis hæmatitæ usti & loti drach. viij. spicæ nardi drac. iij. misyos usti drach. iij. opij torrefacti drachm. iij. gummi drachm. xvi. uini Italici quod satis est.

B Diasmyrnum odorum Synerotis, pharmacum accommodatum ad inueteratas affectiones. Facit & ad Rhœadas, hoc est angulos antrosos, & ægilopas. Cadmiæ lotæ drachm. xxviij. lapidis hæmatitæ usti & loti drachm. xxv. spodij cyprij drach. xxiiij. myrrhæ drach. xlvij. croci drach. iij. opij Hispani drachm. viij. piperis albi grana xxx. gummi drachm. vi. uino Italico excipito. Vtitorum ouo in recentibus affectionibus. Temperatura aquosa est. Aliqui croci drach. xij inijciunt.

C Hamatitinum Synerotis aspretudinibus commodum. Facit ad ueteres affectiones, ad ficosa, & ad omnem extuberantiam si cum odoro Synerotis cōmiscetur. Aëris usti & loti drach. xxiiij. lapidis hæmatitæ drach. unam, croci drach. iij. opij drach. iij. gummi drach. xij. Excipe aceto acerrimo. Aliud, Aëris usti drach. xlvij. croci drac. xxiiij. opij drach. iij. gummi Thēbaci drachmas xxiiij. pompholygis drach. xviij. myrrhæ drach. xviij. salis ammoniaci drach. xij. lapidis hæmatitæ drach. unā, æruginis drach. iij. uino excipito.

D Hieracis ad aspretudines. Misyos usti drachm. viij. croci drach. viij. opij drach. viij. lapidis hæmatitæ loti drach. viij. æris usti & loti drach. xij. myrrhæ drach. xij. gummi drachm. xij. uino acerrimo excipito. Apollonij Phœnix, Collyrium Hieracium ad aspretudines. Per hoc catulo egregie medicatus est. Facit & ad palpebrarum destitutia, & inueteratas affectiones. Lapidis hæmatitæ usti & loti drachm. trigintaduas, æris usti & loti drachmas sedecim, æruginis rasilis drachmas sedecim, opij drach. viij. alij sex: cadmiæ botryitidis drach. iij. chalcitidis assæ drach. iij. gummi drach. xvi. Excipe aqua pluuiali. Phœnix Apollonij aliter, uelut Arius Asclepiadeus inscripsit, in libro quo propria pharmaca coaceruauit. Lapidis hæmatitæ drach. xxiiij. lapidis schisti usti & loti drac. xxiiij. cadmiæ drach. xij. æris usti drachm. xij. opij drach. viij. chalcitidis assatæ drach. iij. alij drach. viij. In alio exemplari etiam æruginis drach. xij. gummi drach. xvi. excipe aqua pluuiali.

Aliud collyrium ad aspretudines. Chalcitidis ustæ drac. xij. misyos usti & loti drac. viij. croci, opij, utriusq; drach. vi. lapidis hæmatitæ drach. viij. gūmi drac. xij. acerrimo aceto excipito. Collyriū ad crassitudines. Aëris usti & loti drach. xxiiij. spodij pompholygis drachmas xvi. myrrhæ drach. xvi.

tom. 5

B 3

fals

salis ammoniaci drach. xij. lapidis hæmatitæ drac. A
 iiij. opij drach. iiij. piperis grana xij. alij xvi. gūmi
 3. viij. uino excipito ac utitor. Eumeri cicatri-
 ces & callos exerit. facit & ad inueteratas affecti-
 ones. Cadmiæ drachm. lx. croci drachm. l. spicæ
 nardi drachm. xx. squamæ æris torrefactæ drach.
 l. myrrhæ drachm. l. opij drachm. triginta. æris usti
 drach. lx. misyos crudi drach. quinquaginta. gum-
 mi drach. lxx. excipe uino Chio. Aliud Pyra-
 mi, Cicatrices & callos extensens, deprimit om-
 nem extuberantiam. Cadmiæ cypriæ drachm. xl.
 lapidis hæmatitæ drach. xl. æris usti drach. xl. mi-
 syos usti drach. xx. croci drachm. xx. ammoniaci
 thymiamatis drach. xx. squamæ æris ustæ & lotæ
 drach. xxx. opij drach. xx. gummi libram i. cū acer-
 rimo aceto utere. Aliud Eumeri, ad eadē affe-
 ctiones. Aëris usti & loti drach. xxxiij. spodij pom-
 pholygis drach. xij. myrrhæ drach. viij. salis am-
 moniaci drach. xij. lapidis hæmatitæ drach. iiij. pi-
 peris drach. xij. gummi drach. viij. uini Chij quod
 satis est. Lynceus, ad affectiones callosas, ex-
 auit uisum, cicatrices & callos exerit. Cadmiæ
 drach. xij. æris usti & loti drachm. xij. ammoniaci
 thymiamatis drach. xij. myrrhæ drach. xvi. lapidis
 hæmatitæ 3. vi. opij 3. vi. aloes 3. iiij. fellis taurini 3.
 iiij. galbani 3. iiij. æruginis 3. i. opopanacis drach.
 iiij. salis ammoniaci drach. ij. gummi drach. vi. alij
 ij. aqua pluuiali excipito. Collyrium Rinema,
 hoc est, lima inscriptū. facit ad callosas affectiōes,
 cicatrices exerit, facit & ad suffusiones. Cadmiæ
 drac. xlviij. ammoniaci thymiamatis drac. xlviij.
 æris usti drach. xlviij. opij drach. xvi. æruginis cy-
 prij drach. xvi. myrrhæ drach. xvi. lapidis hæmatitæ
 drach. xxxiij. galbani drach. xvi. opopanacis 3.
 xviij. fellis taurini drac. viij. salis ammoniaci drac.
 iiij. gummi drach. lx. aqua pluuiali excipe. Tem-
 peratura aquosa est. Collyrium Harmatium, id
 est, curus inscriptū. Quo usus est Ptolemæus rex
 extersua facultate præditum. Exerit cicatrices,
 acuit uisum, est & aspretudinibus commodum.
 Aëris usti & loti drac. viij. ammoniaci thymiamatis
 drach. viij. lapidis hæmatitæ drach. viij. thuris
 corticis drach. viij. gummi drac. viij. excipe aqua
 pluuiali, ac utere cū aqua. Alia exemplaria etiam
 æruginis drach. ij. habent. Collyrium oxydorci
 cum, hoc est uisum exacuēs, ex hæmatite, cicatri-
 ces & callos exerit. Ammoniaci thymiamatis 3.
 xxxiij. æris usti & loti drach. xxxiij. lapidis hæma-
 titæ drach. xxxiij. gummi drachm. xxxiij. æruginis
 drach. viij. Excipe aqua pluuiali. Collyrium Ar-
 temonium inscriptum, quo Bassus sodalis meus
 usus est. Facit ad fluxiones antiquas, & aspretudi-
 nes palpebrarum, ad humore putrescentes & ero-
 sos angulos, ad oculos humectos, & membrana-
 rum extuberantiam, cicatrices & callos exerit, &
 quod maximū in eo est; post illitionem oculos im-
 perturbatos conseruat. Subij drac. iiij. æris usti 3.
 ij. cerusæ drach. ij. croci drach. i. myrrhæ drach. i.
 corticis thuris drach. i. æruginis uermiculatæ dra-
 unam, gallarum omphacinarum drach. unam, pi-
 peris albi drac. i. gūmi drach. i. uino excipe, utere

cum aqua. Aliud pharmacum accōmodatum.
 Cadmiæ drach. viij. stibij drach. viij. cerusæ drach.
 viij. æris usti drach. iiij. corticis thuris drach. ij. cro-
 ci drach. ij. myrrhæ drach. ij. æruginis uermicula-
 tæ drach. ij. gallarum omphacinarum drach. ij. pi-
 peris albi drach. unam, gummi drach. iiij. excipe
 uino. Collyrium Indici Aërianum inscriptum,
 præoccupat ac præripit omnes lippitudines. Fa-
 cit ad obtusum uisum, & scabras affectiōes, ad e-
 rosos angulos, cicatrices exerit. Et quod maxi-
 mum est, post illitionē oculos imperturbatos cō-
 seruat. Cerusæ Rhodiæ drach. xlviij. cadmiæ cy-
 priæ drach. xxxiij. atramenti indici drach. viij. opij
 drach. viij. piperis albi drach. viij. aut vi. opobalsa-
 mi drach. viij. aut vi. gummi drach. xvi. cinnamo-
 mi drach. ij. alij xij. drachmas. aqua pluuiali excipi-
 to. Hermophili collyriū Thalasserum, accom-
 modatum ad suffusiones, & ad omnem hebetudi-
 nem uisus, facit & ad incipiētem suffusionē. Estq;
 odoratissimum pharmacum. Cadmiæ drach. xvi.
 atramenti indici drach. xvi. piperis albi drac. viij.
 æruginis drach. iiij. succi medici drach. iiij. opobal-
 sami drach. iiij. gūmi drach. xij. aqua excipe, utere
 cū aqua. tēperatura diuersa est iuxta affectiōes.

10 Pomponij Balsi. Facit ad incipiēte suffu-
 sionem. Cadmiæ drach. xxvij. atramenti indici
 drach. xvi. piperis albi drach. xij. succi cyrenacii
 drach. v. opobalsami drach. vi. spicæ nardi drach.
 vi. sagapeni 3. v. opopanacis drach. v. opij drach.
 iiij. euphorbij drach. i. cinnamomi drachm. unam,
 gummi drachmas triginta. fœniculi succo
 excipito. Indicum basilicon, id est, regium in-
 scriptum. Facit ad incipientem suffusionem, & om-
 nem uisus hebetudinem, cicatrices exerit. Cad-
 miæ ustæ & lotæ libram unam & trientem, atra-
 menti indici drach. vi. cerusæ trientem, piperis al-
 bi sex uncem, fel hyænæ integrum quantumque
 ponderis, fel scarorum decem, fel perdicum qua-
 tuor, succi papaueris unciam unam, opobalsami
 sextantem, opopanacis sextantem, sagapeni sex-
 tantem, gummi libram unā; excipe succo fœnicu-
 li aut herbæ Heracleæ appellata. Enstacton, id
 est insillatitium Paccij ut Themison. Cadmiæ 3.
 lxxiij. misyos drach. xxxij. atramenti sutorij drac.
 xxxij. stibij drach. xxxij. piperis albi drach. xxxij.
 opij drach. xvi. æruginis drachm. xvi. opobalsami
 drach. xvi. gummi drach. lxxiij. excipe aqua plu-
 uiali. Collyrium Chelidonium inscriptum.
 Cadmiæ drac. xlviij. stibij drach. xij. misyos drac.
 viij. piperis drach. xxxvi. atramenti sutorij drach
 mas sex, opij 3. sex, opobalsami drac. iiij. gūmi 3.
 xxxiij. excipe aqua pluuiali. Hieraciū ad obtusum
 uisum, & scabras affectiōes. Cerusæ 3. xvi. cadmiæ
 3. viij. opij 3. ij. gūmi 3. vi. excipe aqua pluuiali ac
 utere cū aqua. Aliud, Cicatrices & callos exerit.
 Cadmiæ 3. xvi. cerusæ 3. viij. piperis albi 3. iiij. æru-
 ginis drac. ij. opobalsami drach. ij. omphacij drac.
 duas, gūmi drach. quatuor: excipe aqua pluuiali.
 Collyrium fuluum panchrestum, ab omnimo-
 da utilitate inscriptum, accommodatum ad sca-
 bros & circumrosos angulos, ac intensos pruri-

nis, & palpebras scifofas. Cadmiæ drach. lxxx. A
 chalcitidis uftæ drach. xl. piperis albi dra. xl. gum
 mi drach. xl. aqua pluuiali excipito. In alio exem
 plari æqualis olium apponderatio habetur.
 Aliud, Cadmiæ drach. lxxx. chalcitidis uftæ drac.
 xl. piperis albi drach. xl. croci drachm. xij. myrrhæ
 drach. xij. gummi drach. xl. aquæ pluuialis quod
 fatis eft. Tryphonis orbiculare Sphæricum di
 ctum. Cadmiæ drach. xlvij. squamæ æris drac.
 xxxij. æris ufti et loti 3. xxxij. piperis albi 3. xxxij.
 opij dra. viij. myrrhæ 3. viij. opobalfami drachmas
 iij. gummi dra. xxxij. excipe aqua pluuiali. Col
 lyrium Gallii oxydoricum. Cadmiæ drachm.
 xlvij. chalcitidis uftæ drachm. xxiiij. piperis albi
 drachm. vi. squamæ æris drach. viij. opij drachm.
 vi. omphacij drach. iij. myrrhæ drachmas ij. opo
 balfami drach. iij. gummi drach. xij. piperis albi
 grana x. aquæ pluuialis quantum fufficit. Col
 lyrium aromaticum appellatum. Aëris ufti &
 loti drachmæ xvi. ærguinis drachmæ iij. myrrhæ
 drach. iij. opij drach. iij. piperis albi drac. iij. nar
 di drach. ij. croci drach. iij. opobalfami drach. iij.
 gummi drach. iij. aqua pluuiali excipito. Hera
 clidæ aromaticum croceum ex hæmatite. Aë
 ris ufti & loti drach. xlvij. cadmiæ drachm. xxiiij.
 croci drach. xxiiij. lapidis hæmatitæ drach. xxiiij.
 opij drach. xij. piperis albi drach. xij. gummi dra.
 xxxij. uino falerno excipito. Croceum Afclepi
 um oxydoricum. Aëris ufti drachmæ xlvij.
 croci drachmæ xij. omphacij drachmæ iij. opij
 drachmæ xij. myrrhæ drachmæ ij. opobalfami
 drachmæ iij. gummi drachm. xij. piperis albi gra
 na x. aquæ pluuialis quantum fatis eft. Collyri
 um Iochryfon, hoc eft auro compar, ad corrofos
 angulos, fcabras affectiones, inueteratas lippitudi
 nes, afpretudines, ficofas eminentes, cicatrices
 & callos exerit. Cadmiæ drachmæ vi. lapidis
 hæmatitæ drachmæ xvi. myrrhæ drachmæ xvi.
 croci drachmæ xxxij. piperis longi drach. xij. pi
 peris albi drachmæ xxxij. gummi drachmas lxiiij
 uini Italicij quantum fatis eft. Collyrium Cinna
 bari, celebris ophthalmici Stoli Britannici.
 Ad corrofos angulos, lippitudines ad malum ha
 bitum perductas, intenfos pruritus, & inuetera
 tas affectiones. Pforici drachmæ xxxij. cadmiæ
 drachmæ xxiiij. croci drachmæ xvi. piperis drac.
 xvi. cinnabaris drachmæ xvi. opij drachmæ xij.
 gummi drachmæ xxiiij. aquæ pluuiæ quod fatis
 eft. Aliud, Pforici drachmæ xxiiij. piperis
 drachmæ xxiiij. cadmiæ drach. xxiiij. croci drac.
 xxiiij. sandarachæ drachmæ viij. opij. drach. viij.
 cinnabaris drach. viij. gummi drachmæ viij. aqua
 pluuiali excipito. Melinum atarachum à per
 turbationibus amolendis appellatum. Facit ad
 omnem oculorum hebetudinem, & ad affectio
 nes antiquas, cicatrices & callos exerit. Cadmiæ
 drach. xxiiij. omphacij drach. xij. falis ammoniaci
 drach. iij. ammoniaci thymiamatis drac. xij. o
 pij drach. viij. gummi drach. xxiiij. cerufæ drach.
 xxiiij. croci drach. xvi. piperis albi drach. xxiiij. a
 qua pluuialis quantum fufficit. Lucij præcepto

ris Melinum. ad fcabros & corrofos angulos, intē
 fos pruritus, oculos humectos, ad omnē uifus he
 betudinem, cicatrices & callos exerit. Cerufæ
 drach. xxiiij. croci drach. xxiiij. ammoniaci thy
 miamatis drach. vi. falis ammoniaci drach. vi. nar
 di indicæ drach. vi. opij drach. vi. myrrhæ drac. vi.
 omphacij drach. vi. gummi drac. xxiiij. excipe a
 qua pluuiæ. Aliud collyriū Proteus cui nullum
 conferri potest. Facit ad incipientem fuffufionē,
 & ad omnem uifus obtufitatē, cicatrices & callos
 exerit. Cadmiæ drach. xx. chalcitidis crudæ 3.
 xl. cerufæ drac. xl. piperis albi drachmas xxx. fuc
 ci cyrenaici drach. xx. croci drach. xvi. opij drach.
 xij. lagapeni drach. xij. lachrymæ oleæ dra. xij. au
 rī pigmenti drach. viij. myrrhæ drach. xij. gummi
 drach. xx. opopanicis drach. xx. opobalfami dra.
 xij. Apparato cum aqua pluuiali ac utitor cum a
 qua Hygieni collyrium aureum. Ad corro
 fos angulos & fcabras affectiones. Sandarachæ
 drach. xxiiij. piperis albi grana xij. myrrhæ drach.
 vi. croci drach. vi. gummi drach. xij. cum aqua plu
 uiali apparato. Aliter aureum collyrium. San
 darachæ drach. xvi. croci drach. xvi. piperis drac.
 xvi. myrrhæ drach. iij. gummi drachmæ xij. ufus
 oftensus eft. Aliter, Sandarachæ drac. xxxiiij.
 piperis albi drach. xij. myrrhæ drachmæ vi. croci
 drach. vi. gummi drach. xij. aqua pluuiali excipi
 to. Eumeri pforicum. Facit ad corrofos an
 gulos, & fcabras cicatrices ac callos exerit. Facit
 & ad inueteratas affectiones, & lippitudines
 ad malum habitum perductas, itemq; ad afpretudi
 nes. Pforici drach. xxiiij. croci drach. xij. opij. ce
 rufæ, utriufq; drach. iij. piperis albi drach. iij. om
 phacij drach. iij. uino falerno excipito. Basil
 dion, hoc eft regineum pforicum. Pforici drac.
 xlvij. croci drach. xxiiij. opij drach. viij. floris lap
 dis alii drach. viij. cerufæ drach. viij. piperis drach.
 vi. opobalfami drac. iij. omphacij dra. iij. gummi
 drach. xvi. uino falerno excipe. Panchreftū A
 thenipion. Pforici drachmas lxiiij. croci drach
 mæ xvi. chalcitidis uftæ drachmæ xvi. sandara
 chæ drachmas xx. myrrhæ drachmæ viij. piperis
 albi drachmæ xvi. calfiæ fistulæ drachmæ viij. fo
 liorum malabathi drachmæ iij. opij dra. xvi. om
 phacij drach. iij. mifyos ufti drach. ij. gummi dra.
 xxiiij. excipe aqua pluuiali. Ptolemæi familia
 ris pharmacum. accommodatum ad fcabros &
 corrofos angulos, intenfos pruritus, defluuia pal
 pebrarum, hebetem uifum. Pforici drach. lx. fan
 darachæ drach. xxx. chalcitidis uftæ drach. xxiiij.
 croci drach. xxiiij. myrrhæ drachmæ xij. opij dra
 chmæ ij. calfiæ fistulæ drachmæ xij. piperis drac.
 iij. piperis albi drachmas vij. omphacij drach. vi.
 mifyos ufti drach. iij. foliorum malabathi drac. i.
 gummi drach. xxxvi. aquæ pluuiæ quantum fuffi
 cit. Collyrium Malabathi oxydoricum. facit
 ad corrofos angulos. Stibij drach. xxiiij. acaciæ
 drach. xxiiij. piperis albi drachmæ xxiiij. nardi in
 dicæ drachm. xij. opij drach. vi. croci drachmæ vi.
 omphacij drach. vi. gummi drac. xxxvi. aqua plu
 uiali excipito. Aliud, Stibij ufti & loti drach.

xl. acaciæ drach. xlv. nardi celticæ drach. vi. myrrhæ drach. viij. croci drach. viij. omphacij drach. vi. opij drach. vi. cadmiæ drac. xxxvi. gummii drac. xxxij. aquæ pluuiialis quod fatis est.

*Remediâ ad affectos oculos ab Archigene in primo pharmaco-
rum secundum genus conscripta. Cap. VIII.*

In fluxionibus circa oculos in principio conuenit cibi ac potus parcitas, aquæ potus, & maxime omnium rei Venereæ abstinentiâ. Aluus ipsa subducatur, & facies assidue primû multa frigida, deinde etiam aceto ammixto proluatur. Quidâ atramentum futorium aqua dilutum proluendum exhibent. Fugiant odores acres, et pulueres, fumûq;, & tum solis tum lucernarum splendorem. ad noctem lanas puras ex uino, aut sordidas ex aqua frigida imponant, maneq; uelut dictum est se proluant. Quod si augeat fluxio, accedatq; dolor, uenæ sectio congrua est, et perfecta cibi abstinentiâ ac sitis, nisi exurantur, & malû inde augeat. Conuenit & solutio uentris ualida, siue per purgatorium conueniens medicamentum, siue per clysteres robustos. Post hæc uero circa frontem imposita assidue, Vitis folia uiridia auxiliantur. Aut myrti, aut lentisci, aut rubi succus, aut brassicæ aut uitis folia cum flore farinae polentæ. Aut cupressus, samfucus, ocyimum, silymbrium, œnâthe, crocus hortensis, itemq; agrestis, portulaca, mali punici fatiui flores, cytini appellati, uitex, folia recētia mali cotoneæ, singula cû uinô & flore farinae polentæ. Super ipsos uero oculos lana pura uel candido madefacta imponatur, aut oui assilutei. Aut melilotum in passo coctum. Aut aphodeli radix cum uino & flore farinae polentæ. Aut iris contusa cum uino & flore farinae polentæ. Aut mali punici succus cum flore farinae polentæ. Aut ipsum malû in uino maris experte coctum. Aut iuniperi bacæ tritæ cum uino & flore farinae polentæ fronti imponantur, aut etiam super ipsos oculos adhibeantur. Ad hæc uero eryngij & fœniculi syluestris radix trita ex aqua, & cicute semē eodem modo apparatus, opitulatur. Caseus itē mollis & nuper saluus cum apij folijs cataplasmatibus modo impositus. Aut papauer syluestre passo coctum ac tritum impolitû. Similiter & melilotum passo coctû, modico croco & papaueris succo ammixtis. Panis item ex uino, rosaceo ammixto mirabiliter auxiliatur. Aut tribulum recentem per se imponito: imò & polenta ammixta egregie opitulatur. Et ut summam dicam omnia ex adstringentium genere & repulsoria in principijs profunt, uelut est cicuta, & psyllium, apium, solanum, lentes palustres, serpyllum, samfucus, folia uitis, coriandrum, portulaca, semperuium, folia papaueris, urtica. Quæ singula ex uino trita imponantur: psyllium uero ex aqua, eodemq; modo palustris lenticula.

Ad fluxionem calidam. 2

Brassicam tritam cum polentæ flore ex aqua imponito. Aut ocyimi folia eodem modo. Aut rutæ folia cû adipe anserino, aut samfuci folia. Aut halicababum tritam. Cæterû largum fluxû sistunt

A papaueris capita, & hyoscyamus cum posetæ flore ex uino. Oportet autem fomentum prius adhibere, atq; ita imponere. Postquam uero fratus & uigor præterierit, & quum non amplius oportunitum est adstringentibus uti, non incommodum fuerit, tum oculorum, tum capitis fomenta adhibere. Magnifice uero auxiliatur, inflammatio, nesq; soluit, & si qua distictio adfit eâ laxat, linteolû molle butyro madefactû ac oculis superpositû.

De chemosis, hoc est utriusq; palpebra distortionem ex inflammatione oborta. 3

In quibus uero chemosis fortis contingit, Ouituteum cum muscæ carne terito, atq; ubi ad cerati formam deducta fuerint, linteolo excepta impone, confestim sedant.

Oblitiones oculorum. 4

Panis purus uetus acacia & hederâ cum aqua permixtus. Verû ad doloris uexationes rosas uirides aut aridas passo maceratas terito, et ammixto oui assiluteo, ac croco sufficienti, cum passo utitor. Aut crudam hordeaceam uel triticam farinam passo coctam adhibeto. Si uero maior dolor fuerit papaueris folia recētia ammixceto, aut corticem papaueris capitum. Aut hyoscyami folia drachmarum iij, pondera cum oui uittello. Aut silymbrium aqua coctum sufficienti affuso uino, & imponito. Aut papaueris albi capita passo cocta ac trita imponito. Aut opij recentis coma itemq; pulegij recētis similiter utitor. Aut penonis aut cucumeris carne. Aut oui assiluteum cum modico croco ac uino tritum imponito. Cæterû dolētes ex inflammatione oculos cû panace & pulegio uino subactis integito. Præclare facit & pini cortex & polenta cum uino. Aut hyoscyami folia & opium trita imponito. Aut papaueris cortices terito, rosisq; ac meliloto myrrhæq; ammixtis, albumine oui diluito, atq; ita imponito. Aut aloen ac opium cum aqua diluta linteoloq; excepta imponito, uitando ne quid in oculû præterlabatur. Cæterû in his qui dolore uexant crocum bonum cû lacte instillato. Verû ad uehementes doloris molestias, Coriandri succus cum muliebri lacte oculis instillatus, Similiterq; papaueris succus torrefactus, auxiliatur. Folia item platanitrita cum farinae polentæ flore oculis superne imposita. Cataplasmata uero in fluxionibus conueniunt, Cupressus uiridis cum uino, aut palmi folia. Aut portulaca trita cû adipe anserino & croco. Aut iris sicca cû melle. Aut micæ thuris & myrrhâ cum oui candido lana excepta fronti imponito. Aut apium cum polenta, aut seselis flores uino maceratos imponito. Aut papaueris folia recētia adglutinato. Quod si uigiliæ instent, Man dragoræ radicē & succû, papaueris folia, & polentâ æquis partibus in massam cogito, eamq; odorâdam exhibeto, & obdormiscunt. Porro in magnis fluxionibus pulegij recentis semē, & maxime succû, cum aceto ad malagmatis formâ redigito, ac sincipiti imponito, lanis superne additis, ac leni uinculo cōstrictis, Aliqui etiâ papauer recēs ei ammixcēt, aut opij minimû quid, aut rosas, aut melilo.

melilotum coctum. Aut amylo ex uino cum oui candido oculos ipsos integito. Præclare faciūt ad fluxionem uberem, tenuem, ac uetustam, itemq̄ plicera, pompholygis drachmæ iiii. opij torrefacti ob. iij. gummi drach. iiii. aqua pluuiali aut fontana excepta.

Agglutinatorium ad fluxionem. 5

Similaginem & manna thuris dimidium eius, tum oui albumine ad emplastri formā redigito, & in principio fronti in linteolo imponito. Aut oui tenuis uisellum cum thure. Aut cochleam cum testa sua & oui candido ad strigmentitiā formam redactam in splenio à tempore altero ad alterum extendendo imponito. Sua sponte decedit, ubi restiterit fluxus. Aut Moschi malagma, aut barbarum emplastrum, aut uiride, aut aliquod aliud eorum quæ aceto constant, splenio inditum fronti imponito.

Ad hemalopis & hypophagmatas, id est eruentas oculos, & sugillatos. 6

Ad plagas oculis illatas, & ad oborietes ex eis eruentas suffusiones, statim in principio tum ad inflammationem, tum ad dolorem compescendum, facit columbinus sanguis instillatus, & præsertim is qui ex teneris pennis exprimitur. Candidum etiam oui eodem modo in oculum instillatum, atq̄ amplius pura lana exceptum et superne impostum. Prodest etiam oui asii luteum cum uiridibus, aut melilotum coctum cum uino eodem modo. Insuper & folia rosarum ac flos per se & cum uino trita, itemq̄ cum flore farinae polente. Aut brasiæ folia in cataplastmate. Vbi uero diuini cruentatio persistit, cum thure & bitumine equis portionibus acceptis ac mixtis oculum suffito. Aut hyssopi comam tritam lineo paniculo illigatā in feruentem aquam demittito, oculoq̄ admoueto. Sequit̄ enim cruor, adeo ut ex linteolo cōpresso exprimi queat. Aut nitrū & terram Aethiopicam, ac myrrhā pari pondere cum aqua illinito. Aut foliorum olea uiridū succum sublinito. Aut ammium & hyssopum cum lacte bubulo terito, agitato, ac sublinito. Aut semen linitritum cū butyro per linteolum exprimito ac sublinito. Caput uero frigida perfundito.

Curatio tumorum. 7

Ad tumores ex plaga circa oculos obortos, ualde conuenit fomentum per mollem spōgiam asidie factum, ita ut spōgia postea aceto diluto madefacta imponatur. Conuenit in super sinapi uetus sum ex aqua tritum, asidie circumpositū & ablatum. Similiter & nasturtium, si post eorū ablationem loci asidie calida aqua foueantur.

Ad oculos scabros. 8

Ad oculos propter solem aut omnino puluerē scabros atq̄ aridos propter solem, aqua multa æstate quidem frigida, hyeme uero calida affusa commodat. Conuenit & spongiæ calida, aut lentis decoctio, imbuta fomentum. Ipsis uero oculorum angulis rubi, lentisci, myrrī, rosarum succum, unumquemq̄ per se cum aqua adhibeto. Aut rosas aridas tritas cum uino, aut earum florem. Aut uis-

num maris expers ac oleum uetus maxime ubi dormire uoluerint admoueto. Conducit præterea his ut à fallis, acribus, ampliūsq̄ acidis omnibus abstineant. Porro ad inueteratas & callosas circa palpebras affectiones, amurcam coctā cum oleo tritam illinito.

Ad eos qui crassas, callosas, ac rubras, glabrasq̄ & pilis nudatas genas habent, pillos græcis dictos. 9

In his qui crassas pallosas, ac rubras, & glabras palpebras siue genas habēt, quæ pilis exuta sunt, egregie facit, ac pilos producti hoc medicamentum. Acaciæ drach. ij. atramenti librarij aridi, aut si fieri potest mephitici drach. v. succi porri heminas iiii. Vini maris expertis heminas iiii. Coquito donec strigmentitiā formam induant, & repositis in pyxide utitor. Aut muscerdas & caprarum sterora uisita pari mensura, cineris calamigræci duplum, cum melle attico illinito. Hoc uero etiam palpebrarum defluuia emendat. Aeruginis trita partem unam, ammoniaci thymiamatis tantundem, trita adhibeto. facit idem & egregie ad scabros oculos. Aut cadmiam tritā melle subactam in ollula urito ac afflato, deinde aris uisita tantundem ammisceto, ac tritis utitor.

Ad pilos inuiles & pungentes in palpebris enascentes, Triachias in hoc malum græci appellant. 10

Pilos inuilerit in palpebris superna scætes euellito, & sanguiniter cimum illinito, et non enascetur. Papias Laodicensis Autolyci medicus multa in his tentabat. euellebat primum ipsos pilos, deinde locum diligenter cum dropace irritabat, & cum chamæleone albo trito uiridium ranarū sanguine permixto (Sunt autem ranæ quæ in harū dinibus degunt) illinebat. Neq̄ enim postea enascunt̄. Potes & euulsis prius pilis cedriam cū Tellinarum cinere mixtam ac tritam illinerē. Ad eandem quoq̄ rem auiculæ cinædi appellatæ felle utitor. Aut pagri marini piscis itidem felle. Aut rici nī ac cane fœmina adempti sanguine. Egregie facit hoc, Fellis & sanguinis herinacæ terrestris partes, fellis chamæleonis tantundē, castorij parum. Ad formam squamularum piscium reducito, & pilis radicibus euulsis utitor, squamulam unam oris saltūa matutina dilutam illinendo, locumq̄ ad dimidium horæ obligando. Dolitant e quidem ex medicamento huius usu, sed pili amplius non enascunt̄. Aut felle hyanæ fœminæ mox ab euulsione illinito. Aut tellinarum tenuissimā puluerem oblinito. Aut euulsis pilis, cicutæ folium, & cedriam æqualibus partibus cum uespertilionis sanguine illine, illitūq̄ donec exarescat tepie. Si enim hoc oculum cōtingat eius humorem corrumpit. Aut ab euulsione, capræ fel cum brasiæ succo illinito. Aut capni siue fumarie herbe succo palpebræ alam siue summitatem illinito: deinde pilos euellito rursusq̄ illinito. Testatus est & Hermias spumam aquæ post dropacum adhibitionem illitam summe conducere.

De Staphylomatibus siue uis, & Albuginibus. 11

Staphylomata tolles cantharidum succo illito. Albugines uero cito sanar nitrū cum oleo ueteri diligenter

diligenter tritū & illitū. Aut lacertæ sterco illine & tolles. Aut Nycticoracis ouū illine, & tinges ipsas. Aut croci, piperis, æquales partes cum felis felle in collyria formato ac illinito. Aut sepia testam tritam melle subigito ac urito, & leuigato postea pharmaco hoc sublinito.

Curatio obfuscationis uisus & suffusionis. 12

Obfuscationem omnem aut etiam incipientē suffusionem persanat omne fel cum marrubij succo ac melle Attico. Aut myrrha & piperis partes æquales cum melle. Aut solanum nigrum illine. facit & Cyprus in ærea pyxide reposita. Aut fœniculi succum, & fel taurinum liquidum paribus partibus, mellis atticī duplum illinito. Aut croci & piperis æquas portiones felle taurinō excipito, atq; in collyria formato, ac illinito. Aut populi nigra succū cum duplo mellis Atticī illinito.

De humorum suffusionibus. 13

Fellis testudinis marinæ partem unam. mellis Atticī quadruplum illinito. Fel ipsum etiam per se sufficit cum aqua illitum.

Ad Pterygia. 14

In pterygijs oculorum atramenti futori, salis ammoniaci, æquales partes, gummi dimiditum, cum aceto in collyria formato ac illinito. Aut po-

puli nigra succum, cum duplo mellis atticimixtum ac tritum illinito.

Ad glaucos oculos & Nyctalopas, hoc est lusciosos. 15

Solani succus instillatus glaucos oculos denigrat. In lusciosis uero hepar hircinum assato, ipsumq; inter assandum destillantem cruorem colligito, eoq; ipsos illinito, ipsum uero hepar edendū præbeto. Auxiliatur & columbinus sanguis illitus, & fel capræ. Aut hepar caprinum coquito, eosq; obuelatos in ollam intedere iubeto, quo elatum inde uaporem oculis susceperit. Ipsum uero hepar assidue edendum dato, Ex hoc enim cito auxilium sentient. Aut elaterij obolum, seminis portulacæ drachmam i. cum melle inunge.

Aut sterco Alini recens exsuccato ac illinito. Vescatur æger beta, uulturis iecore assato, eiusq; felle illinatur.

Ad Cribas instar hordei oblongos circa palpebrarū pilos abscissos, qui item pŏsthiæ Græcis appellantur. 16

Abcessus circa palpebrarū cilia cribas ab hordei similitudine Græcis appellatas, ceræ albæ fomento discuties. Aut muscæ caput auellito, ac reliquo corpore abscissum ipsum confricato.

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI V

Cap. I. Dehypopio, id est fugillatione sub oculis. 2. Archigenes ad fugillata. 3. Apollonius ad fugillata recentia ac liuida. 4. Inueterata. 5. Cum tumore. 6. Cum inflammatione. 7. Cum percussione. 8. Crito ad fugillata recentia. 9. Ad liuores & fugillationes profundas. 10. Heras ad fugillata.

11. Idem ad ægilopas. Vide sequens caput. III. De ægilope: Vide circa finem præcedentis capituli. 2. Archigenes ad ægilopas. 3. Asclepiades. III. De uariis. Vide cap. 7. sect. 2. & 3. IIII. De ficosis tumoribus. Vide cap. 7. sect. 11. & 13. V. De lichenosis in mento tumoribus: Vide cap. 7. sect. 6. & 7. & 8. & 9. & 10.

VI. De menti eruptionibus. Vide cap. 7. sect. 5.

VII. De furunculis. 2. Ex Critone ad uaros. Vide cap. 3. 3. Ad uaros callosos. 4. Ad affectiones eminentiores, & in facie pruritus, ac principium elephantiasis. 5. Ad ficosas menti papularum eruptiones. VI de cap. 6. 6. Ad lichenes in mento. Vide cap. 5.

7. Ad recentes in mento uel alia faciei parte lichenes: Vide sectionem præcedentem: & superius cap. 5.

8. Emplastra lichenica, quæ citra exulcerationem liberant. 9. De excoriatorijs lichenum. 10. Excoriatorium Menecratis. 11. Archigenes ad papularum in mento eruptiones, & ad ficosas eminentias. Vide supra. cap. 4. & 6. 12. Ad capitis & menti ficosos tumores, & alibi etiam eminentia ulcuscula. VIII. De dentium affectionibus. IX. De gingiuarum curatione. 2. Archigenes ad dentium dolores. 3. Apollo

nus. 4. Archigenes de remedijs perforatorum dentium cum dolore & absq; dolore. 5. Apollonius quæ quibus locis scribat: quorum tamen nihil addit, nisi errhina sectione. 6. 7. Erosi dentes ne uacillent, neq; foeteant. 8. Ad dentes denigratos. 9. Asclepiades ad dentes, motos, dolentes, erosos. 10. Emplastra.

11. Ad tollendos dentes ut citra dolorem excutiantur. 12. De mobilibus dentibus ac prominentibus.

13. Archigenes ad roborandos mobiles dentes.

14. Ad debilitatos dentes, tum alios, tum molares.

15. Archigenes de dentitione puerorum. 16. A muleta ad dentium dol.

17. De doloribus gingiuarum. 18. Quæ dentes præserunt. 19. Andromachus ad omnes dentium dolores. 20. Ad dolores dentium, gingiuarum, aliaq; multa. Ad dentes motos.

21. Ad erosionem & dolorem dentium. Ad gingiuas madore laxas. 22. Ad motos dentes, gingiuas humore grauidas & subcorruptas. Ad dentium dolores. Ad dentes corrosos. Smegma gingiuas contrahens. 23. Critonis ad omnes dentium affectiones remedia: quorum quædam etiam gingiuis conferunt, & ad factorem oris, & nigros in superficie dentes. 24. Molares compositiones: item ut dentes sine dolore tollantur, uel ut digitis eximantur: Ad perforatos. 25. Dentificia. 26. Ad mobiles dentes: & alia dentificia. 27. Dentificiū Damocratis. 28. Aliud Aurelij. 29. Pharmacum dentes præseruans.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

PHARMACORVM SECVNDVM LOCOS, LIBER V.

De Sugillatione sub oculis hypopion Græci dicunt. Cap. I.



VOD hypopion sub oculis fit, nomē ipsum indicat. Idem em̄ est uelut si quis hypophthalmiū dicat, qđ ipsum sub oculis sonat. Est autē ex genere effusionū, ecchymomatū appellatarum, Appellant ita Hippocrates et alij multi Medici circa cutē affectionē, quā tenuibus in ipsa uenis cōtulis, sanguis per fissuras effundit̄, non uno loco acruatim ac statim ita excretus in grumos coit̄, sed postq̄ per persultationē, hoc est diapedin, ut ipsi appellāt, effusio ipsa facta est, cōtingit sanē aliquādo ubi ita coierit, tēporis progressu liuescere & denigrari, paruis nimirū grumulis ex disperso in multas cutis partes sanguine coactis. Quare meritō ad eius curationē statim festinat̄ medici priusquā denigrescat, scopū medendi habētes ut sanguis discutiat̄, quum sciāt id quod in grumos coierit ex sanguine, ægerrius discutī posse. Quū uero tunricula uenarum ex quibus sanguis exilit rūpatur, parum quiddam ex adstringētibz ad discutientē admiscetur. Si enim ex sola simplici facultate disculforia pharmacum a principio adhibeatur, nō solū quod effusum est discutiet, sed & per fissuras aliquid attrahet ex sanguine in contulis uenis cōtento. Postq̄ uero in suam naturam redierint uenulæ ad disculforia pharmacum citra adstringentiū ammixtionē oportune trāsimus. Quemadmodum autē in alijs affectibus pleriq̄ medicorū in distincte auxilia conscripserunt, Ita etiā in his citra eas quas iā recessiui distinctiones, simplices Sugillatorū remedia prodiderūt. Porro si uis eorum quæ in libris de simpliciū pharmacorū facultate didicistis, memores fueritis, facile discernere poteritis, Quasnam sugillationes sola discussione digerere oporteat absq̄ adstrictione, & in quibus ammiscere conueniat quippiam ex modice adstringentibus. Quin & ex ipsis disculforijs imbecilliora primū adhibēda esse manifestū est: fortiora uero inueteratis & denigratis ad mouenda. Exempli itaq̄ loco primū ea quibus ipse uitor indicabo, Inde ad ea quę probati medici tradiderunt progressurus. Appellatur autem collyrium Nisi ex rosis diarodon, multis iā annis præclarum & celebratum, cuius compositionem proximo libro tradidī, hoc ipsum in oculariorum cotricula ex aqua cōtēro, atq̄ sugillationi illino, ferulæ campanæ ac fœni græci decocto prius pro fœmēto admoto, deinde etiā collurio ex eo decocto dissoluto: postea etiam ex ipsius solius fœni græci decocto. Quod si reliquæ quæpiam affectionis resistāt, in fœni græci decocto collurio ex myrha, diasmyrna appellata, soluo ac illino. Conducit autē bis in die pharmacū hoc illinere, simulq̄ fomentū decoctorum calidorū per mollem spongiā prius ad mouere, ita ut primū ex ambobz fœ-

nogræco & meliloto decoctū fiat, inueterato autem malo, ex solo fœno græco. Hic curandi modus ut plurimum perfectē sugillata perferat, paucis omnino subterfugientibus eumq̄ respuentibus, in quibus collurium ex sandice commodum est, & ex pharmacis ad sugillata à medicis scriptis ea quę generosē discutientiū uim habent. Initium autem faciam ab eis quæ Archigenes in primo pharmacorum secundum genus conscripsit, præpositurus quidem ipsius uerba: postea uero si quid ab eo ad discutientem pertinens relictum est, appositurus.

Archigenis pharmaca ad sugillata, iuxta ipsius dictionem. 2.

Sugillata euestigio sanat raphanus impositus, auferes autē ipsum postq̄ mordere inceperit. Recte fecit in eo quod adscripsit, tollendum esse ubi mordere coeperit: si em̄ diutius maneat, uenulas contusas cōmordendo, oscula ipsarū aperiet, quæ propter & a principio eo utendum non est. Vbi uero inueterata fuerint sugillationes & iam denigrata, etiā si quis longiori tēpore incūbere ipsum sinat, magis iuuabit. Facit & caseus recens saluus impositus. Ipse quidem caseus uim obstruēdi meatus habet, uerum recens saluus & nondum inueteratus, mixtam facultatē habet, obductricē ex seipso, disculforiā uero & aliquid adstringētem ex sale, quare nihil absurdū est eo etiā in principio uti. Aut ceratum cum absinthio uel raphani succo subactum. Aut hyssopi coma leuigata eodem modo. Sicut cum absinthij coma trita, siue cum succo ceratum subactū adhibeas, eandem uim demonstrabit, Verum ad tactum mollius redetur pharmacum si succus cum cerato cōmmitatur. At uero raphani succus, aut hyssopum cerato addita, efficacius reddunt pharmacū, q̄ ut a principio statim adhiberi conueniat, nisi iā planē liuida aut nigra facta sit sugillatio, quod etiā ipse deinceps dicit. Summe facit ad recentia & liuida sugillata, Spongia muria tincta & assidue imposita ac ablata: postea uero fomentum assiduum ex calida aqua prodest. Quemadmodum raphanus in principio uti minime tutum est, ob eā quam dixi causam, Sic etiā muria: quapropter etiā post eius usum, calidæ fomentum probat, quo uidebitur a crimonia ex muria inducta cōpescatur. Neq̄ uero in omnibus sugillatis fomento ex muria uti consuluit, sed in his quę statim liuescunt. Modico itaq̄ tempore in his muria utēdum est, in quibus uero cruentus, aut subflauus, aut subpallidus est color, fugere muriam oportet. Cataplasmate autē utere faba fresca contrita, absinthio, hyssopo, origano, raphani cortice, uua passa exacinata, unoq̄q̄ perse cum melle, aut aceto, aut aqua. Imperfecte primum hæc remedia conscripsit, quum non apponat ad sermonem, coctisne an crudis uti iubeat faba fresca, & absinthio, & hyssopo.

Uidetur autem crudorum usum præcipere. Porro ad finem ubi dicit, cum melle, aut aceto, aut aqua

aqua, singulis prædictis utendum esse, neq̄ tum quidem coctis addidit. Quin & eo ipso sermone tria inæqualia medicamenta tradens, minime recte mihi uidetur, cum hoc uel illo utendum esse præcipere. Aqua enim acrimoniae omnis expertissima est, non in cute tantum, sed ipsi etiam ulceribus. Mel uero ulceribus mordax est, cutē autem non offendit. Acetū uero utriusq̄ mordax existit. Neq̄ uero raphani cortex uua passā uiribus par est. Sicut neq̄ absinthium, ac hyssopū & organum. Fortia enim hæc sunt & discussoria uipredita. Moderata autem est uua passā & omnis acrimoniae expers. Et bulbūs albus cum ouo & melle. Bulbū flauum ut acriorem in principio statim adhibere recusat. Scimus autem mel discussoriae facultatis esse, quapropter ouum ipsis ammiscere uidetur, quod mitigandi facultate multum præstat. Cyclaminus per se, & cum uua passā. Neq̄ hic modicum est quod interest inter cyclaminum & uuam passā, Quare haud scio qua ratione per se cyclamino utat̄, & ammixta uua passā, per se enim fortissimum est medicamentum. At ammixta uua passā, tātum auferet eius facultatis, quanta fuerit ammixta uua passā moles. Aut nitrum cum hyssopo & uua passā, melle exceptū.

Hic sermo priore rectior est, in quo etiam solius cyclamini usum permittebat, Nam si etiam nunc hyssopum ipsum per se adhibere consulisset, nō apponendo inueteratis fugillationibus id conuenire, similiter utiq̄ deliquisset. Myrtum cum sale & aqua. Dicitum etiam antea à me est, quod ex discussorijs medicamentis in principio præstantiora sunt, quæ modicam adstringendū uim complectuntur, Qualia sunt rose, & melilotum, & crocus. Non tamen ex eiusmodi pharmacorum numero est myrtus, ut pote uehementer adstringens. quapropter ego nunquam ipsā uti audeam, præsertim si iam liuidus sit color fugillationum. Sinapi cum adipe ouillo. Inueteratis & nigrefactis fugillationibus solum, hoc medicamentū cōuenit, & maxime si non omnino modicum sit sinapi adipi ammixtum. Myrica folia & fructus trita cum aqua, per se & simul mixta. Et hoc pharmacum non solum discussoria, sed & concoctoriam quandam uim habet, quare inueteratis & nigrefactis fugillationibus non conducit. Facit & spongia, & linteolū, aceto ac melle imbuta, & appolita. Hoc remedium in principio adhibetū, non ualde acri aceto opus habet: in progressū autem temporis liuefacta aut denigrata fugillatione, nihil profuerit absq̄ acerrimo aceto præparatum. Aut fabam fresam commanducatam imposito cum melle. Quin & fabæ lomentum, etiam extra manducationem, cum melle subactū liuida discutit. Ex manducatione autē summe discussorium redditur, nimirum uiribus à salua adsumptis. Oui uitellum eodem modo. Si mel ad ouū uitellum misceuerimus, uelut ante dixi de faba fresca, simile faciemus prædicto medicamēto, tum in apparatu, tum in facultate. Aut porci pulmonem calidum imposito, Hoc remedium non tole-

rari uir mundiciem amans. Aut myricæ decocto prole. Non ita longe ante de myricæ facultate dictum est. Aut cardamomū cum myrrhā impone. Discussorium quidē pharmacum est myrrha, uerum acere cardamomum. Hæc sanē sufficere uidentur mihi ex Archigenis scriptis exempli gratia prolata, ostenso simul modo examinandi pharmaca, Qualia scilicet in principio conueniant, ante quam liuida aut nigra fugillatio fiat, & qualia liuidis, aut iam nigrefactis, & inueteratis sint adhibenda. Quare quæ consequantur apud eum deinceps, ea sola per se adscribam, ipsius Archigenis uerbis. Aut ceruse & spumæ argenti æquales partes cum melle terito, & ammixta faba fresca ad cerati formam reducto, ac uitox. Aut anguim senectam cum aqua marina trita illine. Aut cuminum linteo illigatum in feruenti aqua tinctum pro fomento adhibe. Aut sinapi cū cerato impone. Aut feniculū tritū impone. Aut thus & thapsiam æquis portionibus cum rosaceo cerato. Aut mentam & argenti spumam pari pōdere impone. Aut ordeaceam farinam cum aceto mulsō coctam. Aut fabam uino maceratā donec dissoluatur, trita splenis modo impone. Aut cicer eruinum uocatum eodem modo. Aut furnorum fuliginem cum pari cerusa ex uino odora to illine. Aut thapsiam & eruinae farinæ tertiam partem eodem modo. Aut salnam thunni carnē, omotarichon Græci uocant, exprimito: deinde in uino odoro tritam imposito. Cæterum ad uentrosiores fugillationes Smilacis fructus cum uua nigra tritus facit. Aut thapsiæ radix tusa, & succo eius adipe excepto, ac assidue apposito. In uentris exemplaribus non uetustiores comparatiue scriptū est, sed uetustissimas superlatiue. Dicitum est porro à me statim in principio, quod in eiusmodi fugillationibus, pharmacis forti discussoria uipræditis uti oporteat, qualia sunt sanē ab eo his uerbis descripta, & quædam item ex superioribus uelut est indicatum. Atq̄ hæc quidem Archigenis prodidit. Verum Apollonius diligentius & cum pluribus distinctionibus, in primo parabilem in hunc modum scripsit.

Pharmaca ab Apollonio descripta, ad sugillata recentia, ac liuida. 3

Spongiam in aqua marina feruente tinctā assidue locis pro fomento adhibeto. Aut spongia in acri muriā tincta similiter foueto. Idem facit si feruenti aceto, & uino imbuatur. Imponendum est & splenium melle & aceto madefactū, aut lana, aut spongia. Cataplasmate autem utere, Absinthio trito cum melle, faba fresca eodem modo. Organum similiter. raphani cortice cum melle, Bulbis tritis per se, aut cum melle & ouū uitello, Stiphio trito cum oleo & uino, Samsuco trito cum melle, Myrto & sale tritis cū aceto, feniculo trito cum cerato, hyssopo & nitro cum melle & aceto, calce uua cum cerato, Sinapi trito cum adipe uitulino, aut cum cerato.

Ad sugillata inueterata. 4

Aut radicem rasam ac melle subactam in linteum

lum silitam imponito, utere etiam discussorijs facultatibus & compositionibus, quæ ex descriptionibus commentariorum apparantur.

Ad sigillata cum tumore. 5

Spongiam aceto imbutâ imponito, et præmonstratis fomentis frequentius utitor, cataplasmaticis loco farinâ ordeacea ex aceto mulso coctâ imponito, donec locus sigillatus humilior reddat: de cætero uero subscriptis cataplasmaticis utitor.

Ad sigillata cum inflammatione. 6

Aqua calida foue, & pro cataplasmate lentocleam coctâ tritam cum melle impone. Et cochlear ægyptiâ contrusam impone. Vbi uero inflammatio remiserit, tunc ita etiâ alijs pharmacis utere.

Ad sigillata cum pertusione. 7

In ipsam quidem pertusionis fissuram ex medicamentis quæ cruentis uulneribus cõuenienter inde circumlitis uero partibus cataplasma ex medicamentis ad sigillata citra pertusionem conscriptis impone. Præstabat fortassis hic iam feromonem de sigillatis desinere, Verum quum ea quæ ex consensiente experimento iudicata sunt, alijs stabiliora existant, uisum est mihi etiâ ea quæ Crito in tercio de Omatu scripsit apponere, quæ sanè iuxta illius dictionem ita habent.

Quæ Crito ad sigillata recentia medicamenta scripsit. 8

Cicutam tritam ex aqua impone. Ablinthium tritum ex aqua, & in lintheolum infarctum imponito: quod si tenera sit cutis, parum mellis adijcito. Hyslopum ciliicium ex aqua tritum, & in lintheolum ligatum, in globulos cogito, cum quibus his in feruentem aquam incensus sensim foueto. Bryoniæ radicem tritam cum melle imponito, aut rosaceo cerato exceptâ adhibeto. Muriâ acrem facito, spongijsque in ea madefactis foueto. Et post hæc raphani corticem tritum cum melle, & lintheolum infarctum imponito. Aut sinapi tritum cerato exceptum, & modico adipe uutilino addito, in lintheolum infarctum imponito. Et de his quidem intantum. Quod si inueteratæ sint sigillationes, aut etiam appellati liuores, subscriptis compositionibus utendum est.

Ad liuores & sigillationes profundas. 9

Tordylii partes ij. terræ samia partem i. aceto excipito, modicumque mellis simul conquassato. Animaduertere autem oportet diligenter ne cutis exculceretur. Medicamentum de terentis sigillata, Aristarchi. Hyslopi ciliicij drach. i. radices thapsiæ tantundem, thuris integri non secti tantundem. ceræ syrhenicæ drach. ij. resinæ terebinthinæ drach. i. arida cum liquescibilibus committere, deinde lintheolo infarctâ imponito, animaduersione habita ne locus exculceretur, & ob hoc sanè frequenter tollerere oportet. Aliud, Radicis thapsiæ drach. xij. aut succi drach. vi. thuris infecti drach. viij. ueratri albi drach. ij. ablinthij drach. i. cerati rosacei drach. xvi. mollita reponere, ac lintheolo infarctis utere. Oportet etiâ hoc assidue amouere. Aliud, Viticis albæ obol. iij. struthij tantundem, glandis Aegyptiæ tantundem, pulmonis caprini usti tantundem, radice asparagi tantundem. bdellij tantundem, succi thapsiæ tantundem. aceto mulso exceptis utitor.

Galen.

A Aliud, Seminis uiticis albæ drach. iij. radice struthij tantundem. nitri rubri tantundem. succi raphani tantundem. hyslopi ciliicij tantundem. farine farbarum tantundem. glandis ungentariæ drach. xl. myricæ drach. xl. pulmonis caprini usti drach. xl. bulborum rubrorum drachm. xl. radice thapsiæ drach. xl. thuris drach. xij. excipie cerato rosaceo, ac utere ut dictum est.

Medicamentum ab Hera conscriptum ad sigillata. 10

Aufert, ut inquit Heras, tribus horis: quod si in flammatio fiat, cataplasma ex uiridi cafeo probat, et fomentum ex pane. Succu citræ obol. ij. croci drach. ij. myrrhæ drach. i. acaciæ drac. i. opij drach. ij. succi thapsiæ drach. ij. gummi drac. i. cum aqua cogito. Hoc equidè Heras scripsit. Ego uero nucem per ætatem iam oleosam factâ expertum sum aliquando ad cruentatos facientem. Oportet autem ipsam nucem diligenter terere, atque ita imponere homini supine reclinato, quo ad horas duas & tres pharmacum adherenti ubi enim sic fecerit, etiam si postea surgat, ad multum tempus adhæret, oportetque priore delapso aliud statim imponere.

Eiusdem Heræ ad ægilopas. 11

Maluæ folia cum sale & melle trita imponito, de struit hoc ac extirpat ægilopas. Alicæ etiâ in aceto coctâ incipienti ægilopi imponito. Aut myrti recentissimas baccas cataplasmaticis modo adhibe, ubi uidelicet fluxio infestauerit. Similiter facit & Iemnia terra si sillinatur.

De Aegilope. Cap. II

C Inter nasi os & magnum iuxta oculum angulum, paruum quoddam abscessum simile tuberculum oriri solet, & rûptur sanè sæpe in angulum, ut ægre curabile reddatur, nisi mature occurrat. Mederi igitur oportet ipsi cum discussorijs medicamentis quæ citra mordacitatem efficacia sunt. Coaffici enim oculus ab acribus, atque ita etiâ affectæ partis inflammatio augetur. Verum affectio ipsa non ob id solum egre curabilis est, sed & propterea quod quum multa liquida pharmaca in experimentum adsumi possint, ea non tolerat locus ipse, necessariò enim ex eis in oculum quid influit. Neque uero adhæret eiusmodi queant citra obligationem adque totum oculum complectatur, quam impossibile est tot diebus aliquid perferre posse, quot ad mali curationem requiruntur. Ob hanc igitur causam Apollonius nulla pharmaca ad Aegilopas scripsit, Archigenes uero paucis enumeratis, deinceps ad curationem ipsorum per chirurgiam progreditur, quancumque res ipsa non manuarie operæ, sed pharmacis secundum genus sit subiecta, itaque totam ipsius dictionem describam hoc modo habentem.

Quæ Archigenes ad Aegilopas scripsit in primo pharmacorum secundum genus. 2

D Aegilopas quæ circa oculorum angulos oriuntur eruo cum melle integimus, aut cinere utis cum aceto subacto. Probe facit & thus cum columbino stercore recenti impositum. Aut succum herbæ ægilopis, aenam nostri dicunt, cum melle silline. Cæterum in nondum perforatis staphidem syluestrem, & ammoniacum thymiama cum melle

tom. 5

C

ueluti

ueluti splenium impone. Aut alumē scissile cum terebinthina splenij forma impone. Aut lana tormentum sanguine marini leporis tinctum inde. Aut melanterioram tritam adhibe. Quod si nec sic sanetur, diuiso angulo, & cum tenui perforato terebello cōtinuis foraminibus inculsis disparato, capitale emplastrū adhibeto, & discedent em squama, & sanabuntur. Aut osse denudato cauterium admoue, & sic squamulae discedunt ac sanantur. Quidam diuidentes angulum ofsi qua parte perforatum est angustum infundibulum admovent, ac plumbum liquefactum infundentes urunt, atque hoc modo optime sanant. Hæc quidem Archigenes scripsit.

Que Asclepiades ad Aegilopas conscripsit. 3

Porro Asclepiades in primo exteriorū hæc porro dididit. Succu illecebræ librā dimidiā. succi solani lib. dimidiā. thuris drach. viij. mastiches drach. iij. galbani libræ dimidium. succos cum thure coquit, & ubi dissolutum fuerit, galbanū iniicit: mastichen uero improbamus. Aliud, Thuris drach. viij. myrrhæ drach. viij. ladani drach. iij. ceræ drach. iij. aluminis scissi, coagulati leporis, utriusq; drach. iij. spumæ nitri drachmas iij. pharmacum cōtundito & emollito cum trini ungenti fece.

De Varis. Cap. III

Tumor paruus & durus in faciei cute orif Varus Latinis, Grecis Ionthos appellatus, à crasso uidelicet succo congregatus, demonstransq; suijp- sius curationē rationabiliter per pharmaca emollientia & discussoria futuram, Etenim duricies ipsius emollientibus, tumor uero præter naturam discutiētibz opus habet, Quum igitur iam sæpe tum in superioribus libris, tum in simplicium pharmacorum facultate commentarijs, prædictæ sint mihi materiæ tum discussoriorum, tum emollientium medicamentorum, Compositio sanè ipsorum particularis per experientiam iudicata, uti lis erit ad rectum relatorum usum, quæ uidelicet paulo post referentur, ubi saltem prius determinauero, Quæ similes sint Varis affectiones, & ali qua parte ab ipsis differentes.

De scissis tumoribus. Cap. IIII

Vna quædā hæc affectio est ex his quæ in mento enascuntur, differens à Varis in eo quod non solum crassus sit qui hos tumores efficiat humor, sed & serosa tenuitate participet, ob quam etiam cito exulcerantur, si non ut debent curentur, & ob id magis resiccantibus pharmacis quàm Vari opus habent.

De lichenosis in mento tumoribus. Cap. V

Et hæc affectio ex mixto quopiam generatur humore, serosis nimirum ac tenuibus & acris succis cum crassis permixtis, quapropter etiam facile in pforam ac lepram tranlit, indigetq; etiā ipsa pharmacis fortiter resiccantibus. Postquam uero in pforam aut lepram trāsierit, ultra hoc quod resiccantibus indiget pharmacis, etiam repurgantia & exterioria expostulat.

De menti eruptionibus. Cap. VI

Hoc eruptionum, siue ut Græci dicūt exanthe

matum, nomē quiddam in communi usurpant, de affectionibus uidelicet ulcerosis & asperis in mēto sua sponte prouenientibus, quemadmodū etiā Archigenes facit. Indiget autem & hæc ipsa affectio resiccantibus medicamentis.

De furunculis. Cap. VII

Furunculi Dothienes Græcis dicti ex similibus humoribus ueluti Vari generantur, per uniuersum corpus duplices existentes, Aliqui quidē ut ita dixerim Varosi, duri, & ægre concoctiles. Aliqui uero inflammati, in quibus aliquando etiā febres consistunt, & tumor in magnitudinem excrescit, & in pus transmutatur. Vnde curatio ipsorum ut plurimum eadem quæ inflammatio- nis existit.

Ex Critione ad Varos. 2

Crīto in tertio de ornatu hæc uerba scripsit. Ad Varos in facie, Mellis atticī cyathū unum, siue 3. xij. aceti acerrimi tantundem. misceto diligenter eoq; Varos illinito cum digito affricando. Aliud, Spumæ argenti chemam siue drach. iij. terebinthina purā, fabæ Aegyptiæ magnitudinem, addito olei albi parum, atq; ubi prius facie deterferis, ex medicamento hoc parum digito excipe, deinde amababus manibus terendo uaros obline, hoc pharmacum etiam à rugis liberam & mundam faciem conseruat. Aliud, Amygdalas amaras aceto dilutas ac probe tritas faciei obline. Aliud, Alumen scissum probe leuigatum terebinthina excipe, & emollitum impone. Aliud, Costū Indicū tustum & tenuissimō cribro cretū sel le caprino excipe, ac ad cerati crassitudinem redactum Varis circa uesperam illine, Mane uero ubi surrexerit lacte agrum faciem proluere iube. Inueteratis porro Varis subscriptis compositionibus utendum est.

Ad Varos callosos. 3

Saponis gallici 3. iij. ammoniaci thymiamatis 3. i. thuris 3. i. aqua dissoluito, & cerati spissitudinē facito, eoq; illinito, & post horā interstitiū calidi ablucere iubeto. Aliud, Nitri rubri, hyssopi, pulegij, salis fossilis, equalēs partes tundito & per tenuissimum cribrum cribrato, exceptisq; cerato rosaceo utitor. Aliud, Seminis ocymi, nitri rubri, pulegij uiridis, aluminis scissi, costi indicij, singulorum æuales partes tufas & cribratas, adipe asferino seu gallinaceo excipe, ut cerati fiat crassitudo, ex eo uero in linteolum infar cito & imponi to donec penitus persanescant. Aliud, Salis assati, pulegij, hyssopi, ammoniaci thymiamatis, Rhois coriarij, singulorum par pondus rosaceo cerato exceptum donec persanentur imposito.

Ad affectiones eminentiores, et in facie prurium, ac

principium elephantiæsis. 4

Gummi albi, spumæ nitri, thuris, sulphuris uiui, singulorū æuales partes aceto dilutas ac probe tritas in passillos redige, eosq; in umbra exlicca, uero experente aceto dilutos illine, atq; ubi resiccati fuerint, subscripta cōpositione deterge. Saponis gallici libram i. ammoniaci thymiamatis tantundem, thuris quadrantem, mastiches quadrantem

quadrantem, spumę nitri quadrantem. Saponem & ammoniacum in uas sicileta coniecta, & aquę sextarijs duobus affusus coquito, atq; ubi dissoluta fuerint, arida contusa & cribrata adijcitur, deinde in mortarium translata ac probe conuassata, in ale uitreo reponitur, Vsu uero postulare faciem ex eo sinegmate inquinata, & post modicum temporis spacium larga aqua molliter perfricado abluo. Utendum est hoc sinegmate per omnem Varorum curationem.

Ad scifas menti papularum eruptiones. 5

Crito in tertio de ornatu in hęc modum de eis scripsit. Ad scifas in mento eruptiones, uelut Lūcius præceptor tradit, Spumę argenti, misyos crudos, aquas partes tritas insperge. Aliud Thuris drach. ij. spumę argenti drac. iij. salis fossilis drac. viij. sandarachę drach. ij. trita insperge. Aliud, Atramenti furorij drach. ij. sulphuris uiui drac. ij. ærguginis drach. i. nitri rubri drach. ij. trita insperge. Aliud, Elaterij drach. iij. salis fossilis drac. iij. atramenti furorij dra. ij. mixta insperge, & cum specilli humecti extremo admove, quo uidelicet pharmacum ipsum adhæreat. Cæterum post pharmacum impositionem, semine lini ex aqua trito utendum est. Porro ubi humidiora fuerint ulcera, ut ab ipsis aqua pura uelut a fonte defluat, subscriptis compositionibus utendum erit. Pastillus ad scifas menti papulas, Vsus est eo Arte midorus, reprimat omnes tumores, qui accidunt his quibus cicatrix male induta est, ueluti in his qui futura usi sunt contingit. Compositio hæc est. Squamę aris dra. iij. atramenti furorij drac. ij. aluminis scissi drach. ij. glutini fabrilis perlucidi drach. ij. Arida tunduntur & cribrantur, Glutinum uero aceto maceratur, et tritis affunditur, rursusq; leuigatur, & formantur pastilli, quos usus tempore aceto dilutos illinimus. Hoc medicamentum etiam fistularum callos extripat. Alius Magni Clinici. Aluminis scissi, ærguginis corinthiæ, rubricę sinopidis, chalcitidis, glutinis fabrilis, singulorum aquas portiones, composito ac utitur ut dictum est. Alius, Arii Aclepiadei. Milti siue rubricę sinopidis, ærguginis corinthiæ, aluminis scissi, gallę omphacitidis, malicorij, æquas singulorum partes, gummi duplū, aceto excipito ac utere ut dictum est. Alius Apollonij, ut Charixenus tradit. Squamę aris, misyos assati, auripigmęti, singulorum drachmas ij. diphrygis drach. ij. eris ustri drach. iij. chalcitidis ustrę drach. iij. glutinis fabrilis dra. iij. aceto diluito, & pastillos formato, quibus uelut superioribus utitor. Andronis pharmacum accommodatum. Atramenti furorij dra. ij. myrrhę drach. ij. thuris drach. iij. aluminis scissi drach. iij. malicorij drach. viij. gallarum dra. viij. aristolochiæ drach. viij. Vno austero exceptis ut prædictis utere.

Critonis, ad lichenas in mento. 6

Consequenter uero Crito ad lichenas męti scripsit hoc modo. Ad menti lichenas quę iniucundissima est affectio, Nā & pruriginem inducit, & affectarū partium circumfensionē, & periculum

non modicum: proserpit enim aliquando per totam faciem, oculosq; contingit, & ferme extreme foeditatis causa existit. quapropter diligentiore cura utendum est, inspiciendo tum irritationes, tum interualla & remissiones. Ita ut etiam ab inueteratis recentibus disparemus. In quibus conueniet uti resiccantibus medicamentis. Quum uero in sporam aut lepram transierint, supra resiccantię etiam exterioriorum & repurgantium erit usus, & postea sanę subscriptarum item compositionum.

Crispi amici ad recentes in mento, siue alia faciei parte lichenas. 7

Tritici grana multa in incudem imponito, deinde laminam aris igni candefactā tritico superponito, & resolutū ab eo liquorem calidū adhuc auferto, ac super lichenas linito. Hoc solo multos curatos scimus. Aliud, Maluę agrestis semen tenerum adhuc colligito, mūdato ac tundito, succumq; reponito, atq; eo assidue illinito. Aliud, Portulacę succū assidue illinito. Aliud, Oleę æthiopicę lachrymam cum aqua terito, & modico adiecto styracę misceto, & imponito. Aliud, Vlmi lacrymę aqua dissolutam imponito. Quod si inueterati sint lichenas, sequentes compositiones adhibendę sunt. Albuici radicem aceto coctā & tritam illinito. Viticis folia trita cum aceto imponito. Capparis folia trita cum aceto imponito. Rumicis hortenensis radicis corticem ex aceto tritum, loco prius cum nitro præparato imponito. Chamæleonis radicem aceto coctam & tritam imponito. Cæterū quū ad lichenum curationē multa & uaria medicamina existant, particulatim de singulis transigā, in initio a pastillis sumpto. Pastilli Lichenici. Glutinis fabrilis dra. iij. alij duas habēt, sulphuris uiui 3. ij. chamæleonis 3. iij. thuris 3. ij. aceti hemina dimidiū. Glutinum aceto dissoluitur, deinde aridis adijcitur, Vsus tempore quātum satis est aceto dissoluo calidumq; impono. In alijs exemplaribus singulorum par pondus continetur. Alius, Chamæleonis, sulphuris uiui, utriusq; drach. iij. lachrymę oleę æthiopicę 3. ij. thuris drach. i. aceti quantum satis est. Alius, Alcyonij drach. ij. chamæleonis nigri drac. iij. pyrethri drach. ij. sulphuris uiui drach. iij. thuris drachmas iij. glutini drach. iij. aceti acerrimi heminas iij. Alius, Lachrymę oleę æthiopicę 3. iij. sulphuris uiui drach. iij. alcyonij drac. viij. spumę nitri drach. viij. alicę aceto coctę drach. viij. aceti quod satis est. Alius, Alcyonij ubi dra. ij. chamæleonis nigri drach. iij. radicis albuici dra. iij. sulphuris uiui drach. ij. thuris drac. ij. pyrethri drach. ij. spumę nitri drach. ij. glutinis drach. iij. Aceti quod satis est. Porro extenta iam affectione & callosa reddita sequentibus utēdum est medicamentis. Misyos peregrini, thuris, myrrhę, aluminis scissi, singulorum drach. viij. aloę, sulphuris uiui, utriusq; drach. iij. Excipe passo ut strigmentitiam spissitudinem accipiāt, & bis aut ter in die præfrictis illine: fornicus autem conferuādi pharmaci gratia, uelicę pelliculam, aut ouitēstam, aut uiridia folia quantum satis est impono.

Aliud, Mifvos drach. iiii. acaciæ drach. ij. squamæ aris drach. iiii. sulphuris uiui drach. vi. chalcitidis drach. viij. gummi drac. viij. aceti quod fatis est, In quo ubi gummi dissolueris, reliquaq; ammi scueris, amurcam inijce, & probe conuassata reconde, ac utere ut dictum est. Aliud, Sulphuris uiui, thuris, myrrhæ, atramenti futorii, misyos crudi, singulorum drach. ij. gummi drachmas iiii. aceto & cedrino oleo quod fatis est dissoluito, eo demq; utere modo. Exscriptis Zeuxidis, Aliud, Chalcitidis crudæ, misyos crudi, myrrhæ Minnæ, sulphuris uiui, singulorum æquales partes, gummi duplum aceto dissolutū, Excipe oleo cedrino. uerum cedrinū prius coquere oportet usq; ad mellis crassitudinem. Aliud Diodori, Lachrymæ oleæ æthiopicæ 3. xx. gummi 3. xl. atramenti futorii drachmæ xvi. sulphuris uiui drach. x. thuris drach. x. æruginis drachmæ x. acacię dra. x. myrrhæ Minnæ drach. x. aceti quod fatis est. Et ubi dissoluta fuerint singula, ac leuissima reddita excipe amurca condensata, & repositis utere. Annetantur porro & aliæ compositiones. Illitio cocta ad lichenas inueteratos, quæ citra ulcerationem persanat. Atramenti futorii, fœni greci moliti, cardamomi, singulorum drach. ij. melianthij sesquidrachmam. foliorū caprifici sesquidrachmam, aceti acerrimi quod fatis est, leuigata ad mellis spissitudinem reducto, deinde coquito, & postquam nigrum factum fuerit & condensatum pharmacum tollito, illinito, in superq; lichenas abluo. Heraclidæ Tarentini illitio lichenica. Sanat citra ulcerationem. Polentaram drach. viij. glutini drach. vi. atramenti futorii drach. iiii. chalcitidis drach. iiii. sulphuris uiui drac. iiii. spumæ niri drach. vi. alcyonij drach. iiii. myrrhæ Minnæ drach. ij. aceti heminas iij. Dionysii discipuli, Sanat citra ulcerationem. Farinæ ordeaceæ sextarium i. atramenti futorii unc. i. corticum radicū rumicis syluestris drach. i. sulphuris uiui drach. i. myrrhæ sesquiciam, gummi unc. i. aceti heminas vi. Rumicis radicem coquito, & ubi dissoluta fuerit extractam terito, Ordeaceam uero farinā in residuum liquorem cōiectam coquito, atq; ubi recte habuerit reliqua inijcito, & ablatis utitor. Illitio Socratonis cocta. Farinæ alicæ sextarios vi. sulphuris uiui drach. xvi. misyos peregrini dra. xvi. cimoliæ drach. xvi. chalcitidis drach. xvi. spumæ niri drach. viij. alcyonij drach. viij. aluminis scissi drach. viij. radicis albuci drach. viij. myrrhæ drachm. viij. thuris drachmas viij. lachrymæ oleæ drach. viij. ammoniaci thymiamatis drachm. viij. aceti heminas tres. Alcyonium & album in aceto coquito, ubi uero ad dimidias redactum fuerit percolato, & in colamento ammoniacū, myrrhā, thus, oleę lachrymam, dissoluito, deinde terito, aridaq; inijcito, Alicam uero in residuo liquore coquito, & dissolutam reliquis adijcito, simulq; terito ac utitor. In alijs collectaneis sic habet. Sulphuris uiui, misyos peregrini, chalcitidis, singulorum drach. xvi. niri, aluminis isfici, alcyonij, radicis albuci, thuris, lachrymæ oleæ, terræ cimoliæ,

ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. viij. aceti heminam unam. Alia ualde efficax. Aceti acerrimi sextarios vi. farinæ ordei sextarios ij. mænæ sextarium i. radicis rumicis agrestis drachm. v. ueratri albi drach. x. alcyonij drach. xv. cardamomi drach. i. terræ cimoliæ drach. viij. glutinis drac. xvi. spumæ niri drac. xvi. halicacabi uingulorum uiridium manipulum, Cōponito. Quandoquidem uero multi pharmacorum quæ illinuntur cōpositiones, utpote quæ neq; sudorib. i. obortis diffuunt, neq; resiccata cutem circumtendunt, merito etiam ipsorum præparationes subiungimus.

Emplastralibhenica que citra exulcerationem liberant. 8

Cera, picis coctæ, thuris, terebinthinæ, sulphuris uiui, singulorū libra dimidium. Līquida cum aridis committito. Aliud, Thuris drach. viij. aluminis drach. viij. atramenti futorii drach. viij. sulphuris uiui drach. iiii. glutinis drach. iiii. radicis chamæleonis drach. iiii. ceræ drach. viij. picis crudæ heminas ij. Picem & glutinum coquito, atque ubi condensata fuerint ceram inijcito, aridisdq; affundito, ac repositis utitor. Aliud, Facit ad lichenas eleuatos, adeo ut reprimat ea quæ residua putantur. Mannæ thuris, picis, utriusq; drach. viij. bituminis drach. viij. ceræ drach. viij. resinę pinus drach. viij. sulphuris uiui drac. viij. olei cyprini parum. Coquito ut dictum est, & sublati utitor in liateolum aut pelliculam tenuem infartis. Aliud citra ulcerationem remouet. Picis brutiæ liquida sextar. i. manna lib. i. sulphuris uiui lib. i. farina lupinorum lib. i. pro consuetudine composito, deinde galbani sextantem adijcito. Est hoc ex ualde probatis. Alia exemplaria farinam non habent, neq; galbanum. Emplastrū lichenicū Philotæ, citra ulcerationem sanat. Exhibitū est à Philotæ sodali, per uersus scriptū. Chalcitidis crudæ, chrysocollæ, misyos assati, squamæ aris, diphrygis, salis ammoniaci, terræ cretice, singulorum 3. iiii. sulphuris uiui 3. xij. atramenti futorii, floris lapidis asii, aris usti, singulorū 3. vi. foreos 3. v. aluminis liquidi 3. iiii. Hæc omnia terito, deinde aceti heminis xij. affusis, per dies v. sub caniculæ ortū soli exposita sitidē probe terito, donec pharmacū rediditum fuerit æroginosum. Porro in alio mortario thuris uncia i. myrrhæ sextans, aloes unc. i. ladani quadrans, opopanax quadrans, aceto dissoluta ad frigiditatem crassitudinem præparentur, atque ubi recte habuerint, ad ea quæ in sole leuigata sunt adijciantur, rursusq; terantur, addantq; aristolochiæ rotundæ & longæ, utriusq; usq; & tenui cribro excussæ drach. una. Postquam uero ita trita emplastrī formā acceperint, liquefiscibilia prius liquefacta & frigefacta inijcito. Sunt autē hæc. Ceræ drach. cx. terebinthinę drach. xx. galbani 3. ix. olei hemin. i. & probe emollitis ac repositis utitor. Hoc pharmacum duplicem aspectum uidentibus exhibet. Cæteri si affectio pertinacius perseueret, & pharmacorum impositionem respuat, excoriatoris appellatis remedijs utendum erit prompte enim superficiem auellunt.

De excoriatorijs Lichenum. 9

Excoriatorium Lichenum, quo Pamphilus Romanus usus plurima designauit, quom in urbe Mentagra appellatus morbus inualefceret. Squamæ æris 3. vi. auripigmenti 3. iiii. sandarachæ 3. iiii. æris usti sesquidrac. ueratri albi sesquidrachmam, uentrium cantharidum, sesquidrach. Singula per se terito, deinde simul mixta, cedria excipito, & ad strigenti densitudinem reducta pyxide æris cyprij reponito. Vsu autē expetente, nitro & aceto modico perfrictis lichenibus, pharmacū hoc cum spatula illine, ac affrica: deinde interiecto spacio derade, rursusq; pharmacū impone: deinde ubi bis uel ter hoc feceris, quo facile deradi possit, rursus imponere tenta, illitis locis cū uesicæ bubule aut alterius cuiusdā animalis pelliculis infectis. Hac em̄ pharmacū ne desuauit cōseruat, & alias leuis est: post pelliculæ aut impositionem fasciola leuiter obligatum sinito. Præstiterit quidē per noctē adherere, aut saltem ad aliquot horas, usquequo bullas excitet saniem cōplectentes crassam & glutinosam. Deinde uero lauare præcipimus, & in balneo morarinnā & hoc ad hanc curationē auxiliatur. Sit autē calidius balneū, Quo si quid uti prohibeat, fomentū aquæ multæ calidæ adhibendum est, quo detergo, panis ex aqua multa subactus cataplasmatis modo imponatur. Porro ubi fordidā iam facta fuerint ulcera, splenium ex emplastro uiridi imponito, modica parte de excoriatorio adiecta. Cæterum sanie exclusa & nulla crustula ulceri incumbente, spleniū album imponito, atq; hac curādī ratione donec cicatrix penitus inducatur utitor, singulis diebus fomentum adhibens, & nouum spleniū imponens. Post cicatricem plene inductam, si qua suspitio reliqua sit, eodem curationis ductu utendum est. Anteq; uero excoriatorio imponantur, circumstas & uicinas licheni partes pharmaco aliquo inflammationē arcente in splenio excepto, integere ac tueri oportet, Nimirū lichene sua extrema linea semper parum quiddā ex sanis corporibus affricante & inuadente. Hac communis Mentagræ curatio est. Aliud excoriatorium Axiorij. Squamæ æris drach. vi. atramenti futurij dr. iiii. cantharidum sesquidrach. ueratri albi sesquidrach. sandarachæ drai. Excipe cedria. Aliud Apij Phasci. Ad mētagras quod citra cicatricis uestigium sanat, facit & ad alopecias inueteratas, Cæterum alopecias in sole aut ad ignem illinito, & bulla excitata eam acurpungito, ac humore excluso cū ceratis curationem perficito. Post inductam enim cicatricem enascitur pilī, atq; hæc quidem in alopecijs. In lichenibus uero uelut prædictū est utitor, pharmacum ipsum hoc modo habet. Sandarachæ 3. ii. auripigmenti drach. ii. squamæ æris drach. ii. ueratri nigri drach. i. elaterij drach. i. uentrium cantharidum 3. i. Excipe cedria. Aliud, Cantharidum drach. i. & dimidiā. ueratri albi tantundē. auripigmenti dra. ii. squamæ æris tantundē. atramenti futurij drach. i. scammonia drach. ii. Excipe cedria. Aliud, Auripigmenti usti drach. ii. Squa-

Galen.

A. mæ æris cyprij drach. vi. chrysolcolleæ drach. i. atramenti futurij drach. i. ueratri nigri drach. i. aluminis scisci drach. i. succi thapsiæ drach. i. scammonij drach. i. cantharidū drach. i. cedriæ quod fatis est.

Emplastrā uiridia lichenica. Post excoriatoriorum usum emplastrā uiridia & alba imponere oportet, quare rationabile est & illorum preparationes adscribere. Emplastrum uiride Pamphili. Hoc usus est Pamphilus in mentagra post rupturam bullarū. Ceræ lib. i. æruginis rasæ sexuncē. resinæ frictæ lib. ij. olei cyath. iiii. aceti acerrimi quātum sufficit. Aeruginem cum aceto in sole terere oportet, liquefabilia autem liquantur & refrigerantur, ac frige facta liquidis adijciuntur. Viride Demosthenis, Ceræ lib. ij. resinæ frictæ lib. i. æruginis rasæ trientem. olei æstate cyath. iiii. hyc me cyathos vi. aceti quātum sufficit.

Viride Herophili. Aeruginis drach. ij. manna drach. iiii. adipis uitalini drach. xij. galbani drach. iij. ceræ 3. lxxx. resinæ drach. xx. aceti quod fatis est. Tryphonis antiqui emplastrum Euchrum a bono colore dictum. Aeris usti trientem, aluminis rotundi sextantem, æruginis rasæ sextantem, salis ammoniaci sextantem, manna sextantem, ceræ lib. ij. resinæ frictæ lib. ij. olei dextantem, aceti quod fatis est. Antonini emplastrū. Hoc Timocrates post lichenas excoriatis imponit. Ceræ drach. c. colophonæ drach. cc. squamæ cypria drach. xij. aluminis rotundi drach. xij. æruginis drach. xij. manna drach. xij. galbani drach. xij. olei heminam i. acetū quod fatis est.

Annectendæ his etiam emplastrum alborum preparationes: nam his post uiridia utendum est, mūdis iam factis ab excoriatione ulceribus. Etenim cura habenda est ut citra callum cicatrix inducatur, atq; ea gratia eiusmodi pharmaca in usum ueniunt, quæ multā ad tactum lenitatem inducunt. Emplastrum albū Aquosum appellatum. Hoc Magnus circulator usus est post lichenas excoriatis. Spumæ argenti lib. i. ceræ tyrrhenicæ lib. i. olei sextarium i. cerusæ lib. i. aquæ sextar. i. Spumam argenti, cerusam, & aquā terito, atq; ubi leuigata reddita fuerint, paulatim oleum adstillato, alsidueq; terito: & postquam uerita fuerint, in uas fictile translata igni imponito, alsidueq; agitato, et absorpta iam aqua ceram inijcito, qua dissoluta in mortario transferto, & emollitis repositis utitor. Emplastrum Pancreatista rum siue athletarum Trypherū, id est delicatum appellatum. Facit ambullis item, ut citra cicatricis uestigium sanentur. Spumæ argenti drach. xxv. cerusæ drach. xxv. plumbaginis drach. xxv. ceræ drach. xvi. terebinthine drach. xvi. olei heminam i. aquæ tantundem. cōponito ut dictum est.

Megetis chirurgi. Cerusæ lib. ij. ceræ lib. i. terebinthina unc. i. spumæ argenti lib. i. olei lib. iiii. aquæ sextarios ij. cōponito. Diophanti ad ambullas & intertrigines. Conseruat faciē rosaceo dissolutum. Spumæ argenti torrefactæ drach. ij. medullæ ceruinæ drach. xvi. cerusæ torrefactæ 3. xij. ceræ drach. viij. terebinthina drac. viij. thuris drac. viij. olei heminas iiii. pro more componito.

tom. 5

C 3

Manna

Manna emplastrum, medicamentum accommo-
datum. Spuma argenti drach. c. cerusæ drachm.
c. ceræ drach. l. terebinthinæ drach. xxv. manna
drach. xvi. aluminis scissi drac. xl. olei heminas ij.
& dimidiã. composito & reposito utitor. Affri-
ctis porò & extritis lichenibus à quocunq; tan-
dem medicamento, præsertim uero ab excoriato
rijs, subseripitis utendum est.

*Compositio Meneceatis que propter excoriato-
rium appellatur. 10*

Picis brutiæ pellicidæ siccæ & electæ drach. ij.
& dimidiã, resinæ pinus pellicidæ lib. i. & qua-
drantem, ceræ ponticæ tantundem, galbani qua-
drantem, aceti heminam i. liquefibiã ad splēdi-
dum ignem donec non inquinent coquito, deinde
galbanū adijcitur, atq; ubi dissolutum fuerit, ab
igne ablatis, acetum paulatim instillato, assidueq;
moueto animaduersione habita ne ebulliat, & in
sumpto iã aceto, pharmacū in magnū mortarium
transferto ac diligēter terito, donec ad melinum
colorem reducat, deinde in pelliculam albā in-
spissatam repositum seruato. Vsu uero exigente,
in pelliculas quantū ad integēdos affectos locos
satis est infarctum imponito, & tertio quoq; die
soluito, nonnunquam usq; in diem duodecimum
imponito, ita ut quatuor fiat solutioēs. Hoc phar-
macum squamas discedere facit, & corpora atte-
nuat, ac solida facit ad cōueniētes excoriaciones.

11 Quæ Archigenes in secūdo pharmacorum
secūdo genus pharmacæ scripsit, ad papularum
in mento eruptiones, & ad ficosas eminentias. Pa-
pularum in mēto eruptiones, ex inyrti baccis, ma-
licorio, argēti spuma, æris flore, paribus partibus
exceptis, cum uino oblinē. In ficosis uero menti
papulis, mentagris appellatis, & ab aliquibus lich-
enibus agrestibus siue feris, faciūt quidē robus-
tiora ex his que ad lichenas relata sunt. Amplius
autem & quæ ad psoras & lepras describētur. Mi-
rabiliter uero hæc compositio conuenit. Atramē-
ti sutorij drach. i. ueratri nigri drach. i. auripigmen-
ti drach. i. uentriū cantharidum 3. ij. Quidam
etiam oboli. iij. insuper addunt, tritis utitor cum o-
leo, aut cedria, aut rosaceo, præfrictio prius loco:
sunt enim bullæ, quibus per specilli cuspidem ru-
ptis, rursus affricato, quo penetrare pharmacum
possit & mordere: deinde post horam fomēto ad
hibito, ceratum rosaceum imponito. Hoc usque-
quo ad cicatricē perueniat facit, Quod si primum
nō exuperet, iterū iterumq; illinito. facit & ad le-
pras & leucas, alopeciasq; & psoras excellenter.

Heraclide Tarentini, ex libris ad Antiochidem, ad capitis

*& menti ficosos tumores, atq; etiã alijs par-
tibus eminentia ulcuscula. 12*

Elaterij & salis pares partes misceto ac utitor,
Superne uero lini semen crudum, ex aqua impo-
nito, aut ficus paruas tritas, Eodem etiam ad tu-
bercula utendum est.

De dentium affectionibus. Cap. VIII

Ex dentium affectionibus, aliqua sanē omni-
bus eidenter apparent, Quemadmodū quæ per
forati sunt, aut denigrati, aut detriti, aut neq; frigi-

da ferūt, neq; calida, sed ex utriusq; aut altero solo
dolor eis contingit. Quædam uero non manifeste
apparent in ipsis affectiones, ueluti quum ipse æ-
ger se sentire dicit circa corpus dētis dolore in-
profundo obortum. Quidam enim contradicunt
asserentes, quum os sit dens, eum citra dolorem
affici, ueluti quum aliquando prominētiore per
limulam deterere cogimur, aut etiam ob aliam
quampiam causam, de quibus paulo post mentio-
nem faciam. Nunc enim citra rationalem & natu-
ralem demonstrationem, testimonium his perhi-
bere uolo, qui ipsū dentem dolere aiūt, Etenim
quum ego aliquando dolerem, diligentem super
me ipso animaduersionem habui, utpote qui iam
audieram de hac dubitatione, perceptiq; manife-
ste non dolentem modo, sed etiam pulstantem dē-
tem, quemadmodum carnosæ partes inflammatione
uexatæ confueuerunt. Quare mirum mihi ui-
debatur quod & hæc affectio quam phlegmonē
siue inflammationem appellamus, in dente oriri
posset, qui lapideam & duram substantiam habet.
Atqui quum etiam alio tempore dentem dolo-
rem, manifeste sensi non ipsius dentis, sed gingi-
uarum dolorem eum esse, inflammatis uidelicet
ipsis ut etiam citra coartationem dolerent, quin
& ob uicinitatem dētium natura durorum, aucto
dolore ob coartationē. Quapropter utriusq; do-
loris sensum expertus, alium quidem in gingiua,
alium in ipsius dentis substantia esse clare scio, &
id asserentibus testimonium præbeo, Quod ipsi
aliquando dentes dolent. At uero & nerui, qui ad
radicem dentis enatus & substratus est, dolorem
aliquando fieri, nervo imaginatiōe confusam et
indiscriminatā apud plerosq; exhibente, tanq; ip-
se dens doleat, consentaneum rationi est: nā & hu-
ius rei manifestū periculum in me ipso feci, et sanē
remanet adhuc parua doloris portio, exopto den-
te, in nerui inflammatione, quum dolor neruulæ
uior tantū reddatur, ex eo quod concretio nō am-
plius tendat ad osiculum tensionē operante, &
q; liber factus respiratiōe quandā habeat, eumq;
remedia quæ adhibent contingere possint. Neq;
enim per contactū, neq; per distributionem, pos-
sibile fuerit inflamatū neruū curare, utriq; a den-
tium locellis coarctatum, & ab anteriori parte ab
ipso dente. Si uero liuidi per omnem suā substā-
tiā facti appareāt dentes, nihil mirū est ipsos quid
inflammationi simile pati, Cui rei ex eo quis am-
plius fidem habeat, quod ex nutrimento ferē per
omnem animantis ætatem incrementū accipiūt.
Id quod euidenter sæpenumero apparet in his dē-
tibus qui exemptis oppositi sunt, utpote qui sem-
per augetur, Quantū uero augetur, tantū in
ciborum mansu deteruntur. Quum uero impossi-
bile sit incrementum accipere citra nutrimentū,
omnino duabus affectionibus & his contrarijs
obnoxij erunt, inopiæ uidelicet & redundantia
alimenti quod eis suppeditatur. Inopia igitur ari-
diores & macriores alimentumq; non sentientes,
& ob id tenuiores eos reddit, Redundantia ue-
ro consimilem in eis affectionem excitare po-
telt

est, qualis est circa carnosas partes inflammatio. Eius igitur curatio fiet iuxta eundem scopum quem habent propositum qui inflammationes curant, qui sane est ut redundantia euacuetur, partim discutiendo, partim eam repellendo. Cæterum tenuitas dentium ob alimentum inopiam remedium nullum est: laxari enim tunc & moueri ipsos necessarium est, compage ipsorum laxiore facta, cum non solum ipsi dentes, sed & locelli eos complectentes sint attenuati. Hæc itaque affectio senibus accedit citius aut ferius, uelut etiam magis aut minus. Que uero proportionem ad inflammationem habet, magis iuuenes corripit. Auxiliari tamem etiam senibus oportet, auxilio gingiuu exhibito: ita autem appellantur carnes quæ dentes comprehendunt, ubi primum est locellis emergunt. Ipsas itaque adstringentibus medicamentis robustiores, & magis citra dentem adstrictas facere oportet, tanquam quæ & ipsæ aliquid ad hoc faciant, ut stabiles & ægre mobiles sint dentes; quod ipsum aliis ob exactam compagis ipsorum conglutinationem contingit. At uero foramina dentium ex humorum acrimiam & erodentium influxu perficiuntur, uelut ulcera in cute citra externam causam. Verum in cute id assidue & multis, in ossibus raro contingit, quanto uidelicet minus quam cutis noxæ exposita sunt ob duriciam naturalem. Manifestum igitur quod erosorum corporum medela erit per resiccationem uitiatum influentis humoris, qui si paucus fuerit, localibus auxilijs ex resiccantibus pharmacis contingere medela potest: eorum uero materiam paulo post dicemus. Si uero multus influens humor fuerit, uniuersi capitis ratio ac prouidentia habenda est, atque si ipsum quandoque propter totum corpus affectum sit, etiam reliqui corporis cura habenda erit. Porro erosos dentes qui id mali præ mollicie perpessi sunt, reddere oportet duriores, & affectioni minus obnoxios, atque id per austera & acerba medicamenta. Cæterum liuidos redditos per resiccantia curare oportet, ut qui ex humorum uitiatorum influxu id patiuntur. Simili igitur curatione indigent cum perforatis.

De gingiuu curatione. Cap. IX

Gingiuu ex inflammatione dolentibus optimam pharmacum est oleum lentiscinum caliditate temperatum ore retentum. Sit autem recens, nam uetustius tanto recentiore peius est, quanto ætate antecellit. Imponatur autem uasculum in quo calefit lentiscinum, in aliud maius uas quod aquam calidam multam complectatur. Maximum pereitaque inflammationi gingiuu hoc conducit: nec uero minus etiam si iuxta aliam quandam partem, tum pelliculæ linguam ambientis cum succingentis totum os, aliquis dolor ob inflammationem oritur, dolore sedat lentiscinum. repellit enim citra molestiam & absque asperitate, quam plerumque austeriorum habent, discutitque citra mordacitatem, cuius rei inflammatis præcipuus usus existit. Quidam uero medici communi errore inducunt inflammationem lædunt. Quare ea re semel

perpensa, de cætero uitare oportet. Existimant enim, si adstringentia solum id quod influit repellendo, inflammationis profunt, atque aliquando etiam quid ex contentis circa inflammatam partem, ad uenas membrum ipsum nutriendas exprimendo: Verisimile ob id esse id quod amplius adstringit, amplius prodesse. Eodem modo etiam id quod magis digerendo discutit, magis auxiliari opinantur quam ea quæ moderate idem præstant, non animaduertentes quod alterutrum ipsorum intentum inflammationis dolorosum existit. A uehementer adstringentibus enim partes simile quiddam contusioni perpetiuntur, nimirum cum substantia ipsarum uolenter condensetur. Ab acribus uero erosioni quid simile contingit. Merito igitur moderatum in utraque facultate immoderatis præfertur. Hæc igitur sufficiunt mihi præfatus uideor. Cæterum de affectionibus, circa dolores deinceps narabo. In dolore dentium citra gingiuu inflammationem, aliquando in ipso proprio dentium, uelut dixi, corpore, aliquando uero in neruo dolorem fieri contingit. Vehementissimis igitur opus est medicamentis, siue quis repellere, siue discutere uelit doloris causam, siue humor sit, siue flatus uentosus. Et propterea sanè plerumque ipsorum ex accerrimo aceto preparantur. Adscribæ autem ex ordine que aliorum relatione nobis tradita sunt, initio ab his quæ Archigenes tradidit sumpto:

Que Archigenes ad dentium dolores conscripsit. 2

Dolentes dentes colluat aceto calido cum galla. Aut halicacabi radice cum aceto & galla. Aut pinguib. tedis in aceto seruata. Aut myrti ramulis cum pice in aceto tepesactis. Aut hyoscyami semine & folijs cum aceto. Aut cedria, uel propoli, uel nardo, uel solano, aut succo eius, uel cappari, uel alijs, uel myrti ramulis siue in aceto, si uel uini fece calida seruata. Aut polys folijs, uel ipsa herba, uel agrestis cucumeris radice, uel marubio, singulis cum aceto, pipere, & nitro. Aut radice chameleonis eodem modo. aut hyssopo uel staphide siue stri, uel ruta cum uino. Aut pulegio cum aceto mulso. Aut platanis pilulas, uel rosas aridas, in uino albo ad tertias coquito, & uinum in fictili seruato, eoque assidue dentes colluito. Eodem modo utere pentaphylli siue quinquesolij, quæ ab aliquibus eupatorium dicitur, radice cocta ex uino, aut pulegij large cocti decocto. Aut cornu cerui in posca coctum colluito. Aut brassicæ cauliculos tres, & foreos drachij. in aceti sextario uino ad tertias coquito, & colluito. Egregie uero facere fertur rana in aqua & aceto probe cocta decoctum, diutius ore retentum. Mirifice facit dens caninus ustus & tritus: deinde cum aceto coctus, & ore retentus. Aut malicorio & galla aceto coctus utitor. aut squilla ex aceto calido: aut squilla medullam in minutas partes dissectam, & in seruens acetur iniectam, in uase fictili condito, ac inueterari finito, uase in asinino stercore ad dies triginta defosso, & utitor. Aut asinino lacte colluito. hoc & eos qui mobiles sunt corroborat: aut halicacabi corticis, & tede aceto seruata deco

cto large incocto colluito. Aut cornu cerui in aceto & garo incocto colluito. Aut idem ex aceto colluito. Aut tithymalli radicem in uino ad dimidias coctam colluito. Aut hyoscyami radicem aceto mulso coctam colluito. Aut tedarum ramenta, malicorium, alumen rotundum, siue scissum, in aceto ad tertias coquito, ac tepidū colluito. Aut helxines radicem in aceto ad tertias coctā in ore detineto, atq; ubi os saliuā referum fuerit, eo aperto effluere sinito. Aut allium & harundinem Alexandrinā acerrimo aceto seruata colluito. Aut hyssopum, aut thymum, aut origanum, per se & simul aceto cocta colluio. Aut pyrethrum cum hyssopō, & colocynthi dis medulla, similiter in aceto coquito, liquorēq; ex eis longo temporis spatio in ore contineto. Aut colocynthidem uino calido macerato, et diutius ore teneto, multam enim pituitā ducit & dolorem leuat. Aut alliorum & erucæ seminis, ac nitri decocto collue. Aut ranunculum in uino coquito & præmundato prius dente colluito. Aut scyamini, hoc est mori arboris lac in uinum infunde, simulq; lanas succidas in ipsum exprime, tepefac, & per lanas sordidas molā infunde. Extrahit pituitam & dolorem tollit. In his omnibus Archigenes catalogum fecit pharmacorum incidēdi, discutienti ac calefaciēdi ut præditorū, raro aliquid ex acerbis admiscens, quale est ipsa galla. Porro cum semel tātum solanum posuerit, miratus sum cur id admisceri uelit, cum nulla ratione iuuare possit, præterquā ea iuxta quam colica pharmaca profunt, stupefaciendo uidelicet doloris sensum. Quid igitur amplius parabitur Apollonij relationem faciam, cum parum absit, quin omnia comprehēderit Archigenes? Quandoquidem uerō Apollonius ipse quibusdam à se traditis testimonium præbet, tanquam euestigiō sedātibus dentium dolores, usum etiam mihi est illa ipsa adscribere secundū ipsius Apollonij uerba, quæ hoc modo habent.

Apollonij, euestigiō dolores dentium sedat. 3

Alliorum nucleos v. thuris masculi obol. tres, myrti ramulos longitudinis duorum palmorum duos: ex his folia decerpta per se terito, similiter & allium & thus, deinde simul omnia in nouam ollam coniuncto, & aceti heminam unam superfundito, ac coquito spatula ex tēda agitando donec ad dimidias redigatur, atq; ita tepido utitor. Oportet autem liquorem hunc in dolente parte ad multum tempus tenere, donec liquor ipse consumatur. Commodum est & ante hoc balsami succum colluere, aut corticē imponere super dolentem dentem. Quis si non adit, panacis succo conluto, inde defluentem liquorem instillare.

Post prædicta Archigenes remedia perforatorum dentium cum dolore et absq; dolore conscripsit, in hæc uerba. 4

Oblitionibus porro & epithematis eiusmodi utitor. Sory Aegyptium resina terebinthina exceptum obline, idemq; cauernæ inde. Aut compositionem ex duobus piperis generibus inde, nardino aut rosaceo dissolutam, & maxime amygdali-

no. Quin & in aurem eiusdem partis instilla, summe facit. Aut sulphur uiuum lycio exceptum in cauernam inde, aut præmundato denti obline. Aut pulegij comam tritam denti indito. Ceterum in maximis dentium doloribus summe facit hoc. Anguis senectū exurit, et cum oleo ad mel. his solidi spissitudine redigito, ac dentem reperi gatum ex eo integito, omniaq; circumfusa oblinito, itemq; cauernis indito. Aut senectam anguis non usitam dentibus apprimito, & excident. Aut uermes terrenos tostos cauernæ præmundatæ in sperge. Aut araneorum oua unguento nardino diluta inde. Aut melanthium torrefactum cum oleo obline, atq; ubi parumper cōcluso ore tenuerit, pituitam collectam reijcere iube. Aut piper uel cāchry, hoc est rosinarini semē opio exceptum in cauernā inde. Porro ubi uelut inflammatione coriepti fuerint, nitrum rubrū & ofsium persicorum nucleum unita resina excipe, & dentem ex eis intege, ac donec deciderint sine, in cauernam uerō piper, spumam nitri, & galbanum cum melle inde. Aut strigmenta cum pipere eodem modo. Aut pyrethrum cum myrrha. Aut succum cyrenaicum & piper æquali pōdere cum galbano. Aut melanthium, & allij dimidium eius, ac modicū salis simul trita obline, & dolorem tollit. Aut blattæ pistrinariae auulso capite adipem cum rosaceo calefactum & in aurem instilla & in cauernam inde. Aut gallam tritam cum cedria adhibe. Aut in aurem dēti uicinam oleum sesaminum in quo uermes terreni cocti sunt, instilla: uerum ipso dolente dente hyoscyamū conterat. Aut hederæ albæ cacumina quinq; cum rosaceo terito, & in mali punici putamine tepefacta, bis aut ter in die in aurem uicinam instillato. Quin & ipse fructus cum uino tritus, denti illitus iuuat. Ceterum his relatis Archigenes etiā hæc subdit. Summe facit cruētatis gingiuius alumen liquidum duplo aloes pōdere addito admortum.

Aut alumen scissum & myrtum tenuissime trita affricato. Vbi uerō restrictæ fuerint melle ipsas instillato. Aut nucleorū ofsium siue macheratum persicorum partes duas, myrrhæ partem unam, præmundato denti indito. A dolore asserit. At uerō quassatis & dolentibus dentibus, cauterium ignitum admoueto. Apophlegmatismi pituitam extrahentes. Post prædicta uerō Archigenes ita scripsit. Apophlegmatismi optimi sunt in dentium dolore: Staphis agrestis per se & cum pulegio manducata. Aut quod intra gallam est nigrum dolenti dente conterat, sinatq; pituitam effluere. In oppositam autem aurem duos hederæ corymbos cum rosaceo tritos instilla. Aut myricæ fructus drachmas duas, spumæ nitri drachmam unam, aluminis parum, alliorum nucleos v. myrti folia pauca, cum aceto ad dimidias coque, spatula ex tēda agitando, idq; decoctum colluendum ac ore continendum præbeto: deinde hiante ore pituitam effluere permittito, & post hoc rosaceo ore colluto, pituitam foribendam exhibeto; si uerō ex colluendo aliqua circa os ulcerata fuerint

fuerint, croco & rosarū succo inungito. De fo-
mētis. Fomēta ad dentiū dolorē faciūt, forinsecus
ex sale torrefacto et misio in sacculos cōiectis, aut
per fordidos pāniculos probe calfactos. Quin &
epithemata cōducunt citra aquā apparatus, uelut
sunt quæ ex ordēacea farina fiūt, siue ex femina li-
ni. Ipsius uerō dolētis dentis fomentū hoc modo
adhibeat. Origani aridi ramulū in seruēti oleū tin-
ctū dolētī dēti sup̄e affricato. Aut ricini caulicū
eodē modo. Aut staphidē agrestē stylo cui-
piā acuto infixā, eodē modo. Aut cera dolētī dēti
imposita, specilli extremum calidiss. alsidue adhi-
be. Aut opopanaxē & peucedani succū unita lin-
teolo illigato, & in seruētī oleo liquefacito. Cum
uerō inceperit feruere pharmacū, dēti imposito,
& cū specillo apprimito. utere mane & uesperī. et
simul fomentū forinsecus & intrinsecus uelut dixi,
ante cibū adhibe, similiterq; post cibū, multo
spatio tēporis interposito utere. Ceterum species
fomētī & hæc est. Dentē ualde bene prepurgato,
& agro cōtecto ac hiare iussu, hyoscyami semina
suffuso. q; si ad nullū prædictorū malū ipsum cedat,
& dolor uehemēt̄ perseueret, tenui terebel-
lo dentē perforato, ac dictis remedijs utitor: hoc
enī modo magis profectū cōsueuerūt. si uerō ne-
que sic profecerit, & uideat dēs tollēdū esse, ci-
tra dolēre tollere possis ualde cōueniētī pharma-
co hoc pyrethrū acerrimo aceto ad dies xl. cōdi-
to, terito et reponito: usū uerō exigēte reliquis ce-
ra obturatis & probe munitis, ipsum dolētē præ-
munduratum hoc pharmaco integro, deinde hora
interposita digitis extrahito, aut scalpello excigi-
to. Aut fori cū acerrimo aceto ad multos dies im-
ponito, & excidet. Aut plumbagnem tritam ce-
rato exceptam imponito. Educunt fortiter tithy-
mali succus & fori cum galbano imposita.

De his que Apollonius scripsit in primo parabiliū. 5

Primū quidē eorū caput sunt, collutiōes dentiū
dolorib. cōferētes, quæ nihil amplius habent his
quæ Archigenes tradidit. secūdo loco refert quæ
ad erosos dolētēs dētes imponant & indant: ter-
tiū locū obtinet fomēta & uisitiōes. quartū suffusio-
nes ad dentiū dolores. quinto habent cōmandu-
cations & purgatiōes. sexto gargarisatiōes. septi-
mū postremū capite ea scripsit quæ in dolore den-
tiū aurib. infundunt, quorū nullius mētionē face-
re uolui, cū si quis ea expectat, ex libris illius pēte-
re possit, quoniam adeo difficulter parabilis existit,
ego sanē his quæ Archigenes p̄didit cōrētus sul.
Cū uerō Apolloni⁹ que narib. infundūt cōsequē-
ter tradat, uisū est mihi etiā ea ipsa apponēda esse.

Que in dolore dentium naribus infunduntur, ex Apollonio
in primo parabiliū. 6

Radices betæ succū perse in nasum instillato, et
solus dentium dolorē. Cumini quantū tribus digi-
tis apprehendi potest, & myrrhæ magnitudinē
fabæ, & duplum interioris cucumeris terito, & la-
ctē muliebri mixta in colliriā redigito, eaq; in u-
trāq; narē indito, atq; ita attrahere iubeto, donec
quis quinq; stadia percurrere possit, deinde phar-
macū emungat. Idem ad aurium dolorem facit.

Ne crosi dentes uacillent, neq; foetorem faciant. 7

Veratrum nigrum erui magnitudine melle cō-
cto exceptum cauernis inde.

Ad dentes denigratos. 8

Testam gallainam assatam ac tritam dentibus
affricato. Hoc etiā gingiuas corborat. Aliud,
Sal fossile melle subactum in testula torreto, teri-
to ac modica myrrha admixta similiter affricato.
Aliud, Pulegij partem unā, salis tantundē, melle
subacta in eodem donec in carbonem transferint
torreto, ac trita dentibus affricato. Aliud, Car-
cas exurito ac terito, modicaq; nardo ac melle ad
mixto utitor. Hoc & gingiuas cōprimis. Aliud,
Polentā acerrimo aceto subactam exurito, ac tri-
tam dētib. affricato. Hoc & gingiuas fortificat.
Aliud, Alabastritæ usti drachm. viij. pumicis usti
3. iij. salis torrefacti 3. iij. tritis eodē uerō modo.
Ab horum uisū collutione utendū est, uino odo-
rato in q̄ ad multū tēpus iris sicca fuit macerata.

Que Asclepiades in primo extermorum ad dentes scripsit.

Heracleide Tarentini ad motos dentes. 9

Vtendum est spodio cyprio, ut per id gingiuræ
cōprimant, itemq; uerbasci radicibus cōctis: po-
stea ablutio fiat ex aqua myrti, aut rubi, aut lauri:
deinde spodio rursus admoto, quies præcipiatur.
Aliud, Veratri nigri manipulum, radices mandra-
goræ 3. iij. radices hyoscyami 3. iij. in uas fictile
conijcito, & uini Chij aut Coi quamoptimi hemi-
nas tres superinfundito, ac ad prunas luculentas
ad dimidias coquito, indeq; liquorē excolatū ore
retinendum præbeto. Aridū ad motos dētes.
Terebinthi fructuum torrefactorum drac. octo,
aluminis scissi usti 3. viij. balaustij 3. ij. gallarū 3. i.
croci 3. i. myrrhæ 3. i. tritis utitor. Aliud, Cornū
cerui usti 3. viij. rhois rubri 3. iij. omphacij dra. ij.
balaustij drach. iij. corticis pinus drac. i. myrrhæ
Minnææ drach. i. tritis utere. Collutio ad mola-
rium dolores. Radices smyrnij cum aceto mulso
coquito, & excolatū liquorē ore tenendū exhibe-
to. Aliud, Rumicis agrestis radicem & platani
pillulas ex aceto mulso coquito, atq; ut dictū est
exhibeto. Commanducationes ad molarū do-
lores. Canchryos drach. ij. origani drach. ij. pipe-
ris albi drachmam unam, uuæ passæ albæ aut al-
terius quam pinguisimæ sextarij dimidium. V-
uum passam diligenter tundito, reliqua uerō ori-
ganum uidelicet & canchry, & piper, probe tri-
ta adijcito, misceto, ac instar malagmatis emol-
lito. Vius uerō tempore nucis ponticæ magnitudi-
nē commanducandam præbeto. Postquam
uerō collecta pituita fuerit, agrum hiare ac pro-
nuere oportebit, quo liquor facile profluat. Quo
facto, uinum colluere iubeto. Aliud, Vuæ
passæ pinguis exacinatæ sextarium dimidium, pi-
peris albi acetabulum, grani cnidij drachmas du-
as, spicæ nardi drachmas duas, casie drachmam
unā, pyrethri drach. duas, myrrhæ drach. ij. appa-
rato ac utitor ut dictum est. Ad corrosos dētes
preferuatiuū. Per huius usum conseruauī erosos
dentes absq; dolore. Zingiber cū aceto mulso cō-
quito, ac probe terito; indeq; in cauernā indito,

forisq;

forisq; dentē ex eo integito. Aliud, Hederę la crymā galbano misceto, aut tichymalli, siue ficus syluestris succo dissoluto, ac utitor ut dictum est. Aliud dolorem tollens ad dolentes & erosos dentes. Conducit itidē tulsī. Succī papaueris drach. ij. piperis albi tulsī et cribrati drach. i. myrrhę drach. ij. styracis 3. ij. galbani 3. i. pasci quod satis est his exicipiendis. cōtundito simul & carapodia formato, dentib; circūponito, & cauernæ indito. Aliud, Succī hyoscyami drach. ij. myrrhę drach. ij. opij drach. ij. galbani drach. ij. styracis drach. ij. zingiberis drach. ij. piperis drac. i. succi syriaci tantundē, pasci qd satis est, preparato ac utitor ut dictū est.

Molare emplastrum bonū, quod in multis miraculo fuit. 10

Lacrymā oleæ drach. unam, myrrhæ drach. ij. ueratri nigri drach. i. feminis balsami drach. i. styracis drach. i. piperis drach. i. hyoscyami drach. i. succi papaueris drach. i. castorij ob. quatuor, galbani drach. vi. succi cyrenaici drach. i. succi carpassi drach. i. panacis drach. i. sagapeni obo. quatuor, pyrethri ob. quatuor, staphidis syluestris drach. ij. cedriæ quod satis est, q̄ emplastri formā acquirat.

Aliud, Sulphuris uiui drach. iij. bituminis drach. ij. amurcæ olei drac. iij. picis liquidę 3. viij. cedriæ drach. xij. piperis drach. iij. opij drach. iij. staphidis syluestris drach. unam, ueratri nigri 3. unam, grani cnidij drach. unam, opopanax 3. i. picis aridæ lib. unam. Arida aceto excipito, deinde liquida affundito, ac ablatis utitor: ex pharmaco hoc molaris dens est integendus.

Ad tollendas dentes ut citra dolorem excutiantur. 11

Pyrethrum in aceto coniectum ad dies tres, aut quatuor finito, deinde terito & dolenti denti imponito, uicinis dentibus optime præmunitis, & dolente diligēter præmundato, ita ut per duos aut tres dies dentem ex hoc pharmaco integas: ita enim citra dolorē excutietur. Aliud, Cucumeris syluestris radices eodem modo ut pyrethrum preparato, ac utitor identidē ut dictum est.

De mobilibus dentibus ac prominentibus 12

Relatum a me etiam ante est, quod ob senilem ætatem aliqui dentes ressecati mobiles sunt, modicum omnino auxilium adstringētibus pharmacis quibus gingiue coartant ferentes, referetur autē & nunc quod aliqui ex plaga mobiles sunt. Quidam uerō etiam citra plagam, in quibus coniecturam facio, nerum qui ad radices ipsorum adnatus & substratus est, per multam humiditatem rigatū, laxatū esse, & ob hoc ressecantib; medicamentis ad curationem opus esse. Postquā autem motos dentium reliquis prominentiores factos uidebam, & maxime cum ex plaga id essent perpessi, uisum est mihi eos lima atterēdos esse in tantum quantum super reliquis prominēt, nec scilicet oppositos sibi offendant tum in loquendo, tum in manducando, atq; sanē reperi experimen tum mihi fauēs ac testimonium præbēs. Ferream itaq; limulam quo celerius opus fuisset, feci. Multę enim aggressiones dentē mobilem faciūt, cui quiete et minimo motu opus erat, si saltem stabili debet. Quandoq; igitur eminentiæ in quā

les apparent in dentibus, & iuxta aliquas tantum partes lima opus habent. Aliquādo uerō æquales sunt extremitates, et equali similiter lima indigēt. Oporteret autem gingiuis linteolum molle usq; ad radices dentium circundare, deinde cum digitis sinistra manus leniter amplecti, simulq; tum & citra compressionem, ne concutiatur cum lima adhibemus, atq; ita chirurgiam aggredi. Quod si dolorem percipiat in admotiōe limule, & q̄ affecta pars digitis uehemētius contingat, quiescere quidem ab opere statim conuenit. Vbi uerō ex phar macis quæ post referentur, interea aliquid exhibuerimus, rursus ut dictum est aggredi, iterumq; modice cessare, donec extremitates circa dentes deterrantur, atq; id nō prima tantum die bis & ter, sed etiam sequenti faciendum est, ac imperatūm ægro ut neq; loquatur, neq; durū aliquem cibum accipiat. Vtatur autem alimento succo ptisanę, et sorbitione ex alica, & pane madido, atq; alijs ad hunc modum mollibus. Cæterum materię sylvæ quæ motis dentibus commoda est, talis existit.

Ab Archigene scripta quæ mobiles dentes corroborant. 13

Mobiles dentium stabilire uolens, myrrhę, pompholygis, aluminis scissi, amyli, æquales singulorum partes tritas admoue. aut oliuarum albarum succum & rutam melle mixta affrica, deinde nudum cum alumine liquido obline. Aut alumē rotundum cum duplo sale dentibus adspere. Aut aluminis scissi & misyos æquales partes cum cedria ad cerati liquidi spissitudinem redactas dentibus obline, & pituitam defluere sine quo facto, asinum lac colluant calidum, aut acetum, aut uinum in quo malicorium & galla sunt incocta.

Ad debilitatos dentes, tum alios, tum molares. 14

Mel, ceram, æquis portionibus ad solem calida diluito, & picis dimidium admisceito, ac ad emplastri formam deducito, atq; manducanda exhibeto. Quod si aridum sit pharmaco, parum olei addito. Summē facit & mastiche Chia comman ducata. Cæterum in dētium stupore portulacam manducant, aut oleum calidum ore continent.

De dentitione puerorum, ut Archigenes scripsit. 15

Infantibus qui dentium, si doluerint, canino la tēte gingiuis obline. Aut si leporino cerebello infantis gingiuis illeueris, cito dentes prominent.

Amuleta dolori dentium reluctantia, quibus fidem deberi putant, sunt hæc. 16

Si batrachij siue ranunculi folia ei qui dentem dolet, in eiusdem partis brachium imposueris, dolore quidem liberabitur, brachium autem exulcerabitur, cuius curam prout conuenit facies. Si uerō infans cui dentes provenire incipiunt, dolores habeat, ueteris cochleæ cornu pelliculæ illigatum pro amuleto appende.

De doloribus gingiuarum. 17

Gingiuis dolentibus collutiones ferē eadē faciunt quæ ad dolores dentium descriptæ. Magis autē proprie facit acetum cui hyoscyami radix est incocta. Verum inflammatis gingiuis alumē cum salis quarta parte tritum admoue: post mortuum uerō perceptū, uino aut foliorum oleę deco

ho ipsas colluant, at uerò fluxione laborantibus gingiuis & corrosis cum tumore & dolore, & per nomen depassit, præclare conducit fomentum, quod fit per auriscalpiũ cui lana obuoluta est, in feruens oleum tinctum, & gingiuis usq; quo exæquentur admotũ, & donec circumcirca alba red-dantur. Ita enim sũstitur nomẽ, & ex sana carne id quod corrosum est conũtũtur: postea uerò affric-tionibus utere, & his quæ ad dentes sunt descri-pta: proprie autem conuenit galla tenuissime tri- ta acetabuli mensura, cum myrrha magnitudine fabæ, tritis itaq; ac leuigatis utitor. ¶ Si nascens dens grauitur reprimit & cõpungit gingiua, cype- rũ cũ butyro et unguento iusino iuxta exortũ illi- nito. Cæterũ in Epulide, hoc est supercrescete ex inflammatione carne, atramentũ futurorũ cum pari myrteo, & modico alumine scisso admoueto. Faciunt pleræq; etiam ex antheris, id est floridã ap- pellatis compositionibus.

Que dentes præseruent. 18

Quin & doloris dentium præseruatiua Archi- genes his uerbis tradidit. In dentũ doloribus præ- seruantia à dolore conueniunt eiusmodi. Tithy- malli radices in uino ad dimidias coquito, & his in mensẽ colluito, ac nunquam dolebis. Optime cõseruat citra dolorem, & fortes dentes, si fabam Aegyptiam, reiecto interno amarulento, triueris ac dentibus & gingiuis semel in anno affricueris. Aut alumine scisso cum modica myrrha confrica- to, & nunquam erodentur: si uerò adstringat hoc nimum, melle utitor. Aut granorũ uniperi par- uorum, & cupressi foliorum parem portionẽ, & gallæ parum, melle cocto excipito, & in pastillos drachmæ pòdere reducito, ac utitor unum ex his comãducatõdo, insuperq; uino odorato colluedo. Aut iris illyrica nucis ponticæ magnitudinem mande, similiterq; collue. Aut salĩ gallã ompha- cinen in uino odorato coctam misceto & mandito. Optime præterea tum ad præseruandos à do- lore dentes, tum ad corroborãdos eosdem, ac pa- niter gingiuas, ampliusq; ad decorẽ faciunt smeg- mata subscripta. Lanæ succidã linteolo illigatas exurito, deinde salis tertia parte addita affricato. Aliud, Aut dasypodis caput ustum tritum. Aliud, Aut salem & mel ad cerati formam te- rendo redigito, deinde mundo linteolo illigata exurito, & ammixta iride illyrica modica dentes confricato.

Que Andromachus scripsit ad omnes dentium dolores. 19

Compositio molaris eadem hora dolorem se- dans. Piperis, pyrethri, succi tithymalli, galba- ni, singulorum drach. i. galbano excepta in cauer- nam inde, molaris Antiphanis, etiã si nõ premun- dantis indito, & dentẽ ex ea integito. Seminis hyo- scyami, opij, nitri, myrrhæ, pyrethri, piperis, singu- lorũ drach. i. galbani drach. ij. tritis ex uino utitor. Alia molaris qua utor. Aluminis scissi drach. i. pi- peris albi drach. ij. opopanax aut piperis longi ob. iij. foreos ob. iij. gũmi aqua macerati drac. ij. cere duplũ totius pòderis omniũ, ceram in aqua calida tritam reliquis misceto, atq; ita utitor.

Alia Chereæ. Myrrhæ drach. i. ueratri sesquidrac. pyrethri sesquidrach. aluminis scissi ob. ij. aqua terito, & dentem oblinito, ac superne ceram im- ponito. Alia molaris ex libris Aphrodæ. Alu- minis scissi drach. iij. myrrhæ ob. ij. piperis grana- v. ego ob. tres accipio, & melius facit. Resina ex- cipe, & præmundatæ cauernæ inde, & splenium illitum superimponæ. Alia molaris eiusdem. Etiam non præmundatæ cauernæ hanc inde, & superne splenium ex pharmaco item impone, & probe faciet. Seminis hyoscyami, succi papaueris, myrrhæ, nitri, pyrethri, piperis albi, singulorũ partem unam, galbani partes duas. Cum aceto tri- tis utitor. Alia ex libris Aphrodæ. Succu peuce- dani drach. i. succi papaueris drachm. i. tithymalli myrsinitæ, succi cyrenaicĩ, singulorum drachm. i. galbani drachmã unã & dimidiã. Galbano ex- cipe & in cauernã inde, & ubi præpurgaris den- tem in splenium illine, in una hora dolore sedat. Molaris bona. Scissum alumen papaueris suc- co exceptum indito, & oblinito. Alia ut Ari- stocrates. Papaueris drachmas duas, sagapeni sesquibolum, succi cyrenaicĩ tantundem, piperis drachmam unam, sphondylii tantundem, myr- rhæ tantundem, galbani, pyrethri, croci, singulo- rum tantundem, mel quo strigmentitiam ipsi- tudinem accipiat.

Ad dolores dentium, gingiuarum, aliãq; multa Aristocra- tis grammatici. 20

Mellis lib. i. aceti acris sextarium unum, alumĩ nis scissi sexuncem. aliĩ liquidĩ trientem habent. Coquito donec nigrescat. Ad dentes motos. Alumĩnis scissi partem unam, mannæ partẽ unã, tritis utere, cõspergendo motum ex eis dentem.

Ad erosionem & dolorem dentium. 21

Quinquefolij radices in uino coctas à coena colluendas præbeto: coquito autem ad tertias. Aliud, Rumicis radices cũ uino aut aceto coqui- to, & modicũ auripigmenti triti inspergito, ac li- quorem ore retinendum exhibeto. Coquatur ite- dem ad tertias. Ad gingiuas madore laxas. Pyrethri drachmas tres, thymi drach. duas, alumĩ nis scissi ob. tres, iridis illyricæ drachmam unam: tritis utere, ac gingiuis impone.

Pythij, ad motos dentes, gingiuas humore grauidas, & subcorruptas. 22

Alumen scillum chartæ inuolutũ urfẽ, deinde tritũ rubrica colorat, atq; ita gingiuis admouet, similiterq; subcorruptas inditur.

Dioclis medicĩ ad dentium dolores.

Galbani, opij, piperis, cere, staphidis siluestris, grani cniidij, ling. 3. i. trita cera excipito et illinõto. Aliud comodũ ad corrosos dẽtes. Succũ silphij indito, aut ipsam radicẽ. Aut galbanũ cũ pipere. Aut opium cum galbano. Facit & opopanax in cauernas infartum. Ad dentium dolores. Sorẽs drach. ij. alumĩnis scissi drach. ij. misyos drac. i. ari- dis utitor. Smegma quo uitor gingiuas cõtrahit. Cornu cerui usũ libr. ij. lanæ succidæ teneræ qua- drantem, salis ammoniaci trientẽ, piperis albi sex- tantẽ, costi unc. i. alumĩnis scissi sextantẽ, lãtisei, & perdicij

perdicij herbe uſta cum lanis, aut per ſe ſolum, utriuſq; quartam libræ partem, foliorum malabathri unciam unam, contuſis ſimul utere.

Que Crito ſcripſit ad omnes dentium affectiones, quedam ex eis etiam gingiuis conſerunt, & ad ſaxorem oris, & ni gros in ſuperficie dentes. 23

Ordeũ & ſalem melle ac uino ſubacta in chara ligato ac uſito, & ex leuigatis gingiuas confricato. Aliud, Atramentum ſutorium, alumẽ, putamina mali punici dulcis, æqualibus partibus trita ac leuigata, gingiuas in ſeiuino affrica: deinde uino adſtringente collue. Aliud ad gingiuas ulceratas. Nitri uſti, cyperi uſti, utriuſque pares partes leuigatas cum melle illine. Aliud ad gingiuas & dentes motos. Iridis trientem, corticis pinus trientem, aluminis ſciſi unciam unam, aridis utere. Aliud ad motos dentes. Lentifcum, myrtũ, gallam, in uino cocta colluenda præbeto. Aliud, Salis partes duas, aluminis ſciſi uſti & acri aceto extincti partem unam, tritis utitur, deinde uino colluto. Ad motos dentes ſta biliendos. Atramentum ſutorium cum oleo terito, & cum lana dentium radicibus admoueto. Facit & ad eroſos dentes cera exceptum & indutum. Item cum myrto pari tritum ac melle exceptum. Aliud, Vlmi corticem in uino coquito, & decoctum ore tenendum exhibeto. Item cerui cornua in uino cocta. Ad corroſos uerò dentes capparidis radicem cum acri aceto ad dimidias coquito, ac tepidum colluito. Cortice item eodem uitor modo. Idem ad dolores facit. Fomentum dentium corroſorum & dolentium. Sulphuris uiui partem unam, butyri partem unam, li queſacito, & cum his per aurifcalpium foueto. Aliud, Dentes ex ſale præſtrato, & lixiuũ tepefaatum mediocri tempore in ore contineto. Oportebat hic apponere, In gingiuarum dolore hoc conuenire.

Compoſitio molaris eadem hora ſue die dolore ſedans. 24

Piperis, pyrethri, ſucci tithymalli, galbani, ſingulorum drachmam unam, terito & galbano excepta in cauernam indito. Alia, Piperis ſequiobolum, granĩ cnidij tantundem, galbani ſequiobolum, ſpuma nitri obo. duos, croci ſequiobolum, iridis ſiccæ ſequiobolum, roſarum tenerarum drachmæ dimidium, trita melle excipe, & ad emplaſtri formam redactis molarẽ dentem intege. Ad corroſos molares. Melanthium torrefacito & ex acri aceto terito, indeq; molarũ cauernam integito, & non amplius erodetur, ſed manebit ut eſt. Quidam etiam nitri drachma una acri aceto utuntur. Ad idem, Caſtorij, pyrethri torrefacti, galbani, ſingulorum æquales partes mixtas indito. Ut molaris citra dolorem tollatur. Farinæ cicerum puræ drachmas duas, ſuci tithymalli exceptas denti imponito, ſupraq; hederæ folia addito, & ad horã ſinito, tollito, & ſua ſponte in minutas partes frægetur. Facit idem ad eroſos. Verum uſus tempore ceram emollitã circumponito. Aliud, ut dens digitis tollatur. Præmundato antea circumcirca dentẽ, & foreos, gal-

lae omphacines, ſtaphidis ſylueſtris, aluminis ſciſi, ſulphuris uiui, piperis longi, æquales partes leuigatas cedria excipe & impone, ceraq; liquefacta dentem circumline. Eijcit ipſos etiam pyrethrum, & tithymalli myrſinitæ ſuccus cum farina erui ad maſſa fermenti modum coactus & impoſitus. Aut pyrethrum ad dies quadraginta aceto maceratum & denti circumpoſitum. Aliud ad ſauciatos. Caſtorij, pyrethri, opij, galbani, ſingulorum æquas portiones mixtas indito.

De dentificiorum compoſitione, quibus uitor. 25

Quedam ex dentificijs a me compoſitis experimento comprobata, & generoſa efficacia prædita, digna mihi uifa ſunt quæ conſcriberentur, et primum ſanẽ ea quæ frigidas dentium affectiones curant, ſiue ob immoderatam frigida aqua potionem, ſiue ex fructibus per niuem frigeſactis, ſiue ex quibusdam alijs edulijs, aut potionibus ſint productæ. Inſuperq; ſi propter frigidum humorem è capite in ipſos deſtuentem ortum habeant. Dentes igitur ob humorem refrigeratum magnifice uiuat apophlegmatifimus, quomodo uerò hic præparare oporteat, alio capite priuatim conſcriptum habes. Eos uerò qui citra humorem frigeſacti ſunt, per ſolum medicamentũ hoc quod nunc referetur curare decet. Præſtat eo etiam poſt apophlegmatifimum uti, ut non ſolum nocium euacues humorem, ſed etiam generatam ab ipſo affectione perſanes. Compoſitio pharmaci hoc modo habet. Accipito herbas duas, quarum altera ſi deritis, altera perdicias appellatur, eaſq; domiſſim citra ſolis admiſſionem ſiccato, ut neq; humidẽ amplius, neq; ſiccæ adeò extent, & uirito in tantum, ut ubi primum contuſioni & ſectiõni aptæ fuerint, ab utendo ceſſes: uileſcit enim & corruptur uis earum ſi diutius urantur. In alia ponitõ lula ſal ſoſſilis uratur cum alumine ſciſſo, Attico melle ſubactus. Deinde hæc alijs permixta tundantur, & per anguſtiſſimum excreta cribrũ, rufus in mortario terantur. Melius enim erit pharmacum, quanto diligentius fuerit leuigatum. Vtendum autem eo eſt ſolum ad dentes confricandos, citra gingiuarum circumſitarũ contactum, niſi humore fuerint prægnantes. Cum enim relicquidũ habeat pharmacum, aptum quidem eſt gingiuis humentibus, inimicum uerò ſiccis: at tamen ipſas dentium radices poſt gingiuas ſitas, eo confricare oportet itidem ut ipſos dentes. Ceterum eorum quæ in compoſitionem miſcentur, eiufmodi ponderum proportio eſſe debet. Herbarum quidem poſt uſtionẽ drachmas ſedecim. Salis uerò cum alumine uſti drachmas undecim. Ante uerò uſtionem utriuſque herbe par pondus miſceatur. Sal autem quadruplici aluminis pondere ammiſceatur. Aliarum autem rerum nihil uratur, ſed arida inijciantur iuxta ſubſcriptam apponderationem. Comæ origani drachmas ſi; piperis drachmas nouem, in alio exemplari drachmas duas, pyrethri drachmas duas, coſti drachmas tres, ſeminis apij drachmas tres, iridis ſilyricæ drachmas quinque, mentæ ſiccæ drachmas duas, cornu cerui

aut capræ usti drach. ij. sefeleos, hyssopi, utriusque drach. ij. Si odoratum uel uelis, casia aut amomi drach. ij. ammifecto. Si uero in regis usum præparaueris, cinamomi drac. i. addito.

Ad mobiles dentes aliud, quo utor, 26

Seminis callitrici libram unam, aluminis scissi & rotundi utriusque quadrantem, spicæ nardi sextantem, malabathi foliorum unc. i. piperis albi unc. i. pyrethri drac. v. cōtundito & cribrato simul omnia, ac gingiuus usque ad radices dentium admoueo. Timocratis dentifricium. Ad gingiuas madore laxatas, putrescentesque ac cruetatas, mobiles molares, cōcussos dentes, ozanas, putrefactiones, parulidas, & omnia oris uitia, ac dentium dolores. Accipito herbe perdiciaedis modium italicum, alij minam habent, salis albi tenuis sextarium unum, mellis hexagium. Contundito ut massa friabilior reddatur, qua in ollam nouam coniecta, ollam luto figurino obturata; operculum autem adaptetur circa medium perforatum, quo per ipsum foramen rudicula immixta pharmacum super prunas positum agitetur, donec neque fumosum quippiam neque uaporem effertur. Deinde ab igne tollito & refrigerato. Et sumito ex hoc toto, drac. xiiij. piperis albi drachmas quinque, piperis nigri drach. vi. pyrethri drach. vi. aluminis scissi usti & uino austero extincti drachmas ij. pumicis, myrrhæ, hyssopi, seminis apij, pulegij, singulorum sextantem, mentæ, iridis illyricæ, utriusque drachmas iij. Hæc omnia in sole præsecata tundito & cribrato, ac reliquis ex olea leuigatis, ammifecto. Aliud. Perdicij recentis drachmas x. mellis drachmas iij. aluminis scissi drach. iij. iridis illyricæ drac. iij. piperis albi drachmas viij. nigri drach. iij. pumicis drach. ij. myrrhæ drach. iij. pyrethri drach. ij. mentæ sicca drach. iij. hyssopi drach. ij. pulegij drac. ij. seminis apij drachmas ij. herbe sideritidis drac. iij. salis fossilis drachmas xiiij. Perdicij & sideritidem ac mel & salem mixta urito; alumen uero per se usum uino extinguo, deinde simul omnibus confusis utitor.

Aliud. Salis affati cum melle & perdicio drachmas xiiij. aluminis scissi, affati, & uino austero extincti, iridis illyricæ, utriusque drachmas quatuor. helxines, myrrhæ, mentæ sicca, singulorum drac. iij. pulegij sicci, pumicis, pyrethri, hyssopi, seminis apij, singulorum drach. ij. folij malabathi drac. ij. piperis albi drac. v. nigri drach. vi. Tullis & cribratis utitor. Aliud. Salis tosti cum melle & perdicio drach. xiiij. pulegij drac. ij. aluminis scissi usti & uino austero extincti drach. iij. iridis illyricæ drach. iij. piperis albi drach. v. nigri drach. vi. pumicis drach. ij. myrrhæ drach. iij. mentæ drach. iij. pyrethri drach. ij. hyssopi drach. ij. seminis apij drachmas ij. Sal lotus, melle probe subigitur, tritusque in ollam nouam mittitur. Deinde etiam perdicium inditur, sale undique conspersum; quo facto, operculum olle imponitur, ipsaque luto oblita in clibanum datur, indita torrentur, & exempta simul cum alijs teruntur. Oportet enim ualde leuigata in usum adsumere. Smegma dentium quo albi & odora redduntur, & ab erosione adseruantur. Nitri

Galen.

unciam unam, testæ sepia unciam unam, myrrhæ unc. i. tritis utitor. Dentifricum optimū. Aluminis scissi sexuncem, mastiches unc. i. comæ rosarum quadrantem, iridis trientem, tritis utere, indeque aquam tepidam colluendam præbe.

Dentifricium Democrati inscriptum. 27

Libellus paruus extat Pythici appellatus, quem Democrates Pythicum inscripsit, ab eo qui ipsi pharmacorum ueri destinatorum compositiones tradidit appellatione ducta, in quo sanè libello iuxta finem etiam hæc conscripta reperiuntur.

Si dentifricijs uoles uti bonis, Quæ candidos custodiant, immobiles Dentesque reddant, oris & graueolentiam, Laxasque gingiuas sedent, & comprimant. Album hoc parabis optimū sic pharmacum. Cerui cape cornu sic quater usti quam optime, Quartam libræ partem, salis solam libram.

In alio exemplari sic reperi.

Cerui cape cornu sic quater usti quam optime, Libram mediam rursus salis uncias duas, Ammoniaci sicci nec amari hinc amplius, Alicæque, mastiches chiæ, solam libram. Costi quadrantem, aut paululum quid amplius, Albi que iunci tantum, & albi mox piperis Vnam unciam, malabathi at uncias duas. Contusa, cribrata omnia hæc mortario Vtenda præbebis modo quem dixero. Quod si uelis parare quando ad phlegmonas, Et utile gingiuus cruentis, saucijs, Carnemque callosam simul prominentibus, Aluminis coniungito his scissi libram.

Aliud Democratis dentifricium.

Verum magis parabile hoc fortasse erit, Et promptius factu, minus nec commodum, Admixta & hoc quadam simul dulcedine. Multum Sideritium utridem capito herbulam, Magnam in noua quam tu patinam mox indita, Mitcebis ordeo recenti sed modico. Sic ordeo ut posito sequatur fasciculus Herbæ, sal hinc, herba atque iterum, mox ordeum. Fiantque tam diu uicissim hæc omnia Donec patinæ omnem experis amplitudinem, Ut mox supernum rursus herba habeat locum. Furnoque mox calente, uel clibano indita; Torrenda per noctem lines, uel sic potius Vrenda, quo teri queant ita promptius, Cribroque mox fed arctiore hinc excuti. Odoris addes gratia his, parum tamen, Albi piperis thurisque mox item modicum, Hinc iunci odori plus, cyperi que optime. At omnibus mixtis probe & iam sepositis Plus mastiches aridæ chiæ coniunxeris, Dabis sed hinc in uesperam uolentibus, Maneque rursus maxime puris uiris. Sed colluunt à pharmacum mox Bromium Lymphis sociatum, & maxime hoc in uesperam, Sed mane acetum mulsam aquosum præstiterit, Oris leuandis turpibus foetoribus.

28 Aliud Aurelij. Alumen in testa area aut figulina urito, ac uino austero extinguo, eiusque

tom, 5

D

dodran

dodrantem accipito, & mastiches sexuncem, thuris unc. i. folij malabathri drachmas quatuor. cype ri drac. iij. misceto ac utitor. Aliud quo utor.

Cornu cervi usqi drach. ij. marmoris unc. i. origani drach. quatuor. utitor.

Compositio pharmaci dentes preseruantis. 29

Tragorigani drach. ij. hyssopi drach. iij. herbæ perdicij seu perdiciadis, melle & sale tenui subacta, & in olla exusta, donec in prunas redigatur,

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI VI

Cap. I. De affectibus in ore, & de pharmacis ad eas commodis. 2. De stomachico medicamento ex nucibus.

3. De mediocri pharmacorum compositione. 4. De pharmaco ex malis punicis, & malis, alijsq; stomachicis. uide sect. 9. 5. Pharmaci ex musto, & parabilia diuersa. uide sect. 10. 6. Titulus siue promissio sequentium stomachicorum. 7. 8. Pharmaco ex moris, primum secundum Heram, deinde Andromachum. 9. Stomacum ex malis punicis, Andromachi: uide sect. 4. & 11.

10. Andromachi stomachicum ex musto. uide sect. 5. & 12. 11. Critonis stomachicum ex malis punicis. uide sect. 9. 12. Eiusdem stomachicum ex musto. uide sect. 10. 13. Stomatica citra succos composita ex aceto & galis. 14. Stomaticum ex besafa, id est semine rutæ syluestris secundum Andromachum: deq; hirundinibus, & alijs simplicibus unde constituitur. 15. De eodem se-

quadrantem. piperis drach. iij. tundito & cribrato, & post usum reponito. Neq; dolebunt dentes neq; findentur, neq; parulides producentur, neq; gingiue superflua carne redundabunt, neq; fluxio ne infestabuntur. Habebis autem os odorum, & splendidos dentes. Quidam balsameta in olla exusta ad pharmacum addunt, aut etiam cybium. Si quis enim eorum cinere per se utatur, dentis dolo rem non percipiet.

cundum Heram. 16. Aliud ex hirundinibus absque besafa. 17. Aliud ex hirundinibus secundum Hippocratem. 18. Titulus & promissio sequentium oris illitionum. 19. Andromachi, ad columellam laxatam. 20. Eiusdem, ad omnia uitia oris. 21. Asclepiadis illitionis stomachica. 22. Illitionis oris apte eis qui medicamentarias illitiones ægre admittunt. II. De crustis in ore. 2. Crito ad crustas. 3. Archigenes. 4. Musa ad anginam & crustas. 5. Heraclides ad crustas in ore. III. Ad columellam siue gurgulionem. 2. Archigenes ad gurguliones inflammatos. 3. Apollonius. 4. Heras. 5. Heraclides Tarentinus. 6. Asclepiades. 7. Crito. 8. Soranus. IIII. De pharmacis ad aphthas, id est ulcera oris. 2. Andromachus ad aphthas. 3. Crito. 4. Asclepiades. 5. Apollonius. 6. Archigenes.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

PHARMACORVM SECVNDVM LOCOS, LIBER VI.

De affectionibus in ore, & de pharmacis ad eas commodis. Cap. I



ERVS profecto sermo est, quem pleriq; artifices in ore habent. Quod non idem sit, neq; simile, à uiua uoce discere, & ex libro legere. At uero industrij & natura prudentes homines, non uulgarem sæpe utilitatem consequun-

tur, si in libros incidunt non obscure conscriptos. Itaq; quum sciam non paruum utilitatem ex hac tractatione, primum quidem amicis ac sodalibus accessuram esse, qui uidelicet etiam per opera cognouerunt quantam uim habeat rationalis Methodus ad medicamentorum copiam parandam: deinde uero etiam alijs qui optimarum rerum studio se fatigare non cessant, rem gratam facere uolens, ad huius operis explicationem progressus sum, non festinabundo, & compendiario docendi modo in hoc instituto, sed prolixo & longiore, quali etiam in sermonibus, quos frequenter citra scriptum ad amicos habeo, uti soleo. Præstat rationalis auxiliorum inuentio experimentatrici: quemadmodum etiam ante iam mihi in sermone de faciatis neruis dictum est, in cognitione uniuersali facultatis pharmacorum, quorum usus circa singulas affectiones contingit. In pharmacis itaque ori destinatis; ob id stomachicis appellatis; uelut est quod

ex moris constat omnibus notum, primus medici scopus est communis omnium partium inflammationum, deinde consequenter alter scopus priuatus ex ea quæ curatur. Quæ igitur sit affectio inflammationum prius nosse oportet, si ex ipsa indicationem quadam auxiliorum accipere uelimus. Prædidicimus autem & prius demonstratum habemus, Inflammationes ex calidi sanguinis influxu fieri. Didicimus etiam quod hunc ipsum influxum in principio quidem reprimere ac repellere oporteat, præterquam si ad partem aliquam principalem recursum sit, atq; aliud quoddam grauius malum effecturus. Verum nunc adeo nihil opus habemus eiusmodi determinationibus, sed uelut memores adhuc simus quomodo totum corpus præparare, ad curationem effectuum circa quancunque partem consistentium oporteat, ad institutum progrediar. Etenim uenæ sectione utimur, & purgatione, & clysteribus, & inedia, ubi totum corpus apparuerit aut multitudine humorum repletum, aut eorundem malicia uitiatum. Si uero neutrum horum adsit, statim ad curationem per loca remedia peruenimus. Quomodo igitur inuenire ipsa oporteat eum qui oris inflammationes rite curare uelit, præsens sermo statim te docebit. Quo modo uero inuentis conuenienter uti oporteat sodalibus in memoriam reuocabo, qui sæpe uiderunt me pharmacis eorum medicorum quime in consilium aduocarunt, curantem eas affectiones, qua-

quarum gratia uocatus fui. Impossibile enim est pharmaco rite uti eum qui uim ipsius non noscit, iuxta cuius efficaciam auxiliatur. Eodem igitur modo in inflammationibus in ore consistentibus, communis scopus omnium ipsarum si assumpserit ex natura particulae indicationem, reperiet primum quidem genus pharmacorum quibus uti conuenit. Deinde consequenter etiam particulares in ipsis differentias si quidem praecognouerit simplicium pharmacorum facultatem, uelut iam saepe est demonstratum. Genus igitur repellentium pharmacorum in principio inflammationem, in refrigerantium materia situm est. Haec autem ipsa quum duplicia existant ut didicimus, Quaecumque atringendi natura praedita sunt, efficaciorum uim habent ad influxum citius repellendum. Inest autem ipsis statim etiam uis cogendi & densandi superficiem corporis, cui adhibentur. Communis igitur scopus hic est prohibendi incipientes inflammationes, ab ipsius affectionis indicatione inuentus. Alter uero a particulae quae curatur natura ipsi accedit: quum sciamus rariorum esse ac molliorem superficiem tunicae oris, non paulo quam est cutis, quae totum corpus ambit. Inest autem & aliud quiddam particulis oris, atque id duplex, quod non adest ipsi cuti. Insuper autem enim medicamentorum quae adhibentur sentiunt, & duos meatus subsistentes habent, per quos in uentrem & pulmonem defluere quippiam ex stomaticis pharmacis potest: quale est quod per atramentum futurum constat. Et sane medicus neque imprudens, neque inexpertus facultatis pharmacorum, ubi hoc misceuerit pharmaco ori destinato, multo quidem fortius ipsum reddet, uerum uehementer laedens, si quidem ad guttam, aut asperam arteriam extremum quid praeterlabatur, atque haec quidem ut statim occurrant, per ipsa uero & uentrem, & asperam arteriam, & pulmonem. Adest autem pharmaco ipsi circa guttum insuauitas, quae tunc uisus tempore molesta est, tum per totam perseuerat diem, ad eum ut etiam in cibis accipiendis inuocanda sit. Huiusmodi itaque fortibus & quae ueniosam habent facultatem non conuenit uti, ad affectionum oris curationem, nisi magna necessitas urgeat. Neque uero de inflammationibus solum hunc sermonem intelligere oportet, quum neque ex harum indicatione ipsum inuenimus, sed commune esse de omnibus oris affectionibus intelligendum est, ut qui indicationem ex ipsa particulae natura habet. His igitur consideratis ab eo qui pharmacum ex succo mororum compositum primum quidem ipsum cum melle coxit, quo repositum in promptu haberet per totum annum, non illo tempore solum, quo expresso fructu, succo uti licet. Melior enim solus est incipientibus inflammationibus, ideoque me saepe ipso in huiusmodi inflammationibus uti uisistis. Durabilior autem est priuatim cum melle apparatus. Appellauit autem durabiliorem, non solum quod cito corrumpitur citra cocturam cum melle repositus, ita ut sequenti anni tempore eo uti non possimus: sed etiam propterea quod utilior est, ad se-

quentia inflammationis tempora, usque ad perfectam curationem. Quemadmodum enim in principio commoda sunt pharmaca id quod influit repellentia; Sic post principium usque ad finem, pharmaco opus est ex utroque mixto, repellente uidelicet & discutiente facultate praedito: ac primo quidem tempore adstringens praecellere oportet, ad finem uero discutiens, interposito uero tempore aequales utrorumque partes esse conuenit. Quando uero uelut induratum quiddam de inflammatione relinquitur, penitus non conuenit adstringens ad discutitorium ammiscere, nisi prius totum corpus sit euacuatum. Atque neque in principio bonum est discutitorium adstringenti ammiscere. Caeterum qui pharmacum ex succo mororum compositum, parum ex croco & myrrha ei commiscuisse uidetur, quod commune habent facultatem concoctoriam inflammationum: priuatim uero crocus quidem adstringat, myrrha autem calfaciat, intantum ut sufficiens discutiat. Penetrat enim magis in altum corporum myrrha quam crocus, atque potest substantiam tenuium partium habens, utpote hoc dupplicem utilitatem exhibet, simul introducens quidem secum uires ammixtorum, & persanans usque in altum inflammata. Et tamen adiuuant se mutuo crocus & myrrha in penetrando in profundum, crocus quidem uelut impellens myrrham: myrrha uero uelut dux praecedens peditem sequentem crocum, si ita dicere liceat, deducens. Quemadmodum enim crocus ob adstringendi uim, minus habet substantiam tenuium partium quam myrrha: Sic myrrha substantia tenuiorum partium praedita, citius quidem uim suam in altum transmittit: citius autem etiam ad cutem recurrit, simul secum efferens ea quae in profundo sunt attenuata. Hanc igitur re cursum eius uelocitatem impediunt adstringenti mixturae: non enim hoc solus facit crocus. Est itaque in pharmaco stomatico ex moris appellato, tum mororum succus, qui non modicam habet adstringentem qualitatem & facultatem, tum alia quaedam etiam ammiscetur ubi quis forte pharmacum reddere uelit. Haec igitur adstringentia deducuntur quidem per myrrham, quae uicissim ab illis compellitur, atque ita se mutuo adiuuant, quo uis ipsorum amplius progreditur. Uisistis autem saepe me ad pharmacum ex moris in principio quidem Rhois succum, aut uix acerbae succum, quem priuatim omphacium appellant, ammiscere. Si uero haec non adsint, florem rosarum, aut ipsas rosas secas, balauitium, cytinis, & malicorium aridum, & galiam omphacitin appellata. Amplius autem & pinicorticem, itemque thuris, & tum hypocythidis, tum lentisci succum, & ut compendio dicam, omnia adstringentia, praeterea ea quae corruptem habent facultatem, quam ueniosam uocant, & lethalem species quaedam existit. Didicistis enim quod non omne lethale statim etiam est ueniosum. Quemadmodum autem in principio inflammationis harum rerum mixtura fortius efficit medicamentum stomaticum: Sic quum restiterit quod influit nullo eiusmodi opus habet solo. Sufficit e-

nim tunc id pharmacum quod crocū & myrrham
 assumpfit ad inflammationem concoquendam.
 Nam ubi iam fuerit concocta, addimus etiam ali-
 quid ex discussorijs, uelut sæpe uidistis me iniicere
 spumam nitri, & aliquando ipsum nitru, quod
 tenuium partium existit, & iam ab omnibus Bere-
 nicium appellatur. Ultra hoc etiam sulphur uiuū
 uocatum, aliquando etiam sapam, origano quan-
 doq; incocto, interdū etiam hyssopo, aut alio quo-
 piam simili, pulegio uidelicet, thymbra, thymo, ca-
 lamīntha hortēsi ac agresti. Hoc igitur modo quis
 recte utetur pharmaco ex moris, si iuxta indicatio-
 num uniuersalium quantitatem ipsius usum per-
 mutet. Quousq; enim quicquā infuserit, id ipsum
 repellere conuenit. Vbi uero resisterit, concocto-
 ria afferre, & deinde consequenter discussoria. Ma-
 nifestum enim quod per huius methodi usum, ne-
 mo qui simplicij pharmacorū facultatem nouit,
 unquam auxiliorū inopia laborabit, siue per mo-
 res uenetur, siue quid operetur in agro, siue in pe-
 regrinatione quandoq; præparatis careat medica-
 mentis, uelut Erasistratus scripsit, qui seipsum cu-
 rauit ad rubi succum progressus, quum in illo loco
 Andronij passillus præsens non esset. Quum enī
 sciret passillum Androniū in adstringendo curan-
 di dominium habere, materiam adstringentē per-
 quisit. Non uelut Serapion & Menodoros aiūt,
 empirica transiōne ad simile usus. Iuxta hanc em-
 uobis demonstrauit plurimā dissimilitudinem suc-
 ci rubi ad passillum Androniā esse, paucissimā
 uero similitudinem iuxta unum solum, uim uideli-
 cet adstringendi. Verum qui generalem facultate-
 m quam uniuersalem uocant, nouit; in quacūq;
 materia eam repererit, confidenter ea utetur. Hu-
 iusmodi autem materierū ingens est aeruus, qui-
 bus omnibus uti licet, ita ut solum fugiamus quæ
 uim quandam iniucidam aut uenenosam habēt.
 Sic igitur etiam ego pharmacum ex succo nucum
 utridium præparauī, nullo doctore usus, neq; ali-
 quod præscriptum sequutus. Cuius uim expertus
 sum multum aliorum stomacorum facultatē ex-
 cedentem, alia autem dico, id quod ex moris con-
 stat, & id quod ex succo rubi mororum præpara-
 tur. Ita enim rubi fructū appellant, & tertiu quod
 ex musto, & quartū quod ex punicorum succo, &
 quintum id quod per adstringentia mala compo-
 nitur, ex quorum numero optima sunt cydonia &
 struthia appellata, & post hæc ad præsentem u-
 sum quæ Cestiana à Romanis appellantur. Cæte-
 rum composita ex multis talibus sunt, quæ ex fru-
 ctibus præparantur.

De stomatico medicamento ex nucibus. 2

Ego autem quando primum ex Alexandria in
 patriam redij, agrum pertransiui & inueni quen-
 dam hortulanum ab uua & tonsillis ac glandibus
 ferè suffocatum: utebatur autem collutione aquæ
 mulsæ in rosis in ipsa incoctis. Quum igitur uidi-
 sem fructū nucū in uigore esse, iussi detractum ab
 eis externum corticem, quo etiam tinctores uide-
 ram utentes, statim in mortario contundi, & suc-
 cum eius per linteum excolari nondū sciens quo-

modo iuxta crassitiem aut tenuitatē haberet; quū
 uero reperissem aquosum & cōpage tenuem, gar-
 garisare eum iussi ipsum hortulanum. Postquā ue-
 ro ualde tenuis apparebat, præcoxi: & mel cōmen-
 surate, uelut in eo quod ex moris fit fieri sciebam,
 ammiscuitatq; ubi iam ad compagem mellis reda-
 ctum esset, hortulano utēdum reliqui. Porro quū
 uiderem celerrimam utilitatem ipsi inde oboriri,
 præstabile ratus sum in multis experiatq; ex hoc
 sufficiente experimento accepto de facultate eius
 pharmaci, semper ipso utor, uelut noctis. Merito
 itaq; mirandū nullū ex prioribus medicis aliquid
 de hoc pharmaco mente concepisse, ut tum para-
 bilis, tum generoso hoc succo uterentur, maxime
 quum uiderint quomodo etiam manus inficiantur
 eorum quī uirides nuces decorticant. Ex his e-
 nim apparet qualis sit earum succus, & quod ægre
 elui possit ipsarum adstringendi uis, adeo ut neq;
 per fortissima exterioria elui queat. Amplius au-
 tem adhuc miratus sum de medicis quod non co-
 gitauerint fortem esse ipsarum uim, quū etiam tin-
 ctiores uideant eiusmodi nucum corticibus uti. Ni-
 si enim in profundum manuum descenderet, & ni-
 si per omnem substantiā lanarum penetraret, non
 certe ægre eluibilis esset. Quum uero descēdat, in-
 dicat planē substantiam succi tenuium partium es-
 se, rationi autem consentaneū est adstringēdi eum
 maxime proficere, ubi in eiusmodi substantia con-
 tineat. Etenim quæ ex adstringentibus crassas par-
 tes habent, per adstrictiōnem cogunt & conden-
 sant superficiem corporum quibus adhibentur, &
 à progressu in altum ipsorum corporum sese im-
 pedunt. Quibus enim etiam aliās ob substantiæ
 crassitudinē impossibile erat progredi in altum,
 his sanē amplius impossibile fuerit densato corpo-
 re iuuare id quod torum est inflammatum. Opti-
 mum itaq; esse nucum succum persuasus, ut quæ-
 tiam coctum cum melle gustarim nihil in sua ue-
 hentem, eum in quatuor partes diuiso, & ad pri-
 mam statim aliquid ex adstringentibus iniicio,
 ad secundam ex croco & myrrha, ad tertiam sul-
 phuris quiddam ac nitri addo; quartā uero solum
 sinceram seruo, pueris utilem futuram ob dulcor-
 rem. Imò etiam uiris ob delicias mente fractis, &
 mulierculis. Ego quidem igitur à ratiōe inductus
 inueni, quemadmodum neruorum sauciatorū cu-
 rationem, ita etiam hoc pharmacum quod omni-
 bus præstat. Est equidē id quod ex rubi moris con-
 stat, fortius eo quod ex moris fit, quemadmodum
 hoc eo quod ex musto paratur. Omnibus autem
 his præstat id quod ex nucum succo inuenimus,
 in principijs quidem inflammationū cum his quæ
 fortiter adstringunt cōfectum: in uigore uero cro-
 co & myrrha additis, quanquam etiam solum ali-
 quando moderatas inflammationes sanare queat.
 quando uero humorem qui inflammationem pro-
 duxit impactum digerere ac discutere oportet,
 cum acrimia mixtura commodum existit. Verum
 dixerit fortassis quispiam mihi ex medicis paupe-
 rioribus, se amplecti quidem ipsum medicamen-
 tum, si unam pyxidem expleri iubeam hoc phar-

maco semel præparato, Me autem præcipere, aut statim à principio quatuor facere compositiones, aut unam ex melle & succo compositam reponere, atq; usq; usque etiam ammiscere, usquequo quidem influxerit quippiam inflammatis, ea quæ uehementer adstringūt, postquam autem quiesuerit fluxus, concoquantia; ubi uero euacuationem postulauerint ea quæ influxerunt, discutientia; operosum autem hoc esse & difficile his qui domi nō habent supellestem omnium simplicium pharmacorum. Imō neq; ad peregrinationes me commoda cōfectione exponere, in quibus impossibile sit quatuor uniuersusq; medicamēti differentias circūferre: Ob id igit̃ excogitata sunt tū mihi tū alijs etiam prioribus medicis, pharmaca medias facultates habētia, & ad peregrinationes idonea futura, & pauperibus medicis utilia. Quæ uero hæc ipsa sint, paulo post referam. Nunc autem pauperum medicorum sermoni respondere uolo. Quem admodum enim ipsi exilem apparatus laudant; sic oportet etiam diuitibus permittere, ut cōfectiones pharmacorum pro opulentia suæ dignitate comparent. Satis enim scio etiam ipse, non solū multos pauperes esse medicos, sed & qui ab ipsis curantur, quibus satis est ubi ægrotēt, alicam cum aqua mulla accipere, & mundum panem habere, aut aliquā farinam utilem ad cataplasma. Verum eum qui curandi tractationem scribit, omnis materię meminisse operæpretium est, quo tum diuitibus copia sit ipsis artificioso utendi, tum pauperibus electio siuillarum tantum, quibus unusquisq; pro oportunitate abundet.

De medicorum pharmacorum compositione. 3

Dicamus igitur iam aliquid de cōpositione medicorum pharmacorum, in initio ab eo quod ex moris constat sumpto. Commune est autem omnibus medijs, ut congruens modus mellis ad succum ipsum decernatur. Inuenitur autem hic modus per experientiam. Vbi enim succum ipsum cum melle miscueris ac gustaueris, si quidē apparuerit moderate habere, rursus similiter ea miscebis. Si uero deficere quid uidebitur, addes. Velut exempli gratia, In mororum succo si quinta pars mellis addatur, medium fuerit temperamētum, ut hoc modo coctum pharmacū plurimis ualde placeat, & hæc mixturam pauci reprehendant, alij quidem uelut dulciorem, alij uero ut austriorem. Quemadmodum enim aliqui aquam mullam dilutiorem, alij qui dulciorem libētius bibunt, Sic etiam his pharmacis utriq; delectatur iuxta propriam naturam. Quando igitur aliquis pharmacum sibi præparari postularit, semper utiq; uidistis me ei qui dulcioribus delectatur, plus mellis iniicere, qui uero contrarijs, minus. In pharmacis igitur quæ deglutiuntur maxime coniectare oportet naturam eorum qui ipsa sumunt. Quod enim cum molestia aut iniucunde acceptum est, stomachum subuertit. In pharmacis autem stomaticis eiusmodi sinceritatem aliquando contemnere licet. Meditum itaque temperamentum, uelut dixi, succi ad mel, quintuplum habeat multitudinē succum. Audito autem

Galent.

A me diligenter animaduertens quibus utor uerbis in symmetria seu cōmensuratione medicamentorū quæ inuicem miscentur. Iam etenim præcepi quintuplum esse debere multitudinē ipsum succum ad mel, quod nihil differt ab eo si dicam mole quintuplum esse ipsum oportere. Vt uero in modo dictatur, mensurare oportet pharmaca permiscenda. At uero si pondere iubeam quintuplum esse hoc pharmacū, per lancem utiq; facere oporteat symmetriam grauitatis ipsorum. Caterum ad permutationem succi ad mel, non est necessarium heminae aut cyathi meminisse, sed sufficit dicere, quintuplum esse oportere succū, mellis respectu. Si uero quid aliud his ammiscēdum sit ex dictis paulo antē, necessarium est dicere, quota quantitatis mole ipsis existentibus, quantum addendum sit illorū in lance appensorum. Velut in ipso adeo pharmaco ex moris, in Heræ Cappadocijs medicamentario libro, Mellis coniicitur libra una, succi autem mororum lib. vi. ammiscet autem ipsis croci drac. i. myrrhæ duplum, par etiā croci pondus coniicit ex succo uuæ acerbæ qui omphaciū appellatur, atque eius dimidium ex alumine scisso. Mihi uero placet quintuplum succum ad mel coniicere: par autem pondus croci & myrrhæ, utriusq; drach. unam & dimidiā iam ita ut ex utrisque tres drachmæ conflentur. Quod si quis omphaciū addat, & uini austeri item heminam unam, uelut Heræ uidetur, recte sanē drach. i. omphaciū addet. Si uero citra uinum præparetur, multo plus de ipso coniicere conuenit, si quidem mediū temperamentum pharmacū efficere uelis unciā i. si uero austrius, ut in principijs conueniat, nihil peccaris si omnino duas aut tres ammiscueris. Quod si nō sit omphaciū, pro ipso rhois succum iniice: & si uolueris par pondus utriusq; indere, neq; sic quicquam deliqueris. Heras tamē in symmetria huius pharmaci etiam hoc adscripsit hoc modo. Quidam autem & heminam unam dulcis uini, mustum eum uelle indicare palam est: prædixit enim uini austeri maris expertis hemina unā. Mihi uero nō placet, sufficiente melle iam coniecto, unā cum hoc quod & hemina austeri uini addidit, rursus aliam misceri uini heminam. Reddetur enim ualde uinosum medicamentum. Coquunt autem hoc ex moris medicamentū, aliqui quidem à principio miscentes succum mororū, aliqui uero modice præcoquentes. Heras autem uidetur uelle succum solum diutius coquendum esse. Scripsit igitur hoc modo. Succus mororū heminas sex ad strigmenticiā craisitudinē coquito, deinde trita ammisceto. croci drac. i. & reliqua uidelicet iam dicta. Quin & ego censeo succum ipsum solum per se præcoquendum esse: deinde uero ad iiciendum mel, atq; ubi iam cacabum ab igne auferre uelis, reliqua ammiscenda esse. Verū Heras uidetur simul cum melle etiam alia ammisceri iubere. Et uinum quidem rationabiliter quis tunc ammiscuerit. Myrrhā uero & crocum, melius est in fine cocturæ iniicere, eo usq; saltem cum alijs coquendo, aut olla in terram posita mouēdo, donec omnia probe iniantur. Amplior autem coctura

tom. 5

D 3 ipso-

ipforum, destruit facultatem aromaticorum medicamentorum. Spuma argenti equidem & plumbago, atq; alia multa metallica per cocturam meliora fiunt. Decoctiones autem & myrrha multaq; alia aromata in decoquendo vires amittunt. Itaq; medij facultate pharmaci & symmetria, & coctura, moderatis inflammationibus congrua, ampliusq; in maioribus uigore, atq; insuper in principijs & augmentis eorundem cõueniens, iam relata est. Cæterum ad induratas inflammationes, quum iam præterierit uigor, & nihil amplius influxerit, uenerit autem tempus discutiendi, ammiscere conuenit ad stomaticum pharmacum aliqua discussorium. Talia autem sunt, Spuma nitri, & ipsum nitrum molle, aliaq; petrae flos, & sulphur uiuum. Sufficit porro ad prædictam medij pharmaci commensurationem ammisceri. Nitri quidem unciam dimidiam, sulphuris autem uncias duas. Quod si neque sic præparatum habeas ipsum, neq; præsto sit tibi nitrum, aut sulphur, aut alia petrae flos: origanum in sapa, quam alij siracon, nostri omnes hepsema uocant, feruefacito, stomaticocõ pharmaco addito, ac gargarisare iubeto. Si uero neq; sapa adsit, in aqua mulsa origanum coquito. Nihil autem refert etiam si hyslopum cõijcias pro origano, aut pulegium, aut thymum, aut thymbram, aut calamintum, aut mintham odoratam, quam ueteres hedyolmon appellat. At uero in uigore inflammationum, non solum nihil ex eiusmodi pharmacis adhibere oportet, sed etiam contrarium totum: atq; raro quidem stomaticis medicamentis uti, collationibus autem et gargarisimis mitigatorijs cõcoquere inflammationem. Cuius generis est, Decoctum pinguium caricarum, & oleum lentiscinum in duplo uase tepesactum. Quin & ipsum stomaticum pharmacum in uigoribus gargarisare conuenit, aqua mulsa diluore permixtum, aut calida sapa: quae si non adsint, aqua calida. Præualere enim oportet tunc mitigatorium & concoctorium ductum, uelut in declinationibus discussorium, qui ex fortioribus constat medicamentis. Porro meum pharmacum ex succo nucum omnium aliorum esse fortissimum opere experti estis. Ad uos enim sodales loquor, in quorum gratiam maxime ad hanc tractationem progressus sum. Quod uero etiam omnium utilissimum & parabilissimum sit, nemo ignorat. proijciunt enim hortulani uiridum nucum cortices, ubi ipsas decoctarunt, ut uel maximos corbes nobis explere liceat gratis. Mel igitur solutū pauperibus medicis (Nam & illis oportet nos ea quae narraui cõmunicare) deficit, quum eius fuerit penuria, nihil uero aliud, nisi quis ultro adeo aliud uelit. Saepem enim hoc modo confectum pharmacum, nihil deterius apparuit eo quod ex moris constat, in quod tum crocum, tum myrrham indebamus. Quin etiam si Alumē ipsi addere uelimus, non est necesse scissum iniicere. Sufficenter enim adstringit etiam liquidum, quod aliqui phorimon appellant, quod uilis precium & maxime parabile in omnibus regionibus existit, tenuitate tamen partium a scisso deficit, & ob id etiam minus efficax est. At uero si hortulanus

A aliquis aut ruralis hoc pharmacum sibi preparare uelit, habuerit gratis quos conijciat, cytinus aridos contusos & cribratos. Nominantur autem sic primogenita punica. Quo tempore enim arbor florere desinit, fructus ipsius appare figuratus in specie punici mali, quem ablatum & resiccatum adseruare licet ad tempus fructus nucum. In fine enim ueris cytini generantur. Desinent autem aestate ad perfectiorem ueniunt nucis. Quin & in terra decidunt multum cytini, aut a uento decussis, aut alio quopiam modo, quos collectos ficcare licet, ut neque hac parte egenos medicos quicquid impendere opus sit. Notis autem acidorum & acerborum punicatorum, quorum fructus parum abest ut estitari nequeat cytinus meliores esse. Quare etiam si ex arboribus eos auellas, aut nemo penitus te prohibebit, aut certe utilissimum pretium sibi dari pro eis postulat. Cæterum balaustium appellatum penitus cibis non conuenit, & si quis colligere id uelit, quemadmodum organum, & thymbram, ac thymum, atq; alia huiusmodi, gratis licebit. Itaq; si balaustium uelit quis crudum tulum ac cribratum iniicere iuxta proportionem quam antea dixi, pari omphacio potest, utile pharmaci efficiet. At uero & cortices punicorum malorum, ualde parabilis res sunt, adstringendi uim sufficientissimam habentes, & qui ad prædictam statim in principio conijci queant. Optimum autem pharmacum red detur, si iuxta id tempus quo punica nondum perfecta & matura sunt, non tamen longe a perfectione absint, eos cortices detractos conieceris atq; id statim in principio coctura succi. Oportet autem prius in mortario trudere, quo ipsorum uis uniuersa citius in medicamentum quod paras diffundatur.

De confectioe pharmaci ex malis punicis, & malis alijsq; stomaticis. 4

Quum uero tres sint punicorum malorum differentia, Aliqua enim ipsorum sunt austera, aliqua uero dulcia, & quaedam acida, Siquidem sola austera iniicis, magis adstringens pharmacum reddetur: si uero dulcia, suauius. Quemadmodum sanè fortius fiet, si acida tantum indas. Ego autem consecui par pondus uniuscuiusque generis ammiscere. Nam & alia ipsa sola matura punica mala integra una cum corticibus trudo, deinde succum exprimo, ac cum melle coquo, & non solum stomaticum pharmacum ori commodum habeo, sed & ad multa alia utile, ueluti rursus dicitur: atq; sit hic succus ad omnia præstator ex tribus punicorum speciebus, aut generibus, aut differentijs, aut quomodo cunq; quis appellare uelit. Miscemus autem & ruborum fructus quos aliqui quidem a planta denominant, batina, hoc est rubina appellantes: aliqui autem contposita appellatione Mora appellant, apponentes quae a rubis producuntur. Ex quibus sanè succus similiter succo mororum præparatus, melius illo pharmacum reddi: sed minus ualidum eo quod ex nucum succo paratur. Quin & malorum cotoneorum, & pironum syluestrium, ac mespilorum succus similiter præparatus, stomaticum pharmacum efficitur, deuorari que aptum, quum hoc quod ex nucibus constat deuorare non liceat: quanquam

enim nociuū non sit, uelut atramentū sutoriū, tamen stomacho non est commodum. Manifestum uero quod & ex punicis constans pharmacum aptum est fracto & cibos fastidienti stomacho: deficit tamen ab eo quod ex malis constat. Innocuus est etiam rubi mororū succus deuoratus, uelut etiam ipsorum mororum, sed succus rubi mororum habet quid quod stomachū corroborat, quod ipsum mororū succus nō habet. Porro mel his omnibus succis non eadē proportione iniicitur. Plurimo enim nucū succus opus habet, & post eum rubi mororū, modico autē malorū, & punicatorū, & pisporū syluestrium. Medius autē inter hos est mesporū succus. At uero & ex cornis ac brabylis, & prunis apud nos appellatis preparatur apud nos stomatica pharmaca, eodem modo quem in principio de moris recensui, in quorū omnium cōfectio ne rationē quandam cōmunem referam, hanc. Si quidem crassus apparuerit succus, statim mel ammiscere oportet. Si uero liquidior sit succus præcoquatur. Suscipit autē pitōrū ac malorum succus: amplius uero etiam plurimorū fructuū, parē sibi ipsi mensuram mellis. Succus uero eorum quæ multū acerba sunt, uelut est corni fructus, aliquando duplum, aliquando triplū mellis adsumit. Omnia igitur hæc citra noxam deuorantur. Si uero atramentū sutorium ammixtū sit, non ualde deglutire oportet cōfectum pharmacū, præterq̄ si iuxta stomachū aut alium ulcerosam affectionē fieri suspicemur. Quin & si in ipso ore maligna ulcera sūt, præstat ex atramento sutorio medicamētā. Sufficit autem drac. ad prædictam cōpositionem ammixta in qua unā mellis librā coniici est relatu. Sed & plus quandoq̄ recte iniicitur ad ulcera putrefacta. Singula porro quæ dixi iniicere licet aliquando & multo uuarum austerarū quas Aminæas appellat. Præstat autē ultimum mustum in hunc usum. Quod em̄ in principio fluūt liquidius est & aquosius. Iniicienda uero sunt ex prædictis pharmacis acerbiora, quæ admodum sæpe uidistis me aut punica mala, aut balaustium, aut cytinus, aut ægyptiæ spine fructū, aut corna, aut aliud quid ex huiusmodi adstringentibus, ammiscere. Maxime uero aptus est Rhus, siue masculino, siue muliebri genere ipsum uelis nominare. Est autē duplex, Alter obsoniis inspergitur stomacho cōmodus, alter à tinctoriis coriorum expetitur. Vterque uero musto incoctus stomachicum efficit medicamentum, cui ammiscere licet etiam alia iuxta eandem proportionem, uelut in eo quod ex moris cōstat relatum est. At uero citra mellis mixturā, mustum solum per se in mellis cōpagem redactum, exemptis etiā quæ aliās indunt, bonū sit pharmacū in principiis, augmētis, & uigoribus. Ad declinationes autē si tedas addideris pingues, aut etiam in tenuia frustula contusas & fractas easdem unā cum Rhoē in mustum confeceris, deinde eq̄ interposita una die coxeris, donec suam ipsorum qualitatem in ipsum mustum transmittāt. Tunc enim tedas quidē eximere ac proijcere oportet, Mustū uero usq̄ ad aptā cōpagē coquere, quo uidelicet

illiniri cōmode possit. Quæcūq̄ autē prius ex adstringentibus, iniici dixi in id quod ex nucibus præparatur medicamentū, ea omnia etiam accipiēda sunt recte in mustum addi. Quod si uero preciosius efficere pharmacum uelis, iniicies etiam cassiæ corticē, aut nardū indicam, aut malabathri folium. Aequè enim ut pauperibus, sic etiā diuitibus nos pharmaca scribere oportet. Eadē etiam prædictis stomaticis pharmacis miscentur, Sufficit autē drachma una singulorū ex his tribus ad tām medicamētī symmetriā ac cōmensurationē, iuxta quā libra mellis una cōiicitur. Nihil uero leseris si ad singulas drachmas adhuc dimidiā apponas, ut in totū quatuor drachmæ & dimidiā fiant. Cæterū ad induratas inflammationes cōiiciuntur quæ generosius discutere possunt, tusa uidelicet & cribrata. Tempus autē indēdi ipsa nō est principū, sed ubi prope perfecte coctū fuerit pharmacum, aut etiā penitus coctū, olla iam in terrā deposita. Sunt autē hæc costus, amomū, & quod Macer appellatur, Nomīnatur autē sic cortex quidam aromaticus qui ex India afferitur, multū calefaciēs & adstringens. Quin & cyrenaicus succus ad discutendas induratas inflammationes aptus est, quem admodum etiam Medicus, aut aliquis eorum qui postea celebres facti sunt. Pauperibus porro profumptuosius discussores pharmacis, aut dictamnū, aut accrum, aut Meon, aut pyrethrum, aut cardamomum, aut sinapi iniiciendū censeo, pari pondere, ita ut ad triū drachmarū pondus eorū mixturā moles perueniat, ad prædictā in principio stomaticorū pharmacorū symmetriā, in qua mellis libra habebat. Si uero quatuor aut quinque drachmarum pondus ex his explere uelis, magis discussorium pharmacum habebis. Semper enim pro cōstitutionis affectuū proportione, augeri ac minui pharmacorum uehementiam oportet.

De cōfectione pharmaci ex musto, in quo etiam parabilla diuersa.

In pharmaco ex musto, ad decem musti heminas, tres iniicimus heminas Rhois coriariorum, aut eius qui obsoniis inspergitur. Si uero utrūq̄ iniicimus, utriusq̄ unā & dimidiā, aut paulo plus sumimus. Iuxta proportionē uero etiā ex discussores quodcūq̄ tandem inuenerimus. Quod si unum tantū habeamus adstringendū uim habens, quod in principio iniiciamus, aut unū saltem discussoriū quod iuxta finē indamus, ex illo totum pōdus immittimus quod ex omnibus aliis cōstaretur. Quæ igitur dicta sunt in medicamētum ex nucibus coniiciēda, ea omnia etiā in pharmacū ex musto indant. Quin et quæ isthinc nō dicta sunt, amplius iniicere licet. Velut gallā omphacitīn appellatā, aut extremitates mollis rubi, aut rubi canini, & corni, cuius etiā fructū diximus iniicere oportere, uelut etiā pruna, & myrti baccas, & fructum myricæ ac spinæ ægyptiæ fructū, omniaq̄ adstringētia præter ea quæ medicamentariā uim habent, ne uidelicet deuorata lædāt. Omnia porro stomatica pharmaca quomodocūq̄ parata iuxta propria tēpora oportuna ac cōmoda fiunt. Si quidē enim

austeriora fiant, in principijs & uehementibus in-
fluxionibus conueniunt. Si uero moderatiora, in
uigoribus. Si autem magis disculforia uel prædita,
in declinationibus. Quare etiam si non ipsi præpa-
rauerimus quid, neq; symmetriã iniectorũ nouerim,
sed tantum ipsum cõpositum pharmacũ gustauerimus,
cognoscemus quomodo eo sit utendum. Hæc igitur si memoria conseruabitur, quando
necessitate aliquando urgente eorũ quæ experimento
constant pharmacorũ copia nõ sit, ex parabili illius loci materia,
uos ipsi ex tẽpore aptum medicamentũ cõponere poteritis.
Non solum autem in hæc rem utilis fuerit prædictorum memoria,
sed etiam ad iam inuentorũ cõuenientẽ usum. Si enim in
ipsis adstringentẽ qualitã præualere inueneritis, in
principijs eis utemini. Si uero mitigatoriam & laxatoriam
ac concoctoriam, in doloribus & uigoribus inflãmationum.
Si uero obdura tum quippiã & ægre solubile ab inflãmatione
relinquat, in declinationibus. Eodem modo etiã in
medijs tẽporibus, media relatorũ pharmacorum
medicamenta offeretis, ad repulsorijs ad disculforia
paulatim transeundo, atq; si unũ duntaxat uobis
præsto sit medicamentũ, id ipsum per aquã mulsã
& aquã simplicis mixturã exoluentes, & per
additionẽ parabilium intensius reddentes. Sunt autẽ
parabilia ex adstringentibus, Rosã, & myrtus, &
lentiscus, & rubus, & rubus caninus, & galla
omphacitis appellata, & ægyptiã spinã fructus,
omniaq; aluminis genera. Post hæc parabilia sunt
Rhus culinarijs et coriarijs, & succus qui ex Syria
affertur, atq; hic quidem per se ammiscetur, culinarijs
autem & coriarijs Rhus aqua prius decocti, utiles
mixtura fiunt. Est autem & glaucium ex parabilibus,
& omphacium, & cytini, & balauftia. Ex disculforijs
autẽ parabilia moderata sunt, caricarum & fursurum
decoctum, & aqua mulsã in qua origanum, aut
hysõpum, aut thymus, aut calamintha, aut pulegium,
aut mintha odora, quã hediosmum uocãt, sint
incocta: fortiora autẽ sunt etiam hæc, si diutius
coquantur, amplius autem & nitri spuma aut
ipsum adeo nitrum ustum: fortius uero his est
sulphur uisum.

Stomaticorum pharmacorum compositio, in quibus etiam quæ ex moris constat, Heras. 6

Proprie quidem stomatica appellantur quæ ad uas,
tonfillas, ac omnes quæ in ore sunt dependentes
inflãmationes conueniunt. Componuntur autem per
prædictam materiam, ex qua sanè multæ particulares
compositiões à medicis sunt confectæ. Ego uero etiam
hic celebris tantum mentionem faciam.

Compositio pharmaci ex moris iuxta Heram. 7

Pharmacum ex moris stomaticũ faciens ad tonfillas,
& uas, atq; alias in ore inflãmationes, tum illitum,
tum gargarissatũ, uelut est prædictum. Præparat
autem ipsum Heras hoc modo. Succus mororũ
heminas vi. ad strigentia spissitudinẽ coquito.
Deinde tritas croci 3. i. myrrhæ 3. ij. omphacij
drac. i. aluminis scissi obol. ij. Mellis heminam
unam addito. Ipse autem Heras se etiam aliter præ-

parare ipsum ait, hoc modo, ut croci drachma dimidia
iniiciatur, & pãsi hemina una, et uini maris expertis
austeri hemina una. Coctura autem fit usq; ad
compagem melleam.

Andromachi descriptio, pharmaci ex moris. 8

Andromachus autem de pharmaco ex moris in hæc
uerba scripsit. Succus mororũ heminas vi. accipito,
& in ipsum gallas v. croci scisso, radices autem
dulcis drac. xx. Vini chij heminam i. & insolato
aut coquito, deinde ubi coactũ et spissatũ fuerit
pharmacum, radices tollito ac proiecto, gallas
autem tritas ammisceto, & myrrhæ drach. i. croci
drach. i. aluminis scissi drach. i. omphacij drac. ij.
Quidam autem aluminis drach. ij. mellis austeri
hemina unam. Manifestum autẽ est, quod hoc
pharmacum magis adstrictorium est quàm præscriptum,
maxime si alumen adsumat. Sufficientes enim erant
gallæ, & omphacium, ut multũ adstringens
redderet pharmacum, uerum ubi alumen amplius
additur, plurimũ in ipso adstrictoria uis augetur.
Recte tamen in eius confectiõnem ammixta
est dulcis radix, quæ exasperata lenit, & propterea
asperitã ex adstringentibus inductam lenire potest.
Cæterum pro mororũ succo coniicitur etiam
mororum rubi succus, alijs quomodo cunq; uelis
appositis, siue ut Heras, siue ut Andromachus
scripsit. Relatum autẽ à me antea est, quomodo
liceat ipsum uariare, per eorum quæ adijciuntur
ammixtionem. Dicitur etiam, quod per succum
nucum componi queat hoc pharmacum, reliquis
eodem modo iniectis. Quin & per puniceorum
malorũ succũ similiter præparatur, tum solo
cum melle præparato, tum iam dictis iniectis.
Sic uero & rubi fructus cum melle confectus
sufficiẽter adstringens sit pharmacũ, quædãmodũ
sanè & quod ex uero succo paratur, ueluti prius
est dictum. At uero etiam uaria cõpositiõne
pharmaca ex puniceorũ succo à medicis cõscripta
sunt, uelut etiam ab Andromacho his uerbis.

Stomaton ex malis punicis, Andromachi. 9

Puniceorũ dulciũ nucleis carentiũ partes ij. et
acidorũ partem i. Succũ in uas ampliũ quod con-
gietur ipsius capiat exprimito, deinde excolatum
ad lentũ ignẽ ad tertias coquito. Sint autẽ in
propreu myrrhæ minæ drac. viij. crocomagmatis
drach. viij. omphacij 3. viij. illyridis 3. viij. aluminis 3.
iij. gallæ 3. viij. His affundito liquorẽ teritoq; ac
ad melleã spissitudinẽ coquito: deinde in pilam
translata rursus terito ac utitor, quandoq; cũ
melle, quandoq; sincero. Hic non simul coquit
mel cum puniceorum malorũ succo, sed postea
quum paratũ est, dupliciter pharmaco uti iubet,
aliquando quidem sincero, ad inflãmationes
uide licet adstrictiõnis indigat: aliquando uero
cum melle, quum discusione indigent. Multitudinẽ
autem succi cõgium esse iubet, hoc est sextarios
sex Romanos. Quẽ enim Romæ medicatus sit,
semper eius urbis mensuris utitur. Inijcit autem
in ipsum myrrham, & crocomagma, & gallam,
& iridem illyricam. Ipsam enim Illyrida
appellare solet. Amplius autem ad hæc omphacium,
omniũ quin

que numero, singulorū ē. i. octo em̄ drachmæ unciam efficiūt. Ex alumine uero scisso unciā dimidiā. Scripsit porro deinceps Andromachus etiam id quod ex multo fit stomachicū, sic in hæc uerba.

Andromachi stomachicum ex musto, quouor 10

Gallas xxx. Rhois coriarij sextarios ij. musti sextar. vi. Gallas confractas cum Rhoe per diem & noctem in musto macerato, deinde coquito donec ex toto quarta pars super sit, & per linteolum colato, exprimito, & in olla ad mellis crassitudinē spillato, deinde trita addito, aluminis scissi drac. i. croci drac. i. myrrhæ drac. i. permixta reponito atque utitor. De musto nihil manifestū retulit ex qua si uia ipsum sumi uelit, Num ea quæ austerum uinum fundit, aut quæ dulce, aut medium. Nos igitur nosse oportet quod pharmacum ex dulci confectum magis mitigatorium & moderatum erit, ac minus efficac. In quibus autem adstrictione opus est uti uehementiore, id quod ex acerbis uinis fit uehementius quidem adstringit, leniēdi autem uim non habet. Palam est autē ex medio uino paratum, etiam mediam facultatem habere.

Critonis stomachicum ex malis punicis 11

Crito pharmacum ex succo punicorum his uerbis descripsit. Stomaticum ex punicis ad ulcera & aphthas oris. Succu punicorum dulcium heminas vi. in aere uasē ad tertias coquito, deinde cinnamomi drach. i. casiaē drach. i. myrrhæ drach. i. omphacij obol. ij. croci obol. ij. nardi Indicæ obol. ij. terito, eisq; mellis heminam i. ammisceto, atq; ita adinfuso succo ad lentum ignem moueto, ac donec spissetur coquito ac utitor. Scribit autē & aliam compositionē pharmaci ex punicis huiusmodi. Molorum punicorum dulcium unā cum corticibus tusorum ac expressorum sextarios vi. mellis boni sextarium i. in ollam coniecta coquito ad spissitudinem mellis; deinde aluminis scissi unciam unam, myrrhæ unciam dimidiā, trita addito, ac mixtis utitor. Magis adstringens scripsit certe hoc pharmacum Crito quam præcedens. Reticule igitur quidam faciunt interrogātes utrum ipsorum altero melius sit. Alterutrū enim in proprio tempore altero melius est. atq; hoc quidem posterius ad ea quæ uehementi adstrictione indigent, ad ea uero quæ discussionē, prius, maxime quum & cinnamoinum iniecerit in ipsum discussorium medicamentum. Scripsit autē & ex musto medicamentum Crito, hoc modo.

Critonis stomachicum ex musto. 12

Stomaticum ex musto facit & ad aurium & sedis ulcera. Musti sextarios vi. ad sextarios ij. decoquito, deinde Rhois coriarij drac. iij. alij drac. ij. misceto, & gallarum drach. iij. alij uero gallas xxx. croci drach. ij. alij drach. i. aluminis scissi drac. ij. Quidam etiam myrrhæ drach. i. mellis sextarium i. mixtis utitor. Multa uero alia pharmaca ex prædictis succis a multis medicis scripta sunt iuxta commensurationem uariantia. quā aliqui quidam omnia prædicta coniungunt: quidam uero auferant, alius aliud, & alius plus, alius minus: in quibus uelut dixi inspicere oportet quid redudēt, an

adstringens & repulsorium, aut lenitiuum & coctoriū, aut discussoriū. Ita em̄ rectissime ipsis utemur. Quare relinquam particulares eorū quæ scripserunt differentias. Transibo autē ad alia pharmaca citra hos succos præparata.

Stomatica pharmaca citra succos cōposita, ex aceto & gallis. 13

Stomaticum pharmacū scripsit tum Andromachus, tum Crito, eandem habens symmetriā. Sufficiet itaq; descriptionē Andromachi referre, hoc modo habentem his uerbis. Stomaticum Aristoclis ad Synanchas, quas anginas Latini uocāt, & reliquas in ore affectiones. Hac & Antipater usus est. Gallas numero xxx. acetū albi sesquicyathum, alij cyath. ix. myrrhæ 3. viij. nardi Indicæ drac. i. Rhois culinarij sesquicyathum, alij cyath. ix. aluminis scissi drac. i. piperis grana xx. mellis Attici cyathos ij. alij sesquicyathum. Coquuntur gallæ in aceto donec flaccescāt, deinde trita mellis miscenē tempore usus. Quidam etiā feminis mandragoræ unc. i. addunt. Hæc quidem Andromachus scripsit. Fortassis autē dubitauerit quispiam propter quid, quum præscripsisset acetū sesquicyathum, mox adscripsit alij cyath. ix. multum em̄ mensura altera alteram excedit. Quem admodum etiam rursus quum ait, Rhois culinarij sesquicyathum, alij cyathos ix. Singulatim itaq; utrunq; expensum dubitationem affert. Si uero inter se comparantur, cōuenienter scripta sunt. Si etenim cyathos ix. iniecerimus, iniecimus etiam Rhois culinarij eosdē ix. cyath. Si uero acetū sesquicyathum, sufficiet etiā Rhois culinarij sesquicyathus. Quare in pharmaco plus acetū habente, diutius coctura faciēda est, in minus habente breuior. Præstat autē diutius fieri cocturā. Ita enim gallæ molles reddentur. Cōspicuum uero est, generosum esse hoc pharmacum ex cōtrarijs cōpositum. Gallæ enim & acetū, & Rhus magis adstringentia sunt & maxime repellūt: ualde autē discussoriū est piper, sed mixtæ facultatis est nardus. Myrrha uero discussoriā habet uim, sed & lenē ac mitigatoriā unā cum hoc quod etiā cōcoquit. Discussoriæ facultatis est etiā mel, sed citra mordacitatē earū affectionum quæ in ore sunt, quum in oculis mordax existat. Verum de acetū uiribus iam sæpe mentionē fecimus, q̄ & fecat, & discutit & repellit. Albū autē in descriptione addit, ut uidelicet tenuium partium indicet. Quidā uero tū acetū quinq; cyathos, tum Rhois eosdē inieciūt, medium quodāmodo apprehendentes inter eos qui plurimū, & qui minimum de utroq; cōiungunt. Manifestū igitur est eos mediū quoq; pharmacū iuxta facultatē preparare quem admodū symmetria ipsa media existit.

Stomatica illitio ex besafā, hoc est, femine ruta syluestris 14

Celebre est & hoc pharmacū ab Andromacho hac uerborum serie descriptum. Stomaticum ad anginas ex besafā, faciens ad desperata, quouor. Seminis anisi, feminis apij, feminis amij, floris iunci odorati rotundi, aluminis scissi, iridis illyricæ, besafā quod aliqui harmala uocant

cant, cinamomi, myrrhæ troglodyticæ, aristolochiæ longæ, singulorum unc. i. calsiæ, rosarum siccarum, utriusq; unc. i. crocomagmatis, unc. i. costi, cineris hirundinum recentis, utriusq; quadrantē, croci sesquiunciam, nardi indicæ, amomi, utriusq; unc. dimidium, gallas octo, tritis cum melle utere. Verum usus tempore tandem mel adde. Hoc ipsum pharmacum etiam Heras scripsit, ut parum ablit quo minus penitus idem sit, Solas enim rosas variavit, & non ipsas coniicit, sed florem ipsarum, & ad finem addit, Quidam etiam calsiæ fuluæ unc. i. De hirundinibus autem ambo obscure tradiderunt, quanquam alij clare scripserint, nisi quod inter ipsos non convenit. Alij enim nidum urere iubent ex stercorebus hirundinum maxime compositum. Alij ipsas hirundines. Alij ipsarum pullos. Hi uero obscurius scripserunt, & Andromachus quidem, cineris hirundinum recentis, oportebat autem ipsum apponere ustarum, Tale enim quiddam cineris uox significat, nisi nidū ipsum terere ac leuigare iubet. Heras autem, hirundinum recrementi, non apponens ustarum. Forte igitur neuter uult comburi debere hirundinum recrementum, quemadmodum alij. In quibusdam tamen exemplaribus sic scriptū est. Hirundinum teneram unciam i, quemadmodum in alijs hirundinum à tabulis. Palam est autem acre & diffusorium hoc pharmacum esse ex hirundinum excrementis cōstans, quemadmodum etiam alia omnia omnium animalium sterora, aliqua magis, aliqua minus. Velut etiam ipsorum animalium ustorum cinis. Dicitur etiam nobis de besafa in simplicium pharmacorum tractatu, quod tertij sit ordinis calsificantiū, & nunc sanè ut eiusmodi amixtum est etiam prædicto medicamento, quod plurima diffusoria facultatis in se habet, quemadmodum aliqua ex alijs stomaticis adstringētis & repulsoria. Etenim iam relata pharmaca ualde diffusoria sunt, & ad hæc amplius cinamomum super omnia uim tenuiū partium & diffusoriam habēs. Quin & semina anisi, apij, & ammiij diffusoria sunt, & iris & aristolochia ex diffusorijs sunt, uelut etiam myrrha. Mixtæ autem facultatis ex diffusoria & adstringēte est calsia, & crocus, & nardus, & amomum, & costus. Præcellit autem in ipsis calsifactoria & diffusoria, & maxime in cōsto. Mixtæ facultatis est & iunci rotundi odorati flos, sed utraq; imbecillitū adstringente, tum calsificante. Gallæ uero, clarum autem est quod de omphacitidum genere loquor, ex adstringētibus multum sunt pharmacia, uelut etiam alumen scissum. Rosæ autem rursus debilissimam habent adstringendi uim. Ex contrarijs igitur facultatibus particularium pharmacorum, hoc medicamentum propositum iam constat, & non solum contrarijs, sed etiam utriusq; fortibus, atque uelut dixi antea, multo fortioribus diffusorijs quam adstringentibus. Quando uero consecutionem eius clare conscripserit Heras, usum est ob id etiam illius uerba in commune proponere ac adscribere, quæ hoc modo habent,

A Stomaticum ex besafa, Heras. 15

Stomaticum faciens ad anginas, & inflāmatas tonsillas, ac ulcera facta in ore. Conuenit etiā stomachicis & dysentericis summe, in frigida exhibitā magnitudine fabæ. Est & Arteriaca bona, & dolorem sedat. Anisi ꝑ. i. ammiij ꝑ. i. apij seminis ꝑ. i. costi sequiunciam, floris iunci odorati unc. i. tridis illyricæ unc. i. aluminis scissi unc. i. gallas omphacitidas mediæ magnitudinis octo, crocomagmatis ꝑ. i. croci sesquiunciam, myrrhæ unc. dimidium, floris rosarum unc. ij. aristolochiæ longæ unc. i. seminis besafa unc. i. cinamomi unc. i. spicæ nardi sesquiunciam, amomi racemi unc. dimidium. Quidam etiam calsiæ fuluæ unc. i. cineris hirundinum recrementi unc. i. Myrrham cum melle terito: reliqua uero omnia contusa & cribrata in mortariū coniçito, & per pistillū myrrhæ cū melle moderato cōmisceto, ut pharmacū melle cāsius reddat. Usus uero tēpore melle dilutū illine, atq; ex aqua gargarissandū præbe aut ex aqua mulsā uel succo pitūanæ. Cæterum pharmacum hoc in stanneo uasere reponitur ac adseruatur.

Aliud stomaticum ex hirundinibus absq; Besafa
Asclepiadæ. 16

Scriptit etiam Asclepiades stomaticam illitionem his uerbis. Aliud stomaticū facit & ad Anginas. Hirundinū syluestriū ustarū cineris dra. iij. croci drac. i. nardi indicæ drach. i. melle excipe. Mixtura sit quā iam sub manibus sunt affectiōes. Hirundines porrō uruntur hoc modo. Pullos sale cōsperus unā cum pennis in fictile coniçimus, obruturamq; prunis imponimus. Gratia habenda est Asclepiadæ ob id quod tam diligenter describit quomodo hirundinum pullos urere iubet, & quod ipsa animalia, & non eorum recrenta, in pharmaci cōpositionem preparanda censeat. Scripsit uero etiam Andromachus stomaticum pharmacum ex hirundinibus, hoc modo.

Stomaticum ex hirundinibus ad anginas, ut Harpocras. 17
Pulorum hirundinū ustorū numero xi. mellis cyathi. i. alij cyathi. ij. habēt, succi myrti uiridis cyathum i. alij cyathi. ij. myrrhæ obol. ij. Pullos urito omnibusq; mixtis ac tritis utitor. Clare etiam hic hoc loco pullos comburi iubet. Hæc itaque duo præscripta pharmaca ex hirundinibus sunt absq; besafa, Alia autem duo stomatica hæc præcedentia ex hirundinibus unā cum besafa constant. Est autem & tertia cōiugata pharmacorum eiusdem generis, in qua ea quæ ex besafa citra hirundines præparantur, continentur.

Alie stomaticæ illitiones Andromachi. 18
Præstat autem opinor neque alias relinquere oris illitiones, quæ sanè laudant ab his qui de pharmacorum experientia sunt curiosi, maxime quum multorum ex eis etiam ipsi experimentum fecerimus, partim quidem ex nostro usu, partim uero eorum qui nobiscum sunt medicati. Incipiam autem ab his quæ Andromachus scripsit, ipsas compositurus iuxta illius uerba.

Ad columellam laxatam. 19
Mellis lib. i. aluminis liquidi lib. i. floris rosarū libram

bram dimidiam, succi hypocisthidis quadratem. Alumē in melle coquito, deinde sicca inspergito atq; ita utitor. Coquito autē modice. Vere bonū est hoc pharmacū, eo q̄ tribus modis uti oportet, quē admodū uidistis me plurimis stomaticis pharmacis uti. Vnus utendi modus est & maxime in principio, ut dissoluatur per aquam calidā aut aquam nullam ac gargariffetur. Nam & mitigatorū est hoc, & quod conuenit efficit. Interea autē dū eo sic utimur, etiam syncere pharmaco uti cōuenit, partim quidē cum digitis insillendo, partim uero per cochlearē admouendo, unā cū hoc quod reprimamus et intrepide foras columellā ipsam ducamus. Confer enim q̄ maxime ad linguā ipsam uergeret, & a rectitudine secedere quā habet ut plurimū ad ipsius asperā arteriā extremum.

Aliud stomaticum eiusdem Andromachi ad omnia uitia oris. 20

Crocomagmatis drac. ij. iridis drac. iij. sandarachē drac. dimidium, hoc est obol. iij. terebinthinæ dra. ij. lycij Indici drac. i. uuae passæ drac. viij. aloes drach. i. omphacij drach. i. nucum pinearum tostarum drac. viij. succi glycyrrhizæ 3. i. aluminis scissi drach. i. balauftij drach. i. floris rosarum drach. ij. mellis huiusmodi duas & dimidiam. In quibusdam exemplaribus sesquihemina habetur. Ipse quidem Andromachus sic scripsit, non ostendens quomodo mel miscere oporteat, Num crudū, aut coctū, aut despumatum tantum. Ego uero despumatum miscendum esse censeo. Scripsit etiam alias stomaticas illitiones Andromachus omnes bonas, quare minime relinquēdas putauī, ideo q̄ subscribam omnes deinceps, quemadmodum ipse præscripsit. Stomaticum quo ipse se uti dicit. Floris rosarum drac. ij. nucum pinearum drac. i. croci drach. i. Excipe melle. Aliud quod item se uti dicit. Indis illyricæ drac. viij. croci dra. viij. alij iij. florum rosarum drach. iij. Excipe melle. Aliud. Misys cyprij drac. viij. iridis illyricæ drach. iij. myrrhæ drach. viij. croci drach. i. Excipe melle.

Aliud odorum tenerū ad inflammationes & crustas cōmodum. Nucum pinearum drach. iij. amyli drac. ij. aluminis scissi drach. i. floris rosarū dra. i. croci obol. iij. Excipe melle. Hæc ex ferula Crappi esse ait. Aliud stomaticum Menecratis.

Croci drac. iij. balauftij dra. iij. florum rosarum drach. i. alij dimidiam, fructus ericæ drach. unam, malabatri 3. i. nardi indicæ 3. i. nucum pinearū numero xx. Excipe melle. Aliud quod ex libris Meliti esse ait. Rhois rubri 3. ij. floru rosarum 3. i. costi, croci, utriusq; obol. iij. Excipe melle. Hanc etiā gargariffari cō passo, aut aqua mulla ait, neq; scio cur hoc hic adscripserit, quum omnia gargariffari possint. Aliud stomaticū quod etiā ipse laudat.

Florisunci rotūdi odorati, myrrhæ, croci, castiæ, aluminis scissi, illyridis, singulorum drach. iij. nardi indicæ drachimam unam. Excipe melle cocto. Hic quidem igitur cocto adiecit. In prioribus uero semper simpliciter melle dixit, permittens nobis quomodocunq; præparare uelimus. Ego autem uelut dixi melle despumato utor.

Alie illitiones stomaticæ, quas Aesclepiades scripsit. 21

Illitio ad putredines oris Aesclepiadæ. Rhois rubri drac. iij. acaciæ drac. i. medullæ drac. iij. uino pramnio dissoluta excipe melle cocto, & utere ad illitionem. Haud scio quomodo reliquerit adscribere ad medullam, Num ceruinam, an uitur linam conijci uelit. Quando igitur non adscripsit, tutius est ceruinā adijcere. Forte em̄ esse uult medicamentū, fortior autē est medulla ceruina q̄ bubula. Alia, Succu hypocisthidis drach. ij. balauftij drac. i. lycij drac. i. acaciæ drach. unam. Excipe oliuæ immaturæ succo, & melle subactis utere.

Illitiones oris apte eis qui medicamentariis qualitates ægre admittunt. 22

Porrō de mulierculis quid attinet dicere, & maxime diuitibus, quæ præ delicijs stomatica medicamenta ægre admittūt? Iam uero etiā uiri quidā non solum præ delicijs, sed etiā natura quodā modo malum stomaticū habentes, eiusmodi pharmacæ non ferunt. Et sanē præterlabētia sæpenumero in stomachum, non solum iniurcūda aliquo modo sunt, sed etiam nocua. Mansuetissima igitur ex ipsis crocum habent & myrrham, & alumen. Melius igitur est aliquas stomaticas compositiones absq; his factas habere. In moderatis itaq; inflammationibus aut tonsillarum, aut uuae, aut alterius alicuius partis, sufficiūt succi soli fructuum iam dictorum, uelut rubi & mororum, puniceorumq; malorum & cotoneorum. Quin & succus nucū, ubi cum solo melle paratur, suauem gustum habet, itemq; mustum ex acerbioribus uuis, ex quibus Aminæum uinum funditur, si in ipsum Rhois addatur: hoc enim uelut adscripsit optimū fit pharmacum coctū ut dictum est. Ad eas uero inflammationes quæ multa adstrictione indigent, illitiones stomaticas huiusmodi parauī. Aulterorum puniceorum succum, aut aulterorum cotoneorum, aut etiam utrorumque simul, iuxta prædictam proportionem cum melle miscui, atq; sufficiens erat. At uero mororum succus debile pharmacum est. Sed inter hunc & prædictos medius est iuxta adstringendū uim succus rubi murorū. Fortis autem est nullo minus ex corticibus nucū, quanq̄ non sit etiam in gustu acerbus. Vnicuiq; uero ex his licet uuas acerbæ expressas miscere, si quidem uehementius efficere uelis, eadem mensura: si uero non, omnino tamen dimidium succi ipsarum addes. Vehementissimū autē eddetur pharmacum si punica integra tundas unā cum corticibus, indeq; succū exprimas, atq; hoc magis si fuerint acerbæ. Amplius uero acerbissimū ex his fiet, si ad puniceorū aulterorū ita uisorū succū, uuae acerbæ succus superaddatur cū moderato melle. Præstantius adhuc erit, si tota contusa punica mala passo cocta excoles. Licebit etiam ex solis dulcibus puniceis pharmacum præparare, ut debilius, ita suauius, & magis si ex solo succo citra cortices composueris. Ego uero sepe tria puniceorū genera permiscui, aut stera, acida & dulcia. Ne uero ualde exasperet, amixto glycyrrhizæ succo, optimū pharmacū efficiet. Quin & ex fructibus, factū per se solū optimū est

medicamentum, tum his qui gargarissando collue-
re, tum qui illinire oris inflammationes uolunt. Est
autem & hoc partim austrius, partim moderati-
us in adstringendo, diciturq; de compositione ipsi-
us paulo post. Quando uero non solum repulso-
rum pharmacum nos habere oportet, sed etiam discus-
sorium si quid appareat induratum, in hunc modum
ipsum parabis. His quæ medias facultates habent
ex prædictis, iniicies aliquid dum coquantur, ex
pulegio, aut thymo, aut origano, hyssopo, min-
tha, aut calaminta. deinde colabis, & habebis op-
timum medicamentum. Si uero calidius effice-
re uelis, pipere addes. Præparauit quandoq; etiam
sine pulegio, aut thymo, aut aliquo huiusmodi id
quod ex succis constat, solo pipere in ipsum conie-
cto. Omnibus aut si glycyrrhizæ succus addat, me-
lius pharmacum efficietur. Quod si pro opulentis
componas, etiam amomi quid miscibes. Quantitas
autem huiusmodi rerum eadem tibi feruetur,
cum his quæ crocum & alumen ac myrrham adsu-
munt, uelut prescriptum est: pro illis enim tibi hic
amomum erit. Quin & mastichen chiam quædoq;
inieci, post factam uidelicet colaturam, & postq;
ea quæ in cocta sunt fuerint exempta.

De crustis in ore. Cap. 11

In calidis & humidis corporis locis, quale est
os, cito putredo accedit, ex quacunq; tandem cau-
sa fuerit exulceratum. Conferat hæc rem etiam,
id quod nihil penitus in ipso ex pharmacis incum-
bere queat, uelut in alijs ulceribus potest. Eluun-
tur enim omnia à salua. Quapropter etiam fortis-
simis pharmacis sæpe ad ea uti cogimur. Fortissi-
ma autem sunt quæ crustam, escharam Græcis di-
ctam, efficiunt ad modum cauteriorum. In externis
igitur ulceribus, ubi parti curandæ crusta fuerit in-
ducta, à fortibus pharmacis desistimus, ad ea quæ
crustas tollunt transgredientes, quæ manifestum
est extersoria qualitates ac facultates esse. In his ue-
ro quæ in ore fiunt propter loci naturam, tutius mi-
hi esse uidetur ammiscere ad extersoria pharmaca
quædam fortia, quæ singulatim admota crustas in-
fligunt. Ob hanc igitur causam mellis uehementis-
sima extergendi uis prædicit, pharmaca ammiscem-
mus ipsas crustas efficientia. Quæ admodum sanè in
sordidis ulceribus in cuticula obortis, diximus am-
misceri oportere mellis, quæ parum extergent, thus,
eruum, iridem, aristolochiam, & quæcumq; alia hu-
iusmodi, eadè ratione cõtraria apponentes,
uelut Hippocrates dixit: Vna enim eadèq; ratio-
natio in utriusq; est, ut uidelicet extersorium phar-
macum moderate habens ad affectionem adhibea-
tur. Habebis aut cõmoderatum pharmacum ipsum
mel, in ulcerum quidem sordide, debilibus exterso-
rijs permixtum. In quibus autem ob loci naturam
putredinis accessionem formidamus, ex fortiori-
bus quippiam ad ipsum ammiscemus. Rationabi-
liter igitur ad oris ulcera arida medicamenta cum
melle commiserunt, per quæ crustas inducimur.
Quædam igitur ex huiusmodi pharmacis prius re-
censui in eo loco, quo ad nomas oris medicamen-
ta scripta sunt. Eadem enim etiam ad crustas cõueni-

re dixi, si mel ipsis addat. Quin etiam nunc de ipsis
scribam, omnia tãeti bis dici scriptam uideant. Quæ
igitur ab Andromacho scripta sunt paulo ante, in
memoriam saltem me reuocare oportet, ex eo lo-
co in quo docuit quæ pharmaca ad nomas oris cõ-
ueniant: apponam aut principia ipsorum tantum.
Vnum igitur pharmacum sic conscripsit. Andro-
machi stomaticum odorum tenerum ad inflammationes
& crustas commodum. Composuit aut ipsum ex
nucibus pineis, amylo, & alumine scisso, flore ro-
sarum, ac croco, melle ammixto. Alterum hoc
modo scripsit. Illitio ad affectiones in ore, cru-
stas, ac nomas, quæ etiam ipse cum melle utitur. Quin
& omnia alia ab ipso ad nomas descripta, etiam ad
crustas commoda sunt cum melle.

Quæ Crito ad crustas conscripsit. 2

Quæ uero Crito ad crustas scripsit illius ipsius
uerbis sic habent. Misy crudum euestigio tollit.
In alio exemplari cum melle tostum habet Ad oris
uero crustas, aqua diluto ac modico utere. Sint au-
tẽ misyos torrefacti 3. iij. mellis boni cyathi sex, cõ-
misce ac utere. Similiter facit & chalcitis alata,
cum melle, ut strigenticia sit ipsi situdo.

Quæ Archigenes ad crustas scripsit. 3

Archigenes autẽ de his sic tradidit. In crustis
quæ Escharæ Græcis appellantur, priuatim com-
modum est stercus caninum cum melle illitum.
Aut atramentum sutorium purpuræ marinæ tomẽ-
to inuolutum urito, neq; agitato, deinde cum melle
tritum illinito. Aut pice liquida cum pari melle,
modica cedria ammixta utitor. Aut Rhoeo co-
rariarum in aqua sufficienter, donec strigmentosus
reddatur, macerato ac coquito, & melle ammix-
to utitor. Facit & Syriacus Rhus cum melle.

Aut hirundinum uistarum, & stercoris humani
parem modum cum melle illine. Aut hepatis lupi
aridi cochlearia duo trita bibenda præbe. Horum
pharmacorum maximam partem laudo, quod ue-
ro ex rhoeo constat damno, quum adstringentis sit
facultatis quæ nequaquam crustis conueniat. Ve-
rum de lupino hepate nõ habeo quod dicam. Ad
hepaticas enim affectiones scio hoc pharmacum
per se, tum pharmaco ex eupatorio mixtum
bibit. An uero etiam ad crustas in ore potum con-
ueniat, iuxta aliquam totius substantiæ propieta-
tem, per solam experientiam iudicare oportet, de
qua non est quod dicam ut qui hoc non sim usus
in huiusmodi affectionibus. Caninum autẽ ster-
cus ubi ossa comederint canes, per omnia optimum
est. Nam & magnopere auxiliatur, neq; ullam in
sua uirtute exhibet utenti. Humanum uero tantum
abominandum semper detestatum sum. Vius est
itaq; ipso quidam non prædicens, sed latere cona-
tus. Accepit autem non uulgare, sed pueris dabat
in cibo panem cum leguminibus quæ lupini uocantur,
atq; ita refectum habebat in promptu ad
quæcumque eo utique opus esset. Quin & Musa
plurimum usus est primus a deo stercore canino,
album semper adsumens. Scribit igitur in præsen-
ti affectione similiter eodem canino stercore se u-
sum, his a deo uerbis.

Musa ad Anginam. 4

Ad Anginam stercus caninum album accipito ac resiccato, tritumq; cribro medico cribrato, et in promptu habeto. Vfus tempore melle diluito atque tunc ut deoretur illimito. Hæc quæ scribat Musa, merito ei ad stipulamur: hoc enim pharma cofortius nullum nouimus, neque in angina, neque in magna tonsillarum inflammatione, aut his quibus ex glandulis suffocationis periculum imminet. Ex Sorano. Experti fumus etiam Sorano scripta pharmaca probe facere, quæ his uerbis tradidit. Chalcitidis tostæ, mellis Attici, quod satis est, chalcitidem cum melle terito ad strigmenticiam crassitudinē, ac utitor. Aliud ad crustas faciens & humore prægnâtes gingiuas itemq; fecerentes. Misysos uisti 3. octo, irisidis Illyricæ 3. quatuor, croci drachmam unam. Hæc trita ac mixta in pyxide lignea reponito, & tum per se, tum cum melle utitor. Consequenter uero etiam hæc hoc modo prædidit. Aliud pharmacū Anthera ad prædicta faciens. Irisidis illyricæ, sandarachæ, cyperii, singulorum 3. iij. aluminis scissi, croci, crocomagmatis, singulorum drach. ij. his tritis ac mixtis uere. Quidam uero & florum rosarum, & gallæ, utriusq; 3. ij. adijciunt. Vtere autē ad putredines, & disperatas per abscessum ac cruentas gingiuas arido, Ad crustas cum melle.

Que Heraclides Tarentinus ad crustas in ore scripsit 5

Heraclides Tarentinus in scriptis suis ad Antiochidem in hunc modum scripsit, de putredinibus in ore. Facit quidem & Anthera admota. Si uero ualidior sit putrefactio, apposita est hæc compositio. Bdellij usi partes iij. auripigmenti partē i. tritis mixtis utitor, & superne linamentum conuulsum impone, rosaceo tinctum ac expressum. Quidam bdellij partes octo capiunt. Aliud ad robustas putrefactiones oris, ac reliqui corporis. Chalcitidis partē unam, calcis uiuæ tantundem, auripigmenti partem dimidiā, tritis mixtis utere. Aliud ad putredines in ore & gingiuarum abscessus. Florum rosarum drachmas quatuor, aluminis scissi 3. ij. gallæ drac. ij. mirrhæ drachmam unam, trita mellis misceto ac utitor. Verum ad ulcera leuiter crustosa, iniice aluminis drach. quatuor, myrrhæ obol. iij. gallarum drachmam unam.

Aliud. Aceti aceri in heminam unam accipito, in ipsū q; tantū salis donec nō amplius liquetur cōijcito, deinde donec siccetur coquito, & ex illo accipito, atq; acetū cyathū unum affundito, ac ore detinendū exhibeto, per satis multū tēpus, de inde iterū atq; iterū idem facito ter aut quater per diem, respectū habito ad subiectas partes. In pueris uero lanas circū specillū apponito, intingitoq; ac locum confricato, ea corporis figura ordinata ne ipsam deuoret. Quidā uero arido sale utunā terentes ipsū cū aceto & resiccantes. Faciunt & alumen rotundū ac fori, pari pondere. Oportet autē colluere lentū decoctū modico ammixto melle, aut rosarū cremorē cū melle. Quod si nō exuperetur per hæc putrefactio, urere iube, munitis & cōtectis in orbem circumfistis locis, Sit autem can-

Galen.

A dens ac pellucens cauterium, quod admoueatut donec nullus humor amplius defluat, & locus uideatur exuperatus. Postea colluenda prædicta, & Anthera compositione utendum ex melle, usque quo crustæ circūspanant, atq; tum sanè melle uteris. Aliud odorū tenerum ad inflammationes & crustas commodum. Nucum pinearum drach. tres, amyli drac. ij. aluminis scissi 3. i. florū rosarū drachmā unam, croci obol. iij. Excipe melle, hoc medicamentū ex Ferula Cratippi sumptū dicit.

Ad columellam siue gurgulionem Cap. III

Carnosa quædam particula in summo ore apparet dependens, si quis aperto plurimum ore toto, linguam deprimat. Hæc ipsa carūcula duobus nominibus appellatur à ueteribus Græcis, gargareon, & cion, hoc est gurgulio & columna. Cæterū posterioribus Medici ferē oēs, nō ita, sed cionidem, id est columellam uocant. Nam qui staphylen, id est uuā, ipsam appellant, eorū neq; meminisse præstat, Nos enim non particulam ipsam, sed unam aliquam eius affectionē, staphylen siue uuam nominamus. Raro autē hæc affectio circa columellam contingit, Verum ualde sæpe inflāmur. Et sanè quemadmodum in alijs omnibus, in quibus ex humorum influxu cōtingit morbus, Ita etiam hic prima auxilia reprimunt fluxum. Adstringentis igitur facultatis hæc esse oportet, & si quidem moderatus sit influxus, moderate adstringentis, quam austeram priuatim dicunt, Vbi uero uehementior fuerit influxus, acerbæ. Ambæ enim adstringunt, sed debilius austeræ, uehementius autem acerbæ, Relatæ sunt autem sæpe ambarum materiarū. Verum præstat & nunc meminisse, quo in paruis inflammationibus debiles, in magnis uehementes adhibeatis. Collutiōes itaq; moderate sunt ex palmulis, aut phœnicobalanis, aut quomodo docuq; appellare uelis, decoctis quādoq; sola aqua, quā doq; modico melle iniecto. Huic cōsimilis est collutiō ex decocto rosarum, pampinorū uitis, rubi, rubi canini, aspalathi, cyperii, ac cytinorū. Itē siliquarū, & radicū mori, hipocisthidis, malorū austerorum, & pirorū acerbiorū, ac sorborū. His fortiora sunt myrti ac baccarū eius decoctum, & ex acerbis cotoneis malis, & uirgultorū tenerorum silicis, arbuti, smilacis, ac phagi, & ipsarum glandium, mespilorum item & cornorum, & fructus memæcylis. Generosissimum autem est decoctū gallarum, & Rhōis culinarij ac corianj, ac fructus myricæ, & spinæ Aegyptiæ. Ex his singula tum per se tum etiam mixtim, cocta ex aqua gargarizare oportet. Mirum enim q̄ mixturæ ipsorū utiliores sæpe sunt ipso simplici usu. Quia & aridis tritis columellam contingere oportet, sensim quodam modo ad supernam regionē & externam, ad linguam uidelicet, ducendo. Verum trita arida pharmaca cochleario excipiantur, & melius est ut ipsū cochlearium ad sinem in obliquā sectionem desinat, quā in rectam. Et ex his ipsis, Moderatæ quidē sunt rosæ, & flos ipsarū, & uirgulta iam enumeratarum plantarū, hypocisthis, Rheon, lapis quo sutores muliebrī calciāmētā expoliunt,

tom. 5

E uoca

uocat autē Ageratus, uelut non senescens, aloë & cyperus, & funi rotundi odorati flos, radix nardi Indicæ, ac nostræ montanæ. Fortiora his sunt, & citra manifestam aspritudinem adstringūt, fructus spinæ Aegyptiæ, Rheon, & quod di-phryges appellatur, Rhus obfiorum siue culinarius, & exacerbis, balaustium, cytini, malicorium, galla, & magis exacte quæ omphacitis fuerit. Adstringūt etiam eximie omnia aluminis genera, Scissum uero inter ea tenuiorum partiū est, & ob id utilius. Atramentum uero sutorium uehementem habet adstringendū uim, sed non ex-pers est calcandi, & propterea putredinosis ul-ceribus conuenit, & tamen exacerbat columellā, etiam si iam sit in scirrhum indurata. Succī porro adstringentes ex omnibus dictis plantis sunt, & fructibus ipsarum consimiliter. Dictum est de ip-sis inter illitiōis stomacalis, quarū aliquæ ex mu-si, aliqua ex mellis mixtura præparātur. Corri-pūtur enim succi omnino, si absq; melle reponan-tur, aut rursus rescantur, si plurimum fuerint co-cti. Quidam uero succi etiam si ad solem estiuum siccantur ad moderatam spissitudinem, per tem-pus tamen exarescunt: & si ad plures annos dura-rint, in eam perueniūt ariditatem ut conteri que-ant in modum cytinorum & balaustiorum. Tales sunt hypocisthidis succus, & uræ acerbæ, ac gly-cyrhizæ & centaury. Et ut in summa dicam, Omnes succi etiā si absq; melle diutius fuerint cocti, nō quidem corrumpuntur, uerū tempore fiunt ari-di, & quidā sanè uelut dixi conteri possunt, quidā uero natura uidelicet tenaces & uiscosī, in lami-nam magis abeūt, q̄ ut conerantur. Atq; hæc autem simplicia cōmoda existunt. Cōposita uero ex ipsis iuxta duplicem utilitatē fiunt, Vnam qui-dem ex his quæ eiusdem generis sunt, quando ue-hemētī molle ammiscemus, carētē mediō, uelut florem rosarum aut ipsas rosas cum galla aut alu-mine permiscentes, & unumquodq; ex prædictis lenibus pharmacis ad uehemens addentes. Non pauca enim numero iuxta huiusmodi permutatio-nem erūt. Imō & iuxta mixturā ipsam ex duobus factā, plura pharmaca fiunt, quum aliās alia quan-titate misceantur. Velut si duplus sit rosarum flos quātitate aluminis, aut uice uersā, duplum alumē ad florem rosarum: possit autē non solum duplum, sed & triplum, & quadruplum, alterum alteri mi-sceri. Neque clam est etiam par pari, atq; hoc qui-dem mediū fuerit inter summa siue extrema. Re-liqua uero omnia partim propius molliori acce-dunt, quæ uidelicet plus rosarum habent, partim autem uehementissimo, quæ scilicet plus alumi-nis capiunt. In utrisq; uero non obsecrū est magis & minus. Quū em̄ duo sunt pharmaca, forte qui-dem est in quo alumen rosas excellit. Fortius autē est in quo triplū alumen ad rosas continet, quā pharmacū quod duplum saltē habet. Quod igitur semper me dicere audiuiſtis, etiā nunc dicā. Stulti sunt qui inter duo eiusdem generis pharmaca, u-trum ipsorum melius sit quærunt, aut quod tandē omnium optimum existat. Perinde enim faciunt

A ac si quis quærat, præſtet ne alicā aut pifanā agris exhibere, aut Num uinū, an acetū mulfum, aut ali quod purgatoriū medicamentū, aut Num melius sit ueratū albū an nigrū, aut si in uniuersum quis de omnibus auxilijs interroget, quod ipsorū opti-mum existat. Omnia enim respectu ad aliquid, tū emolumentū, tum detrimentū in se habent, quod ipsum etiam Hippocrates dixit primus omnium posteriorum quod euidem ſciam. Ex recentiori-bus autē medicis aliqui, quē admodū alia multa nu-gantur, sic etiam talia. Vidistiſtis porro sæpe opere perfectam quā dico ueritatē. Intempertitue namq; aliqui pharmaca quæ habent uſi, deinde quod exacerbari affectiōe n̄ his uiderēt, ad alia citra me-thodū transgressi, & neq; his quicquā efficientes, ad tertīā deinceps transitionē, aliquādo etiā quar-tam præter rationē delati, & affectū iam malignū esse iudicantes, me in consiliū adhibuerunt: quib; ostendere mihi iuſis pharmaca quæ habebant, id quod cōmodum eſſet ad præſentem constitutio-nem indicari: atq; quum ipsi dicerēt per pharma-cum quod ego conſulebam, egrum exacerbatum esse, & uo id se eo uti formidare, uerū etiā ſe per-suasos à me ad ipsius uſum cōpuli, et tum illis, tum uobis, utrūq; quod Herophilus dixit, uerum esse ostendi. Siue enim dixeris pharmaca nihil esse ſo-la per se ipsa, recte dices. Nihil enim sunt, nisi uten-tem eis recte fuerint ad epta. Siue rursus pharma-ca ueluti Deorum manus esse dixeris, etiam hoc recte dices. Iuant enim maxime, si is qui eis utit in rationali methodo fuerit exercitatus, & cū hoc natura prudens. Quidam enim non sanè præſtan-tiores existentes, de sapientia cum prudentiſſimis contendunt. Mixtura itaq; medicamentorū eius-dem generis, mediōrū pharmacorū uſus gratia ſit, & ob id ſemper duo contraria facultatibus phar-maca in uno quoq; affectu uos habere operæ præ-tium duco, Permiscendo enim ipsa omnino mul-tis medijs pharmacis abundabitis. una igitur mi-xturæ eiusdē generis pharmacorū cauſa hæc eſt, iam uidelicet relata. Alia porro mixtura ex diuer-si generis pharmacis, ex huiusmodi ratiocinatiōe coepit. Raro equidē inuenierit quis affectiōe aut diſcuſſorijs tantū, aut repulſorijs indigentē. Paruē etenim, & affectiōis nomine uix à medicis digna-tæ, cōſeſſim ſedanē, Vbi uero generatus affectus maiorē habuerit cauſā, impoſſibile eſt ipſum per repulſoria perfecte ſanare, et maxime ubi egrū cor-pus fuerit humoribus multis reſertū, aut particula affecta natura debilis. Ob id igitur cogimur sæpe quidem in principio, sæpe uero paulo poſt amitti-scere quippiā ex diſcuſſorijs. Si uero dolor affue-rit ſimul uehemens, etiā ex mitigatorijs. Itaq; tunc opus eſt unicuiq; prædictorū pharmacorū aliquid ex diſcuſſorijs addere. At uero quum & hæc om-nino multa ſint, à molliorib; auſpicandū erit. Ab acribus em̄ inſſāmata exacerbanē. Atq; ea gratia cōpoſita medicamēta in uſum uenerūt, quum ad altarū partiū inſſāmationes tum gurgulionis. Ve-luti quum ad alumen iridem ſlyricam ammiſce-mus, aut farinam eruīnam, aut thus aut myrrham.

Quum enim adstringentia sint multa, & nō pauca citra acrimoniam discutiētia, varietas pharmacorum ad columellas inflāmatas merito multi- iuga facta est. Ceterū tu perspecta inflātionis magnitudine ac caliditate, & cōsiderata influxus quantitate, amplius q̄ copiam humorū in toto corpore per cōiecturā assequutus, pharmaco in quo aut adstringentiū aut discutientiū uis excellit uteris. Adscribā autē rursus etiā hīc pharmaca quæ ab expertissimis tradita sunt, partim quidē cū proprijs discriminitibus, nō pauca uero etiā citra distinctio- nes, in quibus sanē ego, uelut etiā in alijs quæ supra tradidi, propria discrimina apponam.

Quæ Archigenes scripsit ad gurguliones inflāmatos. 2

Adpropositam affectionem sic scripsit Archigenes in primo pharmacorū. Uua laxata succum dissolutū ad moue, aut gallam tritam cum sale, aut ipsum sal dissolutum, aut lycij radicem tritam, aut omphacitū cum melle. Si uero fortius uelis. Atramētū sutorij, squamæ æris, aluminis scissi, misyos, myrrha, gallæ, æquas partes tritas ac uino ex- ceptas illine. Si sola illa Archigenes tradidisset & sic cessasset, haud in iuria ipsum reprehenderim citra discrimen scribentē pharmaca facultatis penitus contrariæ. Verum quando in sequentibus hanc ipsam tradendi negligentia corrigi, recte facit. Quod uero indiscriminatim hæc dicta sint, hinc discere licet. Uua, inquit, laxata succū dissolutū ad- moue. Oportebat equidē etiā hic apponere, qualem succū dicat, Verū quā omnibus iam persua- sam sit cyrenaicū succū optime facere ad columellam inflāmatam, non apposuit cyrenaicū, & ob id sanē minime quispiā ipsi succū fuerit. At uero q̄ acerrimū & maxime excalfactoriū pharmacū, ip- sum cyrenaicū succum cum cōtrarijs scripsit, non apponens discrimen, neq̄ ostendens quādo ipso succo uti conueniat, & quando astringentib. phar- macis, in hoc perperam fecit. Atramentum sutorij um enim & squamam æris, & alumen scissum, & misy, & gallam, omnia æquis partibus in uino te- rere iubens, amplius q̄ ad hæc myrrhā pari pon- dere addēs, hoc modo cōposito pharmaco uuam illinit, quod fortissima adstringendī facultate præ- ditum est. Verum huius scripturæ indeterminatā incertitudinem mox mitigauit, præscribendo uide- licet hæc uerba pharmaci cōpositioni, Si uero fortius uelis. Hoc em scripsit tanq̄ scientibus no- bis quando fortibus utendū sit. Porro mixtū phar- macum est & hoc ubi scripsit, aut gallā tritā cum sale, Galla enim uehementer adstringit. Sal uero discuit cū modica adstringente. In principio uero sale non est priuatim utendū, sicut neq̄ succo, sed in indurata iam & diuturna columellæ inflāma- tione. Ipse autē non columella scripsit, sed uua laxa- ta, cum uulgo existimans columellæ inflāmatio- nem uua appellari. Et quid mirum hoc putādim, quando etiā ex nostratibus quidā ob Atticissimum superciliosus & iactabundus, uuam ipsam particu- lam appellari existimauit. Maior em huius quā Archigenis ignorātia fuit, quanq̄ tum ex alijs uer- tibus huius appellationis usus parabilis sit, tum

Galen.

A ex Hippocrate constet, ex his adeo in Pranotio- num libro, uerbis. Gurguliones cum periculo ex- cinduntur, uruntur, ac reserantur quādiū rubri fue- rint, & magni, Nā & inflātio ad hoc cōsequē, & sanguinis eruptio. Verum tales graciles redde- re alijs artibus hoc tēpore oportet. Hæc præfatus Hippocrates deinceps ait. Quum uero totū fuerit separatū, quod sanē uuam uocāt, & extremū gur- gullionis maius & liuidum fuerit factum, superior uero pars tenuior, in hoc sanē tēpore tutū est ma- nus admoliri. Præsterit autē alio prius euacuata manū adhibere, si tēpus hoc permittat, & nō suf- focet homo. Manifestus autē adhuc Diocles inter- pretatus est, qualis sit affectio uua appellata, & post eum Praxagoras & Mantias, & quicumque concomitantia affectus conscriperunt. Quidam uero etiam ob id affectionē uuam appellatā esse dixerunt, quod uua fructū extremum gurgulio- nis simile apparet. Quæ porro deinceps ab Ar- chigene scripta sunt, recte dicta sunt, discrimina- nimirum usus ipsorum eo adscribente. Habent autem sic. Commune pharmacum columellæ & tonsillarum. In cōmune tum tōsillis, tum co- lumella inflāmatas, aut exulceratis, in principio cōuenit, quies, inedia, & cōsequens diæta, garga- rismi simplices leniter adstringētes. Postea diluti- or tepida, aut aqua multa, aut palmularū, aut uitis pampinorū, aut malorum cotoneorū, aut mespi- lorum, aut pirastroorū, aut rosarum decoctū, ita ut ad austeram decocta parū mellis ammiscæ. Re- cte hoc loco adscripsit, austeris parū mellis ammi- scendū esse. At paulō ante quā aqua multa per se uti iussit in principio inflātionū, nō recte fe- cit. Nihil enim adstringēs habet aqua multa, sed rectissime quis ipsam extersoriam dixerit: & si si- mul discussoria dicat, nihil deliquerit. Quæ uero deinceps ab eo scripta sunt, recte habent in hunc modum. Facit & acaciæ succus aqua dilutus. Illi- nēda sunt etiam cōsimilia stomatica medicamen- ta, uelut est quod ex maris cōstat simplex. Rhois item syriacæ ac corariæ cremore cocto ad ipsius di- nem, cū melle mixto utere. Aut puniceorū dul- cium atq̄ acidorū succū ad mellis crassitudinem decoquito ac utitor. Aut uua acerbæ succū ex- pressum adhibeto. Aut rubi, aut lentisci, aut tere- binthi, aut myrti, aut rosarū succo cū melle utere. Et postea forinsecus alumē scissum cum dimidia aloes parte, ac modica acaciā cū succo solani, im- ponere cōsulens, hæc uerba infert. Quod si more tur inflātio, acetū tepidum per se gargarisset, aut galla trita ammixta, aut rubi aut agrestis oleæ radice. Aut cyperi decoctū cum melle. Aut pas- sum cū aqua. Aut sycites uinum calidū. Aut mal- uæ decoctū. Manifestū est enim hæc auxilia cō- munita esse, uelut prædictum est, tum columellæ, tum tonsillarum. Verum non recte uidetur mihi passō cū aqua considerare, utpote imbecilli ad talia medicamēto. quemadmodū etiam uino sycitæ, & maluæ decocto, priusquā ad suppurationē perue- niat affectus: oportebat autē hoc ipsum ab eo indi- cari. Cōnectit deinde Archigenes ad prædicta

tom. 5

E 2

sic

fic scribēs, Illinito & ea quæ supra ad ulcuscula in
naribus scripta sunt. Priuatim aut picem cū oleo
aut melle. Aut crocomagma cum modica galla
& melle. Aut alumen rotundū cum flore tosa-
rum tritum, aut rosas aridas, aut florem ipsarū, tri-
ta insperge, aut tum tōssillis, tū uix insuffla. Aut
cyperi radicē, uel myrtum, aut lentiscum, uel ru-
bum, aut gallam, aut salem tenuem similiter in-
sperge. Aut omphaciū uel lentiscū cū melle illi-
ne. Aut florem rosarū uel crocū cum mali pūicti
succo. Hic rursus adstringētia ad discussoria ci-
tra discrimē permiscuit. Nihil enim simile est in-
spergere salem tenuē, aut rosas siccas, uel florē ip-
sarū. Aut pice cū oleo uti, quod pharmacū est cal-
factoriū ad discussoriū, aut galla & alumine, quæ
pharmaca sunt maxime adstringētia. Caterū in-
durata iā inflammatione, recte pix liquida adhibea-
tur, aut arida oleo liquefacta. Tūc uero etiā sal
cōmodus fuerit, corpore uidelicet prius euacua-
to. Incipiente uero aut augete et cum multa
caliditate uigente, maxime contrarium auxiliū
est pix cum oleo, eademq; ratione etiam sal. Cō-
sequenter autem recte descripsit Archigenes ad
uigentem affectionē auxilia. Indicat autē ex eo,
augete et nihil opus sentiens ex præscriptis
malum. Habet sermo eius hoc modo. Si uero
in uigorē peruenerit affectio, aut alius subducat,
aut fursurū loturā calidā gargarisset, aut prifanæ
succum, aut passum tepidū, aut radicis dulcis de-
coctū cum passo & hyssopo, aut ficus uino inco-
ctas, aut prifanæ succū in quo uix passū inco-
ctæ. Magnopere iuuatur si amygdalinū oleum in
aures infuderis, forinsecusq; spogijis expressis le-
niter foueris. Quin et omelysis ex cruda ordeacea
farina imponēda, aut ex farina feminis lini aut sce-
ni greci, aut etiā mixtura ex his omnibus facta. Si
ita prope suppurationē fuerint tonsillæ, coaduna-
re assidue per sicuū decoctū oportet, & tantū non
indefinitē id ad gargarissandum exhibere, simi-
literq; aquam mullam calidam. Si uero nihil tale
apparuerit, augetat tamen malū, ita ut ægre tra-
glutine possint ægri, & suffocationis principium
sit nobis suspectum, alius fortī clysteri aut glan-
de subducendum est, & uena cubiti secanda, cū
bitaq; cum scarificatione collo ac mento affigen-
de. Fomentis etiam ac cataplasmatibus frequentius
& robustius utendum & assiduis gargarismis.
Quod si ad nullum horū præsidiorū cedat sed au-
geatur, uenæ uel lingua secentur, aut iuxta angu-
los oculorū, atq; ea quæ in fronte est. Illinatur au-
tem assidue fel tauri, & elateriū cum melle, aut sal
cū oleo ueteri melleq; & aceto. Aut cetaurea cum
melle. Aut absinthiū cum nitro & melle. Aut
hirundines integras unā cū pennis uistas ac tritas
cum melle illinito. Aiunt aliqui etiā summe face-
re hirundinū pullos teneros ualde siue recentes,
siue inueteratos affatos, & in cibo exhibitos. Sta-
tim enim leuāt suffocationem. Siue autem pueri
sint, siue senes, sulphur & iridē cum melle delin-
genda dato. Quod hæc cōmunes medelę sint utri-
usq; uelut in principio dixit, uix uidelicet & ton-

fillarū, manifestū fecit ex his quæ cōsequenter in-
fert, quum ait. Aliquā angina præhēsis, quos tum
synanchicos tum cynanchicos Græci appellat, elate-
rii, & fellis tauri, utriusq; obolos ij. cū aqua mul-
sa tepida bibēdos præbēt. Quidā uero a fellos sub
aquarū uasis nascētes in poru exhibēt, aut delin-
gendo dant, & aut dolentibus & affectis partibus
illinūt, & ualde se iuuari testant. Quin & per ua-
porē intra os receptū hoc modo fomentum adhi-
betur. Origanū aut hyssopū, aut saturisam, cū suf-
ficiēti aceto diligēter in olla feruefacio obtura-
ta. Operculū autē circa medium habeat foramen.
Deinde harūdinem ad foramen operculi ac os e-
gri adaptato, ac fomētum admittito. Si uero os a
feruore harūdinis cōburatur, outi uacuū utriusq;
perforatum ægri in ore contineant, & per ipsum
harundo inseratur. Mollis sit fomentum, si pro
aceto aqua sumatur. Quidam nitrū, & origanum,
& nasturtij semen, ac oleum in posca trita miscēt,
& similiter pro fomento adhibēt. Aut cinerē pul-
lorū hirundinū implumiū illine, aut solani succū,
& butyrum æquis partibus cum rosaceo cerato
mento impone. Eis uero qui suffocantur, picem
cum aqua & nitro in potu præbe. Hæc quidem
Archigenes scripsit. Ego uero nunq; tentauī ulli
alicui, ea quæ biuntur pharmaca, in eiusmodi af-
fectionibus exhibere, qualium sanē tum ipse, tum
alij quidam meminerūt. Itaq; hoc quod ad finem
sermonis præscripti habetur, his uerbis; Eis uero
qui suffocantur, picem & nitrum cum aqua in po-
tu præbe: non possum mihi persuadere quæ ratio-
ne sit dictum. Imō neq; ex præceptoribus alique-
m, neq; alium ullum eo utentem uidi, neq; etiam ip-
se in usum assumere tentauī. At uero uenam seca-
re eis qui suffocātur, & eluere forti atq; acri clyste-
ri, & purgatoria exhibere, gratia euacuandi uni-
uersum corpus, & transferendi infra humorū mo-
mentum qui ad affectas partes feruntur, rationa-
bile est, & multa experientia iudicatum ac cog-
nitum. Similiter etiam post totius corporis euacua-
tionem, & diuersionem ad infernas partes, phar-
macis acribus, multū discussorijs uti, rationi con-
sentaneum est, & experientiam testem habet. Picem
uero cum aqua et nitro in potu præbere, absi-
nuī, utpote quum neq; alium utentem uiderim,
neq; rationem ad hūc usum ducem habeam.

Quæ Apollonius in primo parabiliū prodidit. 3

Apollonius in primo parabiliū sic ad uerbum
scripsit. Ad inflammata cōmellam illinationem. Sa-
le trito & melle illinens reprimēs cōmellam. Pi-
cem illinens per digitum apprimito. Succum cy-
renaicum aqua diluito, & cōmelle adhibeto.
Chalcitidem tritam similiter admoueto, ompha-
cio trito cum melle utitor. Hæc Apollonius.
Licet autem nobis uidere in his quæ absq; disci-
mine scripta sunt, quod si quis non uniuscuiusq;
indefinite scripti facultates nouerit, quo in opor-
tuno tempore eis utatur, maximū omnino nocu-
mētum inferet. Scriptum est itaq; hic primum om-
nium, Sale trito & melle utendum esse. Postremū
aut, omphacio cum melle. Contraria aut facultas
est

est omphacij ad salem. Quare si quis in principio sale utat, maxime si humores in corpore ex æquo abundant, aut etiam circa caput hereant, extreme egrum ledet. Omphacium uero in principio com modissimū est, non trahens neq; euellens ad se ex alto, uelut sal cum melle, sed repellēs. Sales autem cum melle discussoriam uim habent, modica adstrictoria ui sali cōmixta, quam sanē per ammixtio nē melleis penitus euertit. Cæterum id quod ex pice constat, inueteratis inflammationibus, & iam in scirrū, ut ita dicam, induratis conuenit. Quē admodum etiam cyrenaicus succus non incipientibus, sed ubi iam quod influit per adstringentia repressum est, prodest. Chalcitis uero in totum in epta est, præterq; si ualde inueterata & ægre curabilis sit affe ctio. Est enim medicamentū mordax si cruda adhibeatur, quapropter ut uim ipsius desicamus, uita frequentius utimur. Deinceps Apollonius hæc ad uerbum scripsit. Gargarismi ad pendulam columellam, Origanū tritū, aceto & aqua affusus, seruefacito, & cum caricarum succo misce to ac utitor ad gargarissandum. Aut hyslopum terito, & caricarū coctarum succo misceto, ac utitor uelut organo. Mentan ac rutam & coriandrū cum lacte alinino trita gargarissanda præbe.

Apium & lauri folia trita, et uino aut lentis deco ctio diluta gargarissato. Noui quendam qui omnibus ab Apollonio scriptis indiscriminatim utitur in principio inflammationis gurgulionis uno ex his usum esse, & egrum extreme lassisse; præter alia enim neque sciebat quid pendula columella esset, quum uelit Apollonius ualde laxatā absq; inflammatione, gurgulionis affectionē ostendere, quam etiam relecare consueuimus, atq; in hac reuera pi tuitam detrahentia & calfacientia pharmaca com moda existunt, Nam in totū subalbida sit & exan guior. Deinde Apollonius hæc subdit. Lotium alini plurimum & calidissimum bibendum præbe. Idem etiam in angina. Miror equidem eiusmodi auxilia tradentes: certe enim scio omnes homines, paucis omnino exceptis, citius mori uelle, q̄ u rinam alini bibere. Verum hic etiam plurimā addidit, & aliās uelut etiā antē dixi, absurdissimum est curantē oris inflammationem, pharmacum potabile exhibere, nisi si ex purgantium numero existat. hæc enim alterius usus gratia dantur. Ex alijs sufficiunt quæ citra transglutitionē auxiliari possunt. Quin & quod postea scriptū est similem habet absurditatem, quod itidem bibere iubet. Scribit itaq; sic de ipso. Lauri folia trita ex uino & aqua bibenda præbeto.

Que ab Hera tradita sunt. 4

Heras igitur multo melius quam Apollonius scripsit modo. Ad columellam laxatam. Gallę omphacitis partem i. salis ammoniaci partē i. Virūq; perse ac limul terito, & expleto inde cochleario, uiam contingito. Lapidem Ageratū appellatum quo sutores ad muliebria calciamenta expollenda utuntur, deradito, indeq; cochliarium expletum uix adhibeto. Ex his duobus pharmacis, alterū posterius omnī molestia caret, neq; nocē

Galen.

re potēs, neq; magnopere iurare, quocūq; tandē tempore quis eo utatur, Fortius est prius. In principio itaq; & quum ualde rubent, minime aptum est. Si uero præeuaucto toto corpore, & post repulsiōrū pharmacorū usum, adhibeatur, ubi nō ualde rubens sit gurgulio, iuuare potest. Ex contrarijs enim fortibus componitur facultatibus repulsiōria & discussoria. Quare non recte fecit Heras indiscriminatim ipsa tradendo.

Que Heraclides Tarentinus tradiderit. 5

Tarentinus porrō Heraclides in libris ad Antiochidem, ad inflammatas columellas sic scripsit.

Omphacium siccum terito, & ammixto sufficienti melle adhibeto. Aut gallam tritam cum melle, aut alumen scissum eodē modo. Aut succum cyrenaicum cum melle. Aut Melanteriam quasutores utuntur. Aut Andronium pastillum, quem in uulnerarijs medicamentis referam, cū uino. Oportet autem post hæc lentium decoctū gargarissare. Recte ad finem hoc adscripsit. Vehementia em̄ sunt omnia præscripta ad ipso pharmaca, acerbata qualitate prædita, & ob id exasperant, Itaque aspretudinē ab ipsijs inductam mitigare uult per lentium decoctum. In moderata inflammatione non est necesse his uti, quemadmodum neq; ubi columellæ ualde rubræ fuerint, & calidam inflammationem habent. Imō neque in declinatione earum; tunc enim discussoriorum medicamentorum uim prædominari oportet.

Ab Asclepiade prodita. 6

Asclepiades ad eadem sic scripsit. Siccū ad laxatas columellas. Anethum unā cum semine & radicibus quod fatis est accipe, & in uas fictile coniectum, cuius os sit subobturatū, & ipsum uas luto oblitum, in furnum donec uas ignescat mitte, deinde ex furno extractum anethum ustum tere, & sublatum repone. Vsu uero expetente anethi partes ij. accipe, & iridis sillyrica in tenuissimum puluillum redacta partem i. ammicis, ac per harundinem insuffilla. Aliud, Rosarū siccarum sextarium i. nardi celticæ unā cum radicibus & adherente terra fasciculum unum, nidi hirundinū syluestrium aridi drach. iij. myrrhae drach. viij. galas omphacitidas numero xlv. contusa & trita insuffilla, & cum digitis adhibe. Ex his duobus pharmacis prius penitus nihil ex repulsiōrijs habet, sed est totum discussorium. Alterum uero ex contrarijs mixtum est facultatibus; multā enim discussoriam uim habet syluestrium hirudinū nidus, adstringentem autem gallæ. Mediæ uero potentia est myrrha, & mixte nardus celtica, ita ut tum discussoria, tū adstrictoria facultas, ambae in eo sint moderata. Cæterum per harundinem eiusmodi pharmaca insuffillari, ualde improbo. Desertur enim ex ipsijs multum, tum in gulæ summum, tum in ipsam gulam. Præstat itaq; cochleario indita apprimere, quemadmodū ego uti soleo, ut uidistis. Quin & tertium pharmacū Asclepiades post prædicta duo conscripsit his uerbis. Siccum ad laxatā columellā & tumulentem Neapolitæ. Piperis albi 3. i. myrrhae 3. i. aluminis scissi 3. ij. gallæ ompha-

tom. 5

E 3

citidis

citidus 3. ij. trita admove. Hoc pharmacū a principio usq; ad finē utile esse poterit, præterq; in uehementer rubentibus. In his em̄ uitare oportet acritum ac mordaciū ualde mixturā, quale hoc loco pi per existit. Aliud deinceps eiusdē facultatis scripsit ad tumentes columellas ex his cōpositū. Lapidis agerati 3. iij. floris lapidis Asii 3. iij. terræ famiæ 3. iij. aluminis scissi 3. ij. croci torrefacti 3. ij. gallarū omphacitidū 3. ij. tritis utere. Hoc & nos usi sumus saepe ut optimo, & quod omni tēpore iturare possit, præterq; uelut in præcedenti dixi, statim in principio, & quū ruber & calidus fuerit inflammationis tumor. In inueteratis aut̄ iā, & corpore euacuato, post unum usum statim magnam cōmoditatē exhibet. Sunt enim uehementer adstringentia, ac discutiencia, & ea quæ mediā materiam sunt, in ipso temperate mixta.

Critonis pharmacum hoc modo scriptum ad columellas, 7

Hoc pharmacum ad ipsam temporis oportunitatē apparato. Ofsium palmularū, nucum tenerarum immaturarū siccarū, utrorūq; 3. iij. urito ac in puluillum terito. Vtere arido admoto. Et in hoc pharmaco ofsium palmularū uis satis discussoria est. Nam & in alijs affectionibus, eorū experientiam habemus, quod eiusmodi uiribus sint prædita. Nucum uero tenerarū siccarum cinis, discussoriam uim habet unā cum adstringente.

Soranus ad columellas, 8

Quin & Soranus pharmacū indiscriminatim scripsit, nō apponēs in quibus priuatiū faciat. Habent aut̄ uerba eius hoc modo. Radicē dulcē cunctidito, & mel & dulcem aquam pari mēsurā asfundito, deinde coquito, et succū gargariandum præbeto. Peccauit in hoc quod nō adscripsit, maxime mitigatoriū hoc pharmacū esse, quod in uigore inflammationum magnopere auxiliari potest. Huius usus commodus etiam est, ubi ex acerbis pharmiticis immoderatus quis irritarit & exasperarit columellam iussammatam. Hanc enim lenit hoc pharmacum.

De pharmacis ad ulcera oris aphthas appellatis. Cap. IIII

Vlceratiōes in superficie oris obortas aphthas appellant, habentes quippiam igneæ caliditatis: si uero aut̄ ut plurimū pueris lactentibus, quum aut uisiosum fuerit lac nutritis, aut non probe ipsūm concoxerit infans. Curātur facile utpote quæ ex moderata adstringentibus sedantur. Quandoque tamē diuturnę fiunt ac ægre solubiles, & progressu tēporis putredinosum quid acquirunt, quod à Medicis Nome appellat. Scripta itaq; sunt & ad ipsas medicamenta moderata quidē ad eas quę nihil maligni habent. Fortia uero ad eas quę iā quid putredinosum & serpendo depascens habent. Mentionem faciā eorū quæ recentiores coaceruarunt. Nam ex his quę ueteres conscripserunt, optima cum magna experientia ipsi elegerunt, & quędam eorum quę postea inuēta sunt apposuerūt. In uentis aut̄ post ueteres, etiā Mantia & Heraclide Tarentini plurima pharmaca scripta. Similiter & Menecrates librum optimorū pharmacorum inscripsit, ex quibus plurima ipse inuenit. Quamad-

modum & cappadox Heras. Andromachus aut̄ duos, & tertiu in quo ocolorū pharmaca cōtinentur. Plures aut̄ libros cōposuerunt Antonius Musa, & post eum Asclepiada duo, et post hos Crito. Verum hi quidē tres post Andromachū nati sunt, Heras aut̄ ante Andromachū, & ante ipsum etiā Musā ac Menecrates. Lōgo uero tempore etiam hos præcesit Heraclides, & præceptor eius Mantias. Verū Mātias uelut ab initio Herophili sectator fuit, ita etiam per omnia māsit. Heraclides autē medicorum empiricorū sectam elegit, optimus medicus tum circa alias partes factus, tū plurimorum pharmacorū expertus. Quum itaq; apthę, de his em̄ sermo institutus est, malignę euadunt, fortioribus medicamentis egent, qualia etiam alias in tonsillis ac ore affectiones sanant. Prædicto igitur scopo cōpositionis eorū, nihil amplius opus habeo de his dicere, sed ad narrationē progrediar præcognitorū, initio sumpto ab his quę Andromachus scripsit, quemadmodum conserui ad uerbum ipsa transcribere.

Quę Andromachus scripsit ad aphthas, 2

Non solū Andromachus, sed & alij multi duo pharmacorū genera ad aphthas conscripserunt. Ad eas quidem quę nihil maligni habent, moderata uiribus pharmaca cōponētes. Ad malignas uero fortiora: adscribunt aut̄ in his ipsi aliquando quod ad aphthas & ulcera hoc pharmacum conuenit, aliquando quod ad aphthas putredinosas, Quum uero simpliciter ad aphthas adscripserint, simplices indicant & nihil maligni habentes. Andromachus igit̄ ad malignas aphthas sic scripsit. Ad aphthas in ore & ulcera. Aluminis scissi uisti drachmas ij. fructus ericæ drach. i. oleo excipito, & per digitum locis apprimito. Aliud, Aërginis drach. ij. aluminis scissi partes ij. galle in puluillum redactę partem unam, terito & per linteolum conseruato, deinde digitū oleo madefacito, succumq; excipito, & tonsillis extergerendis apprimo, itē palato, & uar. Disparat pelliculas, & tollit asperitates circa ipsum os, callos excoriat, & ulcera ad cicatricē perducit. Cæterum ad aphthas in superficie harētes sic scripsit. Ad aphthas lycium Indicum uino tritum circumlitum facit, & ericæ fructus tritus, aut rosę sicce cum melle. Hęc præfatus infert. Si uero nigrae sint & malignę, Uar passæ purę partes iij. anisi tantundē, trita cum melle illine, deinde collue.

Quę Crito ad aphthas scripsit, 3

Crito uero sic ad aphthas scripsit. Portulacam in melle tinctam manducet, aut oleę folijs in uino coctis os colluat, aut foliorū myrti albæ decoctio ex uino, aut ærginis uermiculatę obolos iij. in uini hemina parte quarta tritos colluat. Quin & galla in aceto acri teratur, ac illinatur. Faciunt & amygdalę amarę cum melle. Nigrefactas autem aphthas, uua passā exacinata & aniso tritis cum melle illine. Tarētinus autem Heraclides, ubi ex terferis ait farina erui cum melle, gallā cum melle adhibe. Conuenit & Rhus obloniorum cum mente ramulis. Sic autem Rhois copia quantum

tribus digitis prehendi potest, mentæ uero ramul-
 tres, & rosarum folia septem, & nuces pineæ sep-
 tem. His omnibus eum melle tritis utitor, aut ly-
 cio ex aqua. Conuenit & sex uini dulcis illita cum
 melle. Aut alumē, & maliciorum punici dulcis,
 æquis portionibus terito, & adipe anserino mixta
 illinito, atq; aquam calidam frequentius colluen-
 dam præbeto, ampliusq; adipem anserinū admo-
 ueto. Aliud Musæ. Fructus myricæ drach-
 mas sex, aluminis fuscissimi drachmas duas, oleo ex-
 cepta admoue. Aliud maxime in pueris. Rhoem
 rubrū tritū melle mixtū illine, aut adipē suillum &
 mel liquefacta. Præbeto eis etiā gargarissandum
 lac alinum. Quod si multa saliuā feratur, gallam
 & solanū aceto diluta gargarissare facito, aut uiol-
 las albas siccas cum melle tritas illinito. Hæc
 quum scripserit Crito, merito quis ei succēseat, ut
 litur etiā alios semper reprehendo, qui ex ordine
 indiscriminatim auxilia recensent, non apponen-
 tes an incipiente affectione, aut progrediente, aut
 decedente, aut uigente, aut decrescente, conueni-
 ant, & Num parua existente affectione & matura,
 aut adeo maligna ut iam putredinosum quid ha-
 beat. Ex his enim quæ scripsit aliqua simplicissi-
 ma sunt in pueris maxime conuenientia nullam af-
 fectionem habentibus. Vel ut quum adipem suil-
 lum & mel liquefacta assumit, et multo magis quā
 alinum lac colluere præcipit. Simplicissimum
 pharmacum est & portulaca melle tincta & man-
 ducta, & collutio ex folijs oleæ, similiterq; ex myr-
 to alba. Fortissimum uero quod ex æruginē & ui-
 no constat, quemadmodū etiā galla acri aceto
 trita ac illita. Valde enim forte hoc pharmacum,
 uelut etiā id quod ex æruginē constat. Verū in
 illo paucissima est ærugo, (obolos enim tres dixit
 in uini quarta hemina parte terendos esse ac col-
 luendos) debilisq; sit, copia mixturæ uini exoluta,
 Galla uero aceto acri trita ut crassa fiat, & illitioni
 apta, ualde uehemens est pharmacum. Quemad-
 modum etiā quod ex alumine & maliciorum pun-
 nici dulcis componitur, quod nisi ad adipem anse-
 rinum ammixtum esset, ad putrefactiones fortes
 congruens esset. Forte est & quod ex myricæ fru-
 ctu ac alumine constat, sed nō adeo uelut id quod
 ex galla & aceto. Semel porò tantum recte fecit
 apponendo in uerborum serie sic. Quod si multa
 saliuā feratur, gallam & solanū aceto diluta gar-
 garissare facito. Multam enim saliuam ferri, maio-
 rem affectionem esse significat. Præstabilius autē
 fuisse statim dixisse. Quod si pascendo proserpat
 affectio, aut ulcera profunda fiant, aut eiusmodi
 quippiam adscripsisse.

De his quæ Asclepiades ad aphthas
 scripsit. 4

Recte igitur fecit Asclepiades, tamen si nō mul-
 tapharmaca ad aphthas conscripsit. Veruntamen
 in duobus quæ in principio tradidit sic. Ad aph-
 thas citra nomen serpendo depascentes. Deinde
 post duo rursus adscribens. Ad aphthas depascen-
 tes. Lenia enim sunt duo pharmaca, alterum qui-
 dem prius in quo ait. Medullam bubulam melle

A mixtam ac tepesactam illinito. Maxime uero pue-
 ris infantibus est commodum. Alterum uero est.
 Adipe suillo melli admixto utitor. Caterum ad de-
 pascentes aphthas, gallarum decocti cyath. ac mel-
 lis tantundem miscere iubet, & seruesacta uti. Ve-
 rum ego tum hoc pharmacum, tum alia tria post
 ipsum tradita, paulo antè in pharmacis ad no-
 mas præscripsi: neque enim referre puto, siue
 ex aphtha, siue ex alio quopiam transitio ad no-
 men contingat.

Quæ ab Apollonio ad aphthas scri-
 ptæ sunt. 5

Apollonius autē Herophili sectator in primo
 parabilium pharmacorum sic scripsit ad uerbum.
 Ad aphthas albas. Chalcididem oleo tritam pen-
 na illinito. hoc euestigio sedat. Postquam uero pu-
 ra facta fuerit, Myricæ fructum tritū, & aqua muls-
 a aut uino dilutum illinito, maxime infantibus.
 Deinceps autē aliud scribit, & maxime ad nigras
 aphthas. Vuam passam exacinatam & anisum
 trita cum melle illinito. Et rursus aliud. Atra-
 mento futorio trito cum melle utitor. Videtur
 sanè in malignis, eiusmodi pharmacis iubere uti.

Adscripsit itaq; ad primū. Ad aphthas albas.
 Ad secundum. Ad nigras, ostendens per id colo-
 rem præter naturam, & magnitudinem affectio-
 nis. Consequenter adscribit & collutiones ad aph-
 thas, hac uerborum serie. Vino nigro austero &
 subadstringente colluito. Oleæ folijs in uino coctis
 colluito. Myrti albæ foliorum decocto cum uino
 similiter utere. Hæc collutiones citra discrimen scri-
 ptæ nullum detrimentum inferunt. Nam & in mo-
 deratis, & in maioribus, & in maximis affectio-
 nibus conueniunt. Recte uero deinceps aliud ualde
 efficax scripsit. Aeruginis uermiculatæ obolos iij.
 in uini quarta hemina parte gargarissandos præ-
 be. Deinde etiā uinum colluendum præbe. Hoc
 enim in fortioribus cōuenit, quemadmodum etiā
 quod cōsequenter sic scripsit est. Muriæ oliuariæ
 & acetū pari mēsurā mixta collueda dato, indeq;
 uino colluito, postea etiā qua mulsā, deinde aqua.
 Post omnia uero oleum colluendum præbe. Post
 hæc duo pharmaca scribit diuersis formis ac spe-
 ciebus aphtharum congrua. Hyssopum enim tri-
 tum ad calidas & erosas affectiones, itemq; puras
 maxime contrarium est: congruit autem fordidīs
 & inflammatis aphthīs. Omphacium uero cum ui-
 no aptum est pueris & mordacitatem sentienti-
 bus ac erosīs. Iubet autem omphacium cum uino
 tritum collui, hyssopum uero cum uino & aqua
 mulsā. Validū ualde est quod ab his sequitur phar-
 macum, ut iam pascendo proserpentibus aphthīs
 conueniat, quod ipsum componit, myricæ fru-
 ctum coquens cum aceto. Validum est & quod
 deinceps ab eo scriptum est, in quo ait, Gallam tri-
 tā in acri aceto colluendū præbe. Hoc uero quod
 postea sequitur, in quo ait, siue cō silphij diluto simi-
 liter utitor, & postea oleum colluedū dato: etiā
 ipsum acre & mordax est ac discussorium non ad-
 stringens. Non recte itaq; adstringentia & acerba
 ac repulsoria, discussoria sunt ac acris,

atq; hoc nullo discrimine adiecto. Quod uero se-
quitur ex aceto apparatus generosum est: quod
autem non appositum ad acetum, acre, in hoc deli-
quit, & quod per semen lini moderatius reddita-
cui, adiecit autem ipsi etiam lolium, pharmacum
multum discusorium, atq; propterea ipsum ad lin-
guæ tumores conuenire ait. Verum ad scribam om-
nem ipsius dictionem. Semen lini, ac lolium, æ-
quis partibus aceto trita colluio. Hoc itidē ad lin-
guæ tumores facit. Longe lenius his omnibus
pharmacum deinceps scripsit hoc modo. Folia
pruni confusa ac lacte permixta colluio. Quum
em̄ adiecerit sermoni, colluio, manifestū est quod
multo lacti pauca folia ammiscet. Nam si folia
cum lacte trita pro pharmaco inunctū esse iussisset,
palam utique esset, quod multa folia, pau-
cum uero lac esse iussisset. Deinceps porrō etiam
quæ mansa aphthas inuent annectit. Mandendæ
sunt oliuæ muria conditæ. Manifestum est lenissi-
mum hoc pharmacum esse. Et rursus. Portulaca
melle tincta māducetur. Et hoc similiter mite est.
Differunt hæc duo inter se in eo, quod oliuæ mu-
ria cōditæ & adstringūt, & discutit; plurimā uero
in se adstringēdi uim habēt. Portulaca uero cū mel-
le imbecillius est pharmacū. Consequenter probe
fecit quū ait: In pueris conuenire quæ dicturus est
medicām etiā. Scribit uero de eis in hæc uerba. Vbi
puer aphthas habeat, Similaginem & medullā bu-
bulā, ac farinā, cocta in cibo exhibeto. Si uero su-
gere nequeat, liēnem bubulum in uino coctum,
ac tritum cum melle, in cibo dato. Hoc pharmacū
superuacaneum est, & plus æ quo curiosum. Dein-
ceps recte scripsit. Abstinentum circa diætā, ab
acribus, & salis, & acidis tum edulsijs, tum poti-
bus. Deinde haud scio quo modo, in hanc senten-
tiam scribit. Atramētū futuriū tritum cum melle
illinito. Hoc enim medicamētum superius scribere
oportuit cum alijs fortibus pharmacis.

Quæ Archigenes scripsit ad aphthas. 6

Quædam ex his quæ Archigenes ad aphthas
scripsit, eadē sunt cum præscriptis, Verum uisum
est mihi ex ordine omnem ipsius sermonem ad-
scribere, ita ut nihil ex eo relinquam. Scribit igitur
sic. Ad aphthas collutiones faciunt. Foliorum
oleæ decoctum, aut foliorum myrti albæ eodem
modo. Aqua oliuæ colymbadis appellatæ, hoc est
muriæ innatantis. Facit & amurca, & marubij
succus, aut lentis decoctū, seu rubi, aut cypri. Aut
æruginis uermiculatæ obolos tres in uini cnsidij
quarta heming parte dissolutos colluat. Illitiōes
autem faciunt pleræq; ex descriptis stomacis me-
dicamentis: priuatim autem congruunt hæc. Alu-
minis scissi, florū rosarū, æquales partes, fructus
myricæ duplum, utere siccis. Aut thus & glycyrrhi-
zæ succum æquis portionibus, gallæ, myrrhæ, ani-
si, singulorum parum quid, cum uino proptropo il-
line. Aliud. Mannam & salem pari pondere
sicca, per pennam adhibeto. Aliud. Fecem ui-
ni dulcis cum melle illinito. Aliud. Misy & a-
lumē & Rhoem cum melle, aut chalcitidem cum
oleo, per pennam illinito; uehemēter bonum est.

Aut oleæ folia cum oleo illinito. Postquam
uero repurgata fuerint, myricæ fructum cum a-
qua mulla aut uino illine. Aut ubi cum erui fari-
na & melle exterseris, gallam cum melle adhi-
be. Aut myricæ semen & aluminis tertiam par-
tem cum oleo illine. Hoc etiam ad nomas fa-
cit. Aut adipem suillum aut anserinum man-
na inspersa illinito. Aut gallam tritā cum oleo.

Aut liquidum alumen dilutum. Aut cypri fo-
lia manducent. Aut lycij radicem aridam adhi-
be. Aut oleæ germina trita ex melle. Aut gal-
lam cum sale. Si uero extendatur affectio, & ser-
pendo putredinose depascat, collutionibus quod-
dem & gargarismis utēdum est ad aphthas deseri-
ptas fortioribus: priuatim autem muria frequen-
tius colluenda est. Aut herbam sacram aqua aut

uino incoctam colluendam aut gargarislandam
dato. Illitionibus etiā ad aphthas descriptis for-
tioribus utatur: priuatim uero cornu cerui tritum
africa. Aut atramētum futorium tostum tritum
cum melle. Aut æuginem aris siue squamam
cum melle. Summe facit ad nomas, foeniculi ra-
dicis usta cinis. Hæc ad aphthas Archigenes in
primo de pharmacis scripsit, quæ parum abest ut
om̄ia etiam alijs sint scripta. Quid igitur opera-
pretium duxi eadem his scribere, quamuis caue-
rim ne hoc facerem? Quod sanè & Archigenem,
quem scimus maiore quàm alios dignitate, etiam
communia cum proprijs discriminibus scribere
posse, uidebam nunc ipsum in pluribus eiusmodi
doctrinā negligentē. Nunc enim om̄ia cōsulum
proiecit auxilia, unā cum hoc quo cōtinentur in-
ter se scribendo cōmiscuit, lenissima & acerrima.
Quid enim simile habet ærugo ad lētis & rubiæ
cypri decoctū? quid galla simile adipi anserino aut
suillo? Acre enim & erodens fortiterq; reliscans
pharmacū est ærugo. Rubus autē & cyprus, & lens,
paucissimam habent adstringendi facultatem. Sic
etiam galla fortissime adstringens, cōtrariam uim
habet suillo ac anserino adipi. Quin & deinceps
ab eo scripta planeq; om̄ia quorum mentionē fa-
cit, eandem confusioē perturbati ordinis habēt.
Præstabat autē uelut semel alicubi in sermone ap-
ponendo dixit, Hoc etiam ad nomas facit: eodem
modo etiam alia distinxisse, ac uadscriptis uideli-
cet, hoc quidē infantibus ac pueris conuenit, hoc
uero perfectis: & hoc incipientibus aut moder-
tis aphthas, hoc aut uigentibus & fortibus. Maxi-
me uero omnium, aut inflāmatas & calidas, aut ma-
gis frigidioribus: & ex inflāmatas, hoc quidem ru-
bicūdiōribus, hoc uero flauioribus. Aliæ enim ex
sanguinea, aliq; ex flaua bile inflammationē habent.
Quemadmodum rursus non inflāmatæ pituitose
in totū existunt, quemadmodū aliq; ex inuete-
ratis humoris atræ bilis malignitatem acquirunt.

Cognoscent hæc om̄es facile uisū simul et tractū.
Visū quidem ex coloribus, quemadmodū etiam
nunc dictum est. Rubicundiores enim sanguineū
humorē præualere ostendunt: flauiores autem æ-
maram bilem. Quemadmodū rursus albescentes pi-
tuitosiores, liuescentes & nigrescentes, atræ bilis

succum. Qui enim hæc rite discuerit, noueritq; amplius singulorum simplicium pharmacorum facultatem, quemadmodum in libris de ipsis à me scriptum est, is in unaquaq; aphthæ specie, tum simplicibus, tum compositis uti sciet, uelut iam sæpe est prædictum. Considerabit autem simul & corporum naturas. Num molles sint & humidæ, uelut in pueris, eunuchis & mulierculis, an duræ & aridæ, uelut in piscatoribus ac nauitis, & uenatoribus atque agricolis. Fortioribus enim corporibus fortiora adhibebis pharmaca, debilioribus molliora. Ego porro infantibus qui adhuc à nutricibus aluntur, lenit̃ cum modico pane & medulla cerui, aut uitulo præbeo. Ammiſceo etiam cibis, ex malis cotoneis, atq; alijs quæ adstringunt, uelut Romæ cæstiana appellata. Quin & ex piris addo, forbisq; ac melipilis, & cornis. Quandoq; etiam ex lactuca, & seride, ac solano, & portulaca in cibis permisceo, si aphtha fuerit inflammata. Quod si cibum adhuc adsumere non queant, nutricẽ eiusmodi uictualo, etq; simul bonam cõcoctionem prospicio. Verum tamen etiam infantes pharmacis illino, si quidem subrubras uidero aphthas, in principio quidẽ his quæ moderatissime adstringunt ac frigefaciunt; deinde uero his quæ citra mordacitatem discutunt. Si uero subflauas uidero, iisdem quidem utor, sed magis refrigerantibus. Si uero pituitosiores, adstringentibus. Si nigrescetes, discutiorijs generosioribus. Cæterum in maioribus pueris, eiusdem generis facultatibus pharmacorum utor, aut̃is tantum uiribus ipsorum. Quemadmodum sanẽ etiam in perfectis & duris corporibus, singulis relictis facultatibus fortissimis utor. Sufficit autẽ mihi in his per omnia misyos usus cum uino adstringente, quod tum intendit, tum remittit uim suam, prout magis aut minus uinum fuerit adstringens, & prout crassius aut liquidius efficitur pharmacum ex misyos ac uini mixtura. Quod si sordida appareat aphtha, Misy cum uino mulso tero. His uero qui fortioribus quam misy est, pharmacis opus habent, Aerugo similiter cum uino & uino mulso utilis existit. Illinendæ autem sunt ex his

A pharmacis affectæ oris partes. Commodum est etiam pharmacum ad hæc rem, chalcit̃is oleo trita. Atque hæc quidem efficaciora. Moderata uero & maxime ad incipientes affectiones, omphacium cum uino & uino mulso. Similiter etiam Rhus. In pueris sufficit rosarũ flos, & ipsa rosa sicca, & colutiones moderate adstringentes, pro ætatis & naturæ eiusmodi corporũ ratione. Et in summa, Moderatæ aphthæ maxime in teneris corporibus, moderatis pharmacis opus habet. Fortes uero & maxime in duris corporibus, à fortioribus curantur. Fortia pharmaca dico, tum quæ fortiter adstringunt, tum quæ mordent, & immoderatius discutunt. quemadmodum moderata, ea quæ omnino non mordent, & parum adstringunt. Fiant porro etiam in his, uelut in alijs prius dictum est affectionibus, composita medicamenta, & sæpe etiam ex contrarijs, quale est quod ex oleo & chalcitide cõstat. Ipsum equidem oleum per se infestissimũ est aphthæ affectui, uelut etiam chalcit̃is. Quãdoquidem alterũ quidem humectat & sordidum facit. Mordet autem uehementer chalcit̃is. Verum mixtura ipsorum ubi fuerit moderata, optimũ pharmacum efficit. Quemadmodũ igitur ex cerato & ærugine, incarnans effici pharmacũ ostensum est, quum tamen ambo incarnationi cõtraria existant, Eadem ratione ex oleo & chalcitide aptum medicamentum efficitur. Si uero in putredinem aphtha uertatur & exulceratioes facit, neq; aphtham amplius affectionem nominare conuenit, neq; pharmaca eiusmodi affectiones curantia, inter ea quæ aphthis commoda sunt connumerare. Quemadmodum neq; inter erysipelata sanantia, recte connumerantur ea quæ præclare discutunt liuidas & duras partes, ex frigidorum medicamentorum adhibitione tales factas, & iam ad induratum in scirrhum affectionem, ex erysipelate delapsas. Profecto enim qui eiusmodi scripturarum indiscriminata incertitudine decepti, erysipelatis calida & discussoria medicamenta, aphthis autem ea quæ putrefactis conueniunt, adhibent, non parum detrimenti inducunt.

ARGUMENTA

Cap. I. De affectionibus circa partes respirationis cõtingentibus: & diuersis eorum remedijs, scilicet, medicis, & foribus. II. De arteriacis 18. ab Andromacho descriptis. 2. Critonis arteriacæ. 4. 3. Diacodion ex capitibus papaueris, iuxta ueteres, Andromachum, Critonem, Heram, Damocratem, & Soranum. Eiusdẽ confectio secundum Galenum. De usu cõfectionis huius. 4. Arteriæ Aſclepiadis. III. Confectiones ad tussim, Andromachi. IIII. De reiectione sanguinis, &

CAPITVM LIBRI VII

hamoptoicis. 2. Andromachus. 3. Vius prædictorum Andromachi pharmacorum. 4. Aſclepiades. Vide & sequens caput. V. Confectiones dolorẽ sedantes, tabescẽtibus & sanguinẽ reiectionibus commodæ, itemq; alijs quibusdam accomodate præterquam colicis. 2. Quæ Andromachus scripsit ad prædictas affectiones. 3. Aſclepiades. VI. De orthopnoea. 2. Aſclepiades ad dyspnoicos. 3. Andromachus ad huiusmodi affectiones.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

PHARMACORVM SECVNDVM LOCOS LIBER VII

De affectionibus circa partes respirationis contin-
gentibus. Cap. I

MOS est recentioribus medicis arteriæ pharmaca, Arteriacas appellare, non apponentibus nunc antidotos dicant, an iuxta aliud significatū. Quidam uero eclecta nominant ipsa, non apponentes pharmaca, & quidam penitus nullū discrimen ipsi adscriperunt, aliqui uero raro addiderunt, alij ad uocem interceptam, alij adhuc generalius ad uocem læsam. Sunt qui & ad exasperatam arteriam, & ad exulceratam scripserunt: a deo ut rationabile sit, eos qui arteriacis appellatis pharmacis indifferenter utuntur, aliquando feliciter eis uti, aliquando uero nihil penitus ægros iuuare, sed maximè lædere. Palam est autem quod asperā arteriā in huiusmodi affectionibus criminantur. Quondam igitur quando nondum eas quæ similiter ut cor pulsant arterias, sic nominant, in solam eam quæ ex pulmone in laryngem emergit arteriam, ipsum arteriæ nomen inferebant, Venas appellantes in totū, uel ut alias quæ nō pulsant, sic etiā pulsantes. Postea uero consuetudine obtinente arteriæ appellationē in pulsantibus dicit, propter æqui uocationē asperæ nomen apponentes, eam quæ ex larynge in pulmonem descendit arteriā, asperā arteriam appellauerūt, unā cum hoc quod ipsam etiā bronchū uocat, quandoquidē cartilaginosa corpuscula, quæ plurima eius pars sunt, bronchia appellant. Ambit autē ipsam arteriā intrinsecus crassa pellicula, quam ob crassitudinē aliqui tunicam uocant, quum igitur affectio aliqua aut circa hanc, aut circa laryngis (qui summa arteriæ pars est) musculos contingit, arteriacas appellant curantes ipsam, nō apponentes, uelut dixi, antidotos. Dissimiles autē facultatibus sunt ab ipsis descriptæ; & ob id cōtingit utentes ipsi absq̃ discrimine, à scopo aberrare. Quod uero multa sit differentia earū quæ in medicamentarijs libris scriptæ sunt, ex tribus exemplis discere licet, quorū primū omnis acrimoniæ expers est, & exquisite meatus obturat, leuigans asperitates, alterū huic contrariū est, acrimoniæ mordacis non parū habens, ut si sanæ particula adhibeatur, ipsam exasperet. Mediū deinde inter ambo dicta, aliud genus arteria corū pharmaca est, lenis & citra acrimoniā extergētis facultatis. Id igitur quod meatus obducit, ex passo cretico, & gummi, & tragacantha, ac radice dulci apparatur. Acre uero ex pipere, et castia, et cinamomo, & galbano, ac resina terebinthina. Mediū autem amborum ex pisanæ constat succo, & amygdalis, & fabis frētis elixis, & alijs huius generis. Inter medium autem & utrumq̃ extremum plura pharmaca sunt, partim magis, partim minus, à medio progressa. De quibus deinceps determinabo, eos qui dem qui discrimen aliquod addiderūt laudaturus,

A qui uero simpliciter protulerunt, neq̃ admissurus. In horum medio locandi sunt, qui discrimina non tamen integra fecerūt, qualia sunt eorum qui scripserunt. Arteriacæ ad interceptā uocem, aut rursus. Arteriacæ ad raucā uocem. Etenim uox intercepta, hoc est non posse loqui, ad plures causas sequitur, partim quidem ad destillationes à capite diuturnas, partim uero suppuratis pectore ac tabidis; & his qui ex magno & multo clamore læsi sunt, & deinde non probe curati sunt, aut etiā affectionē quæ adhuc generatur habent. Eodem modo etiā raucosa uox fit ob easdem causas, & amplius ob frigidū aeris inspirationē. Affectio itaq̃ interceptæ ac raucoſæ uocis eiusdē generis est. Magnitudine tamen differunt inter se hæc mala. Quæ enim uocis organa ab humiditate uehementius & ut ægre solui possit, fuerint madefacta, uox interceptatur, quando uero moderatius sunt humecta, raucoſo oboritur. Organa uocis quum dico, arteriæ accipiunt, & eius summum, ac fauces. Qui igitur ex uehementi clamore uocem amplius oblectam habent, his similis quædā affectio cōtingit ei quæ manibus, & cruribus, & lumbis, & spinæ, & musculis ubi plurimū laboris pertulerint, accidit. Vocat autem aliqui exercitiōrū magistrū eiusmodi affectionē musculorū, in quibus consistit, lassitudinē inlittamam. Itaq̃ iuxta arteriā intrinseca pellicula, aut tunica, aut quomodo cunq̃ quis nominare uelit, à spiritu in magnis uociferationibus extra prolato perculsa, in affectionē inflammata deuenit: atq̃ hoc multo magis si ad magnitudinem uocis, acumen quoddam accesserit. Iuxta arteriæ uero summū ultra hanc plagā, etiā musculorū ipsum mouentiū affectio offensa, maiorē affectionē efficit. Porro curatiōnis ipsarū genus, in omni particula secundū materias euariat. Etenim crura, & manus, & spinæ, per oleū confricare facile licet, quum per cutē in adiacetes ipsi musculos, uis ipsius olei penetrare possit. Iuxta asperā uero arteriā cartilagineas post cutē sitæ, prohibent in subiectā pelliculam transitū facultatis emollientiū ungentorū. Quemadmodū enim oleum, sic etiā alia multa cōposita pharmaca eandem utilitatem præbent. Quin & ea quæ in principio Acopa tantum appellata sunt, hoc est lassitudines emēdantia, paulatim appellationē suā à se ipsis extēderunt ad similia cōpage medicamenta, etiā si gratia uehementē calfaciendi assumant. Ceterū cōmunis materia auxiliōrū ad uocis organa, præter reliqua, est quæ ex balneis cōtingit. Mani festum est autē quod dulcium aquarū dico. Marina enim balnea, et sulphurentia, & aluminosa, & atramentū futuriū olentia, ac bituminosa, propterea quod fortiter resiccant, inepta sunt. Et sancta faciunt phonasci, qui magno uocis exercitio utuntur, quū contendendo obleserint uocem. Sunt autem hi citharædi, & præcones, & tragædiæ ac comœdiæ personatū representantes: balneis enim multis utuntur, & cibos lenes ac laxantes edunt.

Si uero etiam aspretudinē percipiant, cibos qui infarciuntur particulis quas contingunt assumūt. Vna enim est tunica sibi ipsi cohaerēs & cōtinua, quae summo gula, summo asperae arteriae, gula etiam, atq; ipsi asperae arteriae, intrinsecus praetēditur. Quod si ex uictu ac balneis oborta affectio nō sedetur in organis uocis, ad arteriacas transeunt, per totū hoc tēpus cibis utentes qui ex lacte, amylo, alica, ouis, & dulciarijs libis cōponuntur. Si uero per haec non curent, inuēta sunt à medicis pharmaca sub lingua tenenda, inde etiā hypoglottidis appellata. Sunt autē ea eiusdē cū arteriacis inflammationē arcuentibus facultatis, ex uino Theraco & gummi, ac tragaētha, & glycyrriza cōposita, quae ut dixi, leuigant simulq; reprimūt asperitates, quae quid uero reliqui est in partibus inflammationis, hoc concoquūt & cito perstant. In dustrū porro esse oportet qui pharmacū linguā subdit, quo eō paulatim liquefcente, asperae arteriae summum id quod in ipsum defluit fuscipiāt, renitēdo oborientis. Obluctantes enim ut ne fusciant, permittēt quippiam ex pharmaco in arterie summū ipsamq; ad eō arteriā demanare. At uero sic curatos claram uocem habere impossibile est, citra usum pharmaca totū absq; acrimonia extergentiū, quale est faba fresa lixa, et ptisana, et semē lini torrefactū: huiusmodi em mediū obtinēt, inter ea quae mordaci facultate praedita sunt, & ea quae meatus obducunt pharmaca. His uero adhuc magis extergēt, resina perebinthina, & thus, & mel despumātū, & amygdalae amarae. Quemadmodum rursus his fortior est erui farina, & homini semen, iridisq; ac panacis radix. Ceterū his omnibus uina mollia, & passum creticū, & theracum, ac scybelites apta sunt, & ad haec haud scio quomodo neglectum, id quod à Graecis in nostra Asia hepsema appellat, Latini sapam dicūt. Verū Atticissantes ipsū Sirēū uocāt, quēadmodum alij caricarū decoctū. Siraeū appellandū censent, pugnantq; inter se utrū ipsorū sirēū uocare oporteat. Est sanē & hoc ipsū Siraeū, quod pinguibus caricis in aqua decoctis fit, mediae facultatis, quā lenem & citra acrimoniā extergēt appellauimus. Mustū quidem igitur coctū, hoc est sapa ipsa, lenissimū pharmacū est & maxime meatus oblinens. Caricarum autē decoctū magis dicitur & extergēt. Quēadmodū igitur in praecedentibus dixi, Omnium simplicium medicamentorum uires exquirite nosse oportet eum qui cōpositum quoddā fit facturus, atq; hic ipse etiā ab alijs cōpositis recte utetur, & maxime ubi indiscriminatim fuerint cōscripta, quemadmodū plures arteriacae habent. Palam est etiā quod hic ipse his quae cum discrimine prodita sunt rectius utetur. Ereftū iuxta exactā rationē, in quantū apparatur affectio num transfmutatur, tantū etiā cōmodū ipsi pharmacū permutare oportet. Hoc ipsum uero solus is qui singulorū simplicium pharmacorū uim nouit, exacte praestabit, ad primū pharmacū parū quiddam ex sequenti ordine apponēdo. Velut exempli gratia, in lasitudinibus tenuis, quum in summis ipsius asperae arteriae musculis sunt, in princi-

pio lenissima edulia conueniunt, pharmaca uero meatus obducētia. Considerē autē inflammationē parum quid extergentiū addendū est. Deinde consequenter amplius. Deinde rursus aliud illo praestantius, quo paulatim cōpositio ad medium exteriorium perueniat, & rursus secundū eundē modū ab hoc magis discutiorū ac exteriorū, ita progressū ad uehementissimū factū, ubi diutius uelut in scit rhū indurata affectio in uocis organis persistērit. Primi itaq; ordinis est tragaētha, et gummi et fami⁹ aster, amyliq; & ex alica ac trago probe coctis per bitio. Quin & lac aptum est, & dulciarij panes, & oua sorbilia, ac nuces pineae, quas nunc omnes Graecis trobilos uocant: quondā autem apud Atticos Coni uocabatur. Sesama etiā ex hoc genere sunt. Ab his autem deinceps est butyrū, quod etiam butyros mulcino genere Graecis appellatur, & decoctum radices dulcis ad crassitudinē Attici melis liquidū redactū. Atqui radicē dulcem quā glycyrrhizam uocant, praestat in primo tempore in aqua, uelut dixi, coctam, ad sircum siue papā ex melle paratā ammiscere, ad passum itē Creticū idem decoctum misceri potest: siue autē cum sapa, siue cum passū Cretico fuerit permixtum, rursus post mixturā decoquendum est. Haec igitur in affectionibus inflammationis iuxta arteriā eiusq; summū, comoda in principio sunt, donec inflammatio moderata fiat, & praeter omnibus à uini potu hoc tempore abstinentium. Quum uero moderatio facta est inflammationis, uinū dulce Theracū aut scybelites bibere licet, ac ex nostra Asia caryinum, & deinde Therinū appellatū, deinde etiam dulce Tmolites, eo tēpore etiā butyrū aptum est, & sorbitio ex amygdalis, sorbitio itē ex lacte & melle diutius coctis, amylo iniecto, & si amyllum non addit, siliginē Romanis appellata iniecta. Manifestū est autē quod per huiusmodi uictū, inflammatio tū pellicularum, tum musculorum, circa arteriā eiusq; summū sedatur. Relinquit autē humiditas multa, ob quā impossibile est clarā uocem proferri. Quare transire tunc cōuenit ab his edulij, ad omnia ex melle cocta, & ad fabam fresam elixatam, & ptisanā, ac brasicam, & porrū probe coctum. Pharmacorū porro usus idoneus est, quo tempore aut inflammatio, aut aspretudo praeualefcent, eorū quae sub lingua detinentur, de quorum cōpositione dicā. Post haec magis exterioria & resiccantia damus, & deinde rursus his ipsis magis exterioria, & adhuc magis resiccantia, usque quo ad ea quae aliquid acridinis habēt perueniamus, ita ut etiā in his à moderatioribus initio factū, ad uehementiora paulatim trāseamus. Itaq; qualem formam esse cōueniēt uictus, antea dictum est, quēadmodum etiā simplicium pharmacorū species est relata. Ceterū cōposita ex ipsis pharmaca multiformiter alij iuxta aliam symmetriā & cōmensurationē cōscripserunt. Et quibusdā sanē ex tribus aut quatuor simplicibus cōpositum pharmacum sufficit. Quidam uero in maiorem numerum extenderunt. Et quidam uelut dictum est, ex mollissima & lenissima materia, arteriacas confectioes composuerūt. Alij uice uer-

fa ex acri, calida, extergente, ac multum reficcante. Sunt & qui tertium genus medium inter ambo ista fecerunt. Post hos uero, alij mediij generis inter medium & mollissimum, alij mediij generis inter medium & acerrimum, & iuxta eandem rursus rationem, quidam magis, quidam minus, a medijs facultate pharmacis digressi, diuersas compositiones fecerunt, quibus omnibus solus is recte uretur, qui singulorum simplicium pharmacorum uires nouit. Ipse enim sciet & ordinem pharmaci, & quanta distantia sit a medijs digressum. Porro eiusmodi pharmaca scripserunt etiam qui ante Mantiam & Heracidem uixerunt. Verum multo praestantiora a praedictis uiris tradita sunt, per libros quos nobis reliquerunt, & in quibus medicamentariam artem partem auerunt, partim ipsi componentes, partim ab alijs composita transcribentes. Progressu uero temporis tum haec, tum etiam priora, exacta & longa experientia cognita, a uiris electa & coaceruata sunt, quorum iam sepe in hoc opere mentionem fecimus. Sunt autem hi: Aclepiades, Musaeus, Andromachus, Heras, Crito, & Hecraclides. Quin et multa alia pharmaca et Archigenes et Philippus scripserunt, ut nullo ex ueteribus opus habeamus. Hi enim omnia ab antiquioribus inuenta optime uelut dixi, tradiderunt.

De Arteriis ab Andromacho descriptis, Cap. II

Plurimas arteriicas confectiones scripsit Andromachus, ut promptum sit a debilissimis ad fortissimi paulatim per media transitu facto progredi, si quis ipsorum differentiam nouit. Ipse enim Andromachus indiscriminatius ipsas prodidit. Verum ego discrimina apponam, in memoriam reuocatis his quae paulo ante dixi. Quod enim circa simplicium pharmacorum tractatum praerogitatum esse oporteat eum qui dicenda assequi uelit, saepe a me dictum est. Citra enim singulorum simplicium exactam ac certam cognitionem, impossibile est cognoscere ex quo ordine eiusdem generis medicamentorum compositum sit, Num ex mollissimo, an uehementissimo, aut medio, aut alio aliquo inter hunc & alios intermedio. Primam itaque arteriicam confectionem, non longe a principio libri, in quo affectioni corporis internarum curationem tradit, hoc modo in haec uerba scripsit. Arteriaca qua uitor. Thuris drach. i. alij. iij. myrrhae 3. i. alij. iij. croci drac. i. alij. iij. scyllae drac. ij. passii cretici sext. iij. Scylla in passo coquitur donec passum spissescit, deinde scylla abiecta, reliqua insperguntur. Hoc pharmacum si scyllam non reciperet, inter exacte mollissima numerandum esset, utpote in tres passii cretici sextarios, paucissimo thure, ac myrrha, & croco coniectis, ut parum absit quo minus totum passum creticum existat. Manifestum est autem quod pharmacum hoc, electum hoc est delingibile efficitur. Vocant autem huiusmodi etiam Attici electas, hoc est, delingibiles confectiones. Consequenter ad praescriptam altera addidit Andromachus hoc modo. Arteriaca diacodyon ex capitibus papaueris. Capita papaueris uiridia mille & ducenta, mellis Attici lib. iij. croci cilicij drachmas v.

alij decem. succi hypocythidis drac. x. acaciae drach. x. aquam pluuiam ad capita papaueris. Aqua quidem pluuiam additur, quo minus putredini obnoxium sit pharmacum, habet autem & adstringens quippiam in se haec aqua. Scopus est praedictio pharmaco coequere affectionem circa arteriam, quod sane contingit per somnum, & concoctoria, cum adstringendi uel non adeo multa. Carterum simplex pharmacum ex papaueris capitibus, sola capita habet in aquam coiecta, atque ubi flaccida reddita fuerint, ipsa quidem proficimus, aqua uero ipsorum ad solum mel Attici ammiscemus, utque ad compaginem delingibilis pharmaci facta coctura, quomodo sane ego apparare consueui. Quantam autem compositam aquam itemque mellis miscere oportet, in huiusmodi pharmacorum praeparatione in sequentibus dicam eo loco, quo talia uerba scripturus sum. Confectio ex capitibus papaueris. Tertia deinceps confectionem Arteriicam Andromachus haec prodidit. Arteriaca qua uitor, Blastii, ad tabescentes ualde bona. Nardi citicee 3. quatuor. amomi drac. octo. cinamomi drac. decem. malabarri drac. quatuor. nardi indici drach. iij. floris iunci rotundi odorati drach. ij. caliae drach. viij. thuris 3. tres. myrrhae drach. i. costi drac. iij. fecis ungenti malabathri drac. vi. succi glycyrrhizae 3. tres. succi mandragorae drac. v. masticis chiae drach. iij. croci drach. vi. Palmulas in uino mulso aut proteropo coquitur: deinde in ipsum decoctum nuces pineas xx. coequitio ac terito. Postea ex pharmaco ad nucis poticae magnitudine, aut paulo minus accipito, & ad aliquot dies cum hoc decocto utitor, deinde etiam simplicium pharmaco utaris. Postea autem ad duos uel tres dies hiera ex aloë uteris, cochlea rii mensura ex aqua in die data. Vtere pharmaco etiam cum lacte in his qui arteria affecti sunt ad gargarisandum, & rursus factio interstitio, utere pharmaco fabae Aegyptiae magnitudine. Quum uero fortis fuerit fluxio, opium & castoreum in antidotum miscemus, utriusque parum quid. In his autem qui stomacho male affecti sunt ea ipsa uitamus. Manifestum igitur ex ipsis uerbis, quae scripsit Andromachus, quod in fluxionibus partium thoracis, & pulmonis, ac arteriae, praescripta confectione apte componitur. Dixit enim ipse, quum fortis fuerit fluxio, opium & castoreum in antidotum miscemus utriusque modicam partem, reliccare nimirum fluxionem & sanam reddere uolentes. Varium autem est pharmacum, & ex multorum mixtura constans, ut ad omnes conueniat affectiones, quae etiam diuturnae & malignae existunt ac aegre curabiles, etiam si ulcus sit circa arteriam aut eius summam extremitatem, Laringem Graecis dictam, & multo magis si iuxta pulmonem. Talia enim fortis, adeo opus habet pharmacis, quo ad longius tempus sufficere queant tabida affectionem habentes. Quum enim obtigerit eis regio siccata, & in conuenientis uictus ac pharmacorum usu perseverauerint, quae diutissime renitent consuetas actiones moderate obeunt. Hanc igitur confectionem non censuerim ammiscendam esse his quae prius tim Arteriaca appellantur. Quarto deinceps confectionem Andromachus sic scripsit. Altera eiusdem,

Blasiti uidelicet dicit, de quo circa præcedentem arteriacam scriptū est, Arteriaca Blasiti qua utor: compositionē autē eius talem facit. Aloes sextantē, croci unc. i. mastiches un. i. Palam est hoc pharmacum ex eorum numero esse, quæ priuatim stercorūeductiua appellant, unā cum hoc quod concoctoriū quiddā habet crocus. At uerū cum concoctoriū dico, intelligere oportet eius affectio nis cuius gratia exhibetur. v. ex ordine cōpositiōnē Andromachus talem prodidit. Confectio sedans dolorem eiusdem. Opj quadrantē, croci unc. i. myrrhæ sextantē, acaciæ uncia dimidiū, sic ciradici drach. quatuor: excipe melle. Hæc Andromachus. Verū ego non auidē recipio eiusmodi compositionem pharmacorū, ubi nō ostendit affectio, in qua ea sit utendum. Scimus etē com ponendi sedantia dolorum scopū, cum somnū uide licet inducere uoluerimus, & uehementē dolo rem stupefacere. Acaciæ autem mixtura uelut ad ulcus est, quemadmodum radiciis dulcis succus ad linienda exasperata. Crocum autē & myrrham in compositiones dolorem leuantēs miscere plurimū placuit. Vident enim ipsi omnes affectio nes sufficēter cōcoquere posse. v. i. consequenter cōfectiōnem Andromachus hoc modo scripsit. Arteriace eiusdem. Thuris unc. unā, succi radiciis dulcis un. unā, myrrhæ 3. quatuor, tragacanthæ drach. sex, nardi drach. unam, amomi 3. iij. croci 3. iij. mellis atici qd satis est. Non obscurū est etiam hanc ad respiratiōnis organorum affectiōnes cōpositam esse, ex cōcoctoriis, mitigatoriis, adstringentibus & extergentibus. Myrrha enim & thus, & crocus, affectiōnes concoquunt. Radiciis dulcis succus exasperata mitigat, idē etiā tragacantha facit. amomū fortiter resiccat cū modica altringēdi facultate. mel autē calfactoriā & extensoriā uim habet. VII. postrelatas cōpositiōes Andromachus scripsit, ex multis ualde medicamentis cōstantē, quæ oēs ferme facultates habent. nā & altringētia, & mordētia, & attenuātia, & mitigātia, & leuigātia in ea cōtinent. quin & soporifera uis et discussoria ac extensoria in ipsa habent. In quib. omnib. multitudine mixtis facultatib. communis ratio est: quæ admodū etiā antea dixi, quod uidelicet quispiā ex omnib. pharmacū quoddam cōponere uoluit, spe faciēdi unū medicamentum ad oēs eiusdē generis affectiōnes cōmodū. Verū ex ipsis aliqua quidē per experiētia cognita sunt maligna et propterea relicta: aliqua uerō feliciter pro ipsis cōponentis cōiectura efficaciam euaserūt, & ob id recepta: quin & præparādi ipsam modū Andromachus ascriptis, quanq̃ hoc facere alius nō solet. Quod uerō ex pharmacis cōposita sit eas quas dixi facultates cōplectētibus, præstat meminisse eos qui hos libros in manus fument: si tū nō prōptā habent memoriā, eo sanē tēpore q̃ huiusmodi pharmaca discūt, vi. & vij. ac viij. de simpliciu pharmacorū facultate librū legāt: in illis em omnē pharmacorū materiā conscripsi, quæ radices & folia & flores & semina & fructus & liquores & succi omnium ex terra nascentiū planta-

Galen.

rū existūt. His itaq̃ præmissis, iā animū ad ea quæ Andromachus de hoc medicamento scripsit aduerter. Arteriaca qua utor. Radices filicis crassissimæ lauant donec purissimæ fiāt, & omne terreū deponāt, deinde per diē unū perfrigerāt, & in frustra magnitudinis triū digitorū secta cōquassant, atq̃ ex eis lib. x. in ollam nouā picatā aquæ dulcis sextarios x. cōplectentē iniiciunt, et ad dimidiās, hoc est ut sextarij v. reliqui hiant, coquunt, exprimunt: & liquor quidē in duplū uas diffundit, & aromata crassa ac integris partib. addunt. Nardi indicē 3. iij. cinamomi 3. vi. radiciis dulcis 3. vi. casia 3. iij. rhei pōtici 3. iij. balauisti 3. vi. rosarū siccarum 3. iij. alij vi. Hæc similiter ad dimidiās coquunt ac exprimunt, & ad decoctū mellis Attici sextarij unus addit: sit autē mel præcoctū et in duplū uase priuatim spissatū usq̃ quo manus nō inquit: adijciunt & terebinthinę pellucidæ 3. iij. galbani 3. ij. croci 3. v. succi hyofcyami 3. i. succi hypocytidis 3. i. mādragoræ succi ob. iij. piperis albi 3. viij. viii. deinceps cōfectiōnem scripsit, summa facultatis ipsius indicata, qd ipsum in omnib. fecisse oportuit. habet autē sic: arteriace laudæra mithridatis, ad thoracis collectiōes, suppurgat & leuigat. Irionis torrefacti 3. i. in quibusdā extēplarib. sabę fresę scriptū est. Sūt autē ambo extensoriæ potētia, seminis lini tosti 3. xx. & hoc extensoriā uim habet, nucis pineæ 3. viij. hæc leuigādi uim habet. Vnā passā exacinate 3. iij. & hæc ob id qd mōdice subdstringat, simulq̃ cōmodus corpori cibus sit, meritō admixta est. habet autē & passī facultatē, quæ in IIII. de simpliciu pharmacorū uirib. indicauimus. croci ob. ij. minimū quid ex croco cōiecit qui pharmacū cōposuit, ut prope nihil sit aliorum proportione. Diximus de croco em concoquēdi uim habere, unā cum adstrictiōne. Dicitur est etiā quod adstrictiō corpora cogit, cōstringit & corroboret. Adiecit autē etiā mellis heminas iij. à uino dulci & sapa digressus. Vult em hoc modo præparatū pharmacū, uelut præfatus est, in pectore hærentes collectiones depurgare. Cæterū in huiusmodi pharmacis ea quæ crassos succos habēt, impediūt repurgatiōem. His admiscuit tragacanthæ 3. iij. quod pharmacum leuigat exasperata: prædictū est autē quod uult hoc propositū medicamentū repurgare, & leuigare ea quæ iuxta thoracē hæret. Scopus em huiusmodi est, at tenere & abstergere, ac ad educationem superne aptas facere collectiones in thorace. Verū sedandī doloris gratia, & ne nimium extergant ac emungant partes exasperata, leuigātia apponunt. Maximū hoc est, atq̃ ipsius per omnia meminisse oportet, nimirū quod sæpe unus scopus sit, in quē pharmacum cōponit. Ne uerō hoc ipsum aliquo modo offendant, alia miscēt primū utilitatis scopū nō habētia. IX. arteriacen post hæc Andromachus his uerbis tradidit. Arteriace Marini. croci unc. i. gummi sextantē, tragacanthę unc. i. mellis atici sextariū i. coquito donec cū diffundit nō inquit. hoc pharmacū mediū est facultate, essetq̃ exacte mitigatoriū ac dolorē sedās, si nō crocum

Tom. 5

F habere

haberet, neq; mellis sextarium, sed pro ipso Therēū
uinū Creticū, aut sapā ex musto cocto factā, quā
nos Asiānū, ut dixi, hepsema appellamus. Verum
hoc loco importune inter relata fortia pharmaca
locatū est, utpote quæ suppuratis & tabescētibus
cōueniunt. X. cōsequenter recenset, quæ inter
exacte lenissimā ac mediā, qualem sanē esse dixi
precedētē, intermedia est. Ex gūmi igif hanc, et
passo cretico, ac aqua cōponit, melle etiā admix-
to. & gūmi quidē inijcit bestem, passū sextarium i.
mellis lib. i. dissoluere cū aqua iubens ipsum gum-
mi, copia eius non expressā. Itaq; ob gūmi, & pas-
sum, & aquā penitus nihil exteriorium habet, ob
mel uerō, à lenissimo & leuigante est digressā. Sci-
mus enim exteriorium esse mel. Coqui autē super
prunas oportere ipsum dixit, uerū est ad mollē, &
nō fumantem ignē. Melius uerō fecisset, si etiam
ad alias omnes hoc adscripsisset. Ego itaq; sic ip-
sum præparo, & neq; ad prunas adhuc ardentis
cocturam facio, ne uidelicet inde quid acre & fu-
mosum sublātū, a crimonīā nō necessariā medica-
mētō ipsi affricet. Mellis equidē ac redinē tolera-
mus, quāq; ea nō sit uehemēs, propter aliā ipsius
utilitatē. uerū fumi nulla est utilitas. quare fugien-
dus est fumus in quantum possibile est, circa om-
niū huiusmodi pharmacorū preparationē. Præ-
stat autē & in his quæ meatus obducunt, lignis fu-
mū nō edentib. uti. XI. confectiōē sic prodidit.
Arteriaca alia bona. Cinamomi, thuris, utriusq; ꝑ.
i. succi radicis dulcis un. i. myrrhæ 3. iij. tragacantha
3. vi. nardi indicē drach. iij. amomi 3. iij. croci
drach. i. melle atticō excipe. Recte dixit bonam
hanc arteriacā esse, uerum deest sermō, ad quas
affectiones bona sit. Dīctum enim in principio
est & per uociferationē, & per distillationē lædī
arteriā, ampliusq; propter ulcus & inflāmationē
obduratam. Hæc autē cōfectiō quā nunc Andro-
machus descripsit, etiā ad tabidos aptum pharma-
cum est, & simpliciter oēs inueteratas thoracis ac
pulmonis affectiones. Cinamomi etenim natura
tenuium partiū & resicatoria, etiā induratas affe-
ctiones sanare potest, ab eo proximū locum amo-
mi facultas habet, simulq; adstringens quippiam
habet. Verum ob horum actionem uehemētē
rationabiliter admixta sunt, thus & radicis dulcis
succus & tragacantha, pharmaca exasperata leni-
re à natura apta. De croco & myrrha sæpe dixi-
mus, esse uidelicet cōcōratoria & modice resica-
toria huiusmodi affectionum. XII. arteriacā
Andromachus hoc modo scripsit. Alia ex libris
Galli ad arteriam affectam, ulcera pulmonis, puris
& sanguinis refectiones, & fluxiones in thora-
cem, & ad ea quæ ægre educi possunt, uehemen-
ter efficax. Resinæ terebinthinæ drach. iij. croci
cilicij drach. iij. thuris drach. iij. myrrhæ troglo-
dytica drach. iij. cinamomi drach. iij. amomi 3.
iij. nucis pineæ drach. iij. radicis dulcis electa me-
dulla drach. iij. nardi syriacæ drach. ij. & dimidiā,
casia nigra drachm. ij. tragacanthæ drachm. tres,
palmularum syriacarum carnis drach. tres, asteris
samij drach. iij. galbani puri ob. iij. costi drach. iij.

aliq; drach. unam: mellis atticī heminas iij. Mel &
resina in duplo uase coquunt, atq; ubi spissari ce-
perint galbanum miscetur, donec nō inquent.
deinde refrigeratis reliqua trita admisce, & sic u-
tere. Recte fecit in hoc pharmaco, tū q; ad quas
affectiones conueniat, tum q; quomodo præpa-
rauit ipsum oporteat, ascripsit. Ratio autem com-
positionis ex superioribus constat. XIII. arteri-
acen Andromachus his uerbis tradidit. Arteriaca
Galli, eadem etiam antiodotus est ad eadem effi-
cax. Nardi syriacæ drach. quatuor, myrrhæ 3. iij.
croci drach. iij. costi drach. iij. aliq; drach. unā: pi-
peris albi grana xxx. radicis dulcis drach. unam,
nucis pineas centum, styracis drach. unam, traga-
canthæ drach. i. cinamomi drach. i. amomi drach.
unam, thuris drach. unam, ob. quatuor, casia fistu-
læ drach. unam, balaustij drach. tres, ob. tres, mel-
lis atticī aut passī cretici heminas duas. Passum in
duplo uasculo coquitur ad spissitudinem mellis,
atq; ita ad arida trita affunditur. Tragacantha autē
& styrax per diem antea in sufficiente protho-
pacerantur, & ita ad reliqua admiscuntur: reponi-
tur pyxis argentea aut uitrea. Recte fecit & hic
quod tum ea quæ promittit hoc pharmacū, tum
quomodo præparatur adscripsit. Ego uerō pro-
pterea omnes ab ipso descriptas arteriacas appo-
sui, ne quis alium scriptorem requirere cogatur.
Omne enim facultatum genus in ipsis cōtinetur,
mollium, fortium, ac mediolorum. XIII. arteria-
ca eius est de qua sic prodit. Arteriaca ex uehe-
mentibus, Moschionis. Est eius facultas non ue-
dice medias transgressa ad fortissimā. Habet uim
secandi & attenuandi ac calcificandi ex multis phar-
macis, quibus etiam lenia quedam admixta sunt
ob eam quam dixi causam. Compositio eius hæc
est. Rubricæ lemnia, thuris, myrrhæ, nardi, amo-
mi, casia rufæ, croci, iridis illyrica, floris iūci odo-
rati, singulorum drach. ij. cinamomi drach. iij. resi-
næ terebinthinæ drach. iij. floris rosarum drach.
quatuor, opobalsami drach. ij. mellis heminam i.
aut passī cretici heminæ dimidiū ampliusq; quar-
tam eius partem. Liquorem & resinam donec sul-
ua reddatur coquito, deinde ab igne ablatis reli-
qua addito ac conuassato. Datur in thoracis &
arteriæ affectionibus fabæ græcæ magnitudine,
cum aqua quarta heminæ parte. Reliquis forma
eclegmaticis delingendum. xv. arteriæ sic scri-
psit. Arteriace ad gutturis siue arteriæ apertudi-
nem, uocem interceptam & sanguinem reiectan-
tes, qua utor. Ex libris Apolloniij & Alcimionis.
Tragacanthæ drach. vi. gummi drachm. vi. thuris
drach. i. ob. i. myrrhæ drach. i. ob. ij. croci drach. i.
ob. ij. succi radicis dulcis 3. i. ob. iij. aut radicis sel-
quidrachmā, piperis albi grana xxv. palmularum
pinguiū carnis drachm. tres, aliq; palmulas v. aut iij.
habent. Tragacantham passū maceratum ac tri-
tam reliquis aridis tritis committe, ex eisq; om-
nibus catapotia fabæ magnitudine effice, sub lin-
guaq; tenenda exhibe. Huiusmodi confectiōes
hypoglottidas medici, ab eo q; sub lingua dantur
appellāt, iubenq; id quod à dissoluto pharmaco
desiuit

defluit, sensim in asperæ arteriæ summū excipere, obnitendo simul ne tulsis excitef. **XVI.** ex ordine sic scripta est. Arteriæ delingibilis ad oēs internas affectiōes, maxime tabescentes, & suppuratos, ad hydropas incipiētes, tulsis ueteres. Daſ per diē & noctē cochlearij mensura. Succī scyllæ sextarios iij. palsi cretici sextarios iij. uini salerni sextarios viij. mellis atticī sext. iij. myrrhæ trientem, croci sextantē, thuris sextantē, aristolochiæ daſty lindiſ minā unā & dimidiā, glycyrrhizæ minam unā, radicis eryngij sextantē, caliæ unc. i. nardi celticē unc. i. xylobalsami bessem. Aristolochiā, eryngiū, glycyrrhizā, xylobalsamū, casiam, nardū, in crassas partes cōtusa in uini sextarij viij. macerato ad miduū, deinde ad lentū ignem ad tertias coquito, atq; ita exprimito, & retrimentis abiectis passum, mel, & scyllæ succū cōmittito, & ad mellis crassitudinē coquito. Crocū uerō thus & myrrhā cū uino terito, atq; ubi optime habuerit pharmacum addito, & ubi modice fuerint liquata ab igne tollito, & repositis utitor. Recte fecit & hic Andromachus quod que promittit, et quomodo præparet adscripsit. **XVII.** Confectio talis ab eo tradit. Arteriaca alia ut Heraclides Tarentinus. Succī scyllæ sextar. iij. palsi cretici sextar. iij. mellis atticī hēminam i. croci trientē, aliij sextantē, myrrhæ quadrantem, tragacanthæ unc. i. succi radicis dulcis sextantē, thuris unc. i. opobalsami sexuncē. utere præparato. Iuxta hanc cōfectiōnē neq; que promittat, neq; quomodo præparet tradidit, tan quā iam ante sententiā ipsius legentes in telligere queant. Ex eo em sent quod dicit, Alia arteriaca, similia præscripta ipsam promittere, nos intelligere cōuenit. præparationē autē ex antea relatis cōputare oportet. **XVIII.** Confectio sic tradita est. Arteriaca ex libris Perigenis, ad omnes arteriæ affectus. Croci 3. unam, uua passæ exacinate 3. unā, amygdalarū 3. octo, myrrhæ ob. iij. tragacanthæ drachm. iij. pipēris albi ob. iij. mel coctum. Uua passā torret, amygdalæ excoctant. Tragacanthā in aqua macerat per diem unam, & terit, ac reliquis admiscetur. Et hic recte ab eo factū est quod tum promissionem, tum cōpositionem eius adiecit. Cæterum mediæ facultatis pharmacū existit, quæ ad omnes affectūs ipsius cōmodū esse ait. Est em mediōrum pharmacōrum natura talis, un de etiam ipsiſ medijs affectionibus proprie & primario cōuenit; his uerō qui mollibus aut fortibus opus habent, neq; emolumentū neq; detrimentū magnū afferit. Vltimam omnīū arteriicā hoc modo descripsit. uini nulli ueteris sextarios iij. ad unum decoquito, deinde nucū pinearū tostiarum hēminam adijcito, pipēris albi sextantem, ac utitor. Effet sanē hoc pharmacum ex mollissimis, si non piper accessisset. Hoc uerō addito, ad mediā facultatem peruenit; quapropter etiam eiusdē generis cum præscripto esse ratus subscripsit.

Arteriaca à Critone conscripta quatuor numero. 2

Ex arteriicis à Critone cōscriptis quatuor pro duxisse suffecerit. De prima scribit in hac uerba. **Ad uocem interceptam ob cōtentionem. Ficium**

Galen.

A & eryngium probe coquito, & ad decoctū gummi misceto, ut melle durior cōfectio fiat, dato ad noctem. Facit & ammoniacum. Ob id sanē pharmacum huius mentionem feci, quod in principio apta est hæc præscripta cōfectio si per eryngium præparetur. Ammoniacū autem in ueteratis cōmodum: forte enim pharmacum existit. non recte igitur Crito fecit, quod cum moderato fortissimum pharmacum in discriminatū tradidit. Si enim duro pro moderato permutatis uicibus uteris, non solum nihil iuueris, sed etiam lædēs hominē. Alteram arteriacam scripsit Crito medicam facultate, concoctoriam & lenem his uerbis: Alia faciens maxime ad phonalcos, & asperam arteriam, & tulsis irritationes, dolorem aurium, ulcera in auribus, ac pudendo. Concoquit etiam destillationes. Thuris obolos quatuor, myrrhæ 3. duas, palsi cyathos tres, passum ad mellis ipsitudinem decoquito, deinde myrrham & thus trita cum passo semicocto ablato adijcito. Facit etiam ad dysentericos, cœliacos. Quidam croci etiam drachmam addunt, & sit auribus commoda atq; oculis inflammatis. Hæc Crito perspicue & probe scripsit; neq; opus est me eiusmodi pharmacorum expositionem apponere, ut qui sæpe iam de his dixerim. Porro alias duas prædictæ quidem si miles, uerum moderatori facultate & simplicissimas sic scripsit. Eclegma Faustianum appellatum. Vini salerni sextarium unū, mellis atticī lib. unā, in duplici uase coquito, rutæ ramulo agitando. Alterum pharmacum tale est. Eclegma ex uino scybelite quo utimur. Vini scybelitæ sextarium i. gūmi quadrantem, mellis dodrantē. Coquito in duplici uasculo, gūmi prius macerato ac dissoluto. Hoc solum loco apposuit, in duplici uasculo, hoc est diplomate, cocturam fieri debere. Rectissime autem fecerit, qui omnes arteriicas quæ mitigatoriam, concoctoriam, & lenitoriam uim habere prædicantur, in duplo uase coxerit, quod diploma Græcis uocat, quomodo sanē unguentarij unguenta præparant: nimirum calidam aquam in magnum quendam lebetem infunderes, ac postea uasculum quod pharmacū coquendum in se habet, imponentes, & sic præuistas prunas, aut ligna fumum nō edentia succedentes.

Confectio diacodion ex capitibus papaueris, iuxta ueterū traditionē. 3

Quin & circa huius compositionem ueteribus indiscreta discordia fuit. quidam enim ex ipsis ad capita papaueris cxx. aquæ sextarios xx. infundendos censent, ut qualibet sextarij mensura, sex papaueris capita recipiat. Quidam uerō in lxxx. sextarios, octingenta papaueris capita iniiciunt, ut singuli sextarij capita x. accipiant. Quidam ita temperauerūt ut sextario uno octo capita tribuerentur. Quidam autem haud scio qua ratione, in aquæ sextarios tres capita papaueris lxxx. coniiciunt, aliij capita cxx. in eisdem tres sextarios addunt. Verum mihi uidetur ualde pauca aqua esse ad tantam copiam capitum.

Confectio ex capitibus papaueris, Andromachi.

Andromachus igitur, uelut supra in arteriicis

tom. 5 F 2 præ-

præscriptum est, alterâ ex ipsiſ præparans sic scripſit. Capita papaueris uiridia mille ducenta, dein de ad finem, Aquam pluuiam, non apponens aquæ quantitatem.

Confectio ex capitibus papaueris, Critonis.

Crito uerò sic, Confectio ex capitibus papaueris simplex, Capita papaueris agrestis octingenta, aquæ sextarios lxxx. coquito ad tertias, atq; expressis addito mellis lib. x. Si uerò uariam efficere uelis, adde croci, myrrhæ, succi hypocyſtidis, singulorum 3. xij. thuris 3. vi. acaciæ 3. xij. Recte uidetur mihi ad singulos sextarios capita x. conijcere ita em contingit, cum scribat ipſe, capita octingenta in aquæ sextarios lxxx. indendos esse. Et ego sanè hoc modo præparo, non apponens neq; crocum, neq; myrrham, neq; aliud quicquam. optima est enim simplicissima.

Confectio ex capitibus papaueris, Heræ.

At uerò Heras ad capita cxx. aquæ pluuiæ sextarios tres infundit, modicâ omnino quantitatē, tã-erſi in quibusdã exemplaribus, nō numerus capitū papaueris cxx. scriptus sit, sed pondus totidem drachmarum. Adscribam autem totam ipsius dictionē sic habentē. Capita papaueris uiridia cxx. in uas conijcito, & affuſis aquæ pluuiæ sextariis tribus ad triduum maſcere ſinito, deinde ad tertias coquito, & ablata ab igne exprimito ac colato, admixtoq; mellis sextario in duplici uase coquito, atq; ubi ſpiſſari cœperit, acaciæ ruſæ drac. unam, succi hypocyſtidis 3. unam adijcito. Cæterum quum ipſa capita coxeris in aqua, croci drac. unam linteoſo illigatam ſimul coqui permittito. Quidam etiam myrrhæ 3. unã addunt, ipſaq; cum modico paſſo terunt, atq; ita indunt, ac ſimul coquunt, donec aliquantulum fuerit conſectio inſpiſſata. Quod ſi tamen non medicamentariam conſectionē facere uelis, cum capitū decocto ad tertias redacto mel coques, reliquis non adiectis.

Confectio ex capitibus papaueris, Damocratis.

Hoc pharmacum primum à Themifone præparatum est, inquit Damocrates, in libro Damocratis Philiatrus, hoc est rerum medicarum studioſus ſcripto. Scimus autem ex uerſibus eum conſtare. Aiunt Themifonem hoc pharmacum primum præparasse ad tuſſes humidas, dolorem arteriæ, & gulæ, ſpecies fluxionū ſimpliciter omnium quæ circa thoracē conſiſtunt, & ad uigilias, quarum sanè illæ exiſtunt cauſe.

Papaueris quod nominant ipſi agricolæ Agreſte, nam ſpontaneum est, nec conſeritur. Capita uirentia & recentia, integra, Semens rubens nondum nigrum gerentia, Decem quater centumq; magnitudinis Mediocris, in nouã ollulam atq; amplam indito, Infunde tres pluuiã de aqua sextarios, Maçerato in his totam diem noctem ſimul, Dein coquito lento igne, ac diutiuſcule, & Omnem liquorem expreſſum in ollam excipito. Et mellis atticæ libras tres addito, Rurſuſq; lenem ad flammulam decoquito. Dum mellis hauđ fiat liquidi bona compages,

Mox frigeſacta in uitreum uas condito. Sic nos quidem: at Themifon prius qui prodidit Vnum, addit myrrhã, acaciã, & rubens crocū, et Hypocyſtidis ſuccum, aſt ea obſoleta iam, Simplex enim parata commodiſſima est, Iucunda ualde, lenis atq; uiribus.

Ex hac datur miſtri minuti quantitas, In noctem aliquando plus, minus rurſus diem. Ut tempore pauco in ore quis hanc ſic detineat, Iuſſus liquentem ſenſim ita poſt ut deuoret. Quod ſi uoles aluum morandi gratia, & Siſtatur ut pulmonis & ſtomachi fluor, Eruptioq; ſanguinis ſeptum ſupra: Facere, Eupatoriæ aut tu potius hinc Ponticæ Adde rhois ſucci ſimul drachmas duas, Tantundem & acaciæ bonæ, non ueteris, & Auferre iam uolens ab igne pharmacum, Duluta paſſo ambo hæc ſimul conſumidito Paulatim, adhuc feruentibus in ollula, Quo ferueant parum ſimul, mox uaſculo Refrigerata indantur inde uitæ eo.

Confectio ex capitibus papaueris, Sorani.

Soranus porro ita præparandum cenſet. Caputum papaueris numero cl. aquæ sextarios xx. in lebetem nouum conſecta ad dimidias coquito, & reiectis capitibus mellis sextarium unum addito, poſtea uerò myrrhæ, croci, hypocyſtidis, & acaciæ ſucci ſingulorum drach. unam, obolos tres, linteoſo illigato, & in ollam ſiue lebetem ſuſpendito, quo ſimul cum melle coquãtur: poſtquam uerò craſſeſcere inceperit, faſciſculum colligantū tollito, & in mortarium cõiectum cum paſſi cyathis tribus terito, indeq; in lebetem coniecitum, lente ſimul donec ſpiſſetur coquito. Verum miſtor est conſectio quæ ex ſolo melle & caputum papaueris cremore conſtat. Efficacior autem redditur, ſi in faſciſculum linteoſi, pro adſtringentibus, melioſorum & radicem dulcem addideris.

Confectio ex papaueris capitibus, Galeni.

Cæterum uelut ego compono conſectionem ex papaueris capitibus, ita ea utendū cenſeo. Etenim cum de prædictis cõfectionibus experimentum ſumpſerim, præſtantior ea uifa est, in qua ad unum aquæ sextarium capita decem iniſciuntur, quemadmodum Crito ſcripſit, aut ad duos sextarios quindecim capita, uelut Soranus. In medio autem horum amborum terminorū est, ubi octio aut nouem capita in unū sextarium conſiciamus. Præmacero autem ea non ad triduum, uelut Heras, ſed neq; ſtatim ablata coquo, ſed ſiquidẽ humidiora & molliora fuerint, ad unum diem. Accipienda est autẽ in omnib. huiuſmodi ſermonibus etiam nox: quemadmodũ etiam annum dierum ecclxv. eſſe ſolemus dicere. Si uerò duriora & ſicciora ſint, etiam longiori tempore ipſa macero, præſtat autem accipere nondum indurata. Maniſſimum uerò quod etiam ualde mollia abiſcienda ſint: ſicciora enim modicum ſuccum habent, humectiora uerò multum quidem, ſed crudum adhuc & aquoſum ac debilem: quapropter ex humidis ac paluſtribus locis accepta fugienda ſunt.

At uero numerū quem dixi inijci oportere iuxta proportionem aquæ, de mediocribus intelligere oportet. Cum enim quædam maiora moderatis, quædam minora existant, quædam uerò inter hæc media, quæadmodū ut plurimū esse solent, ex his prædictum numerum ad sextariū conijcere oportet. Terminus autē cocturæ sit nō ut tertia aut quarta, aut aliqua talis pars aquæ fiat reliqua, uerū ubi primū in totū flaccida fuerint facta: succū em̄ ipso rū exprimere uolumus, hoc uero sufficīēter cōtinget, ipsi flaccidis factis. Superuacuum igitur diu eius coquere. Ceterum mellis dimidiā mensuram huic succo admiscendā censeo, & coquēdū simul ad lentū ignem ad cōpagem attici mellis. Verum in aqua pluuia quidam caputem cocturā fecerūt, ne uide licet ipsa ad aliam putredinosam qualitate transmutetur. Tibi uerò etiam fontana sufficiet, pluuia nō presente. Satis est & ipsam mundā esse, & omnis mixturæ exortē. ob quam rē ea que per plumbeos canales deriuat fugiēda erit: limus enim quidam ex plumbo in ea continetur. Unde etiam qui aquæ eiusmodi fecem combibunt, dynterici euadunt.

De uisū confectionis ex papaueris capitibus.

Vius eius est in his qui somno opus habēt, qui bus etiam ex opio constantia saepe exhibere cogimur. Opus habent maxime huiusmodi pharmacis hi quibus tenuis fluxus à capite ad asperam arteriam destillat, non permittens dormire, ob consequentē tussim. In talibus ego etiā ex sapa pharmaci confectionem parare soleo. Dicitum autem à me antea est sapa hepsema à nobis appellari mustum coctū, quod etiam siraū quidam medici uocant. Sufficiens coctura eius ad huiusmodi est, ubi capita papaueris ad medietatē aque fuerint decocta. Quin & per passum, aut theræum Creticum, melius est q̄ per mel cocturā fieri, ubi fluxus ualde tenuis extiterit. Scimus enim attenuatis facultatis mel esse: fugiendum igitur tūc, tenues enim fluxiones auget. Admiscetur etiā huiusmodi pharmaco dum coquit, radix dulcis quo simul coquatur. Vbi uero hæc non adfit, succus qui ex Creta asportatur. Si uero circa pulmonem consistat copia fluoris à capite delati, confectione ex melle melior est. Quemadmodū enim somno opus habentibus, ea quæ ex sapa cōstat, sic reiectione per spiritum indigentibus, ea quæ ex melle fit cōmodior existit. Contra urgētī igitū renitēdo, ubi somnū ea pere uult ager, aut q̄d ex melle constat, aut quod circa hoc apparatus est, pharmacum exhibebis: ali quando etiā ambobus permixtis, scopū habēs ipsum urgēs, circa mixturā, ex utro amplius conijcere oporteat. Appello autē urgens, id quod maior auxilio opus habet. Dat cōmoderata mensura, duorū cochleariorū satis magnorū copia. Augebis autē & minues hęc copiā ad magnitudinē corporis cui exhibiturus es, respiciēs, itē ad ætatē, & anni horā, ac regionē. In omnib. em̄ his, frigidioribus minimū dabis, calidiorib. amplius. Quod uero etiā multitudinis ac qualitatis ipsius destillatio nis respectu, aut plus aut minus dabis, manifestū

Galen.

A existit. Cōmune em̄ hoc in omnibus auxilijs est. Suffecerant equidē præscriptæ arteriæ, uerum apponeret amplius mihi usum etiam eas quas Asclepiades in secundo interiorū scripsit. Aliquæ enim ex eis penitus eadem sunt: quædā præscriptis ualde uicij, ut et ex eo certitudo descriptionis cōfirmetur. Quin & ultra hæc preparandi & utēdi modus, diligētius ab ipso Asclepiade traditus est.

Arteriæ ab Asclepiade in 11. interiorū conscriptæ, quæ Mnesonī inscribit. Antonij Muse, ad uocē interceptam. 4

B Brasicæ utridis cauliculos depuratos māducandos præbe, & quod insit palearum exsuccum est expuere iube, succum uero delingere. Alia, Brasicæ succū cum melle coctum delingendum exhibe: auxiliatur cōfestim. Alia, Succū eryngij in aqua cocti heminas duas excipito, et succi sicuum in aqua coctarū tantundem: his adde gummi subtilissime dissoluti drach. octo, coquito diligenter ad arteriæ spissitudinē, & inde cubitum iuris ad cyathi mensuram delingendū præbe. Alia arteriæ Charixenis. Facit ad sonū uocis fractum, destillationes in arteriā, uocem interceptā, & raucosam, ad interceptiones uocis ex distensione. Croci drach. ij. succi cyrenaici drachm. unam, mellis attici cyathos sex: mel coquito, & ubi spissatum fuerit, reliquis admisceto, ac uitior uelut dicitū est pilulis inde formati, quæ sub lingua detineant. Alia, Galbanī 3. sex, pipēris 3. unam, nītri 3. unam, mellis attici cyath. sex: galbanū et mel coquito, & densata reliquis unito, uitior ut dicitū est. Alia ad exulceratā arteriā, Charixenis. Facit phonacis ante & post certamen data. Facit ad oculorum dolores, forinsecus imposita. Lana ex ea madefacta facit & ad internas affectiones delinita. Gummi, tragacanthæ, utriusq̄ drach. sex. thuris, myrrhæ, utriusq̄ 3. unam, ob. tres, croci, hypocythidis succi, utriusq̄ 3. unam, passī scybelitæ aut Theræi sextarios sex: gummi, tragacanthā, myrrham, thus, unā cum hypocythidis succo macerato, affusa ipsis passī portioē, atq̄ ubi dissoluta fuerint, diligenter terito, & ad passum misceto, assidue q̄ mouēdo coquito. Crocum uerò laneo paniculo inditum, & in ollam suspensum, unā cum pharmaco coquito, deinde exemptum passo ditum ac tritū ad pharmacū conijcito, & repositis uitior. Alia, Succū radicis dulcis, tragacanthæ, utriusq̄ 3. tres, croci, myrrhæ, utriusq̄ drac. unam, thuris, spicæ nardi, utriusq̄ ob. tres, protopi sextarios tres: utere. Alia Lysia ad eandem affectiones. Croci, myrrhæ, succi radicis dulcis, thuris, castæ, singulorum 3. unam, pipētis grana xxiiij. passī cretici sextarios iij. mellis attici cyathos vi. utere. Alia Charixenis. Croci 3. tres, myrrhæ 3. unam & dimidiā, thuris, glycyrrhizæ, utriusq̄ 3. unā, passī Cretici sextarios tres. Facit ad sonum fractum, destillationes in arteriā, interceptā uocem, tonillas inflāmatas, facit etiā ad phonaseos ante & post certamē data. luuat perfrigeratōs, facit ad recentem & ueterem tussim, ad spuētēs sicut guinem, eundemq̄ rursus reiectionibus prædest & cœliaci. Conducit item ad spiritus frœtorem.

Tom. 5

F 3

Alia

Alia hypoglossis, sub lingua tenenda. Facit ad arteriam exasperatam, & uocem interceptam, itemq; reliquas affectiones. Tragacantha, gūmi Thebaici, utriusq; 3. tres, myrrha, thuris nō secti, utriusq; 3. unam, ob. tres, croci 3. unam, succi glycyrrhizæ ob. tres. Phœnicobalanorum trium carnem, palsi protropi aut Therasi quod satis est his excipiedis. decoquat ad crassitudinē mellis: dat fabæ Aegyptiæ magnitudine sub lingua tenenda & dissoluta transglutienda. Alia hypoglossis Dioscorida. Croci, myrrha, tragacantha, radices dulcis succi, ling. 3. unā, nuces pineas cōtusas numero sexaginta; amygdalas mūdadas totidē. excipe melle cocto. Datur nucis ponticæ magnitudine sub lingua tenēda. Alia Scribonij Lari hypoglossis. Facit ad uocē interceptā. glycyrrhizæ 3. octo, myrrha drach. xxxiij. terebinthinæ drach. xxxij. tragacantha 3. xxxviij. Arida singula per se tundito ac cribrato: resinā autē in pilam coniectam tundito, arida ad ipsam inspergendo, deinde ex unitis omnibus pastillos formato, fabæ Aegyptiæ magnitudinis, quos in umbra siccat, atq; usus tempore unum aut duos sub lingua tenēdos dato, ac liquecentes deuorādos. Oportet autem hoc pharmacū confestim in pastillos cōformare, quo tempore igitur pastillos cogis, eodem etiā tundes: reficcantur enim cito, & ob id pastillos ex eo formantem ad manum simul tundere oportet. Alia aromatica Mithridatis. Facit ad arteriæ affectiones, pulmonis ulcerationes, spuentes sanguines, tabescētes, suppuratos, & peripneumonicos. Croci 3. ij. & dimidiā, myrrha, resina terebinthinæ, utriusq; 3. ij. thuris sesquidrachmā, nardi, cinamomi, calix, tragacanthæ, singulorum 3. unam, mellis atticæ heminam unā: mel & resinam coquito, ut trāsilia fiant ac fibrosa, & non inquant in frigida aquam instillata, dein cum aridis cōmittito, ac probe cōtundito, & reponito. utere nucis ponticæ magnitudine sub lingua detenta. Alia Mithridatis. Myrrha, croci, utriusq; drach. quatuor, nardi indicæ, terebinthinæ, utriusq; 3. ij. thuris, calix, cinamomi, singulorum 3. unā, palsi cretici heminas tres: passum & terebinthinam ad perfectā cōpagē coquito, & cū siccis cōmittito, indeq; in nucis ponticæ magnitudinē sub lingua tenendū dato. Alia ex filice Andromachi aromatica. prodest hæmoptoticis, pleuriticis, tabescētibus, splenicis, hepaticis, ictericis. Facit et ad affectiōes circa uterū et uesicā. Radices filicis q̄ crassissimæ lauauē diligenter donec omne terreū ab eis decedat, deinde perfrigerant ad diem unā, & ex ipsis libræ x. in frustra digitalis magnitudinis secant & cōquassant, ac in uas figulinū cōiiciunt. Infunduntur deinde aquæ dulcis sextarij x. & ad ignē posita coquant. Cum uerō ad dimidias deuenierint per cocturā, eas tollimus, & in duplum uas unguentariū excolamus, & radices quidē expressas proijcimus: in aquā uerō crasso modo cōtusa cōiicimus. Balaustij 3. vi. nardi indicæ, rosarū siccarum, utriusq; 3. iij. cinamomi 3. iij. glycyrrhizæ 3. vi. calix 3. quatuor, rhei pontici 3. quatuor.

Deinde rursus ad ignē admota coquimus, & ubi ad dimidias peruenerint, rursus in aliud uas uas unguentariū excolamus, & arida quidē expressa reijcimus, ad aquam uerō mellis atticæ heminas quatuor addimus, probeq; mixta & ignē adhibita, rursus coquimus, & cum instillata in frigidā nō inquinariunt eam, his resinæ terebinthinæ drach. tres, galbanū nō lignosi tantundē, admisceamus. Hæc uerō liquefacta ad subscripta deplemus. Sunt autē hæc, croci, succi hyoscyami, succi mandragoræ, piperis albi, succi hypocyttidis, singulorū drac. i. omnia hæc tenuissimè trita, & cum primo filicis uocem unita habeto, ut frimentitiā crassitudinē habeat. Postq; igitur inuicē permixta ac probe cōquassata fuerint, in uitreū aut argenteū uas reponimus. dat ex pharmaco cochleariū, maxime iuuat uocem interceptam. Alia panacea Mithridatis, ad phanascos ante & post certamē. Facit & ad glandularū inflamationes, laxatas columellas. facit ad gingiuas humore prægnates, & nomas in ore, & motos dētes. Prodest destillationibus, recēti ac ueteri tussi, hæmopticois, & sanguinē reijciētibus. Vtor pharmaco hoc quādoq; puro, quandoq; passū dissoluto, aut uino scybelite & aqua calida. Etem ad tonsillarū inflamationes dissoluto pharmaco utendū est: ad affectiones uerō in profundo, puro. Cōpositio sic habet. Capita papaueris agrestis, numero cl. filicis lotæ lib. tres, symphyti depurgati, corticis mandragoræ, rhei pōtici, rosarū siccarum, iridis chalcidoniæ, glycyrrhizæ ponticæ, balaustij, singulorū trienti, cinamomi sextantem, nardi celticæ sesquiuiciā, aque pluuiæ sextarios xv. Prædicta in crassas partes cōtusa in uase duplici unguentario ad tridū mace rant, sequenti deinde die ad tertias coquantur, et postea in quallum cōiecta exprimimus ab ipsis in aliud uas unguentariū liquorē, & res decoctas abijcimus quidē, uerū de expresso liquore quantum sufficit accipiētes, subscriptas res in ipso dissoluimus. Sunt autē hæc, gūmi, tragacantha albæ, utriusq; lib. i. myrrha, succi radices dulcis, succi hyocyttidis, singulorū sextantē, croci, mastiches, utriusq; unc. i. Hæc dissoluta diligenter terimus, paulatim de expresso liquore adfillantes. Postea ad pharmaci cōfectionē uino scybelite, aut thereo, aut prāno utimur. sint autē eius sextarij xxxiij. Passum in uas figile diffusum coquimus, atq; ubi mellis spissitudinē acceperit, ipsi dissoluta & trita pharmaca adijcimus, rursusq; coquimus ad cōpagē, & sublato in uas uitreū aut argenteū utimur, quemadmodū dictū est antea. Aliam ad destillationes, & omnes tussiculosas affectiones. Asclepiades in primo interiorū sic tradidit. Ad destillationē pharmacū q̄ usus est Comō philosophus, auxilium statim. Pyrethri, costi, utriusq; 3. ij. piperis albi 3. i. tusa & cribrata reponito. Vsu uerō expectante, naribus admouere, & pharmacū attrahere iubeto. Alia, Piperis albi drach. i. feminis urticæ tantundem, costi, myrrha, croci, singulorū ob. ij. preparato ac utitor ut dictum est. Alia, doloret sedans, Antonij Musæ. Facit ad destillationem

& uocem interceptam. Opj, myrrhæ, seminis hyofcyami singulorū drac. ij. singula in cicutæ de cocto macerato ac diligenter terito, & ex mixtis catapotia erui magnitudine formato, & duo ex ipsis ante somnū dato. Alia facit ad hæmoptoicos, Seminis hyofcyami albi drac. viij. nardi Indicæ drach. vi. croci drac. iij. opij, amyli, anisi singulorū drach. ij. rubricæ Lemniæ drach. i. cum aqua catapotia erui magnitudine formato, ac uitior ut dictum est. Alia delingibilis, ad tusses extremas & inueteratas. Vini falerii sextariū. mellis Attici lib. i. coquito asidue agitando cum ramulis rutæ. Dato inde mystrum. Facit & ad stomachicos.

Alia Petini, ad ulcerationes & suppuraciones in profundo. Vini nulli ueteris sextar. i. axungia ueteris sextantem, alij unc. i. Axungia probe cum uino nullo terito ac dissolutū, inde q̄ in uas fictile transferto, & ad prunas ramulis rutæ agitando coquito, & ubi defata fuerint, in uase uitreo reponito, ac mystrū delingendum ut prædictū est exhibeto. Alia Originæ. Glycyrrhizæ ponticæ drac. ij. seminis urticæ tosti, seminis lini tosti, utriusq; drac. i. myrrhæ, croci, utriusq; ob. i. mellis Attici, aquæ, utriusq; cyat. vi. Glycyrrhizam aqua coquito, deinde expresso liquore, reliqua terito, & melle cocto excipito, ac delingenda præbeto.

Alia, Ari tosti drach. i. amij torrefacti, nucum pinearum tostarum, Irionis tosti, singulorum dra. i. excipe melle cocto. Alia placentula, hoc est, Copranum ad tussientes. Seminis lini torrefacti, contusi, et cribrati. Vux passæ pinguis citra cinos, utriusq; sexta. i. nucū pinearum tostarū, nucū ponticæ depurgatarū, utrarūq; heminā. i. piperis albi sextantem, myrrhæ, croci, utriusq; unc. i. mellis Attici lib. iij. cōtusa ut oportet tritac̄ reponito. Semen lini cum melle coquito, et densata reliquis addito, misceto ac contundito. Datur nucis ponticæ magnitudine. Alia. Facit & ad Thoracis affectiones. Farinæ fabacæ tenuissimā tosta heminā. Iridis Illyricæ quadrantē, nucum pinearū tostarū sextantē, pulegij aridi cōtusi sesquidrach. seminis urticæ drac. i. piperis unc. dimidiā. Mellis boni sextar. ij. farinam cum melle ad densitatē coquito. Seminis lini etiā tusi, tosti, & cribrati heminā. i. in promptu habeto & adijcito. Alia ad tussim, & spiritus prolacionē, ualde probe expurgans. Hyssopi, pulegij, utriusq; sextantē. iridis, seminis sinapis, nasturtij, singulorū unc. i. anisi, piperis, utriusq; unc. i. tusa & cribrata melle cocto excipito. Datur cochlearij boni mēsurā. Si uero hys sit, & accepturum nō febricit, piperis sextantē, & pro aniso, foeniculū aut cuminum, & pro nasturtio, sinapi duplū cōficito. Catapotium ad tussim recentē. Panacea pharmacū dolorē leuās, inducēs somnū, facit ad hæmoptoicos. Styracis drac. viij. opij, myrrhæ utriusq; drac. iij. diluta passo in catapotia cogito, & erui magnitudine cubitū euntibus dato. Alia exemplaria par pōdus omnium habent. Aliud Platoni inscriptū, euestigio auxiliatur. Styracis, myrrhæ, opij, galbani, singulorū par pondus, passo diluta in catapotia redige-

Aliud Basso inscriptum pharmacum accommodatum auxiliatur statim. Facit hæmoptoicis, sanguinem reijcentibus, suppuratis. Galbani, styracis, iridis Illyricæ, corticis pinus, singulorum 3. ij. enulæ, opij, utriusq; drac. i. Excipe melle cocto, & præbe ciceris magnitudine ex aquæ mulse cyathis. iij. Confectio ex marrubio Platonis. Myrrhæ, styracis, opij, succi marrubij, galbani, croci, & quales partes, præpara ac utere, melle exceptis cocto. Catapotium dolorē sedans, pharmacum accommodatum ad inueteratas affectiones. Facit ad destillationem, dolorē capitis, ægre spirantes, peripneumonicos, ad uescicæ & uteri affectiones. Inscribitur panacea accommodata, ab aliquibus Strichus, myrrhæ, piperis, opij, styracis, castorij, galbani, & quas partes excipe passo, fac catapotia, & utere. Aliud pharmacū ualde bonum, Inscribitur Harmonia, Facit ad destillationes, & in exuperabilem defluxum. Styracis, castorij, piperis, cardamomi, singulorum drac. iij. opij, myrrhæ, seminis hyofcyami albi, singulorum dra. iij. Excipe passo, reduc in catapotia. Dato ciceris magnitudine ad somnum. Aliud, Croci, sulphuris uiui, myrrhæ, opij singulorū dr. iij. seminis hyofcyami albi, cardamomi, piperis albi singulorum dra. viij. mellis cocti quincuncem, aut quod satis est. Vfus prædictus est, Datur cubitū euntibus. Cōfectio Proxeni, ad tusses inueteratas, & ualde diū durātes humectas affectiones, appellat Symphonos Lexopyretos, id est, optime sedās febrē. Hac usus est Antonius Musa. Piperis albi, opij, cardamomi, singulorū 3. viij. croci, sulphuris uiui, myrrhæ, seminis hyofcyami albi, singulorū 3. iij. mellis cocti sexuncem. Datur nucis ponticæ magnitudine cum aquæ mulse cyathis tribus.

Confectiones ad tussim ab Andromacho libro ij. de confectionibus internis conscriptæ. Cap. III

Postquā multas ad tussim Andromachus scripsit cōfectiones, deinceps omnes soperem inducētes, & ob id soperiferas appellatas tradidit. Cæterum hæ omnes tenues fluxiones inspissare possunt, resiccantes simulq; refrigerantes, & propterea aliquæ nō tantum opium, sed & mandragoræ succum, aut radicis corticē, aut hyofcyami semē, aliquæ etiam duo aut tria, aut etiam omnia huiusmodi habent. Quemadmodum aliæ styracem, & crocū. Rationabiliter autem his alij partim calfacientia ammiscuerūt, partim cum modicā adstringendi ui aromatica & resiccantia, itemq; semina quædā familiaria. Velut anisi, foeniculi, apij, dauci, fefelis, utpote quæ tum pharmacorum inuicū ditatē ac uim obtundunt, tum urinā etiam prolestant. Quædā uero etiā aspretudines leuigāt, uelut sunt tragacātha, glycyrrhiza, & uina dulcia. At uero ex his, quæ minus de soperē inducentibus cōplectuntur, eas etiā tabescētibus præbent. Confectio ad tussim ex duobus piperis generibus. Cinamomi drach. i. succi papaueris drach. i. myrrhæ obol. iij. piperis nigri obol. iij. castorij obol. iij. piperis albi obol. iij. galbani obol. iij. croci dimidium. Redigito in passillos, Dato cum melle aut passo.

Alia ad tufsim excellenter effica. Eadē febres fedat. Seminis hyofcyami unc. dimidiā. Vnum exemplar unc. i. habet. cardamomi drac. i. succi papaueris unc. unam, myrrhæ, sulphuris uiui, croci, fingulorum unc. dimidiā. piperis albi iuxta Heram fequunciam. Mellis Attici quod fatis est.

Alia ad tufsim ficcam. Styracis partem i. succi papaueris tantundem, croci partem dimidiā. cōtum dito simul & catapotia inde exhibeto. Cōfectio ad tufsim qua utor, Sacrificuli bona. Succi papaueris drachmas x. feminis lactuce drach. xx. castorij drach. xvij. alij xvi. rutæ hortensis aridæ 3. xiiij. croci drach. vij. alij unciā unā. Excipe melle. Datur pro uiribus ægyptiæ fabæ magnitudine, febrientibus ex aqua, febre carentibus ex uino, ad noctem. Catapotium ad tufsim quo utor. Styracis, myrrhæ, opij, fingulorum drach. iij. opo balsami, croci, utriusq; drach. ij. simul trita excipe, ac utere. Ad tufsim ficcam. Succi radicis dulcis drach. ij. styrcis drach. i. opij, croci, myrrhæ fingulorum obolos iij. excipe passo aut aqua, & ad fabæ græcæ magnitudinem redigito ac utitor.

Potio qua utor ad phthificos, Rhipali multis cōmoda appellatur Menodorios, & Ambrosia. Facit ad febres per circuitum repetentes. Nardi, croci, myrrhæ, costi, casia, cinamomi, iunci rotundi odorati, piperis nigri & albi, castorij, galbani, terebinthina, styrcis, succi papaueris, feminis hyofcyami, fingulorum drach. i. tragacanthæ drach. vi. mellis quod fatis est. Vini falerni heminam i. Tragacantham uino sufficienti macerato, & reliqua simul cum melle committito. Datur febrientibus sefquidrachma, ex aqua mulsa. Febre carentibus unciā dimidiā, cum melle, & aceti cochleario i. & uini Falerni cyath. ij. Apollonij cōfectio, facit ad multa præsertim ad tufses egregie. Cardamomi drach. xvij. myrrhæ, drach. xij. hyofcyami drach. xij. opij drach. x. alij xij. feminis petroselinij drach. xij. croci drach. xv. malorum mandragoræ drach. x. zingiberis drach. viij. sulphuris uiui drachm. vi. ari drach. vi. thuris drach. vi. costi drac. vi. piperis albi drach. vi. mellis Attici. Alia ad internos abscensus, probe repurgans. Sagapeni dra. ij. myrrhæ drach. ij. cardamomi drach. iij. alij drach. i. castorij drach. i. piperis albi obol. iij. opij dra. ij. cum aqua in pastillos formato duorum obolorum pōderis. Dantur cum aqua. Isotheos ad tufsim, ad tabem, ad omnes internas & per circuitum repetentes affectiones. Nardi drach. ij. myrrhæ dra. i. croci drach. i. & dimidiā, costi drach. i. piperis albi drach. i. fecis opobalsami drach. ij. cinamomi drach. ij. succi mandragoræ drach. ij. castorij drach. ij. feminis dauci drach. i. & dimidiā. opij drach. ij. amomi sefquidrachmam, casia nigra sefquidrachmam. mel coctum. Facit ad dolores stomachi, hepatis, pulmonis, oculorum, sanguinis refectionem, abscensus. Prodest dysentericis, uoluo sis, nephriticis, ischiadicis, ægre spirantibus. Vrina suppressæ, doloribus laterum, præcordiorum, ad fluxum muliebrem, & uteri strangulationem.

Admiranda est Antidotus ad lethalia uenena, ante

& post cibum sumpta, ad omnem sanguinis eruptionem cū frigida, & ad morfos à uipera, & percussos à phalangijs, in uini cyathis tribus. Quarta narijs prælotis dantur ante horam accessionis oboli ij. ex uini cyathis tribus. Potio ad tufsim, Dyspnceam, & alia multa Antipatri, qua utor.

Styracis drachmæ vi. terebinthina drachmæ iij. opopanax drach. ij. galbani drach. ij. iridis Illyricæ drachm. ij. myrrhæ drach. ij. feminis hyofcyami albi obolos iij. spumæ nitri obol. iij. piperis albi obolos iij. opij obol. v. Datur quantitate fabæ Aegyptiæ ad somnum. Quidam opij obolos iij. alij drachmam unam coniungunt. Eclegma ad tufsim. Nucleorum nucum pinearum drach. xij. feminis lini tosti drachmas vij. tragacanthæ drachmas xij. carnis palmularum drachmas xvij. iridis Illyricæ drachm. xij. amygdalarum dulcium drachmas xvi. Mel coctum. Dato delingendum bis per diem, mane & uesperi. In quibusdam tragacantham aqua pluuiā dissolutam primum cum melle coquito. Catapotium ad tufsim, Crispi Liberti. Myrrhæ, piperis albi, galbani, castorij, styrcis, croci, opij, fingulorum par pondus, styrcis dimidiū. Dato inde catapotia ij. ad noctem.

Scribonij, ad tufsim. Seminis apij drachmas duas, floris iunci odorati, nardi celticæ, styrcis, croci fingulorum drachmam unam. balauilij obolos iij. succi papaueris drachmas iij. mellis quod fatis est. Datur magnitudo fabæ non febrientibus ex aceto mulso. febricitantibus cum aqua. Asclepiadæ ad tufsim. Rhei pontici, croci Cilicij, succi papaueris, spicæ nardi, thuris, myrrhæ, fingulorum drachmā unam. radicis nardi celticæ sextantem. styrcis sexuncem. Datur drachma una cum uino mulso. Thepsiana Apollonij ad internos abscensus. Seminis apij drachmas iij. succi papaueris drachmas iij. melanthij drachmas iij. iridis Illyricæ drachmas vij. castorij drachmas ij. feminis dauci drachmas vij. si nopidis rubricæ drachm. vij. excipe melle cocto, & dato nucis ponticæ magnitudine ex aqua.

Catapotium reificatorium. ad fluxiones Thoracis, ad molæ dolorem, affectiones per circuitum repetentes, & percussos à scorpio. Succi papaueris, feminis hyofcyami, utriusque par pondus cum passo aut melle ad fabæ græcæ magnitudinem formato, Dato ad noctem. somnum inducendo prodest. Cōfectio finiens febrem Pamphili pharmacopolæ bona. Seminis hyofcyami unciā. cardamomi exenterati unciā unā. succi papaueris unciā i. sulphuris uiui unc. dimidiā, croci unc. dimidiā, myrrhæ unc. dimidiā, euphorbij drac. ij. costi drach. iij. iridis Illyricæ 3. iij. piperis albi drac. iij. & dimidiā. Mellis quod fatis est. Vtere. Catapotium ad tufsim & alia multa commodum, & præsertim ad tufsim humidam. Iunci odorati drach. vi. opij drachmæ iij. galbani drach. vi. styrcis drach. iij. fiant Catapotia araci magnitudine, dentur ad somnum. Alia sedans febrem, Darij. Hac antidoto usus est ad omnia, ad tonsillas, tufses, & anginas. Croci unciā i. piperis

piperis quincuncem, myrrhæ unc. i. succi papaueris unc. i. thuris tantundem. seminis hyoscyami tantundem, cardamomi tantundem. costi drac. iij. iridis llyricæ drach. iij. aristolochiæ drach. ij. melle Attico excipito. Aliud ad omnē tussim expertum. Anisi dra. ij. costi ob. iij. myrrhæ drac. i. castorij, galbani, piperis albi, seminis hyoscyami, opij, succi radicis dulcis, singulorum 3. i. excipe passo, redige in catapotia ciceris magnitudine. Dato in nocte. Catapotium concoctorium ex libris Perigenis, ad tussim & destillationem. Styracis ob. ij. piperis grana xx. myrrhæ drach. ij. & dimidiam. seminis hyoscyami ob. iij. euphorbij drach. ij. iridis llyricæ drach. ij. opopanax drach. ij. croci obol. iij. opij obol. iij. terebinthinæ drach. i. piperis albi obol. iij. galbani drach. ij. trita excipe galbano ac resina, opio q̄ & styrace. Datur prout sunt vires. Apollonij confectio ad tussim commoda. Foliolorum malabathri drach. viij. croci drach. vi. opobalsami dra. i. spicæ nardi drach. i. rosarum siccatū, floris iuniodorati, singulorum drach. i. costi, callicæ, styracis, myrrhæ, mei, singulorum dra. iij. uiræ passæ mundæ drach. xvi. succi mandragoræ 3. vi. mellis quod satis est. Vuam passam in Cretico passo pernoctem & diē macerato, deinde ammixtis aridis terito, & mel misceto, ac reposito utitor. Potio ad tussim ex libris Apollonij, itē ad muliebrem fluxum. Seminis hyoscyami drac. iij. myrrhæ drach. iij. croci, succi mandragoræ, thuris, singulorum 3. iij. piperis albi & nigri utriusq̄ drach. iij. uiticis drach. iij. opij drach. iij. mellis & vini chij quod satis est. Datur magnitudo fabæ. Ad tussim, incipientem phthisim, hæmoptoicos, ad fluxiones. Seminis hyoscyami dra. iij. radicis nigra mandragoræ drac. iij. Rhei drac. iij. corallij drach. iij. opij drach. iij. lycij drac. ij. balauitij drach. iij. thuris drach. v. tragacanthæ drac. ij. croci drac. iij. Cum aqua pastillos triobolares formato. Datur hæmoptoicis ex posca, Reliquis in aqua. Potio prodita à Cletio Abascanto, ad tabescentes, quos utor abunde, Verum ineptum est ad sanguinis reiectionem. Aristolochiæ dactylitidis drac. xxx. sulphuris uiri drachm. xx. corticis mandragoræ drachm. xx. thuris drac. xl. gentianæ dra. xxx. felis drac. xxx. opij drac. xl. seminis hyoscyami albi drac. xl. myrrhæ drac. xl. croci drach. viij. piperis albi grana c. euphorbij drach. x. baccarum lauri drachmæ viij. & dimidiam. costi dra. viij. & dimidiam, Cardamomi dra. viij. Euphorbium, & myrrham in uino tūdito, opium uero & hyoscyamum in uino mulso. Reliqua priuatim tūdito, ac simul misceto ad mel coctum. Vtere pharmaco non recenti. Recte apposuit Andromachus ad hoc pharmacū, quod sit ad sanguinis reiectionē ineptū, ob sulphur uidelicet uirū, & euphorbij, partim etiam ob lauri baccas. Catapotium ad tussim statim auxilians. Iridis ob. iij. croci Cilicij sesquibolum, myrrhæ ob. ij. cinamomi ob. iij. calicæ obol. iij. seminis hyoscyami albi obol. ij. seminis papaueris nigri obol. ij. seminis cicuta obol. ij. redige in pastillos obolares

A aut semiobolares cū passo, & præbe in passu quarta hémina parte. Aliud, Ad omnem tussim, & fluxionem, & abcessus internos, ut Apollonius. Sagapeni, gentianæ, myrrhæ, opopanax, piperis albi, singulorum drach. ij. baccarum lauri mundarum drac. iij. trita cum aqua reduc ad magnitudinē fabæ gracæ, Dato autem ischiadici paulò plus ex uini diluti cyathis tribus. Ad Phthisicos aliud, Cuius utilitatem expertus sum, Fabiani Cretensis. Succu hypocythidis dra. viij. myrrhæ drach. viij. castorij drachm. vi. thuris drachmæ viij. succi Rhois drach. ix. sagapeni drach. vi. succi papaueris drach. viij. anisi drach. ix. seminis apij drach. viij. marubij drach. i. corticis mandragoræ drach. x. piperis longi drach. viij. & albi drach. v. & dimidiam. uerbenaæ supinae drach. unam. mel coctum. Catapotium album, ut Praxitanis & Apollo. Myrrhæ, seminis hyoscyami albi, opij, styracis, singulorum æquale pondus, formato catapotia quanta deuorari possunt, his ipsis uia passo, aut passo, aut palmularum carne exceptis. Catapotium ex libris Perigenis. Ad tussim Seminis hyoscyami, castorij, myrrhæ, styracis, singulorum par pondus. Dato magnitudinē fabæ cum passo, aut aqua mulsa. Catapotia ad tussim humidā ex libris Perigenis. Styracis, galbani, ammoniaci thymiamatis, castorij, opij, singulorū æquales partes in catapotia erui magnitudinis redigito, ex eisq̄ duo exhibeto.

De reiectione sanguinis. Cap. IIII

C In reiectione sanguinis primum periculū est, ne immoderata eius euacuatio fiat. Alterum post suppressum sanguinē. Curatio uero eius quidem quæ ex aperture osculi alciuius uasis coctigit, per obturationē fit oris dilatati. Eius uero quæ ex uasis ruptura, per eiusdem cōglutinationem. Quem admodum eius quæ ex erosionē, per renutritionē erodorum. Obturatur igitur osculum dilatatū, per adstringentia: cōglutinationē autē ruptum, per eadem, & quæcumq̄ ipsis in cōpositione miscentur citra mordacitatem resiccantia, et glutinosum quiddā habentia. Velut est lemnia terra sphragis appellata, & Samius asfer. Renutritur autem cōrosia, per cibos boni succi, & pharmaca carnē gignentia, sarcotica Grecis appellata, de quorū facultate dictum est in secūdo opere huiusmodi tractationis. Iuxta primā quidem igitur rationem, ex talibus pharmaca cōponuntur ad reiectionē sanguinis curandā conuenientia. Iuxta secundam uero, in his qui ex pulmone, aut thorace, aut arteria, aut summa arterie parte sanguinem reiectant. Miscentur enim prædictis trib. congruenti mensura tum calida, tum tenuium partium existentia, quæ infestissima sunt prædictis trib. affectionibus, aperture uidelicet orarū, rupturæ, & corrosioi. Cuius rei gratia itaq̄ miscetur: Distributionis nimirū ipsorum in corpus. Etenim adstringentia et uiscosa ac renacia sibi ipsis uias præcludunt, quare opus habent facultate ipsis uiam fruente ac præparante.

Porrò quum ex locis circa stomachum, aut alium, aut aliquod intestinum, sanguis educitur, huiusmodi

huiusmodi pharmacorum mixtura non est opus. Verum rursus infestissimum his est hoc genus pharmacorum, quod in tantum refrigerat, ut affectio stupefiat, & tamen etiam hæc ammiscetur medicamentis ad hæmoptoicos convenienter paratis, ut quæ altiore somnum ac soporem inducant, & commodissima sunt his qui à tussi lancinatur, sistencia nimirum sanguinem qui ad affectum uas defertur, atque hoc per suam frigiditatem. Atque hi quidem sunt componendi scopi. Copia autem materiae pharmacorum, quæ sufficienter experientiam prioribus medicis, qui circa curatiuam artis partem diligenter uersati sunt, exhibuerunt, deinceps referet.

Quæ Andromacho ad sanguinis reiectionem scripta sunt. 2

Primum ex his quæ sanguinem reicientibus conuenienter pharmactis, Andromachus sic tradidit. Ad sanguinis reiectionem, quo ego utor. Acacia drach. iij. rosarum siccarum drach. viij. balauftij drach. viij. gummi drach. ij. tragacanthæ drach. i. cum aqua pastillos facito drachmæ unius. Dato ex aqua pluuiæ. Aliud Apollonij. Seminis hyoscyami drach. viij. opij drach. iij. thuris drach. viij. terræ Samiæ drach. iij. amyli drachmæ ij. rubricæ lemnis drachmæ ij. aut si hæc non sit, sinopice drach. iij. coralli drach. iij. costi drach. iij. floris balauftij obol. iij. alij drach. ij. excipe succo polygoni, ac redige in pastillos triobolares, quos ex frigida præbero. Quidam cicutæ feminis drach. iij. adijciunt. Aliud quo utor: Cytinorum drach. vi. spinæ Aegyptiæ drach. vi. succi papaueris drach. iij. hypocythidis drach. vi. balauftij drach. vi. acacia drach. vi. lycij Indici drach. iij. myrrhæ drach. ij. excipe myrti baccarum decocto, & fac pastillos drachmæ unius. Ex eodem decocto præbe bibendos. Aliud sistens sanguinem. Croci Cilicij, myrrhæ, iris, nardi Indicæ, thuris, acaciæ, singulorum unc. i. succi papaueris, costi, piperis, singulorum unciam dimidiam. rosarum siccarum trientem. melle excipito. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudo.

Aliud fluxiones sistens. Prodest fluxionibus internis, tonsillaribus, & uisæ, & ad ulceratam arteriam gangarissatum, & ad sanguinis fluxum ex aqua frigida. Pluribus ex posca magnitudine ponticæ nucis. Congruunt etiam mingentibus sanguinem, & fluxum muliebris, potum & appositum. Myrrhæ unc. i. nardi Indicæ unc. i. cinamomi unciam i. thuris unc. i. croci unciam dimidiam. piperis dra. iij. succi acaciæ drach. iij. costi dra. iij. styracis dra. iij. iris drach. iij. floris balauftij sextantem. rosarum siccarum sextantem. Excipe melle cocto. Aliud sistens fluxiones, ex libris Galli. Facit probe & ad sanguinis reiectionem. Croci, myrrhæ, iris, nardi Syriacæ, casisæ nigrae, Rheipontici, singulorum dra. i. styracis, piperis albi utriusque unc. dimidiam. rosarum siccarum quincuncem. tritis mellis Artici quod satis est affunde. Dañ nucis ponticæ magnitudine ex aqua cyathis tribus. Aliud ad hæmoptoicos, ex libris Apollonij. Succus hypocythidis dra. xij. balauftij, acaciæ, cytinorum singulorum drach. xij. gallicæ drach. xij. succi papaueris drach. vi. croci drach. vi. Redigito in pastillos triobolares. Aliud ad

hæmoptoicos. Succus papaueris obol. ij. amyli obol. iij. Dato ex aqua, Aliud ad sanguinis educationem, & omnem sanguinis eruptionem, ex aqua potum. Succus papaueris drach. i. cinamomi drach. i. castorij dra. i. costi, piperis longi & rotundi, myrrhæ, singulorum, obol. iij. croci sesquibolum, corallij obolos ij. balauftij drach. unam. anisi drach. ij. gummi drach. i. Ex tritis pastillos formato acutor. Aliud ad sanguinis reiectionem. Rubricæ sinopice drach. iij. thuris drach. viij. anisi 3. i. feminis cicutæ drachmas iij. succi papaueris 3. iij. lapidis hæmatitæ drach. iij. feminis hyoscyami drach. viij. terræ samis drach. iij. dato pharmacum ieiunis ex aqua. Aliud, Succus hypocythidis drach. unam. opij obol. iij. balauftij drach. i. acaciæ drach. i. Ex aqua. Aliud ad sanguinis educationem, ut Herophilus. Radicis symphyti quadrantem, terræ asteris unc. i. thuris sextantem. balauftij unc. i. hypocythidis unc. i. croci obol. iij. myrrhæ drach. ij. opij drach. i. rubricæ lemnis quadrantem, & obol. iij. gummi drach. i. Excipe succo polygoni aut plātaginis. Aliud ad hæmoptoicos, Boni præceptoris. Balauftij drach. ij. acaciæ 3. ij. tragacanthæ drach. iij. succi hypocythidis dra. iij. floris rosarum drach. iij. opij drach. ij. thuris drach. iij. myrrhæ drachmas ij. feminis hyoscyami obol. iij. Excipe succo sanguinariæ quæ Græcis est polygonum. Aliud sanguinem reicientibus ut Acacios. Terræ Samiæ drachm. iij. corallij, drach. iij. rubricæ sinopice drach. ij. balauftij ob. iij. opij, drachm. iij. amyli drach. xij. thuris drach. viij. feminis hyoscyami, drach. viij. Cum polygoni succo pastillos triobolares formato. Dato in posca, si fluxio sit multa cum uitello oui assato & aqua plantaginis. Aliud ad hæmoptoicos & dysentericos. Floris rosarum, opij, acaciæ, gummi, balauftij, hypocythidis singulorum quadrantem. gallicæ unc. i. feminis plantaginis eiusdemque succi utriusque sextantem. lycij Indici unc. i. succi rosarum unc. i. Redigito in pastillos drachmales. Quidam etiam omphacij unciam dimidiam addunt. Dysentericis etiam infunditur. Aliud ad hæmoptoicos. Carteri robustius. Seminis cicutæ drachm. ij. feminis hyoscyami drachm. i. amyli drachm. i. nardi obolos iij. rubricæ lemnis obolos iij. alij iij. anisi obolos iij. alij iij. croci obolos iij. Dato cum uitello oui assato, ex aqua lactosæ cyathis tribus. Facit & ad destillationes. Aliud ad Hæmoptoicos, Magni Philadelphi. Corallij ob. ij. asteris Samij obol. iij. succi sanguinariæ cyathos vi. Dato hoc totum pro duabus uicibus in potu.

Vfus predictorum Andromachi pharmacorum. 3

Iam ante quidem palam est, ex his quæ in principio sermonis de reiectione sanguinis dixi, quod sit usus præscriptorum pharmacorum. Verum maioris lucis gratia, repetam etiam nunc id quod primum omnium ex acacia, rosis siccis, balauftio, gummi, tragacanthaque est compositum. Manifestum autem est acaciam quidem, & rosam, & balauftium, adstringentia habere, gummi uero & tragacantham uiscosa & glutinatoria. Igitur impossi-

hile est ipsum usq; ad thoracem & pulmonē per se deferri, si non habeat quæ adstringentia & viscosa ac tenacia deducant. Et quod his amplius accedit, neq; mellis quicquam eius compositor addidit. Sed per aquam pluuiam, quæ & ipsa adstringentem uim habet, tum compositio ipsius, tum exhibitio tradita est, ut ad sanguinis ex stomacho & uentre eductiones conuenire possit.

Quin & si possibile sit ex intestino ieiuno aliquid per nauſeam efferri, ad hoc etiam commodum pharmacum fiet. Contrariam autem uicissim ad præscriptum pharmacum compositionem habet quintum ex ordine scriptum, itemq; nonum. Nimirum quum cinnamomum, & piper, & costus, & myrrha eis sint ammixa. Reliqua uero omnia media quodammodo inter hæc sunt, neq; exacte adstringentia per totam sui compositionem, neq; fortiter calfacientibus permixta. Cæterum opium, & hyoscyamus, & cicuta semen, maxime quidem his qui a tussi, aut etiam aliâs lancinatur, apta sunt: quanquam omnibus quomodocumq; sanguinem reijcientibus conueniant. Quare ipsa misceat licet, tum in his qui ex nutritiuis organis sanguinem sursum educunt, tum quibus ex spiritalibus organis idem contingit.

Que Hslepiades ad Hæmopticos scripsit. 4.

Ad sanguinis reiectionem. Radicis symphyti sexuncem. balaustij drach. ij. aut i. aquæ sextarium i. coquito ad tertias, & expresso liquori hæc addito. amyli drach. i. gummi Thebaici tantundē. Dato in potu. Aliud, Cucumerum satiuorum lib. i. in tenuia frusta dissecto, & aquæ potabilis sextarii i. affundito, ac ad tertias coquito. Expresso deinde liquori terræ samie sesquidrachmam inspergito, ac bibendum exhibeto. Charixenis pharmacum accommodatum. Radicis polygoni manipulum, radicis symphyti tantūdem, Rhosis rubri acetabulum, aquæ sextarios iij. coquito ad tertias, & expressi liquoris cyathum unum dato, cum gummi tenuissime triti ac dissoluti drachma una. Pharmacum Arabiani quod ponticum dicitur. Uuæ ursi libras xvi. aquæ pluuiæ sextarios xvi. coquito ad tertias, & expressum liquorem reponito. Aliud, Mororum rubrorum nondum maturorum libras xvi. aquæ pluuiæ sextarios xvi. coquito ad tertias, & expressum liquorem reponito. Aliud, Fructus corni libras xvi. aquæ pluuiæ sextarios xvi. fac eodem modo. Aliud, Palmularum Thebaicarum libras xvi. aquæ pluuiæ sextarios xvi. coquito ad tertias, & postquam expresseris liquorem, ad prius expressos liquores infundito, omnesq; probe mixtos ad tertias coquito, & in fictili uase reponito. Et inde cyathum unum ante cibum dato. Pharmacum hoc est ualde bonum, & regenerationē prohibens. Oportet autem singula suo proprio tempore preparare, & ad pharmaci confectionem reponere. De ursi uua. Quæ ursi uua appellatur in ponto nascitur. Planta est humilis & fruticosa, folio memæyli, fructum ferens rubrum & rotundum, gustu austerum, quem ursi uuam ap-

pellant. Catapotium ad hæmopticos. Corticis thuris, terræ samie, amyli, singulorum drach. iij. tusa et cribrata reponito. Vsu uero expetente, cochlearium unum in aquæ frigida cyatho dato.

Aliud, Balaustij, terræ samie, corticis thuris, gummi, singulorum æquale pondus tusa & cribrata exhibe ut prædictum est. Ad sanguinis reiectionem eclegma Amaranti, pharmacum accommodatum. Vini salerni sextarium i. mellis Attici lib. i. in uas fictile confecta & conuassata super prunas posito, & ubi arteriaca accepterint spissitudinem; ab igne ablata refrigerari sinito, eisq; contusa & cribrata addito, gummi cochlearia iij. balaustij, thuris, terræ samie, singulorum drach. ij. & rursus ad ignem admota & calfacta reponito. Dato ut prædictum est. Aliud Origene.

Succi gentiane, succi symphyti, balaustij, singulorum drach. viij. croci, myrrhe, succi radicis dulcis, singulorum drach. iij. protropi, aut Therai, aut Seybelitæ sextarios vi. præpara ac exhibe, ut dictum est. Catapotia ad sanguinis reiectionem dolorem sedantia. Vsus est Charixenes. Succi hypocythidis, balaustiorum, opij, singulorum drachm. iij. excipe uino Myrrite, & fac catapotia. Dato ex his trioboli pondus. In alijs exemplaribus opij drachmæ dua habentur. Aliud, Succi hypocythidis, succi acacie, succi Rhosis Syriacæ, singulorum drach. iij. balaustij, opij, gummi, singulorum drach. iij. uini Myrrite quod satis est. Vius ostensus est. Pastillus hæmopticos, pharmacum accommodatum, Inſcribitur Tryphærum, hoc est, Delicatum. Amyli, balaustij, terræ samie, succi hypocythidis, gummi, croci, opij, singulorum drach. ij. Excipe succo plantaginis, & exhibe drach. unam. Verum liquor ipse affectioni sit conueniens. Alius, Amyli, terræ samie, hypocythidis singulorum drachmas ij. opij, croci, balaustij, tragacanthæ, singulorum drachmam unam, excipe succo plantaginis. Pastillus ex succino. Facit hæmopticos, diuturnæ & recentis tussi, Phthisicis sanguinem reijcientibus, suppuratis, cœliacis, dysentericis, et inflatis. Est etiam Auricularis bona. Psyllij mundi drachm. xlv. iridis Illyricæ, mastiches, ramentorum succini, croci, singulorum drachm. xxx. opij drach. xv. Psyllium in aqua calidam coniectum macerari sinito, atq; ubi uiscosum ac glutinosum de se in aquam deposuerit, liquorem exprimito, et cum eo pharmacum præparato, in pastillos ipsum cogeno, ex quibus obol. iij. ad somnum dato. Sint autē aquæ sextarii iij. In alijs exemplaribus psyllium ad triduum madescit, deinde ter donec ebulliat coquitur, & ab igne ademptum rursus ad triduum sinitur, atque tunc liquor ad pharmaci confectionem segregatur. Pastillus Neapolitæ. Facit hæmopticos, suppuratis, phthisicis, affectionibus fluidis. Seminis hyoscyami albi, succi mandragoræ, utriusq; drachmæ v. thuris masculi, opij hispani, styracis, coaguli hinuli, singulorum drachm. x. mastiches drac. xx. ramentorum succini, iridis Illyricæ, croci, singulorum drach. xxx. psyllij drach.

xlv. aqua sextarius iij. præpara ac utere ut prædictum est. Saffillus ex corallo, ut Niceratus, Corallij, terræ Samiæ, utriusq; drachmas viij. balauftiorum, amyli, terræ lemniæ, singulorum drach. iij. feminis hyofcyami albi, opij, hypocythidis, singulorum drach. ij. Excipe succo arnoglossæ, coege pastillos ac exhibe. Aliter Dioclis Chalcedonijs. Corallij drach. viij. succi hypocythidis, balaustij, succi acaciæ, Rhei pontici, terræ Samiæ, opij, thuris, succi symphyti, singulorum drach. ij. excipe succo plantaginis. Aphrodisiacum Clidion, pharmacum accommodatum. Facit hæmoptoicis, cœliaciis, dysentericis, & qui stomachi fluxionibus laborant. Cytinorum, spinæ Aegyptiæ, balaustiorum, succi hypocythidis, succi acaciæ, singulorum drach. vi. lycij, Rhei pontici, opij, singulorum drach. iij. myrrhæ drac. ij. confusa & cribrata diligenter baccarum myrti decocto excipe, & pastillos coege. Exhibe pro uiribus cū rosarum decocto, aut baccarum myrti, aut aqua frigida. Forinsecus spongiam aceto imbutā imposito. Postquam uero fluxus confiterit, pectus & fluxione infectos locos omphacium cum aceto dissoluto ilimito. Tepefiat autem ad cinerē calidam, donec aliquantulum spissetur. Philippi pharmacum accommodatum dysentericis, & hæmoptoicis. Balaustij, acaciæ, hypocythidis succi, opij, thuris, myrrhæ, croci, gallæ, lycij, aloes, Rhei pontici, baccarum myrti nigrarum, malicorij, singulorum dr. iij. excipe uino Italico, & redige in pastillos triobolares. Dato febrientibus ex aqua, non febrientibus cum uino.

Confectiones dolorem sedantes, tabescentibus, & sanguinem reiectantibus commode, itemq; alijs quibusdam accommodatas, præterquam colicis. Cap. V

In his equidem qui sanguinem reiectant, nondum tamen exacte tabe apprehensi sunt, hoc genus pharmacorum dolorem sedantium priores medici composuerunt, ipsumq; anodynon appellauerunt, conueniens & his qui sanguinem reijciunt, & qui tum hoc perpetuantur, tum etiam iam tabescunt. itemq; ad alios dolores & affectus, qui circa pulmones, & arteriam, & Thoracem, atq; alias quasdam partes consistunt, colicis tantum exceptis. Differunt em̄ hæc pharmaca ab his quæ priuatim colica appellantur, aromatum, & odoratorum ac urinam cientium seminum mistura. Colicæ enim confectiones his uehementiores sunt, stupefactoriam uim prædominantem habentes ex multitudine refrigerantium pharmacorū. Quale est, hyofcyami semē, & cicuta, & papaueris succus, & cortex radicis mandragoræ. His namq; in colicis uti cogimur ob magnitudinem doloris.

Quæ Andromachus scripsit ad prædictas affectiones. 2

Confectio sedans dolorem ad omnes internos affectus et pleuritidas, qua utor. Radicis panacis, feminis dauci, utriusq; drach. iij. castorij drac. iij. alij drach. ij. feminis hyofcyami, opij, utriusq; dr. iij. alij drach. ij. Mellis quod sufficit. Dantur obo. iij. cum aqua cyathis tribus. Alia sedans dolorem, Marcellini. Anisi drac. ij. feminis hyofcyami

mi drachm. ij. succi papaueris drach. i. feminis apij drach. ij. croci obol. iij. rosarum siccarum drach. i. myrrhæ drach. i. amomi drach. i. Trita cum aqua in pastillos triginta duos redige. Dato in somni tempus cum aqua cyathis duobus aut tribus. Alia sedans dolorem, Ex feminibus. Seminibus apij drach. viij. opij drach. ij. ammij drach. viij. anisi drach. iij. fœniculi drachmæ iij. calsiæ nigrae drach. ij. Cum aqua fac pastillos triobolares. Dato ex passo, sexta & decima heminae parte, aut ex aqua. Alia Achillæ Aurigæ. Anisi drachm. viij. ammij drachm. viij. feminis apij drach. iij. opij drach. ij. nardi Indicæ drach. ij. myrrhæ drach. ij. piperis drach. i. calsiæ nigrae drach. ij. Fac pastillos triobolares qui resiccati ponderent obol. ij. Dato ut reliquos. Alia dolorē sedans ut Xenocrates, qua utor maxime ad tormina & dysentericos. Seminibus apij drach. ij. anisi drachm. v. nam, piperis albi drach. i. myrrhæ obolos iij. castorij obol. iij. opij obolos ij. gentianæ drachm. ij. Fac pastillos triobolares, & uarie exhibe. Alia Sphragis dicta sedans dolorem, resiccans fluxiones, & tormina acustiles, qua utor. Myrrhæ obol. v. alij vi. corticis mandragoræ drach. iij. succi papaueris drach. v. feminis hyofcyami drach. iij. alij drach. ij. thuris drach. v. croci drach. v. Excipe uino, exhibe pro uiribus, aliquibus fabæ Aegyptiæ magnitudine, aliquibus obol. ij. Alia, Alter appellata, sistens dolorem, Qua utor ad omnem fluxum, dolorem, & omnes internos affectus & defillationes, ad uescicā, ad suffocationes, fluxum muliebrem, stomachi fluxionem, dysentericos, sanguinem reijcientis. Facit & ad paralyti resolutos. Croci obol. iij. feminis hyofcyami drachm. vi. feminis apij drachm. vi. anisi drach. iij. styracis drach. iij. feminis dauci drach. iij. castorij drach. ij. opij drach. iij. myrrhæ drach. ij. Quidam etiam mandragoræ succi drac. iij. ut uero Xenocrates, etiam piperis albi drach. vi. cum aqua fac pastillos triobolares. Dato ex aqua. Alia sedans dolorem Lycomedis. Resiccatur defillationes arteriæ, & fluxiones oculorum. Seminibus hyofcyami drach. ij. feminis apij drach. ij. opij drach. ij. anisi drach. i. croci obol. iij. rosarum siccarum drach. ij. myrrhæ drach. i. alij drach. ij. Cum aqua redigito in pastillos triobolares. Vtere quemadmodum Trigono appellato. Alia sedans dolorem, resiccatoria. Facit & ad hæmoptoicos, cœliacos, dysentericos, rupta & conuulsa. Anisi drach. iij. feminis apij drach. iij. opij drach. iij. croci drach. i. feminis hyofcyami drachm. iij. styracis drach. i. iunci odorati drach. i. balaustij obol. iij. cum aqua formato pastillos diobolares. Dato ex uino, aut aqua, aut protropo. Alia dolorem sedans potio, Rusti, qua utor. Corticis mandragoræ drach. iij. thuris drach. v. piperis albi drach. ij. & dimidium. croci drach. v. feminis hyofcyami dr. iij. succi papaueris drach. v. myrrhæ dr. v. nardi ob. iij. calsiæ nigrae drach. ij. Trita cum passo in pastillos drachmales cogito, ac reponito ne humecti fiat. Dant ex aqua calidæ cyathis duobus, cho

lericis, hoc est, biliosa superne & inferne reddentibus, ex frigida. Alia sedans dolorē ad omnes internas affectiones, qua utor. Casia nigra, myrrha, opij, styracis, croci, singulorum dra. i. quidam dra. i. & obol. iij. Cogito in pastillos trium aut duorum obulorum. Præbe febricitibus ex aqua, non febricitantibus in uino. Hepaticis in aqua mulsa, itidem & pleuriticis. Efficax est & ad tulsim.

Alia Trigonos uocata, reficicatoria & sedans dolorem. Seminis hyoscyami drac. iij. anisi drach. ij. opij drach. ij. cum aqua pastillos formato. Dantur cum frigida, mane & uesperni, unus pro uice.

Alia sedans dolorem, Asclepiadae ad omnes internos affectus. Sefelis, chamæpityos, herba saluinae, seminis rutæ syluestris, seminis dauci, singulorum drac. vi. seminis hyoscyami, opij, utriusq; dra. viij. castorij drach. xxv. Rhei pontici drach. xiiij. Excipe melle. Alia ut Charicles. Tordisij dra. viij. chamæpityos drach. viij. Rhei pontici drach. vi. castorij drach. xij. & dimidiā herbæ saluinae 3. viij. seminis rutæ syluestris drach. viij. seminis dauci drach. viij. opij drach. iij. seminis hyoscyami drach. iij. croci drach. v. Quidam addunt mel Atticum, reliqua ipso expicentibus. Alia dolorem sedans, iucunda appellata. Facit & ad tabescentes, & inflatos. Iridis lilyrica drach. xxx. succini, croci, mastiches chæ singulorum drach. xxx. psyllij drach. xlv. aut xxx. succi papaueris drac. xv. cum aqua pluvia pastillos drach. i. & obol. iij. ponderantes formato, ac exhibeto. Psyllium per diem & noctem aqua pluuiā macerato, deinde coquitur & exprimito, atq; sic cum reliquis committito.

Alia potio sedans dolorem, ex libris Aphrodæ. Ad omnem dolorem, in neruis, utero, coxendicibus. Succi papaueris 3. i. opobalsami drach. i. aut carpobalsami drach. i. obolos ij. myrrhae, seminis hyoscyami, castorij, styracis, singulorum dra. i. Excipe passo, & fac pastillos oboli unius & dimidij, Dato ex aqua calidæ cyathis duobus aut tribus.

Aliud sedans dolorem Catapotium. Ex libris Aphrodæ, ad omnes internos affectus, et ad quartanarios, qui interuallū tempore inedia moruntur, & deinde accipiunt. Facit & ad calculosos, dysentericos, stomachicos, & iā desperatos atq; anxios. Est & oculis ualde cōmoda. Seminis hyoscyami, anisi, styracis, singulorum drach. iij. croci, opij utriusq; drach. iij. castorij drach. ij. fac catapotium Aegyptiæ fabæ magnitudine. Præbe ex aqua cyathis duobus. Aliud dolorē sedans, ad omnes internos affectus, & sanguinis reiectionē unde cuncta feratur, etiā si ex uulnere prodeat quibusdā prodest, facit & ad nephriticos & hepaticos. Hæc ne prius dederis q̄ mercedem acceperis. Cinnamonij, casiaē utriusq; drach. ij. myrrhae drach. i. pipēris albi 3. i. & longi dra. i. galbani drac. i. opij 3. ij. Trita cum melle pauco in catapotia redige, partim magnitudine fabæ, partim quātitate arci. Dato pro uiribus cum aqua, aut pro iudicio tuo.

Alia dolorem sedans ad omnia interna. Seminis apij drac. ij. anisi drach. ij. pipēris longi drach. ij. & nigri drach. i. castorij obol. iij. myrrhae, opij,

Galen.

utriusq; obol. iij. panacis, gentianæ utriusq; obol. iij. succi radicis dulcis obol. iij. fac pastillos triobolares. dysentericis drachmæ unius. Alia sedans dolorem, Crateri ad tabescentes, & sanguinem reicientes. Myrrhae drach. vi. mandragoræ drach. iij. seminis hyoscyami drach. iij. opij drac. v. croci, thuris, utriusq; drach. v. Rhei drac. v. seminis cicuta, styracis, utriusq; drach. v. Excipe uino mulso. Alia sedatiua doloris, Mysterium appellata, ut Niceratus. Ad phthysicos, tussietes, coeliacos, dysentericos, destillationes. confestim auxiliatur. Croci, costi, castorij, asari, seminis hyoscyami, opij, styracis, singulorum drac. i. quidam hyoscyami seminis drach. dimidiā. Excipe melle ac utere. Alia doloris sedatiua ad destillationē cōueniens. Seminis hyoscyami, succi papaueris, amyli, singulorum drac. ij. anisi drach. i. spicæ nardi drach. i. croci drach. i. rubricæ sinopice obol. iij. aut lemnia drac. i. formato pastillos xxx. Dato in noctem cum aqua.

Que ab Asclepiade scripta sunt ad easdem affectiones.

Eclegma. Farris Clusini appellati sextarj dimidium, decocti marrubij uiridis sexta. i. hæc in uas uitreum cōiecta per diem & noctē macerari finito. Sequenti die pharmacū mollito, quemadmodū alicā maceramus, atq; ubi penitus dissolutū fuerit, exprimito liquorem, eiq; pinguedinē aliquam addito, & igni admota assidue coquito, donec spissata mellis crassitudine acceperint. Ex hoc mystrū datur ante cibum, & post cibum tantundem. Aliud, Foliorū marrubij tenerrimorum manipulum cū sufficienti aqua in fistili coquito, & ubi exoluta fuerint eximito ac terito, & decocto diluta rursus coquito, pollinis acetabulū inspergens, & pinguedinis arietinæ probe subactæ quadrantē addēs. Et ubi coctura recte habuerit, ueluti reliquæ forbitiones preparatur, ablata ab igne, & modico sale conspersa, forbenda exhibe. Amplius absorptū amplius iuuat. Aliud Nicerati. Facit suppuratis, dyspnoicis, ueteri tussi, uiscosum ac glutinosum reiectantibus, & his quæ a partu purgantur, secūdas deducit. Prodest etiā in fantibus alimentū nō sentientibus, si nutritibus præbeatur. Succi marrubij sexta. vi. Verū probe hūc succū colligere oportet a recēti marrubio tuto expressum. Vini falerni sexta. i. mellis Attici tā tantundem. pipēris albi, myrrhae, thuris, singulorū 3. viij. Vinum & succum ad tertias coquito, deinde mel addito, quib. inspiissatis arida inspergito & diligenter mixta in uitreum uasculū transferto. Dato mystrū ante cibum. Aliud, Scribonij Largi. Succi marrubij sextarios vi. succi spongiarū tantundem. mellis Attici sextar. iij. alij sextar. i. Vini Italici sextar. i. picis liquidæ brutæ tā tantundem. nardi Indicæ, croci, myrrhae, thuris, pipēris albi, singulorum drach. viij. prepara ac utere ut prædictum est. Aliud phthysicis & ad fluxiones Thoracis.

Seminis cucumeris hortensis decorticati drac. viij. amyli drach. iij. seminis lini, seminis papaueris albi, utriusq; drach. ij. tusa & cribrata excipe tragacantha cremore, & in drachmalis pastillois

tom. 5

G

redige

redige, dantur obol. iij. non febrilentibus ex uino & myrti cremore, febrilentibus cum rhois succo. Aliud, Amyli drach. iij. feminis cucumeris fatiui tosti, feminis papaueris albi tosti, amygdalarū depurgatarū, singulorū drach. ij. tragacanthæ 3. i. obol. iij. croci drachm. i. excipe tragacanthæ cremore, & postea etiam uino scybelite cocto. utere eodem modo. Aliud Scribonij Largi catapotium, phthificis, sanguinem reiectantibus suppuratis, educit pelliculas, repurgat sufficienter. Verum immorari pharmaco oportet. Sagapeni, myrrhæ, utriusq; drach. ij. opij, cardamomi, utriusq; 3. iij. castorij 3. iij. piperis albi ob. iij. excipe passo, fac catapotia, da ex aquæ calidæ cyathis tribus.

Alia confectio Thespihana. Facit suppuratis, & ad abscessus oculos. Seminis apij, opij, melanthij, singulorum drach. iij. castorij drach. ij. feminis dauci, simonis, iridis, singulorum drach. vi. excipe melle cocto, præbe nucis ponticæ magnitudine ex calidæ cyath. iij. Alia Cofi. ad humores ægre eductiles, suppuratos, peripneumonicos. Maxime autem his qui crassa & glutinosa educunt utilis est. Mellis Attici cocti ad glutinis compagē libram i. piperis contusi & cribrati, myrrhæ, utriusq; unc. i. Myrrham & piper trita melle cocto excipe, & nucis ponticæ magnitudine deutoranda præbe. In alijs exemplaribus habetur. Mellis lib. i. piperis unc. i. myrrhæ, opopanax, utriusq; dra. vi. præpara ac exhibe similiter ut prædictum est.

Passillus ex mandragora, inscribitur Sphragis. Facit ad hæmopticos. Resiccatur omnem fluxionem. Radicis mandragoræ corticis drach. iij. feminis hyoscyami drach. iij. thuris masculi, succi papaueris, croci, myrrhæ, singulorum dra. v. Trita redige in passillos obolares, & præbe conuenienter iuxta affectiones. Aliud Ptolemæi familiaris. Styracis, opij, thuris, croci, singulorum 3. v. corticis mandragoræ, feminis hyoscyami albi, dauci cretici, singulorum drach. iij. calsiæ drach. ij. excipe uino Aminæo, ac præbe obulum cum aquæ calidæ cyathis duobus. Aliud, ad easdem affectiones. Styracis drach. vi. myrrhæ, opij, feminis hyoscyami, irionis torrefacti, singulorum dra. iij. corticis mandragoræ, opopanax, utriusq; 3. ij. piperis albi, spumæ nitri, utriusq; drach. unam. excipe melle cocto. Dato magnitudine ciceris.

Alia confectio Pancrestus ab omnimoda commoditate dicta. Facit ad tussim antiquam, suppuratos, orthopnoicos, tabescentes. Prodest hypochondriorum, hoc est, præcordiorum distentionibus & ad omnem inflationem. Mulieribus menses, & quæ à foetu corrupto, aut à partu relinquuntur secundas deducit. Liberat etiam ab affectionibus circa uesicam. Terebinthinæ drach. viij. styracis drach. vi. myrrhæ drach. v. croci, iridis, galbani, singulorum drach. iij. feminis hyoscyami, corticis mandragoræ, irionis torrefacti, opopanax, singulorum drach. ij. piperis, spumæ nitri, utriusque drachmam unam. excipe passo. Charixeni. Facit peripneumonics, ac ueteri tussi. Myrrhæ, corticis thuris. In alio exemplari opij, man-

dragoræ, sagapeni, feminis hyoscyami albi, opopanax, dictamni cretici, pilularū marubij, singulorum drachm. iij. Subigito cum aqua & in passillos cogito. Dato ex his obol. iij. ex aquæ mulsæ cyathis tribus. Alia Asclepiadæ qui Philophylicus, à naturalium rerum studio, appellatus est, pharmacum accomodatum. Corticis mædragoræ, feminis apij, utriusq; drach. iij. myrrhæ, croci, anisi, feminis dauci, succi rhois rubri, feminis hyoscyami, piperis albi, castorij, sagapeni, opopanax, singulorum drach. ij. excipe melle cocto. Dato pro uiribus. Liquor uero ex quo exhibetur sit conueniens affectioni. Antidotus Thespihana. phthificis, sanguinem reiectantibus, suppuratis. Facit & ad alias internas affectiones, & præ omnibus cibi appetentiam excitat. Seminis apij drach. xij. myrrhæ, anisi, opij, singulorum drach. vi. piperis albi drach. v. petroselinij, nardij, piperis longi, singulorum drach. iij. castorij, floris iuneci odorati, croci, singulorum drach. iij. cinamomi drach. ij. calsiæ aromaticæ dra. iij. excipe melle cocto. Dato nucis ponticæ magnitudine adnoctem, cum aquæ cyathis tribus. Antidotus Aristarchi. Compositio admiranda, hanc Paulinam appellamus. Facit hæmoptois, tussientibus, phthificis, suppuratis, peripneumonics, ad cõmula rupta, ad stomachi subuersionem, & bilem uomentes ac fecernentes, cœliacos, dysentericos. Facit ad affectiones circa uesicā, suffocationes ueteri, febres per circuitum repetentes, una hora ante exacerbationem exhibita: facit in malis habitum delapsis, cibum non sentientibus, & ad lethalia pharmaca, ac plagas uenenum facultatis bestiarum. Cinamomi, costi, galbani, castorij, succi papaueris, piperis nigri & longi, styracis, singulorum unc. i. mellis sextarium i. Arida tunduntur & cribrantur per angustissimū cribrum. Galbanū coquitur cum melle, & ubi dissolutum fuerit, mel excolatur, ipsiq; reliqua adduntur & tunduntur. Deinde in pyxidem uitreā aut argenteam reponuntur. Vnus est ad prædictas affectiones. Datur sabæ Aegyptiacæ magnitudine, cum aquæ mulsæ cyathis duobus, irroratis de digito guttis acetini nouē.

Alia Antonij Musæ Panacea. Vnus est ad Diatas latraliptes. Facit ad eos qui per circuitum à rigore infestant, delet febres antiquas, ac reliquos morbos. Facit ad tussim ueterem, phthificos, sanguinem reiectantes, suppuratos, dyspnoicos, conuulsa, rupta, inueteratas inflammationes, splenicos, hydropicos inueteratos, cœliacos. Extrahit lapides à renibus. Probe citur in urina. Prodest omnium reptilū plagæ, & ad lethalia uenena, & ad omnem materiā uenensam ac corruptoriam uim habentem. Piperis albi aut longi drach. viij. feminis hyoscyami albi, cardamomi, myrrhæ, thuris, singulorum 3. xij. opij, croci, utriusq; drach. x. sulphuris uiui drach. vi. costi, aristolochiæ longæ, corticis mædragoræ aut ipsorum malorum, euphorbij, singulorum drach. ij. Mellis Attici cocti quod satis est. Datur his qui per circuitū infestantur magnitudine nucis ponticæ, reliquis pro uiribus.

Alia Cereusana. Data est à Philippo Trallianis. Huius usi phthificis & suppuratis liberabat. Piperis albi. succi cyrenai, syriaci, succi papaueris, singulorum quadrantem. myrtiæ, croci, sulphuris uiui, seminis hyoscyami albi, singulorum unciam dimidiam. malorum mandragoræ drach. ij. cardamomi unci. mellis Attici lib. i. Datur pro uiribus ut dictum est. Porrò alterũ exemplar sic scriptum habebat. Piperis quadrantem. succi cyrenai unci. succi papaueris unci. dimidiam. succi Syriaci unci. dimidiam. seminis hyoscyami albi, malorum mandragoræ utriusq; drach. ij. cardamomi unciam unam. Mellis Attici lib. i. Datur pro uiribus, ut dictum est.

De Orthopnœa. Cap. VI

Qui circa febrem dense respirant, qualiter faciunt qui uelociter cucurrerunt, ab accessione hæc Medicis Græcis asthmatici, Latinis anhelosi appellantur. Eosdẽ etiam ab alia accessione orthopnoicos uocant, propterea quod thoracis corpus penitus reatum habere coguntur, ob timorẽ suffocationis. Quin & stratum circa supernas partes ad quas thorax reclinatur, sibi ipsi erectius faciunt, ne dormientes strangulentur. Minus est enim quod inspirat, quam pro usu respirationis, quam uis thorax plurimũ ipsi dilata tetur. Ex quo manifestum sit, intrinsecus ipsis coarctationẽ locorũ faciã esse præter naturam, quam etiam acri ipsi non obscuro sensu perceptant. Fit equidẽ & suppurationis locorũ coarctatio, ob coarctatũ inter thoracẽ & pulmonem humorẽ. Fit etiam peripneumonias, ob pulmonis inflammationem. Resert autem adhuc duæ affectiones, quæ locorũ coarctationem efficiunt in uis, per quas aer inspiratur. Quũ sanẽ aut humorum crassorũ ac uiscosorum multitudo pulmonis brõchijs fuerit infarcta, aut tumor abscessui similis in ipso consisteret. Ceterũ curatio ambarum affectionum aliquid cõmune habet, aliquid priuatum et alteri tantũ proprium. Cõmune quidem utriusq; est, ut redundantia humoris affectiones generantur expendatur & consumatur. Proprium autem affectioni uiscosorum ac crassorum humorum, ut per attenuantia & extergentia pharmaca consumant. ei uero quæ propter tumorem abscessui similem contingit, ut per attenuantia & resiccantia eadẽ consumptio fiat. quæ curatio rursus omnibus in profundo corporis abscessibus cõmunis existit. Vinũ itaq; potus ambabus conuenit tenuis substantia. Omnis aut potus modicus sit in his qui alibic abscessum habent. Multis cõtra, in his quibus bronchia uiscolis ac crassis humorib. sunt obturata. Etenim pharmaca quæ eiusmodi humores repurgant, necessaria quidem tussis mouent, nõ uero facile per spiritum reijcitur quod expurgatum est, ob crassitudinem uidelicet. Quapropter humectatione multa opus habent, quo facile efferatur. Porrò quemadmodum in alijs pharmacis plurimi medici, sic etiam in his quæ ad ambas has affectiones commoda sunt, delinquunt, indiscriminatim ipsa tradentes, quum tamen cõposita sint quædam pharmaca

Galen.

ca alteri affectioni commoda, quædam rursus alteri, quædam uero sic ut ad ambas quidem moderate conueniant, uerum nihil operæpretium efficiant. Quare recensendo pharmaca alicuius præstij à prioribus medicis prodita, indicabo iuxta singula quali facultate prædita sunt. Initio ab his quæ Asclepiade scriptis in secundo interiorum, factõ.

Asclepiade pharmaca ad dyspnoicos conscripta. 2

Eclegma ad dyspnoicos. Antonij Muse. Afello rum sub hydrijs nascetium sextarium i. in uas fictile conijctõ, & ad prunas torreto, in albatos autẽ terito, ac melle cocto excipito, & ante cibum mystrum delingendum dato. Aliud. Scillæ crudæ succum exprimitõ, eiq; parẽ mellis Attici mensuram addito, & ad prunas admota coquito. Dato inde ante & post cibum mystri mensuram. Aliud Charixentis. Origani drach. viij. comæ thymi, iridis Illyricæ, calaminthæ siccæ, piperis albi, anisi torrefacti, singulorum tantundem. tundito & per angustissimum cribrum concernito, ac melle cocto excipito. Dato nucis ponticæ magnitudinẽ. Aliud. Piperis albi lib. i. rutæ trientem. calaminthæ siccæ, anisi tosti, pulegij semẽ non gerantis, singulorum quadrantem. seminis apij, comæ thymi, utriusq; unciã i. excipe melle, & preparato utere ut prædictũ est. Potio ad dyspnoicos, Chariclis. pharmacũ accommodatum, auxiliatur con festum. Vnæ passæ Rhodiæ exacinate acetabulũ. foeni græci loti tantundẽ. aquæ pluuiæ sextariũ i. Coquito donec dissoluantur, & liquorem excolatũ reponito. Ex hoc præbeto alsidue & iuxta singulas irritationes, cyathi mensuram calefactam.

Alia potio. Abrotoni partes ij. vnæ passæ pinguis tantundem, summitatum rutæ partẽ i. aquæ pluuialis sextarios ij. Coquito ad tertias, & exprimito liquorem, eiq; mellis unci. addito, rursusq; coquito ac dato ut prædictum est. Catapotium dyspnoicis, asthmaticis. Abrotoni, uirgultorum rutæ, comæ absinthij, singulorum drach. iij. tusa & cribrata aceto subigito, & catapotia xij. formato. Dato ex aceto multo. Aliud Nicerati. Castorij, ammoniaci thymiamatis, abrotoni, singulorum sextantem. absinthij, cumini Aethiopicũ, utriusq; drach. i. a ceto subigito, ac catapotia formato, ac dato ad ciceris magnitudinem. Pharmaca ex sulphure uiuo dyspnoicis. Anisi, sulphuris uiui, utriusq; quadrantem. ammoniaci thymiamatis, castorij, melanthij singulorum drach. iij. Aqua diluta in catapotia cogito, unũq; in aceti nulli cyathis iij. dato. Aliud. Seminis rutæ syluestris 3. iij. aristolochiæ, abrotoni, absinthij, ammoniaci thymiamatis, sulphuris uiui, singulorum tantundem. Aceto subigito & catapotia cicerinæ magnitudinis formato, ex quibus duo cum aceti nulli calidi cyathis tribus exhibeto. Hæc omnia pharmaca ab Asclepiade conscripta, his qui proprie dyspnoici, hoc est, ægre spirantes appellantur, conueniunt. Vocant autem sic eos quibus bronchia pulmonis crasis & uiscolis humoribus sunt obfarcita, in quibus uelut dixi, ultra hoc quod crassitudinem & uiscolitatem humorum necessariõ se-

tom. 5

G 2

camus

camis atq; attenuamus, humiditatem quandam a
 uero pharmacia, tum uictui adesse oportet. At
 uerò abcessibus atq; attenuatibus & resiccantibus
 opus habent, maxime gaudent aromatum facultatibus, quas omnes ostendimus tenuium partium
 esse, & resiccatorias, unã cum hoc quod calfaciãt,
 quare his qui proprie orthopnoici & asthmatici
 appellantur, pharmaca conuenienter secantia citra
 calfactionem, & ob id maxime eos iuuat acetum
 scilliticum appellatum, atq; ipsa adeo scilla, & ace-
 tum mulsum ex eiusmodi aceto confectum. Cete-
 rum asellorum sub hydnis nascentium meminit
 inter ea, ut qui attenuatoriã & discussoriam uim
 habeant. Verum quo consilio ad usum ipsorum
 peruenierit, non habeo quod dicam. Quemadmo-
 dum autem in hac affectione uehemẽter cau-
 dendum est ne calfaciamus, propterea quod uiscosi
 & crassi humores non solum nihil ab his auxilijs
 sentiunt, sed etiam offenduntur. Eodem modo et-
 tiam quæ ualde refrigerant uitanda sunt. Omnia
 enim crasse faciunt, & cogunt, ac coagmentat hu-
 mores, eosq; ægre eluibiles reddunt: & ob hanc
 rem sanè recte fecerunt, qui eiusmodi pharmaca
 composuerunt, quod neq; papaueris succum, ne-
 que mandragoræ succum, aut radicis corticẽ, aut
 hyoscyami semen, aut cicuta, aut psyllij, aut semẽ
 lini ammiscuerunt. Et multo magis quod neq; ex
 adstringentibus quippiam pharmacia addiderit.
 Maxime enim contraria sunt eiusmodi affectio-
 nibus, ut palàm uidetis.

*Quæ pharmaca Andromachus ad huiusmodi
 affectiones conscripsit.*

Ad dyspnoeam. Sulphuris uiui drach. i. seminis
 rutæ syluestris drach. i. aristolochiæ, absinthij, am-
 moniaci thymiamatis, abrotoni, singulorum dra-
 ch. iij. Trita cum aceto ad catapotia magnitudine fa-
 bæ redige. Dato mane tria & uesperitotidem.
 Aliud ad dyspnoeam, ut Alcimius. Colocynti-
 dis earnis obolos iij. panacis obo. iij. anisi obolum
 i. fac cum aqua catapotia iij. & resiccatorum ob-
 i. præbeto. Præcedente autem die æger simplici
 euacuatorio euacuetur. Aliud, Colocynti-
 dis sesquidrachmam, iridis Illyricæ drach. ij. radi-
 cis opopanax drach. ij. abrotoni drach. i. nitri 3.
 i. alij ob. iij. excipe aqua & redige ad fabæ magni-
 tudinem. Dantur catapotia iij. & post semihoræ
 spatium, datur aquæ mulsæ hemina dimidia. Ali-

ud, Sinapis drach. i. salis communis obol. iij. cha-
 reri obol. iij. alij obol. i. & dimidium. Terito cum
 aqua, fac pastillos viij. Dato alternis diebus cum
 hydromelite. Aliud, Ammoniaci thymiamatis
 drach. i. abrotoni drach. ij. sulphuris uiui dra-
 i. formato cum aqua pastillos, & cum aquæ mulsæ
 cyathis tribus præbeto. Aliud ad orthopnoicos,
 Elaterij obol. dimidium, asellos ex sterquidinis
 iij. terito simul, & dimidium ex aquæ cyatho uno
 dato. Aliud ut Philinus ad anhelos & dyspnoæ.

Cardamomi drach. iij. iridis sesquidrach. panacis
 sesquidrach. calsiæ sesquidrach. struthij sesqui-
 drach. styracis drach. ij. thymi drach. viij. seminis
 rutæ syluestris drach. viij. abrotoni drach. viij. ari-
 stolochiæ clematidis, sulphuris uiui, ammoniaci
 thymiamatis singulorum drach. viij. cum aceto
 cetero adcerati crassitudinẽ redige, prebe fabæ Aeg-
 yptiæ magnitudine ex aquæ cyathis iij. Ador-
 thopnoæ, ut Apollonius. Scyllæ partem unã,
 sulphuris uiui, bituminis, singulorum partem u-
 nam. Dantur oboli tres in aceto mulso. Ador-
 thopnoeam, Socratis. Opopanax drach. i. myr-
 rhæ drach. i. piperis grana xl. rutæ fasciculum quã-
 tus duobus digitis apprehendi potest, ex tritis ca-
 tapotia xx. formato. dato mane itemq; uesperiu-
 num, febricitantibus in aquæ cyathis duobus, a-
 lijs ex uino. Ad orthopnoeam, Andronici. sul-
 phuris uiui obol. iij. ammoniaci thymiamatis dra-
 i. anisi, myrhæ, castorij, singulorum drach. i. cumi
 ni Aethiopici drach. i. cum aqua pastillos cogito,
 scrupulorum triũ aut quatuor. Dato ad noctem
 ex aquæ cyathis duob. Ad orthopnoicos, tussis
 entes, peripneumonicos, tabescentes, egre spiran-
 tes, hepaticos, Vt Eugenius. Croci, drach. viij.
 misios drach. iij. baccharum lauri drach. ij. piperis
 albi & longi utriusq; drach. i. opij dra. iij. costi ob.
 iij. terebinthinæ obol. v. galbani obol. iij. succi ra-
 dicis dulcis obol. iij. gummi ob. i. mellis lib. dimidi-
 am. Dato cochlearium i. cum aquæ cyathis duob.
 aut tribus. Si res urgeat ante & post cibum. Ad
 orthopnoicos, Valentis. Opopanax drach. ij.
 carnis colocyntidis drach. i. Tantũ datur ad sum-
 mum. Aliud Onetri. Castorij drach. i. ammo-
 niaci thymiamatis drach. ij. Detur dimidium ex
 aqua mulsæ. Ad dyspnoæ, Podanithæ. Sinapis
 3. i. salis 3. i. nitri ob. iij. Redigito in carapotia viij.
 Dato ex his duo ad noctem alternis diebus.

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI OCTAUI

Cap. I. De pharmacia stomacho congruis. II. Cõ-
 sectiones stomachicæ Andromachi. 2. Hiera ex aloe
 preparatio & usus. 3. Aliter secũdum Andromachũ.
 4. Aliud Andromachi pharmacum. III. Subuer-
 siones stomachi quæ dicantur, qui stomachici, quæ su-
 pinitas stomachi: & curandi methodus. 2. Alclepi-
 adis ad stomachi subuersiones, ar dorem, singultum, sto-
 machi debilitatem, & cibi reiectionem, remedia ii. quo-
 rum duo postrema stomacho & humanæ naturæ aduer-
 sariãt, quod atramentum futorium & mandragoram
 capiant. 2. Aliud Alclepiadis ad uoluitulosas, id est uio-

lentas stomachi subuersiones, præmittit autẽ Galenus
 quædam tum de huius pharmacia, tum aliorum compo-
 sitione in genere. Vfus odoratorum. 4. Aliud Alcle-
 piadis remedium ad eadem, & intẽtos singultus, & sto-
 machicos qui ardorem percipiunt: Præmittit autẽ Ga-
 lenus suum super eo iudiciũ & distinctiones affectuum
 istorum secundum causas & curationes: & singula huius
 remedij simplicia examinat. De singultu uide etiam
 ca. 4. sect. 3. 5. Hiera Themisonis, ex Alclepiade. 6. A-
 lia Attalica, ex eodẽ. Asteres ij. opiatid ad uarios affectus
 utiles. III. Archigenes de affectionib. circa stomachũ.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

PHARMACORVM SECVNDVM LOCOS LIBER VIII

De pharmacis stomacho congruis. Cap. I



VOD semper dico, etiam nūc
 proloquar; Nimirum per sua
 sum me habere, quod diffici-
 limum sit ad ueritatem reuo-
 care eos qui se se alicuius fer-
 uituti se addixerūt. Verū qui
 prudentes sunt, simulq; ueri-
 tatem sincere amāt, eos spero
 custodituros esse ea quæ ueluti iudicandi instru-
 menta nobis à natura data sunt, ad actionem uitæ
 cognitionem, Experientiam dico, & rationem,
 quæ quidem utraq; ex æquo quibusdā conferunt
 ad artem, quibusdā uero alterum altero ampli-
 us; & tamen tanquam semper ad perfectionem al-
 terum altero opus habeat, Sic sanè ad residuū ser-
 monis & doctrinæ huius absoluedum ingredi
 ar. Falsæ etenim opiniones animas hominū præ-
 occupantes, non solum surdōs, sed & cæcos faci-
 unt, ita ut uidere nequeant quæ alijs cōspicue ap-
 parēt. Quod ipsū uel maxime circa affectiones
 oris uentris uidere contingit, præsertim quū fue-
 rit inflammatum. Eius enim itemq; iocineris inflā-
 mationes, adstringentium cōplexu opus habent.
 Si namq; pro laxatorum medicationis ductū, ci-
 tra ammixturem facultatis robur addentis, curē-
 tur, periculum incurrunt de ipsa uita. atq; hoc ip-
 sum quum omnes Empirici medici per experien-
 tiam edocti sint, & omnes dogmatici in artis ope-
 ribus obseruent, Non pauci tamen huius tempo-
 ris Medicinæ neq; enim de omnibus dico, innum-
 meros quidem stomachicos ipsi in animi deliqui-
 unt inducunt, omnes uero hepaticos occidēt ul-
 lum enim ego uidi seruatum ex his qui in eiusmo-
 di medicum inciderunt. Quidam tamen ex ipsis
 quanquam pauci, oleo eos fouent in quo absin-
 thiij coma est seruata, & sanam nardino ungen-
 to imbutam obligant. Quidam uero etiam masti-
 chen chiam, aut aloen ammiscunt. aut etiam pro
 nardino melinum adhibent. In diuitibus uero mu-
 lierculis foliatum & spicatum ab eisdem appella-
 ta ungenta admovent, atq; quin hæc faciunt, laxa-
 torium ductum se seruare putant, Tantum scilicet
 habent experimēti facultatis pharmacorum.
 Malim autem ego omnes sic indoctos esse, quam
 quod adstringentia quæ sint sciant, usum tamē ip-
 sorum uident. Quæcunq; igitur adstringētia in fo-
 mentis & cataplasmata miscantur, in hepatis aut
 oris uentris, quod sanè & stomachum uocat, affe-
 ctionibus, non est præsentis sermonis explicare.
 Quæcunq; uero in emplastra & ceratiformia me-
 dicamenta, quæ foris in se imponuntur, comino
 da sunt, & quæcunq; utiliter deuantur, hæc ip-
 sa indico, ea quæ inflammatis profunt primum
 tradendo quando quidem etiam in ipsis ægri ma-
 xime periclitantur. Ceratum igitur quo asidue
 utor, ex aloë, & mastiche, & cera pontica amara,
 atq; ungento nardini constat. Componitur autē

Galeni,

hyeme, ad viij. drachmas ceræ, uncia una mēsurā-
 li Romana ungenti nardini coniecta. Aestate au-
 tem ad viij. eadē ungenti proportione. Optimum
 autem ungentum esse oportet, quale antea quidē
 in sola Laodicea Asiæ præparabatur. Nunc uero
 etiam in alijs multis Asiatis urbibus cōponitur.
 Cera si non pontica amara tibi in promptu sit, ali-
 am ponticam conijce, & neq; illa præsentē, eam
 quæ Tyrrenica appellatur. Si uero neq; hæc ad-
 sit, aliam aliquā odoratā & pingūē, si neq; talem
 habeas, eam quam habere potes lotam addē. Li-
 quefiat autē in duplici uase, atq; ita refrigeratum
 & erasum ceratum, cum tritis reliquis probe per-
 misce, cum aloë uidelicet & mastiche. Sit autē u-
 triusq; drach. i. & quandoq; plus, non tamē ut sel-
 quidrachmam trāsgrediaris. Quod si ampliori o-
 pus sit adstringēte, nimirum debilitate tanta exi-
 stente, ut cibum retinere nō possint, omphacium
 pari pondere addatur, ut trium singulorum dra-
 chma sit una, aloes una, mastiches una, & tertia
 omphacij. Cæterum in cerati præparatione pri-
 mum omphacium misceatur, deinde etiā alia his
 uniātur. At uero quemadmodū omphacium, sic eti-
 am absinthij succum ammiscuo, quandoq; etiam
 ambo, & tertium insuper hypocythidis, & quartum
 cœnanthes. Sic autem appello uitium sylue-
 strium germen unā cum floribus, ex quo succedē-
 tibus diebus uua fit. Quin & Rhōis succū non ra-
 ro ammiscui. Sed & cerati nardini copiam auge-
 re oportet, iuxta proportionem numeris reliquo-
 rum pharmacorum, ita ut si quatuor drachmæ a-
 liarū rerū accumuluntur, triens sit nardini cerati,
 sextans quidem ceræ, sextans item nardini ungenti,
 hoc est utriusq; drachmæ xvi. Porro si inueterata
 fuerit inflammatio & iam obdurata, magis uari-
 a pharmaca adhibere oportet, & quæ ex aroma-
 ticis quippia habeant, ac mollientibus, & discul-
 forijs. Quale est quod fit ex mesiloto. Est autē com-
 positio ipsius multiformis, propterea quod omni-
 bus iuxta præcordia inflammatis conuenit, non
 magnis ad eō differentijs euarians. Ita ut aliqua ip-
 sius præparatio inflammato hepatis sit cōmodior,
 alia stomacho, aut aluo, aut spleni, aut quibusdam
 istius loci musculis, quæ omnes cōmuni descri-
 ptione comprehensæ sunt in malagmatum com-
 positionibus. Verū in præsentī loco ea quæ prio-
 ribus medicis ad omnes stomachi affectiones scri-
 pta sunt, & non solum foris in se imposita, sed eti-
 am in potu accepta auxiliantur; omnia cōscribē-
 tur. Quædam uero ex ipsis cōmuniā sunt etiā affe-
 ctionibus uentris. Sæpenumero iam dictū est,
 quod medici in more habent os uentris, ueluti car-
 dian, hoc est, cor: sic etiam stomachum appellare.
 Verum quondam frequentior cardiæ appellatio
 erat. Nunc autem ab ea adhuc restant, cardiōsin,
 & cardialgia, quibus uocibus non cordis, sed oris
 uentris dolores significantur. Particulam autē
 ipsam stomachum uocant æquiuoce cum illa par-

tom. 5

G 3

tūcula

tícula quæ cibum ex ore in ipsam defert. Scripserunt igitur priores medici pharmaca ad affectiones in ipso, cum alias, tū subuersiones ab ipsis appellatas. Videntur autem sic uocare tum appetitus perditionem, tum nauosofas dispositiones, in quibus aliquando quidem uomitus contingunt. Fiunt autem & morsus quidam in ipso, quemadmodum etiam magnæ famis & anxiosæ affectiones. In quibus omnibus communis quidam adstringentium pharmacorū usus inuentus est. Amixta autem sunt plerisque ipsorum calfacientia & resiccantia. Fiunt & alia affectiones rariores, humectantibus, aut refrigerantibus aut utrisque simul opus habentes. Ceterum qui ab experientia citra rationalem methodum, auxilia inueniunt, merito ea quæ sæpe inuenerunt in memoria reuocant, & in usum conuertunt. Eorum enim quæ sæpe eodem modo facere uisa sunt, obseruationē & memoriam, suam ipsorum experientiam esse aiunt. Quemadmodum autem in ore uentris, sic etiam circa ipsum totum, singulaque intestina, & ut comprehensim dicam, circa omnem corporis partem, eadem intemperaturæ obortæ, actiones simularium partium offendunt, quas si quis non esse morbos ipsarum credit, nihil circa cognitionē efficiet, quæ ignorata neque curationem inueniet.

Habent autem non modicam coniecturam cognitiones ipsæ affectuum in profundo corporis consistentiū, & ob id utilissimam medicæ artis pars est quæ cognitionem doct eiusmodi affectionū, quas neque quod primæ & maximæ sunt, plerique ex uulgo medici sciunt. Quare merito neque cognitionem ipsarum, neque curationem inuestigarunt. Coguntur igitur etiā si dogmatici sint in rationali bus methodis, ad solam experientiam peruenire: ut iuste miremur quod quum absque febre & inflammatione, abscessuque et ulceratione, quispiam debilitate concoquat, aut penitus non concoquat, promissione facta se inuenturos curationem, quærāt an contritione ciborum concoctio fiat: et deinde ubi hoc ut maximū inuenerint, edulia quæ facile conterantur exhibent, neque quod promptissimū est intelligentes, quod etiam quispiam rei medicæ rudis, alias autem prudēs uir me interrogauit, Quomodo prodest scire per contritionē ciborum fieri concoctionem, ad hoc ut quis affectionem uentris sanet, in qua debilitatur ad concoctionē ciborum, quū non per exhibitionē alimentorum quæ facile conterantur curatio fiat, sed læsio rātum euitetur, uelut etiam per paucum alimentū ac in ediam. Quemadmodū enim qui in ediam perfert, in concoctionis quidem debilitatē non incurrit, non tamen ab affectione hoc modo curatur: Sic neque qui in cibo accipit ea quæ in totum nulla contritione opus habent, Quale est lac, prisanæ fucus, & sorbitiones ex alica. Hæc quidem igitur in libris de curandis methodo sufficienter tradita sunt, & non obscurum est præsentē doctrinā utilē esse his qui se in illis præexercuerunt. Quæadmodum autem in alijs quæ prius tradidī, reuocatis in memoriā singulis de illis mihi præmonstratis capiti-

bus, ad pharmacorū compositionem progressus sum, sic etiam nunc faciā. Qui octo sint in singulis partibus corporis intemperaturæ, atque hæc omnes aut circa solas nudas qualitates, aut cū alius cuius humoris complexu fiant, Intemperiem quidē sicca humectare oportet, Humidam autē siccare: sic & calidam refrigerare, frigidam calfacere. Similiter uero etiam cōpositas intemperaturas, aut calfacere & siccare, aut humectare & calfacere, aut refrigerare & humectare, aut siccare & refrigerare oportet. Quando uero ueluti dixi, plurimæ intemperaturæ hominibus ex redundantia humorū, magis quàm ex inopia fiunt, pharmacaresiccantia plerisque magis iuant. At uero quum resiccantia partim quidem adstringant, cogēdo ac adstringendo substantiam eorū quæ contingunt, partim uero discutiant & in hoc substantiam ipsorum dissoluāt, ob hoc ipsum sanē plures sunt qui adstringentibus indigent. Verū si humida intemperies cum frigiditate fiat, læduntur qui per solā adstringentia curantur quæ frigidā facultatis existunt. Quapropter merito plurima pharmaca per experientiam inuenta, ex mixta materia cōponuntur, adstringente uidelicet & calfaciente. Verum ipsorū differentiam cognosces, si simplicium pharmacorū facultatem memoria tenueris. Dicitū enim mihi iam sæpe est, Neminem posse rationabiliter & secundū methodum uti his quæ in hoc opere conscripta sunt, si nō memoria teneat quæ in duobus operibus, ante hoc opus editis prodita sunt, de simpliciū pharmacorum facultate, & curandi methodo dico, Quidam enim absque discrimine pharmaca ad eiusmodi affectiones stomachi & uentris conscripserunt. Quidā uero aliqua discrimina attingerunt ab accessionsibus omnibus apparentibus. Quo igitur uos cognoscere sciatis facultates unicuiusque pharmaci per experientiam approbatū, etiam si non inueneritis differentias affectionum in quibus conueniunt adscriptas, primū quidem ea quæ Andromachus prodidit adscribam. Deinde quæ Asclepiades, & post hæc si ita uidebitur etiam alia quædam.

Confectiones Stomachicæ Andromachi. Cap. II

Andromachus postquam præscripsit, Stomachicæ, post hanc præscriptionem, sic auspiciatur. Ad Stomachicos hiera qua utor, & deinceps totam eius compositionem adscribit in hunc modum. Floris iunci odorati, xylobalsami, mastiches, croci, nardi Indicæ, afari, cinamomi, singulorum drachmæ vi. aloes lotæ drachmæ c. simul trita repone, præbe ieiunis cochlearia duo, alij uerū præbent cum aqua frigida cyathis iij. Hæc quidem Andromachus scripsit, neque quos stomachicos nomet ostendens ac declarans, neque an omnibus ipsis hoc pharmacum conueniat, an pluribus. Itaque mihi necessarium est dicere, quum ex his qui stomachici dicuntur aliqui quidem statim magnopere ex prædicta hiera usum uentur, aliqui uero lædantur. Plerique quidem uulgo homines eos qui appetentiam perdidērūt ita uocant, & quibus post acceptū cibum uentris os

grauatur, & quandam ægre tolerabilem anxietatem habet. Appellat eodem modo etiã illos quibus nauſea contingit, & maxime ſi ad uomitũ impellat, & adhuc magis ſi ſimul cibi corrũpanẽ, quandoq; acidi, quãdoq; nidoroſi facti, quandoq; etiã aliã uitiatã qualitã adepti. Et præ his omnib. ad huc magis illos ſtomachicos nominant, quibus etiuſmodi, cũ moleſtia quãdã, & anxietate ac ſubuerſione contingunt, ſæpe cũ nondũ cibũ acceperunt. Quin etiã ſi per plurimũ tempus cibi in ore uentris morentur, grauantes, & uix deſcendentes, hos itidem ſtomachicos appellat. Alios item appetitũ caninũ appellatũ habẽtes, ut & plurima edant, & maxime grauati paulo poſt reuomãt, ſimiliter uocant. Alios ruruſus qui fortiter exoluntur, ubi diuiniſ in mediã pertulerint, & ſi non citius cibũ accipiant, in ore uentris morſus percipiunt, eodẽ modo ſtomachicos uocant. Horũ ipſorũ uero aliqui facile nauſeoſi ſũt, ſi citius potũ ac cibũ acceptẽt. Itaq; qui ſecundũ rationale methodum auxilia inueſtigat, ad affectionis inqueſitionẽ proceedit, qua inuenta, abundaturũ ſe ſperat proprijs ipſi auxilijs. qui uerò per ſolã experientiã auxilia accumulãt, ipſe ſuam fortuitam occaſionẽ expectat, & a prioribus tradita relegit. Cum uerò plurima ab ipſis indiſcriminatim p̄dita ſint, & in pluriſq; etiã inter ſe differant ac diſſentiant, merito etiã ipſe alias aliud ſentit, maxime ubi ab ipſis auxilijs aliquando quidẽ iurari ſtomachicos uidet, aliquando uerò lædẽ: quemadmodum in propoſita hiera contingere ſolet. Quam equidem omnes qui nunc Romę medicant, picrã, hoc eſt amaram nominant, quando quidẽ hierã appellatio, pharmaco ex colocythide rite ab ipſis indita eſſe uidet. Verũ qui ante nos Romã medicinã exercuerunt, ambo ea pharmaca hieras appellarunt, & diſtinctionis gratia alteri ex colocythide, alteri ex aloẽ, appoſitione addiderunt: ſic ſcribentes. Hierã ex aloẽ colocythide. Hierã ex aloẽ.

2 Hierã itaque ex aloẽ dupliciter præparatur, ab aliquibus, uelut Andromachus deſcribit, ad centum aloes drachmas, ſingulorum aliorum drachmis ſex admixtis, ab aliquibus uerò nõ ſex, ſed octo. Quidam uerò in lxxx. aloes drachmas, ſex aliorũ addunt. Plurimi autẽ ad pharmaca quæ aloẽ miſcent, & ſex numero ſunt, etiã florẽ iunci odorati apponũt. At uerò ipſam aloẽ Andromachus quidem lotam, aliſj uerò ex alijs etiã ſic, ali qui uerò illotam adſcribunt. Verũ noſſe opere preſertim eſt, ad uentris ſubductionem illotam aloẽ aptiore eſſe. Multum uerò de medicamentaria ui deponere lotam, quam etiã febricitantibus dare aliquis ardeat, ſi non uehemens, ſed ualde debilis ſit febris. Quidam uerò etiã ex illotã aloẽ pharmacũ multis ſic febricitantibus exhibuerũt, dein deũ quum nihil manifeſte læſiſſent, in alijs ruruſus magnã experti ſunt cladem. Infeſtiſſima eſt enim aloẽ, etiã lotã, his qui citra uitiatos humores ex intemperie calida & ſicca affliguntur. Proximam ab his cladem percipiunt, qui ſiccã intemperiem habent frigidityate implicatã. Et in uniuerſum,

A qui ex ſola qualitate particulã aliquam affectã ac læſã habent. Etenim in humoribus intemperatura, pharmacis ipſas euacuantibus egent, quæ uerò abſque his conſiſtunt, penitus in tabem deueniunt ex pharmaci huius ex aloẽ conſtantis uſu. Itaque ubi humiditas uitiatã tunicas uentris perrigat, Hierã ex aloẽ utilis eſt, expurgans humiditatem. Omnino autem ſic affectis acceſſio nauſeæ plus aut minus adest. Euacuatio igitur affligentis humoris nõ ſolam aloẽ contingit, quẽ purgatoriã uim nõ fortem habet, ſed ut ea quæ circa aluum ſunt, quæ etiã contingit, purgare poſſit. Et ſi aliquandò ampliori pondere exhibeatur, uſque ad locos circa hepar conſcendit. Non tamen totius corporis purgatoriã aloẽ exiſtit. Cæterum ex his quẽ ei admixcentur, maſtiche ut ſtomacho commoda & odora, & quæ medicamentariã aloẽ uim frangere queat, admixcet. Cinamomum uerò eadem gratiã, & præterea quod tenuiſſimarũ partium eſt, ut aperire uentris meatus poſſit, extergereq; ac attenuare ſi quid uicoſum aut craſſum in humoribus feratur. Craſſos enim humores ob purgatoriã facultatẽ imbecillitatem, aloẽ trahere non poteſt. Quapropter bilioſarum uentris affectionum optimum pharmacum eſt, ad eò ut in uno die ſæpe multos ſtomachicos creditos perſanet. Iuuat autem & hos & alios omnes affectus ex uitiatis humoribus ortos cinamomum admixtum, utpote quod alterant habet facultatem uitioſarum qualitatum in id quod ſecundum naturam habet. Quare ſcire oportet affectiones in humoribus uitiatas circa uentrem & ſtomachũ, maxime per medicamenta ex aloẽ iuari, in maximum uerò detrimentũ peruenire ex adſtringentium eduliorũ, potuum, ac pharmacorum uſu. Quemadmodũ uice uerſã, in quibus humiditas multa, et uelut mador quiſpiã eſt circa affectã partem, citra uitiatos humores, qui ipſe ſola quietate & copia affligat, & uelut irriguũ uentris os reddat, utiliſſimus adſtringentiũ eduliorũ, potuũ, ac pharmacorũ uſus exiſtit, languida nimĩũ & exoluta tũc reddita affectã particulã ad modum laxatorũ articuloꝝ. In quibus ipſis etiã adſtringentiũ uſus corrigit affectionẽ. Cæterũ picrã conſectio (de hac enim nobis ſermo eſt) uelut cinamomũ, ſic etiã aliã partim ut ſtomacho cõmoda, partim ut tenuiũ partium & extergentia aſſumit, quæ robore quidẽ multũ à cinamomo deſciunt, idem uerò facultatis genus habent.

3 Secundã à præſcripta cõpoſitione Andromachus ſic ad uerbum reddidit, ut Lampon Peluſiota. Cinamomi, calami aromatici, calix nigre, xylobalſami, floris iunci odorati, palme elates, ſingul. quadrantẽ, aliſj uiciã unã. omnia in craſſas partes tuſa in ollã nouã cõiſce, & aquã pluuiã ſextarijs tribus infulis, donec dimidiã ſuperſit coque, & excola, & accepta aloẽ indicã libra una, aquã pluuiã ſufficientem ſuperfundito, & ſub caniculã aſtus donec reſiceatur terito, atq; ubi primũ per hanc aquã aloẽ ipſã edulcaris, poſtea eam quæ ab aromatis excolata eſt, aquam aſſundito,

& in sole donec resiccetur terito, indeq; trita hæc quæ sequuntur admisceto. Croci, myrrhæ, mastiches, singulorum quadrantem, alij unciam unā. Conterito simul omnia, & sicca reponito, atq; in potionibus ad cōuulsa, rupta, plagas internarum partium, incipientes laterū dolores uitior. Item ad inflatos, dolentes stomachum, tarde concoquentes, reiectantes sanguinem, & ischiadicos. Datur ad summū obolus unus, aut duo, ex aquæ cyatho uno. Reliquis pro uiribus præbeto. In uulneribus & inflamationibus dilutū aceto mulso imponit. In oculorum inflammationibus succo mentę, aut calamithæ, aut solani, aut alicuius consimilis. In podicis inflammationibus cum rosaceo, aut uino Aminæo. Vtere etiam in unguum abscessibus, paronychias Græci uocant, sicco, superne linamēto cum rosaceo imposito. Et ad sanguinis eruptiones siccum cum aceto, & ad crustas in ore ex passo, gargarisandum dato. Hoc pharmacum quod Pelusioræ Lamponis esse ait, ad multas affectiones cōmodum est, polychresta ob id taliā græci appellant, de quibus etiā ante aliquid dictū est, quod uidelicet deficient ab his quæ unū quoddā optime faciunt, ob multitudinem eorū quæ promittunt. Apparantur autem quum unum habere uiginti affectionibus cōgruum malum, quātor numero alia, quum tamen ad singulas affectiones unum aliquod destinatum, eo quod ad plures paratum est, melius existat. Facultas autem ipsius per quā in prædictis efficax est, tenuium partium existit & calfactoria, secans, extergēs & aperiens, & ob id discussoria redundantū in quibusdam partibus seroforum succorū ac humorum. et propterea etiā prædictis in sermone affectibus cōuenit, discutiens ut dixi, uitiosos & serofos succos ac humores affectarū partium. Quare etiā prædictas alui affectiones, in quibus picra confectio moderatā purgationē operat, curauerit per modicam resiccationem, non per coaceruatam euacuationē. Præstantior igitur est ad huiusmodi affectus picra compositio prima descripta.

4. Tertium post prædicta pharmacū Andromachus sic descripsit. Ad stomachicos & cœliacos pastillos amarus, mollit alui. Facit ad somnū. Est aut ex libris Aphrodæ. Facit & ad uescicā, & colicū affectus. Seminis apij drach. vi. anisi drach. vi. piperis albi sesquidrachmā, castorij drac. ij. myrrhæ sesquidrachmam, nardi celticæ floris sesquidrachmā, opij sesquidrach. cinamomi sesquidrach. comę absinthij 3. iij. aloes ob. iij. mastiches drach. i. cum aqua pastillos formato triobolares aut drachmales & dato cum aquæ cyath. iij. Neq; in hoc pharmaco adscripsit Andromachus, quos nam stomachicos dicat, & quid patiant. Verum ex eo quod compositioni additū est opium, manifestū fit cōpositorē huius pharmacī intentionē suā eō direxisse, ut resicatoriū simul & doloris sedatoriū pharmacū efficeret, somnūq; aliquē induceret, nō tamen cōtentiose cōtra unā aliquā ex prædictis affectionibus instando, quā uidelicet breuī ipsam excinderet. Quartū deinde pharmacum Androma-

chus scripsit, neq; ad unam aliquā affectionē contentiose cōpositum, neq; ad multas moderate, habet descriptio hoc modo. Ad stomachicos hiera Antipatri. Aloes bonæ drach. iij. mastiches drach. ij. asari drach. iij. rosarū siccarū, iunci odorati, mei, phi, calisæ, singulorum semunciam. utere arido trito, quemadmodū alijs. Quintū post hæc pharmacū, quod ex plantaginis succo præparatur, & ipsum Apollonij esse ait, tale est. Succū plantaginis aridi drach. iij. mastiches drac. ij. myrrhæ drach. i. mentæ 3. i. zingiberis drach. unam.

Videtur mihi Apollonij hanc compositionē experimento cognouisse, in stomacho calidiore affectionem habēte, atq; ita ipsam in discriminatim extulisse nō potentem frigidis affectionibus cōuenire. Refrigeratorius em̄ est plantaginis succus. Porro quæ sequit, uidetur mihi cōposita esse ab eodē autore, in prioris usu successum nō sentiente, & recognoscēte pharmacū refrigeratiuū se effecisse, & ob id castorij modicū, & aloes quippiam apponente quæ euacuare potest, & mastichen ut stomacho cōmodā, ac crocū & myrrham, ut quæ concoquere queant. Quapropter neq; hoc, neq; præcedens pharmacū adhiberim in stomachica affectionē, cū nullā probe curare possint, præterq; satis multū calidā. Scripsit de ea hoc modo. Succū plantaginis sicci 3. x. aloes indice 3. i. mastiches 3. i. croci ob. ij. opij ob. iij. castorij ob. iij. myrrhæ 3. i. formato ad magnitudinem ciceris. Similiter autem neque consequenter scriptum citra discrimen, recte quis adhibuerit in alia affectionē quā quæ moderata siccatione & adfrictione opus habeat, in humoribus. quidem modicis, qualitate uerō uitatis. Componitur enim ex succino & mastiche, sic ipso Andromacho prodente. Succini, mastiches Chia. Succini plus conijce. Dato cochlearium unum ex aqua tritum. Ceterum quod sequitur pharmacum, hac descriptione, Stomachica Galli, affectioni quæ calfieri & secari postulat, utilis existit, ex foeniculo, aceto, & melle constans, quod ipsum Andromachus his uerbis tradidit. Stomachica Galli. Corticis radice foeniculi, libræ dimidium, aceti acris sextarium unum, eiusq; dimidium, aloes quadrantem, mellis autē lib. unā. Radices lotas ad triduum aceto macerato, deinde coquito, atq; ubi coctæ fuerint expressas projicito, & affuso ad acetū melle simul coquito, deinde aloē inspergito, & cochlearia tria cum aqua dato. Alcetius sophista ad hanc descriptionem addit rutæ, & apij, semina gerentis, utriusq; manipulum, iubens cum radicibus macerari ac coqui. Verum aceti sextarios sex, & mellis libras duas conijcit, atq; hanc laudat. Post præscripta pharmacā, Andromachus sic ait. Stomachica, ut Nicostrotus, Succini, mastiches Chia pura, iris illyricæ, singulorum trientem, floris rosarum sextantē. dato aridi triti cochlearia ij. cum aqua lactosa. statim em̄ dolorē leuat. Reponatur in corneo uase. Et hoc pharmacum palam est adstrigentius quoddam esse, opatq; affectionē humidiorem in humoribus non multis, neq; ualde

mordacibus. In quibus sanè experimentum phar-
mãci fecisse eius autorem opinor, aut certe assiduo eius usum ægrum à dolore leuasse, atque inde
vniuersalem pronũciationẽ ipsi apposuisse, quod uidelicet statim ægrum dolore leuet, quum non possit id in multis præstare. Postremum deinceps pharmacum ab Andromacho scriptum hoc modo est. Ad stomachicos. Corticis radicis fœniculi drach. duas, uini cyath. tres, coquito ad tertias, ut unus cyathus super sit, ac totum præbetur. Et hoc ex calcantiibus est, opusq; habet affectione quæ cal fieri exoptat.

Stomachica pharmacã ab Asclepiade in primo internorum conscripta.

Cap. III

Asclepiades porrò de stomachicis scripturas, de ipsis sic ordit. Ad stomachi subuersiões. Quas uerò subuersiões dicat non manifeste indicauit. Potest enim & appetitus perditionem ita appellare, potest etiam nauseosas affectiones ab accepto cibo fientes. Aliquando enim hoc unum solum symptoma accedit accepto cibo, ut si paulo fortiori moru moueantur, statim uomant. Appellanti igitur aliqui etiam tales stomachicos, & stomachum ipsi supinũ reddi aiunt. Sequitur autem hæc accessio quãdoq; ad solam oris uentris debilitatẽ, quod cibos amplecti eisq; obuolui non potest, uelut tota uentris amplitudo solet. Quãdoq; uerò & cũ uitiatæ alicuius, modicæ tamẽ humiditatis complexu. Etenim multa quemadmodum etiam ualde uitiata, etiã citra cibũ, nauseã efficit. Ceterũ quæ à multis uulgo Supinitas stomachi appellat, cõtingit quidem iuxta intemperie quã eumq; tandem citra uitiatos humores. Fit etiã per humiditatẽ, multam quidem, nõ tamen magna: qualitatẽ. Irriguum enim stomachus per largã humectationẽ, similiter ut ligamẽta neruorũ laxat. Facillime itaq; curabilis est hæc affectio ex omnibus ferè alijs pharmacis indigens, quæ siccare humiditatem, & coagmentare, & constringere laxatum corpus ualent. Vbi igitur per profundũ fuerit extenta humiditas, crassaq; sit & uiscosa, opus est mixtura pharmacĩ attenuatorij, & si ita dicere libeat, perrosiui quale est acetũ, & acetũ mulsum. Si uerò neq; talis sit humiditas, neq; in altum extenta, adstringentia sola suffecerint ad curationẽ. Proposuit igit in sermone pharmacũ, nõ moderatũ supinitatũ, sed fortiorũ est curatiuũ: esset autẽ & in moderatũ sanatiuũ, si astringentia sola quis misceret, aut etiã ex calcantiibus, quippiã, si frigidã esse affectionẽ sentiret. Sufficiens autẽ signũ est frigidæ affectionis, si æger se nõ sitire percipiat. ubi em̃ neq; siticulosus fuerit, neq; ardorẽ senserit in ore uentris, palã est affectionẽ nõ calidã esse. Idonea itaq; sit ad huiusmodi uentris affectũ, quatuor pharmacã ab Asclepiade cõscripta, quæ etiã ego scribã, ipsius Asclepiade uerbis et ordine seruatis.

Ad stomachici subuersiões. Nucleorũ mali punici uisitorũ succi sextar. iij. succi. mètẽ sext. i. mellis atticĩ sext. l. in uras fictile cõijcito, ac coquito assidue agitãdo, & ubi dẽsata fuerint, ab igne ablata reponito. tẽpore usus dato mystrũ i. aut ij. ante ci-

bũ. Aliud, facit ad dysentericos, & uometes cibũ. Radicis mali cotoneæ lib. i. uini myrtici sext. iij. coquito ad tertias, deinde exprimito liquorẽ, et mellis atticĩ sesquilibrã addito, rursusq; coquito, assidue mouẽdo. dato ex reposito uelut dictũ est. Cõfectiõ ex fructibus. Facit ad stomachi subuersiõnẽ, cœliacos & dysentericos. Mala cotoneæ num. x. forba num. l. mespila l. rhois rubri sextar. i. aquæ cõgios vij. Fructus tufos & in aquã cõiectos diligẽter coquito, & ubi dissoluti fuerint, liquorẽ exprimito ac rursus coquito, electo eo qd ex fructibus instar palearũ exuicũ reliquũ est. cũ uerò tertia pars liqris super fuerit, mellis atticĩ lib. iij. addito, & ad prunas assidue agitãdo coquito, ac spissata reponito. usus ostensus est. Aliud pharmacũ, Sorborũ maturorũ sexta. i. baccarũ myrti nigarũ sext. i. rhois syriaci sext. i. prunorũ syluestriũ. sext. i. mespilorũ sext. i. phœnicobalanorũ Thebaicorũ lib. ij. mala cotoneæ x. mala punica integra unã cũ nucleis x. musti aminæi sextar. xlvij. præpara pro cõsuetudinẽ, & expressum liquorẽ rursus diligẽter coque donec spisset. utere ut dictũ est. Porrò post præscriptas cõfectiões, quintã scripsit Asclepiades hoc modo. Catapotia ad stomachi subuersiões. Origenia, bona & ualde probata. Florum rosarũ 3. viij. baccarũ myrti nigre exacinarũ acetabulũ, seminis hyofcyami acetabulũ dimidiũ. teritõ simul diligẽter, sufficienter pro tropo paulatim instillato, deinde his palmularũ passarũ, patetos Græci uocãt, x. numero, carnẽ addito, & ex cõtritõ catapotia ciceris magnitudinẽ formato, & iij. aut iij. cũ aquæ mulsæ ueteris dilutæ cyath. ij. exhibeto. Et hoc pharmacũ in ijsdẽ affectionib. cõmodũ est, in quib. quatuor præscripta. Voluit autẽ autor huius pharmacũ per seminis hyofcyami mixturã, doloris sedationẽ & somnũ inducere, unã cõrestitutionẽ. Manifestũ est autẽ refrigeratoriũ. quippiã hyofcyami semẽ habere, uelut etiã papaueris semẽ habet, quare ad calidos affectus facit. simile præscripto pharmacũ deinceps proditum ab ipso est his uerbis. Rosarũ recentiu defectis unguibus 3. viij. seminis papaueris albi 3. iij. seminis hyofcyami 3. ij. aloes ob. iij. asari ob. iij. cũ aqua diluta in pilulas redigito, & ciceris magnitudinẽ præbeto. Septimũ post prædicta pharmacũ Asclepiad. scripsit appposito discrimine ab accessiõe palã apparente. Ait em̃ ardori stomachi ipsum cõuenire, & propterea sitim extinguere testat, unde etiã ad ipsõ Græcẽ appellat, cõpositionẽ ipsius sic tradẽs. Ad ardorẽ stomachi ad ipsõ catapotiu sitim extinguẽs. Seminis cucumeris satiuĩ 3. viij. seminis portulacẽ 3. viij. tragacãthæ 3. iij. tragacantham ouorum cistrorum recentium candido dissolue, & probe tritis alijs adde, & ex mixtis catapotia forma, eaq; in umbra sicca, atq; unũ sub lingua tenendum præbe, ac liquorẽ inde solutũ deuorare iube. Quin & quod postea sequitur refrigerat. ac corroborat stomachum madore pregnantem, & qui humidam ac calidã affectionẽ habet. Scribit autem de ipso Asclepiades hæc uerba. Aliud facit ad stomachi subuersiõnem, maxime cõmo-

dum est ardorem multū perferentibus, & qui stomacho exuruntur. Foliorū rosarum uiridū drac. vi. glycyrrhizæ drach. quatuor, nardi indicū drac. quatuor. excipe uino dulci aut protropo, & redige in catapotia, ex quibus unū sub lingua tenendū prebe, aut ciceris magnitudinē cū frigida aqua dissolue, & in potu exhibe. Nonū deinceps pharmacū Asclepiades scripsit, hoc modo. Ad singulū & stomachi debilitatē & cibi reiectionē. Reiectionis itaq; hoc est uomitus, ex genere est Supinitatū. Quando em̄ os uentris fortiter afficit, hoc aut uelut dixi, ob uitiosos humores, quos uenter abrumperē conatus, propter debilitatem nauasæ ac celsionē perpetitur, atq; hanc etiā tum ante acceptiōem cibi, tum post ingestū cibum, ob extremam debilitatē perfert. Supinitates igit̄ ex uitiatibus humoribus obortas, picra confectio q̄s celerit̄ me curat, nempe uitiatos humores expurgās. Vomitus uerò ob imbecillitatē grauati stomachi ob orti, curantur per intemperaturæ correctionem. Non parū saepe cōtingit etiā, non solū stomachū, sed & uentrē ob debilitatē ferre nō posse ciborū onus, atq; ideo reijcere aliquando quidē ad infernā partē, ubi illis robustior sit stomachus, aliquando uerò sursum, ob stomachi imbecillitatē, quando sanē hic debilior fuerit infernis partibus. Hoc itaq; uomitus symptoma unū quidē est, sequit̄ aut tē sepe ad affectiōnes diuersam medelā exigētes. Similiter & singultus, stomacho interdū ob frigiditatē aut repletionē accedit, interdū ob mordacitatem humorū acriū & medicamentaria qualitate præditōrū. Impossibile itaq; est pharmacū inuenire omnibus dictis affectiōibus aptū. Cæterum quæ deinceps scripsit Asclepiades duo pharmaca, ostensa sunt substantiā habere multū ab humana natura diuersam, quæ ipsa maxime omnīū inter reliqua corporis partes stomachus nō fert, ob excellentiam sensus qua præditus existit. Magnopere igitur affligit stomachus etiā ubi ex stomachicis pharmacis quippiam in ipsum fuerit præterlapsū, maxime quæ atramentū sutoriū, aut tale quid in se habent. Quod em̄ ex fructibus constat, ex comestibili materia cōpositum est. uerū atramentū sutorium cōtrariā penitus homini naturæ est. Quemadmodū etiā mandragoras. Fugienda itaq; sunt hæc duo pharmaca ex chrysobalano & radicis mandragoræ cortice cōposita. Apponam tamen etiam ipsorū compositionē. Et prioris quidem descriptio hæc est. Chrysobalani lib. i. masticis chizæ libræ dimidiū, corticis radicis mandragoræ quadrantem. Tusa & cribrata excipe menta succo, & redige in catapotia. da inde obol. tres cum aqua frigidæ cyathis tribus. Posterioris autē descriptio hæc est. Masticis chizæ lib. i. corticis radicis mandragoræ sextantem. Tusa & cribrata reponito. Vsu exigente dato cochlearium inspersum aqua frigidæ cyatho unī.

3 Post præscriptas confectiones, Asclepiades sic scripsit. Ad uoluuosas stomachi subuersiōes. Coniectarit quispiam ipsum uoluuosas appellare fortes, quemadmodum enim in uoluuosis sub

A uersiones fiunt cū magna cōtentione & uiolētia, adeo ut stercus etiam reuomat: sic etiā alios uomitus concitatos, quos appellare uoluuolosos possit. Sequunt̄ aut̄ huiusmodi uomitus, ubi affecte partes a medicatis serosis humorib; magnopere fuerint afflictae: si uerò etiā imbecilliores fuerint, duplicat̄ malū. Erit itaq; ob id curatiōis scopus, ut si mul ad affectas partes odoratas qualitates imponamus, quales aromātū sunt, & quorundā seminū in ciborū usum ueniētū, uelut est anisum, apsiū, daucus, cuminū & fesele, iuxta hanc itaq; rationē Hippocrates in pleuriticis purgatiuū exhibēs medicamentū, misceat̄ aliquid ex his iussit, sic scribēs. Si uerò sub septo trāuerso sit dolor, & ad clauiculā nō se extēdat, mollire uentrem oportet ueratro nigro, aut peplio, ad ueratrū quidem dauco, aut fesele, aut cumino, aut aniso, aut alio quopiā odorato addito. Apparet em̄ quod in his misticis maxime odorē ipsorū respiciat, quo medicamentariā uim, quæ hominis naturæ cōtraria est, mitiget & obtūdāt. quæadmodū em̄ graueolētia omīa stomachū subuereere solent, sic odorata corroborare. si uerò ultra hoc etiā in ciborū usum ueniāt, multipliciter auxiliant̄ stomacho ob uitiatos serosos humores subuerso. Atq; iuxta hæc ratiocinationē autor propositi pharmaci anisum et apsiū admiscuit. absinthiū uerò propterea quæ natura uim habet extergendi, ac repurgandi, & subducendi uitiatos stomachi humores, ampliusq; densat & cōstringit ac robur addit parti affectæ.

C Cinamomū aut̄ addidit, ut quod omnib; foetidis & putredinosi serosis humorib; se opponat, iuxta utramq; facultatē suam, alteratiuā & discussoriā. Non parū em̄ ex odore suo exhibet utilitatem omnibus malis affectiōibus. Opij uerò parū pharmacū immiscuit, sensum stomachi hebetare uolēs, qua ratio ē etiā celiaciū ipsum damus, ut quod profundū quendā soporē inducere possit. Quo uerò uehementē opij frigiditatē cōpositor ipse corrigeret, castoriū ipsi adiecit oppositū ferme ipsi in facultate. Eadē ratione etiam piper admixtum est. De myrrha uerò operæ pretiū est scire, quod in quantum facultas ipsius est concoctiōria humorum præter naturā & uitiosorum, in tantum conuenienter admiscet̄. In quantum autem medicamentaria est, nō cōuenienter. Verum pauca eius ad concoctiōnem quippiam conferet, qualitatis autem peregrinitas nō apparet, utpote uicta ab odoratis. Ego itaq; hoc pharmacū etiam sine myrrha præparare consueui, ad securitatem perducere semper tentans usum omnium pharmacorum, præsertim ubi in acuta febris tale quid exhibetur. Cum igitur cinamomum habeat hoc pharmacum, & semina calida urinam cientia, ac piper, & præterea castorium ac apsiū, merito multis affectiōibus commodum est, quandoq; cum uino stomacho grato datum, quale protropū est, quandoq; cum myrti baccarum decoctio, uelut in dysentericis, aut cum aceto mulso, uelut in splenicis. In cholera uerò & bilis uomitu ac effluxu, cum frigida, uelut Asclepiades scripsit, sed addito

discrimine, si sticulisior est nūc q̄ antea, aut nau-
seę calidę sensus circa os uentris ipsi cōtingat, aut
frigidam bibere sanus cōsueuit. Ego sanē hoc me-
dicamentum ad securiorem usum perduxī, myr-
rhā q̄ dimisi, & piperis quantitatem auxi. Cum
uero plurimū cinamomū accipiat, necessariū no-
bis est ubi cinamomo caremus, casiam optimam
conijciamus, aut plus q̄ duplo cinamomi ponde-
re, aut omnino non minus. Cæterum cōmensura-
tio ac apponderatio pharmacorū quę ipsū con-
stituit, ab Asclepiade his uerbis prodit. Ad uol-
uolosus stomachi subuersiones passillos Amazo-
nū. Facit ad inflatos, ardorē stomachi, et uomētēs,
cibū, facit & ad internas affectiōnes. Seminis apij
3. vi. anisi 3. vi. absinthij 3. iij. piperis 3. ij. myrrhæ
3. ij. cinamomi 3. vi. opij 3. ij. castorei 3. ij. cū aqua
passillos formato, & summū drach. i. dato, stoma-
chicis cū protropi diluti cyathis tribus: cholericis
& uomentibus cibū cū frigida: cœliacis & dysen-
tericis cū bullis myrrū decocto: splenicis
cum aceti mulli cyathis tribus.

4. Aliud pharmacum deinceps scripsit Ascle-
piades, nō solū ad uolulosas stomachi subuersiō-
nes ipsū cōuenire promittit, sed & ad intensos
singultus, & stomachicos quī ardorē, hoc est mul-
tam caliditatem percipiunt. Dicitum aut̄ iam sępe à
me est, impossibile esse inuenire pharmacum ad
multas affectiōnes optimū. Inuenit enim in una-
quaq̄ ipsarū id quod propriē ipsis destinatum est
præstantius esse, uerū his qui unū pharmacum ad
multos affectus habere uolunt, etiā horū prepara-
tio ac cōpositio utilis existit. Contineat tamē ambi-
guitas quędam in huiusmodi pharmacorū promissio-
nibus, qualem Asclepiades nūc de proposito
pharmacofecit. Putabant em̄ fortassis aliqui ex
ignaris, tū singulorū trium symptomatū curatio-
nem promitti, tum duorū simul coincidentiū, aut
omniū simul. Velut cū lancinat uehementer nau-
seans aget, & singultit, & multa anxiosa calidita-
tis sensum circa stomachū percipit. Et de tali sanē
affectiōne primo dicā in qua tria hæc mala simul
hominē infestant, nimirū ardoris sensus, & singul-
tus, & affectio uolulosa. Hippocrates quidē igitur
conuulsionē fieri dixit ex repletōe & euacua-
tione, & addit ut aphorismū fermē in omni-
bus exēplaribus, sic aut̄ & singultus. Ego uerò in
conuulsionē tertią aliquā causam supra euacuati-
onem & repletionem nō dum reperi. Singultum
etiā sine his fieri uideo, acribus humoribus, aut
serosis & medicatis stomachū mordētibus, quos
ubi uomitur reiecerint statim singultu liberantur,
quin et multi deuorato pharmaco ex trib. piperis
generib. cōstant, si statim uinū in super bibāt, om-
nino singultuant, ex quorū numero etiā ego sum.
Amplius aut̄ & cibo in mordacē qualitate corrup-
to, aliqui singultuūt, & quod uomitur statim libe-
rant, omnisbus notū est. Quidā etiā ex rigore oris
uētis singultuūt. Verū pueros maxime frequēter
singultire cōtingit, tum ob corruptionē alimentū
in uētre, tum ob partis frigiditatem. An uerò & ob
nimī euacuationē fiat singultus, ueluti etiā con-

A uullio, dignū consideratione est. Verum si in præ-
sens hac consideratione relicta, eos qui ob frigiditatem,
aut ciborū copiā, aut mordacē acridinē gra-
uant, Intueamur, uomitū reperiemus sufficentem
medelam eorū qui ob copiā aut morsum singul-
tiant, caliditate uerò eorū qui ob frigiditate. Alio
autem modo reperiemus etiā sensus stupefactio-
nem per refrigerantia, et per mutationē ac discul-
sionem mordacitū per attenuantia & resiccantia.
Componit autē ex huiusmodi ipsum pharmacū.
Opium enim & rosę, & psyllij succus, ex refrige-
rantibus sunt, Spica nardi uerò & chrysobalano
ex discutientibus & corroborantibus. Asarum au-
tem per urinam deducit uitiosos humores. Aloe
uerò uitiatos humores expurgat, & inferne per
uentrē euacuat. Crocus aut̄ coccoquit & roborat
partes, per temperantū quidē caliditatis cōco-
ctiōne efficiens, per adstringendū uerò uim, quę
ipsi adest, robur addens. Costus aut̄ sufficenter cal-
facit, moderate uerò adstringit, quod & ex gustu
eius percipit. Ex his porro cōpositū pharmacum
aptū est singultuentibus, aptū est & qui ad uome-
dum lancinant, & qui circa præcedens pharma-
cum dicti sunt, uerū non similiter ut illud, aliquid
ex odoratis habet, aut cinamomū. Refrigerantiū
aut̄ in ipso mixtura stupefacere sensum potēs, in-
tigando molestiam ex mordacitate serosorum &
aliorum etiā humorū obortam, uere aptū phar-
macum efficit, ad nauoseos affectiōis imminutio-
nem. Quandoquidem uerò etiā ad stomachi ar-
dorem conuenire pharmacū dixit, repugnat autē
huic sermoni costus, operæpretiū fuerit & de eo
dicere. Quemadmodum in antidotis colicis ap-
pellatis, & a quibusdam, dolorum sedatorijs, qua-
lis est Philonis antidotus, Scopus componendū
pharmacū est stupefacere sensum dolentiū. Quo
uerò nō cum magno detrimento id fiat, & ut per
altum dolentium corporum frigiditas penetret,
calfacientia miscentur, quę refrigerantium stupe-
factionem deducere possunt, cum illa ipsa per se
tardi transitus existant. Hęc igitur ubi quis inau-
diuerit, quantitatem consideret simplicium phar-
macorum quę in compositiones miscent. Ex hæc
em̄ sciet num magis, an minus efficere possit cō-
positum pharmacum ea quę promittit. Si namq̄
refrigerantia plura apparuerint, sensum affecto-
rum magis obrundit, & quantum calor in ipsa
particula fuerit etiā hunc extinguit. Vbi uerò cal-
facientia fuerint aucta, minus quidē hæc efficiet
ipsum pharmacum, innocentius autem reddetur.
Nosse enim oportet, corpora utuentium mortifi-
cationi simile quippiā perpeti, ab omniū ex opio
& hyoscyamo, & mandragora compositorum
pharmacorum usu, nimirum causis dolorem infli-
gentibus insensibilibus factis, & multi sanē qui
alsidue talia accipiunt, ad immedicabilem frigi-
ditatem particulas perducunt. Quemadmodum
autem in refrigerantium & calfacientium opposi-
tione, utrorumque quantitas ostendit prædomi-
nantem pharmaci actionē: Eodem modo etiam
in alijs considerationem facere oportet: uelut den-

fantibus & rarefacientibus, coagmentantibus & diffundentibus, odoratis & graueolentibus, humectantibus & siccantibus, discutientibus & cohibentibus. Itaq; ubi subscripsero his mixtorū in compositione quantitatem, ad coherentia transibo. Scripsit autem ipsam Asclepiades in hac uerba. Stomachicis, ardorem sentientibus, & ad intensos singultus, & uolulosos stomachi affectiones. Costi drach. iij. spicæ nardi drach. iij. chrysobalanorum drach. iij. rosarum uiridium drach. iij. mastiches 3. iij. aloes drach. ij. asari drach. ij. opij drach. i. excipe succo psyllij, & reduc ad pastillorum formam, exhibe obolos tres. Liquor sit affectioni conueniens. Post præscripta pharmaca, Antidotum Hieram iam antea in Andromachi pharmacia conscriptam, ex aloë & cinnamomo compositam, etiam ipse tradidit nō iuxta eandem commensurationem & symmetriā. Habent autem uerba eius in hunc modum.

5 Antidotus Hiera, id est sacra, Themisonis. Ad stomachi subuersiones. Facit & ad sentientes ardorem, & omnem inflationem, tardam concoctionem & affectiones uteri. Probe cit urinam, et omnino admiranda confectio est hydropicis, hepaticis & nephreticis. Deducit & foeminis menses. Aloes drach. c. mastiches unc. unam, croci unc. unam, nardi indicæ unc. unā, cinamomi unciam unam, carpopalsamū unc. unam, asari unc. unam: tundo & angustissimo cribro excernito, atq; aridum ut ne transpiret seruato. Vfus eius est ad tardæ concoquentes, atq; ita sanos drach. i. cum frigida cyath. iij. Vomentibus bilem, aut aliā fluxione laborantibus. drachmæ dimidiū. Ad inflammationes internas conuenit cum aqua mulsā. Verū quibus urinam ciere uolumus, aut menses deducere, pharmacū cum uino damus. Est aut medicamentum inspersile in pulueris ac farinae formam redactum. Hæc quidem scripsit Asclepiades de prædicto pharmaco. Videamus aut primū in his de quantitate pharmacorum ipsum constituentium quatenus consensit & dissentit cū Andromacho. Deinde consequenter de promissione & usu. E quidem in mixtura pharmacorū consenserunt in ter se Andromachus & Asclepiades, in hoc quod aloes drachmas centum coniungunt. Dissentiunt autem in eo quod Asclepiades simpliciter aloes scripsit, Andromachus autem lotæ apposuit, & quod Asclepiades reliquorum singulorum singulas uncias admiscuit, hoc est drachmas argenteas viij. aut viij & dimidiam. Andromachus uerò sex. Amplius etiā in eo quod Asclepiades carpopalsamū, Andromachus xylobalfamū iniicit. & præterea quod Asclepiades florē iūci odorati penitus relinquit. Cæterū circa promissionē operū Andromachus nihil amplius scripsit, q̄ quibusdā unum cochleariū, quibusdā duo, cum aquæ frigidaë aut calidaë cyath. iij. exhibere. Verum Asclepiades plura de usu propositione Antidoti prodidit. ad tardas enim concoctiones sanorū drachmam unam dari iubet, cum aquæ frigidaë cyath. iij. Opior aut ipsum dicere drachmā argeteā, etenim

A sic ferè omnes recetiores medici appellare in more habent: neq; ipsa rei natura aliud nos intelligere cogit. Manifestum est autem quod drachmam dicimus nunc in huiusmodi omnes, quod Romani denarium appellant. Verum non omnibus tarde concoquentibus expedit præbere hoc pharmacum, sed his solum quibus ob uitiosos humores tarda concoctio contingit, & maxime quum tenues fuerint & biliosi. Fecerit & quietem in his quibus citra uitiatos humores, humida intemperies intantum affectam partē perigauit, ut exoluatur & laxetur ad modum ligamentorū neruorum circa laxatos articulos. At uerò qui bilem in uentre habent, quæ præsertim ipsis in tumicis in alto continetur, præstantius pharmacum non repererint. Verum haud scio qua ratione parum de ipso exhibeat Asclepiades, cum moderata exhibitione ipsius ad drachmas sex progrediatur. Porro ad inflammationem habentes non simpliciter in omni inflammationis tēpore dandum est, sed ubi concocta fuerit & declinavit. Concocta enim mēdicanda recte censet Hippocrates, nō cruda, neq; in principijs, nisi sua sponte concitata id expectat, hoc est, nisi motus ad excretionem nos adducat, qui nondū firmā aliquā inclinationē ac stationē ad unā partē habeat. Recte aut hoc pharmacum tarde concoquentibus, aut bilē uomentibus, aut alias stomachi fluxione laborantibus, aquæ cyath. iij. inspergens præbet, nimirū subuersionē stomacho ex melle oborientē formidās. Ad declinationem aut internarū inflammationū cum aqua multa tempestiue quæ exhibuerit. Quæmodum etiā urinā ciere uolēs aut menses euacuare, Asclepiades quidē ex uino dandū ait: præstitit aut, ut ego sentio, cū uino mulsō pharmacū præberi, lia em simul & quæ circa distributionē & delationē ex uētre in urinā, & quæ circa uterū instant, secit ac dissoluit, & robur partib. addit per quas trāsitus facit. Amplius q̄ & locorū per quos fert caliditatem auget, quæ & ipsa nō parum cōfert ad instantes humores fundendos ac euacuandos.

6 Post præscriptā sacra Themisonis antidoti, Asclepiades sic scripsit. Alia ex Mariæ cōpositionibus Atalica. facit ad stomachicos & reuictes cibū, cholericos, cœliacos, dysentericos. Cōpositio sic habet. Croci 3. ij. nardi 3. ij. feminis hysocyami 3. i. aloes 3. i. balauftij 3. i. tragacathæ unc. i. pleris albi unc. i. acaciæ 3. i. rhei potici unc. i. rhois syriaci culinarij unc. i. excipe succo drachmæ unius. tragacantham uerò succo maceratam unio. Hoc pharmacum nihil priori simile habet. Illud enim purgatoriū est, hoc adstringens, his qui stomachum aut totum uentrem ob multam humiditatem exolutū ac laxum habent conueniens: quem admodū etiam in articulis eiusmodi dilaxitates contingunt, ligamentis ipsorū multa humiditate perigatis, quæ plurimū medicū neruos ligatarios appellare solēt. Multæ em eiusmodi affectiones tum in uētre, tum in stomacho, fiunt his qui multo potu se explēt, aut fructus humectantes, aut etiā edula

hæ talis temperamētī ingerunt. Quum itaq; multi sint qui tali uictu utantur, rationabiliter etiā prædicitur facultatis pharmaca sepe successu clara euadunt, ut quæ prædominantē adstringendū uim habeat. Vbi uero aut uitiatos humores euacuari, aut affectū particulā calfacere oportet, non solū nihil inuadit ita adstringentiū pharmacorū usus, sed etiā nocet. Post prescriptū medicamentū, aliorū duorum Asclepiades meminit, quæ et ipsa ambo bona sunt, & ex multis cōposita, ac propterea multi ad uarios affectus uales, et presertim posterius. Quod uero tale sit quale ipsum esse dicit, etiā nobis ipsis facile erit iudicare, ubi in memoriā reuocari uis sim plicia in ipso pharmaca, qualia singula sint, ampliusq; methodum cōpositionis eius audierimus.

Aster stomachicus. Facit ad eos quibus cibus in uentre acefcit, ad tormina, destillationes, dolorē capitis, spuentes sanguinē, tabescētes, affectiones circa uelicā & uterū. Preparat sic. Succū mādragoræ drach. iij. myrrhæ drach. iij. balauftij drach. iij. caltorij drach. iij. croci drac. iij. opij drac. vi. anisi drach. viij. seminis apij drac. viij. styracis drac. viij. hyssopi cretici drach. xij. seminis hysocyamī albi drach. xij. Cōponito pro more & digerito in pastillos. Dato pro uisibus. Liqueor sit affectioni cōueniens. Aster in exuperabilis. pharmaca ac commo datū, sedans dolorē, inducens formū, multi usus ad uarios affectus. Nā & stomachi morbos mirabiliter sanat, à ructibus acidis, ægris concoctionibus, torminibus, uolulis, inflationibus. Facit et ad capitis dolores potarū, & foris illitū fronti acetodilutū. Facit et ad oculorū dolorē pastillus perdicij succo dilutus. Facit & ad dentiū dolorem cauernæ inditus, tritus ac galbano exceptus, aut sic succo. Prodest ad influxus colorū, & tonfillarum inflammationes, uino dulci dilutus. Ita ut ad oculos sanā eō imbuta imponamus. In tonfillis uero affectis tepelactū colluamus. Facit ad omnē sanguinis fluxū uino myrrite dissolutus. & ad ueteres ac recentes tusses & destillationes dilutus uino The ræo, aut protropo, aut scybelite. Facit phthilicis, suppuratis, marrubij succo dissolutus. Hæmoptocis, dysentericis, cholericis, sanguinariæ succo dilutus, & ad omnīs reptilis plagā cū rutæ decocto potatus. Solutū irritationes per circuitū repetētes. duabus ante eius inuasionem horis, ex uini diluti cyathis iij. acceptus. Menses etiā foeminarū ducit artemisiæ decocto dilutus. Facit & ad uelicæ affectiones uino mulso dissolutus. Similiter etiam his quæ ab utero suffocant, auxiliat. Facit arthriticis, podagricis, gētiangē decocto dilutus. Et de his quidem quæ efficit hætenus. Compositio uero hoc modo habet. Myrrhæ drach. iij. styracis drach. iij. nardi Indicæ drach. iij. cassæ fistulæ drach. iij. terræ lemnæ quæ sphragis, hoc est, sigillū appellatur drach. iij. corticis mandragoræ drach. iij. In alio exēplari etiā piperis drach. iij. croci drach. vi. succi papaueris drac. vi. seminis dauci cretici drac. viij. anisi drach. viij. seselis malsilensis drach. viij. seminis apij drac. viij. Myrrha & styrax, atq; opistū uino dissoluunt odorato & teruntur. Arida uero

tunduntur & cribrantur, ac deinde simul miscentur, subinguntur, ac in pastillos coguntur ponderis drachmæ dimidiæ, & in umbra resiccantur. Visus ostensus est. In alijs exemplaribus pastillorū pondus drachmale proditur.

Quæ Archigenes in primo pharmacorū secundum genus prodidit, De affectionibus circa stomachum. Cap. IIII.

Quum multæ & uariæ sint circa stomachū affectiones, atq; hæc omnes ferē in totum ex cruditate oboriantur, omne ipsius robur cōsiderandum est, & si quidē per aquarū aut aeris malignitatē ledantur, quoad maxime possibile est fieri, ea uariando ac permutando hominē liberabimus. Si uero per inconfuetos cibos læsio fiat, eis interdicemus. Si uero ob copiam, cibos contrahemus. Et in uniuersum ex quacūq; causa suspicati fuerimus fieri læsionē, eam prohibebimus. Quod si quis sibi ab omnibus his bono ordine caueat, & iuxta ipsum stomachum tamen concoctio impediatur, unctionibus & exercitijs, uociferationibusq; et alijs huiusmodi p̄ expertū artificē adhibitis stomachus corroboretur. Verū ructu acido affectis coriandrum cōchlearij mensura ante reliquū cibū dendum dato, & merū insuper bibendū. Quod si quādoq; moderata cruditas & quæ cōtemni possit oboriatur, longiore tempore in lecto decumbendū est, & si negotia id non permittant, quanto possibile est, omni distentione, ac labore, ampliusq; æstu ac irauitatis. Serius etiā q̄ pro consueto tempore exferuida aqua lauandum est, & in priore balnei domo aqua tepida hausta, omnia in stomachum coaceruata pituitosa reuocanda, & modico cibo itemq; potu p̄ma die utendū. Si uero fortis ciborū corruptio fiat, stomachiq; morsum sentiant, ac ipsos eructent, ampliusq; nausea afficiantur, aqua tepida exhibitā uomere cogito, donec omne corruptum expurge, deinde caput pinguis linteoilis ad ignem calfactis irrigato, aut huiusmodi aliquo non inani ductu locos circa stomachū foueto, & præcordia mitigato, summas item partes pinguis frictione aut etiā cōstrictione lenito, atq; ita in lectulo quiescere sinito, ac inediā per totā sequentē diem perferre. At si non absurdū quid inde consequatur, & satis firmi sint, lauando eos, ut prædictū est, curato. Infirmiores uero moderate ad diem unum resectos, in sequentē lauato, moderatis cibus ac potibus ad tridū uti iustos. Et cruditatis quidē talis quædā (ut rudī quædā forma expressi) curatio existit. Verū de his quæ ex ipsa proueniunt, uelut profluuiū uētris, aut bilis per uomitū ac secesum refectione, aut alijs eiusmodi, in proprio loco dicetur. Cæterū in alijs stomachi molestijs, his qui dem qui stomacho exurūtur, cum exolutione aut animi deliquio, aut appetentia perditā, ex quacūq; tandē causa, præter febrē, cyathos iij. aut iij. aquæ frigide absorbendos dato, bis aut ter per interualla; & si quidē inde mitius habeant, ipsos reuocatos tum cibo, tum etiā alijs refocillare tentabis: si uero permaneat malū, ligatis & confrictis extremitatibus, eiusmodi quendam cremorē asidue absorbendū dato, uelut palmularū, malorum

cotoneorū, pīrorū, mēspīlorum, baccarū iuniperi, A
 pampīnorū uitīs, rosarū, Malī itē punīci nucleum
 non habētīs succū, aut nuce pineas xx. & semīnis
 cucumerīs grana xxv. baccas myrti xx. croci obo-
 lum dīmīdiū. & rosarū duarū foliā, ex aqua bibēda
 exhibeto. Aut aquā frigidā cum omphaciī succo
 præbeto. Aut florē rosarū cū nardo & aqua frī-
 gida, aut etiā portulacæ semē ammīsceto, aut atrī
 plīcis semē, aut malorū cotoneorū decoctū. Aut
 cucumerū fatiurorū semīna quīnquagīnta trīta, ex
 frīgida præbe. Aut oryzā coctā cum butyro e den-
 dam exhibe. Aut tragorīganū trītā & exsuccatam
 cum aqua edendā præbe. Aut fabas Aegyptias x.
 & nardī celticæ obol. ij. utraq; tosta & trīta bibēda
 exhibe, cum malī punīci acidī ac dulcīs succo &
 aqua, parī utriusq; mēsurā. Aut mentā ramulum
 contrītū bibendum dato. Aut cenanthen similīter
 trītā cum nardo Indica bibēdā dato. Aut lentes
 coctos trītos ex aqua præbeto. Aut phēnicobala
 nos cum rosīs. Aut marrubij succū cum melle, &
 ubī paululum quīeuerūt uīnū cum polenta exhibe-
 to. Aut cardamomī drach. i. cum acetī mullī cya-
 thīs tribus potandā dato ac quīescere sīnito. Por-
 rō his quī saluā multā in stomacho aggregarunt
 aridā conyzā manducandā dato. Forīnsecus uero
 stomacho imponantur uitīs foliā uīridiā trīta, aut
 mala cotoneæ, aut palmulē, aut mēspīla cum cera-
 to, aut myrtī foliā tenera uel rubī, uel lentīfici, trīta
 cum polentæ flore frīgida subactō, aut portulacā
 uīridīs similīter præparata, aut caseus recens mol-
 līs cum polenta & apij folijs, aut serīdīs foliā cum
 aceto & polenta ac apij folijs. Si uero multū sīnt
 estuosi, uesicā aqua expletā imponito. Aut niuem
 superdato, aut cucurbitarū ramenta imponito, &
 omnīno omniā quibus in cardiacīs utimur. Do-
 lores autē stomachī lenit, & maxīme hīs quibus trī-
 stītia aut desperatio accedunt, lac asīnīnū, aut mu-
 liebre, aut bubulū, silīcibus incoctīs potarū. Aut
 unguentū nardīnū uel aliquod pretīosum dato ex
 aqua. Aut decoctū floris iunci odorati, rosarū flo-
 re simul īnsperso. Aut portulacæ succū quandoq;
 per se, quandoq; cum nardo. Aut ouī utellum to-
 stum & in farīnā cōmīnutū, cū polenta bibendum
 dato. Aut amaras nuce cum cucumerīs semīne et
 nucē pineæ. Aut rumīcis syluestris semīnis obolos
 ij. bibēdos præbeto. Omnes uero circa stomachū
 dolores & displicētias ac molestias sedarī aīūt, co-
 chleā africāna cruda īntegra uorata. Exoluto
 autē solū & nauēabundo factō stomacho, lactū-
 cæ albæ semē modicū, ex aquæ cyathīs quatuor
 aut uno bibēdū dato. Aut passerū stercus arīdum
 uel ut polentā, siue aquā biberit, siue uīnū, īnsp-
 gīto. Aut mastīches chīæ cochleariū ex aqua frī-
 gida dato. Aut glaciē īeiunīs quōtidīe exhibeto;
 ut ea asīdīue manducata saluā expuāt. Aut cony-
 zā aridā manducēt. Si uero una cū humectatio-
 ne etiā īnflāmatīo aliqua adsit, cenanthen cum me-
 siloto, aut rosam siccā cum cerato rosaceo parū re-
 sīnæ uīstæ habēte impone. Aut acaciæ & aluminīs
 melij pares partes dupla ceratī, p portione excipe,
 & ut malagma impone. Ceterū quibus bilē atrā

generantibus stomachus inflatur, spongias aceto
 acerrimo calido imbutas ad stomachū imponito,
 atq; hoc maxime tēpore distentionū, & si postea
 etiāmnū perseuerarīnt, alumen liquidū cum atra-
 mento sutorio trīto melle exceptū imponito. Aut
 hęc & aloen parī portione mīsta & cerato myrteo
 excepta imponito. Aut hederæ folijs uīno coctīs
 pro cataplasmate utitor. Aut plantaginis cum sale
 trītīs. Aut armentariæ bouīs stercus arīdum uīno
 coctum, aut marrubīū cum pane & rosaceo suba-
 ctum, aut bulbos rufos & alumē parī portione im-
 ponito. Post hęc antidotos apyretos appellata,
 aut hiera, aut alia quæpiā, quæ cuiq; per experien-
 tiā cognīta est, in potu exhibēda est. In cibo sto-
 machicīs conueniunt, beta, lens, tragus, oryza, ali-
 ca, malīs cotoneīs, aut palmulīs, aut mēspījs, aut
 malī punīci nucleō carentīs granīs, aut melapījs
 simul incoctīs, aut tenerīs lentīfici, aut myrtī, aut
 rubī ramulīs ammīstīs. Panīs sit summe tantū ser-
 mentatus, aut penītus absq; fermēto, præparatus.
 Ex oleribus conueniunt cruda, cīchoriū, meconi-
 dea lactuca, eryngium, intubus, gingīdiū, serīs, lac-
 tuca. Cocta maxīme cōmoda est brasīca & sīsa-
 rum. Ex reliquis autē coctīs conueniunt cochleæ
 & bulbi. Ex carnibus uenter, rosīra, pedes, turdī,
 perdīces, attagenæ, turtores, palumbes, anates, le-
 pores, corcades. Ex piscibus squilla, gammari, na-
 trices siue colymbanæ, locustæ, lolīginēs, lepīe,
 ex hīs quī duras carnes habent nullī. Ex testaceis
 maxīme buccīna, purpuræ, pectīnes, glaucī, centī,
 glandēs, siue balanī. Verū Sīsarū à reliquis omni-
 bus acceptū, ut stomacho gratū, & refectionī cō-
 modum, ad plerasq; omnes stomachī accēstiones
 cōueniens est. In potu prodest uīnum quod unū-
 quisq; libenter bibit. At uero hīs quī īnstantur &
 stomacho distenduntur, polij fasciculum coquito
 & bibēdū dato. aut calaminthæ decoctū per no-
 ctē sub dio expositum, modicā melle, & pipēris
 drach. i. ammīxtīs, bibendum præbeto. aut spon-
 gīam acerrimo aceto imbutā pedibus ac brachijs
 imponito usq; quo bullæ excitentur, maxīme si cī-
 bos reiectēt. Aut scēnī gracī farīnā acetō subactā,
 aut sīnapi trītū cum aceto, usq; quo rubefiat locus.
 Aut psyllium aceto & aqua maceratū & in morta-
 rio tulum, parī portione carnū cochlearū ammīx-
 ta, īn malagmatis forma imponito. Quæ stoma-
 chicīs dolorē eximant. Cuminū tostū & apium,
 utriusq; modicā portione cum aqua bibēdū præ-
 be. Aut aloes obol. ij. cū uīno mulso, aut uīno, aut
 aqua bibēdos dato. Aut abrotonī & thymī utri-
 usq; obol. ij. ex uīno præbe bibēdos. Ligaturas
 īsuper extremarū partū fortiter adhibe, & circa
 ipsū stomachū cum curbitulīs et fomentīs uarijs
 utere. Quod si uehēmētē ualīda sit distentio, etiā
 uenæ sectīo effīcax auxiliū erit, & alui solutio per
 supposititiam glandem.

2 Deinceps post scripta Archigenes de fa-
 me ingenti, bulimo Græcis appellata, itēq; de sin-
 gultu prodit quæ sequuntur. Porro eos qui ex
 ingenti fame in uis animo līquuntur, reuo cabi-
 mus odoramentis acetī, aut pulegij, aut quæ forte
 obtingit

obtingit terra aceto macerata, aut malis, aut piris, aut alijs similibus fructibus, qui ad manū sunt. Panem insuper odorandū dabimus, & ingerere cōgemus. Ad hæc enim singula confestim excitant, & præterea ad sullā carnē assaram ac coctā, & in uniuersum ad omne quod multū alit, & præsertim ea que odorē nidorosum ac probe conditū habēt. Per huiusmodi enim odores ut plurimū tales reuocantur. Nihilominus tamen etiā extremæ partes ipsorum constringendæ sunt, ipsiq; excitandi tum maxillarū punctura, tum capillorū ac aurium distentione. Refocillabis porro ab exolutione & deliquio animi, panē in uinō diluto, aut etiā aliud quippiam ex his que acruatim rescere uires possunt, exhibendo; uelut sunt oua forbilis, bulbi, cochleæ. Etenim singula hæc stomachi humiditatem eximunt, & in modica mole multā uim complexa cumulatim corroborant. Singulicūtibus autem ratā cum uinō dato, aut nitrū in aqua mullā; aut opium, aut calstrum, aut abrotonum, aut aristolochiam, aut daucum cretium, aut cuminum, aut anisum, aut zingiberis radicem, aut scyllam cum aceto & oleo, aut tordilion, aut dīctamnū, aut calaminthen, aut acorū, asarum item & nardum celticū, & pulegiū, singula tum per se, tū simul mixta.

Pharmacum nostrum ex succo malorum cotoneorū constans. 3

Magnæ equidem oris uentris affectiones à prædictis pharmacis curantur. Moderatas uero omnes feruē, præter eas quæ ex uementi ardore fiunt, subseriptū medicamentū iuuat. Succī malorū cotoneorū sextarios ij. mellis Attici sextarios ij. acetī sesquifextariū. Si uero multū acre fuerit sextarium unū. Zingiberis quadrantē. piperis albi unc. i. Arida insperges, ubi malorū succus cū melle & aceto coctus ad lentū ignē, Attici mellis crassitudinem acceperit. Aliud ex malorū cotoneorū carnē cōstans. Malorū cotoneorū carnis lib. iij. mellis lib. iij. acetī albi lib. iij. piperis quadrantē. zingiberis quadrantē. petroselinī Macedonicī uncīā unam.

De pharmacis que forissecus ori uentris imponuntur. Cap. V

Vocant quidem plurimi medicī haud scio quare uelut Asclepiades & Andromachus, omnia pharmaca que forissecus imponuntur, siue adstringendo cōdensent, siue indurēt, Malagmata, quæ uox emollitionis significationē habet. Verū nos permittemus ipsis etiā si non proprie appellent. Quæ autē conscripserunt ad stomachi affectiones comoda pharmaca, per experientiam non illorū solum, sed etiā nostram approbata, ea nunc adscribe mus, ab his que Asclepiades prodidit initio factō.

Que pharmaca Asclepiades ad stomachi affectiones in quarto exteriorum tradidit, que uerelle inscribit. 2

Euoni ad stomachi subuerfiones, doloresq; facit partim etiā ad inflammationes. Oenāthes drach. viij. croci drach. ij. rosarum siccarum drach. iij. meliloti drach. iij. mastiches drach. iij. ramentorum succini drach. iij. carnis phœnicobalanorum quadrantē. Vini myrtei quod satis est. Arida tundito & per angustissimū cribrū concernito, & cum uino myrteo diluito, ut cerati spissioris crassitudinē accipiant, his carnem phœnicobalanorū addito,

Galen.

A & conuallata cerato ex rosaceo apparato excipito, & linteolo infarta ori uentris imponito. Facit & ad oculos inflamatos. Aliud Oenāthes drach. vi. croci drach. iij. myrrhæ drach. iij. floris rosarum drach. iij. meliloti, mastiches, utriusq; drach. iij. aloes drach. iij. corticis mandragoræ drach. iij. Carnis palmularum quadrantē. Excipi cerato ex rosaceo apparato. Asclepiadæ qui philophysicus dictus est, hoc est natura studiosus, ad stomachi subuersiones. facit & coeliacis & dysentericis. Seminis hyoscyami drach. iij. seminis apij drach. iij. floris rosarum drach. ij. seminis anisi drach. ij. succi hypocythidis drach. ij. myrrhæ drach. ij. croci sesqui drachmam. opij sesquidrachmam. Arida tundito & per angustissimū cribrum concernito. Hypocystidem uerō et myrrhā, & papaueris succū, uino myrteo dissoluta aridis adijcito, & pastillos forma to, eosq; in umbra rescicato. Vfus tempore quantum opus est tusum, melle cocto excipito, & deinde linteolo infarta locis affectis imponito. Si fortis fuerit fluxio, succi hypocythidis aliam adhuc drachmam addito, & floris rosarum tantundem.

B Aliud Galli Marci Asclepiadæ, ad eandem affectiones. Seminis hyoscyami drach. iij. floris rosarum drach. ij. anisi drach. ij. seminis apij drach. iij. opij drach. i. succi hypocythidis drach. ij. myrrhæ troglitidis drach. ij. croci sesquidrachmā. uini myrtei quod satis est. mellis cocti quod sufficit, præparata ac utere ut dictū est. Eiusmodi pharmaca etiam bibuntur, & ualde auxiliantur. Cohibito autē fluxu & sequēte dolore, tantū pondus cerati rosacei ad pharmaci cōfectionē addere oportet. Si uero multa fluxio cōtingit, ad pharmacum succi hypocythidis drach. iij. conijcio, & flores rosarū aliam drachmam. Vigilijs infestantibus, etiā succi papaueris aliam drachmā addo. Aliud Nicerati, coeliacis, dysentericis ualde generosum. Oenāthes drach. ij. rosarum siccarū unc. i. mastiches unc. i. aloes unc. i. gallarum omphacitidū unc. i. aluminis rotundi unc. i. acaciæ unc. i. ceræ lib. i. picis brutæ quadrantē, olei myrtei lib. i. arida cum liquidis cōmittito. Aliud ualde præclarū. Oenāthes unc. i. omphacij unc. i. gallæ omphacitidis unc. i. aluminis scisci unc. i. acaciæ unc. i. cytinorum masti punicī, balaustij, mastiches, singulorum unc. i. uini myrteæ quantum satis est his subigēdis, carnis phœnicobalanorum sexuncem, excipe cerato lentissimō, præparata ac utere ut dictū est. Hæc quidem igitur præscripta pharmaca facultatis sunt adstringentioris. Quæ uero deinceps ab Asclepiadæ prodita sunt, mixtam facultatē habent, adeo ut etiam induratas inflammationes curent, & propterea etiā hepaticis utilia sunt. Opus enim habent etiam illi adstringentiū ad laxantiā mixtura, non tamen æque ut stomachicis. In stomachicis enim medicamentis qualitas adstrictoria prædominatur. Malagma Nilo inscriptum, Facit ad præcordiorū dolores, dissoluit omnē duritiē. facit & ad exarticulata & luxata post declinationē inflammationum impositum. facit spleneticis & hepaticis. Ceræ libram unam, ammoniaci thymiamatis lib. i. olei cy

C
D

tom. 5

H 2 prinl

prini lib. i. croci semenciã, aceti quod satis est. Ammoniaci dissolutio, deinde sic arida adijcitur. Aliud ex libris Arii Asclepiadei. Ammoniaci thymiamatis lib. ij. diligenter tritas in uas fictile conijce, eiq; floris salis lib. i. adde, & olei cyprini sesquialibrã. Coque ad lentũ ignẽ assidue agitando, atq; ubi emplastri formã acceperint, adijce cerã lib. ij. qua eliquata & pharmaco amplius non inquinante, eximito ipsũ & in mortariũ transfero, conquassatũq; diligenter reponito ac utitor. Malagma Nilei crocerũ, pharmacũ accõmodatũ ad predictas affectiones, facit et ad erysipelata. Hoc usus est Licinius Atticus. Ammoniaci thymiamatis lib. i. cerã lib. i. rosacei lib. i. croci unc. i. aceti quantum sufficit, præparato pro more. Aliud Melinum inscriptũ aromaticũ, hepaticis, stomachicis, & ad præcordia dissenta, & omnẽ neruorũ per cõsensum affectionem. Ammoniaci thymiamatis drach. c. cerã ponticã drac. c. melilotorũ drac. xij. croci, myrrhã, bdellij, singulorũ drach. viij. olei cyprini lib. i. Aliud facit stomachicis, hepaticis, ad præcordia inflãmata, & omnẽ neruorũ per cõsensum affectionẽ. Cerã drac. c. croci drac. xij. ammoniaci thymiamatis drach. c. myrrhã drac. xij. bdellij drach. viij. confectionis hedychroi quadrantẽ, uini dulcis quantum sufficit, olei cyprini lib. i. præpara pro more. Aliud Neapolitã Aromaticũ inscriptũ, pharmacũ accõmodatũ ad internas affectiones. Ammoniaci thymiamatis lib. ij. cerã lib. ij. rosacei lib. ij. confectionis hedychroi librã dimidiũ, mellis librã dimidiũ, nardi celticẽ librã dimidiũ, floris iunci odorati librã dimidiũ. Vini dulcis quod satis est. Arida cum liquidis subacta cum mittito. Malagmata bona inflammationũ citra debilitatẽ inueteratarũ, quẽ ad hepatis inflãmationes similiter cõueniunt. Malagma Asclepiadæ ex meliloto, Hieraticon, hoc est pontificũ inscriptum. Stomachicis, hepaticis, & ad uiscerũ dolores. Nardi celticã 3. x. cyperi 3. x. myrrhã 3. x. cardamomi 3. viij. meliloti 3. xl. croci 3. viij. amomi 3. viij. cyphæos hieratici, hoc est sacrificulorũ 3. xvi. ammoniaci thymiamatis 3. xl. resinã terebinthinã 3. lxxx. cerã minam unam, olei cyprini 3. cxx. Vini odorati Italici heminã unam. Præpara ut dictum est ac utere. Aliud Basilicum, hoc est, Regium inscriptum, faciẽs ad predictas affectiones, omnemq; per cõsensum neruorum affectionẽ. cerã minas ij. ammoniaci thymiamatis minas ij. resinã frictã minam unam, meliloti minã dimidiũ, propolis 3. xxv. myrrhã 3. xxv. nardi celticã 3. xxv. styracis 3. xxv. cyperi 3. xxv. iridis illyricã 3. xxv. cardamomi, panacis, utriusq; 3. xxv. croci, castiã, mastiches, opobalsami, amomi, floris iunci odorati singulorum drac. xvi. Vini Italici odorati quantum sufficit. Arida cum nardini Asiã aromatici libris quatuor subacta pro more præparato.

Malagma polyarchion. Facit peripneumoniacis, stomachicis, splenicis, hydropicis, facit ad affectiones circa uescicam aut uterum, ad omnẽ neruorum per cõsensum affectionẽ. Cerã minam i. terebinthinã minam i. bdellij minã i. ammoniaci thymia-

matis, cardamomi, cyperi, singulorum minam unam, meliloti, amomi, nardi Indicẽ, croci, myrrhã, thuris, xylõcinamomi, singulorum 3. xxv. olei cyprini heminam i. Vini Italici quod satis est, præpara pro more ac utere quandoq; immixto, quãdoq; dissoluto cum cerato cyprino. Polyarchi pharmacum accõmodatum. facit ad predictas affectiones, & omnẽ neruorum per cõsensum affectionem. Facit etiã ad assiduas cruditates, & corruptentes cibum, & uomentes bilem, ac omnes inueteratas affectiones. Vfus est eo Iustus Agrippa, cõpositio hoc modo habet. Castori, amomi, utriusq; fescunciam, piperis albi fescunciam & longi fescunciam, myrrhã quadrantem, cõfectionis hedychroi quadrantem. carbobalsami quadrantem, croci quadrantem, foliorũ malobathri, castiã rosas referentis, panacis, opobalsami, nardi Indicã, singulorũ quadrantẽ. floris iunci odorati, cinamomi, utriusq; trientem. pyrethri, croci, cardamomi, singulorum trientẽ, cyperi semissem, iridis illyricã, aristolochiã longã & rotundã, singulorũ semissem, cerã lib. iij. terebinthinã lib. ij. resinã laticis quadrantem. In alio exemplari; etiam bdellij trientem. ammoniaci thymiamatis trientem. Vngenti nardini Asiã lib. iij. Vini salerni quod satis est, præpara pro more. Ego autem adijcio mastiches, cinamomi, ammoniaci thymiamatis, styracis, aloes, opobalsami singulorum quadrantem.

Malagma Andromachi ex meliloto. Nardi celticã 3. viij. cyperi 3. viij. iridis illyricã 3. viij. myrrhã 3. viij. croci 3. iij. meliloti 3. xxv. ammoniaci thymiamatis 3. l. terebinthinã 3. l. cerã 3. c. cyprini heminã dimidium, aceti quod satis est. Quidam ammoniaci 3. c. cõijciunt faciãd omnia interna. Malagma polyarchi ex epistola ad omnia interna. cyperi minam unam, cardamomi minam unam. manna tantundem, cerã tantundem, terebinthinẽ frictẽ sesquiminam, aut liquide minas iij. cyprini quantum sufficit. Ego etiam bdellij appono minam unam. Aliud, altera descriptio. Cyperi, cardamomi, amomi, bdellij, thuris, balsami, singulorum minam i. cerã fescunciam, resinã frictẽ minas iij. cyprini heminã dimidium. Vini odorati sesquiheminã. Præpara ut moris est, ac utere uelut prescriptis. Vt ego componere soleo. Cyperi, cardamomi, amomi, bdellij, thuris, singulorum minam unam, cerã ming dimidium, resinã frictẽ aut terebinthinẽ minas iij. cyprini heminã i. castiã ming quartã partem, ammoniaci thymiamatis ming quartã partem, nardi Indicẽ, croci, myrrhã, singulorum ming quartã partem. Vinum odoratum.

De hepate et eius affectionibus. Cap. VI

Quã hæc tractatio postrema omnium à me cõscriptatur, omnibus sanẽ manifestum esse opinor, quod ex duobus his alterum uerum sit. Aut alias omnes inutiles esse & superuacaneas, si quis ex hac sola sufficiens sit omnes affectiones curare, quã medelam per pharmaca requirant. Aut siquid illã utiles existant, primũ ipsas legẽdas esse, & in memoriã reuocandas ab his qui hinc aliquid commo-

cōmodi auferre uelint. Iplas etenim methodos curandi prædictas affectiones, in xiiij. libris de curandi metho do inscriptis prodidit: nūc uero tanquam his ipsis cognitis, citra prædictas demōstrationes in memoriā reuoco, ostendens omnino quomodo nos pharmaca componamus, & quæ à prioribus scripta sunt iudicemus, indeq̄ in usum agere ac assumere confidamus, & sanè utilis hæc speculatio existit. Nam empirici qui suam artem rationis expertem esse uolunt, omnia quidem legenda esse censent, quæ à probatis medicis sunt conscripta, non autem statim in usum assumenda esse, sed prius iudicanda, an singula ex ipsis ea quæ promittunt opere etiam demōstrare possint. Nos autem experientiā in omni arte magnum quid posse perfrui, speculationes tum per rationale methodū, tum per rationale indicationem inuenitas, ad ea quæ ab ipsis de iudicationis historia tradita sunt, apponimus, demōstrantes qualem facultatem ad ambulandum utrumq̄ crus exhibet, talem in medicina experientiā & rationem habere. Itaq̄ in tractatione de simplicibus pharmacis per undecim libros conscripta, singulorum sponte naturæ productorum pharmacorum facultatem qua metho do quis inueniat recensuimus, atq̄ etiā ad particularem ipsorum materiā progressi, utilissimam ad artis opera facultatem omnem secundum species prodidimus. Consequenter autem ab illo opere, etiam curatiuam tractationem, quomodo quis optime non solum simplicibus, sed etiam compositis utatur, exposuimus: simulq̄ uias compositionis ipsorum omnes indicauimus. Cæterum in proposito iam opere, quomodo uarietas compositorum medicamentorum inducta sit ostēdimus, ad certos iuxta speciem scopos tum compositionem tum usum ipsorum deducentes, ampliusq̄ iudicationem eorū quæ iam ante scripta sunt docentes. Quum igitur consequenter post prædicta, ad affectionum hepatis doctrinā progredi uelimus, affectus circa ipsum consistentes non nuda doctrina, sed ratione exquisitos referemus, & ab uniuersalibus scopis curationis ipsorū: quos in curandi metho do tradidimus: ad compositionum doctrinam peruenimus. Primum igitur omnium discernendum est. Num debilitas quædā uisceris adsit, quæ admodum etiam de uentre diximus, aut etiā alia quadam affectio ipsum apprehenderit, aut citra debilitatem affectum sit, in inflammatione aut induratione, aut abscessu laborans, aut obturatione. Quemadmodū etiā an erysipelatosam habeat affectionem, aut ulcus, aut aliquam putrefactionem. Nam & in hoc hepaticā affectionē dicunt, quemadmodum etiam ore uentris affecto pleriq̄ medicici acidiote stomachicā affectionē uocant, in multis symptomatibus, non tamen omnibus circa unam affectionem acciditibus cōtingentem, sed circa multas, una quadam generali communitate comprehensas, & tamen inter se in tantū differentes, ut aliqua ipsarum maxime contrariæ existant. Quomodo enim non maxime cōtrariam quis dixerit frigidam intemperaturam calidā, humidam

Galen.

A sicca: quanq̄ secundum genys egedem sunt: fermè autem omnia contraria eadem genere si quis dixerit, non peccabit. Contrariorū enim notio contingit, ubi plurimum inter se distant. Plurimum autem distat à medijs in quocunq̄ genere, ea quæ extrema sunt, adeo ut cōtraria sæpe quidē eadem uideantur iuxta cōmuniis generis finēs, sæpe uero generalioribus cōtrarijs supra ipsa ascēdentibus, ab illis comprehendantur. Illa ipsa uero ob id omnino cōtraria sunt, quod quum unius generis sint, plurimū inter se distent, adeo ut quæ his subiacent primū & supremū genus cōmune habeant. Atq̄ hoc quidem hoc loco semel à nobis obiter & accessione loco dictum, semper in memoria teneatur, ne uidelicet cuiuspiam uideri possit à seipso dissentire, qui aliquando unam affectionē in duobus hominibus eandem esse dixerit, aliquando non unam, neq̄ eandem, sed duas contrarias. Intemperiem enim unam quandam affectionē generaliter appellant, sed quæ in contrarijs differentias secetur. Licet enim secundum hoc quod diximus, duo & tria & plura, iuxta particulares differētiās inter se contrarijsima esse, & secundum hoc debilitatis hepatis affectionē unā esse: quam intemperie nōcant: præfatus, non male rursus dixerō, non unam sed octo affectiones esse, propterea quod tot differētiās intemperierum existant. Etenim rursus iuxta aliā sectionem, duæ intemperierū differentie fiunt, & rursus iuxta aliā tres, hæc quidem in qualitatibus solis, affectis partibus affectis, hæc uero cū humoribus quibusdā, aut in spacijs affectarū partium contentis, aut in ipsis corporibus irriguis ab illis factis. Circa uentrē igitur & intestina, una in singulis est cauitas, quæ uitiatā humiditatē suscipere potest. Verum circa hepar tot numero sunt, quot sunt arteriæ & uenæ. Quū uero hæc omnes angusta oscula habeant, qua parte sima huius uisceris cum gibbis coeunt ac cōmittuntur, obturatio & oppositio uitiosorū humorū aliquando contingunt, ad quas putrefactio consequitur, breui in frigidis intemperaturis, in calidis uero non cito, sed temporis progressu accedens. Fit autē intemperatura iuxta propriam hepatis substantiā, quam Erasistratus putat præterfusionem quandam: parenchyma Græce appellat, & non principalissimā uisceris partem esse. Fit etiā intemperatura circa contentas in ipso uenas & arterias, & iuxta materias in spacijs ipsarum cōtētas. Quum autem habeat hoc uiscus non unā sed plures facultates actionū, quas uitæ tempore operatur, easq̄ tot numero, quot sunt actionum species, cōtingit sæpe unam ipsarum præcipue lædi, sæpe duas & tres, atq̄ omnes quatuor simul. Actio nāq̄ ipsius una quidem attrahere cibum & alimentum in sese. Altera uero obuoluerè & continere, donec permutans ipsum suū ipsius faciat partem. Est igitur hæc ipsius facultas principalissima & ferè prima, conquirere uidelicet & permutare ac alterare atq̄ assimilare si bippi alimentū, quam alteratiuam uocamus. quæ uero iuxta hanc alterationem remanēt recrementa, ea per aliam facultatem, quam excretiuā & ex-

tom. 5

H 3 pulso-

pulforiā nominamus, expelluntur. Ostensum autē est quod hæ facultates omnes in omnibus sunt partibus per omne uitæ tempus. Omnes enim familiare sibi attrahunt, & alienum excernunt, attractumq; temporis progressu alterant, quo tempore etiam retinent & consringunt. Vocatur autem alteratio ipsa usq; quo in similitudinē partis quæ nutritur transmutatur, concoctio. Vbi uero iam parti apponitur, nutritio. Quum igitur hepar præ imbecillitate ex uentre & intestinis alimentum trahere non potest, liquida & nondum iusto modo exsuccata, per sedem excernuntur, & si quidem uentre simul cum hoc uiscere fuerit imbecillis ac non probe concoquens, cruda. Si uero ualidus fuerit, concocta quidem, sed liquida, propterea quod nulla, aut omnino modica digestio ac distributio ad hepar est facta. Si uero traxerit quidem hepar in seipsum ex uentre & intestinis alimentum, sanguificare autem ipsum præ debilitate nequit, quemadmodum in uentre multiformis corruptio contingit eorum quæ cruda remanent, sic etiam circa hepar. Dico autem nunc cruditatem solam, non comprehendens hoc ferme tardam cōcoctionem, quod si uelis alimentum crudum permanens, & alterationem quæ fit à particula iuxta naturā non assumens, itidem crudum appellare, neq; ego fugio appellationem, si mihi saltem differentia rerum conferuatur. Peior enim est transmutatio in peregrinam qualitatem iuxta cruditatem facta, moderatior uero ea est in qua alimentum suam naturam quam diuissimè seruat, nulla alteratione ex particula quæ ad ipsum cōcoquendū à natura destinata est, suscepta. Atqui & tertia præter has, species est frustrata cōcoctionis, quum semicoctū sit alimentū. Et circa ipsam sanè exactam cōcoctionē frustratā, hepaticis sanguinolentus humor per aluū excernitur, talis consistentia ueluti si quis sanguinem cum aqua confudisset, & pleriq; sanè medici imaginem eius depingentes scripserunt talem eius compagem esse, uelut si quis uisceris recens macerata carnes aqua lauasset. Et plurimæ hepaticæ affectiones ab eiusmodi excretionibus initium capiunt, nondū magnam debilitatem hepate habent, sed adhuc concoquere, & alimentū alterare uelut in formam sanguinis poterat; aucta autem affectione, nihil amplius tale excernitur, sed multiformes aliæ qualitates & compages, uelut à uentre ex cruditate laborante. Verum in uentre ciborum ipsorum corruptiones manifeste apparent, circa hepar uero distributum alimentum ad sanguinem prius in uiscere existentem ammissetur, corrumpiturq; temporis progressu etiā hic, unā cum alimento circa ipsum non concocto. Calida igitur intemperie circa uiscus existente colliquationes fiunt, primū humorum, deinde etiam carnis ipsius hepatis, & euacuantur per uentrem bilis crassa, graueolens, & abunde colorata, quemadmodū in pestilentibus febribus contingit. Frigida uero intemperie existente, neq; assidua excretiones, neq; multe fiunt, Durat tamē affectus diutius, & per aliquos dies profluet

A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
V
X
Y
Z

ipsis uenter maiori copia, cuius neq; foetor similis est his quæ ex calore sunt liquefacta, neq; color similis, aut compages, uerū minus graueolentia ab his excernuntur speciem putrefacti sanguinis, non colliquate carnis habentia. aliquando uero id quod excernitur uelut sanguis niger apparebit, Verum diligenter cōsideranti neq; sanguis niger est, neq; grumus, sed uelut limus quidam sanguinis crassi, qui prope ad atram bilem accedat, & plures acregre iudicabiles colores circa eiusmodi affectionē in egestionibus apparent. In utraq; autem intemperie tum calida, tum frigida, quando intemperatura humida & sicca fuerint ammixta, liquidiora in humiditatis complexu, sicciora uero ex siccitatis copula, sient recremēta. Scopus igitur curationis in eiusmodi affectionibus sit cōmunis quidem iuxta intemperie contrarietate, peculiaris autem unicuiq; per cuiusq; contrarietatem. Affectio igitur Hepatica peculiariter appellata, ueluti etiam cœliaca & stomachica, citra tumores præternaturam circa ipsas partes contingit. Inflammatum enim esse hepar, aut abscessu laborare, aut in duratū esse, medici dicunt, aut aliud quippiam tale, Non tamen hepaticum uocant hominem ipsum cui tale quippiam accidit; Verum quando citra manifestum aliquod in uiscere malum, in propriis actionibus debilitatur, tunc ægrum hepaticum appellant. Videamus igitur primum ea quæ scripserunt hi qui ante nos de pharmacis optime & studiosissime tradere fategerunt, initio ab his quæ Andromachus prodidit facta. Hic enim uir in libro internarum affectionū curationes continente multas hepaticas confessiones conscripsit, quarū omnium faciā mentionē hoc loco, ipsius uerbis in medium adductis, & primum sanè Antidotus adscribam.

Que pharmaca ad Hepaticos ab Andromacho sunt conscripta. Cap. VII

Andromachi antidotus Cyphoides ad hepaticos, & omnia thoracis uitia. Vuræ passæ carnis drac. xxv. alij drach. c. croci drach. i. alij oboli. iij. calami drach. ij. & dimidiam. bdellij drac. ij. & dimidiam. calsiæ sesquidrachmam, cinamomi obol. iij. spice nardi drach. iij. floris iunci odorati drac. ij. & dimidiam. myrrhæ drach. iij. terebinthinæ drac. iij. alij drac. xvi. ramentorū aspalathi drac. ij. mellis drac. xvi. uini quod satis est. Hæc quidem est Antidotus descriptio: Appellauit autem hanc cyphoides, hoc est, cyphoeiformem, ob similitudinem. Nam & odore & gustu similis est cyphi ab Aegyptijs appellato, qui sanè primi hoc pharmacum composuerunt, & utuntur eo quotidie ad uaporem edendum accenso in deorum honorem. Plurima autem eorum quæ in illo thymiamate & suffumigio scripta sunt, eadem sunt cum his quæ in hoc pharmaco habentur, quin & suffumigari hoc ipsum similiter ut cyphi potest. Compositum est autem ex moderate adstringentibus, & resiccantibus ac discutientibus uiciosis ferrosos humores, & corrigentibus humorum maliciam, & contrariam uim habentibus aduersum putrefactiones, quorum plurima ex aromatu sylvæ existunt. Hab-

bet itaque pharmacum hoc cinamomum omnes putredinosas & uenofas facultates corrigens, non solum seroforum & aliorum humorum, sed etiam lethalium pharmacorum. Quemadmodum & feris uirus eiaculantibus contrarium existit. Consequenter autem post cinamomum, castia eandem uim habet, optima uidelicet & cognata ipsi cinamomo, & post hanc omne aromatum genus uelut hic est nardus, & iuncus odoratus, calamusq; & myrrha. Hæc enim ad propositum pharmacum iniecta sunt, iuxta iam dictam ratiocinationem & modum. Quemadmodum etiam ex his quæ apud nos gignuntur, aspalathus & crocus, adstringens & concoctorium pharmacum, & quod corrigit putrefactiones.

Cæterum uua passa contemptiliss uideri possit, ob familiarem eius usum, ut uero hoc ipsum eam facit utiliore. nam quum familiaris nobis sit, in tantum adstringens est, quantum opus habet uiscus affectum. Habet autem & uim concoctorium crudorum humorum, & uim coecendi maligna, siquæ ipsa haud facile putredini obnoxia, & ultra hæc secundum totam substantiam uisceri ipsi familiaris est & propria. Didicimus enim quod alimenta secundum totam suam substantiam proprietatem ac familiaritatem habent ad ea quæ adiuntur, quod maximum est in huiusmodi affectionibus curatis quæ iuxta intemperiem fiunt. Optime enim in ipsis faciunt quæ una cum hoc quod intemperiem curant, etiam alere possunt, & ob id etiam uinum conuenientissimum est, citra inflammationem, aut erysipelas, aut abcessum, aut calidam intemperaturam, ægrotantibus. Nam & nutrit, & concoquit, & roborat, & putrefactioni resistit, & si intemperies ex humiditate facta sit & frigidityte, eam citra omnem molestiam ac secure perferat. Eadem est & mellis facultas præterquam quod non condensat substantiam corporum quæ contingit, sed pro hoc uim extergendi, & aperiendi, ac puros reddendi meatus, & urinam ciendi, non parua sanè auxilia possidet. Porò ammixtum est à compositore pharmaci bdellium, sufficienter emolliens & concoquens, uelut didicimus, ampliusq; moderate discutiens. Consimilem ferè uim terebinthina resina habet, supra hoc quod angustos meatus extergit & expurgat, quibus auxilijs uiscus curandum opus habet, quo osculorum uenarum in ipso commissuræ laxæ & ab obturatione liberæ permaneant. Didicimus nanque quomodo obturatio efficiat putrefactiones. Aliqui tamen huiusmodi confectio compositores, quemadmodum etiam prius in stomachicis dictum est, opium aethiopyam, aut quippiam aliud ex refrigerantibus miscendo, ad calidas intemperies utile pharmacum effecerunt. Et ob id etiam Philonis Antidotus misticæ semel tantum exhibita, hepaticam intemperiem sanauit, id quod & compositor eius testatum reliquit. Verum ex pharmacis hepaticis ab Andromacho conscriptis nullum est huiusmodi. Et sanè uehementer refrigerans nullum

A esse debet, sed qualia tum ab alijs, tum ab Asclepiade sunt scripta. Nunc igitur hepaticas antidotos consequenter ab Andromacho proditas subscribam, modo memoria nos teneamus, nullam ipsarum calidis intemperaturis conuenire, sed aut humidis uidelicet, aut ex utrisque compositis, aut certe humidis quidem fortiter, calidis uero moderate. Conscribentur autem omnes iuxta ipsius Andromachi dictionem. Alia Cyphoides ad hepaticos, ex libris Galli, ad tusses item & reiectiones. Croci drachmam unam. myrrhæ drachmam unam. bdellij drachmas quatuor. aspalathi obol. quatuor. iunci odorati drachmas tres. calami drachmas duas. castiæ drachmam unam. nardi Indicæ drachmam unam. terebinthina drachmas sex. carnis passarum uuarum drachmas centum & sexaginta. mellis heminam dimidiam. Vini chij quod satis est ad macerandam uuam passam, bdelliumq; ac myrrham. Resinam uero melle liquefacito, & deinde omnia mixta ac trita reponito. Alia ad Hepaticos & Ictericos. Amygdalarum amararum drachmas duas. anisi drachmam unam. absinthij, cumini, seminis apij, singulorum drachmam unam. cornu cerui obol. tres. trita cum aqua in pastillos triobolares redigito, ex eisq; unum mane ac uesperis, cum uino mulso dato. Nectarea Antidotus ad hepaticos & arquat laborantes. helenij sesquilibram. crocomagmatis libras duas. aristolochiæ unciam unam. petroselinij unc. i. pipperis nigri unciam dimidiam, myrrhæ unciam unam. mel quod satis est. Antidotus hepatica Athanasia appellata. Facit & ad nephriticos & ictericos. multum mouet sudorem. Croci drachmas duas. cinamomi drachmā unam. nardi drachmas duas. castiæ, myrrhæ, iunci odorati, singulorum drachmam unam. melle Attico excipe. Datur fabæ græcæ magnitudine, febricitantibus ex aqua mulla. Hepatica admiranda, qua Pharmaceus herbarius ægrotus usus est. Croci drach. ij. mei, asari, phupontici, dauci, petroselinij, myrrhæ, singulorum drach. iij. nardi Indicæ & celticæ, utriusq; drach. vi. costi, castiæ, iunci odorati, singulorum obol. iij. carobalsami drach. iij. & dimidiam, rubiæ drach. viij. succi radice dulcis drach. tres. hemionitidis herbæ drach. tres. polij drach. iij. succi balsami drach. vi. confectio hedychoi drach. v. mellis quod satis est. Vtere, ad omnia uitia efficax est, nucis ponticæ magnitudine, cum uino mulso. Antidotus Hepatica à Ne archo laudata. Radicis panacis, rubiæ, eryngij, eupatorij, helenij radicis, polij, costi, aristolochiæ, piperis, scolopendrij herbæ, seminis cucumeris, chamæpityos, radicis gentianæ, milti siue rubricæ sinopidis, fellis ursini, spicæ nardi, baccarum iuniperi, seminis brassicæ, seminis cruce, singulorum par pondus, melle Attico cocto excipe ac utere.

Antidotus Hepatica, Dioscori. Cinamomi, castiæ, utriusq; drach. iij. croci, nardi, costi, seminis balsami, hyperici, glycyrrhizæ, singulorum drachmas viij. Excipe melle Attico, ac exhibe nucis ponticæ magnitudine.

Alia ad Hepaticos, et reliquos internos affectus, A
 ut Aristoteles. Piperis grana xl. myrrhę drach. viij.
 croci, costi, mei, acori, nardi, dauci feminis, petro-
 selini, scordij, singulorum drach. iij. cinamomi
 drach. xij. casisę drach. xij. Mellis quod sufficit.
 Das nucis ponticę magnitudine. Potio ad sple-
 niticos, nephriticos, hydropicos, auxiliatur & sto-
 machicis, & molestijs ex partu, & conuulsis. Pro-
 dest conualescentibus & se rescipientibus ex infir-
 mitate, facit ad uitiosos humores, ictericos & tus-
 ses, ac pleuriticos. Est etiam antidotus ad letalia
 pharmaca, & ad ferarum plagas. Nardi indi-
 cę drach. iij. costi drach. ij. casisę drac. i. croci drac.
 i. piperis albi obol. v. alij drach. ij. feminis apij drac.
 i. obol. iij. iridis silyricę tantundem. acori drach. i.
 obol. i. opobalsami drach. i. succi ari masculi drach.
 iij. Vuę passę exacinatę drac. vi. Terito cum pas-
 sę, aut melle excipito & drach. i. cum uino dulci di-
 luto dato, aut cum aquę mulfę cyathis iij. aut ut
 conueniens fuerit. Hę quidem sunt Hepaticę con-
 fectiones ab Andromacho proditę. Transibo au-
 tem iam in de eas quas Asclepiades tradidit in
 tertio interorum, Quę Mnasoni inscribit.

Confectiones Hepaticę ab Asclepiade conscriptę. Cap. VIII

Primam equidem confectionem Asclepiades
 Antonij Musę esse dicit, hoc modo compositam.
 Succı cichorij cyathum unum cum aquę calidę
 cyathis iij. dato, mellis Artici cochleario addito.
 Aut filicis uel anethi succi cyath. i. cū aquę mulfę
 cyath. iij. dato. Aut picridis recētis, aut seridis recē-
 tis succi cyath. i. cum aquę mulfę calidę cyath. iij.
 Hęc prima est descriptio tritum pharmacorum in
 Asclepiadę libro. Cichoria itaq; & seris cibarij
 generis existunt, Apud nos nanq; rurales ambo
 hęc edunt & cruda & cocta. Vtut eis etiam Era-
 siltratus abunde in affectionum circa aluum cura.
 Facultas horum olerum subfrigida est & sub-
 amara ac moderate adstringens, & propter has qua-
 litates, optima pharmaca calidis intemperaturis
 ipsius hepatis existunt. Ultra hoc enim quod mo-
 derate refrigerant, amplius & robur uisceri addit
 per astringentiam facultatem. Insuperq; commissuras
 osculorum uenarum in sima uisceris parte ad eas
 quę in gibba sunt, extergent. Neq; uero frigiditas
 intemperies magnoperę ledunt, quemadmodum
 quę frigidam humiditatem absq; adstrictione aut
 amaritudine possident, facere solent. Iuare etiã
 uiscus talium olerum substantia potest, etiam si ci-
 tra serosorum aut aliorum humorū uitiationē in-
 temperies fiat per se, & cū humiditatis cuiuscunq;
 complexu. ex mixtura enim mellis, humiditatem
 per urinam educunt. Quapropter etiam si siccata
 tusa quis portio inspergat, itidem iuuat. Quin &
 decoctorum decoctum potatum multum com-
 modi affert. Si uero non calida aliqua intemperies
 infestet, aut si obturatio quadam sit circa uiscus,
 magnopere auxiliantur ex uino albo tenui pota-
 ta, cum his quę urinam ciunt. Vtilis autem non
 solum succus ipsorum est tum recens, tum exsicca-
 tus, sed & ipsa olera exsiccata tusaq; ac trita potui
 inspersa, & eorum decoctum in potu acceptum,

auxiliantur. Ceterū ad uisceris expurgationem &
 meatuum aptionem, citra manifestam calfactio-
 nem aut refrigerationem, optimum pharmacum
 filix est, prædominantem habens amarum qualita-
 tem. Anethum uero nihil forte habet ad huiusmo-
 di affectiones, sed modice refrigerati ac condensa-
 ti uisceris curatiuum existit. At uero catapotionum
 ex chamępity, cuius itidem meminit, eiusdē cum
 prædictis facultatis est. Amarū enim & hoc phar-
 macum est. Nihil igitur mirum est, ipsam chamę-
 pityn tum per se, tum cum cichorio potatam, he-
 paticas intemperaturas iuuare. Quemadmodum
 Asclepiades scripsit in hæc uerba.

Catapotion hepaticis. Radicis chamępityos
 drach. viij. radicis cichorij drach. iij. contunde &
 excipe melle cocto, ac præbe nucis ponticę ma-
 gnitudine, & aquę calidę cyathos tres in super-
 bibendos. Hęc Asclepiades scripsit. Iuuant au-
 tem prædictę hepaticos, non solum radicibus ipsa-
 rum acceptis & preparatis uelut Asclepiades pro-
 didit, sed & succo, & decocto, & arida coma una
 cū semine tusa ac trita, assumptis. Quin & Sphen-
 damni, id est, aceris radix tusa trita, nam & huius
 meminit, eiusdem est cum prædictis facultatis. Ex
 hibet autem ex ea drach. i. cum uini nulli diluti
 cyathis tribus. Insuper & ex nardo celtica phar-
 macum; cuius item meminit; his cõsimile est. Scri-
 psit autem ipsum sic. Nardi celticę partes tres, ab-
 sinthij partē unã, tusa & cribrata melle cocto ex-
 cipito, & mystrum delingendum dato. Et quod
 post hoc scriptum est cõsimile ipsi existens in re-
 liquis, plus habet de ui expurgandi ipsum uiscus
 per urinas. Scripsit autem sic Asclepiades de ipso.

Pastillus hepaticus. Anisi, feminis apij, alari,
 amygdalarum amararum mundatarum, absinthij,
 singulorum drach. iij. præpara cum aqua & reduc
 in pastillos, ac exhibe drach. i. cum uini diluti cyathis.
 iij. febricitibus cum aqua mulla. Hoc phar-
 macum leniter quodammodo est calidum, pro-
 pter urinam cientium mixturã. Reliqua uero om-
 nia superiora, aut prædominantem habent frigiditatem,
 aut omnino neq; hanc, neq; caliditatem. Verum uim
 extergendi, & uias digestionis ab ob-
 turatione uindicandi, omnia habent. Alia insu-
 per medicamenta Asclepiadę scripta sunt, partim
 extergendi ac aperiendi & secandi uim habentia,
 partim uero calidiora paululū quàm sunt media.
 media autem dico quæ neque calfaciunt, neque
 refrigerant manifeste. Vnum uero inter ipsa cal-
 factorium est, ubi ait, costi triti cochlearium præ-
 be cum aquę mulfę calidę cyath. iij. Reliqua ue-
 ro quę prope ad medium temperamentum accedunt,
 ad caliditatem uergunt, hæc sunt. Helenij
 drachmas xij. crocomagmaris drachmas viij. ex-
 cipe cichorij succo & fac catapotia, eaq; pro uis-
 bus exhibe. datur ad summum drachma ex uini
 nulli diluti calidi cyathis tribus.

Hoc pharmacum poterat absq; helenio etiã ca-
 lidis intemperaturis conuenire. Quando uero he-
 lenium extergentibus ammixtum est, ad calidi-
 tatem uergit, nisi quis omnino modicum de eo
 cum

cum multa frigida permisceat. Quin & id quod ex foeniculo conitar calfactorium est, sic habens, foeniculi drach. i. petroselinii drach. ij. anisi, amygdalarum amararum, absinthij, singulorum drach. i. croci, myrrhæ, utriusq; obol. iij. excipe aqua ac redige in pastillos, & dato drach. i. ut supra prædictum est. Etenim hoc loco foeniculum quidem & petroselinum, multum calfaciunt. reliqua uero moderate, amygdalæ uero attenuatorie sunt facultatis, & præsertim si fuerint amara. Medium aut quodam modo inter calfacientia & refrigerantia est hoc pharmacum, quod Asclepiades scripsit hoc modo. Eleagma hepaticum Paulini, auxiliatur confestim. Chamæpityos sicca lib. i. myrrhæ unc. i. passî protopij sextarios iij. Chamæpityon & uinum dulce coquito, & ubi super fuerit tertia pars, liquorè exprimito, eiq; mellis Attici libram dimidiam adjicito ac rursus coquito. Postea uero myrrham addito assidue agitando, atq; ubi dissoluta fuerit, ab igne ablata reponito, & ante cibum mystrum exhibeto. Scripsit & ex cochleis pharmacum hepaticum Asclepiades huiusmodi. Cochlearum trium carnem ualde probe terito, & affusus uini nigri cyathis tribus calfacto, ac bibendû dato. Videtur autem hæc iuxta totam substantiam efficacia esse, non secundum unam aut alteram qualitatē. Quale est & Lupinum hepar, cuius abunde experimentum habemus. Vnus autem ipsius consimilis cochleis est, teritur enim exacte hepar lupinû, & dat drach. i. cû uino aliquo dulci, qualia sunt theracum creticum, & scybelites, ac dulce protopium. Benigna enim hæc sunt uiscerî, ipsum nutrire potentia, & media iuxta calidâ & frigidâ oppositionem, & ob id talia pharmaca omnibus intemperaturis conuenire uidentur, ut quæ ex substantiæ proprietate commoditatē de se exhibent, & neq; calidas neq; frigidas intemperies lædant. Atqui in febricitantibus manifesta febris, aut non obscure, uelut solet aliquibus hepaticis accedere, melius est ex aqua calida pharmacum præbere, aut ex aliquo prædictorum succorum, uelut est ueritas succus. Ad induratas hepatis affectiones. Et ad has Asclepiades quatuor pharmaca his uerbis scripsit. Confectio ciēs urinam, facit ad induratas hepatis affectiones, ac splenicos, & ægre se à morbo recolligentes, a hydriopicos, & in uniuersum bonum colorem inducit. Croci, nardi, calsiæ, singulorum drach. ij. costi, floris iunci odorati, cinamomi, myrrhæ stactæ, singulorum drach. i. mellis cocû drach. xxv. Datur fabæ Aegyptiæ magnitudine cû uini mulsi cyath. iij. Alia qua usus est Pasicrates: Vrinam multam ducit. Seminis dauci sesquidrachmam, radicis rhei ponticæ, floris iunci odorati, seminis balsami, cedridû, anisi, nardi indicæ, croci, cinamomi, calsiæ, phur, asari, petroselinii, chamæpityos, singulorum drach. i. mentæ sicca obol. iij. nucleorû pinearum nucum repurgatarû numero l. Excipe melle cocû & dato nucis ponicæ magnitudinem, cum uini mulsi diluti cyathis iij. Alia antidotus ex felle ursino, pharmacum accommodatum ad induratas hepatis affectiones. Chamæpityos, marrubij, seminis pe-

trofelinii, gentianæ, seminis uiticis, fellis ursi, sinapis, seminis cucumeris, scolopedrij, panacis, rubricæ lemnia, rubiæ, seminis brasiçæ, aristolochiæ, piperis, nardi indicæ, costi, seminis apij, seminis eruca, eryngij, polij, echij, eupatorij, baccarû iuniperi, singulorum drac. i. rusa, cribrata, melle excipe. Dat nucis auellaneæ magnitudo in uini mulsi cyathis duobus. Alia accommodata. facit & ad alias internas affectiones citra tussim. Radicis gentianæ, chamæpityos, marrubij, seminis petroselinii, fellis ursi, sinapis, seminis cucumeris, scolopedrij, panacis, rubricæ sinopice, rubiæ, seminis brasiçæ, aristolochiæ longe, piperis albi, spice nardi, costi, seminis eruca, eryngij, baccarû iuniperi, seminis fraxini, chamædryos, dictamni cretici, seminis cestri, seminis dauci, singulorum unc. i. mellis Attici qd satis est. Datur nucis ponticæ magnitudo, liquor sit passî cretici cyathi ij. Hoc pharmacum usu & experimento approbatu est. In alio exemplari etiã pelecini tantundem habetur. Circa prædicta quatuor pharmaca recte fecit Asclepiades quod non simpliciter adscripsit, uelut in alijs, quod ad hepaticos ipsis sit utendum, sed cum appositione, ac induratas uidelicet affectiones. Humidæ etenim uisceris affectiones, exolutum & imbecille ipsum face re solēt, ueluti sunt articuli laxati: siue autem cum frigiditate, siue cum caliditate, siue sine his, laxitas ipsius sola cõsisterit, penitus adstringētibus pharmacis opus habent uerum hoc aut cum calfacientiu mixtura, si frigida qualitas prædominetur, aut cum refrigerantium, si calida. Quæ uero ob frigidos & crassos ac uiscosos humores in solidis corporibus imbibitos indurantur: ex necessitate frigidam habēt affectionem. Quare & calfacientibus simulq; tenuium partium pharmacis opus habet. Hæc enim sufficientia sunt, & ad uiscositatem humorû induratis partibus infarctorû extergendâ, & ad secundam crassitudinem, & discutendos ita extenuatos. Verum in quinto de simpliciũ pharmacorû facultate, ubi de eiusmodi affectionibus sermo mihi habitus est, emollientiu medicamentorum mixturam laudauit, nimirum ut præparantem indurata corpora, & prædictis pharmacis idonea facientem: citra uero præmollitionem, diffunduntur quodammodo ea ipsa corpora, & euestigio manifestam immutationē habent, sed in immedicabiles reliquias terminatur res ubi fuerint superreficcata. Hæc eadem & in xiiij. methodi curatorijs nobis sunt dicta. Igitur & circa hepar cõiectare oportet emollientiu mixturam. nam quod copagis humectet sit hepatis corpus, ualde moderatis opus habet emollientibus: prædominatur itaq; in ipso, præter aliarum partium induratarû morem, calfacientium & ad attenuantium mixtura. Merito ita que ex præscriptis quatuor pharmacis Asclepiades postremum maxime laudat, ut quod multam de se experientia præbuit: ex aromatis enim cum ponit attenuare ac discutere ualētibus: aliaq; pharmaca adsumpta, acria secantiaq; ac discutioria: mitigatoria aut his ammissa sunt, cucumeris semen ac iuniperi baccæ. Deinde uero mel & eryngium;

uelut urinam cientia his addita sunt, quo exterfa uisceris affectionis per urinas deductio fiat.

Que Archigenes ad Hepaticos in secundo pharmacorum secundum genus scripsit. Cap. 9

In hepaticis conueniente prægreflo ductu per alimenta, unctiones, cōmunia cataplasmata, uenæ sectionem, cucurbitas, sinapismos, dropaces, & consimilē diætā, amplius conscribendis compositis potionibus & malagmatis optime ipsis cōuenientibus utaris. Et potionibus quidem his. Senecionis decoctum ut ualde commodum exhibe to. Nascitur autē huius caulis maxime in tegulis. Aut ungenti nardi cochlearia. iij. quotidie bibenda dato, & maxime in induratis. Aut aristolochiæ obolos iij. propinato febrientibus ex aqua, febre carentibus ex uino, ualde benefacit. Aut trifoliū acidum in aqua coquito ad tertias, & per triduum bibendū dato pro uice cyathum unum.

Aut fel ursinum in uase leniter seruesfacito, & in sole resicato, atq; ex eo hepaticis cochlearium unum dato. Aut radices rubi corticis minā unam cum aquæ congio uno, in nouo uasculo ad residuum quartæ partis coquito, & ad succum per noctem sub dio expositum mellis cyathos vi. ammisceto, & ieiunis ad triduum bibendum dato. Aut pseudobunij obolum unum dato cum melle ieiunis. Aut dauci & feniculi radices utriusq; minā dimidiā cum aceto mulso ad tertias coquito, & ieiunis cyathum unum exhibeto. Aut glycyrrhizæ succi obolum unum aut duos ieiunis dato, & aluum subducit, & urinam mouet. In magna duricia abrotoni succum quā crassissimū præbe bibendum. Aut acori obolum i. panacis tantum dem, cum aqua propinato. Aut spicæ nardi decoctum assidue exhibeto.

2 De Cataplasmatibus. Cataplasma porro Hepaticū sit, malis cotoneis cum farina ordeacea & feno græco coctis. Aut semine lini trito cū polenta in uino cocta. Aut semine lini trito cū melle subacto. Aut capparidis radice in aceto mulso cocta. Aut farina ordeacea cū ficibus. Aut oleo radice in uino cocta. Aut myrobalano tusa cum uino. Aut cerato ex phœnicobalanis facto. Summe enim ad hepatis inflammationes facit, maxime in quibus etiam stomachus affectus est, & costæ dissentæ sunt. Aut palmulam resecto interno nucleo diligenter tundito, & cum æquali parte cerati rosacei in mortario probe unito, rosacēū adstillando atq; ita imponito. Aut myrrhā aminæo uino macerato, & palmulis ammisceto, & linteolo infarta imponito. Ceterum malagmata quibus quis uti possit in inflammatione hepatis citra manifestam causam, post irrigationes & cataplasmata, iam ante scripta sunt in sermone de oris uentris inflammatione, nimirum cōmunia illi & hepatis existentia, in quibus sunt etiam quæ ex meliloto præparantur, & polyarchium. Verum etiam nunc apponentur quædam ex ipso Andromacho. Malagma Andromachi ad hepaticos.

Ammoniaci Thymiamatis, drach. cxliiij. alij 3 centum habēt. bdellij drach. xxiiij. alij centum. a

ceti heminas iij. cyprini heminā unam, ego uero heminæ dimidium. Malagma Apollonias.

Ceræ drach. lxxx. ammoniaci thymiamatis drach. lxxx. terebinthinæ drach. xl. mannae thuris drach. xl. cum irino contundito.

Malagmata à Damocrate conscripta ad hepar & præcordia. Que dā ex eis etiā ad totum uentrē, & splenem. Cap. 10

Affecta si quis per stomachum præcordia, Et per secur, intestina per, dein per colum, Per uentriculum, aut uiscus aliud sic proprie Dictum, uolet inquam læsa quis præcordia Malagmate integere bono & per commodo, Primum paratum habebit hoc longe antea, Infirum enim atq; inualidum est factum recens.

Ceræ capit quod ponticæ libras duas, Ammoniaci Thymiamatis solam libram, Terebinthinæ frictæ pariter solam libram, Vitæq; resinæ picæ simul libram,

Et post trientem cardamomi seminis, Aridæ cyperi tantundem, item myrrhæ bonæ, Pondusq; par unum horum iridis mox candidæ, Sextantem & inde celticæ spicæ integræ, His unciā unam & dimidiā croci boni Et sex meliloti, item duas, besselm puto. Verum melilotum præsterit hic Atticum, Recentis & cyprini libras olei duas.

Oleum cyprinum tu cum reliquis liquoribus Et decoque lenta flammula, & deradito. Dein tusa cribrata & reliqua, uino bono Rigata, per noctem integram & totam diem, Vinum omne donec combibant seponito. Vnctisq; post cyprino manibus, hæc pharmaca Mortario amplo uni, & simul committo, Mollisq; pelle tecta sic reponito.

Aliud Malagma eiusdem. Aliud ualens ætas itidem si accesserit, Verum hoc mage affectus uiciatæ mox habitum, Quicunq; non cum flatibus, feruentibus Et phlegmonis lædunt diutioribus, Et uiscera irritant grauibus doloribus, Iuuat: solubiles male & iam duritias Dissoluit, exoluta earum compage.

Paratur hoc modo, ut bonæ terebinthinæ Libram mediā, tantumq; ceræ ponticæ, Fœnicij: græci unam capias puri libram,

Et de nitro, & de panace unicam libram, Rursus anisi seminis unicam libram, Pinguēdinis puræ uituli simul libram, Pondusq; par contusæ & albide iridis, Parum de aceto, tres cyathos sine dimidio, Mellis duas libras recentis Attici, Ammoniaci thymiamatis solam libram

Quidam addidere, uerum alij libras duas. Sic tusa, cribrata, & cataplasmatibus modo Cum melle mixta, & pauca aceti stillula, Donec fuerint mollita tæui coquito. Atq; hinc liquatam ad cerulam, & pinguedinem, Terebinthinam & calentem adhuc adijcito. Et uasculo maiore derafa excipito, Manibus subacta dein simul committo. Nec utere mox, inualidum est factum recens.

Aliud Damocratis malagma.

Odorū & hoc, tollensq̄ mox uicia hepatis,
 Affectiones renibus, colo & graues.
 Stomacho simul et uulua diuifusculas.
 Idemq̄ iam corrupto habitu super datur,
 Morboq̄ longo pallidis, hydropicis,
 Et qui male concoquunt cibum, & fastidiunt.
 Habet hoc amomi Scythici, xylobalsamī,
 Et cardamomi, bdelliq̄ lucidi,
 Arida Cypri, thuris boni, omnium parem
 Modum, libram. post casia daphnitiadis,
 Myrrha bonae, pariter croci, de singulis
 Libra trientem, aut amplius quid paululum.
 Nardi bonae post Syriacae uncias duas,
 Terebinthinae purae bonae libras duas,
 Albæq̄ cerae perpolitae unam libram,
 Recentis unguenti cyprini libram unicam,
 Vinifaleni hinc optimi sextarium.
 Contusa alia cribro tenui concernito.
 Thus, bdellium, in mortarium conijcito.
 Myrrham bonam, simul crocumq̄ his addito,
 Fractisq̄ unum cum cyprino confundito,
 Dein tundito, mellisq̄ crassitudinem
 Formato, & his aromata mox trita addito.
 Et quod superest unum addito, committito,
 Totam diem noctem simul quo combibant.
 Terebinthinam uero, cyprinum, ceram & simul
 Igniliquata lentulo, his affundito.
 Vinctisq̄ post manibus per unguen quodpiam,
 Subactalic committito, & reponito.
 Nec mox parato uti uelis tu pharmaco,
 Sed tempore interiecto, & hoc ceratulo
 Partim polito, ut mollius sit, addito,
 Quamquam potes solo uti etiam, raro tamen.
 Aliud Damocratis malagma.
 Aliud malagma ad iam relatas commodum

ARGUMENTA CAPITVM LIBRI IX.

Cap. 1. De ictericis. 2. Pharmacia icterica Andromachi. 3. Asclepiadis. 4. Archigenis. II. De splenis affectionibus. 2. Potabilia Andromachi ad splenicis. 3. Asclepiadis potabilia. 4. Eiusdem epithemata & emplastra ad recentes splenis inflammationes. 5. Eiusdem ad induratas etiã affectiones. 6. & 7. Ad splenicis & hydropicos, eiusdem. 8. Archigenis. III. De hydropice siue aqua inter cutem. 2. Andromachi ad hydropicos & inflationes. 3. Archigenis.

CL> GALENI PERGAMENI DE

COMPOSITIONE PHARMACORVM SECVN

dum locos Liber nonus.

De ictericis. Cap. I



IVNT quidem Ictericis ratioe bonae iudicatiõis in febribus, proruente nimium ad cutem bilioso humore, & facile sanæ hi curantur balneis aquarū potabilium, & olei discussorij affictu, omniumq̄ rarefacientiũ cutem, Quale est anethinũ oleũ, & chamemelinũ ac cicinũ. Post hæc etiã ungenta faciũt, gleucinũ, crocinũ, deinde irinũ & amaracium. Verum alias cõfectiones priuatim ictericas appellatas suis autorib. ne putes ad huiusmodi

A Affectiones, si fuerint dñtinæ. Conferet lienosis uel omnium optime, Si palluerint, & si febricitauerint, Aquamq̄ habeant præcordia his si pauculam, Multam nequeunt curare enim malagmata. Ficus cape pingues sicciore, sed nouas. Et semine eiecto, simul umbiliculo, Appende drachmas quinq̄ denas insuper, Albæq̄ cerae ponticæ parem modum, Myrobalani pinguis libram post integram, Nitri marini sed libram modo dimidiã, Aluminis scissi duas supra & decem Drachmas, superq̄ dimidiã, triobolon. Et mox onychis, quod sic uocatur, bdelliq̄ Adde parem tu aluminis dictum modum,
 B Nitro parem florem lapidis sed Afis, Ammoniã tantumq̄ thymiãtis. Et seminis post filiculã, & nasturtij, Et cardamomi, quã optimiq̄ origani, De singulis sextarij quartam modo. Viniq̄ post, irini unguinis, quod sufficit. Paratur at tandem malagma in hunc modum, Vino rigatum suaueolenti bdellium Mortario emollito, & hinc adijcito Ficus, simul rursusq̄ rite tundito, Quo trita uini stillulis fiant prope, Mixture mox addatur inde inspersilis. At post rigatam feruida ceram ex aqua Mollem manibus factamq̄ latam adijcito, Et tusa mox ligni radio compingito,
 C Guttis & unguinis frequens madefacito. Vfus malagmatum omnium, quæ uentriculo Induntur, & stomacho, simul interaneis, Est tempus, in quo qui cibus congestus est, Non amplius relidet, sed aluum iam subijt. Finis octauũ libri.

III. De pharmacia dolore sedantibus anodynis & colicis appellatis. 2. Philonis antidoti descriptio carmine, eiusq̄ explicatio. 3. Colica pharmacia Andromachi. 4. Asclepiades ad colicis affectus. V. De dysentericis & primũ remedia Andromachi. 2. Alia eiusdẽ. 3. Infusa pro dysentericis. VI. De affectionibus & uicis sedis. 2. Andromachus. 3. Ad prolabantẽ podicẽ. VII. De hæmorrhoidib. VIII. Ad pudõdo rũ affectiões. IX. De priapismo. X. Ad uteri affectus.

ictericos conuenire, neq̄ enim hoc illi ipsi de his prodiderunt, sed ad eos ictericos qui ualorũ circa hepar obturationem habet. Imò etiam eos qui ex inflammatione icterici fiunt. Itaq̄ qui icterum seu Regium morbum ex obturatione incurrunt, sine febre permanet, Qui uero ex inflammatione, omnino febricitant. Quicũq̄ igitur in pharmacia ictericis adscripserunt, in quibus ea ipsa conuenire dicant, hie recte fecerunt. Qui indiscriminatim & simpliciter protulerunt, non parum peccauerunt. Etenim quæ multum medicamentaria sunt, itidemq̄ facultate calida, magnopere febricitantes lædunt. Talia sunt gentiana, struthion, hebenum, costus, aristo

aristolochia, posium, centaurea. Conueniunt autem iſtericis ex inflammato hepate, quæcunq; in inflammationes fanant. Quemadmodum etiam his qui ex obturatione, omnia quæcunq; strenue ex tergent, etiam si medicamentariam substantiam habeant, & calidæ sint facultatis. Si uero coincident simul obturatio & inflammatio, laxantibus simulq; extergentibus opus erit. Fugienda autem quæcumque medicamentariæ substantiæ, & calidæ facultatis existunt. Quum igitur & pleriq; ante melitrica pharmaca indifferinatim cõscripserint, ego propria discrimina singulis ipsorũ adijciam, quo sciat is quibus nam in febribus citra periculum uti queatis, & quibus maius ex exacerbatione febris et inflammationis detrimentum subsequatur, quam ex extersione emolumentum refulet.

De pharmacis iſtericis ab Andromacho scriptis. 2

Andromachus quatuor pharmaca ad iſtericos indifferinatim tradidit, minime quidem periculosi usus in his qui non febricitant, uerum non securi in febricitantibus, & maxime si cum uino aut uino mulso ea exhibeat, quemadmodum aliquando damus in febribus moderatis, & uisceris obturatione. Quare ex aceto mulso non ualde acido securus tunc ea quatuor pharmaca propinant, quæ iuxta illius dictionem sic habent. Ad iſtericos.

In colocynthidis calicem uinum fundito, calcasico, ac bibendum dato, subducit aluum. Idem & thus facit. Aliud ad iſtericos. Adianti obol. iij. nardi obol. ij. absinthij drach. i. myrrhæ obol. ij. Excipe passio, ac dato nucis auellanae magnitudine, ex aquæ cyathis. ij. Aliud ad iſtericos quo utor.

Struthion cum croco coloratum, nucis ponticæ magnitudine ex aqua aut aqua mulsa dato. Datur & Anchusa cochlearij mensura. Aliud ad iſtericos, ut Apollonius. Erui drach. xxiij. cornu cerui usti drach. viij. thuris drach. iij. nardi Celticæ drach. ij. nardi Syriacæ drach. i. piperis sesquidrach. m. flor. iunci odorati drach. i. myrrhæ obol. ij. cassiæ obol. i. cinamomi obol. i. Vere sicco cum uini mulsi cyathis tribus.

De pharmacis iſtericis ab Asclepiade scriptis, in tertio interuoriorum. 3

Ex his quæ antea dixi cognobile fit, etiam si citra discrimen pharmaca prodantur, quæ fugienda sint febricitantibus. Consueuit autem Asclepiades aliquando distinguere apponendo, febricitantibus hoc modo exhibere oportere medicamentũ, Nõ febricitantibus hoc modo: ubi uero omnino nihil apponit, his in nõ febricitantibus magis est utendum, quemadmodum sanè etiam, quãdo ex uino solo, aut uino mulso usum fieri debere censemus. Talia enim non febricitantibus conueniunt. Verum scripta ab ipso pharmaca hæc sunt. Potio ad iſtericos. Cichorij succi cyath. vi. febricitantibus per se dato. Non febricitantibus autem cum uini cyath. ij.

Aliud, Solani succi cyath. i. Vini mulsi diluti dimidium. Aliud inspersile. Anchusæ tenuissimæ tritæ cochlearia ij. cum aqua potabili exhibe.

Aliud, Struthij cochlearium i. dato cum uini mulsi diluti cyathis ij. Aliud Nicerati ciens uri-

nam. Cicerum siccorum sextarium i. rosinarini manipulum, aquæ sextar. vi. sceniculi manipuli, asparagorum palustrum radicium manipuli, præparato ac dato, ut dictum est, coctum ac excolatum liquorem, febricitantibus simpliciter & assidue bibendum. Non febricitantibus cum uino diluto.

Aliud, Cicerum sextar. i. adianti manipulum, aquæ sextar. vi. asparagorum palustrum radicium manipulum, præparato & exhibeto uelut dictum est. Pastillus ad iſtericos, facit & Hepaticis.

Amygdalarum amararum mundatarum drach. iij. anisi, absinthij, utriusq; drach. i. nardi Indicæ, asfari utriusq; drach. unam. tusa & cribrata aqua subigito, ac formatis pastillis drachmam unam cum uini mulsi cyathis tribus non febricitantibus dato.

Aliud quo usus est Charixenes. Asari, absinthij, utriusq; drac. viij. feminis anisi, feniculi, apij, amygdalarum amararum repurgatarum, singulorum drach. iij. Aqua subige ac forma pastillos, & exhibe ut dictum est.

Nicerati erthinum Medicamentum quod naribus attractũ, morbum regium expurgat. Quando reliquum corpus iuxta naturam habuerit, oculi uero pallidi permanserint, a ceti acerrimi cochlearium unum in balneo naribus attrahendum exhibe, detrahit multæ bilis fluxionem. Eiusdem aliud. Nasturtij uiridis folia tenera, aut rosinarini uiridis folia tenerrima terito, & expresso indeli quore ut prædictum est utitor. Aliud eiusdem.

Elaterium cum lacte muliebri tritum naribus infundito, & attrahere iubeto.

Que pharmaca Archigenes ad iſtericos conscripsit, in secundo pharmacoriorum secundum genus. 4

Ad iſtericos cõuenienti diæta & ductu persequentes deambulationes, & multam unguentorum frictionem utaris, ampliusq; fomentis siccis & subscriptis medicamentis. Aiunt eos qui in febribus morbum regium incidunt, rubi canini suluo fructu comesto, statim probentur. Auxiliatur & chelidonia herbæ succus cũ uino aut aqua mulsa potatus. Aut adiati uel rubiæ radicis obol. iij. cum aqua mulsa exhibe. Aut struthion cum melle delingant, aut fellis ursini cyathum bibendum dato. Aut hyperici drachmam unam ex uino mulso propinato, uel aquæ cyatho uno. Aut helxinæ decoctum ad dies quinque uel sex cum uino mulso. Aut stercoris canini albi sextantē, cũ mellis quadrante ad triduum bibendũ dato. Aut lichenas in petris nascentes cum aqua mulsa propina. Aut lichenis in tegulis uel lapidibus nascentis drach. i. ex meraco propina. Aut nasturtium cum olei cyatho uno bibendũ præbeto. radicem uero eius in nares indito. Aut absinthij cochlearia. iij. anisi cochlearia. ij. exhibeto ex aceto mulso. Aut oxylapathi siue lapathi radicis tritæ acetabulum, dato ex aqua mulsa, si non febricit cum uino aut uino mulso. Aut adianti & mentæ & rubiæ parem mensurã in aqua feruefacito, & hennam inde bibendam exhibeto diutius ad solem insolato, ac sitiienti & anheloso, quo post acceptum porum exudet. Statim transmutat colorem. Aut

adianti & myrrhæ eius dimidium, ieiuno à balneo exhibeto in uini hemina dimidia. Aut leporis coagulum cum meraco ad dies. v. uel vi. præbeto. Aut Scolopēdrii drac. iij. ieiunis ex uino ad dies. v. uel vi. dato. Aut mentē & rubiæ ac adiatī æquas portiones cum aquæ cyathis duobus propinato. Aut betæ foliorum crudorum drach. vi. myrrhæ obol. ij. cum aqua mullā ieiunis exhibeto, aut prælotis ac ieiunis cum uini hemina dimidia dato. Aut adiantī drach. vi. myrrhæ drach. ij. mentæ drach. i. in aquæ heminis duabus coquito donec mediæta superferit, deinde ubi plurimum deambulatuerit probe fricato, & spiritū adhuc sublimiore existente bibendam dato. Hoc ad biduum facito. Aut cicer eruinum in aqua sub dio per noctem exponito, aquamq; bibendam dato, & cicer insuper comedum mane ac uesperī. Inde uero per triduum absinthium ex aqua mullā bibant. Aut cum cyclamini succo purgatis naribus lauato. Aut herbam Orontium appellatam coquito, & cum decocto lauato, & decoctum confectum uiride reddas. Aut uenam sub lingua secato. Quod si ad nullum horum auxiliorum malum cedat, expurgatione per scammoniam & exquisita diætā utantur, atq; ita ad exercitia progrediantur.

De splenis affectionibus. Cap. II.

Quod omnes corporis particule familiarem sibi ipsi ex uenis trahant humorem, in cōmentarijs de naturalibus facultatibus edocti, in iisdēq; etiā quod uelut fecem sanguinis, ex qua atra gignitur bilis, hoc uiscus alimentum habet instituti, & ultra hæc memoria tenentes ea quæ in curandis methodo de Splene sunt dicta, facile assequemini ea quæ nunc referentur. Quorum primum & principalissimum hoc est, Quod hoc uiscus à natura cœlesterrime indurari solet, sanguine nimium in uenis ipsius obturato, & ob crassitudinem neq; excerni neq; discuti facile potente. Attenuantibus igitur opus habet pharmacis citra manifestam caliditatem, ut ne uehementius incrassescat succus crassus in ipso obturatus. Quo uero actiōe ipsius conferuentur, ex austeris aliquid his ammisceatur, quale est etiam adstringentium genus. Didicistis enim in naturalitū facultatum cōmentarijs, Quod quum omnes particule suæ conseruationis gratia habeat facultates, tum familiarium attractoriam, tum alienorum expulsoiā, itemq; assimilatricem sibi ipsi eorum quæ attraxerint. Aliquibus ipsarum insuper inest, per accidens magnopere iuuare totum corpus. Ex horum genere est & lien, qui ex hepate in seipsum uelut fecē sanguinis trahit, quemadmodum uescica in hepate bilem, & renes urinam. Si igitur præ imbecillitate eiusmodi sanguinem ad sese trahere nō potest, uitiosus humor uniuerso corpori affricatur. Ob id itaq; naturalem ipsius firmitatem custodire oportet, quo conueniens ipsi alimentum attrahat, per quam actionem uniuerso corpori ad humorum bonitatem cōfert, & generata in ipso recrementa in uentrem demittere potest, una cum ciborum recrements excernenda. Ea gratia igitur ualde amara medicamen-

Galen.

A ta ipsi offerimus, quædamq; ipsis ex austeris misceamus. Quædam uero ad materiam commoda, ad ce-
ratorum uidelicet & malagmatum præparationē, apponimus, quale pharmacum est cera, & resina, & pix, & bitumen, & quæcunq; alia huiusmodi. Iuxta primam autem rationem acetū, & acetum mullum, uisceri cōmoda sunt, utpote secare & attenuare crassos humores potentia, citra calfactionem. Quemadmodum igitur in alijs particulis ea quæ per cataplasmata, aut liquida pharmaca imposita, aut affusa fotu auxiliantur, in alio opere relata sunt: Ita & nunc relictijs his quæ inflammato spleni cōmodant, eorum solum mentionem faciam quæ indurato uisceri opitulant, quod ipsum etiam in medicamentarijs libris fecerunt, qui ante me scriperūt, proprie eos splenicōs appellantes, qui induratum splenis affectionem habent.

Pharmaca potabilia ab Andromacho ad splenicōs conscripta. 2

Potio ad splenicōs Antipatri, ut Nilus. Carnis myrobalani drach. iij. hemionitidis herbæ, quam quidam asplenium, quidam scolopendram dicunt drach. vi. corticis radicis capparīs 3. iij. costi 3. iij. chamedris drach. vi. polij drach. iij. radicis cotyledonis drach. ij. corymborum hederæ nigre grana xxv. ammoniaci thymiamatis drach. iij. seminis hyperici drach. ij. galbani drach. ij. seminis periclymeni drach. i. aut radicis drach. iij. nasturtij nigri sesquidrachmam. succi fructus scillæ drach. xvi. Dantur oboli duo in aceto mullso. Aliud splenicōs potabile. Glandis ungetariæ drach. iij. hederæ albæ grana xxxiij. costi drach. ij. seminis periclymeni drach. ij. hyperici drach. unam. alij drach. iij. galbani drach. i. obol. ij. nasturtij drach. iij. Excipe succo scillæ cocto. Dato fabam græcam in aceto mullso. Aliud. Carnis myrobalani drach. iij. hyperici drach. vi. seminis periclymeni drach. vi. radicis dauci drach. vi. rubiæ, acori, plu pontici, croci, singulorum drac. vi. funci odorati drac. iij. Mei drach. vi. nasturtij, chamæpityos, radicis capparīs, singulorum drach. vi. polij drach. vi. alij drach. iij. ammoniaci thymiamatis drach. iij. cum aceto mullso pastillos duorum obolorū ponderis formato, & unū in aceto mullso dato. Facit & ad hepaticos, & hydropicos. Aliud facit ad splenicōs. Trixaginis rubiæ drach. iij. polij drach. v. chamæpityos drachmas iij. drubiæ drach. v. ammoniaci thymiamatis drach. iij. artemisiæ drachmas iij. myrobalani drach. iij. corticis radicis capparīs drachmas iij. aristolochiæ drachmas vi. tragacanthæ drach. ij. cum aqua in pastillos triobolares redigito, ac dato ex aceto mullso. Aliud Stomacho cōmodū. Vtere etiam ad omnem affectionem splenis. facit & ad conuulsā, inflatā, & uitia muliebriā. Myrrhæ drach. iij. nardi Indicæ drach. iij. corticis radicis capparīs drachmas iij. costi drach. v. radicis panacis drach. iij. radicis peucedani drach. iij. dictamni drach. iij. polij drach. ij. corticis radicis periclymeni drach. iij. rubiæ drach. iij. & dimidiā. ammoniaci thymiamatis drach. iij. & dimidiā. aliqui etiam iridis drach. iij. & dimidiā. Excipe aceto mullso. præbe obolos ij. in aceto mullso. Aliud Splenicōs, or

tom. 5

1 tho

thopnoicis. Struthij, scillæ affatæ, panacis, radicis capparidis, singulorum drach. v. crocomagmatis drach. ij. & dimidium. excipe aceto & præbe in aceto scillitico. Aliud, Struthij, corticis radicis capparidis, trixaginis, panacis, singulorum drach. x. fructus myricæ drachmas ij. Excipe aceto scillitico, & drachmam unam ex aceto scillitico exhibeto.

Pharmaca potabilia ab Asclepiade ad Splenem conscripta. 3

Cynoglossi manipulum cum uini cyathis. iij. terito, & expressum liquorem ante cibum bibendum dato. facit & succus per se. Colligere autem oportet herbam sinistra manu ante solis exortum.

Aliud. Trixaginis manipulum cum uini sextario uno coquito, & expressum liquorem reponito, ex eo cyathos. ij. ante cibum dato. Pharmacum inspersile Splenicis. Myricæ fructum tufum & cribratum reponito. Vfus uero tempore cochlearia ij. cum aceti mulsi diluti cyathis. iij. dato. Aut herbam pelargitin appellatam tufam ac cribratam dato ut prædictum est. Aliud,

Asini aut equi syluestrium lienem siccatum tundo ac reponito, & cochlearia. ij. cum uini diluti cyathis ij. exhibeto. Catapotium Splenicis.

Corymborum hederæ albæ grana ij. deuoranda præbe, & aceti mulsi cyathos iij. insuper bibendos. Catapotium Andreae pæonium dictum.

Myricæ fructum tufum & cribratum galbano excipe, & in catapotia redige, eaq; pro uiribus exhibe. Pastillus splenicus tumorem eliquat.

Fructus ericæ drach. iij. piperis albi, nardi Syriacæ, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. ij. Arida tunduntur & cribrantur, ammoniacum aceto scillitico dissoluitur; & aridis additum in pastillos cogitur, sunt autem pastilli drachmæ ponderis, daturq; drachi. i. ex aceti mulsi cyathis ij. Qui pharmacum hoc tradidit, dixit porcellum ad triduum hoc bibisse, & postea resectum, sine liene inuentum esse. Alius splenem tumementem eliquans & consumens. Ammoniaci thymiamatis, foliorum rubi tenerrimorum, utrorumq; drach. viij. corticis capparidis drach. iij. myricæ fructus; herbæ spleni quæ & scolopendrium & hemionitis dicitur, utriusq; drach. ij. nucleæ scillæ affatæ & purgata, piperis albi, utriusq; drach. ij. Excipe aqua & redige in pastillos, atq; exhibe drach. i. cum aceti mulsi cyathis iij. Chrysermi pastillus, splenicis, hydropicis, Ciet urinam, mollit aluum. Scillam magnam luto oblitam affato, & corticem detrahit ad quod ad fundum est durum, ex nucleo uero libras ij. accipito, seminis dauci drach. viij. hoc est uncia unam, anisi, felis, radicis panacis, iridis, singulorum tantundem, seminis urticæ, bacarum cedri, utrorumq; drach. xij. myrrhæ drach. iij. erui moliti choenicem. Vini odorati quod satis est. Subacta in pastillos redigito. Datur drach. i. cum aceti mulsi cyathis iij. Alius Eugerasia.

Scillæ affatæ depurate minas ij. radicis bryoniae minas viij. piperis albi tantundem, petroselinæ tantundem, seminis dauci cretici tantundem, erui mo-

liti tantundem, cedridum, hoc est, cedri baccarum sextarium vi. aceti besselæ, iridis, radicis panacis, myrrhæ, singulorum quadrantem. Vini salerni quantum satis est his in pastillos cogendis, formatos autem pastillos in umbra reficæ, & unciam i. cum uini diluti cyathis tribus exhibe.

Epithemata ex emplastro eiusdem Asclepiade ad recentes splenis inflammationes. 4

Foliorum tenerrimorum arboris sambuci lib. iij. Aloes li. i. cū aceto subigito, & linteolo infarctæ imponito. Aliud, Erica fructus semissem, galbani lib. i. alij semissem. fructum tundo ac cribrato, atque ita galbanum addito, ac diligenter misceto, atque in linteolum impacta imponito. Pharmacum ldiotæ accomodatium. Visci quercini lib. i. calcis uiuæ lib. unam. uiscum in uas fictile coniectum ac prunis appositum dissoluito, & dissoluto calcem utuam inspergito, misceto, & calidum albe pelli inferctum imponito. Oportet autem cum adherente adhuc pharmaco lauari, atq; ita finire donec sua sponte cadat. Curam item habere oportet ut disparatæ splenis partes resecentur. Aliud,

Visci quercini lib. i. calcis unæ. i. floris lapidis Assi trientem. cedriæ unæ. i. præparato pro more, ac utere quotidie auferens pharmacum, & spongiis calidis fouēs locos, rursusq; imponēs. Hoc pharmacum urinam mouet. Malagæ auræ colorem referens, ualde commodum. Cera, resina pinus & frictæ singulorum libras ij. arsenici, aluminis scissi, calcis uiuæ, singulorum sextantem. aceti, olei, utriusq; cyathos viij. Apparato pro more. Aliud ualde generosum, quo usus est Andromachus.

Cera, resina pinus, picis Brutæ aridæ, singulorum lib. ij. arsenici, aluminis scissi, calcis uiuæ, singulorum sextantem. acethi cyath. viij. præparā pro consuetudine. Facit ad splenicis, hydropicis, & ad præcordia distenta. Facit & ad lēthiacos, arthriticos. Nos ad pharmacū hoc appositum myrrhæ sextantem & unciam dimidiam, uisci trientem.

Ad induratas splenis affectiones, Vfus est Tryphob Gortyniatis. 5

Foeni græci moliti, sinapis, mannæ thuris, singulorum sextarium unum, retrimento rum à myrobalano expressa reliquorum sextarium dimidium, spumæ nitri quadrantem, tenuissime trita ac mixta, cedria cocta excipe, ut emplastri liquidi habeant spissitudinē. Vfus eius est per interualla, pharmacum autem impositum fascioliis completæ & obligata. Tempus imponendi est ante balneū, quantum possibile est agrum ferre, postea uero obligatum adhuc in balneū inducto, & pro reliqui corporis curatione in solū demittito. atq; ita in aqua fasciam resoluito. Aliud ad splenicis per unam diem sanans. Verum supra pharmaci impositionem per tres dies certo uiuē dimodo utimur. Myrrhæ, mannæ thuris, utriusq; quadrantem. sinapis Alexandrini, nasturtij, utriusq; sextantem. aceti scillitici quod satis est. Sinapi & nasturtium tundo ac cribrato. mannam uero & myrrham dissoluito, eisq; arida addito, & simul aceto subacta ad malagmatis formam reducito, & à secunda hora usque

ad nonam imponito. Postea uero duabus fasciis obligatum in balneum inducimus, atq; ubi laxata fuerint in calidæ solium demittimus. In folio uero longiori temporis spacio moretur, cruribus extra aquam emotis. Ne uero in animi deliquium deiebat, acetum & pulegiū odoret, & fascias paratim resoluat. Egresso porro è balneo salsamentū citra panem exhibendum est, & uinum mari mixtum. Sequenti die eadem offerenda sunt. Tertia uero gymnastis utendū quæ spiritum acutum reddere ualent. Aliud Ariz Tarfensis. Vfus est per interualla. Ficum pinguisimarum, sinapis, radicis capparit corticis, singulorum lib. i. aceti quantum satis est. Aliud Diodori. Sinapis, nasturtij, foenicragri, seminis lini, retrimentorū ab expressa myrobalano reliquorum, singulorum drach. viij. Excipe cedria cocta aceto scillitico ammixto. Vfus est ante balneum. pharmacum bonum est, & post usum sanguinem mingunt.

Pharmaca ab Asclepiade in quarto externorum conscripta, ad splenicis, & hydropicos. Quæ iuxta dictionem eius sic habent. 6

Epithema splenicis, tumorem eliquat. Foliorum tenerorum sambuci lib. iij. aloes pinguis lib. unam. terito cum aceto, & linteolo excepta imponito. Aliud, Fructus ericæ lib. unam. galbani lib. i. fructum tundito & cribrato ac galbano excipito, rursusq; tundito ungenti Irini fece admoda, quo ad malagmatis formam redigatur, deinde linteolo infarcta imponito. Malagma ad splenicis. Myrobalani corticum tuforum cribratorum minam dimidiam, & retrimentorum ab expresso succo eiusdem residuorum tantundem. ceræ drach. vi. resinæ terebinthinæ drach. xxxij. galbani drach. x. Irini parum. Arida cum liquidis committito. Aliud ualde præclarum. Farinæ myrobalani quadrantem, niri unc. unam. alij uncias iij. ceræ semilem. terebinthinæ besslem, aceti quod sufficit, splenē eliquat. Malagma ex Cedria splenicis, hydropicis, medicamentum accommodatum. Vrinam cit multam, & splenem eliquat. Oportet autem unā cum pharmaco lauare, & quod ab eo disparatum est, à splenio uidelicet de corporis cuticula, defecare. Sinendum enim est adhærens pharmacum, donec sua sponte dilabatur.

Compositio hæc est. Visci quercini lib. i. calcis uiuæ semilem. floris lapidis Asii trientem. cedriæ quadrantē. Viscum ærea patina coquito, & postquam solum factum fuerit, cedriam adijcito, assidue moueto ac arida trita inspergito. Deinde ab igne ablata aliquater frigerieri finito, atq; in pellem albam à spina appellatam infarcta affectis locis imponito, & unā cū pharmaco lauare iubeto, donec splenū sua sponte dilabatur. Oportet tamen ut prædictū est disparatas splenij partes defecare. Aliud ualde præclarū. Floris lapidis Asii sextantē. lapidis gagaræ unc. i. calcis uiuæ besslem. uisci quercini lib. i. Præpara ac utere ut dictū est. Malagma Antichididis. ad splenicis, hydropicos, Ischiadicos, arthriticis, præparatū est Fabullæ. Ceræ lib. iij. resinæ terebinthinæ libras iij. retrimentorum

Galien.

ab expressa myrobalano reliquorū lib. unam, spumæ niri lib. i. floris lapidis Asii lib. unam. ammōniaci thymiamatis lib. unam. olei cyprini lib. iij. Acetum ad ammoniacum dissolendum. Aliud Fabullæ compositum ualde præclarū, ad easdem affectiones. Myrrhæ factæ lib. ij. opopanax lib. unam. galbani lib. unam. mastiches lib. unam. floris lapidis Asii lib. unam. styracis lib. i. succi scymmororū lib. unam. canchryos lib. unam. piperis albi semilem. ceræ lib. v. terebinthinæ lib. v. pharmacum est tusile, id est, quod contunditur. Oportet autem tundētes ungenti Irini fecem admouere, donec quam mollissimum pharmacum reddatur. Repositum enim mollissimum euadit. Malagma quod aurei coloris appellamus. Auripigmenti unc. i. aluminis scissi sextantem, calcis uiuæ sextantem. Arida tundimus ac cribramus, et in mortarium conijcimus, hisq; aceti cyathos viij. superfundimus, & probe trita liquidis excipimus.

Sunt autem liquida hæc. Ceræ lib. unam. resinæ frictæ lib. ij. pinus lib. ij. hæc frigerieri post eliquationem sinimus, & sic erasa tritis adijcimus. Nos ad pharmaci præparationem etiam myrrhæ sextantem apposimus. Aliud, hoc est usus Andromachus. Facit splenicis, hydropicis, & ad præcordia distenta. Facit item Ischiadicis, Arthriticis, & ad inueteratas affectiones. Ceræ lib. unam. picis brutiæ lib. unam. pro resina fricta, picem addimus. olei cyath. viij. auripigmenti auricolaris sextantem. aluminis scissi sextantem. calcis uiuæ sextantem. præpara ut dictū est. Nos ad pharmacum etiam myrrhæ sextantem, & uisci quercini trientem apposimus. Ad inueteratas induratas splenis affectiones, Authemeron ab eo quod per unam diem curat appellatum. Oportet autem cum pharmaci impositione agrum ad triduum conuenienti diæta uti. Myrrhæ, mannæ thuris, utriusq; quadrantem. sinapis Alexandrini sextantem. nasturtij sextantem. aceti scillitici quod satis est. Arida tundito & cribrato, & cum aceto ad malagmatis formam subigito, & linteolo excepta ab hora secunda usq; ad nonam imponito, ita ut complectaris & contineas incumbens malagma fasciola obligata. Deinde uero ita obligatū in balneum mittito, & ubi probe laxata fuerit, in solium desidere facito, & pedes extra solium extendere iubeto, ac longiori tempore in ipso immorari. Ceterum ad reuocandos in animi deliquium collapsos acetū cum pulegio naribus admouemus, et paulatim resolueri fascias tentamus. Sint autem due fasciæ malagmati incumbentes. quum enim fasciæ tolluntur, auferimus etiam incumbens malagma, & post affectos locos sufficenter fouemus. Egresso de balneo salsamentum citra panem exhibebimus, & uinum mari mixtum. Idem etiam sequenti die facimus. Et tertia similiter, insuperq; gymnastis utimur quæ spiritum acutum reddere possunt.

Aliud Tryphonis Gortymiatæ Cretensis pharmacum accommodatum. 7

Fœni graci moliti sextarium unum, retrimentorum

tom. 5 1 2 torum

torum ab expressa myrobalano reliquorum sexta rium dimidium. Spumæ nitrî quadrantem. Omnia trita cedria excipe. Verum hæc prius coctam condensare oportet ad cerati spissitudinem. Vtius est ante balneum, quantum æger ferre potest. A balneo cerotarium imponimus. Aliud Authemeron inscriptum, liberat ab affectione eadem die.

Pyrethri drach. xx. myrobalani besslem, nasturtij besslem, feminis urticæ besslem, sinapis sextariū dimidium. omnia trita & aceto subacta per intervalla imponito ad horas tres si æger tolerare possit. Deinde ablato pharmaco lauari iube. In balneo uero cerato utendum est ex rosaceo apparatus. Aliud tumorem liquefacit. Floris lapidis Asii, nitrî rubri, recrementorum expressæ myrobalani, ammoniaci thymiamatis, singulorum drach. xxiiiij. corticis radicis capparîs drach. viij. feminis raphani drach. x. aut succi cyathum unum, aceti acerrimi quod satis est, uiscî quercini drach. xl. ammoniacum sambuci succo, aut myricæ, aut trifolij dissolue, Arida uero tunde & angustissimo cribro excute, ac aceto subige, indeq; ammixto uisco omnia simul contunde, & utere.

Pharmaca ad splenicis ab Archigene in primo medicamento- rum secundum genus conscripta. 8

In splenicis poro præcedente similiter tota digra, ex describendis compositionibus his utitor. Potus quidem sit aqua in qua ignitum ferrum saepe fit extinctum, non febricitantibus cum uino. Febricitantibus uero aqua sola. Aut anagallidis cœruleum florem habentis obulum unum exhibeto cum aceto mulso. Aut serpillum cum aceto. Aut Panacis radicem uiridem cum aqua mulsâ. Aut semē similiter. Aquam mulsam uero per noctem sub dio exponito. Aut corticis radicis periclymeni & feminis eius quantum tribus digitis apprehendi potest, in uino albo meraco calido ieiuninis bibendum ad dies xl. exhibeto. Aut uulpis hepar siccum cum aceto mulso exhibe bibendum. Aut cuminum Aethiopicum similiter ut hepar ex aceto mulso. Aut radicis ari corticis drachmam dimidiam cum aceti mulli cyathis iij. Aut polium similiter cum aceto mulso. Aut hederæ albæ grana tria cum aceti mulli cyathis iij. Aut arida trita capparîs folia propinato. Cataplasma ta autem eadem impones splenicis quæ hepaticis, Ampliusq; cinerem ex ferraria officina cum aceto. Aut capparim maceratam aceto ac tritam cerato cyprino exceptam. Aut nasturtium & fœnum græcum, ac calcem uiuam, & nitrū, cum melle mollita imponito. Aut fœnū græcum, & calcem, ac nitrum, item cum melle imponito. Aut lepidij folia imponito. Quis uero iam morsum perceperint in balneum inducito, & ablato pharmaco in feruidâ solium demittito ac detineto, Aegre enim ferunt nimiam mordacitatem, uerum sanis exant. Idem etiam in Ischiadictis facit. Aut myrobalani expressæ recrementum aceto maceratum, rosaceo cerato excipe ac impone. Aut fœni græci & nasturtij par pondus, mannæ duplum, calcis uiuæ parum, cum melle splenia uelut em-

plastrâ facito ac imponito. Aut fecem acris aceti imponito. Aut capparîs radicem cum aceto.

Aut spongiam acerrimo aceto imbutam. Egregie faciunt myrobalani cortices, & nitrî tertia ipsorum pars, trita aceto subigito, & resnam ac ceram cum modico oleo liquefacta affundito, & mollitiss utitor. Perseuerante malo cucurbitas cum scarificatione affigito. Amuleta autem, & per contrarietatem quandam naturalem ad hepar & splenem facere credita, hæc sunt. Venam retro sinistram aurem secato, & detracto sanguine affectum splenem conficato.

De hydropse siue aqua inter cutem. Cap. III

Hydropicorum medicamenta, & alia communia ad splenicis ipsos, itemq; quaedam multiplicis usus, ad uarias affectiones, tum iam prædictas, tum duricias & ubi quid discutere oportet, etiam si iam purulenta sit compages, dicere aggrediar, initio ab his quæ Asclepiades tradidit sumpto.

Pharmaca ab Asclepiade conscripta ad prædictas affectiones in quarto exteriorum, quæ Marcelle inscribunt.

Epithema hydropicis ualde cōmodum, quod adiacentem humorem absorbet. Farris, quod zeam uocant, moliti sextar. iij. floris lapidis Asii sextarium i. mannæ lib. i. Probe trita adipis suillo ueteris probe subacto, & uino per integram noctem macerato, excipito. Sit autem tanta adipis copia quanta ad molle faciendum pharmaco satis est.

Aliud, Belsa: est autem semen syluestris quod in Syria nascitur, & uernacula lingua Harmala ab illis appellatur: huius tussî sextariū i. mannæ sextarium dimidium, adipis suilli ueteris quantum sufficit, preparato ut dictum est. Aliud, Ficuum pinguisssimum lib. iij. origani lib. i. Quiddam cumini lib. i. sulphuris uiui quadrantem. Cochlearum Africanarum lib. i. Arida tundito & cribrato, & tussis sicbus unâ cum carne cochlearum excepta, ac in linteolum infarcta imponito, melle cocto sufficienti addito. Aliud ex Critone.

Fœni græci moliti ac cribrati sextarius ij. sulphuris uiui lib. ij. & dimidiam. Arida tenuissime trita melle cocto excipito, In deq; linteolo infarcta per noctem imponito. In die uere & gestatione, & confectione subscripta. Malagma Ipoterium inscriptum, Resorbet humiditates ex alto, & duricias dissoluit. Ceræ, picis aridæ, utriusq; lib. ij. aluminis liquidî, sulphuris uiui, mannæ, nitrî rubri, singulorum lib. i. resinæ frictæ lib. iij. olei ueteris heminam i. aceti quantum satis est ad aqua dissoluenda. Præpara ac utere ut probato. Aliud præclarum Ipoterium pharmaco accomodatam. Facit hydropicis, splenicis, & ad inueteratas affectiones. Resinæ frictæ lib. iij. ceræ lib. ij. sulphuris uiui lib. i. picis liquidæ lib. ij. aluminis liquidî lib. unam. nitrî rubri lib. unam. Aristolochiæ quadrantem, bdellij quadrantem, amomi racemî quadrantem, radicis cumemeris syluestris quadrantem, aloes semissem, pyrethri quadrantem, ammoniaci thymiamatis quadrantem, uiscî quercini quadrantem, succi fycomororum quadrantem, aceti sequi sextarium. Aut pro aceto uinî Italici tantūdem, elct

olei heminas iij. preparato pro more. Malagma
 ex bacis lauri, ad splenicos, hydropicos. Dissol-
 uit omnem duritiā, absorbet abscessus in pro-
 fundo. Ceræ lib. i. resinæ pinus lib. i. picis Brutiaë
 lib. i. baccarū lauri siccarū lib. i. nitri rubri lib. i. am-
 moniaci thymiamatis lib. i. adipis utulini subacti
 lib. i. arida tundo & cribrato per angustissimum
 cribrum. Liquefiscibilia liquantur & frige facta ari-
 dis adijciuntur, atq; ita contusis simul ac repositis
 utimur. Aliud, Baccarum lauri libram unam,
 picis lib. i. mannaë lib. i. adipis taurini lib. i. ammo-
 niaci thymiamatis lib. i. ceræ lib. i. preparato ut
 prædictum est. Emplastrum tonloris appella-
 tione, ad splenicos, & hydropicos. Hoc tonlor
 quidam uir Bithyniensis usus, ischiadicos à coxen-
 dicum morbo penitus liberauit. Picis arida lib.
 iij. ceræ lib. duæ. resinæ pinus lib. ij. ammoniaci
 thymiamatis librae duæ. nitri rubri lib. ij. adipis
 taurini lib. una. In alio exemplari etiam iridis l-
 bras ij. habentur. canchrys uncia xvij. farinae
 foeni graeci sextarius i. pollinis sextarius i. radicis
 chameleonis nigrae tenuissime tusæ sextarius i. cu-
 mini tenuissime triti sesquifextarius, pasci sextar. i.
 In alio exemplari anisi triti sextarius dimidiū ha-
 betur, & pollen deest. Aliud Bithynum appel-
 latum, pharmacum accommodatum ad prædictas affec-
 tiones. Picis Brutiaë lib. iij. resinæ pinus, ce-
 ræ, ammoniaci thymiamatis, singulorum lib. ij.
 medulla ceruinæ lib. i. adipis taurini subacti lib. i.
 succi fycomororū libram unam. floris lapidis Asii
 semissem, radicis chameleonis contusæ semissem,
 baccarum lauri siccarum libram dimidiam, farinae
 loliaceæ libram dimidiam, seminis dauci Cretici
 contusi trientem. petroselinii trientem. cumini Ae-
 thioptic trientem, anisi trientem, salis hispani sex-
 uncem, aphonitri sexuncem, cyprini sexuncem.
 Vini salemi quod satis est. Arida cum liquidis pro
 more apparo. Malagma ex seminibus, phar-
 macum accommodatum ad prædictas affectiones,
 hoc usus est Olympius. Ceræ drach. c. terebin-
 thinae drach. c. ammoniaci thymiamatis drach. c.
 adipis taurini drach. c. anisi drach. c. foeni graeci
 drach. c. petroselinii drach. c. ammij, iridis Illyrica,
 utriusq; drach. l. panacis drach. c. nitri drach. l. gly-
 cyrhizæ drach. l. cyperi drach. xxv. sabinæ drach.
 xxv. samfuchi drach. xxv. meliori drach. xxv. carda-
 momi drach. xij. & dimidiam. casisæ fistulæ drach.
 xij. & dimidiam, nardi Celticae, radicis dauci Cre-
 tici, utriusq; drach. xij. & dimidiam. Mellis hemi-
 nam & dimidiam. Vini odorati quod sufficit. Præ-
 para pro consueto more. Aliud, Ceræ minam i.
 ammoniaci thymiamatis minam i. terebinthinae
 minam i. samfuchi minam dimidiam. iridis Illyri-
 cae minæ quartam partem, hoc est drachmas xxv.
 seminis lini toffi ming quartam partem, adipis tau-
 rini minæ quartam partem, radicis cucumeris syl-
 uestris, anisi, seminis apij, ammij, cumini, fœnicu-
 li, nitri, singulorum minæ quartam partem, pipe-
 ris drach. xij. & dimidiam, mellis heminam, uini
 sesquiheminā, cyprini sesquiheminam, aceti ses-
 quiheminam. Componito ac utitor.

Galēn.

Ex Andromacho ad hydropicos & inflationes. 2

Picis liquidæ lib. ij. ceræ lib. i. nitri drach. vi. sul-
 phuris uiui sexuncem. aluminis sexuncem. Ad
 hydropicos Cleophanti. Ceræ, resinæ, spumæ ni-
 tri, singulorum drach. c. galbani drach. xij. & dimi-
 diam, propolis drach. xij. & dimidiam, ammoniaci
 thymiamatis drach. xij. & dimidiam, cyprini cya-
 thos ij. aceti cyathos duos.

Ex Archigenis secundo libro pharmacorum secun-
 dum genus. 3

Hydropicis diætam ac uiuendi modum conue-
 nientem constitue. Pro cataplasmate autem ster-
 cus bouis armentariae impone. Resicca autem ip-
 sum stercus diligenter, et tritum in posca uelut cru-
 dam ordeaceam farinā coque, inspersa sulphuris
 uuii quarta parte. Cataplasma uero per omnē uen-
 tris amplitudinem impone. Musa uero catapla-
 sma ad ipsos præparauit ex elaterio, staphide syl-
 uestri, hyssopo, felle tauri, æqualibus partibus ip-
 sorum ficibus contusis exceptis. Aut radicis cu-
 cumeris syluestris minam unam in uino coquito,
 & ficium minam dimidiā similiter coquito, atq;
 hæc simul terito affuso eorum decocto, donec ma-
 lagmatis forma euadat. Inde q; altheæ radicis trita-
 tantundem ammisceto, simulq; coquito ac terito,
 atq; ita imponito. Aut caprinum stercus in uri-
 na pueri impubis ueneris expertis, uel ipsius ca-
 præ urina coctum, ad strigmenticiā spissitudinem
 redigito, ac imponito. Egrege ipsum per alium
 purgato. Aut ueratum nigrum, fel taurinū, nitrum,
 piper, æquis partibus cum melle aluo per dimidig
 horæ spacium imponito. Porrò per omne cura-
 tionis tempus unam aliquam ex his potionibus
 ipsis propinato. Cotyledonis drachmam unam.
 scyllæ arida mundæ drach. i. in uino mullō diluto
 quotidie exhibe. Aut corticis radicis Ari drach.
 i. Aut cneori, quam aliqui chameleæan adpellant,
 teneras eminentias ad calamorum radices nascent-
 es exuacato, ac succi cyathos iij. prædictis ammi-
 xis quotidie exhibeto. Optime facit & hoc.

Cancri fluualis sicci triti, pedibus ac eminentijs
 omnibus amputatis, drachmam unam. asari drac.
 i. misceto aqua ex ipso flumine unde cancri extra-
 cti sunt accepta, & propinato. Aliquando uero
 pro asaro, opobalsami par pondus additur. Aut
 coralli drach. i. aluminis scissi drach. i. obol. ij. cum
 calaminthæ cremore terito, & in pastillos duorū
 obolorum ponderis redigito, & obolum inde ex
 calaminthæ aqua bibendum dato. Summe facit &
 ad nephriticos. Aut radicē calaminthæ coctam
 propina. Aut sion quod lauer Latini dicunt ite-
 dem coctum propina, idemq; etiam edendum ex-
 hibet. Aut tribuli folia siue radicem cum uino da-
 to. Aut in balneo cum sale & oleo diligēter, usq;
 quo exudent, illtos educito, & folis testibus exu-
 dantibus ablutis, primum linteis, deinde etiam re-
 liquis amiculis contectos curato, & panem furna-
 ceum cum sufficientibus caricis edendum dato:
 uinum uero nigrum Italicum aut Spicatū recens,
 in quo ficium triens in uini sextarijs vi. incoctus
 est, donec tertia pars superfuit, bibendum exhi-
 beto.

tom. 5

I 3

beto

beto. purgat per urinam. Aut urinq̄ caprę cochlearium unum cum nardi drach. una calfactum bibendum dato. Aut cucumim syluestrem uino nardino uel amineo macerato, & ex cremore tercyathum unum bibendum præbeto, & paulatim usq̄ ad cyathos tres progreditor. Aut fesei in potu uel cibo exhibe. Aut daphnoides tritum lu pini magnitudine inspergēs bibendum dato, Ducit urinam multam. Aut corticem radicis Ari ex uino. Aut squamę aris drachmam unam panis medulla excipito, & catapotia facito ac exhibeto. Fortiter aquam ducunt. Aut aris usti drach. s. rutę ramulos tres, stercoreis columbę drachmam unam. salis communis parum, cum uino Ephesio & aqua, ita ut tota mixtura hemina dimidię sit, præbeto. Summe faciunt & Theriacę omnes urinam cientes. Insuperq̄ potiones aquam ducentes, quę uenicuq̄ per experientiam cognitę sunt minime periculosa. Similiter & catapotia.

Cæterum hydropicos diutius ad solem, contento capite, inūgito ex oleo multo sale admixto, & multa salſugine calida perfundito. Inflatos uero maxime locos, uesicis magnis probe inflatis quotidie continenter pulsato, Inde enim arctantur ac contrahuntur. Scarificatis item ipsorum talis & uulnufculus impactis, ipsos in ferculo aut lectica gestato ac circiuehitō, Multus enim humor hoc modo ipsis profuere solet.

Ad easdem affectiones Confectio Biennij. Croci, opij, opopanax, myrrhę, iridis, acori, mandragorę, asari, costi, nardi indicę, dauci cretici, mei, singulorum drach. viij. piperis albi & longi, gentianę, stœchadis, casia, phu ponticę, singulorum drach. viij. excipe melle.

De pharmacis dolorem sedantibus, anodynis & colicis appellatis. Cap. IIII

Huiusmodi pharmacis magni doloris, aut uigiliarum gratia, aut ne per uolentiam tussim lancinemur, uelut in sanguinis refectione & grauibis distillationibus aliquando contingit, uti solemus. In moderatioribus tamē prædictis affectionibus, confectiones ex seminibus priuatim tussiculares appellatę sufficiunt, quę & ipsę omnino aliquid ex soporiferis seminibus habet: uerum medicum inter multa adeo semina, quę odorata & tenuium partium ac urinam cientia existūt. Appellant autē hęc Medici sepe citra appellationis seminis appositionē, Cuminum dicētes & dauci, & fesei, apiumq̄ & anisum. Eiusmodi igitur pharmacorū compositiones inter tussiculares appellatas confectiones sunt relatę, Verum dolorem sedantes anodynęq̄ & colicę dictę, quę eiusdem quidem generis cum illis sunt: multo autē facultatibus illas exuperat, in hoc sermone ostenduntur. Prima itaq̄ ex ipsis præcis tēporibus, ut apparet, celebris fuit quę Philo prodidit, & de qua ipse hanc Elegiam fecit.

Philonis Antidotus. 2

En me Tarſensis Medici prægrande Philonis
Inuentum, mala quod multa dolore leuo.
Sive colum doleas, seu tu iecur, auxiliabor,
Seu lapis infestet, difficile aut lotium.

A Et medeor splemi hinc, orthopnœęq̄ moleſtę,
Conuulſa atq̄ tabem protinus exupero,
Pleuritimq̄ malā, & sputum uomitorisq̄ cruoris
Euinco, mortis terror & hostis ego,
Viscera tentantes omnes ego sedo dolores,
Interna & quicquid membra dolore quatit,
Tussim, Singultum, destillantescq̄ fluores
Sisto, etiamsi quid strangulet excipio.
Me dedit ille autor sapienti munera magna
Discipulo, stupidos nil ego curo uiros,
Odorum fulumq̄q̄ pilum pueri cape, cuius
Fulget adhuc campis Mercurij ille cruor.
Pondus ad humanos sensus perpendito prudens,
Dein drachmę pondo Nauplion Euboicum,
Inde Menceriada occisoris ponito drachmam,
Qui pecoria densis uentribus excipitur.
Viginti & drachmas candentis conijce flammę,
Et totidem fabę post suis Arcadice,
Et drachmam dictę falsō radicis, ab ipsa
Terra, pissæ quę loue clara manet.
Quumq̄ pion scribes, uoci caput amplius addes,
Malculum Achiuorum nominis articulum.
Indeq̄ post drachmas expensę sumito lancis
Quinq̄q̄ bis, atq̄ isthęc prouidus excipito
Natarum tauri textura Cecropidarum.

Sic mecum Tricę progeniesq̄ facit.
In his uersibus Philo iubet croci drach. v. conijci,
pyrethri unam, Euphorbij unam, spicę nardi unā,
piperis autem albi & hyoscyami par pondus, utriusque drach. xx. opij uero drach. x. Primi quidem igitur duo uersus crocum indicant, ut qui fuluus colore sit, & tenuis ad formam pilorum. Cruorem autem croci fulgere ad huc in campis Mercurij dicit. Adoleſcens enim crocus appellatus cum Mercurio disco ludens, & incuriosius cōsistens, illapso in caput ipsius disco, statim mortuus est: esse sanguinem autem ipsius in terram acto, crocus natus est; fulgere uero cruorem dixit, hoc est sanguinē tam occisi, propter coloris croci splendorem. Scribitur autem non solum campis, sed & herbis in uersu, hoc modo, fulget adhuc herbis Mercurij ille cruor. Cæterum pondus croci drach. v. esse uult, quum ad humanos sensus pendere iussit, qui quinq̄q̄ numero existunt. Quod uero drachmas quinq̄ esse uelit, & neq̄ obolos, neq̄ libras neq̄ aliud quicq̄ tale, per sequētia cōmonſtrat, primū quidem quum ait, Dein drachmę pondo Nauplion Euboicū. Deinde uero & consequenter quum alijs idem drachmę nomen apponit. Nauplion itaque Euboicum, pyrethrum uocat. Propterea quod Nauplius magnis pyris incensis; ut aiunt, circa Euboiaę portum, multos Græcorum decipit, ut perirent tanquam ad regionem portus bonos habentem applicantes. Id ipsum uero ob Palamedis necem ipsum fecisse tradunt. At uero & Euphorbium similiter his ænigmatice uocauit, quum ait, Inde Menceriada occisoris ponito drachmam, Quandoquidem poeta Patroclum sicloquentem facit.

Sed me parca ferox, Latonę & filius auferet,
Atq̄ uir Euphorbus.

Pecoris autem hoc est ouium uentribus excipi & adferuari Euphorbiū ait, propterea quod hos solos non corrumpit, & ob hoc in his reponi pharmacum potest. Est porro Euphorbiū plantæ cuiusdam spinosæ in Maurusiorum terra nascentis succus, facultate calidissimus, & de ipso libellus paruis scriptus est lubæ regi Maurusiorū. Consequenter uero Philo ait, Viginti & drachmas candidentis conijce flammæ, piper album per hoc significans, Est autem stomacho comodius acrius quàm nigrum. Viginti insuper drachmas seminis hyosciamini iubeat, quod fabam suis Arcadicæ appellat, Quandoquidem aprum Erymanthium Hercules occidisse fertur, qui in Arcadam terram fuit connutritus. Quin & nardi ipsius drach. i. conijciendam censet, quam radicem falso dictam appellat, quandoquidem spicanardi uere nominatur, Vult autem eam Creticam esse, quum ait, ab ipsa Terra pissæ quæ Ioue clara manet. Quandoquidem fabularum scriptores Iouem in dictæo Cretæ monte educatum aiunt, occultatū ibidem à matre Rhea, ne & ipse à patre Saturno deuoraretur. Apposuit autē Ioui epitheton pissæ, quemadmodum multi etiam extra poetica, in cōmuni sermone dicere solent, per Aesculapium Pergamæum, per Dianam Ephesiam, per Delphicū Apollinē, per Vestam Eleusiniā. Quidā uero non Creticā terram, sed Indicam indicatā esse aiunt, ex qua ebur affertur, ex hoc enim statuā Iouis in Pissā factā ac formatam esse. His omnibus & papaueris succum ammisceri iubet, qui recepto à medicis more priuatim opii appellat, quū nullus aliorū succorum quantumuis multi sint in neutro genere; opii uidelicet, nominat, Quādo igitur ipsū nomē opion, ex uoce. ὄ. & πῖον. componitur, ob id sanē inquit, Quum quæ pion scribes, uoci caput amplius addes, Masculum Achiuorum nominis articulum.

Indeq; post drachmas expensæ sumito lancis Quinq; bis, &c. Hoc est iniijce & opij drach. x. Superest postremum quo omnia hæc trita excipiuntur, ipsum Mel, itidem coniecturaliter ab ipso appellatum, Natarū tauri textura, quandoquidem ex putrescentibus tauris apes generari tradunt. Quod autem Atticum ipsum Mel esse uelit, ea gratia addidit, Cecropidarum, hoc est, Atheniensium. Cæterum per extremum uersum ostendit etiam Asclepiadas hoc pharmacum sic præparare, Ex Trice enim generis sui originem ducunt, ex quorum ordine & poeta est. Hæc ferme prima antidotorum dolores sedantiū celebris facta est. Iuxta hanc autem alijs partim ad ipsam appositis, partim detractis, aut apponderationibus permittatis, posteri magnum antidotorū dolores sedantium numerū fecerūt, quas etiam colicas uocant, denominatione ab affectione quæ maximos dolores habet deducta. Ego uero primum quidem generales componendi ipsas modos referam, deinde uelut consueuit, etiam particulariū materierum seriem quantū latissime se expandit subscribam. Optimum itaq; fortissimū est ex his quæ sensum stupesciunt ac somnum soporiferū inducunt. Opē-

ratur autem hæc etiam solum sapa disutum, deinde tomento exceptū ac sedū inditum, itemq; frontiac naribus illitū. Si uero cum alio quopiam uim ipsius moderatē misceatur, moderatius hæc facit. Verū quæ ammiscentur ipsi, aut concoquere, aut mitigare dolorosam affectionem oportet, aut humores affectionem efficientes discutere, aut secare, aut attenuare, aut iuxta totam substantiam alterare. At uero neq; ignorare nos puto optimū esse compositionis scopū, qui trium coniectationi sit intentus, Nimirū ut & sensus stupefiat, & nullum in posterum inde circa particulam detrimentum permaneat, ampliusq; ut affectio ipsa maxime inde iuuetur. Ad hæc igitur respiciens Philo mihi uidetur hoc pharmacum de quo iam proposuimus dicere, cōposuisse, Ex opij quidem & hyosciam mixtura somnum soporiferum, & sensitiuæ facultatis stuporem inducere uolens. Quo uero citius distribuenter, & totorū affectorū corporū profundum penetraret, calcificatione ammiscuit, pyrethrum, & euphorbiū, & piper, quæ nocentes humores discutere possunt, & extergere uiscosos, ac secare crassos, & uentosos flatus attenuare ac euacuare. Est autem non modica concoctoria uis omnium frigidarū affectionū in nardo sita, Verum Creticā nardū iniijcere non oportet, neq; omnino eam quæ apud nos nascitur, quam montanam & herbā Narditen magis quàm nardū appellant. Est igitur Celtica nardus optimum pharmacū, efficiens quæcunq; etiā Indica nardus solet. Verum ab ipsa uiribus deficit, uelut etiam à Celtica, Montana. Quemadmodū autē ex aromaticis appellatis medicamentis Philo solum nardum iniicit, Sic posteri alius aliud apposuit, aliquid autē plura. Quæ uero apponuntur sunt, flos iunci odorati, & calsia, cinamomū, amomū, & costus. Quemadmodū autē rursus crocū addidit, crudorū humorū concoctoriū, itemq; affectionū medicatarū, Sic alij myrrhā & castoriū ammiscuerunt. Plurimi autē ex ipsis, neq; male in hoc faciētes, & hæc familiaria semina, de quibus etiā antea in coniectationibus ex seminibus constantibus dictū est, addiderunt: quo uidelicet amarorū medicamentorū iniucunditate mitiget, & totū pharmacū ad distributionē & urinæ propulsionē instigent. Si uero & humorū crassitudo attenuari expetatur, etiā hoc ipsum faciunt. Dico autem apij semen, cumini, dauci, petroselinī, anisi, & quæcūq; eiusmodi existunt. Apponam igitur etiam & copiam ac seriem particularum materierum à prioribus medicis usu ac experiētia cognitarum.

De colicis pharmacis ab Andromacho conscriptis. 3

Prima itaq; ipsarū in hæc uerba scripta est. Colica Calsij. Anisi drach. vi. seminis apij drach. xij. nardi drach. liij. alij drach. vi. castorij drach. iij. petroselinī drach. iij. alij drach. iij. piperis albi drach. v. & longi drach. v. myrrhæ drach. vi. iunci odorati drach. iij. succi papaueris drach. vi. croci drach. iij. Excipe melle cocto. Quidam etiā cinamomū drachmam unam. aut calsiæ drach. ij. Datur ad summum nucis regię paruæ magnitudinis ex aqua calidæ cyath. iij. minimū nucis ponticæ magnitud.

Colica secunda ab Andromacho scripta hæc est. Colica Calsij, ut Crispus. Facit & foris imposita. Anisi drach. xij. feminis apij drach. xx. iij. nardi Indicæ tantundem. castorij drach. vi. feminis petroselinij drach. xvi. myrrhæ drach. xij. piperis albi drach. xij. & longi drach. x. iunci odorati drach. vi. opij. croci, calsiæ, singulorum drach. xij. costi, acori, utriusq; drach. vi. Excipe melle cocto. Præbe nucis ponticæ magnitudine ex aquæ calidæ cyathis iij. Hæ igitur præscriptæ duæ confectiones ex medicamentis de quibus paulo ante dixi compositæ sunt. Quæ uero deinceps sequi, qua se usum esse ipse ait, habet etiam alia quædam præter priora, eiusdem generis cum opio & hyoscyami semine existentia. uelut malorū mandragoræ succum, aut quæ ex radice ipsius expressus est, & succum cicutæ. Habet item phu ponticum, quod partim nardo celticæ, partim petroselino & urinâ cientibus seminibus simile existit. At uero syluestris brasicæ semē ex maxime attenuatorijs est, & quæ multum siccare ac discutere possunt. Ex urina cientibus est & Meon, & asarum. Illyris uero quam neq; nominauit iridem Illyricam, concoctoriū est & attenuatorium pharmacum. Stœchas autem à putrefactione uindicat & attenuat. Ipsum pharmacum autem sic describitur. Colica Tullij qua uitor. Succu malorum mandragoræ drach. viij. aut succi radices eiusdem drach. x. phu pontici drach. viij. feminis brasicæ syluestris drach. viij. succi cicutæ drach. xvi. costi, piperis albi, & longi, myrrhæ, opij, singulorum drach. viij. opopanaxis drach. vi. stœchadis, feminis dauci, Mei, asari, singulorum drach. xij. cinamomi, Illyridis, acori, singulorum drach. viij. Sequitur post præscriptas Colica Abscanti, quam apud me consonâ reperit. Anisi drach. x. feminis seselis, drach. xx. petroselinij, nardi Indicæ, piperis albi & longi, singulorū drach. iij. & obol. iij. opij drach. x. myrrhæ drach. x. cumini Aethiopicij, castorij, utriusq; 3. v. iunci odorati, croci, utriusq; drach. v. Excipe ac præpara cum melle cocto.

Colica admirabilis qua uitor. & ad uoluulosos & qui steruus sursum euomunt in magnis doloribus, datur magnitudine fabæ in aquæ frigidæ cyathis iij. aut iij. Piperis albi, feminis hyoscyami, utriusq; drach. xl. opij drach. xx. croci drach. x. spicæ nardi, euphorbij, pyrethri, singulorum drach. ij. excipe melle cocto. Alia non inefficax ad apto tos ob id dicta, ad omnem etiam inflationem. Sisonis, feminis hyoscyami, piperis albi, singulorum drach. xl. succi papaueris drach. xx. croci drach. vi. opobalsami drach. iij. excipe melle. Colica Terentij Valentis. Sisonis, piperis albi, feminis hyoscyami, singulorum drach. xl. succi papaueris drach. xx. croci drach. viij. alij drach. vi. corticis radices mādragoræ drach. iij. mellis quod fatis est. Quidam etiam opobalsami drach. iij. Colica Apollonij.

Nardi drach. ij. castorij, solihiculi, succi mandragoræ, costi, singulorum drach. i. asari, spicæ, utriusq; drach. iij. opopanaxis drach. i. dauci Cretici drach. iij. cinamomi drach. v. piperis albi & longi, iridis, myrrhæ, singulorum drach. ij. lemnis spha-

A gidis drach. x. absinthij drach. ij. excipe melle. Datur drachma una ex aqua. Colica ut Nicostratus, Ilotheos appellata, empta talentis duobus. Facit ad stomachicos, oculorum dolores, & uexationes, uulua labores, ex aqua mulsâ in cocta rutæ. Croci sesquidrachmam, nardi drach. ij. myrrhæ drach. xij. costi, piperis albi & longi, galbani, singulorum drachmam unam. opobalsami drach. iij. cinamomi, succi mandragoræ, castorij, singulorum drach. ij. feminis dauci drach. iij. & dimidiam. sagapeni drach. iij. calsiæ drach. iij. excipe melle Attico. Colica ut Scribonius. Cineris cornu cerui teneri usti heminâ, piperis albi, myrrhæ, utriusq; drach. ij. ex tritis cochlearium unum exhibeto. Et cochleam unam crudam tritam cum uini cyathis duobus & aqua calida.

B Colica qua afsidue utebatur, perfecte liberans & malum extirpans. Zingiberis drach. iij. salicis corticis drach. iij. rutæ ramulos tres aut quatuor, phœnicobalanorum drach. iij. aquæ cyathos vi. conijcto in uasculum nouū, & coquito donec tertia pars supersit. & bibendum dato ad triduū post irritationem, & facto interstitio idē factio, ad plures dies pharmacum in potu exhibendo. Colica Tullij bona qua & ipsa uitor. Seminis brasicæ syluestris, phu pontici, utriusq; semissem, piperis albi & longi, feminis dauci, singulorum drach. ix. castorij, costi, opij, corticis mandragoræ, nardi Indicæ, asari, illyridis, singulorum drach. vi. stœchadis drach. ix. cinamomi drachmā unam. calsiæ daphnitis drach. xvij. excipe melle cocto. Da fabæ Aegyptiæ magnitudine. Colica quam admiratus est Ariston, ut Diophantus Lycius. Succu centaureæ, castorij, scillæ assatæ, piperis albi & longi, myrrhæ, rutæ hortensis, hyslopi, abrotoni, iridis Illyricæ, singulorum drach. ij. croci, ammoniaci thymiamatis, radices acori, phu pontici, zingiberis, ueratri albi, singulorum drachmam unam. excipe aceto mullo.

C Datur etiam drachma una ex aceto mullo. Colica ut Publius in Putiolo & Apollonio. Polij drach. vi. scordij drach. xij. gentianæ drach. v. feminis rutæ syluestris drach. iij. succi cyrenæici drach. iij. rubricæ lemnis drach. v. myrrhæ drach. viij. opobalsami drach. viij. piperis albi drach. ij. & dimidiam. cachryos drach. iij. uerbenacæ herbæ drachmas duas. pentaphylli drach. v. excipe melle Attico. Da magnitudinem nucis ponticæ.

Quæ Aesclepiades ad coli affectus prodidit. 4
Pharmacum inasperile ad coli inflationes, Antonij pharmacopolæ, huius usus sanus erat. Chrysobalani drach. ij. seselis, astragali, utriusq; sextantem. illyricæ, tragacanthi, utriusq; unc. i. Hæc simul tusa & cribrata, cochlearij unius plus minus mensura, ex aquæ calidæ cyathis quatuor ante cibum exhibeto. Aliud, Gallinarum interanea omnia exempta & in uas fictile coacta affato, ac trita reponito. usus uero tempore cochlearij unum & dimidij, & feminis dauci cretici tasi & cribrati tantundē, ex aquæ mulsæ calidæ cyath. iij. exhibeto.

Ad coli inflationes Charicidis. Cumini Aethiopicij drach. vi. feminis apij drach. v. feminis dauci

Cretici drach. ij. piperis albi drach. i. tusa & cribrata reponito. Dantur ex eo cochlearia duo, cum aqua mullâ cyathis tribus. Aliud, Seminis rutæ syluestris aridi, fefelis malsilici, utriusq; drach. viij. petroselinî drac. iij. sinonis Syriaci drachmas iij. piperis albi drachi. ij. tusa & cribrata exhibe ut dictum est. Eclegma colicis Nectareum. Facit & pleuriticis, & dyspnoicis. Deducit mulieribus menses. Est & concoctorium. Cumini hispani unc. i. piperis albi, zingiberis, utriusq; tantundem, uini dulcis aut Scybelitæ, aut protropi sextarios iij. uini falerni sextarium unum. Mellis Attici libram unam. Arida tunduntur & cribrantur crassiore cribro, Deinde cum uino coquuntur donec tertia pars superfit, deinde affunditur uinum dulcæ ac rursus coquitur. Mouere autem oportet ramulis rutæ uirgæ falcis exceptis, & falcis cortice obligatis. Habenda est ad manum etiam altera uirgæ similiter rutæ ramulos recentiores cõplectens, quo prioribus exsiccatis recentioribus moueas. Postquam autem liquor semel atq; iterum ebullierit, inijce mel ac rursus coque, & excolatum per saccum liquorem repone. Vir expetente mystraria ante & post cibum præbe. Alia Scribonij. Largi ex falcis. Liberat à tota affectione. Corticis falcis drach. iij. zingiberis aridæ drach. iij. phoenix cobalanos vi. numero, aquæ sextarium unum & dimidium. Coquito omnia rutæ ramulis mouens, & ubi tertia pars liquoris restiterit, tum excolato, & cyathos duos quotidie bibendus dato. Hoc uero per triduum facere oportet, & post triginta die non interstitium rursus repetere, quo per annum potiones xxxvi. fiant. Bibitur enim hoc pharmacum per annū totum. In alijs exemplaribus hoc modo habetur. Corticis falcis uiridis drach. v. zingiberis sicci drach. iij. piperis albi drach. iij. palmulari passarum maximarum, quas Græci patetos appellant, numero duas aut tres, rutæ uiridis ramulos v. aquæ pluuiæ sextarios iij. coquito ad tertiâ, & dato ut prædictū est. Alia Pacci Antiochi, à tota affectione liberans. Cornu cerui recens enati mollissimū usi ad albedinem cochlearia iij. maioris magnitudinis. piperis albi grana x. aut ix. myrrhæ parum odoris gratia, omnia teruntur, & cochlea Africana uarij coloris unâ cum testa itidem teritur, uino falerno per saccum non excolato affuso. Sit autem uini mensura cyathorum trium. Hæc omnia in fictili uase permixta ad prunas calcinatus, diligenter mouentes, ne quid ex pharmaco subsidat. Calfactum uero in ipsis irrationibus bibendum dato, item q; sequentibus duobus diebus. Oportet autē diem unam ante, cibum disserere, et reliquis diebus prandio solo uti, in eoq; assumere cibum qui facile confici potest. Alia confectio. Succu fœniculi sextar. iij. mellis Attici sextar. ij. croci drac. iij. crocum in linteolum purum ligato, Succum uero & mel mixta in uase fictili coquito, & falciculo croci moueto. Vbi uero densata fuerit ad arteriæ spissitudinem, Crocum quidem expressum reijcito, pharmacum uero reponito. Visus tempore mystrum unum aut duo an

te cibum dato. Colica Sigonis, qua usus est Valens. Facit in summis doloribus data nucis ponticæ magnitudine, ex aquæ calidæ cyathis tribus, & confectum minuit dolores, & maxime si pruritus per totum corpus fiat. Facit & ad inueteratos spleniticos, et ad uolulosas affectiones. Facit hepaticis & ad febres per circuitum repentes, ac uulnæ strangulatas, & uesicæ affectus. Est & arteriaca bona. Sinonis syriaci aut hispani drach. lx. piperis albi drach. xl. seminis hyoscyami albi drach. xl. opij, corticis mandragoræ, utriusq; drachmas decē, croci drach. vi. mellis cocti quod satis est his excipientis. Quantitas exhibitionis ostensa est.

Alia exemplaria sic habent. Sinonis hispani drach. lx. piperis albi, seminis hyoscyami, utriusq; drach. xl. cornu cerui usi, opij, utriusq; drach. xx. corticis mandragoræ drachmas decem, croci drachmas vi. mellis quod sufficit. Confectio Lingo nis colica, data ex frigida statim soluit dolores. Seminis hyoscyami albi drach. xx. opij, seminis dauci cretici, utriusq; drachmas decē, petroselinî drachmas vi. croci, spicæ nardi, pyrethri, singulorum drach. iij. euphorbij, opobalsami, cinamomi, singulorum drach. ij. Excipe melle cocto, & exhibe fabæ Aegyptiæ magnitudine cum aquæ tepidæ aut frigidæ cyath. iij. in irritationibus. Colica sedans dolorem, qua usus est Cassius. Facit & ad internorum affectiones, pharmacum est ualde bonum. Anisi, nardi Syriacæ, myrrhæ, singulorum drach. viij. piperis albi & longi, utriusq; drach. xij. seminis fefelis drach. vi. opij tantundem, croci, castorij, petroselinî, iunci odorati, singulorum drach. iij. mellis Attici cocti quod satis est. Datur ponticæ nucis magnitudine. Colica sedans dolorē Lucij, confectum eximit dolores, inscribitur Sicula.

Myrrhæ, succi hyoscyami, opij, singulorū drach. viij. radicis mandragoræ, piperis albi, croci, thuris, singulorū drachmas decem. Excipe melle & præbe fabæ Aegyptiæ magnitudinem ex aquæ calidæ cyathis tribus ad noctem. Colica sedans do lorē Eufchemo Spadoni inscripta. Bibitur in dies triginta. Seminis brassicæ syluestris, phu, cinamomi, iridis Illyricæ, acori, asari, opopanacis, myrrhæ, nardi Indicæ, opij, costi, succi mandragoræ, castorij, singulorū drach. vi. trium piperis generum, mei, seminis dauci cretici decorticati, singulorum drach. xij. excipe melle cocto ac præbe fabæ Aegyptiæ magnitudinē, febre carentibus cum uini mulli diluti cyath. iij. febricitibus cum aqua mullâ. Hac etiam in infusis utebatur nucis ponticæ magnitudine, cum fœni græci decocto cyathorum iij. & oleo cui ruta incocta est item cyath. iij.

Ad easdem affectiones confectio Breniti. Croci, opij, opopanacis, myrrhæ, iridis, acori, mandragoræ, asari, costi, nardi Indicæ, dauci Cretici, Mei, singulorum drach. vi. piperis albi & longi, gentianæ, stœchadis, casia, phu pontici, singulorū drach. viij. excipe melle.

De dysentericis. Cap. V

De dysentericis equidē quæ in uniuersum nosse oportet, iam ante dictū est, tum in curandi me-

thodi libris, tum etiam nunc in sermone de hepaticis habito, Reliquum est igitur de vere dysentericis agere, in quibus neque hepar affectū est, neque alia aliqua affectio est, præter intestinorum ulcerationem, aut nudam, aut cum putrefactione aliqua obortam, quam Medici Græcæ consuetudo uocabulo Nomen appellant. Quæcumque igitur ad tales affectiones comoda sunt, & iam frequentis experimento cognita, ea in principio subscribentur.

Quæ ab Andromacho ad dysenteriam scripta sunt.

Porio ad dysentericos & hæmopticos. Floris rosarum, opij, acaciæ, gummi, singulorū drach. iij. balauftij tantundē. succi hypocisthidis tantundem. gallarum drach. ij. seminis plantaginis tantundem, & succi eius tantundem. lycij Indici drach. i. succi rosarū drach. i. Fac pastillos drachmæ unius. Vere uarie. Ad dysentericos & cœliacos, confectio ex fructibus. Mala punica integra xx. mala cotonea xx. erui sextar. i. prunorum syluestrium sextar. ij. Sorborum Ephesinorum sextar. ij. Rhois Syriaci sextar. iij. pira Terentiāna xx. mala Cestiana xxx. filiquis xl. baccarum myrti nigrarum sextarios iij. multi amineci ad tertias de cocti sextarios xlviij. Coquito simul ad mellis spissitudinem & in sigillum reponito. Alia ex fructibus ad eadem. Siomachū subuersum restituit, Imponitur etiā forinsecus. Mala punica x. cotonea xx. mala orbiculata xv. sorborum sextar. ij. mespilorum sextarium unum. glandium sextarium unum. Rhois Syriaci sextarium unum. rubi fasciculum manipularum, baccarum myrti nigrarū sextarium unum. palmas passas, patetos Græci dicunt xxx. acinorum aridorū sextarium dimidium, prunorum syluestrium sextar. i. siliquis magnas x. œnanthes sex uncem, cornorum sextarium unum, mala citria v. passis Cretici sextarios xvi. Coquito simul & reponito in uitro, utere ut priore. Ad dysentericos qua utor. Gallæ, fructus ericæ, opij, singulorum drach. iij. cum aqua redigito in pastillos duorum obolorum. Dato ex aqua aut uino. Ad dysentericos Clidion. Nardi, croci, utriusque drach. viij. aloes drach. iij. ego drach. ij. thuris drach. ij. acaciæ drach. iij. myrrhæ drach. iij. succi hypocisthidis drach. iij. alij drach. vi. rosarum siccarū drach. iij. lycij Indici drach. iij. tragacanthæ drach. iij. opij drach. iij. alij drach. i. obolos ij. piperis drach. ij. alij etiam fridis drach. ij. Excipe aqua. Quidam etiā cinamomi drach. ij. & dimidiam. gallæ drach. ij. fac pastillos obolorum duorum ponderis. Exhibe cum uino myrteo. Ad dysentericos & cœliacos pastillus Beritij. Nardi, croci, utriusque drach. ij. myrrhæ, succi hypocisthidis, aloes, opij, tragacanthæ, lycij Indici, gallæ, anisi, acaciæ, piperis, rhei pontici, singulorum drach. i. tragacantham in uino macerato, & reliqua trita commisceto, pastillosque drachmæ unius formato, atque ipsos ex uino dato. Clidion ad dysentericos. Acaciæ drach. xxv. seminis hyofcyami drach. lvi. baccarum myrti tusarum drach. clx. rhois Syriaci drach. lxx. & succi eius drach. ij. & dimidiam. thuris drach. lxxv. Omnia torrefacta terito & uino nigro excipito. Datur summum

A drach. i. Ad dysentericos & cœliacos. Vini falerni sextar. vi. mellis Attici lib. vi. coquito simul ad multam spissitudinem, utere pleno cochleario ad delingendum dato.

Ad dysentericos & omnia interna uitia, pastillus ab Eudemo seniore. 2

Croci, cassiæ fistulæ, utriusque drach. ij. nardi drach. i. myrrhæ, aluminis, succi papaueris, singulorum drach. ij. cum aqua pastillos formato, & dysentericis ex uini cyathis duobus dato, febrientibus ex aqua, hepaticis & peripneumoniacis ex aqua mulsa. Ita etiam pleureticis & tussientibus. Aliud, ad dysentericos. Seminis foeniculi, anisi, apij, malicorij, singulorum drach. iij. opij drach. ij. cum aqua redige in pastillos duorum obolorum. Dato unum ex aqua. Ad dysentericos & cœliacos ex libris Antipatri. Piperis nigri drach. iij. gallæ drach. iij. myrrhæ drach. ij. croci drach. ij. nardi drach. i. lycij drach. i. succi hypocisthidis, acaciæ, ramento rui loti, gummi, singulorum drach. ij. opij, aloes, anisi, singulorum drach. i. Rhois obsoniorū, drach. ij. Excipe succo rubi & utere. Ad dysentericos, cœliacos, & hæmopticos, e Cornelio medico. Myrrhæ, thuris, aloes, croci, opij, rhois Syriacæ & coriariæ, lycij Indici, acaciæ, malicorij, succi hypocisthidis, gallæ, balauftiorum, singulorū par pondus in pastillis cogito, et ad noctem febre carentibus ex uino, febricitantibus ex frigida dato. Aliud ad dysentericos Valentis. Myricæ fructus, rhois Syriaci, opij, petroselinij, singulorū par pondus torreto ac terito, & cum aqua in pastillos reducto magnitudine fabæ. Da in noctem febricitantibus ex aqua calida, non febricitantibus ex uino. Ad dysentericos ex scriptis Lucij. Styracis drach. ij. opij, croci, acaciæ, gallæ, fructus myricæ singulorum drach. i. cum aqua pastillos facito ac dato fabæ Aegyptiæ magnitudinem cum uino. Ad dysentericos & hæmopticos, statim ad primam potione cohibet fluxum. Cochlearū usfarum drach. xij. cornu cerui usfi drach. xx. obol. ij. baccarum myrti nigrarum drach. xv. opij torrefacti drach. v. obol. ij. gallæ tostæ drach. v. obolos ij. œnanthes drach. vi. succi hypocisthidis drach. v. obolos ij. radices mandragoræ drach. xij. succi rhois, terre albis, utriusque drach. xij. rhois culinarij drach. iij. malicorij tosti drach. vij. thuris drach. viij. coricis pinus torrefacti drach. vi. seminis apij drach. xiiij. hyofcyami tosti drach. x. rhois coriarij sextar. ij. acaciæ tostæ drach. v. obol. ij. Vini nigri, quo rhus coquitur ut crassissimus succus fiat. Coquito itaque cum uino, atque colato, & cum succo reliqua subacta in pastillos drachmales, & triobalares, ac diobalares cogito, & pro habitu exhibeto. febricitantibus cum aqua calidæ cyathis iij. Non febrientibus cum uini cyathis ij. In alijs exemplaribus cornu ceruini drach. vi. obol. ij. habentur, & gallæ drach. vij. & acaciæ tantundem. Ad dysentericos Flauij Pyctæ, id est, pugilis. Baccarum myrti aridarū tusarum sextariū unū. rosarum siccarū tusariū, sextariū dimidium. fecis malabathrinij drach. ij. baccarum tuniperi drach. xxx. pirorum aridorum tusorum sextar.

textar. i. corticis pinus drac. xij. myrrhæ drac. i. gal-
 las v. siliquarū tarsarū sextarium unum. Dantur ad
 summum drach. viij. Dato aridū cum uino diluto.
 Que uero crassiora sunt palmulis pinguisbus exce-
 pta exhibeto. Ad coeliacos. Sissit fluorem con-
 festim. Fructus myricæ drach. iij. rhois cibarij
 drach. iij. baccharum myrti nigrarum drach. iij. ac-
 ciæ drach. ij. succi papaueris drach. i. excipe malo-
 rum spissamento & fac pastillos drachmæ ponde-
 ris, ac utere cum ouī afflati uitello. Vbi uero biben-
 dum dare uolueris, radicem rubi, aut myrrum, aut
 mala cotonea coquito, atq; decoctum horum frigi-
 dum cyathorum iij. mensura cum pharmaco da-
 to. Facit & lētericis. Potio ad internos fluores,
 forissecus etiam cum melle cocto impositum facit.
 Anisi drach. ij. succi hypocisthidis sescquidrach-
 mam, seminis rosarum sescquidrachmam, succi pa-
 paueris drach. unam. myrrhæ drach. unam. croco-
 magmatis drach. i. Dantur cum aqua oboli. iij. &
 duo, & unus item. Potio ad omnem fluxionem
 & inflationem, Lucij Tarsensis. Anisi, seminis a-
 pipij, utriusq; drach. ij. seminis anethi, dauci, tordylj
 singulorum drach. iij. opij, seminis hyofcyami, u-
 triusq; sescquidrach. Excipe aqua atq; ita utere. Po-
 tio ad fluxum muliebrē sistendum, ut Apollonius.
 Coralli oboli. iij. balaustij obolos iij. gummi oboli
 unum. excipe oui crudi candido, & dimidium to-
 tius cum aquæ cyath. iij. præbe.

Infusa Dysentericis commoda. 3

Infusum ad dysentericos, lidiori, ad exulceratio-
 nes factas in intestino recto. Cineris chartæ drach.
 x. aluminis scissi drach. iij. auripigmenti drac. iij.
 sandarachæ drach. iij. squamæ æris, omphacij, utri-
 usq; drach. iij. croci, succi papaueris, utriusq; drac.
 ij. calcis uiuæ drach. v. Trita misce & excipe uino
 dulci, ac forma pastillos drachmarū trīum, & dua-
 rum ac unius ponderis. Vfus tempore uino auste-
 ro diluuntur ad strigmentitiam crassitudinem, mi-
 scenturq; succi ptisanæ cyathi duo. Infundito hæc
 simul aegroto ita ut tum de ptisanæ succo, tum de
 pharmaco pro uiribus ipsius sumas. Infusum
 Faustianū. Auripigmenti drach. xij. chartæ ustæ
 drach. xxx. sandarachæ drach. vi. calcis uiuæ drac.
 x. alij xij. cogito in pastillos, quatuor drachmarū,
 & cum plantaginis succo, in quo spissamenta inco-
 cta sunt, infundito. aut uini diluti cyathos iij. In-
 fusum quo uitor Athenæi. Concordat Harpocræ,
 Magno Philadelpho, Aristolao. Omphacij drac.
 vi. aluminis scissi drach. vi. calcis uiuæ, squamæ æ-
 ris, utriusq; drach. vi. auripigmenti drach. viij. san-
 darachæ drach. iij. chartæ ustæ drach. xv. Cum ui-
 no myrteo pastillos drachmarum iij. aut iij. forma-
 to. Infunde cum uini diluti cyathis iij. & aquæ te-
 pidæ cyathis duobus. Quandoq; etiam cum aqua
 pluuiali. Infusum quo uitor. Chartæ ustæ drac.
 xxx. auripigmenti drach. xij. gallæ drach. ix. calcis
 uiuæ drach. xvi. bituminis drach. xvi. sulphuris ui-
 uæ drach. xvi. sandarachæ drach. xvi. Infusum
 aliud ut Idius. Aëris usti drac. xxxiij. calcis uiuæ,
 aluminis scissi, utriusq; tantundem. chartæ ustæ
 drac. xxx. auripigmenti drac. xij. sandarachæ drac.

A xij. Excipe uino myrteo, aut rosarū decocto, que
 cū uino austero ad dimidias coctæ sunt & expres-
 sæ, forma pastillos, eosq; infunde cum aqua. In-
 fusum ab Eubulo. Squamæ æris drach. xx. char-
 tæ ustæ drach. xvi. calcis uiuæ drac. vi. auripigmen-
 ti drach. viij. sandarachæ drach. xv. omphacij drac.
 iij. fecis uini ustæ drach. i. excipe uino myrteo, &
 infunde cū uino diluto calido. Infusum Heræ.
 Chartæ ustæ unc. i. calcis uiuæ unciam dimidiam,
 cadmiæ unc. i. auripigmenti unc. unam. Ex hoc ari-
 do cochlearia duo cum decocto baccharum myrti,
 aut uino myrteo cyathorum iij. mensura infunde.
 Calcē uero cum succo plantaginis extingue. In-
 fusum aliud eiusdem. Sandarachæ, auripigmenti,
 utriusq; drac. viij. acaciæ drac. iij. calcis uiuæ drac.
 iij. excipe uino austero, & coge pastillos drach-
 marum trīum. In debilibus uero minus cum uino
 diluto infunde. Aliud, Sandarachæ drac. viij.
 calcis uiuæ recentis drach. x. chartæ ustæ drac. viij.
 alij drach. xxx. malicorij, gallarum, acaciæ, singu-
 lorum drac. v. manarum aceto conditarū ad dies
 uiginti unum, ac ustarum drach. iij. auripigmenti
 drach. xvi. Vrutur manæ in olla cruda, Et aliqui
 arido medicamento utuntur, aliqui in pastillos cū
 myrti baccharum decocto cogunt. Si uero non mo-
 rētur pharmacum retentum, ante eius usum poly-
 goni succū aut muriam infundito. Infusum quo
 uitor Aphtha appellatū, Rois Syriaci, gallarum
 ustarum, utriusq; drach. xv. chartæ ustæ tantundē,
 C suberis usti drach. xv. panis Alexandrini sicci usti
 drac. xv. auripigmenti drac. viij. sandarachæ drac.
 x. acaciæ drac. v. cerusæ drac. viij. calcis uiuæ drac.
 x. spumæ argenti drach. iij. Excipe uino ueteri &
 forma pastillos, alios duarū, alios trīum, alios qua-
 tuor drachmarum pondere. In principio quidem
 per plantaginis aut sanguinaria, aut helxines suc-
 cum infundito. qui si non adsint, aquā, Si uero ut-
 gor sit, & morbus fortis cū dolore, cum foeni gra-
 ci aut seminis lini decocto infunde. In declinatio-
 ne autem cum decocto myrti & rubi uino cocto-
 rum. In pueris cyathorum duorum copia, In foemi-
 nis trīū, in uiris quatuor. Infusum quo uitor Gem-
 melli. Auripigmenti drac. viij. sandarachæ drac.
 iij. calcis uiuæ drach. viij. squamæ æris drac. vi. alu-
 minis scissi tantundem, omphacij drach. viij. licij
 D Indici tantundem. succi papaueris drach. iij. suc-
 ci hypocisthidis tantundem, croci drach. ij. ego
 autem drach. iij. chartæ ustæ drach. viij. Infunde
 cū uino diluto. Infusum Agathi. Auripigmen-
 ti drach. ij. sandarachæ drach. v. calcis uiuæ drach.
 iij. chartæ ustæ drach. iij. Ex hoc pharmaco drach.
 iij. cum sale trito infundito in aquæ frigidæ cyathis
 vi. Infusum Nicolstrati ad dysentericos, quo
 Menander usus est. Calcis uiuæ drach. i. gypsi
 drachmas viij. acaciæ drachmas ij. omphacij drac.
 i. stybij drachmas iij. thuris drach. i. gallæ drach.
 iij. tragacanthæ drachmas duas. cum uino myr-
 teo cogito in pastillos. Reponuntur reliquis ab
 expressio uuarū succo restantibus stipati, ne trans-
 pīrent. Infusum ad dysentericos Thamyra.
 Auripigmenti drachmas duas, aluminis scissi
 drachmas

drach. ij. cadmiæ tantundē. calcis uiuæ nouæ drac. i. chartæ uſtæ drach. ij. ſuberis ex dolio uini falerni uſti drach. vij. & diſſidiam. Cum ſapa aut paſſo hiſpano apud te recocto, paſſillos cogito. Cæterum paſſillis rurfus tritis cochlearia ij. inſundito. Reliquis pro uiribus cum lenticulæ decocto, Si lenticula non addit, rubum cum roſis aridis decoquito, & ſeorſim myrti baccas cum uino auſtero coquito, & utriuſq; cyathum unum miſceto. Quandoq; uero uini cyathos iiij. & rubi decocti cyathos ij. Facit item in potu acceptū pro uiribus ad cochlearia plus minus menſuram ex frigida aqua. Inſufum ut Deletius Epagathus. Auripigmētī drac. xij. ſucci hypociſthidis drach. ij. ſandarachæ drac. ij. chartæ uſtæ drach. xxx. calcis uiuæ drac. xxiiij. balaufij drac. xlvij. Balaufium in uino ueteri auſtero coquito. Deinde cum decocto reliqua teruntur, formanturq; paſſilli drachmarū quatuor, quidam uncia ponderis faciunt. Inſunduntur autem in myrti baccarum & lenticulæ decocto.

Quæ ab Aſclepiade ad dyſentericos ſcripta ſunt, Quorum aliqua etiam cœliacis conueniunt. 2

Vini myrtiæ ſextarios ij. Rhois rubri heminā i. mellis Attici cocti lib. i. Rhoem & uinum coquito rubi ramulis mouendo, & ubi tertia pars reſtiterit, liquorem exprimito, etq; mel adijctum ac rurſus coquito donec ſpiffetur. Datur myſtrum ante cibum. Aliud, Rhois Syriaci, farina polentæ, uuæ paſſæ non exacinata, ſingulorū drach. ij. malicorij tuſi & cribrati drach. i. excipe melle cocto, dato miſtum ante cibum. Paſtillus cœliacis & dyſentericis. Ouum crudum recens perforato, & in uacuſculum euacuato, & cum teſta ſubſcripta menſurato. olei omphacini teſtam oui unam, piperis albi tenuiſſime triti tantundem. gallarum omphacitidum tantundem. farina tritici tantundem. Omnia ſubacta & mollita in paſſillos redigito, & in ſartagine fricta ante cibum dato. Aliud. hoc ſcimus multos uſos à morbo liberatos eſſe. Gallarum ſubtiliſſime tritarum cochlearium. piperis albi, rhois rubri, malicorij tenuiſſime triti, ſingulorum tantundem. Omnia mixta oui luteo excipe, & in uacuam mali punici teſtam conijce, atq; obturato cum farina oſculo iplius, ad prunas torre, deinde depurgata mali punici teſta, cochlearium unum comedendum exhibe. Catapotia, cœliacis, dyſentericis. Gallarum omphacitidum non perforatarū drach. iiij. opij hiſpani drach. ij. petroſelini drac. i. excipe aqua, ſac catapotia, & da magnitudine ciceris: uirum tamen ratione circa menſuram habita. Aliud Alpaſū, pharmacum generoſum. Petroſelini, fructus ericæ, rhois Syriaci, opij, ſingulorū drach. ij. cum myrti decocto in catapotia redigito, ac dato ut dictum eſt. Paſtillus ſedans dolorem, cœliacis & dyſentericis. Et bibitur & inſunditur. Quandoq; etiam ipſo pro cataplaſmate utimur excipientes melle cocto. Seminis hyoſcyami drach. iiij. ſeminis apij tantundem, aniſi, ſlorum roſarum, utriuſq; drach. ij. hypociſthidis, opij, utriuſq; drach. i. Cum aqua trita in paſtillos reducito, & obol. iiij. exhibeto. Febrē non ha-

bentibus cum uini diluti cyathis tribus, febricitantibus cum aqua. Aliud cœliacis, dyſentericis pharmacum accōmodatum, & bibitū & inſunditur, & forinſecus impoſitum auxiliatur. Seminis apij, ſeminis hyoſcyami, aniſi, foeniculi, ſingulorum drach. iiij. opij, Rhois Syriaci, utriuſq; drac. ij. ſucci hypociſthidis, balaufij, ſingulorū drach. i. excipe aqua & coge paſtillos, dato ut prædictum eſt. Paſtillus aromaticus, cœliacis, dyſentericis, Berytij appellatus. pharmacum accōmodatum, ſiſtit confectum. Croci drac. iiij. nardi Indicæ, aniſi, utriuſq; tantundē. myrrhæ drach. ij. aloes Indicæ, ſucci hypociſthidis, ſucci papaueris, gallarum omphacitidum, tragaçathæ, piperis albi, ſingulorum tantundem. Excipe uino & forma paſtillos, dato obolos. ij. Paſtillus Philippi, ad dyſentericos inueteratos, ſedans dolorem, Bibitur & inſundit.

Balaufij, acaciæ, ſucci hypociſthidis, Rhois, opij, thuris, myrrhæ, baccarum myrti nigrarum, croci, gallarum, lycij, aloes, Rhei pontici, malicorij, ſingulorū drach. iiij. Excipe uino Italico, & coge paſtillos pondere obolorum iiij. da non febrientibus cum uino. Febrientibus cum aqua muſſa. Paſtillus ſedans dolorem, præclare inducens ſomnum, Ad inueteratos dyſentericos. Chartæ uſtæ drac. x. ſandarachæ, auripigmenti, ſquamæ æris, aluminis ſciſi, omphacij, calcis uiuæ, ſingulorū drac. v. croci, opij, utriuſq; drac. ij. Singula diligenter trita in paſtillos drachmales cum uino myrtite coagmentato, ac uiritor. Inſunduntur ad ſummū ex eo drach. iiij. Medium duæ, minimū una. In conſciedo autē omphaciū cum opio tibiſi in uino myrtite maceratū. Crocus ſeorſum teratur. deinde ſimul mixta probe terito, & additis aridis unito, aniſi maduerſione habita ne pharmacum à calce uiuæ exuratur. Si tamen tale quid conſequatur, de myrtite ſufficienter affunde ut omnia diſſoluantur. Oportet autē calente adhuc pharmaco paſtillos formare. Vſus iuxta apponderationis uariationē, ſit ſecundū quod acri ſubtili aut hebetenſu præditi, id tolerare poſſunt, & ſecundum magnitudinem affectionis. Inſundito autē diligenter in non febricitantibus cum uini auſteri diluti cyathis vi. in febrientibus cum aqua, aut decocto palmularum, aut roſarum, aut myrti. Ante inſuſionem detur panis non febrientibus cū uino diluto. febrientibus ex aqua. Alius dyſentericis non febrientibus, facit confectum. Chartæ uſtæ drach. x. ſandarachæ, auripigmenti, ſquamæ æris, aluminis ſciſi, omphacij, lycij Indici, acaciæ, ſucci hypociſthidis, calcis uiuæ, ſingulorū drach. v. croci, opij, utriuſq; drac. ij. excipe uino myrteo, & forma paſtillos magnitudine differentes. Inſunduntur ad ſummum drach. iiij. Inſundere autē oportet quantitate pharmaci ad magnitudinem affectionis apponderata. Sicq; liquor paſſum creticum dilutum, & ex eo ad ſummū cyathi vi. inſundantur. Epithemata cœliacis, dyſentericis. Seminis hyoſcyami albi, apij, utriuſq; trientē, aniſi, ſloris roſarum, ſucci hypociſthidis, balaufij, Rhois Syriaci, ſingulorū ſextantem. ſucci papaueris unc. i. Hæc ſingula cum uino

myrteo terito, deinde mista in pastillos cogito, eosq; in umbra siccato. Inde uero quantū sufficit tundens & cribrās palmis pāsis excipito, deinde sine oleo infarctā uetri imponito. Aliud. Succī acacię, malicorij, seminis hyoscyami, opij, gallarū, omphacij, Rhōis Syriaci culinarij, singulorū quadrantum. baccarum myrti nigratum heminam unam, tundito, cribrato, & uino austero subacta in pastillos coagmentato, eosq; in umbra siccato. Vfus iam ostensus est.

De affectionibus & uitijs sedis. Cap. VI

Sedis uitia & affectus ob multas causas diffici- lem curam accipiunt. Multo enim sensu particula hæc prædita est, dictum autem sæpe est eiusmodi particulas facile per acriora & austera pharmaca irritari. At uero & ipse retrimentorū alimenti tran- situs per se mordax est, & hoc magis ubi eruperit ipsa bilis, & ferosi quidam aliquando humores. Quibus accedit & hoc, quod neq; statum tempus habeant medici ad imponenda pharmaca, sed ple- rūq; tempore minime conuenienti ægri ad excer- nendum concitatur. Quin & humiditas ac calidi- tas ipsius loci, ficcantibus simulq; frigefacientibus opus habens, non parum confert ad hoc ut æ- grie curabitis anī affectio existat: si quidem mor- dent adstringentia. Verum locus subtili sensu præ- ditus, acrimoniam ferre nō potest. Ob id igitur ap- tissima ipsius pharmaca sunt, quæ citra aspretudi- nē adstringūt. Qualia maxime sunt ex metallicis, quæ neq; acra, neq; acerba penitus existunt. Hæc em̄ lota citra mordacitatē id quod oportet operan- tur. Horum itaq; in summa dīctorum memores, deinceps materiæ sylum experimento cognitam subscriptam habebitis.

Medicamenta Sedis seu ani ab Andromacho conscripta. 2

Medicamentum sedis quo uor. Cerussæ, spu- mæ argenti, utriusq; 3. quinq; thuris, aluminis scis- si, utriusq; 3. tres. croci obolos iij. Vini & rosacei quod satis est. Aliud ad sedem, ut Apollonius, quo uor. Lycij Indici, sextantem. œsypī unc. i. ceræ Tyrhænica trientem. aliq; sextantem. Rosacei quod satis est. Aliud. Butyri fescunciam. ceræ fescunciam. medullæ ceruinæ unc. unam. œsypī, unc. i. thuris unc. i. aluminis scissi quadratē, lycij sextantem. Vini & rosacei quod satis est. Aliud ut Nicoftratus. Ceræ Tyrhænica unc. i. lycij Indi- ci sextantem. balaustij unciam dimidiam. œsypī unc. i. acaciæ unc. dimidiam. rosacei trientem. Aliud ut Herophilus. Rosarum siccarum aut uiri- dium 3. duas. cerussæ drach. ij. pompholygis 3. duas. croci 3. duas. spumæ argenti lotæ 3. duas. meliloti drach. duas. iunci odorati 3. unam. succi papaueris drach. unam. œsypī 3. unam. oui assati uitellum u- num. Rosacei quod sufficit, succi plantaginis cya- thos duos. Aliud faciens ad pruritus. Spumæ argenti libram dimidiam. thuris, terræ samię, u- triusq; unc. unam. œsypī sextantem, rosacei sextan- tem. melini librā dimidiam. Arida in umbra cum uino salerno terito, œsypumq; infarctito, & affu- sus duobus ungentis terito ac commisceto. Aliud ad sedem quo uor, ad condylomata, inflam-

Galen,

mationes ani ac rimas. Ammoniaci thymiamatis, lapidis hæmatitæ, thuris, aluminis rotundi, singulorum 3. duas. gallæ, croci, utriusq; 3. unam. terebinthinæ 3. unam. cerę tyrrhænice 3. duodecim. rosacei heminas quatuor. excipe pello cum Syriaco, in reliquis cum rosaceo. Medicamentum se- dis ex cerebellis. Adipis anserini curati, ceræ, thuris, medullæ cerui, florum rosarum, pompholy- gis, cadmiæ, plumbi loti, singulorum 3. quatuor. cerussæ drach. octo. cerebri gruis 3. duas. succi papa- ueris sesquidrachmam. œsypī 3. quinq;. succi feridis heminam unam. rosacei heminam dimidiam.

Medicamentū sedis à Rustico, quo uor. Rosarium uiridium 3. octo. lactis muliebris heminā unam. spumæ argenti 3. quadraginta. succi papa- ueris 3. xl. oua cruda integra duo. butyri 3. sexdecim. œsypī 3. sexdecim. malicorij drach. sexdecim. mellis 3. centum. in alio exemplari heminam dimi- diam. cerę 3. quadraginta. rosacei aut myrtei hemi- nam dimidiam. Verum Heras pro œsypo adipem anserinum pari pondere coniecit, & spumę argen- ti drach. decem. lactis heminas quatuor. & oui ut- tellum assatum. Aliud à Tyranno. Spumæ argenti sextantem. cerussæ sextantem & unc. dimi- diam. thuris ½ unam. myrrhæ ½ unam. cadmiæ fescunciam. aluminis scissi trientem. ceræ trientem. Vinum & rosaceum. Aliud Samithræ ad multa commodum. Spumæ argenti 3. duodecim. ce- russæ 3. duas. chalcitidis 3. duas. misyos assati 3. unam. terebinthinæ drach. sex. olei & aquæ hemi- nas quatuor. Pinguis compositio ad Achoras & psoras. Spumæ argenti, cerussæ, utriusq; drach. xxxij. atramenti futurij 3. sexdecim. sulphuris uiuī 3. octo. olei myrtei & aceti quod sufficit. Alia pinguis Galli. Spumæ argenti 3. uiginti quatuor. cerullę 3. uiginti quatuor, myrrhę 3. octo. thuris 3. decem. olei myrtei drach. quatuordecim. Vini au- steri tantundem. Alia pinguis qua uor, Cleo- phanti. Olei myrtei, lentiscini, rosacei, singulo- rum 3. sexdecim. cerussæ libram unam. spumæ argenti lotæ sexuncem. Vini ueteris Italici sextar. di- midium. ceræ trientem. Alia ex nouem medica- mentis constans, Enneapharmacos dicta. Mel- lis partem unam. ceræ albæ partem unam. medul- læ ceruinæ, myrrhę, utriusq; partem unam. butyri partem unam. adipis anserini, adipis uitulini, u- triusq; partem unam. terebinthinæ partem unam. olei partem unam. aliqui & ricini partem unam.

Alia Xanithæ multi usus. Cerę 3. sexdecim. bu- tyri 3. decem. œsypī 3. decem. adipis anserini 3. octo. terebinthinæ 3. octo. medullæ ceruinæ drach- mas quatuor. Rosacei parum. Alia ex ruta.

Spumæ argenti minam unam. rutæ minam di- midiam, aliq; minā unā. aceti 3. quatuor. olei quod satis est. Alia ad obturationes & alia sedis uitia.

Plumbi usti & loti drachmas x. cerussæ drach- mas quatuor. cerę drachmas xij. adipis porcini uel anserini drachmas quatuor. olei quantum sufficit.

Ad obturationes & uitia sedis cōpositio Ico do- ti, qua Astainus curatus est. Oesypī 3. unam. obo- los iij. adipis anserini per hycem curati 3. sex. partem

tom, 5

K. celtatem

æstatem drac. iij. medullæ cerui aut cameli drac. ij. A
 ceræ Tyrrenicæ drach. viij. plumbi usti & loti 3.
 quatuor. ladanij drac. ij. adipis uitulini drach. qua-
 tuor. terebinthinæ drach. iij. cerussæ drach. ij. spu-
 mæ argenti drach. unam. rosacei hemina quartam
 partem, hoc est selquicyathum, hoc est sextantem
 & unciam dimidiam. Arida cum liquidis commit-
 tito. Quando uero temporis progressu fuerit indu-
 ratum, dissoluitur rosaceo, & adipe anserino, facit
 & ad contractos articulos. Ad condylomata
 quo melius nullum reperitur. Aluminis scissi 3.
 tres. ceræ drac. octo. croci drach. iij. opobalsami
 drach. unam. cæsypij drachmas octo, thuris drach.
 quatuor. aloes drach. iij. liquefabilia liquefacito
 ac cum aridis tritis committito.

Ad prolabantem podicem. *Asclepiade pharmacæ
 ex quinto externorum.* 3

Ad prolabentes podices ut Archelaus. Re-
 crementi plumbi drach. viij. Rhois Syriaci drach.
 viij. floris rosarum drachmas quatuor. myrrhæ Min-
 nææ drac. ij. admoue siccum, ubi prælaueris uino
 austero aut lentifici decocto. Aliud. Gallæ oino
 phacinæ, malicorij sicci, rhois coriarij, singulorum
 drac. ij. plumbi usti drac. iij. Spumæ argenti drach-
 mas viij. trita inspergito. Aliud. Balauftij drac.
 unam. malicorij drach. ij. feminis hyoscyami drach-
 mas duas. cerussæ drach. viij. myrrhæ drac. ij. plum-
 bi loti drach. ij. tritis utitor. Aliud. Corticis pi-
 nus, spumæ argenti, manna, singulorum drach. ij.
 pilularum cupressi aridarum drach. ij. plumbagin-
 nis drach. ij. trita insperge, ubi prælaueris uino a-
 cerbo. Pharmacum nostrum ad proidentem
 sedem. Fructus ericæ, gallarum, acaciæ, cerussæ, suc-
 ci hypocythidis, corticis pinus, thuris, myrrhæ
 Minnææ, singulorum drach. quatuor. arida trita
 insperge, uino austero prælotis locis.

De hæmorrhoidibus. Cap. VII

Quæ Asclepiades in quinto externorum de hæ-
 morrhoidibus scripsit, in subscripto sermone con-
 tinentur. Quandoquidem uero plurimæ hæ-
 morrhoides opus habent extractione ad facilem
 pharmacorum impositionem, necesse est etiam
 huiusmodi compositiones subscribere. Extra-
 ctorium hæmorrhoidum Magni Tarsensis, phar-
 macum accommodatum. Piperis, nitri, utriusq;
 drach. unam. terito & admoueto ante reliquorum
 pharmacorum impositionem. Aliud. Spumæ
 nitri, fellis tauri, staphidis sylvestris, singulorum
 drachmiam unam. trita adhibe, modico addito mel-
 le. Aliud. Succus absinthij drach. unam. fellis tau-
 ri, staphidis sylvestris, utriusq; drachmā unam. A-
 liud ut Diogenes. Succus cyclamini, mellis, utri-
 usq; parem mensuram coquito in uase æreo, ad ce-
 ratum liquidum spissitudinem. Aliud ex scriptis Lar-
 gi, quod uix pronueus extrahit hæmorrhoidas.
 Succus centaureæ drach. ij. aluminis liquidij drac.
 duas. misyos drac. unam. staphidis sylvestris drac.
 unam. excipe melle & anum obline, aut lanam ex
 eo madefactam in sedem inde. Postquæ uero hoc
 pharmacum promptitudinem induxerit ad ege-
 rendum, & tumor hæmorrhoidarum procliderit,

pharmacæ ad hæmorrhoidas conscripta adhibeto,
 Quædo uero aliquod huiusmodi pharmacum illi-
 sedem ac anu ipsam extrahit, necessario tales cose-
 ctiones adhibemus, qualis est & Nicodemi Romæ
 medicantis, quæ Euaphion à lenitudine appella-
 tur. Cerussæ unc. i. spumæ argenti quincuncem,
 cadmiæ bestem. aut pompholygis unc. i. olei myr-
 teti bestem. Vini boni bestem. butyro unc. unam.

Ad sedem inflamatam ac prolapsam. Gallam
 flauam coctam ac tritam imposito, cum uino si fortio-
 re uti uelis, aut cum aqua si mitiore. Succus ite Echi-
 ni facit ad inflammationes & prolapsam sedem.

Aliud. Corticis pinus drac. octo. pilularum cu-
 pressi aridarum drac. ij. prælotis uino austero insper-
 gito. Ceterum ad ardentes sedis dolores, oui assati ut
 B telli uino albo terito, et cerato myrteo exceptum il-
 linito. Verum ad pruritus cimolia trita cerato myr-
 teo excipito. Ad rimas uero tum sedis, tum puden-
 di, rasuram linteolorum urito, eiusq; cinerem cum
 pari amylo tritum succo foliorum oleæ ammixto, il-
 linito. Pastillus ad eminentias, Aloes, croci, u-
 triusq; drachmas duas, & dimidiam, aluminis scis-
 si unc. i. terito cum uino Aminæo ac utitor.

Ad pudendorum affectiones. Cap. VIII

Exulcerati pudendi cognitio ex manifesto cir-
 ca ipsum dolore contingit, unam cum hoc quod &
 circa mictiones excernitur quid ex corpusculis ul-
 ceri ipsi insidentibus. Discernuntur autem hæc ab
 eis quæ ex uesica feruntur, quod statim circa pri-
 mum exitum illa apparent, uerum ex uesica dela-
 ta ipsi urinis ammixta sunt. Cæterum ulcera pu-
 dendorum & circa sedem citra inflammationem co-
 sistentia, resiccantibus ualde indigent pharmacis,
 qualia sunt, quod ex charta usta constat, & anethum
 uultum siccū, & cucurbita usta, Verum siccis & re-
 centibus ulceribus, etiam aloë bonum est pharma-
 cum, si eius arida puluillus inspergatur. Omnium au-
 tem maxime dolorē sedat, neq; ullo minus efficax
 est pompholyx, Si uero humectiora sint ulcera, pi-
 nus cortex per se, & lapis hæmatites, uerum si pro-
 funda etiam sint ulcera, manna prædictis adda-
 tur. Porro quæ circa uterum aut uesicam sunt ul-
 cerationes, iisdem pharmacis indigent, sed instru-
 mentis insuper opus habent, quæ ipsa intromittat,
 quæ metrenchyæ & Catheteris Græcis appellantur.
 Aptiora itaque sunt arida qualis est crocus, &
 D pompholyx, & aloë, quæ facile plantaginis aut al-
 teri tali succo miscuntur. Ad Scroti & pudendi
 dolores. Butyro & resina pari mensura utere.

Aut semen lini cum aqua coquito, & ammixta
 myrrhæ fermē decima parte, & resina tantundem
 imposito. Ad pudendum intumescens. Folio-
 rum uitis tenerorum drac. i. cerussæ drac. v. trita ca-
 taplasmatis uice impone. Vtere etiā marinæ aque
 frigida perfusione, & quiete, & colis religatione.

Aliud. Lenticulam in aqua coquito, & cum ma-
 li punici cortice tritam imposito. Si uero à sudo-
 ribus ulcera in scroto fiant, gallam tritam cum ala-
 mine inspergito. Ad tubercula uero in pudendis
 nascentia piri semen inspergito, & fel hircinum obli-
 nito. Cæterum fissuras ac rimas pudendorum ne-
 uatres

uarellina fricta cum rosaceo trita ad strigenti-
tiam crassitudinem, ammixto etiam oui assati ui-
cello. Aut rosacei, & amyli, ac thuris, singulorū
uncia una. Aut foliorum hederæ aridorum usto-
rum cinis cum oleo in mortario plumbeo tritus.

Ad inflammationes autem pudendorum, uuam
passam exacinatam, & cuminum, trita imponito.

Aut farinā ordeaceam aqua multa coquito, &
uicis folia tenera cū polenta terito, omniaq; simul
imponito. Aut cuminum tritum, cum butyri &
resinæ æqualibus partibus eliquatis conmittito.

Testiculos porrò uulcere aphthæ nō ablimili ap-
prehensos, ex terra cimolia cum aqua oblinito, &
exsiccatissimo. Inde q; aqua calida ablutos myrto-
arida trita & modico smyrnio item trito consper-
gito. Exrescentem uero testium carnem cinis
samentitius cum nitro & aqua subactus sanat ca-
ptalasmatis uice impostus.

De priapismo. Cap. IX

Priapismus est auctio pudendi stabilis in longi-
tudine ac orbem tumefacti, citra rei Venereæ ap-
petentiam. Est autem status uentosus uidelicet qui
membrum ipsum tumefacit, ex humoribus uisco-
sis ac crasis generatus per moderatam caliditatē.
Palam igitur non oportere membra ipsa calfa-
cere, sed refrigerare leniter per ceratum rosaceum
in aqua cōquassatum, itemq; per chamæmelinum
ceratum tum pudendo, tum lumbis impostus. Vi-
ctus & pharmaca exhibeantur attenuatoriæ facul-
tatis citra manifestam calfactionem. Adhibenda
sunt etiam naturalis efficacia prædita per experien-
tiam inuenta, nymphæa q; in potu danda ac uitticis
semen. Ruta etiam uiridis obsonijs ammiscetur.
Verum hoc à principio ne fiat, multum enim cal-
facit, sed posterius post aliorū extenuantiū usum.

ARGUMENTA CAPITVM LIBRI X

Cap. I De nephriticis. 2. Andromachi nephriticæ
confectiones, ad renum & uesicæ affectiones. 3. Ascle-
piadis. 4. Archigenis. II. De ischiadicis, podagra,
& arthritide. 2. Andromachus ad ischiadicos. 3. As-
clepiades ad ischiadicos, arthriticos, et alios affectus ma-

A Quod si euacuatione uti libeat, per uomitū id fiat.
Quæ enim per inferior em uentrem fiunt euacua-
tiones, sep numero uicinas partes fluxione in-
stant. Adeos qui se in somno permingūt. Ve-
sicam caprinam aut ouillam uisam ex posca biben-
dam præbeto. Et ad uesperam siticulosos somnium
petere iubeto, facit & leporis testiculus in uino o-
dorato seruefactus, atq; ita potatus. Aliud. Ca-
lamintham & myrrham in uino ante cœnā biben-
da dato. Oblinat autem & pudendum cimolia ter-
ra cum perdicij succo.

Ad uteri affectus. Cap. X

In uteri suffocatione contingit sensus ac motus
priuatio, & pulsus obscurus ac paruus, & penitus
interceptus. In aliquibus uero tum sensus, tum mo-
tus adest, itemq; ratio, uerum uix respirant. Aliqui-
bus etiam uox intercepta. Alijs contrahuntur ar-
tus. Fit igitur & sensus & motus & spirationis
interceptio ob frigiditatem, quum ipse sola per
spiratione totius corporis per arterias cōtingente
contentæ sint, & respirationem per os non expe-
tant, atq; hoc ut dictum est ob frigiditatem. Quan-
do sanè in priori tempore probe purgatæ, & conc-
ipientes, ac uiris coeuntes, his ipsis priuatae fue-
rint, ut palam sit humidum & frigidum in ipsis se-
men totum corpus perfrigerare. Ad uulua igitur
strangulatus conuenit agarici drach. i. in potu
accepta ex uino, Plantaginis semen & succus cum
uino. Onyx detractus ex conchylio potatus. A-
cetum scilliticum absorptum. Cæterum olfactū
excitant strangulatas, bitumen, castorium, galba-
num, pix liquida, cedria, pili usi, ruta, alliū, cepa.
Eandē in rem & cornu cerui sufficitur. Et ruta cum
melle lana excepta, in anum inditur.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

PHARMACORVM SECUNDVM LOCOS LIBER. X

De Nephriticis. Cap. I

VOD Nephriticas antidotos
& compositiones appellent
quæ renibus affectis cōmo-
dant, ex ipsa appellatione ma-
nifestum est, Nephriticæ
nihil aliud quàm renales so-
nant. Est autē differentia ipsa-
rum generalissima duplex.

Quædam enim calculosos renes iuuant, Quædam
uero inflammatos & ulceratos, quæ etiam ad uesi-
cam similiter affectam conueniunt. Maxime uero
contrariæ inter se sunt prædicorum pharmacorū
facultates. Quæ enim ad inflammatas & ulceratas
affectiones cōponuntur, mitigatorijs medicamen-

Galen.

Dtis opus habent. Quū uero impossibile sit hæc ci-
to ad regiones renū peruenire, ob id ipsi pharma-
ca urinam cientia miscemus. Quæ uero calculosis
auxiliant, unica facultate indigēt, quæ secare & ex-
tergere cū manifesta caliditate potest. Sunt autē ta-
lia terē omnia amara. Quæ admodū igitur in alijs, etiā
in his materiā experimēto cognita deinceps sub-
scribā, initium ab his quæ ad ulceratas & inflama-
tas affectiones conueniunt facturus, à quibus etiā
Andromachus & Asclepiades orsi, inde ad cōpo-
sitiones calculos frangentes transferunt.

Confectiones renales ab Andromacho ad renum et ue-
sicæ affectiones conscriptæ. 2

Potio. Seminis lini, seminis papaueris albi, semi-
nis cucumeris, tragacanthæ, singulorum drach. ij.

tom. 5

K 2 amy

amylī drac. iij. cū aqua in pastillos redigito, & ad uelicam ulceratā ac urinæ emittendæ difficultatē exhibeto. Alia. Nuces pineæ. xxx. amygdalas xx. palmas quindécim, tragacanthæ drac. iij. succi radicis dulcis drac. ij. croci ob. i. myrrhæ ob. i. uino protropo diluito ac utitor ut accōmōdato. Alia.

Ad uesicæ affectus & ulceratiōes pastillus quotor. Seminis cucumeris drac. xij. feminis hyofcyami 3. vi. feminis cicutæ, opij, fœniculi, croci, sing. drac. iij. calsiæ drac. iij. amygdala x. nuces pōticas. x. feminis apij. drac. vi. feminis maluæ syluestris drac. iij. Excipe passo cretico & præbe ob. iij. non febrientibus ex passo. Quidā cicutæ drac. vi. habent. Alia, ad eadem & uesicæ dolores. Croci, feminis besafæ, hoc est, rutæ syluestris, feminis maluæ syluestris, sing. drac. vi. feminis hyofcyami drac. xij. opij. drac. vi. feminis apij drac. xij. nuces auellanas. viij. amygdalas xx. feminis cucumeris drac. xij. Mellis Attici quod satis est. Datur magnitudo nucis ponticæ cum uini nulli cyathis tribus.

Alia, ad profluuia sanguinis ex uesicæ. Alumini drach. i. tragacanthæ drac. ij. gummi ob. i. Dato ex passo quandoq; obolū unum, quandoq; duos.

Alia, ad uesicæ affectiones urinam ciens ā Macedone profecta, facit & ad hepaticos, hydropticos, ictericos, nephriticos, ac omnia uesicæ symptomata, frangit etiā lapides. Acori drach. l. phu 3. xxv. nardi celticæ drach. xxiij. feminis dauci drac. xxij. cinamomi drach. xxxij. mei drach. xvi. afari drac. xxiij. petroselini drac. xvi. opobalsami drac. xvi. & carpo balsami tantundē. croci drach. xxiij. myrrhæ drac. xx. radicis dulcis drach. xvi. nardi Indicæ drach. xvi. calsiæ drach. xij. amomi drac. xvi. uuzæ passæ drach. viij. tragacanthæ drach. ix. Arida melle excipito, & tragacanthum uino amineo macerato. Dato nucis ponticæ magnitudinē cum uini cyath. iij. febricitantibus cum aqua multa. Alia ad uesicæ ulcera & inflammationes. Nuces pineas xx. feminis cucumeris fatiui grana xl. amylī ob. iij. nardi drac. i. feminis apij cyath. ij. Nardus & apium in aquæ sextario uno coquuntur, deinde ex decocto duo cyathi præscriptis ammiscetur. Alia ad calculosos, qua Bassa uxor Marij curata est. Frangit ita ut neq; rursus gignatur. Calsiæ drac. ij. feminis apij 3. iij. myrrhæ minnæ drac. iij. pipe ris albi 3. ij. thuris 3. iij. lapidis syriaci masculi 3. i. aut fœminæ 3. i. feminis pastinacæ, anisi, utriusq; drac. ij. syracis drac. iij. iridis Illyricæ drach. iij. feminis papaueris albi drach. ij. spicæ nardi tantundem. amygdalarū amararum mundarum, afari, utriusq; 3. iij. feminis smyrnij, cypert, utriusq; drach. ij. mellis Attici quod satis est. Dato quotidie. Alia ad calculosos frangēs & paulatim expellēs, do nec mūdā uesicā reddat, deinde æger pellucida lotia reddet, & quod maximū est, curat ut nō amplius renascantur. Seminis dauci, anisi, feminis cucumeris, petroselini, myrrhæ, sing. drach. vi. calsiæ daphnetidis, cinomami, nardi celticæ singul. 3. iij. Terito & cum aqua ad parui lupini quantitātē coagmentato, & ieiunis quotidie per dies xxx. ex aquæ cyathis tribus præbeo. Hoc uero pharma

cum quemadmodum accepimus, cum quadam religione præparatur. Ligno enim mortario ac pistillo tundit, oportetq; cum qui tundit neq; anulū habere ferrēū, neq; calciamenta clauis ferreis trāfixa. Hoc ā rustico ut mysteriū accepimus. Alia ad nephriticos & omnem fluxionem, ut Apollonius. Corticis mandragoræ tosti selquidrachmā, anisi tosti selquidrachmā. tragacanthi, carnis palmarū, utriusq; drach. iij. dato cum melle.

Nephritice compositiones ab Asclepiade conscriptæ. 3

Antonij Musæ. Fructuum pini, qui pitxydis nō cantur, tuforum & cribratorum drach. xv. feminis papaueris albi, tragacanthæ, utriusq; drach. ij. Nardi celticæ, croci, anisi decorticati, radicis dauci cretici, singulorum drach. i. costi obol. iij. præpara pro protropo, & reponē in pyxide. Datur ponticæ magnitudinem cum protropi cyatho i. & aquæ calidæ cyathis duobus. Alia. Seminis cucumeris fatiui tosti drach. iij. feminis maluæ drac. v. nucum pinearum drach. vi. feminis apij, drach. viij. feminis lini 3. i. amygdalarum amararū mundatarū drac. ix. excipe passo, & exhibe ut prædictum est.

Alia ad Nephriticos Onesidemī. Amygdalarū amararū 3. xvi. feminis dauci cretici, feminis maluæ, utriusq; drach. vi. radicis iridis syluestris 3. viij. cornu ceruini uisti, tragacanthæ, nardi celticæ, feminis cucumeris fatiui, singulorū drach. vi. passi quantum sufficit. præpara ut dictum est. Aliud pharmacum accomodatū. hoc scimus multos Nephriticos usos esse, & ā tota affectione penitus liberatos. Oportet per multos dies in pharmaci huius usu perseverare. Datur & calculosis, & colicis medetur, ac uesicæ affectibus. Cōponitur hoc modo. Nucum ponticarum purgatarum, amygdalarum amararum mundatarum, feminis cucumeris repurgati, singulorū drach. iij. feminis cicutæ, croci, feminis maluæ, opij, singulorum drac. vi. feminis hyofcyami albi, feminis apij, utriusq; 3. xij. Cogito in pastillos cū melle, ac dato obol. iij. cum aquæ multæ cyathis iij. In alio exēplari & besafæ, hoc est feminis rutæ syluestris drach. vi. Ad calculosos in renibus concretones, Onesidemī. Symphytum, & sion, & Artemonium cum uino coquito, & expressi liquoris cyathos ij. cum pari aqua dato. Aliud. Maluæ syluestris radicem, & rutæ syluestris radicem, & apij montani radicem coquito, & eo qui dictus est modo exhibeto. Aliud ad calculosos inspersile. Seminis balsami partem unam, lapidis qui in spongijs reperit tantundem, pulegij aridi, feminis maluæ syluestris, ocymī aridi, singulorum tantundem, Tusa & cribrata reponito, & dato cochlearium cum uini distul cyathis duobus. Aliud. Struthij radicis partem unam. iridis syluestris siccæ tantundem. oxalli dissicæ tantundem. fremij luteum florem habentis sicci tantundem. Tulsis cribratis ut dictum est utere. Catapotia Heraclidæ Tarētini. Dissoluit uesicæ tofos, commodant & ad uesicæ stilliciditū. Piperis, galbani, utriusq; drac. i. succi libyci 3. ij. myrrhæ drach. iij. protropi quod satis est. Formā catapotia ciceris magnitudine, & iij. de uozā da-
ta, &

co. & pasci cyathos ij. insuper bibendos. Aliud. Ammoniaci Thymiamatis, piperis, spumæ nitræ, singulorum drach. unum. carpobalsami drachmas ij. myrrhæ drach. quatuor. excipe protropo, & forma catapotia ciceris magnitudine ac tria de uoranda dato, ita ut uini dulcis quadrantem insuper propines. Hoc ad dies quadraginta octo, ægro prælotato facies. Pastillus ciens urinam. Detrahilapillos & tofosas concretiones. Afari, petroselini, phu, Mei, singulorum drach. quatuor. acori, seminis anisi, seminis dauci, apij montani, carpobalsami, tragacanthæ singulorum drach. ij. Tragacantham passio dissolutam aridis adijcto, & pastillos formato, Indecq; obol. iij. cum pasci diluti cyathis ij. exhibeto. Alius pastillus Chariclis. Educitarenosas subsidentias. Facit ad affectiones ulceratas. Seminis apij, petroselini, anisi, singulorum drach. xvi. floris iunci odorati, croci, tragacanthæ, singulorum drach. vi. seminis dauci cretici, piperis albi, utriusq; drach. iij. præpara ut dictum est, & da drach. i. cum protropo diluti cyathis tribus. Antidotus ex lapidibus, ut Mithridates. Facit Nephriticis, & ad uelicæ affectus, artrit calculos, & tofos dissoluit. Seminis smyrniij, cyperi, spicæ nardij, seminis papaueris albi, cinamomi, calsiæ fistulæ, piperis albi, seminis pastinacæ, singulorū unc. i. Thuris nō secti, seminis apij, croci, styracis, iridis, amygdalarum amararum, acori, singulorum sesquiuicium, lapidis Syriaci fœminæ aut masculi, utriusq; semiuicium, myrrhæ Minnæ sextantem. Excipe melle. Datur nucis ponticæ magnitudinem. Alia Antidotus Biennite, pharmacū accommodatum, sedans dolorem, utile & Nephriticis, hoc est, renalibus affectionibus, & ad uelicæ ulceratiões. Frangit lapides, & tofos per urinam expellit. Iridis 3. quatuor, mei, felis, chamædryos, hypericij, cneori, canchryos, singulorū tantundem. amomi drach. octo. cinamomi drach. xij. rosmarini montani, nardi Indicæ, croci cilicij, petroselini, polij, seminis rutæ syluestris, dictamni cretici, singulorum tantundem. glycyrrhizæ, lapidis Syriaci masculi, utriusq; drach. xvi. thlaspeos drach. xx. iij. seminis utricis, myrrhæ, spondylii, singulorum tantundem. Cardamomi drachmas xlviij. excipe melle cocto, & præbe nucis ponticæ magnitudinem cum uini mulsi diluti cyathis quatuor.

Que Archigenes ad Remum affectiones scripsit in secundo pharmacorum secundum genus. 4

Exrenibus laborates Nephriticos appellatos, conuenienti diæta adseruo. Et Ceratum quidē Rosaceum cum styrace ad malagatis formam redactum impono. Cæterū Antiochus apud phricen Linophobum, ualde iuxta naturalem contrarietatem auxilio fuisse ait, ad mali euerisionē, Prototo mi caulis decocti cyathos ij. ieiuno ad dies nouem exhibitis. Inpersigito autem salem modicū & magis proficis. Alia potio. Foliorum rosarum, amygdalarū decorticatorum, thuris, æquales partes, capitū papaueris duplum. Excipe protropo, & in uas fictile reponē in loco nō humecto, & ob. ij. cum protropo exhibe. Quidā pro amygdalis, a Galen.

mylum cōijciunt, & pro protropo aqua excipiūt, uerum cum protropo bibendum exhibent.

De Ischia coxendicium morbo, podagra, & morbo articulari siue arthritide. Cap. II

Ex genere Arthritidis est tum Ischias, tum podagra, Quod enim in omnibus articulis Arthritidis est, hoc in uno iuxta coxendicem quidem Ischiada, hoc est, coxendicem morbum appellant, luxta pedem autem podagram. Incipit igitur plerumque podagræ generatio ex uno articulo, et progreditur in omnes, temporis diuturnitate accedente. Cōmunem habet hi tres affectus humoris redundantiam, quæ affectam occupat coarticulationē, qua expleta in omnem partem circumsitæ nervosæ particulæ tenduntur, & ex his dolor oritur. Aliquādo quidem igitur irruens humor sanguineus est, ut plurimum uero pituitosus, aut ex pituitoso & bilioso mixtus, aut etiā sanguine cum ipsis permixto. Quod si quis exactius interpretari rem uelit, non pituitosum humorem, sed qui proprie crudus appellatur, ut plurimum circa arthritidas prædominari dixerit. Est autem hic crassius ad similitudinem puris crassioris. Vbi uero in ipsis articulis diutius moram traxerit, non solum crassior sed & uiscosior reddit. Qui igitur tosi seu calsi appellatur, horum generatio ex his est, & postquam fuerint producti, non sperauerit ad pristinam constitutionem exacte redire articulum posse. Cæterum differentiæ assilgentium humorum facile deprehendi possunt, tum coloribus, tum symptomatibus coincidentibus. Itemq; per experientiam phar macorū quæ adhibentur. Cognitio igitur ipsorum ex colore omnibus exposita est, ex symptomatibus uero & accessionibus coincidentibus, tamen non omnibus, neq; ex prociñctu manifesta sit, tamen nō adeo difficilis cognitio existit. Biliosus em sanguis multæ caliditatis sensum ægroto exhibet, & calfacientibus impositis exacerbatur, quemadmodum rursus à frigidis relaxatur. Verū ad humoris noxiij cognitionē conferet tibi etiā prægressa diæta, siue per exercitia, siue per otium transmissa, & per balnea post, aut ante acceptū cibum. Quæadmodum conferet etiā horū gymnasiorum & eduliorum tum quantitas, tum qualitas. Item anni hora, & Regionis ac aeris cōstitutio, Insuperq; & ætas, & habitus corporis. quorū omniū facultates sæpe in plerisq; locis enarraui. Porrō principij curationis sit tibi euacuatio humoris affligere reperi. Si quidē humoribus ex æquo redidit corpus, Venæ sectione primū omniū assumpta, dein de purgatiōe. quibus accedat pharmacorū dicendorum cōueniens, & tempore, & ordine usus, Ita ut in manibus & pedibus pharmacis fluxionē repellentibus utamur, circa coxendicū uero iuncturam id facere uitemus. Quū enim in profundo easita sit, sanguis ex uicinis & ambientibus uasis ac musculis ad illam cōcipitur. Mitigatorijs igitur in principio medicamentis opus est in dolore circa coxendicem harente, quæ neq; refrigerēt multū, neq; fortiter calfaciāt, qualibus sanè postea opus habet. Exacerbatur enim per ipsa fluxiones, calsi-

ditate nimirū plus attrahēte ipsas q̄ impediente. Quandoquidem uero presentis operis institutū est neq̄ de cataplasmatibus, neque de irrigationibus quicq̄ dicere, sed de methodo cōpositorum pharmacorū, ad hanc solā progrediār, initio ab Ischia- de sumpto. Raro equidem fit Ischia siue coxendicum cum dolor ex sanguinis multitudine, & citissime curatur, uenis circa poplitē aut talos secū. Quem admodū autē saepe sola sanguinis euacuatio sufficiens auxilium exiit, Sic contra in omni coxendicum dolore, & praesertim eo qui ex humorū copia exortus est, si quis ante euacuationem totius corporis, acribus pharmacis circa partem affectā utatur, egre curabilem reddet affectionē, copia nimirum indissolubilit̄ ibidem cōdensata. Praeter alia enim, & crassa & uiscosa sit, ob calorem & siccitatem acrium pharmacorum nō dissimile quippiam affationi perpeties. Tanquā igitur maximā uim ad affectionis curationē habeat totius corporis euacuatio, ab ipsa incipiendū est, non solum à cruribus, sed & à cubito primum sanguinis detractione facta. Auxiliari etiam uomitus ipsi Ischiadici, magis utiq̄ q̄ euacuationes infernē per uentrem, ut qui reuellant deorsum repētē humorē, faciendū itaq̄ sunt uomitus in principio ab accipiendo cibo, postea uero etiam per uomitoria medicamenta, initio à mediocribus factō. In quibus autem uehemens humorū densatio, quae aegre dissolui potest, à medicis intēpestiue acribus pharmacis utētibz facta est, his curabitur affixa maxime auxiliatur, & purgatio per efficaciora insula, quale est & quod ex colocynthide cōstat. Si igitur ea quae nūc dicta sunt praeculibus habueritis, medicamentis sanē à prioribus medicis traditis iuxta Methodū utemini. Verū in ipsis recēdendis auspicator ab his quae ab Andromacho scripta sunt, in illa parte libri de externis pharmacis conscripti, in qua praescriptis malagmatis proprie appellatis, inde etiā alia omnia prodit, iuxta quēcunq̄ tandē modū in ueteratas affectiones iuuātia, in quibus est etiā Ischiadicorū appellatorum cura.

Compositiones ab Andromacho conscriptae ad Ischiadicos. 2

Seminis rutae syluestris drach. iij. sulphurij drach. iij. spumae nitri drach. iij. baccharum lauri drach. iij. abrotani, colocynthidis medullae, cardamomi, ammij singulorum drach. iij. rutae uiridis mingōctauam partē. Quidam horum singulorū drach. xx. accipiunt, & picis, terebinthinae, myrti, cere, singulorum tantundem. adipis taurini, tantundem. galbani drachmas vi. ammoniaci thymiamatis drach. vi. opopanax drach. quatuor. sulphuris uiui drach. quatuor. Quod hoc pharmacum fortiter calfactorium sit, si memoria tenuerimus ea quae in libris de simplicium pharmacorū facultate scripta sunt, nihil opus recentioris assertionē. Est enim uehementissimū & calidissimū medicamentū syluestris rutae semen, & cum oleo sulphurij, & bacca lauri, deinde spuma nitri. Post haec abrotanū, indeq̄ colocynthidis, et cardamomū, et Ammij. Ruta etiā uiridis minus quidē his, non tamen contemnen-

dam habet caliditatē, quemadmodū neq̄ sulphurij uiuum. Ex profundo itaque attrahere omnia haec possunt humores articulum & iuncturam coxendicis uexantes. Quo uero Emplastrum ex ipsis fiet, picē & terebinthinā, ac myrtē, & cerā, ac adipe ammiscuitis qui pharmacū composuit. Verum Ammoniacum thymiamā, & galbanum, ultra hoc quod cōferunt ad emplastrū cōpositionē, etiam emolliendū ac mitigandū uim quandam habent. Opopanax uero eiusdem cum ipsis est generis, sed fortiori facultate praeditus. Alteram porro cōpositionem ad eandem affectionem Andromachus sic scripsit. Aliud malagma ad Ischiadicos, & alia multa. Cerā drach. lxxij. terebinthinae 3. xlvij. ammoniaci thymiamatis 3. xxxij. pro polis 3. xliij. galbani 3. xxxvi. bdellij 3. xxv. croci drach. v. opopanax drach. xij. spumae nitri drach. xxx. ungento in no admoto tundito. Aliud Protae Pelusiorae ad Coxendicum & capitis dolorem, & ad omnes diuturnos dolores. Cerā drach. xxij. ammoniaci thymiamatis drach. viij. terebinthinae drach. viij. succi thapsiae drach. viij. olei cyathumunum. Quin & aliā cōpositionē inter malagma ta Andromachus retulit hoc modo. Ad Ischiadicos ab Hera Cappadoc. Picis liquidae heminas iij. aut ij. & dimidiā. cerā lib. i. resinae pini lib. i. nitri sesquilib. sulphuris uiui lib. i. staphidis syluestris sextar. i. pyrethri lib. dimidiā. fecis uini uisē lib. ij. cardamomi sextar. i. galbani lib. dimidiā. arida cum liquidīs cōmittito. Hoc pharmacū etiā ipse Heras in proprio libro prope finē scripsit, sed non appositum est ad picem, aut duas aut dimidiā, sed simpliciter scriptum est heminas tres. Praescriptum autem haec uerba. Ceratū ad Ischiadicos, quod eruit etiā ualde in ueteratas affectiones, hoc usus sum in Frontino. Scripsit autem & alias duas Ischiadicas cōpositiones Heras, quarum altera hoc modo habet. Ad Ischiadicos ualde mitigatoria. Picis partes duas, sulphuris uiui partē i. utraq̄ trita mixta dolenti loco imposito, uerū praelauare agrum oportet, & superne chartā superponere, ac sinere donec sua sponte dilabatur. Licet etiā lauare charta supraposita adhuc incubente. In quibusdā exemplaribus, picis pars una habet, & licet etiā sic preparare, modo sciamus nos efficacius esse ambo pari mensura misceri, debilius uero pharmacum, in quo duplum picis ad simplicium sulphuris coniicitur. Porro quae restat adhuc tertia cōpositionē Ischiadicarū, hoc modo ab Hera prodita est. Alia Ischiadica, hac usus sum in Frontino, statim in exacerbationibus. Cerā drach. c. uisci quercini drach. xvi. myrrhae drach. vi. terebinthinae drach. xxv. galbani drach. vi. iridis Illyricae drach. vi. cedriae heminam dimidiā. cyprini heminam dimidiā. Ceram & cedriā cum cyprino liquefacto, deinde resinam & galbanum, atq̄ ubi iam ab igne auferre uoles iridem inspergito, itē q̄ uiscū indito. Ablata autem iam olla, in promptu sit tibi myrrha trita, ad quam liquefacta diffundes, & mixtū simul omnibus uteris. Quidam supra haec omnia etiā nitri drach. v. addiderunt.

Que phar maca Aſclepiades in quarto extor norum
prodidiſi, Que Marcellus inſcribit. 3

Nominat equidem et hic omnia huiusmodi ma
lagmata, apponit autem aliaſ quod ad Iſchiada, a
liſ quod ad ſplenem, aliſ ad latus, aut aliſam ali
quam partem conducant. Quędam etiā uarij uſus
eſſe ait. Quędam admodū etiā hoc ſcriptum ab ipſo
in hæc uerba. Malagma Antiochidis, ſplenicis,
hydropicis, Iſchiadicis, arthriticis. Pręparatū eſt
Fabullę Libyę. Cerę lib. iij. uifci quercini lib. iij.
reſinę terebinthinę lib. iij. reſtimenti ab expreſſa
myrobalano reliqui lib. i. ſpumę nitrī lib. i. floris la
pidis Aſii lib. i. ammoniaci thymiamatis lib. i. olei
cyprini lib. iij. Acetū ad ammoniacū diſſoluendū.
Poſt hoc ſcribit ruruſ aliud ſic. Aliud Fabullę cō
politiū ualde præclarū, ad eaſdē affectiones. myr
rhę ſtactę lib. ij. bdellij onychis lib. ij. medulle cer
uinę lib. ij. ammoniaci thymiamatis lib. ij. iridis
ſilyricę lib. ij. opopanacis lib. i. galbani, ſtyracis, u
triſcuſ lib. i. maſtiche lib. i. floris lapidis Aſii lib. i
ſucci ſycomororū lib. i. cächryos lib. i. piperis albi
lib. i. cerę, terebinthinę, utriuſcuſ lib. v. tundēdū eſt
pharmacū, ita ut qui tundit fecē ungenti irini adhi
beat, quo molliuſ pharmacū fiat. Aliud deinceps
Aſclepiades ſcripſit hoc modo. Malagma quod
& aurei coloris appellamus. Auri pigmenti auric
oloris, calcis uiuę utriuſcuſ ſextantem. aluminis li
quidi & ſeiti utriuſcuſ ſextantem. Arida tundimus
& cribramus, & in pilam coniectis, aceti cyathos
viij. affundimus, & probe trita liquefactis excipi
mus. Sunt autē hæc. Cerę, reſinę frictę, & pinus,
ſingul. lib. ij. olei cōmunis cyath. viij. hæc liquefa
cta trigeſieri ſimimus, & eraſa tritis ammiſcimus.
Nos ad pharmacī præparationem etiā myrrhę
ſextantem addimus. Alij etiā ſandarachę ſextan
tem apponunt, aluminis liquidi ſextante ſublato.
Nos autem coniectis omnibuſ præſcriptis confi
cimus, & ſit efficaciſ. Poſt præſcriptū aliud ſub
didit hoc modo. Hoc uſus eſt Andromachus. fa
cit ſplenicis, hydropicis, & ad præcordia diſſenta.
facit Iſchiadicis, arthriticis, & ad inueteratos affe
ctus. Cerę, picis brutię, utriuſcuſ libram i. Nos pro
picereſinam frictā indimus, reſinę pinus lib. i. olei
cyath. viij. auripigmēti auricoloris, aluminis ſciſ
ſi, calcis uiuę, ſingulorū ſextantē. Prępara ut dictū
eſt. Nos apoſuimus ad pharmacū myrrhę ſextan
tem, uifci quercini trientē. Poſt relata alia que
dam ad hydropicos & ſpleniticos recenſet, & in
de ruruſ multi uſus compositionem tradit, quam
etiā Iſchiadicis conuenire ait, hoc modo. An
dreæ Malagma. Componitur admirandā ad ea que
uelis perforare, diſſoluere, expurgare, & uelut ex
colare. educit oſſa corrupta, aculeos, & infixā. De
ſcriptū eſt etiā ad Serapione Empirico. Facit &
ad Iſchiadicos, cōmodū eſt ſuppuratis, facit & ad
induratas uifcerū affectionibus. Eſt & acopon bon
num diutinis reſolutionibus, & diſtortis corporis
particulis. Facit etiā ad corroſa ac corrupta, edu
citur enim aliena, & ulcuſ ad cicatricem perducit.
Grani Cnidij purgati, nitrī rubri, ſalis ammoniaci,
ariſtolochię creticę, radicis cucumeris ſylueſtris,

A terebinthinę, ſingul. drachmas xx. piperis rotūdi
& longi, ammoniaci Thymiamatis, & ut quidam
uolunt, amomi & xylobaſami, ſingulorum dra
chmas decem. thuris maſculi, myrrhę, reſinę ſic
cę, uifci ſubacti, ſingulorum drach. x. ſucci mo
rorū 3. x. cerę 3. xxx. adipis caprini 3. xv. fecis un
genti Irini quantū ſatis excipiēdis erit. Arida tundū
tū & anguſtiſſimo cribro excernunt. Liqueſci
biſia uero ſingularim diſſigēter tundunt, deinde om
nia ſimul miſcent, ac ruruſ tundunt admota Iri
ni fece. Deinde ubi probe fuerint unita emollita
reponimus. Quod ſi uelis acopo uti, accipe phar
maci quadrantē, adipis aſnerini quadrantē, olei cy
prini quadrantē, ac mixtis uitior. Poſtea uero con
ſequenter ſic ſcripſit. Aliud ad eaſdē affectiones.
B Pyrethri 3. xx. grani Cnidij, ſpumę nitrī, utriuſque
3. xx. ſalis ammoniaci, ariſtolochię creticę tenuis
corticis, radicis cucumeris ſylueſtris, terebinthin
ę, ſingulorū 3. xx. piperis rotūdi & longi, am
moniaci thymiamatis, bdellij, xylobaſami, thuris
myrrhę, cardamomi, amomi, adipis caprini, reſinę
ſiccę ſingulorū 3. x. cerę 3. xxx. Viſci probe ſub
acti 3. viij. ſucci mororum drach. viij. fecis ungen
ti Irini quod ſufficit hiſ excipiēdis. Vini Italici qd
ſatis eſt. Maceratis hiſ que diſſoluere oportet, pro
more apparato. In alio exēplari neq; xylobaſamū
neq; Cardamomū, neq; Amomū reperi. Poſt hæc
alia phar maca prodidiſi, & deinde ruruſ Iſchiadi
corū meminit ſic ſcribens. Aliud eiufdem Epi
thema. Iſchiadicis & arthriticis auxiliã cōſeſtim.
C Foenū gręcum in uas fictile cōſiecto, & ad ipſum
poſcam ſufficientē affundito, & prunis impolitu
donec diſſoluat coquito. Ad diſſolutū uero mel
liſ quod ſatis eſt inſiſce, ac ruruſ coque, deinde ex
empta diligēter tere, & in lintheolum inſarcta lo
cis affectis impone, ſcaciaq; obligatos ſine. Hoc
autem ad bidaū & triduū facimus. Caterum ſi in
terendo pharmacum induretur, ex liquore quan
tum ſufficit addimus, liquor autem tantus ſit, ut
tractile cataplaſma reddatur. Aliud quod cōti
nenter ad prædicta ſequitur, hoc modo. Symphy
ti ſerquilibrā rafam, & minutim concifa, ac in
mortarium teſtaciū conſectam, diligenter teri
to, & ad tritam mannę quadrantem addito, atq; o
uorum crudorū recentiuū trium numero candidū
unā cū luteo, & ruruſ terito, & ubi unita fuerint,
his adipis ſuſſili ueteris lib. i. adſiſcito, & cōquaſta
diligēter atq; in lintheolū inſarcta imposito. Mit
gat conſeſtim. poſt præſcriptū, aliud deinceps ſcri
pſit hoc modo. Aliud eiufdem Malagma, Iſchia
dicis ſtatim in irritationibus imponitur, appella
tur Didymea, facit ad atrita, & omnē neruorum
per conſenſum affectum. Diſſoluit omnem duri
tiem. facit etiā ad alias inſtāmationes. Delet ma
lignas cicatrices, facit ad luxata & coſſiſa. facit &
ad mamillarum affectiones malignas. Cerę, uifci
quercini, terebinthinę, iridis ſiccę, myrrhę, gal
bani, ſingulorum drachmas xlvij. olei cyprini aut
ungenti Aegyptiaci quod ſatis eſt. Galbanum in
oleum cyprinū, aut ungentū Aegyptium conie
ctum, ad ignē diſſoluimus, & cerę molliſſimę, ac re

liquis mixtā probe tundimus, atq; his galbanū liquefactū cū cyprino iniijcimus, ac rursus tūdimus malagma lenissimū tactui reddendo, quo utimur. Consequēter etiā hoc Asclepiades subdidit. Aliud eiusdem ex Ario. Facit ad colicos supra q̄ dici potest, in ipsiſ vexationib. impositū, & p̄oras curat citra ulcerationem. Cera, picis liquidæ utriusq; lib. i. sulphuris uiui, aluminis scissi, nitri rubri, singulorū lib. dimid. liquefabilia liquefacito, arida uero tundito & per angustissimū cribrū cōcerno, & ad liquefacta adijcito paulatim ea inspergendo ac assidue mouendo, inde q̄ in pilā translata ac tusa reponito, & utitor. Deinceps rursus aliud prodidit hoc modo. Aliud eiusdē Malagma ex Silphio, Ischiadicis ualde cōmodum. Ammij 3. xij. silphij, seminis rutæ syluestris, baccarū lauri purgatarū, singulorū 3. xiiij. medullæ colocyntididis 3. ij. nitri 3. iij. abrotoni thebaici 3. iij. cardamomi 3. iij. cera ponticæ minæ octauam partem, picis, resinæ, ammoniaci thymiamatis, singulorum minæ octauam partem. Liquida cum aridis committito. Cōsequenter & hoc ab Asclepiade scriptum est ita. Aliud eiusdem, quo usus est Antipater. Silphij, rutæ syluestris sicca, baccarum lauri siccarū, spumæ nitri, medullæ colocyntididis, abrotoni thebaici, ammij, cardamomi, singulorum drach. iij. rutæ satiuę uiridis, picis sicca, resinæ terebinthinæ, ammoniaci thymiamatis, adipis uitulini, singulorum minę octauam partem, galbani drach. xvi. opopanax drachmas iij. sulphuris uiui drachmas quatuor, olei cyprini heminas. iij. Visus tēpore oportet prius coriandrum aridū usum cyprino excipere, & ex eo coxendicem illinire, atq; post huius usum malagma ipsum imponere. Post hoc rursus aliud scripsit hoc modo. Aliud eiusdē Malagma in Ischiadicis humores ex alto euocat ac trāfert, liberatq; à tota affectione. Facit & dissolutis, & tremētibus, & affectiōibus inueteratis. Picis liquidæ Bruticæ lib. iij. fœcis aridæ usitæ lib. ij. nitri rubri sesquilibrā. resinę p̄ni lib. i. ceræ lib. i. staphididis syluestris lib. i. sulfuris uiui lib. i. pyrethri lib. dimid. cardamomi sexta. i. picem, ceram, resinam coquito, arida tūdito & cribrato, ac cum liquefactis cōmittito, & utitor. Post præscriptum adhuc aliud pharmacum subdidit ita habens. Aliud eiusdem quo usus est Philocalus. Sinapis, fœnigraci moliti, utriusque sextarium dimidium, pyrethri, staphididis syluestris, nitri rubri, singulorum drach. iij. opopanax drach. ij. galbani drachmas duas, resinæ terebinthinæ lib. unam, ceræ lib. unā, olei cyprini lib. i. arida cum liquidis committito & utitor.

Ischiadicorū cura à Democrate cōscripta, ex Iberide. 4

Damocratis extat libellus Clinicus inscriptus, in quo uersibus Iambicis: quemadmodū solet de tribus differit medicamentis. Ac primo quidem eo quod ex herba, quam ipse Iberidem appellat, constat. Secūdo ex semine dolores sedante cōposito. Tertio uero purgatorio, & ab ipso Hiera appellato. De primo igitur in Ischiadicorū curatiōe in eo libello hæc scripsit. In Iberide inquit medi-

acum quendā amicū suū per hanc herbam curatum esse quā herbā ut dixi, ipse Damocrates Iberidem appellat, ut qui ipse uisū herbæ cognorit, nomen autē eius nullū audierit, quum etiā id ipsum ignorarit is qui eū usū eius docuit. Verū ex signis quæ scribit uidef Iberidem appellare, quæ à Grecis lepidiū nominat, à regione in qua amicus eius curatus est appellatiōe ducta. Describit autem ipsius signa per hos lambos.

Herba hæc ubiq; multaq; frequens nascitur, Monumenta iuxta antiqua, muros & ueteres, Tritasq; quondam publice pedibus uias, Quas iuxta aratum duxit haud quis agricola, Semper uirescens, folijs nasturtij Florentibus uere, attamen maioribus. Caulē cubitalis longitudinis gerit Paulō minore aut rursus ampliore, ab hoc Aestate pendent folia, donec multa hyems Sarmentitiam deducat hæc ad imaginem, & Deiecta & exiccata depereant gelu, Adnata radici tamen cernes alia. Aestate florem fert colore lacteo Mulum tenuem uariumq; ualde cauliculus. Ad quem sequitur semen p̄nitus sic exiguum, Visum ferē ut fallens, oculos quoq; effugiat. Odorem habet radix at inde acerrimum, Uero similem q̄ maxime nasturtio. Per hos quidē uersus figurā herbæ indicauit cō-

sequenter autem usum ipsius per huiusmodi, Hanc erutam larga satis cape copia Aestate, nam tunc optima & fortissima est Adhuc recens, siccata fit sed debilior. Tusam hinc probe, (Nam difficulter tunditur) Paucam subactamq; excipies axungia, Crurūq; toti & maxime coxendici Adhibebis, & ligabis, & fines duas Horas mulieribus, utris sed quatuor. Hinc balneo inductos, nec ullo ex unguine, Nec smegmate ullo pinguiore collines, Sudore sed modico exiliente, in folium Merges, iubens perferre, nam mordacitas Ingens, calorū sensus atq; exoritur. Verum hinc rigatos leniter producito. Illati enim quamuis manibus sint plurium, Exhibittamen suis pedibus ualens Quicunq; consilium hoc bonum susceperit. Ad multū oleum miscibes hinc unū modicum, Et concuties, & illines lotos eo.

Ac mox madore terso & pinguitudine, Totum teges crus mollibus tu uelleribus, Iubens obire assueta uitæ munia, Quæcunq; uult, & non grauatim suscipit. Hoc auxiliū certum atq; constans integre est, Et nullo alio adijciendo ei simul indigum. Quare dolore ablato adora radiculam, Cuius deflorio tibi sanata data est. Quod si tamen inde affectiōnis uestigium Quoddam superfit, post repetes hoc præsidium, Diebus ut multum decem bis præteritis.

Hoc sanē utendū modo & inueteratos capitis dolores, & alias omnes quacunq; corporis parte

inueratas & ægre solubiles affectiones ac resolutiones te curasse ait, & omnino uitia in quibus alij linapifino appellato, & auxilio ex thapsia confato utuntur, se per hanc herbam perfanalfe dicit.

5 Porro de hac beride etiam Archigenes scribit in secundo pharmacorum secundum genus, lepidium ipsam appellans. Dicit autem & iplenis & lischadidis ipsam conuenire. Ad lischadas & perfrigerationes, Hygieni Hipparchi. Herbam lberidem quam aliqui lepidium uocant, aut agrico cardamum, id est, nasturtium syluestre colligit, & radicem eius ipsam ac adipe porcino commolitam emplatri urice imposito ad dolentē locum ad horas tres, indeq; in balneum mittito. Idem præfidium & ueteres capitis dolores depellit, in consimili usū adhibitum, quem Damocrates medicus peruersus prodidit.

De podagricis & arthriticis affectionibus. Cap. III

Dictum antea est in sermone de lischade ex fluxionibus generari eiusmodi affectiones, irruentibus in locos iunctururarum, quare etiam curatio ipsarum iuxta eundem sit modum, nimirum ut irruentes fluxiones euacuent. Influxionibus igitur adhuc ipsi, scopum afferendorum auxiliorum communi rationi influxionum humorum subiicere oportet, ita ut repellamus ac restringamus. Vbi uero amplius non influant, ut discutiamus iam illapsos. Cæterum materia pharmacorum per quæ hæc sunt multiformis est, quemadmodum etiam in alijs affectionibus, excogitantibus uidelicet a principio prudentioribus uiris iuxta quandam artificialem coniecturam modo hoc, modo aliud, eorū quæ optima per experientiam sunt iudicata. Quapropter uelut in alijs affectionibus, sic etiā in his, optima ex eis quæ priores medici experientia cognouerunt adscribam.

Pharmaca ab Aesclepiade ad prædictas affectiones in quarto exteriorum prodita. Que Marcella inscribit 2

Epithema podagricis, Arthriticis, sedans dolo rem. Vfus est in ipsis uexationibus. Succus papaueris 3. iij. croci 3. i. cum lacte bubulo aut caprino terito, & adiecto pane interno diligenter leuigato, ut molle cataplasma fiat, & rosaceo admoto molliato, ac uitior leni cataplasmate, forinsecus betæ aut lactuca folijs, custodiēdi eius gratia, impositis. Quandoq; opium & crocum cum lacte tritacero rosaceo excipimus, & linteolo infarsa imponimus. Aliud. Styracis 3. ij. opij 3. i. conficere ac utere ut dictū est. Aliud. Confestim a dolore liberat, uerum ante pharmaci impositionem ægrom lauare oportet, et tunc deterisis locis imponere. Succus absinthij pontici, croci, opij, singulorum 3. i. ceræ ponticæ 3. iij. unguenti lrim 3. vi. uini cretici quantum sufficit. Opium, absinthium, crocum dissolue, & dissoluta liquidis excipe, & linteolo infarsa impone. Aliud. Seminis cicutæ expressi, drach. vi. croci drach. i. opij drach. i. pasci cretici quod satis est. Trita excipe rosaceo cerato. Epithema podagricorum arthriticorum. facit ad maximas affectiōes. Vfus est eo Erasistratus sicyonius. Radicis caparis tuse et cribratæ choe

anicem unā. seminis hyoscyami choenicæ dimidiā. radicis chamæleo nis nigri choenicis quartā partē. seminis chamæle choenicis quartā partē. radicis mandragoræ choenicæ i. radicis solani aut ut alij dorycnij choenicis quartam partē. Omnia tusa & cribrata mixta in uasculū figulinū reponito, & probe obturata seruato. Vfus uero oportet choenicis quartā partē inde accipito, & passo trita in uas fictile nō picatū cōiicito, & addita fecis uini aridæ quarta hemina parte, ad prunas posita diligenter mouēdo coquito, donec bis aut ter efferueat, dein de ab igne ablata quāam calidissima imposito, aut quomodo perferre ægri possunt. Verum ante huius cataplasmatis usum, pedes multa aqua frigida perfundere oportet, & spongiosis detergere, atq; ita pharmacū imponere. Supra uero cataplasma linteola tenuissima aceto imbuta imponat, & fascia circūdata ad horas ij. pharmacū incubere sinatur. Postea uero eo ablato excitatas bullas acubus perforare oportet. Ab his em humor mucosus multus ac glutinosus profluet, post cuius excretionē multa aqua frigida pedes proluant, & rursus pharmacū ut dictū est imponat, ita tamen ut pro aceto aqua potabili utamur, & ex ea rigatum linteolum pharmaco superindemus. Aliud eiusdem.

Hoc pro ecurbitis & hirudinibus utimur. Nam serosos sanguinis humores exugit. facit & ad tofos ac duritias, ut inde dissoluantur. Farinæ foeni græci sextarium unum. floris lapidis Asii sextarium unum, lomenti fabæ nigrae molitæ, farinæ lupinorū, utriusq; sextariū unū. Omnia mixta & aqua calida subacta, calida imposito, & fascia constringito. Oportet autem prius affectos locos perfundere, aut etiam in solio lauare. Quom uero fascia circumdata madidæ ac cruentæ factæ fuerint, pharmacū tollimus, & fosis locis pastillo ex amygdalis amaris utimur, & malagmate qd crocum, iridem & aristolochiam habet. Hoc ipsum uero inter malagmata ad podagram descripta habetur. Pastillus podagricis, arthriticis. Vfus eius est in ipsis irritationibus. Aloes lib. unā, succi cētaurij sexuncem, thuris nō secti trientē, myrrhæ trientem, floris lapidis asii sextantem, opij sextantem, succi mandragoræ sextantem, aluminis scissi sextantem. Excipe passo, & fac pastillos. usū expetente lacte dissolutos cum pēnis illine, & supra illitionem linteolum passo imbutum impone. Alius pastillus iupiter appellatus. Aloes drach. xij. opij drachm. viij. succi papaueris drac. vi. succi hyoscyami drach. vi. aconiti drach. iij. hy poeystidis drach. vi. glaucij dracti, viij. croci drach. xij. gummi drachm. xxiiij. malorum mandragoræ drachm. xx. aceti heminas duas. Mala cum aceto coquito, & expressa prædictis admisceto, & ex dilutis ac probe leuigatis pastillos formato, eosq; in umbra siccato. Vfus ostensus est. Malagma arthriticis, podagricis, ex cicuta & agarico ac commodatum. Seminis cicutæ sextariū unum, agarici sextariū unū, foeni græci sextariū unū, nitrī 3. i. ceræ lib. i. resinæ frictæ lib. i. olei ueteris lib. i. medulle ceruicæ trientē, illyricæ trientē. Arida tusa

per angustissimū cribrum concernito, liquefcibi-
lia uero eliquato, & frigeferi finito, & sic erasa a-
dis cōmittito, & contulis ac repositis utitor, Ali-
ud eiusdem. Cera lib. i. olei ueteris aut fabini sext.
i. fœnigræci sexta. i. cicuta sextar. dimid. resinae fri-
ctæ lib. i. nitri rubri dodrantem. floris lapidis Asii
semissem. medulla ceruinae trientē. Illyricæ trien-
tem. Præpara ut dictū est. Aliud malagma eius-
dē ex tedis, Titi Cæsaris, facit podagricis & arthri-
ticis. Emollit omnē duritiā. Visci quercini sesqui-
libram, thuris lib. i. cera li. i. tedarū pinguium lib. i.
resine pinus li. i. Liquefcibilia coquito ac pinguib.
tedis moueto, Postquam uero omnis pinguitudo
ab ipsis effluserit, ab igne ablatū liquorem exco-
lato, atq; huic thus tenuissime tritū inspergito, as-
sidueq; moueto donec ad compagem manus non
inquinantē redigatur, & in mortarium transla-
ta reponito ac utitor. Aliud. Tedarum pinguissi-
marum li. i. thuris masculi lib. i. resinae pinus lib. i.
uisci quercini lib. dimid. præpara ut prædictū est.
Malagma ex lapide Asio, podagricis, Arthriti-
cis ualde præclarū. Liberat à tota affectione. Vfus

est in celsationibus. Visci quercini, terebinthinae,
utriusq; li. i. spuma nitri, floris lapidis Asii, thuris,
singulorū lib. dimidiā, olei cyprini lib. unam. ad-
pis quantum satis est. Arida tunduntur & cribran-
tur, ac cum aqua teruntur, ad cerati spissitudinem.
Liquefcibilia uero eliquantur, & tritis adijciuntur,
quibus simul conuassatis ac repositis utitur.
Aliud. Visci libram unam terebinthinae lib. i. la-
pidis Asii, nitri, utriusq; trientem, manne quadran-
tem, cyprini sextantē, aquae lixiuij pileatorij quod
satis est. Aliud, ad Arthriticos ualde præclarum,
auxiliatur confestim, humores in alto absorbens.
uisci libram unam, terebinthinae lib. i. ad pis tauri-
ni, floris lapidis Asii, utriusq; quadrantem. calcis
uiuæ quadrantem. manne quadrantem. cyprini
lib. i. præpara ut dictū est. Aliud Diodori. Adi-
pis taurini drachmas octo, spuma nitri drachmas
quatuor, floris lapidis Asii drac. ij. In alio exempla-
ri drachmas quatuor, olei cyathos ij. arida cum
liquidis committito. Hoc pharmacum ualde com-
modum est. Resorbet etiam collectiones circa ar-
ticulos consistentes, & à doloribus liberat.

ARGUMENTA CAPITVM LIBRI PRIMI

Præfatio. in qua prius eisdem sibi libros scriptos te-
fiatur, qui Romæ in cendio perierint.

De compositione medicamentorum in genere.

Cap. 1. Aduersus eos qui negant medicamēta, siue
simplicia, siue cōposita, ad certā aliquā partē peculiari-
ter magis q̄ alias spectare. 2. Contra negantes in cō-
positionibus singula simpliciu uires retinere suas: & u-
nam quampiā ex omnibus nouā resultare uim dicētes:
Quodq; istū nō distinguat inter proprias & acquisitas
facultates. 3. Contra empiricos, qui nulla medicamē-
ta ratione cōponūt, sed casu. 4. Quæ præfere cōueni-
at eum qui medicamēta probe cōponitur sit: Nempe
uires & gradus simpliciu, itē morborū aliorūq; præter
naturam causas differentiasq; deniq; indicationes me-
dendi. 5. De usu & necessitate cōpositorū medicaminū.
De emplastris.

6. De emplastro ex chalcidide quod phœnicinū quo-
que. i. palmēū uocat. 7. De emplastro quæ ex argēti
spuma præparant. 8. De emplastro quod ex argēti spu-
ma & hydreleo cōficiū. 9. De emplastro, quod ex ar-
gēti spuma & oxelao cōponit. (Recētores argēti nutri-
tū & triapharmacū uocat.) 10. De emplastro & argēti

spuma & anelao. 11. De cruda spuma argenti usu.
12. Quō lauare oporteat argēti spumā, & reliqua me-
tallica. 13. De pharmacis quæ ex molybdana cōficiūt.
De albis emplastris,

14. De emplastris albis quæ ex argēti spuma & ceru-
sa fiūt. Et primū de cōtione ipsarū. De resinis. De cera &
resinae mixturæ. De cera alba. De oleo quod admiscet.

15. Cōpositio & pōdera ad utilissimū iā dictū albū em-
plastrum. De thure, alumine, pipere. 16. Albū empla-
strū ex pipere, ut Attalus Herasq; cōposuerūt. 17. Al-
tali albi secundū Andromachū cōpositio, quæ minus
nocet moris à rabido cane, & neruis uulneratis: Vide
Cap. 24. 18. De alijs emplastris albis. 19. Albū ali-
ud. 20. Aliud albū. 21. Albū Hera. 22. Alia duo al-
ba emplastra Hera. Itē de libris ipsius, & Asclepiadis
pharmacionis & Andromachi. 23. Quæ Asclepiades
alba scripserit. 24. De Attalico sine pipere secundum
Asclepiadē, etc. Vide cap. 17. 25. Quō candida empla-
stra cōponenda sint aduersus ulcera cacoethe. i. mali-
gna, & ea quæ cicatricē difficulter admittunt.

26. Damocriti fenarij de albo
emplastro.

CL. GALENI DE COMPOSITIONE MEDICAMENTORVM PER

GENERA LIBRI SEPTEM, A IOANNE ANDERNACO
Latinitate donati: Liber primus.

PROOEMIUM.



CRIPSIMVS & iam antea
commentarium, cuius prio-
res duo libri in publicum sa-
ne prodierant: sed cum alijs
in apotheca quæ ad Viam sa-
cram est relicti intercideret:
quando pacis delubrum to-
tum, & ingentes palatij bi-
bliotheca incendio conflagra-
runt. Tunc enim
& aliorum complurium & mei libri qui in apo-
theca illa erant sepolti, interierunt, idq; cum ami-

corum nullus qui Romæ degebat, priorum duo
rum exemplaria habere se fateretur. Efflagrantibus
itaque familiaribus, ut idem opus denuo cu-
derem, operæ precium mihi uisum est prius edi-
torum mentionem facere, ne si quis antea in il-
los incidere, causam quæreret cur bis de eisdem
rebus tractauerim.

1. In illis igitur à primis libri exordio disputatio-
nem in eos direximus, qui sophistarū modo com-
positorum medicaminum pollicita, seu professio-
nem quantum licuit, abrogare, nonnullaq; simpli-
cium

cium calumnijs deprimeret conabantur: disterijs eos pariter incessentes, qui scriptum de illis reliquerunt: alia iecur, alia lienem, alia renes, uel uescicam, uel caput, uel pulmones iuuare. Vtrum enim (aiunt) praeses quidam eis imperat, quemadmodum in Tragedia:

Abi quidem tu flumina ipsa ad Inachi

Thebas arage tu pergit Cadmeias.

Sic in his tu ad hepatis portas, tu ad uescicam, uel renes duos proficiscere? An quod in uentriculum ingestum est, iecur quidem excipit, inde uero per uniuersas corporis partes defertur? At hoc scimus ma eos qui haec cauellantur, tam esse medicamentorum facultatis imperitos arguit, ut à marino lepore pulmone exulcerari solum ex omnibus corporis particulis ignorent: uescicam solum à cantharidibus, ab alijs renum lapides coneri, ab alijs rursus ex pulmone atque thorace faciles fieri excretaiones: quemadmodum ab alijs alia in una quadam particula peculiariter pericit.

2 Atqui uarie hunc sermonem in primo commentariorum iam antea nobis (ut dixi) conscriptorum uolumine, sicut rursus in altero sumus executi, quod quidam putarent in cõpositione simplicium medicamentorum contrarias inter se possitates omnino corrumpi. Etenim si aquam (inquunt) seruentissimam cum frigidissima temperaueris, neutra illarum, qualis prius extitit, permanet, sed tertia quaedam ab utraque diuersa generabitur. At hic quoque uanam ipsorum nugacitatem offendimus, qui ignorent ex ijs quae corpori adiuuentur, nonnulla pro innata qualitate, alia pro acquisita functione obire. Quis enim cicutam aut papauer refrigerandi uim habere dubitat? Et tamen tu si recalcetra ea uehementer animalis corpori offeras, nõ fecus ac cauterii ulcus concitabit. Quoadmodum rursus ubi sinapi in frigido aere cum aqua trita, frigidissimo hyemis tempore, repente corpori raro ac imbecilli applices, horrebis nihilominus, quod si niue aut glacie ipsi contigisses. Porro si longiore temporis spatio corpori nostro admotum fuerit, primum sanè exigui caloris sensum praebit: dein maioris, postea tamen euidentis ut igne uiri uideamur. Rursus cicuta & papauer, non calefacta adhibita, tantam patientem refrigerationem, ut stuporem corporibus qualibet acuto sensu antea praeditis inferant. Cum igitur id genus omnia in cõmentarijs qui undecim numero sunt, de Simplicium medicamentorum facultate definiuerimus, iam ad ipsam disciplinam utilem descēdemus, in qua exercitatus etiam si multiplicis medelae facultatū siue cõpositionū, quas Graeci polypharmacus nominant, scriptiones minus proferant, nõ desiderabis commoda cuiusque morbi auxilia: modo simplicium pharmacorum, uti diximus, materiae nõ sis imperitus.

3 Caterum hic liber obiter ostendit & Empiricorum medicorum contentionem, qui ad insomnia, fornicationem, & casum medicamenta composita propè uniuersa referunt, si paucissima quaedam excipias, quae communi omnium hominum ratione, (epilogismum ipsi uocant) inuenisse se

dicunt, quemadmodum ubi eiusdem facultatis pharmaca inuicem miscuerimus, quae alia in alio corpore melius aut peius functionem suam obesse usum ac experimentis didicimus, ratio certe nobis esse uideretur Empiricorum aliqui dicunt (non enim omnes) componere plura huiusmodi, ut uel unum ex eis corporis curandi naturae idoneum inueniatur: quod in hoc utique recentissimo pharmaco, cui nomen inditum est cephalicum, quasi capitale dixeris, accidisse ferunt, missis in eo omnibus ijs, quae uel per se ulcera carne implere cognoscuntur. Sed qua ratione arugo cerato simpliciter mista medicamen sarcoticum, id est carne implens faciat, cum neutrum ex illis nutriendae carnis uim habeat, non item exponit: si quidem erugum ulceratam carnem erodit, utpote acre, & calidum medicamentum: ceratum mite quidem est, nec mordax, uerum nouae carnis loco sordes parit ulceribus. Nos uero diximus in tertio Methodi medendi libro, quomodo uidelicet tum hoc, tum alia quae ex contrarijs eodem pacto constant, inuicem commisceantur: dicitur nunc quoque particularis exercitatio, morbi cuiusque appposito exemplo.

Quae praescribere conueniat eum qui medicamenta probe compositurus sit. 4

Expositum est alibi simplicium medicamentorum uires non solum cuiusque generatim noscendas esse, ut quidam scripserunt, dicentes ea uel calefacere uel refrigerare, uel siccare, uel humectare, uerum distincte, membratimque, & ex quo sint ordinis singula, uti nos docuimus. Nam nonnulla quaedam medicamina obscure prorsus unum quodque praeditum efficiunt, quaedam manifesto, aliqua ualde, sicut alia absolute. Non satis est ergo nouisse pharmacum hoc calefaciendi, aut refrigerandi uirtutem habere: sed quantam habeat, definire oportet. Calefaciunt enim resinae omnes, idque sibi commune habent, attamen maioris minorisque ratione non exiguam in calore sortitae sunt. Item succi plures non mediocriter ratione ad maius minusque facta differentes, excalfaciunt. Nam si panacis succum cyrenaeo & medico conferas, uidebitur tibi hic nihil ceu ad illos esse. At quorsum attinet sermonem longius abducere, quam ea ipsa quae quotidie in cibo sumimus, eius differentiae nos commonefacere possint. Anethum igitur & ruta, cepa quoque, omnia calefacientia magno inter se uariant discrimine. Quapropter in curationibus, quodque particulae admodum refrigeratae, medicamentum quod impense calefaciat, ad mouebimus: illi uero quod paululum à naturali habitu recessit, medico calore praediti: sicut & insigniter refrigerata uehementissime calefaciens adhibebitur. Merito igitur quatuor non ex calfacientium ordines statuimus: separantes à modice calidis ea quae euidenti eiusmodi qualitate praecellunt: tum quae magna, tum quae uehementi adeo, ut urere uideantur. In singulis autem illis quatuor ordinibus diuersis quaedam esse uelut incipientis differentiae, nonnulla definitis & ei quae post haec existit, propinqua, alia in medio constituta. Itaque

funt ex his præ propter caloris uim exulcerant: quemadmodum etiam ex illis quæ exedètia seu putrificata latine, septica Græce nominantur, alia simul atque corpora contigerint, potestatem suam ostendunt: quædam duabus tribusue, aut quatuor horis opus habent: nonnulla diem totum, uel etiam post eum noctem, uel maius dein spatium requirunt. Hæc iam ut in calefactibus, ita quoque in refrigerantibus intelligere eum oportet, qui medicamentum aliquod confecturus est. Pari modo & in ijs quæ humectant exiccantque. Cæterum materiæ medicaminum quædam à plantis, quædam à metallis, nonnullæ ab animalibus proueniunt, quas omnes in commentario De simplicibus medicamentis definite expressas didicistis. Nam cum familiaribus hic mihi sermo potissimum est, qui precibus me adegerunt, hæc nunc propter librorum interitum denuò perscribere. Iam uero ut simplicium medicaminum uniuersorum facultates adamusis uobis cognoscendæ sunt, quo ubiuis corporibus curationem desiderantibus idonea ex ijs quæ ad sunt, facile possitis remedia componere, ita etiam omnium præter naturam affectuum differentias tenere expedit, quas primùm quidem lib. De morborum, altero De symptomatum differentijs, tertio post illos in quo De causis morbos efficientibus dissero, comprehensas habetis: ad hæc alijs tribus De symptomatum causis, uno insuper meo De plenitudine, necnon De febrium differentia commentario: postremo Medendi methodo, in quibus affectiones actionem lædentes didicistis: item curationem harum primam esse, quemadmodum etiam præseruationem causarum eas parientium. Docti pariter estis, primæ curationis consilium à morbois affectionibus sumi, cumque his simul indicationem facit partis affectæ natura. Præterea aeris nos ambientis temperamenta, constitutionem, ætatem, tempus, locum, uitæ propositum & mores, plures egregij medici inspicunt: de quibus ubi eorum usus fuerit, aliqua simul & hic nobis dicent. Hæc itaque in memoria uos omnia sic exprompta habere expedit, si quouis loco medicamentorum, tum simplicium, tum compositorum copiam habere desideratis, insuper ab uno interim aliquo sponte nato medicamine ac simplici, morbum curari posse, interim uero compositi usum requiri, ac quæ ob re id agam, ratione deinceps explicabim.

Quis compositorum medicaminum usus

5

Si solis simplicibus medicamentis uniuersos præter naturam affectus curare liceret, nullus utique compositi unquam usus foret. At hoc nunc ita comparatum non est: nam sæpe cum corpus aliquatenus calcare uolumus, simplex nullum, quod præstare id queat, habemus. medicamentum enim curans, affectioni cui adhibetur, proportionem nimirum respondere oportet: Ergo si affectio sit frigida, quatuor numeris à naturali recedens, curaturum ipsam pharmacum totidem gradibus mediocri symmetrice calidius esse oportere quis ignorat? Porro cum interim tale simplex nullum adsit, si duo habeamus, quorum hoc numeris duobus, illud tri-

bus calidius sit, ea si miscuerimus, medium efficimus quatuor numeris symmetron exuperas. Iam quædam simplicia citra alterius mixtura ne in usum quidem esse possunt: ueluti cum emplastro phar-macon apponere cupiam uolumus: quippe simplex nullum ad talem usum idoneum est. Ergo neque bitumen, neque cera, neque resina, sicut neque pix, neque propolis, ac ladanum: multo minus ærugo, & cerussa, uel spuma argenti, uel molybdæna, uel aliud quodpiam metallicum medicamentum, simili modo nec herbæ solæ emplaston pharmacum efficere possunt. Quare primi emplastro rum autores non temere ex oleo quoque metallica coquere excogitarunt, quæ liquefieri possint, liquefacere, ac siccas herbas contusas cribratasque eis adijcere. Rursus in alijs affectibus unum medicamentum: solum ex ijs quæ suapte natura proueniunt usurpamus. Cui tamen nonnulla adijcimus, aliquando uirium ipsius uehementiæ obtundendæ, interim insuauitatis mitigandæ gratia: quemadmodum Hippocrates in libro De uictus ratione in morbis acutis hisce uerbis inquit. Si sub transuerso septo dolor sit, ad clauiculam nero non ascendat, emolliendus est uenter uel nigro ueratro, uel peplio: nigro quidem daucū, uel fesele, uel cuminū, uel anisum, uel aliud quid odoriferū miscendo: peplio aut silphij succum. Hæc di-c-tione manifesto Hippocrates usum quidè pharmacii purgantis esse ostendit, sed insuauitate eius in potu, moramque in uentriculo condimentum requirere. multa siquidem quæ bibuntur pharmacum sunt assumentibus insuauia, ut stomachum subuertant, uomitumque protinus ciant: quædam licet paululum in uentriculo manere possint, postea tamen euomantur, cum prauas eructationes mouerint. Quemadmodum uero purgantium ceu condimenta sunt eiusmodi medicamina, quorum Hippocrates meminit: ita dolorem leuantium quæ anodyna appellantur Græcis, alia uehementiam mitigant, ut cum papaueris succum, uel hysocyami semen præbemus, uel mædragoræ radicis corticem. Quare & hic pharmacorum compositionis usus est, maximus autem in morbis qui contrarias simul facultates desiderant, uerbi gratia repellendi & digerendi, uel detergendi ac leuigandi, uel inerascandi simul & attenuandi humores, quemadmodum plurimi usus medicamenta, Græci Polychrestota uocant, & optima, contrarias in se potestates, ut indicabimus, continet. Verum is quoque medicamentorum compositionis usus est, cum unum aliquod illorum ad multas uenenatas feras, uel exitiosa pharmaca efficax habere uolumus: qui usus etiam theriacam, ut uocant, antidoton comparauit: item mithridation, aliasque multas. Sunt porro & alia quædam utilitates minores quidem prædictis, at tamē quæ crebro nos ad medicaminum compositionem descendere cogunt, quas uniuersas hoc in opere docebimus. Nunc enim ubi primum emplasti medicaminis & ad plura utilissimi à me confecti mentionem fecero, iam institutum aggrediar.

De emplastro pharmaco ex chalcitide confectio, quod phoenicinum
quocq; est palmærum uocatur. Cap. VI

Qua ratione seu industria cōpositum emplastrū ex chalcitide, q̄d à palma quā phœnica Græci uocant, phœnicinum appello, medicamen glutinantis ulceribus, cicatrice obducendis, & phlegmonis curandis accommodum, (quia liquefactum liquidi cerati crassitudinem obtinet) animū exerceat, tum permissis empiricis suam ipsorum fatentis scitiā, tū relictis quoq; Theffali sectatoribus, qui optima pharmaca à medicis inuēta cōtrarijs constare facultatibus ignorant: exercete inquam ingentium, ut eisdem meū utentes methodis, medicamēta positis cōficere: ac sitis re ipsa persuasi, uel ea quæ à maioribus inuenta sunt, omnia ex ratione cōponi; nimirū cum empiricorum fortuita occasio (Græci uocant periposin) nugatoria sit. Dicenda itaq; iam est propositi medicamēti cōpositionis ratio. Oleum uetus, & adeps digerēdi uim obtinent, chalcitis & palmæ succus repellendi, adstringendiq;. Ex his igitur pharmacum cōpositū, quo iam complures uel nouissis, ideo quod omnibus sui generis melius esse, usu & experientia probatum iudicārūt. etenim ratio cōpositio nem inuenit: experientia de inuentorū uirtute decernit: ut etiam rationalium methodorum imperitijs artificiose cōfecta fidem faciant. Porro cum modo dictis medicamētis argenti spumā miscui, quæ nihil magni adeo momēti adferre potest: neque repellentibus quod influit, neq; digerētibus quod iam particulis phlegmone laborantibus in fluxum est: quippe siccandi uirtutē habet, sed non ualidam. Quare ipsam ceu aptum medicamen in emplastri cōpositionem adiunxi: nam cum prædictis incoquitur, usq; ad consistentiam non polliuenter. Adipē uerō insulsum, & q̄ maxime fieri licet uetustissimum esse conuenit, tum oleum uetus similiter, quod cum suillo adipe propinquam uirtutē habere quodāmodo didicissis: licet adeps paulo maiorem emolliendi calfaciendiq; uim obtineat. Intellexistis quoq; uetustate ipsa tenuiorū partiu fieri, & digerere promptius: eoq; phlegmonis quæ magnum dolorem inferūt, magis blanda ac mitia esse ipsa recentia. ijs uerō quæ tales non sunt, cōmodiora uetusta. Et quo phlegmone diuturnior & cōtumacior, hoc magis uetera profūt, ac sola curare ualent, modo præterea nihil afflicte parti influat. Quod si quicquā influxerit, mistam esse medicamēti quoq; uirtutem oportet, cuiusmodi habet à me cōpositum pharmacum. Itaq; propterea chalcitidē & palmam digerētibus admiscui, nō ignarus paucas omnino phlegmonas diuturnas existere quibus nihil influat. Nam ob humores in eas confluentes diutina esse solent. Porro dum hæ incipiunt & accrescunt, astrigentium refrigerantiumq; medicaminum uirtus recte prepollet: ideoq; hoc emplastrum pharmacum aduicq; liquidū cerati spissitudinem liquefactum multis admodum utile redditur: interim uinō adiecto, uel aceto, uel aqua illiquescens: nonnunquam ex oleo immaturo, uel alio quopiam astrin-

Galen.

A gente, quale est Hispanū & Hisfricum: uel ex dulci aliquo adstrictioris experte, aut etiam uetusto. Ego quoq; sæpe myrteo & melino, ubi ualidius adstringere res postulabat, medicamentū liquefeci. Hæc igitur cōpositio medicaminis talī symmetria cōficif. Verusti adipis, quem insitiores axungia appellant, sunt pōdo libræ ij. olei ueteris pōdo libræ iij. argenti spumæ tantundē, chalcitidis pōdo uncia quatuor. Hæc autē ita coquere oportet. Adipis mēbranulæ omnes eximunt: deinde contunditur, ut liquari facile possit: mox ad ignem liquesit, deinde per colum destillat ut purū fiat, nihilq; membranæ habeat, pōdo libras duas prædictas pendens. postea chalcitidis leuigatæ pōdo triens cū olei trib. libris adipi admisceat: his & argenti spumę pōdo libræ iij. adijciunt. Ac omnia ubi simul in mortario coierint, cōijciunt in cacabū, ac rudicula palmæ mouent. Sufficiet autē tibi ramus unus maiusculus, ut solida ligni parte mouēdo utaris in modū spathe dictæ. uocant em sic id quo cōfecturas mouent, & nos perspicuitatis gratia similiter nominabimus. Quod autē solida rami parti continuū est, in orbē purgatum, ac tenellis ramusculis utrinque procedentibus abiectis putatum decidit, sed cortice prius exuto, ut segmenta iniecta pharmacum succo suo imbuat inficiantq;. Igitur statim ab initio spathe uetudum est, sed tenuia palmæ segmenta iniicere oportet ubi medicamentū cerato similē consistentiam habuerit. nam si à principio ea immittas, succus iniectorū, quē manere uolumus, ex decoctiōe consumetur. Insuper spathe qua medicamentum initio mouet, pars in cacabo intincta postquam inaruerit, ut proprium succum non amplius seruet, amputatam reijce, reliqua utere. hanc rursus cum medicamento intincta siccata fuerit, simili modo absecato. Constat autē uobis arbitor, quod palmæ ramum non multis diebus ante abscissum arbore esse oportet: quippe tēporis interuallo arefcit, & succum amittit. Prædie igitur per hyemem auferatur: æstate, uel eodē ipso die quo cōcturus es pharmacum. Vbi autem sic cōctum spissitudinem, ut nō inquinet, acquisierit medicamen, ipso uteris emplastro ad ulcera, quæ cicatricem ægre ducunt, dysepulota græce uocant: ad cruenta uel oleo liquefactū: benefacit phlegmonis, podagris, articulorum morbis, inguinum inflammatio nibus, phymatis, ambustis, perionibus, fracturis ossium, cōtusionibus, omnibus deniq; affectibus quos appellant rheumaticos. Iā uerō & multi qui hernias abscant, post manus operā, statim ipsū cum irrigationibus & cataplasmatis preparatum imponunt: si uerō chalcitidis uncię sex immittantur, quæ est selibra, medicamen ad magna uulnera glutinanda prōptius, atq; ad ea quæ cicatricem ægre ducunt, efficacius fiet. Sunt quidem in hoc etiam alia eiusdem potentia medicamenta: ipsi tamen cum oleo liquefacto magis quam alijs omnibus in rheumaticis affectionibus fidendum est. Cum igitur plurima eiusmodi Romæ existenter, nullū tam celebre probatumq; fuit. Conducit,

tom. 5

L ut

ut dixi, & podagricis, & articulorum uitio laborantibus quolibet tempore, cum dolores intensi non sunt, qui perfusiones, & cataplasmata lenientia postulent. Incipientibus igitur atq; augetibus etiam nū id genus uitis, liquefactum pharmacum refrigerari sinito, idq; spathomela dera-dens pilæ inijecto, cui uinum superfundito, quod ut recipiat, manib. ad pilam subigito. Erit autem uinum austerius, ætate quidem medium, substantia non crassum, sed quammaxime fieri potest dilucidius. Nam huiusmodi, utpote substantia tenuioris in altum corpus penetrat: tãtis per autem liquefacto medicamini ipsum infundito, manib⁹ conterens, dum excipiat misceturq;: nec humidum adnatet, quod nō contrito ac emollito phar-maco mistum sit. Ad hæc etiam si non prius refrigeratum medicamentum deraferis, liquefacto & adhuc calido uinū superfusum permiscere licet. Itaq; in phlegmonon principijs uim repulso-riam utilidiorē esse oportet. In incrementis uerò hæc non nisi in imminuenda, quæ digerit uirtus augenda est. Cum autem in statum proprium seu uigore phlegmones tumor peruenit, pares inuicem esse potestates conuenit repellendæ & digerendæ, nisi quis uehemens dolor pharmacum leniens requirat. Cæterum inclinante phlegmone digerendi uim augebitis, ut prorsus nihil uini eo tēpore miscatis. Præterea dū id liquefcit, si quando astrictorium qualitatē fatis excellere uolumus, Hispanum oleum, uel Histricū, uel quod omphacinum seu omotribes, latine immaturum seu crudum appellat, iniiciendum est. Vbi æquales utraq; facultates habere cupias, oleo dulci nec recenti nec utusto liquandum est. Si ut digerat expetis, uetus oleum uel cicinum cōmode sumitur. Emplasti autem medicaminis in liquefcendo huiusmodi fiat symmetria. Oleum paulo copiosius q̄ medicamentum est, magisq; æstare uidelicet, ut libram unam absoluat medicamenti uerò decem uncias iniēcisse abunde suffecerit. Clarum est cui libet hoc efficacius reddi emplastrū quo plus medicamētū habuerit: tanto magis mitigare ac dolorem tollere, quanto liquidius fuerit ex rosaceo liquefactū. At cerati quod inungi possit coagmen-tum recipit, dum medicaminis pondo in olei sēbra liquata fuerit. Tale uerò phlegmonon inclinatio-nibus ex usu est. Item sedis, rectiq; intestini tumores phlegmonodas spōte obortos omnibus melius iuuat. Ipsum autē tunc liquefactum oportet cum oleo copiosiore, ut per cornu recti foraminis, cui uesica suis alligata sit, immittatur, uel ut in eiusmodi usurpare consueuimus. Ad hæc frequenter ipsum in his ex rosaceo liquefcimus, ca-cabo uasi in quo liquefcit prius subiecto, qui calidam contineat: prunis uerò ardentibus incumbat, aut flammæ fumo carenti. Jam uero pro superioris symmetriæ modo liquatū, ut liquidū cerati ipsi-situdinē habeat, & naturalium & podicis ulcera perlanat, imò & alia omnia usq; ad ulceratos per-niōes, & ambusta. etenim uniuersa statim inflam-matione liberat, plurāq; reddit, & solida implet

A carne, præsertim ubi plus chalcitidis adiectū fuerit. Insuper nemo ignorat uinū quoq; medicamēto id esse turo admiscendū esse. Quod si acetum acceperit, ambustus optime facit & statim, & post ea quolibet tempore impositum: siue illa iam pustula, siue non habeant. Constat autem, si quis in aqua feruenti ustus fuerit, hunc etiam affectum ambustum igne nominari. Porro si pharmacum ante imposueris quàm phlegmone sit orta, nihil adeo ipsius generationē impedit prohibetq;: qua propter, ut dictū est, nonnulli qui hernias secant, statim eo utuntur, nec prius uulnere madescto. Ad hæc cōtusionibus, fracturis, & qualibuscunq; plagis, si liquidum imponitur, accommodatissimum est remedium. Ligamentis autem circum-datum fasciarum instar quibus rupturæ deligantur, Catagmaticas Græci uocāt, œdemata omnia & inflationes minifice iuuat. Cum malo succo corpus abundat, uel admodum sentiens est, quamprimum contusis & percussis partibus illud impones, hyoscyamos recens adijcietur, qui si nō est recens propter anni tempus aut locum, nihilo magis ipsum desiderabis, si adiungas eū qui per ætatem repositus est, qualis etiam singulis annis ex Creta uobis Romam apportatur. Hoc magis adhuc dolori sedando opportunum medicamē succus mandragoræ mistus efficiet. Non autem uos latet et hunc à Creta optimū fictilibus poculis asferri, cuius uncia unam libræ olei emplastrū liquefacti miscere sufficit. Atq; interim amplius, interrim minus impones, prout affectio postulat. Conducit autem in eiusmodi corporibus & pharmacum ex rosaceo liquefactū esse. Cæterum ex casu cōtusis partibus, uel ligno ac lapide percussis, est ecchymosis quedam cōtigerit, protinus ab initio medicamē liquefactū opus est imponat, uino, ut docui misto. quod uinū die tertio, aut certe quarto, si particula inflammatione careat, austeri oportet: oleo aut ueteri emplastrū liquare, nam si plus adstringant ecchymomata, uix queant per halitum digeri. Hoc medicamento etiam uitor aduersus erysipelata, præsertim phlegmonode, & adhuc lōge magis ad phlegmonas erysipelatodes. Principio igit impono ipsum liquatū ex rosaceo quod oleo omotribe, id est crudo & salis expete constat: tale enim erysipelatis est accommodatissimū. Ita iam liquefacto solani succus in mortario misceat, qui totus per totum accurate subigatur excipiaturq;: qui si non adest, psyllij, si æstas fuerit, etiam uuæ acerbæ cum portulacæ, uel semper uisui succo. Et enim uiuæ acerbæ liquor per se plus quam oportet adstringit: tanta autem adstrictio erysipelata lædit, ut quæ calorem ipsorū cutem densando includat. Rursus portulacæ succus ne exprimi quidē solus prælētore potest. Optimum igit est eū qui ex uua acerba prius tūsa expressus est portulacæ in pila cōmittere, & sic iterū cōm-tere, deinde ubi ex ambobus mistū exacte unitum fuerit, liquorem elicere. Simili modo etiam semper uisui succum exprimes. nam seorsum neq; ex hoc, quemadmodum neq; ex coryledone succum

cum copiosum exprimere quisquam potest. At mandragora pomorum maturitate uigentium succus recens adiectus magis aptum medicamen efficiet, quem si tempus neget, illius qui à Creta, uel alio quopiam loco aduehatur, miscere non dubitabis. Quin & hyoscyami succum miscere ei consueuimus: interim Meconium, qui papaueris succus Latinis dicitur. Satius est autem una cum hoc & glaucij quippiam adijcere. At his multo imbecillior, sed acquisitu facilis lactuca succus est, tum agrestis, tum hortensis, quam uniuersi Græci huius tempestatis non thridacinem, sed thridaca nominant: agrestem solam thridacinem appellantes. His rursus ferreos, polygoni, trifolij, & auriculæ muris succi minus ad refrigerandum efficaces sunt, quam & ipsi refrigerent: sed euidentius lenticula palustribus locis proueniens. Horum omnium penuria, miscebis acetum & aquam. Porro medicamenta hæc uniuersa ascititias qualitates frigidas habent: uasis uidelicet aquæ admodum frigida, aut niui insistentibus, atque ipsum quoque Phoenicinum medicamentum simili modo refrigeratum erysipelatis ammoueatur, donec uehementis ipsorum ardor subsidat. Liquet autem subinde ea, quæ adscititia qualitate frigida erysipelatosis affectibus succurrunt immutanda esse, maxime ubi exactum erysipelas citra phlegmonem fuerit. Postea quam uerò actis illa inflammatio quiesuerit, aut nec perfectum plane erysipelas afflixerit, sed uel erysipelatodes phlegmone, uel phlegmonodes erysipelas, non adhuc adscititium frigus admolieretur, uerum à succis etiam impense frigidis abstinerebimus: eos medicamini liquefacto miscentes, qui mediocriter refrigerant. Atque ab his iam & lini seminis, & chamæmeli succum miscemus, ex eoque solo postea medicamine liquato utemur, nihil aliud præterea immittentes. At si quando liuidum ex frige facientium uel erysipelas euaserit, non tale amplius erysipelas appellandum est: sed tunc abstinere non à uini mistura modo, sed rosacei quoque & adstringentium oleorum oportet. Nam solum Phoenicinum ueteri oleo liquefactum, quod liuorem contraxit per halitum discutere potest: & tunc affectæ partes aqua calida fouentur, & scarificantur. Vobis si fuerit uisum hoc interdum facere, protinus Phoenicini liquefacti humidum medicamen, cui uinum adiectum sit, imponere conuenit: altero die uinum auferendum. Quòd si iam plus impendio erysipelas refrigeratum ab immodice refrigerantibus medicis acceperimus, ut iam quoque nigricet, perfusionem & scarificationem magis utemur: atque citra hæc calcis uisæ quippiam liquido pharmaco immittentemus. Si uerò laborantes teneri sunt, lotam ipsam usurpabimus: tunc prodest etiam succus coriandri pharmaco inditus, qui sanè & cum ceratore rosaceo iuuat non mediocriter. Ad hæc quæ iam similes affectus alia pleraque medicamenta

A curant, sequenti sermone dicentur quædam pari uirtute Phoenicino, nonnulla etiam efficacior prædita. Porro aduersus fluxionum uitia omnium optimum hoc medicamentum est, ac spe maiora frequenter præstitit. Quum itaque femur aliquando prope inguen cruda phlegmone totum id affligente suppurasset, crus ita nobis figurabatur, ut sanies ad inguen conflueret. Facto autem ulcere, dum hoc longiore interuallo contingeret, fluctio quæ in femur decubuerat, euacuata est: sed fistulosa quædam dispositio sub femoris totius cute orta est, ut ipsam iuxta patellam, quæ genu pars Epigonatis Græcis dicitur, diuidere cogitarem, quò sanies utrinque liber esset exitus: medicamentis autem liquidis inditis, largius pertransundi uia promptior. Vbi autem femur soluissem, postero die incidere ipsum decreueram. Inuenta sunt omnia coacta, arida, madorisque expertia. Nemo igitur nõ nouit, quòd rationi consentaneum erat, & illo ipso, & postero die, & sequentibus, similiter uti pharmaco: quandoquidem particula quotidia coloratur ac omnino sanior quam esset, reddebatur. Curato itaque hoc modo fœmore, postea multas rheumaticas affectiones hoc medicamine sanauit, quæ quidem osculum simplex habent, sed ut glutinari non possent, & fistulosum intus essent. Non uerò ab ipsius usu desistendum est, etiam si multis diebus euident nullum præsidium adferre uideatur, ut quòd postea uno interim die simul uniuersam utilitatem maximam ostendat. Quare confidenter hoc semper in rheumaticis affectionibus utamini: in teneræ quidem carnis homine, uel puero aliquo, uel muliere, post prædictam symmetriam, quatuor uncias chalcitidis immittentes: in ualido ac duro corpore, ex proportionem, uel unciam unam, uel duas apponentes, ut quinque, uel sex chalcitidis uncia sint, tres librae utriusque, nempe olei ueteris, & argenti spumæ. duæ uerusti adipis, quem insitiores axungiam appellare diximus. Diluatur autem in rheumatium uicijis oleo dulci, nec nouo, nec ueteri, asumatque uinum austerum ætatis mediæ. Hoc pharmacum coarguit Thessali nugacitatem, efficacissimum auxilium ex contrarijs potentijis compositum ostendens, quarum si alteram adimas, nihil faciet prædictorum. Nam neque ex adstringentibus solum, sine laxantibus ad rheumaticos affectus præclaras quidquam & efficiet, uel certe ad phlegmonas incipientes, & augetescentes. (neque enim leniendi uim obtinebit) neque ex solis relaxantibus discussorium sine adstrictione confectum, quæ indurata habent emollire. Porro laxabit perfecte, & mediocriter emolliet, si non admodum uetus oleum & adipem receperit. Quòd itaque Mnaseus pharmacum condidit, æqualia inuicem continet tum oleum, tum argenti spumam, tum adipem: sed maxime phlegmonis incipientibus incrementibusque est contrarium. Habet & nostrum uidelicet hoc pharmacum.

macum eadem omnia, & quæ Mnasei, & argenti spumam, & adipem, & oleum. Verum si nihil ex ijs quæ adstringunt acceperit, particulas effeminat, & robur earum dissoluit: ob quod etiam fluxionis sunt obnoxia. Didicistis enim, non semper ob calorem immodicum, ut quidam arbitrantur, corporis particulas fluxionibus laborare, sed hoc quidem ipsis raro accidere: ab imbecillitate uero illarum id genus uitij progigni, quæ ut plurimum ex intemperie frigida proficiunt. Itaque si humectet eas quippiam, calefaciatque medicamentis laxantibus, dissoluitur profus & infirmæ sunt. Rursus si tumores in rheumaticis morbis fortiter adstringat, initio quidem proficere uidebitur: ceterum qui restat, contumacem & scirrhosum faciet. Nam magna ex parte tales affectus ne quidem ferunt nimis adstringentium impositionem: ut à quibus dolore & tensione molestantur. Atqui omnis dolor inflammata exciuit irritatque, & fluxionibus occasionem præbet: quamuis rheumatica intemperie æger non afficiatur. Sed miri nihil est, Thessalum medicæ artis operum in expertum, & qui morbos ratione inuenire nequeat, omnem phlegmoniarum curationem ignorare. Vobis autem qui crebro tum Phœnicini huius, tum aliorum medicamentorum, quæ contrarijs constant uirtutibus, euidentissima in multis morbis auxilia uideritis, conandum est ipsis quoque, ubi iam composita interim desiderantur, eadem methodo ex illis quæcunque regio præbet conficere, quum phlegmonem suspicamini futuram, uel in cepisse modo, quæ magis adstringunt, in augmento ipso, quæ minus: in statu & inclinatione, quæ magis relaxant & digerunt. Semper tamen utraque miscetur & repellendi, & discutiendi facultas: nisi quando fluxio prorius constitit, & corpus uacuum fuerit, tunc ad digerentem, sicut in primis incursum ad repulsiuam uirtutem tuta est accessio.

De emplastris quæ ex argenti spuma præparantur. Caput VII

Quoniam in emplastri mei Phœnicini confectura adipem uetustum, & oleum, digerendi potestatem habere dixi, chalcitidem uero & palmam constringendi, repellendique: hæc autem medicamen emplastrum sine argenti spuma præparare non possunt, ob id uisum mihi est, de ipsius spumæ usui deinceps uerba facere. Si quidem Phœnicini uirtibus nec eam obesse quidquam, nec conducere, sed materiæ ad emplastri pharmaci compositionem tantum idoneæ rationem obtinere putandum est. Non absurdum itaque mihi apparet, si de eiusmodi medicamentis, exempli gratia de spuma argenti disputationem instituero. Sunt non pauca quæ potestatem aut nullam, aut exiguam admodum pharmaco quod præparatur simul afferunt: commoditatem uero materiæ præbent, ut uel emplastri, uel cerati speciem referat. Neque enim argen-

ti spuma manifeste calida est: sicut nec frigida, nec humida, sed exiguam siccitatem habet uirtutem in primo abscessu ab his quæ adamussum media sunt inter humida & sicca. Non tamen uis eius est obstruere, sicut nec aperire: item nec abstergere, quemadmodum nec inquinare euidenter, sed paululum à medijs ad crassius quodammodo recessit. Verum hoc quoque ex diuturna concoctione deponit fusa per ignis potentiam, & alterata. Porro sola per se cruda foemorum attritus ex itinere iuuat, quo etiam parum exsiccare cognoscitur. At neque acrem, uel suauem, neque acidam, uel amaram, uel austeram, uel acerbam, uel omnino adstringentem facultatem ipsam habere, gustus abunde testis est.

Quemadmodum etiam ulcera nec ab ea derodi, nec calefieri, nec refrigerari, nec purgari, nec carne impleri, nec quum caro supercreuerit tolli percipimus. Licet itaque nobis in uariarum usum administrare argenti spumam: interim ex oleo & aqua coctionem eius ad usque emplastri spissitudinem molientibus, interdum ex oleo & aceto: aliquando ex oleo & uino. Porro in quibuscunque istorum coquatur, melius id medicamentum redditur, quod magis coctum fuerit, quod liquidorum quæ miscentur copia continget. Est enim ex ijs pharmacis, quæ liquefieri possunt etiam spuma argenti, dum tota funditur: sicut resina & cera: sed non statim ubi ignem contigerit. Vnde multis imponit, qui nullo modo ipsam fundi existimant. Igitur si cum oxelæo coquatur, liquefit citius, perinde ac cum æugine, quæ & ipsa fundi natura solet: uti chalcitis quoque & misy. Ipsorum itaque celestissime chalcitis funditur: tardissime argenti spuma. At in horum medio sunt ærugo & misy, funditur & fori, sed longiore temporis intervallo, ut quod terrestre magis & saxeum sit, quam chalcitis & misy: sed de his iterum dicetur. Argenti autem spumam per oxelæum coquens ocyus liquefacies: per hydrelæum tardius. Tamen funditur sic quoque, si duplum eius sit uterque humor. Ego certe plus etiam quam duplum miscui frequenter, ut paulo post exponam. Atqui melius est statim ab initio hæc tria in mortario miscere, argenti spumam, aquam, & oleum. Quod si candidum medicamen esse cures, oleum purius, lucidiusque inmiscito, atque aquam similiter puram, ac candidam, coquaturque in loco sub dio solis exposito: quia nubilus aer pharmacum denigrat: syncerus magnum ad albedinem adiuumentum adfert, sicut aqua etiam in huiusmodi aere aspersa. Ceterum obseruato ne coctionem lignis, aut carbonibus peruri incipientibus moliaris. Nam fumus ei facile nigredinem conciliat. Perustis igitur antea carbonibus, quum exacte ardent, tunc coctionem auspicare. Quod si illam per hos absolui non licuerit, in alio foci simili modo carbonibus præparatis, cacabum superponito. Quæ ergo medicaminis candidi faciendi

faciendi gratia obseruanda sunt, abunde satis indicatum est. Iam uerò hoc fit glutinantius, quo plus, ut demonstratum est, liquoris adfuerit. Quemadmodum si singulorum trium pondolibram unam iniicias, firmius adhærebit. At si argenti spuma non illiqueſcat, causa est potissimum, quæ id facile decidat, sicut diutius adhæret cum argenti spuma cocta funditur, alteraturque. Candidius sanè erit, citiusque coquetur, libris duabus aquæ in tres utriusque puta spumæ argenti & olei iniectis. Atque hoc in paruis ulceribus uti consueuimus. Medicamenti quod aqua coquitur, potestas nota est, si meminimus eorum quæ in commentario De simplicibus medicamentis dicta sunt.

De emplastro quod ex argenti spuma & hydreleo conficitur. Cap. VIII

Aqua peculiari substantia semper humectat & refrigerat. Adscititio autem calore assumpto, donec ipsum perferuat, excalefacit: frigida facta refrigerat. Oleum uerò si recens sit, pharmaco non renititur, permanet enim humidum, & modice frigidum, quali maxime tenera corpora & utriusque humoribus obnoxia indigent. Mulieres itaque & pueri, atque ex grandioribus mollem corporis habitum sortiti, (sunt autem hi & candidi cute) eius generis medicamenta requirunt. Porro coctum ostendimus ex oleo copioso, & aqua reddi tam glutinans, ut ne quidem aliois decidat. Et uerò etiam ulceribus quæ ad cicatricem ueniunt, multis diebus subsequen-tibus pharmacum immanere expedit, quò melius & citius ita cicatrix ducatur. Notum est huiusmodi pharmacum pruritus, desquamata, & ut uno uerbo expediã, parua ulcera persanare, in quibus & subliquidum parygrum appellatum Græce ceratum, aliaque id genus quædam utiliora sunt, quæ ualidam potestatem obtinēt, qualia magnis uulneribus imponimus. De quorum omnium simul uniuersali uirtute in tertio libro De morbis curandis dictum est: in quo generales communesque sermones (uniuersales nuncupant) de quaque ulceris differentia tradidit, ostendens quales medicamentorum, quibus illa curabuntur, uires esse conueniant. Hic uerò particulares materias recensio, symmetrias miscendorum definiens & modos, quibus si præparentur reddantur optima demonstrans. Ex hydreleo itaque argenti spuma sicuti comprehensum est præparata, emplastrum tactu blandissimum simul & adhærendo pertinax efficit: præterea aspectu album, refrigeratoriã uim habens medicorem, cuius auxilio exulceratis partibus ne quid influat impedit, & quod iam influxit de nouo ad partes circumiacentes retrudit, ut res fiat huiusmodi, qualis cum spongiã aqua frigida humentem particulæ cuiquam corporis imponimus. Nam illa rugosum contractumque totum locum facit, non tantum repellens quod influit, sed etiam quod in eo continetur ad uicinã

Galen.

A elidens. Atque emplastrum modo commemoratum non ex prima facultate, sed per accidens exiccare dicitur. Nam proprie quidem & primario ea quæ digerunt, & temperamenta ad sicciorem statum perducunt, nominantur siccantia: ex accidenti uerò etiam ea quæ frigoris causa id quod influit repellunt: quod continetur expellunt. In summa nullum humectans, uel primario, uel ex accidenti ulceribus commodum est, ut in tertio Methodi medendi libro demonstrauimus.

De emplastro quod ex argenti spuma & oxelæo conficitur. Cap. IX

B De argenti spuma quæ ex hydreleo præparatur, etiam hæc sufficit. Digrediendum modo est ad eam quæ oxelæo constat. Itaque mediocriter exiccās medicamentum fit, si utriusque, nempe olei & aceti duplo maior portio quam argenti spumæ misceatur. At si uetus quoque oleum sit, adhuc etiã magis exsiccat, copiosior uerò quam duplum fit utriusque mensura ualentius facit pharmacum. Quapropter fistulas quæ nondum cal-lum durum habent, curat. Cæterum spumæ argenti una pars iniicitur: illorum singulorum due & semis. Quinetiam tripla utriusque parte nonnunquam mista, toto die coxi medicamentum. Unde quidem reddebatur nigrum, sed perinde ac bitumen probum splendebat. Porro maxima siccantia potentia hoc pollet, curatque ulcera difficilia, & fistulas, quales dixi, fungit, uulnera cruenta glutinat, uno uerbo, exsiccat sine mor-su. Huius rei gratia etiam alia uniuersa ulcera sanant, maiora minoraque, donec ad cicatricem perueniant. Aequum est & alia quædam eius opera commemorare, quæ forsã ne quidem speraueris, quantum ad materiam humilitatem atinet. Nam quum febris solutio ex parotide suppurata cui-dam accidisset, parua relicta est fistula, quæ post sex menses à principio in agro mihi ostendunt. Erat enim puer filius agricolæ, annos natus circiter quindecim: huic quum ex emplastro illo, quanta tunc mihi copia aderat, imponendum dedissem, ipse in urbem reuersus sum, ac pluribus negocijs medicis occupatus, oblitus sum eius qui pharmacum acceperat: sed post duos certe menses, præter animi mei expectationem uenit incolumis: immittentibus enim nobis suillum pilum per fistulam, ad articuli commissuram usque procedere uidebatur. Non multos post dies, cum alius puer forte fortuna eiusdem cum priore ætatis, eodemque morbo laborans mihi esset ostensus, emplastrum hoc imposui, quo ille pariter integræ sanitati restitutus est. Ab eo tempore plurimos eodem uitio huius medicamenti uirtute liberaui, tum pueros, tum adulescentes, tum mulieres. Igitur si uos quoque uti eo ad huiusmodi affectus uolueritis, uetustissimum oleum & acetum quam acerrimum ex uino uidelicet solo confectum iniicitote, non ut quidam aqua mista ipsum præparent, sed purum sit quam maxime licet, ac pellucidum, tale liqui-

tom. 5

L 3

dem

dem tenuius commodiusq̄ ipsi erit ad quæ ipsum requirimus. Hoc pharmaco etiam musculos induratos subinde curauit.

De emplastro quod ex argenti spuma et œneleo preparatur. Cap. X

Reliquum est ut de argenti spuma dicam quæ ex œneleo componitur, & eandem prædictis symmetriam ac uirtutis excessus pro humorum copia respondentes habet. Etenim æquali portione tria missa præparauit, & duplo maiore utriusque liquidi mensurâ, quàm argenti spumæ, dimidium insuper, ac interdum tripulum addidit. Conseci autem nonnunquam ipsum & hoc modo. Per æstatem sole calido argenti spumam ex uino falerno conterebam singulis diebus quindecim continuis, uinum rursus, si forte primum euaporaret, infundens: post dictos dies coctum medicamen, exiccans abunde factum est, quo in rheumaticis quoque dispositionibus perinde ac Palmeo, quod Phœnicinum appellauit, usus sum: ex oleo liquefaciens, ut in illo prædictum est. Ac scemur iam diu induratum, cruentaq̄ uulnera eo sanauimus: atque ad omnia fuit optimū. Itaque si Falernum ad manum non habeas, aliud sumito colore fuluum, sed tenuē substantia ut pelliceat, cuiusmodi est Ariusium, quod in Chio nascitur, & odorum uehementer Lesbium, in Mytylene paucum, in Eresso & Methymna copiosius meliusq̄ proueniens. Item quod Falerno simile est Tmolite. Est & hoc tenuissimū, perlucidum, fuluum colore, dulce mediocriter, nimisq̄ odoratum: potes inueteratum hoc usurpare ad quæcūq̄ & Falerno uteris. Est porro & aliud uinum Tmolite, huic tum colore, tum substantia simile, uerum neq̄ dulce, neq̄ odoratum. Habet autem uim quandam adstringendi, sed dulcedine multo inferius est. Hæc itaq̄ ex cocta spuma argenti fiunt medicamenta.

De crudæ spumæ argenti usu. Cap. XI

Incocta quidem per se, ut annotauimus, attritus emendat. Ex aceto autem seu uino trita sicca taq̄, ulceribus medetur, quæ ob humiditatē uix cicatricem recipiunt. Quod si rosionis expertem esse cupis, elota utitor.

Quomodo lauare oporteat argenti spumam, et reliqua metalla. Cap. XII

Facile eluatur, ut quæ statim propter innatam grauitatem liquoribus in quibus leuigatur substat: unde totam rosionem in aqua lota exiit: acuti uerò sensus corpora, parum ad eò mordacem percipiunt, si ex aceto uel uino eluatur. Porro conuenit, diligenter tota die tritam, cum liquore per noctem relinquere: postero die mane illum auferre, alium mox superfundere, postea rursus terere similiter, iterumq̄ sequenti aurora liquorem emittere. Quod faciendum est, donec simul cum humore argenti spumæ uel tenuissima quædam lanugo (Achne hanc Græci uocant) appareat, cumque nihil amplius innatat, nihil etiam magis effundendum est. Attamen

A conterere diebus pluribus, etsi nihil ei insistat, idq̄ sole seruētū, satius est: ita enim accidit, ut medicamentum exiccat ualentius. Porro nouerunt omnes id æstate non solum in argenti spuma, uerum in alijs etiam quæ hoc modo præparantur, fieri comodius. Siquidem cadmia, æris squama, æs ustum: ad hæc item quod uocatur diphryges, cerussa, misy, sori, stymmi, & omnes lapides præterea calx perinde ut argenti spuma ex liquoire aliquo prædicto eluuntur, leuiganturq̄. Interdū et marina præparationem ipsorū molior, de quibus in sermone processu rursus agitabitur. Nunc enim propositum mihi est emplastra perferre, quæ Græci iuniores medici cum rho Græca litera in ultima syllaba & scribunt & enunciant: quemadmodum in Centrio, & Melotride facere omnes consueuerunt. Siquidem in his prima nominum positio uidetur sine rho facta fuisse, à uerbo quidem centon, quod est pungere, Centrio nominato, ultima syllaba rho non habente: Melotride uerò composita ex mela & ore, id est specillo, & aure. At quom hoc tempore propè omnes eacum rho efferant, non peccaueris si simili modo illis pronuncies, præsertim in Centrio. Quippe ostendimus in opere quod contra illos qui solocissantes corripunt, prodidimus, & ipsos Atticos uiros ualècentem usum & consuetudinem sequutos fuisse. Nam alij quoque ante me indicarunt, Atticorum linguam permultum à proprietate sua decidisse: ac omnes quorum eloquentia laus & gloria maxima apud Græcos extat, suæ quæque tempèstatis morè imitatos fuisse. Et nos itaq̄ cum omnes inueniamus iam medicamentarios libros emplastri nomen cum rho scriptū habere, usum præualentem sequemur.

De medicamentis quæ ex molybdæna conficiuntur. Cap. XIII

Relatum à me est superius quoque molybdænam & argenti spumam in eundem fere usum adhiberi. Omnia enim quæ ex argenti spuma componuntur, etiam ex molybdæna fieri possunt: sed facultate inuicem differunt tantum, ut molybdæna substantiæ crassioris frigidiorisq̄ sit: argenti spuma tenuioris, et inter calidam ac frigidam media. Cæterum colores medicamentorum quæ inde præparantur, molybdæna nonnihil euariat, quatenus sulciores ipsos efficit. Quare & alborum emplastrorum, quæ non modo cerussam, sed argenti spumam quoque habent, nullum ex molybdæna constat. Quippe huius mixtura color albus cinereus redditur. potestas autem in albo emplastro, quod ex hydrelæo cõponitur, melior etiã euadit, præcipue in teneris corporibus, tantum abest ut pereat. Cum discutere quid uolumus, argenti spuma q̄ molybdæna prior est. Pari modo & in reliquis medicaminibus cūctis, quæ ex argenti spuma cõpositionis titulum sortita sunt, cum molybdænam adijcimus, color & uirtus tantū immutatur medicaminis, quantum paulo ante indicauimus.

De emplastris albis quæ ex argenti spuma & cerussa fiunt. Cap. XVIII.

Vel coloris causa medici cerussam argenti spumæ ad emplastra alba cõficienda miscent: uelut quando adstringendi, ac refrigerandi uim medica mento cõciliant. Videntes autem & huiusmodi nigrescere, cū largius cõctum fuerit: præsertim li gnis, & ijs quoq; fortasse fumidis, nec in aere pu ro, mox ab igne tollere cogunt: ob quod ipsum nec aqua copiosam, nec oleū miscere. Merito igitur resina ei adiungere excogitarūt, quò sequax ac sibi cõtinuum fiat, uiscosum quid allumēs, ma xime cū liquida resina immittit. at ex tali mistu ra deterius efficitur pharmaci: cū mordax quidã resina representet: quod siccer, nihil adeo ge nerosum, cuius usum maxime ulceribus esse ne cessari didicistis. Quædã itaq; uel insigniter de rodat resina: de quibus uniuersis iterū sermo fu turus est. Mitissimæ uero duæ inter eas sunt, pri ma terebinthina, larix altera nuncupat. Has igitur miscere satius est, ubi id genus emplastrum confice re cogitas. At multo leniora tactu omnia sũt, tum quæ resina constant, si ceræ quid adiectū sit: tum quæ ex cera, si resina nonnihil admistū habeant. Quamobrem cera quoq; resina immittenda est. ut autem color emplastrum albus seruet, albã cerã esse cõgruit. Est sanè alba, quæ suapte natura pro uenit, Pontica, sic em nominari iã consueuit, licet aliunde ueniat: q; plurima in Ponto alba nasca tur: alijs in regionib; paucissima: At cãdida quæ Tyrhenica nominata est, nõ sponte nascit, qua re nullam euidẽtem habet acrimoniam. Quæ ue ro suo instinctu proueniūt, nonnullæ acres sunt, quas prius eluere oportet in hunc modū. Liquã tur primum ad ignẽ, deinde in aqua fontis pura demerguntur, ubi permouentur, expurgatũq;. Similitudine & pix & resina, et quod phlegma di citur, lauandum est: de quibus iterum exactius commentabimur. In præsentia, quoniam albi em plastrum cõpositionem tradimus, reliquum eorum quæ præcepta sunt deinceps percẽsebimus. Post eaq; tam ergo cerussa spumẽq; argenti cõctis pri us, usq; dum medicamentum adamussim non inficiat, cera simul cum resina fuerit adiecta, cãdida iam emplastrum si placet, habebitis: interim aquã iniiciẽtes, interim oleum duntaxat, idq; nunc re cens, nũc uetus. Prius enim iam audiuistis, quam uirtutem aqua, & oleum uetus habeat. Nouistis item quod Omphacinum oleum, & id quod colitur in Iberia, quæ nunc Hispania dicitur, astrin gens quippiam pharmaco adijcit. Histricum nõ modo exiguam astrictionem, sed amaritudinem quoq; refert. Proinde differret tantum ex astrin gentibus confecturæ ab ijs quæ dulci oleo con stant, quanto initio ulceris & fini potiora sunt om nia que nõnihil astringens cõtinent: in medijs, dulcia. Nam in principio medicamenta repellen tia profunt ulceribus, ne phlegmone corripici inci piant. Inde quæ magis relaxent, si non phlegmo ne adsit, trãspiratus gratia: quòd si affuerit, etiam

A ob illam, ut citius dissoluatur. Enim uero clarū est de parua phlegmone uerba fieri, si liquidè exigua ulcera in quib; albis hisce emplastris utimur, magna comitari phlegmone non potest, si error nul lus accesserit. Caterū & ulceribus quæ iã ad cica tricem ueniunt, astringendi qualitatem utilis esse cui obscurum est: Tempus igitur iã postulat, me dicaminū quæ emplastrum album utilissimum constituunt, symmetriam exponere.

Pondus emplastrum. Cap. xv

Aequa sit portio utriusq; metallici, cerussa & argenti spumæ: & hæc si uideat, esto singulorum podo libra. olei uero mensura, amborū simul pò dus absoluat, uel ut Romani dicunt, sint pòdo li brae duæ. ceræ pondo selibra. terebinthina, silius dimidium, hoc est pondo uncias tres. Quod si & thus admisceas, primū dolori mitigando magis etit, tum parua ulcera quæ phlegmone infestat, uocis cõcogit: sed ad cicatricem ducendam e rit imbecillius. Nam carnem super crescentẽ pro mouet, quoniam thus carnem generat, ut in ter tio quoq; libro De morbis curandis legistis. Sati us itaq; est iniicere et aluminis paululum, tum ad cicatricem ducendam, tum alterius causa, quan do quidẽ laxantia medicamenta plethoricis & uir tioio succo obnoxijs corporib; adhibita, affectis partibus fixum concitant. Ex his autẽ omnibus compositum medicamen, tumores præter natu rã in molli corpore, qui nec magni adeo, nec do lorifici sunt discutere poterit, præsertim cū thus abunde assumpserit. Erit itaq; in prædictis copio sum thus, si æquale ipsi terebinthina pondus accipiat: sin eius dimidium, minorẽ digerendi uim medicamentum habebit: magis autẽ cicatrici du cendæ erit idoneum, quam quòd duplo copiosi us id receperit. Iam si plenius adhuc digerere eu piatis, etiã piperis albi panxillũ adijctore, quod ulcerum cicatrici obducendæ nihil obesse potest. Sit igitur aluminis pondus unum, piperis uerò dimidium. Rationi enim consentaneū est, ut hu ius 3. iij. aluminis autẽ 3. vi. iniiciantur. Quoniã uero & aliã præstat alumẽ quod scissile nomina tur, & colore candidū est, id immittere expedit.

Album emplastrum ex pipere, ut Attalus He rasq; composuerunt. Cap. xvi

D Iuuat senum ulcera, & eort, qui mollẽ habent cuticulã: deniq; omne ulcus curat quod & humi dũs est, & nõ facile cicatriẽ admittit: ad hæc ab rasa, quæ aposyrmata Græci uocãt, ut cutis suspẽ si sit interim nigrescens in cubito, tibia, & genu, quib; neq; caro, sed mēbrana sola os ambiẽs sub iecta est. Hisce igitur, ut omnia ordine recenseam, medicamentum cõpositio constat. Argenti spumẽ, cerussa, utriusq; pondo libra. olei duarũ librarũ mensura. nũcupatur enim à Rõmanis æquiuoce ponderalis, ut ita dicã, libra solidorum corporũ, & mensuralis libra liquidorũ, quæ copiosissima in tota urbe ex materia cornea cõstat. Præter hæc ceræ pondo selibra. terebinthina resina pondo unciarum trium. thus uel dimidium ipsius resinẽ,

uel æquali pondere, aluminis pondo denarium sex, piperis pondo denarium trium. Coctio manifesta est. Initio quidem metallica in sole coquitur, dum plane non inficiat, uel etiam paulo durius fiat: immittuntur autem tunc cera & resina.

Dein cum omnia in unum coierint, thus primū, mox alumen & piper addentur. Inijcere autem conuenit cerussam, quam uocant rhodiacam, si emplastrum cādīdum eximie fieri cupias. Quinetiam in ciuitate Dicæarchia olim, nunc Puteoli uocata, nonnulli qui cerussam præparant, similem rhodiacæ albam facere consueuerunt. Porro quod in sole conficiendum sit emplastrum, & aqua admiscenda, ut albius simul & magis refrigerans fiat, antea discussum est. At si maus ad cicatricem ducendam commodius ipsum reddere, ab aqua in totum abstineto: olei autem ueteris pondo uncias duas, ac dimidiā, immo etiam tres immittito. Hoc medicamentum non ex eorum numero est, quæ à me primo autore composita sunt, sed iam annis multis ante à rege nostro Pergamenorum Attalo, uiro omnigenorum medicaminum studioso. Constat ratione prædicta. Et admiraremur sanè, si quis aliud præstantius ipso, eiusdem speciei existens, componere possit. Meminit eiusdem Heras quoque in Medicamentorum libro, quem nonnulli Nartheca, id est ferulam inscribunt, alij Tonon dyaimeon, id est robur compositionum, censens oleum uetus attribuendum, eiq; parem aquæ mensuram, uel dimidiā esse miscendam. Cæterum alia quæ ad symmetriam spectant, ita habent ut à me scripta sunt, nisi quod ille heminas, nō libras tum aquæ, tum olei posuerit: non indicans, quot unciarum hemina siue ponderis, siue mensuræ constituat. Etenim ponderales unciæ grauitatem corporum, mensurales molem decernunt. Cum igitur pharmacum hoc senum ulcera & tenerorum curare dicit, uerus est: cum uero omne ulcus sanare scribit, amplius quam par est ei condonat & tribuit. Si quidem humidiora, eoq; minus ad cicatricem uenientia curat, cacoethes nullum, sicut nec ullum uulnus cruentum. Ille autem & hæc omnia promittit: attamen derasis ipsum meredi scribens non fallus est. Subinde enim tam derasum os, ut cutis inde cum subiecta quadam carne dependeret medicamento imposto cum ipsa coaluisse uidi, & quod hoc maius est, interdum iam nigricante. Rursus aliud quam hoc etiam admirabilis, in cubiti gibbero, tibia, & genu, quibus nulla caro, sed os cōuestiens membrana, uel latus tendo solus subiectus est. Quare ad abraſa optimum hoc medicamentum habueritis: ad sinus & abscellus, nec omnium optimum, nec bonitate optimum secundum. Verum ad medicos hos affectus in teneris, mulieribus, pueris & senibus commendatur. Quare & hic plus quam oportebat Heras medicamento detulit: multo autem magis cum laudaret ipsum, scribens ad morsus uniuersos esse remedio. Cur enim sermo

ni appositum esse uult uniuersos? utrum si etiam ferarum morsus fuerit, an hominum uniuersorum tantum dicit? Atqui falsum est utrunque in feris quidem clarum est, que enim ab efficacibus pharmacis uix curantur, hæc nemo ab illo sanari posse dixerit. Quod de hominibus dicat, & sic oratio incerta indistinctaq; est, adeo ut auditores magis offendat quam iuuet. Itaque perſuaſit aliquis cuidam medico, ut emplastrum hoc adoleſcenti in pancratio digitum indicem morſo imponeret, qui inde tam male habuit, ut in periculo esset, ne pars tota morſa computresceret oborata iam putredine. Vix autem diuturna curatione glutinatus est. At cum non in neruum, sed carnē læsionem acceperit, nihil mirum est huiusmodi medicamēto saluum euasisse. Etenim hominum morsus alijs ulceribus admodum similes sunt, nisi qui morsum intulerit, uitiosis humoribus abundet, aut diutius à cibo abstinerit, aut ira correptus sit, ut uniuersum corpus, etiam dentes bile madeant. neq; in his tamen eiusmodi quicquam mentione dignum medicamentum facere uidebitur: atqui ei qui subito fuerit usus satis erit, si nihil incommodi acceperit prius, quam pharmacum aliquod talibus curandis peculiariter dedicatum morſæ particulæ imposuerit, de quibus mox disputabitur. Nunc uero tantum dixisse sufficiet, de ijs quos siue homo qualem diximus, siue siue, siue canis, siue id genus animantium aliud momorderit.

Attalici secundum Andromachum albi narratio & compositio, quod minus ledit à rabiosis morsos, & neruos uulneratos. Cap. XVII

Alba quæ oleo recenti & aqua citra piperis at que thuris misturam conficiuntur, commorſas partes uehementer offendunt: licet animantis salua quod momorderit, uel pauillū adeo uirus contineat. At minus illis omnibus Attalica lædendi naturam obtinet, quod terebinthina, oleum uetus, thus, & piper adiecta sint. Pari etiam modo in neruorum uulneribus reliqua alba magis nocent, sed multo minor offensa est ex hoc, quod quidem oleum uetus habet, aquam non item. Insuper hoc magis eueniet, si tres uncias thuris integras, & non eius dimidiū recipiat. Dicitum liquidem mihi est & antea, quod si & hoc pacto præparemus, in huiusmodi albis alumen pharmaco male cōgruere. Nam opus est hic nō adstringentibus, sed abunde extrahentibus quæ in alto neruos punctos affligunt, & uenenatam animalium saluā. Heras hoc emplastrum ex rhodino, uel myrteo, uel myrrhino dilutum, meredi & ambustis igne tradit: & si longe inferius sit etiam his pharmacis quæ ambusta cōmode sanant, de quibus ipsi quoque rursus sermone instituemus. Præstantiora enim in his sunt alia candida, quæ neq; thus, neq; resinam habet. Quin & hæc non parum ab ijs superantur, quæ ambustis igne proprie auxiliantur, quemadmodum à me compositum eadem sanare dixi, si acetum adiungas.

Illud liquidem nullo non tempore commodum
 est. Quod autem ex pipere album constat, excori-
 atis adustionibus cum ad cicatricem peruenerint,
 utile est: ante per se nihil conducit: dilutum
 uero ex oleo myrteo prodest, non tamen æquali
 cum his medicamentis uirtute quæ ad ambusta
 igne proprie faciunt. Heras morbis etiam ipsum
 conuenire scribit. Sed hic quoque distinctione utamur
 oportet: liquidem in duris & coctis difficilibus
 imbecillius est medicamentum: in mediocribus,
 maxime in senibus, pueris, mulieribus, & ut
 breuiter dicam, molli carne præditis abunde sufficit.
 Insuper uariis aptum est, quemadmodum &
 hoc uere prodidit Heras. At de pustulis quæ Exanthemata
 Græcis dicuntur, indistincte pronuntiauit. Etenim ex
 harum numero mediocriter subduras perferant. quæ uero plus
 caloris, aut phlegmonodes quippiam referunt, irritat, præsertim
 initio. Post commemorata, deinceps in hæc uerba
 Heras disseruit. Fecit etiã ad duritiam trimestrẽ,
 quæ ex partu profecta erat, ac perspiratu discul-
 sit, non impossibilia dicens. At conueniebat ipsum
 præscripsisse, cuiusnam durities esset, totius
 ne uulua, an ceruicis solius, uel orificij, uel cornu
 um, uel extranei cuiusdam corporis ei incumben-
 tis. Iam uero id ipsum emplastrum impensius quæ
 natura comparatum sit laudat aduersus fistulas
 cum alias omnes, tum maxime quæ in ano oriuntur,
 sic enim appellauit ipse, cum illud curare adfirmaret.
 Simili modo ad podagram, carbunculos, epinyctidas,
 condylomata, lepras, uirilignos, fugillata
 propositum emplastrum Heras extollit. Sinitque
 tanquam meliorum penuria eo usus quispiam
 mediocre præsidium attulerit, uere prædicat. In
 autem ut medicamen ad hæc optimum ad ducit,
 manifesti mendacij arguitur, cum multa alia
 præstantiora inueniantur. Cæterum post ipsius
 laudes his uerbis præcipit. Vtere hoc maxime,
 cum ulcus ab acris pharmacis, & his quæ cruentis
 imponuntur uulneribus (Græci uocant Enema)
 soluitur & phlegmonem recipit: tum in abscessibus
 qui circa genu fiunt. Hic quoque fidei illius
 erat apponere pro abscessuum quidem ratione,
 tenera carne præditos, pueros, mulieres, & senes
 in ulceribus autem, species eorum adscribere,
 uti nos faciemus in sermone De malignis ulceribus.
 nam istud de quo nunc loquimur emplastrum
 nulli tam caecoethi seu maligno cicatricem obducit.
 Verum distinguenda sunt ea quæ cicatricem
 ægre ducunt à caecoethibus. neque enim omnia
 caecoethi difficulter cicatricem admittunt. At dicitur
 sermone procedenti De ipsorum differentia, &
 medicaminum, quæ utriusque sanandis dicata
 sunt. Quin ex solis metallicis album emplastrum
 præparare licet, ut paulo ante in sola argenti spuma
 cocta admonuimus. Si enim spuma argenti
 cerussæ committatur: deinde olei, & aquæ utriusque
 duplum miscetur, & coctione, ut nuper est
 præceptum, carbonibus antea perustis in aere lu-
 cido peragas, tum glutinās, ac tenax, tum album

colore medicamentum erit, maiore autem refrigerandi
 uirtute præditum quam quod est ex sola argenti
 spuma coëctum. Quemadmodum enim molybdæna
 frigidioris crassiorisque naturæ est, etsi
 argentæ spumæ eam admisceas, sic etiam cerussa,
 uel magis adhuc quam molybdæna. Quod si
 uetus oleum indatur, non parum lentoris & hoc
 medicamen habiturum est, ne uidelicet à corpore
 facile decidat, cuiuscumque fuerit impositum. Atque
 si emplastrum candidum fieri postulatis, oleum
 quam fieri potest purissimum simul & lucidissimum
 iniicitote. multa enim eius generis non sunt:
 mitigans uero ac dolore sedans erit pharmacum,
 si et adipis aliquid inieceris ueluti ego facere
 cõsueui. Adeps uero anserinus sit, uel huius
 inopia gallinaceus. si neque hunc habemus, sullum
 iniiciamus: non ignari quidem magnam esse anserini
 ad reliquos eminentiam: utentes autem peioribus
 etiam, si quando optimi copia non conceditur:
 nam & cum cinnamomum desideratur, ad casiam
 optimam descendimus. Verum in prædicta symmetria
 adipis pondus dimidio minus quam utriusque
 metallici miscere sufficit: ut argenti spumæ
 & cerussæ singulorum pars una ad sit, olei dupla,
 & aquæ dupla, uel etiam paulo amplior, adipis
 pars dimidia. Cæterum quomodo dicam his
 quæ lance metiuntur, ea quæ alia mensurantur,
 dupla dimidia & æqualia, ante paulum ostensum
 est, dum Romanæ libræ ponderalis cum mensurali
 cognominationem quam uocant homonymiam
 seu æquiuationem interpretaretur. Pharmacum
 hoc uariis modis præparauit: siquidem quatuor
 pari portione misisti, dimidiam adipis, interim
 quoque liquidorum utriusque partem unam et
 dimidiam admiximus. Porro fieri ueluti exemplo
 symmetria talis, argenti spumæ pondo libra, cerussæ
 pondo libra, olei, aquæ utriusque pondo libra una
 & dimidia, postremo adipis pondo selibra: est
 cum & pondo trientem adiecerim, sicut & aquæ
 pondo libram unam. Quod autem idiotæ frequenter
 dicere solent, & medici ipsis similes, obseruante
 ne interdum dicatis, nempè medicamentum quodlibet
 generosius fieri, si adiectum hoc fuerit, quo deumque
 nominauerint. Nonnulli ignorare se fatentur,
 rogantque nos, qualis nam compositio præparatioque
 sit optima: ignorantem aliam in alio affectu esse
 commodiorem. simpliciter uero & indefinite,
 ne unam quidem optimam. Huius itaque rei gratia
 ego simplicium pharmacorum uirtutes accurate
 pernoscere operæpretium esse uobis puto: nam
 compositio probe uti non possit illorum ignari.
 Nimirum igitur in proposito hic albo emplastro
 recens adeps admixtus, medicamentum efficit
 quod dolore magis adeo leuat, ut si & inflammatione
 labore ulcus inuenit ipsum, at cicatrice obducenda
 minus reddet accommodatum. Quod citra
 adipem conficitur, facilius quidem cicatricem inducit,
 uerum non ex æquo sedat dolorem. Dicitur quoque
 est prius, quod aqua admixta euidentius refrigeret,
 sed oleo ueteri magis discutiat. Itaque qui eam

facultatem adsecutus est, ut quo potissimum ulcus indigeat, scire possit, is optime & ipse componit medicamenta, & iam compositis utetur. Atque uidisti me subinde medicorum qui me in consilium aduocarunt pharmacis multa curasse, à quibus illi sanitatis spem abiecerat. Optimum igitur medicamentum dictum est non sermone simplicis, sed inter ea quæ hoc aliquid facere pollicentur: quæ admodum ego Phœnicinum optimum esse retuli aduersus rheumatica, si eo iuxta prædictas distinctiones utamur.

De alijs emplastris albis. 18

Alba igitur ante commemorata, qua dixi ratione iam olim confecta sunt: post quæ alia diuersa medicæ posteri excogitarunt, quædam adimentes, ad dentes, & immutantes, de quibus & ipsis præstat dicere, ut in uaria medicamentorum compositione uos exerceamini. Scripsit itaque Andromachus in libro cui titulum fecit, Virtutes ad exteriora, his se quodam modo uerbis, Albū quo uitor. Argenti spumæ pondo mina. cerussæ tantundem. ceræ pars quarta. resinæ pars quarta. olei hemina tres. aquæ hemina ij. hætenus Andromachus. Nec quibus conueniat adscripsit, nec coctionis eius mentionem fecit. Nonnulli uiginti uncias minam continere tradunt: quidam sedecim: atque medicamentum utroque modo preparari possit, non tam recte mihi parem modum resinæ & ceræ iniicere uidentur: nam Attalici compositio melior est, quæ cerâ resinæ duplo copiosior accipit. Cõstat autem si resinæ & ceræ æqualis portio adiecta sit, emplastrum fore glutinantius, non tamen ex æquo suaue gratumque ulceribus, sed acrimoniâ habiturum. Quinetiam eò quod indicare noluit, qualis immitti debeat resina, parum recte fecit. Nos autem haud ignari esse meliorem per omnia terebinthinam tum colophoniam, tum ea quæ phrycæ nominatur, illam iniicimus. At si & laricem habeamus, quid uti prohibet, cum sibi inuicem prope modum sint adsimiles: Olei heminas tres, articas puto ipsum scribere, aut certe scripsisset libras. At qui miretur quispiam, quomodo Roma degens pro libris heminas nominauerit: eius nẽpe regionis illa sunt nomina, libra, sextarius, uncia. Ex multis pharmacis quondam conscriptis, priusquam Romanorum res eò potentie accreuissent, coniecti quæ illi uocarent hemina, esse æqualem uncias nouem libræ Romanæ hodiernæ. Nunquid igitur & Andromachus tres heminas censet adijciendas, tantquam singulæ uncias nouem ualeant: eademque ratione & aquæ duas? Vos ergo si simplicis cuiusque potestatem cognita ante habeatis, quomodo cum que præparato uti potueritis ad ea quæ compositio nis modus promittit, alijs permittentes inquirere, qualisnam confectio sit optima. Omnes enim optime sunt & non optime: quemadmodum nobis prius ostensum est. Postea Andromachus aliud subiungit huiusmodi.

Album aliud. 19

Argentis spumæ pondo denarium cētum sexa-

ginta. cerussæ pondo denarium ducentorum. ceræ pondo denarium quinquaginta. terebinthinæ pondo denarium uiginti quatuor. olei hemina dimidiū. aquæ cyathos sex. Hoc igitur emplastrum priori plus cerussæ, quam argenti spumæ habens, candidius euadet, magisque refrigerans quod ad hoc attinet, sed facile decidit, minusque adherescit, licet sedecim uncias, & duas uncias partes hemina habere statuamus, quemadmodum nonnulli aiunt. Iuat sanè ipsum ad hæc terebinthinæ misura, ne rigidum fiat pharmacum, quoniam omnino alipes, ut Græci dicunt, id est pinguis expers & aridum esset, pauco oleo, & aqua addita, nec in hoc uero adscripsit Andromachus, uel coctionem, uel quid promittat.

Aliud album. 20

Aliud post hoc ponit tertium, quod eadem alia omnia, cum Attalico ex pipere albo confecto continet. Adiecta autem sunt ei hæc duo, orehis herbe pondo denarium octo. struthij pondo uncia duæ. aquam uero nequaquam huic pharmaco adiungit, sed thuris pondo denarium uiginti quinque iniicit, das censet, non adscribens ut Heras consueuit. Nonnulli autem uigintis sex immittunt: olei tamẽ & hic ille heminas duas imponit, eandem nobis obscuritatem relinquens, cuius supra meminimus. Accusauerit quis eum uehementer, quod pharmacorum pollicita seu titulum non præfixerit: quippe secundum cum primo & tertio eandem potentiam non obtinet: Herasque sanè laudandus est, qui medicamentorum uirtutes adscripserit, utendique modos, quos Andromachus in emplastris albis profusus omisit, raro ad quid ualeat apponens, quin nec quo pacto coquendum medicamentum sit, indicauit. Attamen nemo forsitan eum accusare possit, quod iam exercitatis in re medica, non idiotis scribat. Verum quod titulum præterijt, uel uniuersales potestas, nõ mediocre peccatum est. Quid enim dicit, qui defensionẽ eius suscepserit? forsitan per se simplicium medicaminum uirtutum hæc tradiderit. At qui illorum nullus Andromachum desiderat, cum & ipse simili modo possit componere.

Candidum Heræ. 21

Rursus ad Heræ reuertamur, aliud candidum emplastrum post Attalici huiusmodi hisce uerbis scribentem: candidum aduersus rabiosorum morsus, facit exacte etiam ad aquam expauescetes ex rabidi canis morsus, præseruat enim statim à periculo uulneris impositum: item deuictis ualde catapotiū nucis auellanæ magnitudine ex eo dandum est, idque diebus quadraginta. Mutat tamen colorem in splensis, reddiditque nigrum, ualet & contra morsus hominum canumque, abrafa, & ulcera quæ cicatricem difficulter admittunt, tollit etiã fugillata, & crueta uulnere coglutinat, aufert phymata & rhagadas. Est & pessus emolliens, oportet tamen post die solueri, & nigredinem ulceribus obortam spongia detergere. Idque tantisper faciendum est, donec nigricies amplius nulla appareat. Iam quoque idẽ cicatricẽ ducit, & ad omnia bonum est. Hæc præfatus Heras

dein symmetriam emplastrī his uerbis enarrauit.

Album.

Cerae albae ponticae pōdo lib. ij. argenti spumae chryslidis pondo librā. cerussae tantundem. myrrhae pondo uncias ij. medullae ceruinae tantundem. thuris atomi, id est infestī pōdo unciam. olei ueteris sextariū. haec sanē symmetria eorū est, quae emplastrum constituunt. coquendi uero modum deinceps ita scripsit. Argenti spuma ex oleo coquitur. ubi sordium crassitudinem habere uidetur, cera, mox cerussa aspergitur, mouetur q̄. Vnita iam nec polluentia ab igne tolluntur, & medulla iniicitur. postquam refrixerit medicamentū, myrrha & thus miscet̄, deinde emollitum, subactūq; manibus usui est. In hoc igitur Heras commēdandus est, quinō reliquerit nobis quomodo cūq; lubet emplastrum coquendum, sed ipse apposerit. Proclue enim erat cerussam cum argenti spuma, ut in albis alijs statim ab initio coquere, & nos id plerū que facitare cōsueuimus, immo & ille ipse in alijs cōscripsit. Verū in hoc ipsam secūdō iniicere praecipit, nō apponēs causam cur id agere praestiterit, est ostendat nō unum coquendi modum in omnibus esse similiter utilē, sed in quibusdam & duos & tres efficere licere: nō modo colorem, uerum & facultatē immutantes medicaminū: quem admodum in hoc nunc proposito, cerussam cū argenti spuma coquere noluit, sciens ipsam, & exactum cādorem ex cōtione perdere, & adstrictiōnem quam habet cum refrigerandi uirtute deponere. Forſan igitur inquirat aliquis, ecquid cū emplaſtri autor primus, quicunq; fuerit, digerens id esse uellet, conatus tamen est cerussam crudam in eo perferuare? Mihi sanē uidetur huius gratia ad talem uenisse conſecturam, ut medicamentum repellentē quoq; uirtutis quippiam habeat, etenim eiusmodi nullam habētia, plethoricis corporibus nequaquam tuta sunt. Ut ergo conueniat & his, cerussam crudam mistam esse ratio postulat. Ceterum neminem latet magna de se propositum medicamen promittere, inde q̄ myrrhā & ceruinam medullam assumpserit, sicut & alia quoq; eadem cum cōmunib. his emplaſtris cōtinet. Didicimus autem myrrham ualide siccas, tenuissimāq; admodum partem esse medicamentum: medullam rursus nullo inter ea quae molliētia uocantur, inferiorē. De hac facultate, quemadmodum & de alijs omnibus secūdis in libro quinto Simplicij pharmacorum dictum est. Videtur tamen non ijs tantum medicamentū compositor, sed etiam aed̄ cerā ponticae, quae uim habet medicamentosam fidere: atq; ideo plurimū eius immittere. Ceterum sextarij Romani Heram meminisse puto: nam apud Athenienses neque mensura, neque nomen hoc erat. Nūc ex quo Romani imperare orbī cōeperunt, nomen sextarij apud omnes, quae graeca lingua utuntur, nationes existit: ipsa uero mensura Romanae aequalis nō est. Quippe alij aliam sextarij mensuram usurpant: apud Romanos sextarius libram unam semissem, & sextam illius partem pendet: ut omnes simul iunctae unciae sint uiginti,

quas plurimum cornibus metiuntur, incisis extrinsecus lineis quibusdam orbicularibus. Nōnulli falsō Romanum sextarium opinati sunt octodecim mensurales uncias capere. Videſ igitur & Heras cum heminam scribit, sextarij dimidium indicare. num uero nouem uncias ex librāli cornu, an decem innuat, etiamnum ignoratur. Itē ad rabiosos morsus aptum sit pharmacum siue bibitum, siue extrinsecus impositum, ratione cognoscere nemini licet. Indicauimus enim tota substantiae proprietate eiusmodi medicamenta efficaciam habere, & ob id experientia iudicari. At experiri nunquam ausus sum hoc pharmacum, quam uim in rabidorum morsibus ostenderet: q̄ certo sanans haberem medicamentum ex canceris confectum. Cum autē hoc non adest, alia quoq; nōnulla, quae nunquam prospero successu nos frustrantur. Quare in tam periculoso affectu certis medicaminibus relictis curiosae experientiae causa, mors salutem proderet graue, & iniquū mihi uidebatur. Iam quidem de rabiosis morsibus haec quoq; dicta sufficiunt. Reliqua uero quae Heras de hoc emplaſtro retulit, ut in Attalico, partim sanē uera praedicari, partim impendio magis ab eo extolli dixerim. Optimū em̄ est pharmacū, ut inter emplaſtra, quae fūgillatis dictis admoventur: inter ea uero quae cruēta uulnera glutināt, nō in primis & optimis est. Summatim permultos inuenio non modo huius tempestatis medicos, sed etiam ueteres qui libros posteritati reliquerunt, hoc genus emplaſtra supra ueri fidem extulisset de quibus sequenti uolumine agetur. In praesentiarum ad institutum reuerſi, iterum Herae dicta examinemus. ait enim phymatis medicamentum illud mederi, nulla distinctione eorum apposita, quae ego de Phenicione protuli. Quaedam liquidem tam calida sunt phymata, ut cum uehementia quadam exiliāt, quaedam frigida siccaq; sunt: permulta alia inter haec cōsistunt: alia quidem exacte media illorum quae diximus: alia à medio in utranque partem paulum inclināt: aliqua plus idem faciunt: nonnulla summis uiscina, uel à medijs quoddammodo & summis pari spatio absunt. Quibus uniuersis emplaſtrum hoc conuenire non potest, nisi humidis quibusdā id uelit liqueſcere; ut fiat usus multiplicis, quē explicasse ipsum, sicut in alijs factitauit, oportebat. Proinde par esse puto, ut hunc laudemus ob ea quae tradidit, Andromachū accusemus. Ceterū de eo quod emplaſtrū istud, hominum canumq; morsibus conferat, easdē putam rationes audire, quas & de Atralico pronūciaui. Similiter de alijs, quae pharmacū cōmendant, ut illud, ita hoc quoq; bonū esse medicamen dicens: sed multum ab ijs, quae optime ad unum quoq; illorum faciūt inferius esse, ut quis eo cōfiderenter utatur, ubi optima desint omnia. Hoc autē non paruum est in medicamentis, quemadmodum nec in uictus ratione, & omnibus quae circa artē uersantur. ego cōtempſi quidem id primum, ut nec dignum esse iudicāre Hippocrate, qui adhortatur nos ita omnia artis opera perficere, ut it

uent, uel non offendant: postea uero cognoui magnam uim habere, cum scilicet uiderem nonnullos medicos in pharmacis se primū recte gessisse, ut in admirationē sui alios perducerēt, eisdē postea in alijs prospero euentu frustratos, ut risu essent. Ideoq; semper conatus sum eiusmodi uti presidijs, quæ an profutura essent, nonnunquam sanē dubi tabam, quod autem nihil afferrent incōmodi, certo sciebam. Quæ igitur in Attalico emplastro atq; hoc laudauit Heras, non quidem ut dixi, magna sunt: sed ubi desiderantur, quæ id magnifice efficiant, nemo his utens manifestam læsionem inferret, etsi nihil iuuenit. Atqui si quis hoc pharmaco uti uolet in phymatis, ab illis quæ in Phœnicino docui, ipse intelliget, aliās aliter ipsum liquefaciens. Tractabit autē uberius deinceps & phymatum tota curatio, unde spero uos methodum exactam perfectamq; medicaminū, quæ illos iuuare possunt, habituros. Vocet autē uobis emplastrū hoc, albū ad rabiosos morsus, sicut illud quod ex albo constat pipere, Attalicum.

22 Subiūgit mox & aliud emplastrum Heras in hanc sententiam. Album ariabarzanion, quo Xenocrates abscellum iam in alterato circa tarsum (ea pars est in pede, quæ carpo seu brachiali proportionē respōdet) discussit. Deinde eorum quæ ipsi immittuntur symmetriam, & postea coquendi modum præfatus, ad calcem hæc uerba apponit. Maxime facit ad cacoethe, pascenia, cōtumacia. uniuersaliter ad omne ulcus. Porro cur eorum, quibus constat pharmacum, symmetriæ tertiam partem recitauerit, compertum non habeo, cum alij integram hoc modo tradiderint. Argenti spumæ denariū pondo ducentorum, ceræ denariū pōdo quinquaginta. olei ueteris heminas iij. cerussæ denariū pondo octoginta. terebinthinae denariū pondo triginta duum. cineris buccinorū denariū pōdo decē. thuris denariū pōdo decē & nouē. aque cyath. xij. Hæc omnia à me prolata pharmaca Heras ad tertiam partē immittit. Argenti spumæ denariū pōdo sexaginta sex. obolos quatuor. cerę denariū pōdo sedecim, obolos quatuor. olei ueteris heminā. cerussæ denariū pōdo uiginti sex, obolos quatuor. terebinthine resinæ denariū pondo decem, obolos quatuor. cineris buccinorum denariū pondo tria, obolos duos. thuris denariū pondo sex, obolos duos. aque cyathos quatuor. postea coctionem ita subdit. Argenti spumam, & cerussam cum aqua & oleo terito: deinde de recenti olla igne non acro coquito, ferrea spatula sedulo mouens, ne adurantur. Vbi semicocta fuerint, ceram immittito, hac liquefacta, resinam & thus, ac tādium coquito, dum aliquatenus non inquitur. Posteaquam bene habere propemodum uideretur, buccinos insectos reliquo tempore concoquito. Cum perfecte coierint, in mortario demittito, aqua exigua prius subiecta, & subacto utitur. Hoc medicamentum, ut sine morsu discutiat præparatū est: quod & cerussæ parum ad argenti spumæ portionē habeat, & cum hac ab initio cocta sit: ualideq; exciccet ob

A buccinorum cinerem additū. Non dissimilis quoque modō facultas est & purpuris & ostreis concremaris, notum est autem sine carnis horū animalium testas concremari. Ac Heras quidē unum de compositionibus librum conscripsit. Asclepiades cognomento Pharmacion, decē, præter Theriacos & gynecacos, feris bestijs ac fœminis destitutos: apponens & ipse cuiusq; pharmaci titulum in multis etiam coctionis, in quibusdam utendū modum. Porro Andromachus multas uires collegit, & ferē non pauciores ijs quæ in decem libris Pharmacionis Asclepiadis habentur, tribus ipsas libris cōprehendens. Primo pharmaca docet, quæ extrinsecus imponunt: altero quæ intro assumuntur, & tertio quæ oculis adhibentur. Reprehendere autē ipsum iure polysis, ut admonui, quod nec confecturas, nec usus rationē, nec uires, nec quid præmittant adiecerit.

Quæ Asclepiades alba scripserit. Cap. 23

Ad Asclepiadem igitur iam transgressus, producam in medium quæ ipse alba emplastra ad finem tertij libri Exteriorum tradidit. Nam inscribit eos primam Marcellam, secundam, tertiam, quartam, quintam, ueluti alios interiorū quinq; primū Masonem, secundum, tertium, quartum, & quintum. Verum in tertia Marcella ad calcē alba emplastra adscripsit, prioris titulum esse ait, ad ambustam igne, abrafa, cutem tenerā, quod emplastrum Acelin, id est medelam nominari dicit. Omnia uero simul quatuor, argenti spumam, cerussam, oleum, aquam pari pondere incoqui oportere commemorat. Constatq; hoc pharmacū fragile & alipes effici, hoc est pinguis expers, ut cuti sine deligatura adherere non possit. Nisi em̄ ut præfatus sum ante, metallica plenius cocta fuerint, tale emplastrum fieri necesse est. Coquunt largius, dum maiorem liquidorum mensuram in mistura continent. Huic aliud emplastrum Asclepiades subdit, eiusdē quidē tituli, sed non eiusdē cofectione, neq; em̄ æquale metallicorū pondus imminet: uerum cerussam, argenti spumæ sesquiplam. Quin & seuum utiulinum adijcit, totam symmetriam sic faciens. Cerussæ denariū pondo centum uiginti, argenti spumæ denariū pōdo octoginta, adipis utiulini denariū pōdo triginta, ceræ denariū pōdo uiginti quinq; olei heminas duas. hoc pharmacum olei parū habet, ceu ad metallicorū proportionē, si quis heminā statuat ualere uncijs nouem Romanis, quæ in cornibus consuetis libralibus descriptæ sunt. Quoniam uerō cerussa in ipso superat, eoq; magis adstringens q; superius reddebat, adipem auctor admiscuit. Sciens autem uibulum adipem calidiorē esse suillo, & uehementius digerere, cauit perfectū bouis seuum indere. Quippe in omni animalium genere iuuenilia perfectis humidiorē minusq; calidum adipē habent. Erit igitur & hæc compositio difficilior quidem, ac simplicis albi emplastrū quod ante scripsit, sed nihil utilior. Ab his tertium aliud profert cicatricē ducens, albū: ex pari cum argenti spuma pondere, ceræ quarta illorum parte, & terebinthine pur-

fus dimidio minore q̄ in cera. Oleū et aqua fere
 aqua portione metallicis mensuris utriusq̄ simul
 indita sunt. Voluit em̄ medicamenti autor ceru-
 s̄æ & argenti spumæ singulorū pondo denarium
 centum miscere. cerę denariū pondo uiginti quin-
 que. terebinthinæ denariū pondo duodecim. olei
 & aquæ cutusq̄ heminas duas. Itaq̄ Attalici me-
 mores emplastrī, quod metallicæ perinde ac istud
 continet, sicut etiā oleum simul cum aqua, ceram
 dupla portione ad eam, quæ in hoc medicamēto
 auditur, terebinthinā similiter scietis manifeste,
 quoniam discrimine medicamēta inter se uariant.
 Adiectum nanq̄ est illis & thus, alumē, ac piper.

24. Quinetiam Asclepiades Attalici illius em-
 plastrī commeminat, non uocās id Attalicum, im-
 mo nec piper admiscens. Alia uero omnia pariter
 ita scripsit ad uerbū.

*Album quod ad Mnaſeum refertur. Facit
 & ad diuina ac difficilia.*

Argenti spumæ, ceruſsæ, cuiusq̄ denarium pon-
 do centum. cerę denarium pondo quinquaginta.
 terebinthinæ, thuris, singulorum denariū pondo
 uiginti quinque. aluminis siſi denarium pōdo duo-
 decim. olei heminas duas. Porrò ne putetis differ-
 re, si drachmas cētū alicubi inueniatis loco unius
 libræ scriptas, sed illud potius considerate: utrum
 qui scripsit cētum denarios, dimidiū ceræ ipsis mi-
 sceat, siue huius dimidiū terebinthinę, ut sint cerę
 quidē denarij quinquaginta, terebinthinæ uigin-
 ti quinque; an aliam quādam symmetriam faciat. Si
 nāq̄ prædictam, nihil referet dicere libram & seli
 bram, & tres uncias. Siquidem libra denarios sex
 habet ad nonaginta, selibra octo & quadraginta.
 Sic & huius rursus dimidiū quatuor & uiginti.
 Quapropter eadem proportio seruetur nulla inſi-
 gni differentia, siue centū drachmis metallicorū,
 siue nonaginta sex heminæ duæ olei miscantur.
 In hoc itaq̄ nō uariabunt pharmaca, siue libra no-
 minetur, siue denarij cētum. Illa uero Asclepiadis
 scriptum pharmacū ab Attalico emplastro diſum-
 xit, quod Attalicum sex quidem drachmas alumī-
 nis siſi, piperis uero albī tres habeat. Asclepia-
 dis albū piper non habeat, sed duplū pondus scis-
 si aluminis. Porrò ualidius adstringere quodāmo-
 do, ideoq̄ promptius cicatricem ducere Asclepia-
 dis pharmacum, Attali magis digerere omnes nō
 rit. Vnde quod dixi & prius, quā rogant, utrum
 ipsorū præſtet, medicamētis uti nesciunt. Etenim
 ad cicatricem ducendam Asclepiadis, ad digeren-
 dum Attalicum est melius. In uniuersum memi-
 nisse oportet, quod apud Hippocratem scriptum
 est in libro De alimēto, prauum uidelicet, & non
 prauum, noxiū & utile relatione ad aliquid dici.
 Alia enim ratione pronūciaueris Attalicum hoc
 emplastro esse præſtatū, eo q̄d, ad multa utilius
 illud extat. Deniq̄ & Asclepiades ipse post hoc
 modo recitatū, scribens illud ipsum quod ex pipe-
 re fit, nō uocat Attalicū, sed Paphilion, ignorās o-
 pinor primū ipsius inuentorē. Apponit autē no-
 men utentis, ac unde accepert, tū quid ualeat his
 uerbis præfixit. Aliud Paphilion dictū phar-

Galen.

macū accōmodatum. facit ad uetera, uix sanabi-
 lia, carbūculos, epinyctidas, achoras, pſoricos af-
 fectus. sinus glutinat, facit ad abſceſſus, condylo-
 mata, & fere omnibus utilius est. Cōſtare ipſum tra-
 dit ex ceruſſa, argenti spuma, cera, terebinthinā,
 duabus heminis olei, eodē modo sicut & Heras.
 ad hæc itē fiſſo alumine, et albo piperis. aque uero
 non meminit in confectura, sed neq̄ thuris, qui-
 dam non quinque & uiginti, sed dimidiū immi-
 tū: quinetiā de aqua, cum enim olei ueteris he-
 minas duas infundi scripſiſſet, poſtea aquæ duas
 uel unā adiecit: ego & sine aqua medicamentum
 sæpius præparauit: & ad omnia aliā melius fieri ap-
 paret, præterq̄ in teneris corporibus; nam in his
 aquam præſtat adhibere, præſertim cū phlegmō-
 nis tentant ulcera. Inde aliud Asclepiades cum ſu-
 perioribus albis emplastris proſert, q̄d rabioſos
 morſus ſanare promittit: quemadmodū & quod
 apud Heram ſcriptū est pollicebatur. Aſſumit &
 hoc præter ſimplex album quod ex argēti spuma,
 ceruſſa, thure, cera conſtat, in ſuper medullam cer-
 uinā & myrrham. Porrò miſcet ei argenti spumæ
 denarium pondo quadraginta. ceruſſæ denarium
 pondo triginta. thuris denarium pōdo decē. myr-
 rhæ tantundem. medullæ certūne duobus paucio-
 res quā decem. ceræ albæ denarium pōdo quin-
 quaginta. olei ueteris sextarium. Primum horum
 omnū quę recitauit, prodidit Asclepiades quem
 uocat Rhodiācū, ceu digerens & curans in mam-
 mis duritias ex his cōponitur: argenti spumæ, ce-
 ræ pōtica, singulorum pondo. ceruſſæ, adīpis ſuiſi
 li elaborat, cuiusq̄ ſelibra. hoc est uncijſ ſex. myr-
 rhæ pondo uncijſ quatuor. ouorum toſtorum ut-
 tellis duobus. olei hemina una & ſemis. Iſtud etiā
 ſedi benefacere confirmat, non apponens quonā
 liqueſcieri uelit, sed nobis coniectandum forſan re-
 linquēs, interim ex roſaceo linguēto, interim myr-
 teo, aliās ex oleo quopiam liquandum eſſe.

*Quomodo canāda emplāſtra componenda ſint aduerſus ul-
 cera cacoethæ, id eſt maligna, & ea quę cicatri-
 cem difficulter admittunt.*

Quæ dyſepulota, id eſt uix ad cicatricem ueniē-
 tia: quæ ſtēdum cacoethæ, id eſt maligna uocem, di-
 ſtinguendum modo eſt, quia nō ſolum in præſen-
 tem diſputationem, ſed etiā in futuram commo-
 da præſinitio eſt futura. Quæ itaq̄ ex humorū cō-
 fluxu, uel multorum, uel acrimio oriuntur, ſine eo
 quod locus affectus huiusmodi itā diſpoſitionem
 habuerit, ut licet bonum ſit quod inſiuit, tamē ip-
 ſum corrupat, dyſepulota nomino: quæ uero di-
 ctam diſpoſitionē ſam obtinēt, præcipuo uocabulo
 cacoethæ appello. Nunc igitur quoniā priores
 me emplāſtra quæ dā alba, ut quæ dyſepulotis
 cicatricē probe obducant, cōſcripſerunt, propte-
 rea ego quocq̄ alba ſcribo emplāſtra, quæ aduer-
 ſus dyſepulota omnia, & cacoethæ nō nulla, quę nō
 prauum admodum habent ſtatū, compoſui. Nam
 in illis denuo. medicamenta accōmoda dicentur.
 Primum & hic, methodum dicturus ſum, quæ id
 genus emplāſtra complura conficere diſcietis. Du-
 plex porro eius ſcopus eſt: alter omnium quæ ra-

tom. 5

M

tione

rione componuntur medicamentorum communis: alter peculiaris, colore ab his differēs. Quę igitur in commentario De simplicibus medicamentis cognouistis sine rosione quidē ac morsu, ualide tamē adeo exiccantia, hæc in memoriã reducite. Omnino autem referebat ea, præterquã quod nõ erodunt uel astringunt manifeste, etiam detergere posse. Siquidē caua plurima eius generis ulcera tanq̃ ab exesione humorum malignorum facta apparent, eiusq̃ rei gratia carne impleri desiderant. Ostendimus in tertio Therapeutices methodi libro, omnia quæ carnem generant medicamenta, detergendi facultatē habere. Multa etiam alia siccam obtinent uirtutem, huiusmodi ulceribus curandis accommodam. Sed age nũc repetamus ea quæ aut compositi emplastri candorē tueri possint, aut non adeo lædere. Hoc ex genere est cadmia, pompholyx, calx, ostrea cõcremata, purpura, buccina, et sepiæ pars ossea, parum officiet colori & æris squama, & uisæ chalcitidis non solum, sed cineritiũ, uel subalbidum. Quomodo autem huiusmodi res præparanda sit, rursus in Theriacę antidoti sermone dicemus. Porro dictorum quodq̃ si lauetur, totam rosionem amittet: quem admodũ cera quę medicamini conficiendo admiscenda est, uel resina. cæterum q̃ cera Tyrhenica uel Põtica dicta ad cãdidi emplastri præparationē sit idonea, prius explicatũ est. Resinę uero & quę larix uocãt, et terebinthina, aduersus ulcera maligniora magis ualēt. Thuris quoq̃ partem aliquã indere nõ abs re fuerit, ut ulcerum maleficorum dispositio coquatur, & ad suppurationem ueniat, At non solum ex prædictis medicamentis unum quodq̃ lauadum uenit, sed etiam metallica quàm maxime in loco soli exposito, cũ aqua, uel aceto, uel marina, uel uino leuigare oportet. pura autē, & cãdida, & perspicua singula hæc erunt, candoris cuiusdam medicamento cõcilandi gratia. De cerussa, oleo, coctionis modo, aere circũfluo, & igne, quomodo quodq̃ eorũ albedinis quidquã adferat, ante exposuimus. At quemadmodum in alijs, ita in his quoq̃ facultatis aquæ, aceti, marine, uiniq̃ albissimi peritiũ, id in cõpositura miscere cõuenit, quod maxime curãdo morbo profuturũ est. Etẽm in ulcerib. præumidis ac duris, ochthode Græci appellãt, quæ oras crassas, callosas, multãq̃ attenuationē requirentes habent, ex aceto, & marina leuigata, magis q̃ quæ per aquã idonea sunt. In quibus autē acre & mordax est humidũ quod in ulcera ferẽ, ex aqua terere potius singula metallica necesse est. Quemadmodũ rursus ex uino magis, ubi copiosus humor ulcerib. influens apparet. Hęc igitur singula quę dixi in uno quo que iã nominato humore leuigata dieb. pluribus, inieci frequẽter pharmacis, quæ ex argẽti spuma & cerussa cõsunt, eaq̃ expertus sum omnia cicatricem optime ducere. Verum scriptiones quasdã amicis quoq̃ dedimus, qui huiusmodi pharmaca deficiãt: etã quibus ipsius quoq̃ in usum ad experientia producta, quod titulo promittit rueri uidebant. Itaq̃ argẽti spuma cũ cerussa prius cocta,

A & medicamento propẽ ad non inficentem consistentiam perueniente, inijcienda est larix, uel terebinthina resina cum cera candida. His pulcre unitis adde metallica, quæ huiusmodi symmetriã habent. Argenti spumæ, cerussæ, pro consueta sine singulorum pondos, coquatur cum olei libris duabus, frequenter etiam aqua selibra addita. Liqum scit enim sic argẽti spuma citius, & coctio aquam consumit, ut nihil ad humiditatē pharmaco aperte proficit resinæ pondos tres uncias, ceræ duplũ sufficit. Quanquã si duas resinæ indideritis interim, quatuor ceræ, sic quoq̃ compositiones non adeo differre inuenientur. thuris etiam pondos uncia semis satisfacit post cerã & resinam iniectã: deinde tres aliorũ uncias quæ drachmæ quatuor sunt ad uiginti. impones autē duorũ, trium, plurũ, ac omnium quæ numerari, quorum singulorum tibi copia contingat, ut si omnia habeas, æquam portionē cuiusq̃ inijcias, cadmię dico, & pompholygis, buccinorum cineris, uel ostreorũ, & æris squamę, singulorum denarij sex erunt, qui tres uncias absoluunt. Quod si & calcem lotã miscetas, singulorũ drachmæ quinq̃ ponentur, Si uisæ chalcitidis singulorum drac. iiii. ut ex omnibus sex comitis tres uncias fiant. Verũ chalcitidis uisæ sit, elota, & colore cinereo, nõ qualem multi ex his qui uirunt ei, faciũt, ueluti si dicas ex pallido flauam. si duo quædam ex his habeas solũ, tres uncias ex ambobus ponito: hoc est utriusq̃ unã ac semissem. Hęc in præsentia ad aliorũ emplastrorum constitutionē ulceribus dyspepilotis curãdis cognoscere uobis sufficit. Atq̃ subhumida cerata candida etiã ex his ipsis præparantur, differunt tamen ab emplastris quod nec argenti spuma, nec cerussa coquatur: adeps uero uel asnerinus, uel gallinaceus, uel uulius, uel uitulinus indatur. Quod si uinum interim habeas uel acetum quæ albissima lucidissimaq̃ sint, aquæ loco ipsa admiscebis.

Damocrates de albo emplastro. Cap. XXXVI.

Quoniam pharmacorum uirtutes metris trascriptæ facilius memoria tenentur, et exactam ipsorum symmetriam perferuat, satius mihi uisum est & harũ meminisse. Cum itaq̃ Damocrates præter alia alba emplastra, etiam candidum scripserit quod commentat, apponam scripturam ipsẽ illius uersibus, lambico trimetro expressis.

D At cum his habere emplastrum medicis cõuenit Album, efficax aduersus abulsam cutem, Ambusia, ad ulcera & per summa corporis Occasionem citra manifestam edita. Ita confit: cerussæ libra sumitur, Lithargyri tantundem mollis additur, Et portio præterea libra tertia, Ceræq̃ puræ ponticæ quinq̃ uncias, Terebinthinæ pondos uncia purissima, Thurisq̃ mannæ, uel thuris quinæ uncia, Olei boni recentis quinq̃ selibras Albi, infundetur his a quæ sextarius. Oleum, cerussa, argenti spuma, aqua coquitur Leni igne, agitatur sedulo rudicula. Cum tota pulchre desiccata sic aqua,

Et leue medicamentum apparet, candidum,
Et molle, inficiens nec terebinthina inditur,
Deinde cera succedet, thus postea.
Ab igne cum depones ollulam moue.
Cum mediocriter est refrigeratum pharmacum,
Mortario superfundas, atq; excipe
In mulieribus, uel delicatis puerulis,
In senibus, habitu aut prauo iuuenibus simul.

A Huic tertiam partem immisceto aluminis
Quod prodidimus emplastrum nō multo antea:
Ac utitor ad omnia recentia uulnera:
Ipsi uero rhodion liquefacto immiscetas,
Paulum ac ceræ, liparon habebis ac bonum,
Album uinum, parum austerum si affuderis
Aluminis cuius meminit compositio, est quinta
ta ex ordine in hoc libro.

ARGVMENTA CAPITVM LIB. II

Proemium, cuius pars prima docet, Institutum esse
totius operis huius, artem & methodum aliquam con-
ponendi medicamenta constituere, qua cognita & alia
composita quis iudicare, & ipse noua componere possit.
Argumentum præcedentis libri, & præsentis, &
sequentium aliquot secundum genera emplastrorum.
De coloribus emplastrorum. Quod melior sit ordo tra-
dere medicamentum secundum facultates, quam secundum
colores consimiles: Quod autem quidam colorum
similitudinem secuti sunt, factum est propter diuer-
sas, qui certorum aliquando colorum emplastra posu-
lant. Et quod ipse medium quandam modum seruaturus
sit. Proemij pars 2. Qui ante Galenum de compositis
medicamentis scripserint: Et quod nullus illorum
generalium aliquam componendi rationem docue-
rit, ut nihil mirum sit Empiricorum sectam apud mul-
tos inualuisse. 3. Contra Empiricos, quod medicam-
diratio non fortuito & ad sola experientia inuenta sit, ex
emplo caui ulceris curandi copiose ostendit: & quoniam
ad id curandum ex cera & argente aptum medicamen-
tiferi possit: Quæ sit proportio mixtionis eorum. Pro
corporum duritie aut mollitie debilius aut fortius esto
pharmacum. Non licet unum pharmacum omni-
bus aptum parare: sed medio cre quoddam parandum
est, cuius deinde uires in ipso usu uel augeas, uel minu-
as, si opus fuerit. Quarta pars. De apparatus artifi-
cioso eiusdem uiridis emplastri, & proportionem mixtio-
nis ceræ ac terebinthina ad emplastri formam, quod
æqualis esse debeat, præsertim si ambæ recentes sint:
sin altera uetustior & siccor, resina semper præua-
leat ad duplicem usq; proportionem. Vide sequens ca-
put. Caput I. Confectura simplicis Emplastri uiri-
dis Andromachi, & uirtutis ipsius explicatio: Nomi-
nat & alia Andromachi uiridia, quorum descriptiones

hic non ponit: Vide cap. 2. 2. Consideratio simplici-
um ex quibus Emplastrum uiride primum Andromachi
constat, de resinis earumq; differentijs, de thure &
proportione ceræ ad resinam, & apparandi modus cum
aceto. 3. De frictione metallorum cum aceto ad so-
lem. 4. De olei alicuius mixtione ad prædictum em-
plastrum: & oleorum differentiæ. Item de alijs simplici-
bus quæ diuersi medici prædicto emplastro admiscēt.
5. De usu uiridum emplastrorum. 6. De uiridum
emplastrorum commixtione, eorumq; quibus constāt
proportionem. II. Alia post primum Andromachi ut
ridia describit, non omnia, sed quæ ab ipso commen-
dantur duntaxat. 2. Aliud uiride eiusdem: & quæ-
dam lita dicta. Communis sermo de emplastris co-
lore similibus. III. Quomodo uiridia fiant. IIII. De
pharmacis ualde abstergentibus. V. De meli-
nis emplastris. VI. De melinis Andromachi. 2. Al-
lia quædam ab eodem prodita melina. 3. Heræ em-
plastra melina. 4. Critonis melina. VII. Degil-
uis siue fuluis emplastris, quæ dichroma, id est dupli-
cis coloris dicuntur. 2. Rufum Galeni. VIII. De
emplastris quæ cicatricem obducunt. 2. Epulotica
ab Asclepiade prodita. 3. Epulotica Andromachi.
4. Alia eiusdem, quibus quid præsent non adscri-
psit. IX. De catagmaticis & cephalicis, id est ad fra-
cturas & caput accommodatus emplastris. 2. De ca-
tagmaticis Asclepiadis. 3. Alia eiusdem. 4. De em-
plastris quæ proprie Cephalica nominantur. 5. Her-
as de quibus catagmaticis & cephalicis scripserit.
6. Catagmatica Andromachi. X. De emplastris
glutinantibus. 2. Barbara, sic uocant emplastra con-
fecta cum bitumine. 3. Barbarum siue nigrum em-
plastrum Heræ. 4. Aliud Barbarum Heræ: & duo
quibus utebatur Galenus.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM PER GENERA LIBER II.

PROEMII PARS I



VM propositum opus hunc
quoque cum alijs scopum te-
neat, ut si quādo librum, quo
medicaminum quibus uti-
mur compositiones, scriptas
habemus perdiderimus, ipsi
nos perditis similiapossimus
cōficere, necessarium est pri-
mū nos in uniuersum formulā quandam uisē didi-
cisse, qua propositū inueniamus, deinde per hanc
uiam in multis particularibus exercereamur oportet,
sciētes citra talis studij exercitacionē, nullum
recte opus perfici. Et uero graue est, quod iā qui
busdā accidit medicis duobus mihi cognitis, quo-
rū hic dolore ex talium scriptonum interitu con-
turbatus perisnaliter ab operibus medicis desti-
Galen.

tit. Verum exercitatis, iudicio meo, præterquam
pharmaca uisā cōponere, etiā a superioribus
nobis medicis scriptorum arbitris esse licet, com-
modeq; omnia ea quæ ab illis prodita sunt usur-
pare, atq; illa quæ ipsi methodo inferius posita in
uenerint. Melius igitur est experimentis iam cō-
probata sumere eum qui usus ipsorum rationem
didicerit: licet quod dixi, necessitas frequenter
nos cogat, ut uel experientia incōpertis ex tem-
pore utamur. Itaq; superiore libro quōmodo ex
argenti spuma sola emplastrum præparēs docui-
mus, interim oleo tatum, interim aceto admisso,
uel uino, uel huiusmodi alio: item ex quali ipso-
rum symmetria emplastrum fieri candidum possit,
si probe coctum fuerit. Cæterum ex his empla-
stris, quædam ducendæ cicatrici accommodatā

fieri diximus, quædam uulneribus cruentis glutinandis, quædam phlegmonis exiguis curandis, quædam ulceribus quæ cicatricem ægre admittunt, sanandis, si non cacoethe sint, quædam ad tumores præter naturam, sed non magnos, neque duos, discutendos. Scriptum simul in eo est non multo post initium, & emplastrum à me compositum, quod Phœnicinum nomine præsentis autem hoc libro De uiridibus, & melinis, & giluis, & fuscis, & rufis agetur emplastris, quibus etiam adnumerantur quæ dichroma, id est coloris ambigui dicuntur. Inter hæc alia quædam sunt medio inter hæc nomine, ut ex candido melina, & ex nigro uiridia, & à similitudine sordium rhyode grece appellata, quasi strigmentosa, adde quæ aerem imitantur, & cœrulea, quædam uero nomine profusarentia. Itaque similia inuicem uiribus deinceps scribere commodum est, ut qui in plura incidit, uel librum legit, id quod optimum corpori, eiusque curando affectui sit, eligat. At colore similia tradere, eorum est qui similitudinem non artificialem attendunt: uerum quoniam potentes quidam uiri interdum nos iubent emplastrum sibi melinum conficere, quod ulcera glutinet, uel cicatricem ducat, uel indurata emolliat, uel aliud huiusmodi facere possit, coacti sunt nonnulli recentiorum medicorum, ubi similia colore seriatim conscriberent, proprias cuique professiones apponere. Quamobrem ego mistam quandam disciplinam conabor effingere, à magis artificiosa auspiciatus. Scribo enim prius, quæ caua ulcera carne implent, quorum plurima colore uiridia sunt: adnotas, quot ex his glutinantia sint, quotque in maligna euadentibus medeantur, atque huiusmodi aliud quidquam possint perficere: Deinde glutinantia non modo recentium ulcerum, sed etiam sinuum, ex his & plura sunt, quæ ad usque cicatricem ulcera perducant, atque horum omnium unam seriem facturus sum, melinorum aliam, barbarorum (ut uocant) aliam, & fuscorum aliam: necnon in reliquis coloribus similiter. Producam in alio quoque uero libro similitudines absque coloribus, quæ ulcera cicatricem uix admittentia (dicuntur & chironia) persanant. In alio rursus post istum quæ tum hæc, tum alia quædam curant quæ usus dicuntur, suntque multiplicis, ac post hæc omnia quicquid emplastrorum facultatum reliquum fuit uia ac ratione cognoscendum percensere conabor.

2 Hæc igitur uicem proœmij cuiusdam omnium emplastrorum quæ commemorabuntur communis, præfati, ad ea quæ hoc libro scripta sunt, digrediemur: oratione quadam generali eis præposita, tanquam nihil etiam mihi iam prædictum sit. Compositiones medicamentorum complurium laudabilium primus omnium, quos nouerim Mantias Herophilæus scripsit, cuius discipulus factus Heraclides Tarentinus, non solum in pharmacorum usu uidetur imitatus illum, sed etiam in ea artis parte, quæ uictus rationem docet. Post quos alij sane quidam non paucis uoluminibus, sicut Mantias & Heraclides. Sunt etiam qui uno aut altero

tantum ea conscripserint, quemadmodum Cappadox Heras, qui nec improbatum aliquod medicamentum tradidit, nec confecturas ipsorum omisit, & uniuersos particulatim usus recensuit. Per multa pharmaca pluribus libris studiose scripserunt, Musæ, & Asclepiades, & Crito: uerum Andromachus unico libro medicinalia medicamenta ad exteriora corporis usita, altero quæ interna curant memoria prodidit. Item tertio his minore, oculorum remedia, paucissimis autem ipsorum nec præparandi modus, nec utendi appositus est: neque uero horum quispiam, nec alius cuiusque pharmaci componendi ratione docuit. Ob quod Empirici confidentius, licet absurda, pronunciant, ut qui pharmacorum compositionis inuentionem ad casum referunt: in de nimirum confidentiæ occasione fumentes, quoniam nemo ex dogmaticis medicis confessionis eorum regulam absolute scripserit. Nam cum dogmatici interrogati rationem, qua pharmaca singula composita sint quibus utuntur, nihil quod dicant habent: perditisque illorum descriptionibus, ipsi alia componere ex tempore non possunt, & ipsi merito contemnuntur, & Empirici contradicendi maiorem præbent audaciam.

3 Quod si affectus cuiuslibet eorum quos curandos suscipiunt naturam scirent, methodumque cognoscerent qua & simplicium singulorum medicaminum uires, et scopum curationis inuenirent, non utique compositionis ratione ignorarent. Vt exempli gratia, caui uelcus, minime periculosum, græce aperistaton (nihil enim mali est, ut quidam uocant breuioris disciplinæ gratia, sic nos quod non minare) quomodo quis sanare queat, consideremus: tanquam si nondum aliquid ei curando aptum medicamentum inuentum sit. Nam cum docti à ratione fuerimus cauorum ulcerum curatione ministrari, nascete alia carne loco perditæ, ex ea uidelicet quæ subiecta est, cogitauimus fieri non posse hoc, si in ulcere sordes, aut copiosa humiditas insit. Verum sordes medicamina detergentia auferunt, humorem exiccantia discutunt. Cœuenit igitur huiusmodi pharmacorum materiam cognoscere non simpliciter secundum genus, ut Dioscorides alius scripsit, sed uti nos in cœmentarijs De simplicibus medicamentis fecimus, non tantum apponentes uel calescere, uel refrigerare, uel huiusmodi aliquid aliud quod uis medicamentum facere: uerum etiam quod prima distantia, uel secunda, uel tertia, uel quarta à medio tale existat, frequenter etiam quod in horum media unaquaque, uel incipiente, uel desinente sit, ut duodecim pharmacorum quæ per excellentiam quæcumque profertur, ordines subsistant. Interdum enim uel medio critere calefaciens, uel exiccans: interdum quod uehementissime quod uis horum facere possit, requirimus. Qui autem simpliciter particula calefieri uelle intelligit, non magis piper & sinapi quam thus accipiet. Hæc sane & prius ostendimus, diximus uero & in tertio methodi Therapeutices cœmentario: quasi uero præscientes ea ex demonstratione conuenienti, ad reliqua deducam, hinc præsentis sermonis sumpto initio. Quo

nam ulcera carne implenda, pharmaco exiccate & detergēte mediocriter sine morfu indigere demonstrauimus, cōuenit eiusmodi pharmacorum materiam quamam sit in memoriam reducere. In dicata est autem in libro De simplicium medicamentorū facultatibus, in super & conueniens singulorum ordo expositus est. Hoc etenim, sicut dixi, admodum utile est, ut si quando fortiore quis pharmaco opus habeat, ad quod digrediatur cognoscat. Verum cum simplex nullum habemus, compositio utitur: atque primum fingamus nos habere cerā & æruginem: aliud nihil quod cauo ulceri manifeste cōducatur: thus dico, irim, aristolochiā, farinam eruorum, radicem panacis, & quæcunque ex hoc sunt genere. Cum igitur sciamus, cera sola imposita sordidū ulcus euasurū, ut quod neque detergere, neque exsiccare possit: æruginē autē adiectā morsum & rōtionem illatum iri atq; phlegmonem excitandam, horum sanē utrunq; deuitabimus: mediū autem ex ambobus aliud conficiemus: imbecillius quidem æruginē, ualentius autē cerā. Sed quoniam hæc paululo inferior est eo quod commode queat adijci, ærugo autem multum præcellit, multæ ceræ parum æruginis admiscebimus. Quātam ergo quantæ: hoc enim deinceps uenit dicendum: exacte quidem quantitate cuiusque ante experientiam inuenire nemo potest: consijcere tamen & iudicare, & componere pharmacum prima potest experientia nullum inligenter improspere succellum habiturum: quemadmodum ego aliquando feci in quodā uice, ubi cum neque ipse medicamentum quod me sequeretur haberem, neq; alius ex ijs qui ibidem agebant copiam mihi facere posset, reperi solū ad compositionem idonea æruginem & ceram, quibus acceptis, & ad ignē cera liquefacta cum oleo rosaceo, ut liquidum ceratum fieret, miscui ceratū libræ unciam unā æruginis, hoc est duodecimam partē. statui enim decimam, uel duodecimam mīscere: suspicatus quidem maiorem, ut acriorē cerā futuram, minore tanquam imbecilliore. experitis autē nobis compositionem, uisæ sunt partes & decima & duodecima recte pro corporum differentia cōmisse. Ostendimus enim, quod etiā usus attestatur, ualida corpora ualidiora sustinere medicamina, imbecilliora huiusmodi non ferre. Validiora dico corpora, quæ temperamento siciora sunt, ueluti agricolarū, nauatarū, & uenatorū: imbecilliora, molliora uel natura, uel uictus cōsuetudine, cuiusmodi sunt mulierū, eunuchorū, puerorum, et qui naturali temperamento sunt huiusmodi, candido molliq; corpore præditi. Dura igitur corpora ex copiosiore æruginē cerato admista carnem recipiunt, mollia ex pauciore. Vnde, ut frequenter dictum est, unum pharmacum omnibus nequaquā cōuenire potest corporibus, sed oportet mediū esse, ceu ad mediā temperatūram aptatum: duci uero ad utranq; eius mediū partem, dum quotidiano usu & experientia probat: si enim quod res postulat effecisse uideatur, in eo manere cōuenit: si paulum deficiat, augere ipsius

Galen.

A uires: quemadmodum etiam adimere, cum prætermodum efficax fuerit, uelut in ipso hoc proposito pharmaco quod cerato & æruginē constat, cōsiderare prius oportet, ulcusne carne obductū sit an nondū, sed sordibus humoreq; sit refertum, uel præterquam q̄ carne impletum non est, erosionis sensus aliquis laborati ortus sit, & calidior, uel rubicunda magis pars ulcerata apparuerit. Si igitur imbecillius uideatur, melle uel æruginē admistis potentia eius adaugebis: si ualidius, oleum uel rosaceum miscebis, molliēs pharmacū, quod linamentis excipiendum est. Pro occasione quidem ceratum & ærugo sic miscentur, quemadmodum a me nonnunquam esse mista retuli.

B 4 Confectura autē medicantibus hæc esto emplastrī cōpositi (Viride a colore uocant) sanantis quidem & recentia uulnera, quæcunq; non magna sunt, sed q̄d ex rhodino simul ad linamentis excipiendi pharmaci cōsistentiam potest liquefieri. Quin & resinæ, uel colophonæ, & frictæ nomina, uel terebinthinæ non nihil ipsū habere oportebit. Ostendimus autem laricem uocatā terebinthinā quodammodo esse similem. Porrò quantitas earum misturæ & hic cōiectura potest deprehēdi: si em plus resinæ q̄ ex usu sit admisceamus, donec manibus subigat, molle appareat: in linteolū uero illitū, paulo post instar pellis durū erit, facile a corpore decidens. Sin minus iusto resinæ cū cera mistum sit, non habebit hoc q̄d echecollon, id est glutinans Græcis appellatur, ut distrahēdo eo, plurimum extendatur. Liqueat autem si alicui particule imposueris, fore ut difficulter agglutinetur, & protinus ab ipsa delabatur. Quæ igitur medicis mistura, ceu emplastrī cōsistentiæ conueniens: Si quidem mihi fidem adhibes, par utriusq; portio. Nec uero cera, nec resina sicca uetusq; esto: optimum liquidē ita amborum mistionis cōagmentum est, si ambo pingua, & mollia assumantur: si alterum excedat, semper resinam præpollere satius est: quare nonnulli uel duplum huius portus ceræ admiscunt.

Confectura simplicis emplastrī Viridis Andromachi, & uirtutis ipsius explicatio. Cap. I

D Ac sanē Viride nonnulli, sic em ipsi nominant, ex dupla resinæ portione cōfecerunt: duas quidē eiusdem libras, unam uero cere, & binos olei cya thus immiscentes. æruginis autē alij duas, alij tres uncias huiusmodi ceræ & resinæ mistioni immittunt. Sed etiā in præparationē, liquefactis quæ liquari possunt æruginem inspergunt: quidam ubi refrigerauerint, mox raserint, in mortario misturā moluntur. Porrò qui medicamentū creutorum ulcerum glutinantius facere statuerint, æruginē in pila prius cum aceto leuigatā inijciunt, ceratum radentes. Proinde si quis uos roget, quale horum uiridum emplastrorū sit præuositissimum, succurrat, id quod identidem a me prædicatur responde re, omnia esse optima ei, qui affectus, quibus lingua offeruntur, cognoscat: sicut & eos ignorantia omnia pessima. Mei etem officij est dicere, id excicare ualentius quod acetum assumit. Constat autem

tom. 5

M 3

tem

tem quod plus æruginis continet, id tum ualidum esse, tum magis exiccās, tum fordida ulcera rectius purgare. Finis ipsius est, ut hæc citra erosionē ac morsum efficiat. Nam adeo ualēs, ut iam puris ulceribus impositum erosionem pariat, nec ea unquam carne replebit: sed alio modo humida sordida quæ reddet, similiter ips, quæ parū integre siccant deterget. Iam uero ex acrioribus cauum magis ulcus euadit, & rubicūdus, calidiusq; est, cum æger etiā ipse morsum eius percipit. Ne igitur quoduis medicamentū simpliciter laudate citra dispositionis in qua commēdatur appositionem: nec in alio quoquam pharmaco, nec in ips quæ modo nobis proponuntur id agēdum est. Quos igitur uiridibus ordine suo descriptis, affectus quibus ea conueniunt, distinguere nō piguit, minus peccat q̄ ipsi qui ne hoc quidē fecerunt. Qui uero sine distinctione, ac indefinite scripserunt, cū ad alia transeunt apponentes, Aliud uiride, disciplina reddunt prauissimā, si modo oportet omnino disciplinam uocare huiusmodi scriptiōes. Igitur Andromachus in libro quē Externorū inscribit, paulo post principitū, prima fusca posuit, mox rufa, deinde nigra, postremo ad uiridia cōuersus disciplinæ huiusmodi initium fecit: præfixo nomine, uiridia, ac quod principem locum habet, scripsit his uerbis.

Viride Galli.

Resinæ strobilinae denarium pondo trecentorum, ceræ denarium pōdo centum. æruginis rasæ denarium pōdo quinquaginta. thuris denarium pondo uiginti quinque, acetū quantum satis est. Cōueniebat igitur ipsum non nihil forsitan & de cōfectura dixisse, num etiā thus simul cum ærugine in leuore redigi acetū affuso uelit, an solā æruginem. utrunq; enim licet, atq; in multis compositionibus nōnulli hoc, quidam illo modo scripserunt. Verum in hoc mentem eius conijcere possumus: nempe ambō cum aceto uelle cōteri, thus puta & æruginem. Attamen in quibusnam affectibus medicamentū sit utendum, significatum profus oportebat. Nūquid igitur, quoniam ante hoc duo quædam emplastra scripserat, quorum prior præposuit, Ad gægrænas, putredines, nomas uetustas & malignas: secundo, Ad nomas quo uitor, & alia pleraq; ideo Viride istud sine appositione deinceps protulit, ostendens ipsdem ipsum affectibus conuenire? Cæterum aliud rursus huic subiungens simpliciter dixit.

Viride Potamonis.

Deinde aliud tertium Viride, & quartum quo uitor. Ad hæc quintum aliud, sextum, septimum, octauū, nonū, decimū, undecimū, duodecimū, decimum tertium, decimum quartū, decimū quintum, decimum sextū recensuit uno duntaxat hoc nomine, Aliud, singulis præposito, differētia quidē inter se omnia uiribus cōmemorans: non tamen uniuersa ad putredines, nomas, & gangrænas idonea, quemadmodum ex ipsorum materia est cognoscere, unde etiā constat pro coloris, nō uiridū similitudine simul inuicem hæc ipsum conscripsisse. Itaq; nos cuiusq; eorum potestatem ex-

A ponemus, a simplicitū medicamentorū natura sumpto principio. Nā hoc longe utilissimū fuerit ips, qui non solū in uniuersali cōpositionis methodi, ac usum talium medicamentorū cupiāt intelligere, sed etiā suomet ipsorum Marte cōficere posse, & quæ a ueteribus citra distinctionē tradita sunt, qualemnam potestatem habeant dignoscere.

2. Quod igitur primum Andromachus prōdidit inspiciamus, proponentes considerātesq; simplicia singula quibus cōfectum est. Primum igitur resinæ strobilinae in eo meminit, quæ ut in cōmentarijs De simplicium medicamentorū facultatibus afferit, resinarum longe calidissima efficitur terebinthina ambabus qualitatibus. omnium moderatissima. Omnes siquidem resinæ calefaciunt & exiccant: sed hæc magis, ille minus. Validissima igitur est strobilina: moderatissima, ut dixit, terebinthina. quinetiā siccata celerrime strobilina, & quæ peculiari appellatione pityinō physema dicitur: resinā quidem & ipsum genere, cæterum siccans, & calefaciens: siccando autem a strobilina non superatur, calefaciendo plurimum. Hæc ergo exiccata pinguis expertes sunt, ideoq; emplastra bene ad hæretia cōficere nō habent, ut uiscosa & liquida. Inter pityinon physema, id est picem, & strobilina resinā media calore abietina est: liquida tamē diutius perdurat: sicut etiā colophonia thuris redolens, quæ nonnullis sola uocatur colophonia, odoratu suauitatem quādam referens sicut abietina & calore mediocri prædita ut illa, nascitur admodum modica, atq; ob id pretiosa est. Humidissima tamē omnium est altera laricis appellata differentia: nam hæc quoq; duplex quodammodo est: una quidem similis in omnibus terebinthinae: altera hæc acrior, calidior, magis liquida, et odoratu grauior, et gustu amarior calidiorq;. Porro humida resinā quæ in continentibus pineæ resinam subidet uasis fictilibus, consistētia & colore terebinthine adamussim similis, odore & gustu diuersa: ingratiore quidem olfactu, sicut etiam acrior & gustu mordacior. Quare satius est terebinthinam omnibus medicamentis, quæ ulcera recte curabūt, admiscere: quoniam primus præcipuusq; in eis locus est, ut quod offertur, nō mordeat. Igitur ad cōpositum emplastrum reuertatur, in quo Andromachus strobilinae resinæ denarium pōdo trecentorum, ceræ denarijs centum mistis iubet miscere: neq; cōsistentiam, neq; uirtutem exacte affecutus uel ipsi, uel qui id cōposuit, neq; enim glutinans erit, & acres fiet. Auxilium uero ei ad utrunq; contulit, thus admiscens, uerū pro illorum copia paucam adeo, præsertim cum æruginis denarios quinquaginta immitat, octauam partem quadringentorū ex cera resinæ collectorem ex plētes. Atqui nemo hoc illi uitio uerterit, utpote cui consilium fuerit medicamentū cōficere uehementer exiccans, cum & alioquin ipsum carni generāda, ac mediocribus glutinandis uulneribus aptum reddere uolētī drachmæ quinquaginta misceri recte possint. itaq; lenius, ad carnem producendam commo dius, adhærendo pertinacius, &

multo utilius fieri. commendanda uero est thuris cōmissio, quod emplastrum coagmentum iuuat: do-
lorem enim leuat, & cocoquit. Quare si æqua ip-
sius portio ærugini fuisset cōiuncta, hoc est dena-
rium pōdo quinquaginta, glutinātius ut dixi red-
ditum fuisset, & mitius medicamentum. Quo-
ntiam uero uiginti quinq; adiecit, sicantem æru-
ginis uim seruare curās, emplastrum ad glutinan-
dum maiorā uulnera, et ulcēribus uix sanabilibus
curandis idoneum, factum est, quodq; tale ipsum
fore in animo habuerit, acetū quoque mixtura in-
iuit. Penes nos itaque est & uehementius & le-
uius ipsum facere, uel plus acetū, uel minus miscē-
tes: sicut acrius, uel minus mordax. Etenim ex a-
crioris mīstione, quemadmodum etiam copiosio-
ris, medicamē exicabit fortius, & cruentiorum
erit glutinantius si uinosum acetum sit adiectum.
Porro præstat in cōpositione plurculis diebus æ-
rugine ex aceto acri, in sole calido leuigare: quod
enim in eo mordax est, mitescit, uirtus nihil fiet
minor: thus autem initio admiscere necessariū nō
est, uerum huc dies unus satis est.

3 Si quidē meminisse uos puto & huius quod-
toties repeto, fortū medicamentorū, cuiusmodi
est ærugo, misy, chalcitis, fori, æris squama, uel
chalcanthū, ex aceto diebus pluribus contritorū,
morsum seu erosionē obrundī, bonitatē augeri.
Quoniā enim metallica ut quæ crassioribus natu-
rā cōstant partibus potestatē suam in altum usq;
corporis, quod curatur, nō extendunt, ideo ut te-
nuiora fiant, ipsæ per triturā & acetum adhibendus
est cultus, hoc em̄ curiose ita attenuata ad intima
usq; penetrant. Accedit autē & aliud quoddā com-
modum in huiusmodi medicamentorū prepara-
tionibus, qd̄ diligētē elaborata corporis meatus,
nisi quā inter eundū retenta, pertranseunt, eiusq;
rei gratia & si calidioris naturæ sint, sine moris
munere suo fungūt. Quin & inter humores ip-
sos in corpore generatos, tenues facile citra ero-
sionē perspirant: crassiores retētī, obstructiq; mo-
lescit, ubi mordaces fuerint. Eadē ratio est in me-
tallicis medicamentis combustis, sed illa ex ignis
comercio nō nihil mordax, seu erodens perferuat
quod per lauaciones deponunt, ac lenia prorsus
reddantur. Quibus autē simile quippiā ustioni
extitura cum aceto in sole facta ignis loco acci-
dit, ea neq; exigne genitū calorē consequuntur:
si tamen & quæ combusta sunt ex aceto leuigen-
tur, multo præstantiora fiunt. Igitur tum hæc mul-
torum medicamentorum cōmunia, sunt cognitu
necessaria: tum usus ipsorū similiter: alius quidem
in alijs affectibus: in cauis uero ulceribus, cum li-
namentis excepta imponuntur.

4 Propositum itaq; emplastrum si ex rosaceo
liquefaciēs eo utaris, prodest fordidis & humidis
ulceribus, aperta uero erodit: cuius rei causa mi-
scendū ei est ceratū liquidū ex cera & resina con-
fectū, uel ex rosaceo, uel oleo liquefactū. Poteris
interim & myrteo uti: atq; horū mīstionis metho-
dum quandam intelligas oportet. Olei sanē no-
men unum est, qualitas & facultas diuersa. Nam

A Omphacinum frigidius: ex maturis oleis pressum
calidius est, temporis autem processu calefacien-
di uim auget: sic etiam quod salē habet, quantum
ex illo sumpserit, tanto calidius est, magisq; siccatur
quā quod ipsius expers est: quod surculos oleg,
thallus Græci nominant, continet, ualentius ad-
stringit. Indicatur autē tibi id quod est utilius & ul-
ceris forma, & corporis ægri natura: ulceris qui-
dem sanandi contrarijs, corporis autem ulcerati
similibus. Quapropter medicamentū quod lina-
mento exceptū immittendum est, myrteo lique-
facies, cum generata caro flaccidior quā par est
apparet, præsertim ulcerē ad cicatricem perueni-
ente propemodum. Nam cum pauillum quid-
dam phlegmones in ambiētibus particulis relin-
quitur, optimum est, pharmacum ex rosaceo li-
quare. Rosaceum uero præstantissimum esse no-
uisti, quod solis rosas pluribus in oleo, citra salem
præparato diutius maceratis confectum est. Si er-
go hæc quispiam in memoria præpta semper ha-
beat, nec oblitus sit, ut præcepimus, omnium sim-
plicium medicamentorum potentia, & uaria ip-
se emplastra uiridia cōponet, & singulis iam con-
fectis optime utetur. Emplastrum igitur hæc-
tenus in sermone propositum, quod primum uir-
idium scripsit Andromachus, multifariam licet ad-
aptare, partim pro strobilina resina aliqūā aliam
adijciendo: partim thus augendo, uel cum eo sic-
cum aliquod carne explens, uel ut irim, aristolo-
chiam, erui farinam, atque huius generis alia ad-
miscendo. Quin etiam quod oras ulceris indura-
tas emolliat miscendo, compositionem uariare li-
cet. Vnde nonnulli medullam ceruinā, aut uulsi-
nam, aut seuum admiscuerunt: sicut rursus aliq;
repellens aliquod, dum influxus conantur reprimere.
Hac ratione igitur aliq; fissum alidē, aliq; rotun-
dum, aliq; gallam omphacinam, id est immaturam
adiecerunt: quidam ladanum utraque uirtute præ-
ditum, molliendi uidelicet & repellendi, ut oras
emolliat, & nihil ex superioribus influat. Insuper
qui uix sanabilia curare studeuerunt: ut multipli-
cis usus medicamentum esset, adiunxerunt enu-
meratis chrysocollam, uel diphryges, uel æs com-
bustū, uel squamā, aliqui eris, aliqui stomomatis
ferri. Et propē omnia modo enarrata, uiridū
emplastrorum colorem seruant: alia uero iisdem fa-
cultatibus prædita mista, corrumpūt. Quare nec
ego omnium memini pro qualibet facultate, sed
illorum duntaxat quæ emplastri compositi colo-
rem tuebuntur. Non enim de glutinantibus, uel
ijs quæ carnī alenda sunt emplastris simpliciter,
uerum iisdem uiridibus quoq; dicere statuimus.
Quamobrem hæc modo narrata, atramentum sy-
torium, & chalcitis cruda, si breui mensura admi-
scentur, colorem pharmacorum in sermone præ-
cedentium seruant. Itaq; de talium compositio-
ne abunde satis dictum est.

5 Vsum uero ipsorū quoniā Andromachus
omisit, a quo traditum esse conueniebat, nos ap-
ponemus, communem unum de talibus medi-

caementis usurpandis sermonem planè necessari-
um præfati. Deinde uniuersalem Methodum in-
terpretati: particulares, eorum causa qui illam di-
dicerunt, conuenit effingamus. At huiusmodi o-
pus ad dialecticos pertinet, in omnibus particu-
lares ipsis perscribere: sicut Heras, Crito, Ascle-
piades, aliq; complures factitarunt. Atqui etiã
tertia disciplinã species est, quam nos tracta-
mus, neque in omnibus particularibus medica-
mentis usum scribentes, imò nec uniuersum com-
muni Methodi disciplinã soli totum conceden-
tes, sed hanc quidem primam docentes, inde ue-
rò unum uel alterum, uel etiã tertium exemplum
claritatis & exercitij discentium gratia accomo-
dantes. Quemadmodum sanè ea & nunc re ipsa
ostendimus, ut iam in prioribus quoque fecimus.
Nam quatenus medicamentum excicet deter-
gatq; quum ex simplicium facultate quæ id con-
stituit inuenimus, inde simul dispositionem
cui conuenit indispicemus. Vbi enim humiditas
multa, & copiosa sordes est, desiccans euiden-
ter purgãsq; medicamentum applicare oportet.
Vbi uerò minime periculofum (Græci Aperista-
ton uocant) ulcus est, carnis indigium, moderatissi-
mum inter exiccantia detergentiaq; competit.
Verum minoris maiorisq; in eo rationem ab æ-
gri natura sumere cõducit. Siquidem durioribus
uel ex temperamẽto naturali, uel ætate, uel loco,
uel studijs corporibus, magis exiccantia exhiben-
da sunt: humidioribus minus. Quapropter pri-
mã cuiusque medicaminis linteolis excepti (em-
moton Græcis appellatur) usus ex prædictis nu-
per scopis cõiecturali artificio sumitur: secundus
ut etiã antea monuimus, ex signis in corpore cu-
rando apparentibus. Sinãque cauum ulcus et-
tra phlegmonem & purum inueniatur, nihil no-
uum tentare oportet: si humidus uel fordidius,
intendere desiccans detergensq; pharmacum ra-
tiõ postulat: si cauum magis quam prius existit, sol-
uere. Intenditur itaq; mellis missio: mitigatur
ex oleo & cerato, uel oleoso quopiam, cuiusmo-
di est rosaceum, myrteum, & cyprinum, simpliciter
preparata sine spissamentis, (stymmata Græci uo-
cãt) quæ addunt odoris gratia, uel ut cõfecta diu-
tius ab iniurijs immunia permaneant. Iam uerò si
contentiosus quispiã nos increpet, tanquam præ-
ter id quod ab initio instituimus, ad medicamen-
torũ usum orationẽ deducamus, polliciti nos de e-
orum cõpositione uerba facturos: ille considera-
to, quod in usu etiã cõfectura quædam sit, silen-
tium sibi imponat. Prima enim pharmacorũ quæ
cerato miscetur in eo cõfectio est: altera rosaceo,
uel myrteo, uel cyprino, uel lentiscino oleo, uel
melle appolito constat. Atq; de his satis.

6 Verum ad emplastra quæ iam per experien-
tiam abunde probata sunt trãeamus. Hæc igitur
Andromachus memoratu digna medicamenta
usurpare ipsa sciẽtibz præscribit. Vnde cum ta-
lia sint, ea deligẽda quæ ex paucioribus, paratius
facillimis simplicibus cõponuntur, tum quæ ad
plura ualent, & proposito maxime scopo seruiũt.

A Res fiet exẽplo ita lucidior. Finge cauum ulcus mi-
nime periculofum in sano corpore: tale uerò ab
emplastro uiridi, quod lite uocatur, liquefacto ex
rosaceo curabit. Appellant aut litem quod ex eru-
gine, cera, & resina cõfiscitur. Ego sanè ut ostendi,
equam utriusq; portionem misceo, æruginis deci-
mã uel duodecimã uel octauã. Est uidelicet duo-
decimã, si cerã podo, & resinã tantundem, ærugi-
nis uncias duas miscuerimus: decimã, si duabus
æruginis uncis, uiginti ambarum resinã & cerã,
hoc est utriusq; decẽ adijciantur. Quinetiã si octa-
uam æruginis partẽ cerato ex cera & resina con-
fecto apponamus, etiã sic bene habebit. Nama-
crius quidẽ magisq; detergens huiusmodi medi-
camentũ erit, non tamen inutile. Duris enim cor-
poribus per cõmode adhibebitur. Melior euadet
B cõpositio, ubi octauam portionẽ æruginis con-
fecturã ex cera resinãq; immiscuerimus, æruginẽ
ex aceto quamacerrimo diebus plurculis ante in
leuorem redactã. Præstantior erit, si etiã thuris
partem, dimidio maiorem quam fuit in æruginẽ
indiderimus. olei pares numero cyathos ærugi-
nis uncis adiunges, cum sine aceto & thure medi-
camentum conficis. Quando autẽ thus, acetoq; adij-
cis, siquidem frictã resina pinguior quodãmodo
molliorq; sit, ac castate pharmacum præparas, mi-
scebis nihil: si uerò dura, idq; per hyemẽ conficis,
cyathum unũ infundes. Quod si liquidatũ quam-
piam resinarum cerẽ misceas, oleo prorsũ carere
licet. Liquidissimã quidem tertiam cerã portio-
nem addes, minus liquidã dimidiam. Fiet autem
C uidelicet huiusmodi quædam cõpositio. Ceram
resinãq; liquatam ubi refrigeraueris, æruginis
partim nunc octauã, nũc decimã, aliã duodecimã
cõmisceto: cognoscẽs duris corporibus primã
symmetriã conuenire: mollibus tertiam: medijs
mediã. Aeruginem ex aceto leuigabis: si lenius
medicamentũ uoles efficere, thuris pòdus dimi-
diũ eius quod ærugo cõtinet adijunges: sin hoc
mitius, thus & æruginem æquali modo com-
mittes. Atqui & resinã cum cera ubi sine rasura re-
frigerauerimus, liquefactas eas ærugini thuricq;
in pila ex aceto tritis superfundimus. Hæc igitur
primæ cõpositiones sunt uiridis emplastri, quod
cruenta quidẽ uulnera non adeò magna glutina-
D nat, & reliqua ad usque cicatricem sanare potest,
& carnem in eis producere, ex humido quodam
oleoso liquatũ. Voco autem oleoso, rosaceum, quo
maxime ad illum quem retuli modum cõfecto
utendũ est: & post hoc myrteo, cyprino, & len-
tiscino. Sed ipsum oleum, ubi medicamento lique-
scenti caloris quippiã adijcere cordi est, comu-
ne hoc miscebis: in quibus refrigerare studes, id
quod omotribes, hoc est immaturum appellatur:
ubi adstringere, myrteum: ubi mistã facultatis ali-
quid, concoquens puta & repellens, rosaceum:
in quibus modicam adstringendi uim cum maio-
re caliditate desideras, cyprinum & lentiscinum.
Porrò & plerãque aliã, ut dixi, cõpositiones
erunt, dũ medicamentis simplicibus modo com-
memoratis, uel carne expletiã, uel emollientia,
uel

uel adstringentia, uel quæ difficilia ulcera curant, cōmiferunt. Nonnulli uerò digerentia miscuerunt, sicut etiam cicatricem dēcentia: alijs autem quibusdam omnia commiserunt, uel cōfecturam inutilem, uel medicamentum uarijs accōmodum preparare contingit, quorum materias cognoscentes, tum iam inuentis uti, tum similia cōponere ipsi poteritis.

CAP. II Adscribam tamen & ego nonnulla celebra, ab ijs denuo, quæ Andromachus tradidit auspiciatus. Sunt itaq; à præcedētī trīginta ordine, quæ uerò ab ipso cōmendantē duntaxat adijciā. quartū ergo post primū ita expressum est.

Viride quo uitor.

Æruginis rāsæ denarium pondo nouem. chryfocollæ denariū pondo nouē. terebinthinæ pondo minam unciarum sedecim. ceræ minæ dimidium. aceti parū. Quid singula emplastra polliceantur, non (ut prius dixi) proposuit Andromachus, sed ex simplicium medicamentorum materie, ex quibus propositum componit, nulli obscurū est, uel ipsum per se, prius quam liquefiat, ulceribus mederi posse, ac liquatum linamento exceptum immitti. Minam uerò sedecim unciarum inijcit, nam quæ uiginti continet, ceu ad chryfocollæ & æruginis equam mensuram magna est. Post hanc uero alijs tribus seriatim productis, rursus aliā sic ad uerbum subsungit.

Aliud quo uitor.

Æruginis rāsæ pondo. mannæ uncias decem. ego libram inijcio ceræ. resinæ frictæ. resinæ liquidæ. singularium pondo quinq; olei cyathi. aceti quantum satis est: ego etiam guttæ ammoniaci pondo uncias decem pondo. Post hæc Andromachus cessat. Liqueat autem si prædictorum meminimus, etiam hoc ipsum emplastrum persimilē superiorī facultatē obtinere. Deinde aliud scribens Andromachus, sic exorsus est.

Aliud Molochinum.

Acopstea simplicium pharmacorum symmetriā, unde ipsum cōfici, his uerbis subscribit. Æruginis rāsæ pondo. picis pondo duo. mannæ pondo. ceræ pōdo duo. resinæ pōdo duo. olei pōdo. aceti quantum sufficit. hoc itaq; superioribus simile est. Manifestū uerò est utriusq; & æruginis, & mannæ parem portionē ex aceto leuigandā esse. Duplam horū, ceræ, picis, & resinæ, hoc est cuiusque pondo duo cum olei libra liquada, & sic in leuorem ex aceto redactis admiscere oportet, uti frequenter nobis dictū est, refrigerantes magis & radentes q; infundentes, ne ære iam frigido, encerides appellatas, hoc est cerę grumos fieri cōtingat. Aliud ab hoc celebre emplastrum subnectit.

Viride hecatondrachmon.

Guttæ ammoniaci denariū pondo octo. squamæ denariū pondo duodecim. mannæ denarium pondo octo. resinæ sicæ denarium pōdo duodecim. æruginis denarium pondo octo. seui uitulini denarium pondo quatuordecim. resinæ terebinthinæ denariū pondo viij. ceræ denarium pondo trīginta. olei quartam cyathi partē. aceti quātum

satis est. Hoc & magna uulnera glutinare potest, & sordida ulcera purgare, ubi ceratū inter liquefcendum assumpserit, carni producendū est. Priusquam uerò liquefactum sit, crassas ulcerū oras sanare, & sinus iungere, in totū digerere & repellere potest: nam ex cōtrarijs facultatibus mistum est. Quod succedit uiride nunc commemorato similis & potentia & usus, huiusmodi symmetriā obtinet. Terebinthinæ pondo minam. serapiadis herbæ denarium pondo uiginti quinq;. æruginis rāsæ denarium pondo decem. seui uitulini denarium pondo uiginti quinq;. ceræ denarium pondo uiginti quinq;. thuris denarium pondo duodecim. cyprinū aridis adijcitur. Ac emplastrū quod ab alijs Iis nuncupatur, ipse citra hanc appellatiōnem in hunc modum conscripsit.

Viride Epigoni.

Quantum omnes eius meminerint, nihilominus & nunc simplicium in ipso medicamentorum symmetriā adducturus sum, quoniam nonnulli in eis dissentiant. Iubet enim immittere æris uisti, salis ammoniaci, æris squamæ, æruginis, guttæ ammoniaci, aristolochiæ, & thuris, singulorum denarium pondo viij. hoc est unquam. aloes autē, myrrhæ, galbani, singulorum sesquiplum, hoc est uncia unā & dimidiam. quod perinde est, ac si dicās, drachmas duodecim. seminis aluminis rotundi denarium pondo sex. miscet etiam resinæ colophonix denarium pondo ducentorum. ceræ dimidium, hoc est centum. olei heminæ dimidiū. Quosdam ait quartam partem miscere. aceti quantum satis est. draconij radicis uncia dimidium, quod est denariū pondo quatuor. in sine autem hoc adiecit, quod in Isidis scriptura nō continetur: nam Epigonus id apposuit, atq; hac ratione Iis ab Epigoni uiridi differt. Iam uerò post nuper relata addidit Andromachus uiride Pasionis hac symmetriā. Resinæ colophonix denariū pōdo trecentorum. ceræ denariū pondo centum quinquaginta. æruginis denarium pondo octo. aluminis rotundi tantundē. æris squamæ denariū pōdo duodecim. thuris denariū pōdo sedecim. æris combusti denariū pōdo octo. salis ammoniaci denariū pōdo octo. olei dimidii cyathi. aceti quantum sufficit. Hoc medicamentū, quia salē ammoniacum prius assumpsit, magis q; superiora extrahit, digeritq; in alijs omnibus cum illis conuenit. Fortius autem magisq; utile præscripto post medium unum recenset Andromachus, quod uiride Alcionis nominauit in hac symmetriā. Terebinthinæ denariū pōdo ducentorū. ceræ denarium pondo centum quinquaginta. æris squamæ denarium pōdo decem & octo. æruginis rāsæ denariū pōdo sedecim. aluminis rotundi denarium pōdo sedecim. galbani denarium pondo sedecim. thuris denarium pondo decem. salis ammoniaci denarium pondo duodecim. æris combusti denarium pondo sedecim. aristolochiæ denarium pōdo decem. aloes indicæ denarium pondo duodecim. myrrhæ denarium pondo sedecim. guttæ ammoniaci denariū pōdo decem & octo. galbani dena-

rium pōdo duodecim. alij viij. olei heminae dimidium. aceti tantundem. Aliud inde scribit, cui titulus Athenae, id est Minerva, sicut ipse ad calcem refert. Porro simplicium eius medicaminū symmetria unde cōponitur, in hunc modum habet. Cerae denarium pondo ducentorum quinquaginta. terebinthinae denarium pondo ducentorum. frictae denariū pōdo centum. seui uitulini denarium pōdo quinquaginta. galbani denarium pondo uigintiquatuor. mannae denarium pōdo uigintiquatuor. salis ammoniaci denarium pondo xij. aeris uisti denarium pondo duodecim. aloes denarium pondo duodecim. aeris squamae denarium pōdo uigintiquatuor. aluminis rotundi denarium pondo duodecim. & fisci denarium pondo viij. chalcanti denarium pōdo viij. misyos denariū pondo viij. opopanax denarium pondo viij. aeruginis rase denariū pōdo sex. guttae ammoniaci denarium pōdo sex. minij sinopici denarium pōdo trium. aceti heminas tres. olei heminas ij. minimum initio indif. Athena, hoc est Minerva, uocat hoc emplastrū, utilissimū multis, ut indicauimus. quo modo autem usui erūt emplastra multis utilis, in sermone de ijs futuro significabitur. Ab hoc deinceps aliud uiride his uerbis conscripsit.

Viride ex cyprino, Aphrode. 2

Cerae denarium pondo uigintiquatuor. resinae aridae denariū pōdo duodecim. aeruginis rase denarium pondo octo. Aphrodis denarium pōdo duodecim. mannae denarium pondo octo. cyprini dimidium acetabuli. Contunditur autē cum eo, & difficilibus curatu ulceribus potest cōducere. At quae haec causa est, cur ipsum scripserit, tum quod paucis constet, tum quod utilissimum esse possit. Cum autem multa deinceps uiridia alia multiplicis mixturae & utilitatis adducat Andromachus, uisum mihi est ea relinquere, et ut ipsi uocat litas, dūtataxat percēdere. Is igitur sic ad uerbum scribit.

Aliud uiride lite, quo uitor.

Resinae pōdo libras duodecim. cerae pondo libras viij. aeruginis rase pondo libras viij. seui uitulini pōdo libras ij. aceti pōdo libram. Ego autem mannae libram iniicio. Liqueat igitur acetum cum duabus aeruginis libris, & libra thuris esse leuigandum, sicut antea precepit, deinde liquabilia his miscenda: dico autem seui libras viij. cum cere octo. & resinae xij. Emplastrū hoc lite, hoc est simplex adamusum foret, nisi adipē affumpsisset, & manna. Ita namque erugo decima amborum simul portio esset, resina uidelicet & cera. Quod si resina dura fuerit, omnino etiam olei quid addendum putabis, uti prius expositum est. Quoniam uerō seuum uitulinum recepit, nec amplius exacte est lite, ut quod molliens & cōcoquens medicamentū acceperit. Multo autem magis, si etiam mannam assumpserit, quae cōcoquit, purior mouēdo est, et carnis gignenda quamdam uim obtinet.

Communis sermo de emplastris colore similibus.

Quod sanē medicamenta non secundum coloris, sed facultatis similitudinē unā scribi cōueniat manifestum planē est. Ut ergo Andromachus, sic

alij quoque nonnulli ordine tradunt emplastra, non solū uiridia, sed etiā melina, fusca, & cāda. Quo igitur modo nō cāda, priori uolumine dictum est. Viridium uerō compositionis licet antea exposita, nunc quoque mentionem faciemus.

Quomodo uiridia fiant. Cap. III

Aerugo nō pauca ijs immittitur, ut & aliorum colorem uincat, & omnia in suum permutet. Porro cōiungere oportet eum qui tale emplastrū conficit, praeter aeruginis quantitatem, etiam colorem illorum quae ipsi commiscetur, ad hęc coctionis rationem: in ijs qui miscētur quidem, colores per tinaces uitare, cuiusmodi flaua & rufa, & nigra medicamēta obtinēt. Dico autē flaua & rufa, qualia sunt melitites, chalcitis combusta, auripigmentū, sandaracha. Nigra uerō, quod genus sunt, pix, bitumē, terra ampelitis, lapis gagates. At inter cōquendum nō oportet aeruginem super ignem cōcumbentibus committere, uerum ubi in mortario unitas facta est, admiscere, si colore uiride medicamentum permanere desideras: sin autem melinum uoles emplastrum conficere, intelligito in cōcoctione aeruginem primum in hunc colorem perducipostea in giluum, ut emplastrū quod à duplici colore Graece dichromō appellant, euadat. Etenim à cōcoctōis tempore paucis diebus post in summo quidē fuscū magis redditur, in imo gilū simul apparet. Quoniam uerō de ipsorum colore quae conueniebāt diximus, rufus ad facultatis sermonem reuertemur, memoria repetētes, unde primū hoc in libro exordium sumperimus. Agere autē cepimus, si quid meminimus, de medicamētis carne generatibus, quorum potestatis scopus est, ut mediocriter & sine morsu detergeat exicēctq; at speciales cōfecturae pro diuersa simplicium pharmacorum materie differūt. Ceterum nemo ignorat ea, quae proprie & primario sarcotheca, id est carne progignētia nominātur, minime periculosa uelera carne implere, hoc est quae caua quidē sunt, nō tamē sordes, aut inflammationē coniunctam habent, magis uerō etiam nec prauorum humorum influxionem, neque carnē in cauo ulcere intemperatam. Nam praedictorum aliquo cauitati immisso, prius illud curandum est. Consilia uerō curatōis ipsorum sunt, sordidis detergētia pharmaca adhibere, profluentibus exicēctia, atque id quod influit repellentia. At si multitudinē laboret, & contumax existat, fluoris causa prius amputanda est. Constat autem & inflammatorum phlegmonem sanandam esse: carnē intemperatam hanc ad temperiem reducendam. Porro intemperata iam facta, quatuor sanē modis simplicibus, quatuor itē compositis, per cōtrarias qualitates succurretur. Sed de his & postea: nunc autem de medicamentis uehementis detergentibus agemus.

De pharmacis ualde abstergentibus. Cap. IIII

Quod haec ex praedictorum genere sunt quae ob moderatā detersionē cauis ulceribus puris apertis sine omni morsu admouebant, antea diximus. Intensem uerō detergēdi uirtutem obtinent, quae copiosas sordes auferūt. Quare nonnulla ex praedictis

dicētis uiridibus medicamētis una re solum, nempe aruginis copia, ab ijs quæ simpliciter carnem producunt, euariant. Quædam & aliorum uehementer detergentium mixtura, sicuti uocatum lsis & Machæronis emplastrum, quod nos pro more usurpamus, oleosum ex usu nuncupant. Vbi enim sinum carnē implere proponimus, copiosiore oleo liquefacientes, per cornu recti foraminis modo clysteris porcinæ uesicæ coniuncti ipsum infundimus. Quin & uocatis pyulcis, hoc est pus trahentibus, in eo utimur. Et enim horum etiā in quibus latius foramen est, ad huiusmodi administrationem commodi sunt. Cui uerò non est perspicuum, sinus oppletos foridibus, ex meraciore hoc medicamēto purgari, id est oleo pauciore adhibito: rursus puriores ex humectato magis olei uberiores mixtura: Itaq; si paruè adhuc phlegmones sinum infestantis suspicio quæpiā existat, medicamentum ex rosaceo prorsus liquefiat. Sin à phlegmone fuerit liber: ex oleo, etsi citra efflorescentem ueteris mixturā sustinuerit, illo pharmaco liqueatur. Ceterum in huiusmodi usum non solum hoc, sed Machæronis quoq; emplastrum, & lsis, atq; alia faciunt, quæ maiores nostri perspicere, cerato mista, cauis ulceribus carnē inducere. Omnia namq; hæc sine cerati mixtura ex oleo & rosaceo liquefacta, sinibus immittuntur, eo quod consistentia quæ linamento excipitur (Emmoton syntalin Græci uocant) sinibus illini non potest. Pariter modo & medicamentum siccum, quod combusta charta constat, rosacèo copiosiore diluētis, ipsi infundimus. Quemadmodum uerò sinus liquidioribus pharmacis indigent, dum crassiora imponi nequeunt, ita quæ in summo caua ulcera affligunt, crassius medicamentū desiderat, hac uidelicet occasione, q̄ liquida statim ab eis decidunt, & linamenta sicca relinquuntur. Merito igitur istud genus uitij ceratum ualde abstergentibus admulcemus: in sinibus oleū, uel rosacèi plurimum. Atqui hæc in eum modum abstergentia pharmaca omnino etiā digerunt, ideo q̄ uehemētèr excitant, ac cōmune quoddam ipsorum genus efficiunt, quod Græci polychrestum, id est multiplicis usus appellat. Accedunt huic generi emplastra admodū acria, qualia sunt ea quæ Dialō, id est ex salibus nominantur, quæ nō offerenda sunt ubi carne quicquam expleri cogitamus. nam præter alia hoc quoq; sal eximium habet, ut astringat magis, q̄ purget: siccat uerò nihilominus q̄ aphronitū ac nitri potest. sed illa astringendi facultatem nō agnoscit: sicut nec Asiae petre flos. Atq; huius rei gratia discutere; & ceratis admista ulcerū fordes tollere nata sunt. Sal propter astringendi potestatem hoc efficere non potest. Proinde cū hæc in memoria habeatis, & methodum cōpositionis uisus; omnium eiusmodi medicamentorū audientis, deinceps illa quæ à clarissimis medicis propter optimorum medicaminum cognitionē, usū atq; experimentis probata sunt, enumerabo. Primum sanè Mantæ, atq; eius discipuli Tarētini Hætelididis sectatorū permulta pharmaca, quæ subse-

quentibus annis per experientiam probantes distinxerunt, & præstantissima eorum ipsi denuo literis mandarunt: quæ uerò minus efficacit̄ habere uidebant, omiserūt. Iure igitur et ego maiorem facio mentionē eorū, qui illis successerunt. Sunt autem inter eos, qui in medicaminum experientia rectissime se gessisse uident, Petronius, Musa, Heras, Andromachus, Asclepiades, & Crito. Iam uerò Archigenes et Philippi studiosi nō pauca medicamenta prodidere. Quin etiā liber unus est Menecratis, cui nomen inditum est, Insignium pharmacorū uero creator hologramatos, quasi dicas imperator integris literis descriptus. Quæ ergo pulcherrima ipsis tradita sunt medicamina, & commendantur, quorum q̄ nos inter omnia relata experientiam habemus, & quibus præceptores nostri usi sunt: ad hæc si quod & nobis inuentum sit, deinceps adducam, quo singula genere cōtineantur exponens. Nunc autem uiridibus relatis, melina protinus subiungam.

Melina emplastra. Cap. V

Quemadmodum uiridium emplastrorum plurima propter aruginem præpollentē talia sunt, præsertim quæ sunt ex ipsis coloratoria, ita quoq; melina. Sed uiridia aruginem incoctam habent melina uerò coctam quidē, sed mediocriter. nam si amplius coquas, ambigui coloris emplastra quibusdam appellata, quibusdam gisua, efficies. Solent medici uiridia simpliciter melina & rufa nominare, quæ non ad eō magna uulnera glutinant, & ulceribus cicatricē obducunt: quæ mos est medicis appellare aperistata, quasi dicas minime periculosa, & nulla grauiore incommoditate affligentia. Itē ex rosaceo liquefacta cauis carnē gignunt. Multiplicis usus sunt inter ea quæ plura pollicentur. Quædam multa nō promittunt, sed unum mentio dignū, uidelicet uel ulcera cacœthæ bene curare, uel pus digerere, uel meliceridas, uel duritias emollire, uel huiusmodi quid nō cōtemnendū, nec curatur facile. Andromachus itaq; quatuordecim melina cōscripsit, ex quorum numero quinque aruginem habent: reliqua sine hac confecta sunt. Porro ex his quæ aruginem constant, unū quidem primū inter quattuordecim positum est: alterum uerò quartum, post hoc aliud sextū, id est septimum & decimum. Quibus ergo nihil eximij appositū, omnia simul & conglutinant ulcera, & cicatricem inducunt. Quæ si ex rosaceo liquefiat, carnem procreant. Quin & medicis phlegmonis incedunt, sicut mediocres etiam duritias emolliunt, atq; hoc faciunt euidentius, quæ guttam ammoniaci cōtinent. His adhuc ipsis magis, quæ copiosiore reliquorum proportionē eam assumpserunt: in quibusdam uerò apposuit ipse, tenerum, hoc est tenere cuti cōueniens uidelicet & cui præfixit epispasticum & exipicoē, id est atrahens & eruēs, inuuit membrorum doloribus, synanchæ, & lateris cruciatui benefacere, uel interiores abscessus discutere: magis quoddam testimonium his afferēs, q̄ simplici sermone scriptis. Igitur omnia ipsa deinceps subiiciam.

Melina Andromachi. Cap. VI

Melinum quo utor. Spumæ argenti denarium pondum centum quatuor, olei heminā, hyeme tres cyathos, ceræ denarium pōdo quadraginta octo, colophonix denarium pondum quadraginta octo, guttæ ammoniaci denariū pōdo uiginti quatuor, æruginis rasæ, chalbanī, myrrhæ, singulorū denarium pondum octo. Aliud, Spumæ argenti denariū pōdo centum, olei tres cyathos, resinæ colophonix denarium pondum sexaginta quatuor, guttæ ammoniaci denarium pondum quadraginta, cerussæ denarium pondum uiginti quatuor. Aliud, Spumæ argenti denariū pōdo xl. cerussæ denariū pōdo vi. ceræ tyrrhenicæ denariū pōdo sedecim, resinæ pityinæ siccæ denariū pōdo sedecim, guttæ ammoniaci denariū pōdo ij. alij heminā. Aliud, Spumæ argenti denariū pōdo centum, colophonix denariū pōdo sexaginta quatuor, alij quadraginta octo. ceræ denariū pōdo octoginta quatuor, chalbanī, myrrhæ, æruginis, singulorū denarium pondum viij. opopanaxis denariū pōdo vi. olei heminam æstate, per hyemem uerō tres cyath. Aliud,

Spumæ argenti denarium pondum centum, resinæ pityinæ denarium pondum centum. ceræ denarium pondum duodecim. olei tres cyathos. uini falerni heminæ dimidium. spuma argenti ex uino leuis fit, donec siccata fuerit, deinde coquitur. Aliud, Spumæ argenti denariū pōdo centū. olei ueteris heminas duas. ceræ denariū pōdo centū. æruginis scolecix denarium pondum uiginti quinque, chamaeleontis nigri denarium pondum duodecim, ac semissim. chryso collæ denarium pondum quadraginta. Aliud, Spumæ argenti denariū pōdo ducentorum. olei ueteris heminas tres. ceræ denarium pondum centum sexaginta octo. guttæ ammoniaci denarium pondum centum. myrrhæ denarium pondum quatuor. æruginis denarium pondum octo. resinæ colophonix denariū pōdo centum uiginti octo. galbani denarium pondum uiginti. chamaeleontis atrī denariū pōdo octo. alij propoleos denarium pondum octo. pro chamaeleonte. Aliud, Olei ueteris in quo chamaeō seruefactus sit q̄ copiosissimus sextariū. spumæ argenti pōdo. ubi ebullierit, argenti spumam inspergito, & coquito.

Aliud ad nomas, id est ulcera de pascencia.

Sandarachæ denarium pondum trimum. aluminis fisis denarium pondum quatuor. thuris denariū pondum quatuor. myrrhæ denariū pōdo quatuor. guttæ ammoniaci denarium pondum octodecim. ceræ denarium pondum octodecim. terebinthinæ denarium pondum sex. adipis suilli denariū pōdo duum. mellis decimam sextam heminæ portionem. Aliud, Spumæ argenti denarium pondum centum octo. ceræ pondum denarium pondum centum octo. alibi centum inuenio. guttæ ammoniaci denarium pondum quinquaginta. terebinthinæ denarium pondum quadraginta. aristolochiæ denarium pondum uiginti quinque. xyridis radices denariū pōdo octo. æruginis scolecix denarium pondum sedecim. aluminis fisis denarium pondum sedecim. olei ueteris binas heminas.

Aliud simplex.

Spumæ argenti denarium pondum centum. æruginæ denarium pondum septuaginta quinque. olei ueteris pōdo denariū septuaginta quinque. Ad mollitiam carnis præditos facit, & digerit.

Aliud melinum emolliens. Diaphantis aphra nominatur, attrahens & eruens, quo articuli curantur.

Visfi elaborati pōdo. ceræ pōdo. resinæ terebinthinæ pōdo. chalbanī unc. iij. liquefactis uitior.

Aliud, Salome, ad omnem dolorem, & anginam, synanchen post cucurbitulas, & ad lateris affectum.

Spumæ argenti pondum libras duas. olei ueteris uncias viij. simul coquito.

Aliud melinum Heraclidis, interiores abscessus sine dolore discutiens. 2

Spumæ argenti denarium pondum centum, cerussæ denarium pondum centum. ceræ denariū pondum octoginta. resinæ aridæ denarium pondum sexaginta. guttæ ammoniaci denarium pondum quinquaginta. galbani denarium pondum sedecim. olei ueteris heminas duas. Vt autem rusticus ille famularis Iliodor, spumæ argenti denarium pondum quinquaginta. cerussæ denarium pondum quinquaginta. guttæ ammoniaci denariū pōdo octo. ceræ denarium pondum uiginti quinque. resinæ aridæ denarium pondum triginta. ulmi in sacculis ex corio reconditæ denarium pondum quindecim. galbani denarium pondum octo. olei tres cyathos. Inter hæc emplastra nullius coctionem scripsit Andromachus, ego uerò ad colorē ipsorum pertinere dixi, scilicet nec æruginem crudam esse oportere, ut in uiridibus, necq̄ nimis coctam, sicut in ijs quæ duplicis coloris & gilua nominant. Verū ubi iam cacabus ab igne auferendus propemodum est, in ijs ærugo debet. Deinde cum mutat colorem, & melinum redditur, medicamentum tollere ab igne tempus est, si iam nō in quinet. Sin minus paululum super ignem lentissimum remorati sic collemus. nam in admodum uehementi facile in giluum degenerat, cuius rei gratia alia quoq̄ duo insignia emplastra melina, alterum Mencei, alterum Serapiōis subiungam, quorum coque dē rationem pleriq̄ tradidere, et uos cōfecturæ eorum quæ Andromachus scripsit, exemplum habebitis.

Mencei melinum.

Spumæ argenti pōdo quatuor. olei pōdo tria. terebinthinæ pellucidæ pōdo duo. ceræ pondum. æruginis, thuris, galbani, singulorum pondum uncias quatuor. guttæ ammoniaci pōdo uncias sex. Argenti spuma ex oleo ad multam spissitudinem usq̄ incoquitur, deinde resina, ceræq̄ inijciunt. cum pulchre soluta hæc fuerint, cacabus deponitur, & refrigerari bene sinit, post illa ærugo immittitur, & ubi infra motum fuerit, denuo super ignem lenem coquitur, donec melinum colorē repræsentet, postremo galbanum, & thus, leuia facta, ac in mortariū demissa, ubi ammoniacū ex aceto in leuorem redactum est, ut forditū imaginem habeat, statimq̄ manibus subacta excipiunt, & aceto modico affuso in sequentem diem usq̄ relinquuntur, ac tunc rursus emollita reponuntur.

Melinum

Melinum Serapionis ad uulnera, & ad resoluendum pugibus utilissimum.

Spumæ argenti denarium pondo centum, guttæ ammoniaci denarium pondo uigintio octo, ceræ denarium pondo quinquaginta sex, æruginis cypræ denarij pondo nouem, myrrhæ denarij pondo unius, colophonæ denarium pondo quinquaginta sex, chalbani denarium pondo nouem, olei tres cyathos; estate cyathum & dimidium. Argenti spumam ac oleum coquito, cum inalterata sunt, ammoniacum, deinde ceram, & postquam deposueris cacabum, chalbanum, æruginem, & reliqua addito, atq; molliet incoquito. Huiusmodi coquendi modos, melinorum que scripsimus emplastrorū, multi me priores tradidere, iuxta quorum similitudinem etiam alia melina coquere poteris. Argenti spumam sanè primum inijcere conuenit, mox resinas & ammoniacum, deinde chalbanum & æruginē, postea si uel thus, uel myrrham, uel aloem capiat, hæc immittenda sunt, cum medicamentum ab igne tollitur, quippe coctionē non ferentia. Prædiximus autem lente coquenda esse, præsertim cum ærugo indita fuerit: quin & ipsam miscendam, ubi cacabū in terrā deposueris, ac parum refrigeraueris, idq; magis, si uas paruum sit, in quo coquitur. Nam effervescenti immixta ærugo, frequenter ex ipso uase diffundit medicamentum cogit. Porro in Menoceti primo melino, quod ideo pugillatoriū (ut ita dixerim) uocat, quoniam pugiles polysimum medicamēto eo utantur, ammoniacum quoq; ex aceto leue in mortario fieri posse, alijs omnibus in cacabo mistis, deinde ex ipso defulsis, prius instituti sumus.

Hæc emplastra, ad strumas. 3

Quæ ab Hera conscripta sunt, hunc in modum habent. Melinū ad ueteres sinus, & si in uacua perforati sint. Idem etiam dicitur strumas quæ in pueris nuper ortæ sunt. Facit etiam ad artus è loco motos. Argenti spumæ chrysitidis denariū pondo centum, resinæ pityinæ sicca tantundem, ceræ ponticæ denarium pondo duodecim, & scrupula duo, olei tres cyathos, uini salerni tantundē, argenti spuma ex uino letigatur, donec rursus siccescat. Post unā cum oleo sic coquitur, quousq; mutata fuerit, & tunc resina leuis additur, ac cera, & coquitur, donec non inquinet.

Menicis, coloris aurei. Ad teneros, maxime euuochos facit: aptum est ad rhas, & omni inueterato & recenti ulcere, itidem combusis.

Est etiam magma dicitur phymata, paroidia, strumas, & omnes duricias. Vallet etiam ad rhas gidas, & ad condylomata, ualde generosum est.

Argenti spumæ denarium pondo centum, olei ueteris denarium pondo centū, resinæ pityinæ arida denarium pondo quinquaginta, uel centum, ceræ denarium pondo quinquaginta, argenti spumam cum oleo coquito, donec unitas fieri inceperit; mox resinam leuem indito; hac liquata, ceram; ubi bene habuerit medicamē, in mortarium oleo prius inunctum demittito, & denuo tritum excipito; est autem glutinans, nec polluit.

Galen.

A Hygini emplastrum ad multa boni coloris, curat ulcera uix cicatricem dicentia, & paronychia; hoc melius emplastrum non existat.

Argenti spumæ chrysitidis minam, ceræ tantundem, chameleontis nigri radicis denarium pondo triginta sex, æruginis rase denarium pondo octo decim, chryso collæ denarium pondo quadraginta, olei ueteris heminas tres, Argenti spuma cum oleo igne non acri coquitur, usq; dum effervere ceperit; deinde erugo inspergitur, cacabo deposito, atq; iterum reposito, emplastrum permouet, quousq; proprium colorem receperit, postea cerā, quæ ubi bene se habuerint, chryso collā & chameleonem assumunt. Demissis tam in mortarium acetū superfunditur. Itaq; prædictis affectibus bene facit etiā chryso colla admista, attamen sine hac mitigatissimum est, & præcipue ad neruorū puncturas ualet, itidem ubi à musculis uel neruis abluere quid oportet. Horum trium emplastrorum quæ Heras conscripsit, primum ex uino & confectionem & titulum habet, multiq; nostri tam præceptores q; amici eo sine æruginē uidelicet præparato, utuntur. Scripto autem ab Andromacho & fere omnibus qui uaria emplastra composuerunt. Proinde non pauci illorum incuriose ipsum conficientes, contemptū emplastro pariunt. Optimum uero est, si uti tradidimus, ex uino salerno conficiatur, cuius penuria giluum uetus, tenue substantia, & quā giluum inueniri potest, immiscebimus. Nam candida hoc peculiariter habent, ut pelluceant. Porro præstantissima apud nos sunt in Asia tria, Tmolite uocatum, Lesbium, ac celebratissimum apud ueteres Ariusium, in Chio proueniēs, quo omnes ad optima medicamenta, præsertim antidotos, sicut nunc salerno utebatur. Huiusmodi igitur uinum, si in argenti spumam sub canicula æstu, uel sole alioqui calido mittamus, deinde teramus, uel sine sole etiā diu teramus, ut humor siccescat, ipsaq; argenti spuma relinquatur, uel omnino madoris expers & licca, uel propè fiat, medicamentum optimum euadit; unum sanè ex præceptoribus meis postq; in uino salerno tritam excicasset, hoc modo ipsam præparabat. Oleum alio, uinum item alio uase calefaciens, paulatim argenti spumæ superfundebat interim uino, in quo leuigata probeq; permixta, oleū adijciebat; interdum ab oleo auspiciatus ad uinū transibat. Alternis autem uicibus hoc sæpius agendo utrunq; consumebat, & sic ex mortario in cacabum demittens, pityinam resinam, quam proprie physema Græci uocant, leuem adamussim factam addebat, mox ceram, & sensim quoad non inficeret, decoquebat. Utebatur eo & ad sinus, illinēs prius sanguine columbæ non domesticæ, sed ex eis (boscidas quidam nominant) que in turribus nidum collo cant, quas apud nos in agris extruunt; nonnulli has agrestes uocant. Pari modo magnis uulneribus, recentibus, huiusmodi sanguine columbino illinens, medicamentum imponebat, non mediocri eius cōfidentia. Vini autem heminam & semissem indebat, non ut Heras & Andromachus semissem

tantum. Atq; huius occasione medicamen longe melius factum est. Cæterum ubi ipsum uoles boni odoris efficere, opopanax semunciam, quod est denarios quatuor, miscebis. Coloris gratia, ceram candidam posticā adijcies. Hoc medicamentum ulcera uel ad usq; cicatricem probe perducit.

Critonis medicamenta. 4

Quæ Crito melina scripsit, buxæa nominat. Buxæum ad recentia uulnera: idem cicatricem obducit & extrahit. Spumæ argenti pondus quatuor, ceræ pondo totidem, terebinthinæ pondus uncias octo, æruginis tantundem, olei ueteris sextarios ij, aceti sextarij dimidiū. Spumā argentæam, oleum, æruginem, acetum, unā super ignem lentum incoquito. Vbi uero coitura sunt, resina ceræq; adiungatur, & in unum redactis ad recentia uulnera potissimum utitor. Scripsit & aliud ante hoc Crito, quod buxæum uocat: simplex quidem quantum ad mustorum numerum pertinet, magnum uero pollicitus: scribit igitur de ipso ad uerbum hoc modo.

Emplastrum ex chameleonte, eadem faciens quæ Tyria: cicatricē ulceribus difficillimis, callosis, & inueteratis maxime inducit. Medetur etiam rhagadijs digitorum, condylomatibus, & duricijs.

Spumæ argenteæ pondus minam, ceræ pondus minas sex, æruginis pondus minas quatuor, chameleontis pondus minas octo, olei pondus minam, oleo spumam argenteā coquito, rudicula mouens, donec consistat, & fiat melinum. post hoc æruginem inspergito, inde ceram adijcito. Porro ubi diligēter liquata ab igne tuleris, chameleontem indito: quum unitas facta est, in mortarium demittito, ubi subacta, excipito. Iam uero & alia quædam emplastra Crito tradidit in quarto Medicamento rum uolumine, buxæa quidem, ut ipse nuncupat, melina uero ut alij. Attamen nonnulla ex ijs citra æruginem componuntur, nonnulla ærugine quidem assument: sed in alio pharmacorum genere pro facultatis seu uirium similitudine dicuntur, in Epuloticis Epulotica: in ijs quæ succis consistant, ex succis composita, in mollientibus, illa quæ mollire nata sunt, quemadmodū & Mnasæi emplastrum multifariam ab eo in hoc opere conficitur. Nunc igitur ad glutinantia ire iam tempus est: colore inuicem, & à melinis differentia.

De giluis siue suluis emplastris quæ Dichroma, id est duplicis coloris dicuntur. Cap. VII

Quædam ex eadem materia constant, qua æruginem habēt melina: sicut prius quoq; diximus, hoc solo differentia, quod diutius coquantur. Omnia siquidem propter crudam æruginem uiridia, sunt melina, ubi mediocriter ipsa cocta fuerit: gilua, ubi liberalius. Manifestū igitur melina giluaq; oleum copiosius quam uiridia necessario habere: et si reliqua omnia eadē recipiant. Atq; huius gratia, primum spuma argenti cacabo iniicienda est, in quo tantisper coquetur, dum sordium crassitudinem consequatur, mox ærugo: deinde si metallicum aliquod, ceu æs combustum, eiusq; squama immittatur: ac quando spissitudinem acceperint, tunc ceram & resinam, si hæc etiam medicamentū recipiat, indere conueniet: postremo, thus, myr-

ram, aloen, aliāq; id genus, sicut celeberrimū giluum, quod ex dictamno uocatur, sacrum et ipsū appellatum, uelut Isis: quoniam aīunt ea ex lacris Aegypti locis esse allata. Vsum igitur hoc præstat multiplicem: proinde in sequenti sermone simul cum ijs quæ ad plura ualent, paulo post describetur. impræsentiarū de alijs giluis, tum omnino simplicibus, tum ijs quæ inter hæc & polychresta, id est multipliciter utilia consistunt, uerba facturi sumus. Vt igitur uiridia emplastra simplicia ex cera, resina, oleo, & ærugine conficiantur iuxta dictā silic symmetriam, sic gilua ex argenti spuma & oleo copiosiore quam in uiridibus sumpto componuntur. Itaq; si emplastrum largius uoles coquere, augeasq; oleum, medicamē habiturus es, quod magis siccet, id eoq; uulnerum cruentorum glutinantius: sin autem mediocriter, tantam olei mensuram quantum argenti spumæ pondus esse sufficit: libram enim olei mensuralem Romanorum in argenti spumæ librā ponderalem iniiciemus. Iam si pharmacū plenius incoquere placet, non solum unam librā semissem, sed etiam duas & plures immitteris. Porro inter hæc gilua emplastra sic præparata, plus siccant, quæ nec resinā, nec ceram omnino habent, sed ex solis, ut uocant, metallicis conficiuntur: quemadmodum alij quoq; nonnulli ex prioribus talia scripserunt.

2 Cæterum quo ego semper mea industria compositus utor, in hunc modum coquitur. Argenti spumæ cum oleo prius cocta, metallica ex aceto leuigata immittō, & sic coquo, donec non inficit. Addō his olei lib. quatuor: hoc autem quantum uetusius, tanto erit melius: magisq; si id fuerit Sabinum: argenteæ spumæ libras tres, aceti quam acerrimi libras duas. Horum trium metallicorum, squamæ aris nigri, æruginis, chalcitidis, singulorum æquale pondus, nimirū uncias duas, hoc est denariū pondus sedecim. At cum uetus oleum est stit, crassumq; ex uetustate, quatuor libras semissem immittito: nos & quinque interim, idq; per hyemē indidimus, non ignari hyeme plus olei, quam per æstatem immiscendum. At argenti spumam prius uidelicet coques, donec sordium crassitudinem recipiat. Quod si & oleum cicinum habes, id pro uetere usurpato: medicamentū hoc cruenta uulnera facile glutinat, magisq; in duris corporibus quam mollibus: cuiusmodi sunt mulierum, puerorum, & eunuchorū. dilutum quoq; ex oleo cicino uel ueteri, ac linteo exceptū impositumq;, mirum est quam ulcera curatu difficillima concoquat, quæ pus nequaquæ faciunt. Ad hæc linus conglutinat, & fistulas astringit, excicat, & proflus claudit. Atq; ubi iam ipsum hæc polychre uelis efficere, metallica pluribus diebus aceto longe acerrimo conterito, ac potius in sole: pari modo argenti spumā trita exccatamq;, & oleo postea mistam, eo quo dixi modo incoquito. Attamen ad ulcera quibus cicatrix difficulter induci potest, metallica sic elaborari, & argenti spumā ita coterere non est necessum. Etenim sine his quoq; Epuloticorū, quasi dicas cicatrici ducēdæ promptus illud euadit

curat. Adhiciatur autē tunc ei diphrygis & chry-
socolle singulorum uncia: at hæc non simul cum
squama & arugine committuntur, uti nec ubi iam
coctū medicamentū fuerit omnino, sed eo quod
intercedit tempore. Tantā enim huiusmodi phar-
maca coctionem requirunt, ut ex hæc cum priori
bus in unū coeant: quod mediocri intervallo acci-
dit, neq; multo ante, nec paulo minus quam caca-
bus ab igne tollatur. Solum itaq; hoc emplastrum
fistulas, sinus, & magna uulnera glutinare potest.
Iuuat ipsum spongia recens, non dura, ueteri uino
respersa. Deligatura in sinibus ab imo fiat, ligamē-
to ad ostiolum perueniente, sicut in sermone De
fistulis clarius ostenderetur.

De ijs que cicatricem obducunt. Cap. VIII

Emplastra cicatricem inducentia, siue synuloti-
ca, siue epulotica nominare uelis, sicut etiam alia
medicamentā epipasta, id est que insperguntur, &
quæ linamentorū usū apponuntur, nihil ut ad cu-
rationes eorum differentiæ adfert, si qualis quodq;
facultatis medicamentum huiusmodi esse debeat
memineris, quā simul cū reliquis omnibus in The-
raputicis methodi libris explicauimus. Quanto
enim glutinantia sarcoticis, id est carnem generan-
tibus, siccare magis ostensa sunt, tanto glutinantibus
epulotica. Nam ipsorum beneficio carnem ca-
uis ulceribus generatam, cutē reddere statuiumus,
ob quod etiam tale pharmacorum genus, siue illi-
nendum, siue inspergendum sit, astringere oportet.
Hic autem illorū duntaxat emplastrorū men-
tionē facere cogitamus: si quidē ea quæ linamen-
tis excepta imponuntur pharmaca, ex his rosaceo,
uel myrteo liquatis fiunt. Atq; myrteum rosaceo
hoc magis conducit, quo uehementius astringit;
at si neutrū habeas, ex cyprino, lentiscino, & me-
lino liquanda sunt: si his quocq; careas, ex ompha-
cino, uel eo quod ab Hispania portatur, Hispanū
nominant: ubi nec huius copia adsit, teneros oli-
uarum surculos cōtusos alij cuiuspiam uulgari oleo
admiscebis: quod si hos etiam desideres, præstat
oleo uetere liquifacere: hinc enim medicamentū
siccandi uirtute augebis. Proinde pleriq; medico-
rum, à pharmacis quæ optimi quicq; medici longi
temporis experientia satis probarūt, eoq; nobilita-
reddiderunt, hac ratione solum abstinere, ut ipsi
melius quippiam præter maiores habere uideantur.
Attamē ex medicamentis celebribus, quæ cō-
mendantur omnibus, sciendū est, id quod ex cad-
mia, quodq; ex ladano inscribitur, ad cicatricem
ducendam utrunq; esse præstantissimum. Quan-
quam apud omnes mixtura simplicium pharma-
corum symmetriā eandem non sit inuenire. Qua-
propter uisum mihi est eas quæ cuiq; scriptori pla-
cent describere, auspiciā à proditis Asclepiadi in
tertio de Exterioribus cōmentario, quæ Marcel-
las inscribit.

De Epuloticis emplastris Asclepiades sic memoria
prodidit. 2

Postquam ulcera particularia sine alia dispo-
sitione ad cicatricem iam tendunt, ut edum est ijs
compositionibus quæ infra scribuntur.

Galen.

A Emplastrum ex cadmia, ad cicatricem ducendam: hoc Lucius Ca-
thegetes, id est præceptor usus est.

Cadmia ustā & uino extincta, chalcitidis to-
stæ, singulorum denarium pondo sexdecim. ceræ
denarium pondo octoginta. picis colophoniacæ
pondo uncias octo. uini Italici quod satis est. chal-
citis & cadmia ex uino terantur, ut humidis cer-
a spissitudinem habeant: ceram & resinam perfra-
ctam in uas fictile immittito, atq; his olei myrtei
pondo libram adijcito; deinde carbonibus super-
ponito, mouēs sine requie: cum soluta fuerint, ab
igne tollito: ubi refrigerint, radito, leuigatisq; in-
dito, ac mista excipito, in usu oleo myrteo subigi-
to, temperatura dispositioni respondeat.

Aliud ex cadmia.

B Cadmia tostæ, chalcitidis tostæ, diphrygis, sin-
gulorum denarium pondo sexdecim. ceræ, resinæ
frictæ, olei myrtei, singulorum pondo selibrum. uini
Italici quantum satis est. præpara quomodo di-
ctum est, ac utitor nunc diluto, nunc mero phar-
maco. Aliud, Argenti spumæ, cerussæ, cadmiæ,
diphrygis, resinæ, singulorum denarium pondo
octo. chalcitidis denarium pondo duum. ceræ de-
narium pondo octo. myrtei olei quod sufficit. uini
aminæi quod satis est.

Aliud Euphratoris.

C Diphrygis, misyos tostæ, singulorum denarium
pondo octo. chalcitidis tostæ, molybdænæ, sin-
gulorum denariū pondo duum. cadmiæ denarij pon-
do unius. ceræ denarium pondo sex. colophoniacæ
pondo uncias tres. myrtei libras tres. uini Italici
quod satis est.

Aliud ex ladano accommodatum medicamentum, non solum cic-
atricem ducens, sed etiam callos excindens, & male
curata infirmitas.

Chalcitidis, argenti spumæ, ladani, singulorum
denarium pondo uiginti quatuor. bituminis dena-
rium pondo octo. ceræ denarium pondo septua-
ginta duum. myrtei heminā, alij drachmas decem
& octo. uini heminam. præparato in modum præ-
dictū: cum res exigit, & splenio, & diluto utitor.

D Aliud, Argenti spumæ denarium pondo cen-
tum. picis denarium pondo quinquaginta. ladani
denarium pondo uiginti quinque. æruginis rasæ, æ-
ris combusti, singulorum denarium pondo octo.
olei myrtei libras duas. æris squamæ denariū pon-
do quatuor. conficito ac utitor.

Aliud quod Pyricauton dicitur, ex attalici uirtutibus
medicamentum accommodatum.

Olei heminam. aluminis fisisi, manna, thuris, ar-
genti spumæ, chalbani, singulorum denarij pon-
do unius. ceræ denarium pondo uiginti quatuor.
anchusæ denariū pondo octo. medullæ ceruinæ,
adipis suillæ, æruginis, cerussæ, singulorum dena-
rium pondo duum. ouorū trium lutea. quæ liqua-
ri possunt, siccis immiscetur. Hoc pharmaco aliàs
diluto, aliàs mero utitor.

Aliud medicamentum accommodatum: facit ad ulcera uetera,
ac sanatu difficilia.

Cerussæ, argenti spumæ, aluminis fisisi, mannae,
chalbani, thuris, medullæ ceruinæ & uitulinae, sin-
gulorum

gulorum denarium pondo quatuor. ceræ, anchusæ, ouorum luteorum, singulorum denarium pondo octo. olei heminas quatuor. medullas diligenter tundito, & liquato cum his quæ liquefieri possunt, mouens anchusæ, ex qua possint ea colorari, deinde ab igne sublata, & in aliud uas coniecta refrigerari finito, deersa siccis immisceto, deinde in ulum excipito.

Candidum quod magnum dicitur, medicamentum accommodatum. ualet & ad diuturna uulnera, & quæ uix cicatricem recipiunt: item scabiosos affectus: benefacit & sedis uirij rosaceo diluunt.

Argenti spumæ denarium pondo centum. ceræ denariū pondo quinquaginta. cerussæ denarium pondo centum. terebinthine denarium pondo uiginti quinque. thuris denariū pondo uiginti quinque. aluminis fisci denarium pondo duodecim. olei heminas duas. Componitur simili modo, & utitor interterim emplastro, interim diluto medicamine.

Aliud cui nomen est P amphibion, ad idem: insuper sinus conglutinat, & fistulis callum exteri. ualeat ad ulcerum fluxiones, tuam ad diuturna, & dysepulota, scabiemq; sanat, tollit fugillata, benefacit caput dolentibus, & oculorum epiphoris fronti inpositum, nec minus sedis conuenit, diluunt rosaceo uel inrtyre: ceterum in hunc modum componitur.

Argenti spumæ denarium pondo centum. ceræ denarium pondo quinquaginta. terebinthine denarium pondo uiginti quinque. thuris denariū pondo uiginti quinque. cerussæ denarium pondo centum. aluminis fisci denarium pondo sedecim. pipe ris albi denarium pondo trium. olei ueteris heminas duas. Liquato ut dictum est, nunc diluto medicamine, nunc emplastri modo utens: nam in capitis manantibus ulceribus, quæ achores Græcis dicuntur, & oculorū asperitatibus, del in ijs quas epinyctidas uocant, uel ani uirij dilutū pharmacum myrteo, uel lentificino illinitur.

Aliud Telamonis, pharmacum accommodatum. Facit & ad carabunculos: sinus excicat immixtum uel instillatum: ad hæc cicatricem probe inducit.

Pityinæ, ceræ, calcis uiuæ, argenti spumæ, singulorū denarium pondo quinquaginta. cerussæ denariū pondo uiginti quinque. olei tres cyathos. Argenti spumam oleumq; dum in unum coeant, incoquito, mox ceram, inde resinam. Porrò calci & cerussæ in leuorē redactis liquabilia indito. Dum ueteris, oleo cineri calido superposito, medicamen confringendo inijecto. Vbi incaluerit, mortario superfundito, & diligenter subigito, donec sordium spissitudo fiat. Ab igne deposito utitor tantquam maximo pharmaco, aliàs pennis illinens, aliàs instillans. Cæterum carbunculis uocatis, linteo illo illitum adhibeto.

Aliud Moschionis, celebre ad qualibet à callo uinducanda, & cicatrice obducenda. idem & sedi prodest insigniter.

Argenti spumæ, cerussæ, calcis uiuæ, singulorū denarium pondo octo. medullæ ceruinæ, ceræ, utriusq; denariū pondo sedecim. olei myrtei quantum satis est. Quæ liquari possint, aridis immiscetur, et mollita curiose in pastillos digeruntur: cum uti uoles, prius aqua uel lacte diluetur quantum lubet, ut sordium crassitudinē habeat. Deinde rosacei quod sufficit, immittitur, uel myrtei. Contu-

sum diligenter in plumbeam pyxidem reponitur; usui est, quem admodum prædiximus.

Epulotica Andromachi. 3

Cadmia pondo librā. chalcitidis usq; pondo librā. ceræ pondo librā. resinæ aridæ pondo lib. iij. myrtei pondo libras tres. uinū siccis immiscetur.

Aliud ex ladano.

Argenti spumæ denarium pondo quadraginta. ladani denarium pondo trigintaduū. chalcithi denarium pondo octo. aluminis fisci denarium pondo duodecim. ceræ denarium pondo centum. squamæ denarium pondo octo. bituminis denarium pondo trigintaduū. myrtei quartam hemina partem. Vinum falernum siccis adijcitur.

Aliiter ut Alcimion, quod præparauit.

Ladani denarium pondo octo. cæsyphi denarium pondo quatuor. propoleos denarium pondo octo. bituminis denarium pondo octo. argenti spumæ denarium pondo quatuor. æris squamæ denarium pondo quatuor. misyos crudī denariū pondo quatuor. ceræ denarium pondo uiginti quatuor. myrtei octauam minæ portionem.

Aliud ex hordeis.

Cerussæ denarium pondo quinquaginta. argenti spumæ denarium pondo quinquaginta. hordei combusti non triti sextarium. ceræ denarium pondo quinquaginta. olei sextarium. postremum hordeum adijcitur.

Aliud ad ducendam cicatricem.

Cadmia pondo uncias duas, chalcitidis, ceræ, terebinthine, singulorum pondo uncias quatuor. cæsyphi pondo unciam. myrtei pondo uncias quatuor. chalcithi pondo uncias quatuor. uinum siccis affunditur.

Aliud ad idem.

Resinæ aridæ denarium pondo xviij. diphrygis denariū pondo iij. argenti spumæ denarium pondo sedecim. ceræ denarium pondo decem. olei heminas quatuor. Post hæc Andromachus alia emplastra sex percensuit cicatricem ægre ducētib; accommoda, quæ sanè hic nunc ad scribere uisum non est. Dicuntur enim simul cum illis quæ uel cura turā difficultia sanant, in quarto huius operis uolumine. Cum autem Andromachus ibidem ante prædicta modo epulotica alia quædam tradiderit, non præponēs, quod apertis ulceribus cicatricem inducerent, præsertim in pueris, mulieribus, & eunuchis, summatum in omnibus qui tenerā habent carnem, statui hæc quoq; huc adijcere: titulum ipsi siccis colore Andromachus indidit, ut qui de ijs in hunc modum ad uerbum scripserit.

Candida Andromachi epulotica. Albus quo uitor.

Argenti spumæ pondo minam. cerussæ tantum dem. ceræ, resinæ, singulorum quatuor. olei heminas tres. aquæ heminam. Aliud, Argenti spumæ denarium pondo centū sexaginta. cerussæ denarium pondo ducentorum. ceræ drachmas quinquaginta. terebinthina denarium pondo uiginti quatuor. olei ueteris hemina dimidium. aquæ cyathos sex. Aliud, Argenti spumæ denariū pondo centum. cerussæ, ceræ, singulorum denarium pondo

pondo quinquaginta. terebinthinæ denariū pondō uiginti quinque. aluminis fisci denarium pōdo sex. piperis albi denarium pōdo trium. orcheos herbe denarium pōdo octo. olei ueteris cyathos duos. aliter denariū pōdo duum. aquæ heminas duas. Aliud, Argenti spumæ denarium pōdo uiginti quinque. cere denarium pōdo quinquaginta septem. adipis suilli denarium pōdo triginta septem. myrrhæ denarium pōdo duum. ouorū coctorum uitellos quatuor. alij crudorum.

Medicamen virtus appellatum.

Strigmenti puri heminas duodecim. argētī spumæ pōdo minas tres. squamæ denarium pōdo sex. alij denarium pōdo sedecim. resinæ colophonæ pōdo minas sex. alij denarium pōdo quinquaginta. ceræ pōdo minam. quidam minas quadraginta quinque. marinæ aquæ heminas tres.

Andromachi panacea, id est uniuersale remedium.

Argenti spumæ denarium pōdo centum quinquaginta. ceræ denarium pōdo quadraginta. terebinthinæ denarium pōdo quinquagintarium. aquæ marinæ ueteris heminas duas. strigmenti heminas sex. squamæ denarium pōdo sedecim. ricini heminas duas. cerussæ denariū pōdo octoginta. guttæ ammoniaci denarium pōdo uiginti quatuor. seui uitulini denarium pōdo octoginta. calicis uiuæ denarium pōdo xxiiij. aristolochiæ denariū pōdo uiginti quinque. Coquito ut didicisti.

Candidum Telephanis.

Argenti spumæ denarium pōdo octoginta. cerussæ denarium pōdo centū uiginti. myrrhæ denarium pōdo trium. obolos duos. sagapeni denarium pōdo quinque. thuris denarium pōdo sex. obolos quatuor. olei heminas duas s. omnia simul incoquito. Aliud, Ceræ candidæ pōdo librā. myrrhæ pōdo unciam. thuris tantundē. medullæ ceruinæ pōdo uncias duas. adipis hyanæ pōdo uncias duas. coagulī cerui uel hœdi pōdo uncias duas. nitri pōdo uncias duas. chalbanī pōdo unciam. guttæ ammoniaci pōdo uncias quatuor. argenti spumæ librā s. cerussæ denarium pōdo sex. olei ueteris heminā s. marinæ aquæ tres cyathos. Cauiacæ dicitur. Aliud, Argenti spumæ denarium pōdo ducentorū. cere denariū pōdo quinquaginta duum. olei heminas tres. cerussæ denarium pōdo octoginta. terebinthinæ denariū pōdo triginta duum. buccinorū cineris denariū pōdo decem. thuris denarium pōdo nouemdecim. aquæ sextarium. Aliud, Adipis suilli recentis pōdo octoginta octo. ceræ candidæ denariū pōdo quadraginta octo. cerussæ denariū pōdo duodecim. argenti spumæ denariū pōdo duodecim. faciat ad herpetas, carbunculos, condylomata, rhagadas: phlegmonem profus arceat, ut Heras Cappadox meminit. In hoc igitur recte fecit, q̄ nō simpliciter ceræ scripserit, sed candida adiecit: nam sic fieri possit, uti uult colore candidū. Post hæc autem aliud cōmemorans, neq; ceræ, neq; uini candore apposit, sed nos aditigere oportet, si emplastrū candidū reddere statuimus. Porrò cōpositio eius his uerbis ab ipso Andromacho tradita est.

Galen.

A

Aliud ex uino, Publij.

Cadmizæ pōdo libram uncias nouem. argenti spumæ pōdo libras duas. cerussæ tantundem. uini græci sextarios duos. rosacei pōdo libras quinque. ceræ pōdo libras tres. oua cruda numero duo decim. thuris pōdo uncias tres. hæc incoquito. Candidorum emplastrorū coquendi rationes, in priori cōmentario percensui, simulq; methodum non coquendi modo, sed etiam eorum cōpositionis ostendi. Et fortasse nihil amplius eiufmodi emplastrum doctriinæ adijciendum restat: sed quia hic liber non solum de carnē generantibus emplastris, quæ quidē ut plurimū uiridia sunt, uerū etiā de glutinantib; & epuloticorū omnium ratione egit, quæ ulcera malignitate carētia cicatrice obducunt, quoniamq; melina ac gilia percurrit, ideo candida quoq; emplastra, quorū in illo libro mentionem nullam fecimus, in hoc producere uisum est. Cæterum ut nihil præsentī cōmentario desit, non pigebit adijcere emplastra, quæ ab ipsis cephalica & catagmatica, id est capiti fracturis mendicia nominantur, & magna uulnera, sinusq; glutinant: cum uero diluta fuerint, linamentis excipiuntur, & fiunt farcatotica, id est carnem progignentia.

B

De catagmaticis & cephalicis, id est ad fracturas & caput accommodatis emplastris. Cap. IX

C

Qui plurima ac optima pharmaca prodiderunt (antea omnes nominatim citauimus) genus quoddam emplastrorum cephalicum et catagmaticum uocant, à caluarie fracturis potissimum nomen eius imponentes. Sunt autem talia abstergendi, digerendi, & siccandi potestate prædita. Pleriq; paululum ex astringentibus pharmacis eis admiscuerunt, idq; duplicis usus gratia, sicut diximus, nempe ut id quod affectis partibus inluit, repelleretur, & abstergentium facultatem in profundum usq; deduceret. Porrò docuimus nos antea, nisi astringentia elaborentur, tritura quoad usq; in puluerē redigantur, noxam magis quam præsidium esse allaturis, quæ trahēdi uim obtinent. At optime elaborari ostendimus ea, si ex aceto acrilēuia fiant. Itaq; huiusmodi pharmacorum feriem ab ijs quæ Asclepiades tradidit, iam auspicabimur.

De emplastris ad fracturas idoneis ab Asclepiade traditis. 2

D

Primum in tertio Extrariorum medicamento- rum his uerbis perscripsit.

Nigrum ægisoy, id est optimum catagmaticum.

Hoc pharmacum in fracturis eum multa innatent ossa, omnesq; innatantia tollere adhortentur, simile quid incredibile ægisoy perfectit: nam fluitantia & ab alijs ossib; separata ita copulauit, ut alijs cum ferruminauerit. Hæc recepit. Argenti spumæ, bituminis, singulorū denarium pōdo decem: picis aridæ, ceræ, singulorū denarium pōdo centum. resinæ terebinthinæ, denariorū pōdo quinquaginta. aluminis scissilis, propoleos, singulorū denarium pōdo triginta. guttæ ammoniaci denarium pōdo uiginti quatuor. æruginis denarium pōdo decem. olei sextarios quatuor. præparato ut prædictum est. Alia præposito generi similia in eodē libro Asclepiades conscripsit in hæc uerba.

tom. 5

N 3

Aliud

Aliud Pitthionis ad fracturas, quo Helenus usus est.

Valet etiam ad uulnera ex ictu, cum auferre uoles, spōgia calida madefacta splenium relaxare oportet: nam medicamentum ualde glutinat: bene facit idem ad strumas & fistulas: in sinibus autē & fistulis splenium excindere conuenit, hoc est in orificio, ut humor, qui excernit, locū habeat. Item simul cum medicamento lauandum est: præparatur hoc pacto. Bituminis iudaici pōdo libras quinque, uncias quatuor. picis brutiæ siccae pares portiones. resinæ frictæ pondo libras octo. ceræ pondo libras quatuor. thuris libras quatuor. Squamæ rubræ pondo libram, unc. iij. olei per æstatem pondo libram. hyeme pondo librās. aceti heminam. Quæ liquari possunt, liquefacito: thus & squamā ex aceto trita reliquis admisceto, attendens ne ebulliant, mouensq; in mortarium demittito, contusa & subacta excipito, ac utitor. In alio exemplari squamæ rubræ pondo libram s. offendi. Liqueat autē effica cius esse, q̄ copiosiorē squamā receperit.

3 Mofchionis pharmacum ad fracturas, recentia uulnera, & neruus præcisus accōmodatū: item ad diuisa cum contusione: benefacit etiam fracturis cum uulnere: etenim uulneribus succurrit, & ossa cum deligatura conuenienti impositū ad calum perducit, nec minus incipiētibus hydropicis, & testium contusionibus prodest: eminentias circa anum reprimi, & rhagadas butyro dilutum sanat. Facit et ad gutturis tumores, quos Græci brōchocelas appellāt, dissoluit omniē duriciā: in super uolet ad luxatū & peruersum articulum, itidē ad callosos excessus in manibus pedibusq; quos clauos appellamus, ita ualet, ut sine exulceratione auferat. In summa pharmacum est longe utilissimū. Hoc modo cōficitur. Argenti spumæ pondo minā. Mina uero in hoc pharmaco habet denarios centū sexaginta. picis denariū pondo centum sexaginta. seui uitulini denariū pondo centū sexaginta. resinæ terebinthinæ denariū pōdo octoginta. mannae thuris denariū pondo octoginta. ceræ denariū pondo quadraginta. æruginis denarium pondo octo. opopanax denariū pōdo octo. chalbani denariū pondo octo. olei cicini heminā. aceti tantundē. liquoris sycamini heminā. picis liquidæ heminā dimidiū. Argenti spuma leuissima & cici num oleum in uas fictile aut eneum iniecta, & super ignē posita incoquant. Postea q̄ ebullierint, seuū & manna thuris adduntur, mo uenturq; continue, cum coierint, pix, cera, resina admiscētur, & coctis quoad usq; nō polluant, chalbani aspergitur: deinde ærugo & opopanax ex aceto resoluta: liquor uero sycomorū, & pix liquidæ in alterum uas transfusa coquant: ubi coierint, priori pharmaco admiscētur. rursumq; supra ignem posita, usquedum non inquant, coquant, & in uinū demersa relinquantur tridui, inde subactis utimur, in linteolū illinentes. Oportet autē, dum medicamentū imponitur, uitā respersam uino exprimere, & tunc pharmaco circūdare. Quemadmodum uero Lucius præceptor noster præparauit, ita habet. Adeps & oleū prius liquant, ubi dissoluta fue-

A rint, manna thuris leuissima, & argenti spuma inaspergitur, his in unum coactis, sequentia facimus. Atq; tum in hoc pharmaco, tum in eo quod proxime subscribitur, minā denarijs centū sexaginta ualere ait. Vnde clarū est Alexandriæ minā ipsū intelligere, quæ uncias uiginti pendet, & singulæ uncia denarios octo habent. Sic enim accidit: minam centum sexaginta denarios continere.

Aliud Claudij Philoxeni Apelumi id est ulcerarium inscriptum, ad cruenta & fracturas: facit etiam ad predicta uita.

B Argenti spumæ minā, quæ ualet drachmas centum sexaginta. seui uitulini drach. centū sexaginta. thuris drac. lxxx. opopanax drac. xl. resinæ terebinthinæ drac. lxxx. ceræ drac. xl. æruginis, aluminis scissilis, chryso collæ, chalbani, singulorū drac. xij. olei cicini heminam. aceti quantum sit satis. postremū thus, & æruginem, & opopanax, & alumen, & chryso collam, & id genus reliqua prius aceto dissoluta, & curiose leuigata inijcito. In alia scriptura sic habet, Argenti spumæ drac. clx. picis drach. centum sexaginta. seui uitulini drac. clx. resinæ terebinthinæ drachmas octoginta. mannae thuris drach. octoginta. ceræ drach. quadraginta. opopanax, æruginis rasæ, utriusque drach. sedecim. chryso collæ, aluminis scissilis utriusq; drach. duodecim. guttæ ammoniaci drach. sex. ciceos heminam. aceti tantundē. ut catagmatica componito.

Cenanthæ catagmaticum accōmodatum pharmaco ad idem.

C Argenti spumæ denariū pondo centum sexaginta. picis uinariæ denariū pondo centum sexaginta. hanc ex Italicis dolijs defluentē capimus; resinæ terebinthinæ denarium pondo octoginta; thuris denarium pondo octoginta. seui uitulini elaborati denarium pondo octoginta. medullæ ceruine elaboratæ denarium pondo octoginta. cenanthæ siccae, symphyti radices, centaury comæ, singulorum pondo libram. æruginis rasæ, opopanax singulorum denarium pondo octo. papaueris succi, myrrhæ, aloes, chalbani, singulorum denariū pondo octo. aceti heminas iij. olei cicini heminā. symphyton, cenanthen, centauryon, non minutim contusa, ac in acetum iniecta ad tertias coquimus, & humore expresso ad pharmaci confecturam utimur. Prodest medicamentū etiā podagricis. Alibi sic scriptum est. Argenti spumæ, picis uinariæ, singulorū denariū pondo centū sexaginta. medullæ ceruine, resinæ terebinthinæ, seui uitulini, thuris, symphyti radices, succi sycamini, singulorū denarium pondo octoginta. cenanthæ aridæ, centaury, singulorum pondo. ceræ denarium pondo quadraginta. æruginis, opopanax, styracis, papaueris succi, mandragore succi, myrrhæ, aloes, chalbani, chryso collæ, aluminis scissilis, singulorū denarium pondo duodecim. aceti sextarios tres. olei cicini libram. Præparato quemadmodum prædiximus, & in uinum Italicum demergito ut in catagmatico Mofchionis fecimus.

De emplastris quæ proprie Cephalica nominantur. 4

Capitis fracturarum, quæ ad crasse membranę duplicaturam usque peruenerunt, emplastra cephalica dici cōsueverunt. Eorum uirtus est, ut ossium squamas

squmam sursum attrahant & ramenta disparata e-
ducant, tum circa caput, tum circa reliqua corpo-
ris ossa. Nonnulli cōmuni genere hæc etiam uocant
catagmatica, proprie uero nuncupatis fortio-
ra sunt: Siquidē catagmatica ab eis dicta, purgan-
di, siccandiq; facultatem habent: hæc autem acrimo-
niam etiam quandam sortita sunt, ut ex alto in
superficiem extimam non ossa modo, sed his mul-
to magis quoq; humorem crassum aliquem, & ui-
scosum, uel omnino deprauatum attrahant. Memi-
nit huiusmodi emplastrorum Asclepiades in ter-
tio libro De exteriorum medicamentis, quæ sanē
in quarto huius operis libro tractamus. Quoniam
uero ad cacoethe ulcera, & chironia quedam ipso-
rum cōuenire dixit, tum quod ad Deileontem au-
torem refert cephalicum: tum hoc fecerunt ex ni-
gro uiride cephalicum, tum post hæc Philotæ ce-
phalicum, tum deinde Ism, quod & ipsum cephal-
icum appellatur: aliq; nonnulla huiusmodi, huius ge-
neris esse putandum est, ideo nunc quoq; ipsa non
apposui, sed ad catagmatica & cephalica ab alijs
medicis memorię mandata transgrediar, ubi gene-
ralem utriusq; potentiam exposuerim. Quæ uero
& antea, & in hoc libro protulimus, & in opere
De simplicium medicamentorum facultate in me-
moriam reducentes cognoscere uos expedit, ce-
phalica catagmaticis esse ualentiora, eoq; cum ce-
rato carnem producere natura sunt apta. Quapro-
pter & sarcoticis alio quodammodo genere simi-
lia sunt. Nam ubi ex cerato uim remiserint, sarco-
tica fiunt, quæ linamentis excipiunt: adiecto uide-
licet interim oleo, alijs rosaceo, nonnumquam alio
quodam huiusmodi.

De quibus Heras catagmaticis & cephalicis scripserit.

Primum id genus emplastrorum Ism uocatum,
Heras scripsit, medicamentum ad satis multa ido-
neum; deinde quod ex herbis appellant, quod &
ipsum multiplicis esse usus, attestatur id nempe
quod cephalicum existat. Quin & quod cōfec-
tum ex scylla scriptum deinceps est, cum multi sa-
tis usus pharmacum existat, idem pollicetur. Insuper
post hæc omnia, aliud emplastrum manifesto
his uerbis exposuit.

Aliud Cephalicum.

Ad capitis fracturas facit, ossa facile reducit, &
squamas separat, reliquaq; omnia facit, quæ & ante
ipsum pastillus. Squamæ aris rubri denarium
pondo uiginti quinque. aluminis denarium pon-
do uiginti. aristolochiæ dactylitidis denarium pō-
do uiginti. guttæ ammoniaci denarium pondō uiginti
quinque. thuris denarium pondō uiginti quinque.
myrrhæ denarium pondō duodecim. seui tau-
rini pondō libras quatuor. ceræ libras quatuor. te-
rebinthina pondō libras quatuor. pitynæ siccæ
pondō libras quatuor. olei heminam. acetii quan-
tum satis est. Sicca ad leuorem terito quot sufficiat
diebus, sub æstu caniculæ, ammoniæ quam madefa-
ctum prius aceto infundito: demum quæ liquari
possunt rasa. ac in unum coactis utitor. In quibus-
dam exemplaribus ascriptum est, olei ueteris. At
cum hoc ipsum emplastrum dixerit efficere, quæ

A & ante ipsum pastillus: uisum mihi est illius quoq;
compositionem subscribere, quæ secundum He-
ræ ipsius uerba ita habet.

Pastillus Cephalicus triplici mistura constans.

Facit ad capitis fracturas, item ad phymata, fi-
stulas, podagras, callos, coxendices. Terræ eretria
dis pondō minas duodecim. squamæ aris rubri pō-
do minas quatuor. ichthyocolle ponticę pōdo mi-
nas quatuor. eretria & squama seorsum teruntur,
deinde simul acetū acre affunditur, ut mellis cras-
situdinem habeant, & leuigantur: resiccatiss acetum
rursus admouetur. hoc sit diebus uiginti sub
caniculæ æstibus: post ichthyocolle ex aceti hemi-
na confringitur, & lento igne liquatur, mox terra
squamaq; additur, quæ in uas aris rubri coniecta,
B soli octo diebus exponitur, bis quotidie mouetur,
donec coiuerit: post hæc exempta paulatim
in mortario conteruntur aceto affuso, usquedum
cōsiterint: inde pastilli finguntur, & collyria, tum
longitudine, tum crassitie inæqualia & refrigerata
reponuntur. In usu ad medicamentum partem
ex aceto leuissimam factā, tres cerati rosacei por-
tiones admisceto, utitor platysmate primū: mox
splenio in capitis fractura, desuper lanis succidis
ex aceto adiectis. Porro collyrio fistulis imposito
splenium ex hoc cum cerato superdandum est.

Aliud ad multa ualens.

Posuit aliud quoq; multiplicis usus emplastrum,
ad fracturas quoq; conueniens, de quo sic ad uer-
bum inquit. Emplastrum ad fracturas artuum cum
uulnere, & sine uulnere, item ad male curata, & si-
nus. Picis aridæ pondō minam. argenti spumæ tan-
tundem. mannæ eius dimidiū. seui uitulini pon-
do minam. ceræ tyrrhenicæ pōdo minæ quartam
partem. opopanax denariū pōdo octo. æruginis
rasæ pondō minæ decimā sextam partem. aris cy-
prij decimam sextam minæ portionem. chabani
denarij pondō unius. terebinthine minæ dimidiū.
ricinini, uel olei ueteris heminā. acetii heminæ ter-
tiam partem. Argenti spumam, oleum & seuū len-
to igne incoquito: ubi colorē mutauerint, picem,
resinam, chabbanum adijcito, postea coquito do-
nec coeant, & tunc subtracto igne sinens paululū
refrigerari, mannā: mox opopanaxem, & ærugi-
nem ex aceto tritam in ollam fundito, ac ubi tantū
lum incoxeris, dū bene habet, tollito. utimur hac
compositione, frigidam affundētes æstate, hyeme
congelationem adimentes: Cæterum ubi medicā
mentū tenerius facere animus est, uel ut os matu-
rius abscedat, medulla cerui ipsum diluimus. Iā ue-
ro in hoc pharmaco Heras minam sedecim unc.
esse uelle planē ostendit. aliās enim decimam se-
xtam minæ partē nō scripsisset. Aliud, Huius de-
inceps aliud ad eadē hisce uerbis Heras subdidit.

Emplastrum phlegmonas arcens.

Ad puncturas neruorum, ac fracturas. Hoc fre-
quenter et ad articulos luxatos ipso die usifumus,
tum in fracturis, item in cōtortione tali, uel genu.
discutit humores incoctos circa genua summa se-
atollētes: præsertim si partes affectę duob. uel tri-
bus diebus ante, erui farina oxymelite madefacta

illita sint. Summatim ad omnem cōuulsionem, & rupturam ualet: nam mirificæ phlegmonem arceat. Argenti spumæ denarium pondo uiginti quinque. bituminis aridi denarium pōdo centum. picis aridæ denarium pōdo quinquaginta. ceræ denarium pōdo quinquaginta. resina: pitynæ denarium pōdo uiginti quinque. guttæ ammoniaci denarium pōdo quindecim. aluminis fisis denarium pōdo quindecim. æruginis denarium pōdo quindecim. propoleos denarium pondo quindecim. olei ueteris libras tres. Argenti spuma cum oleo coquitur, & ubi conflueræ cœperint, bitumen adijcitur: usque dum probe liquefactum fuerit incoquitur (liquatur enim pedetentim) dein pix, postea resina, cera, ammoniacum, propolis adduntur: singula autem adhibe cōtorquendo ignemque subtrahendo, quibus sic spissatis, ut non amplius inquent, æruginem, ac scissile alumen ad iungito, tum seruore remisso, in ollam in qua frigida sit transfundito. Hoc, postquā fractura reliqua callum cepit frustulis plurib. innatūtib. usi fumus: idque paucis diebus eo rem perduxit, ut callus etiam dum frustula comprehendere. Valde est in multis usui. Inde aliud quoque deinceps eiusdem generis cum prædictis emplastris in hunc modum Heras recensuit.

Emplastrum ad fracturas, & ad hydropicos.

Picis aridæ pondo minam. picis liquidæ hemina: dimidium. liquoris sycomori heminam. argenti spumæ pondo minam. thuris pōdo minam. chalbani denarium pondo viij. terebinthinæ minæ dimidium. adipis uitulinæ pondo minam. ceræ pondo minam. opopanax denarium pondo viij. æruginis rasæ denarium pondo viij. ricinini non adulterati heminas quatuor. acetis acris heminam. Argenti spuma, & thus cum ricinino, & seuo leniter incoquantur: deinde pix adijcitur, cera, resina, chalbani purgatū & pauco aceto dilutum. Reliqui acetis tertia pars ærugini, duæ opopanax admiscuntur, & hæc immittuntur. In alia autem ollula, picis liquidæ, sycomori liquoris & ricinini pars octaua, ne ærugo conpingatur, deinde medicrater coquantur, ut unitas fiat: cum bene habere uidebitur, in uino reponitur pharmacū. Hoc multis hydropicis succurrimus, iniucientes ipsum, ac moroso minus uictu egentes, solumque ut bene conquerent prouidentes. Cum uero profecisse se multum ægri sentiunt, descendimus ad emplastrum ei subiunctum, quod ex salibus dicitur.

Catagmaticum Andromachi.

Primū Catagmaticū Andromachus ita scripsit.

Catagmaticum quo continet uitor.

Argenti spumæ pondo minam. picis pondo minam. ceræ pondo minam. seui taurini pondo minam. thuris pondo minam. picis liquidæ hemina: dimidium. liquoris sicamini heminam. terebinthinæ pondo minam. opopanax denarium pondo octo. chalbani denarium pondo octo. æruginis denarium pondo octo. ricinini heminam. nonnulli etiam butyri pondo minam addunt. guttæ ammoniaci denariū pōdo xxv. ex uino austero diluitur. mox, post hoc aliud hæc sententia scribit.

Aliud catagmaticum.

Argenti spumam pondo minam. ceræ minæ dimidium. alij quartam partem. picis pondo minam. terebinthinæ pondo minam s. seui titulini pondo minam. opopanax denarium pondo octo. æruginis denarium pondo octo. chalbani denarium pōdo viij. alij sex. ricinini heminam. acetis tantundem. Gallus iniecit scissilis denarium pondo xij. chrysolcollæ denarium pondo xij. Aliud superioribus catagmaticum hoc modo Andromachus subneçit.

Nigrum catagmaticum.

Argenti spumæ denarium pondo ducentorum. bituminis denarium pondo ducentorum. picis denarium pondo centum. ceræ denarium pōdo centum. scissilis denarium pondo triginta. propoleos denarium pōdo triginta. terebinthinæ denarium pondo quinquaginta. guttæ ammoniaci denariū pondo uiginti quatuor. æruginis rasæ denariū pōdo decem. olei sextar. iij. alij duos adijcunt. Vete res etiam lapidis pyritæ denarium pondo sexaginta. Hæc igitur ab Andromacho ordine scripta sunt: seorsum uero, inter uiridia postremo emplastrum quoddam his uerbis expressum inuenio.

Aliud uiride Cephalicum ex colleæneis Aphrode.

Squamæ denarium pondo quadraginta. terræ eretriadis denarium pondo uiginti. aristolochiæ denarium pōdo triginta. ichthyocollæ denarium pondo sedecim. falsis ammoniaci denarium pondo duodecim. misyos denarium pōdo duodecim. myrrha denarium pondo duodecim. thuris denarium pondo triginta sex. aris usti denarium pondo sedecim. aluminis fisis denarium pondo duodecim. rotundi denarium pōdo sedecim. bryoniæ denarium pondo duodecim. chamæleontis nigri denarium pōdo duodecim. resina: usteæ denarium pondo octodecim. guttæ ammoniaci denarium pondo octodecim. argenti spumæ denarium pondo duodecim. illyridis denariū pondo duodecim. chalcantibi denarium pōdo duodecim. fellis taurini tres cyathos. acetis cōgium. Sub Canicula: æstus pastillos fingito, qui singuli denarios quatuor pèdant, ceræ quartam partē, misceto acetis heminas sex. olei tantundem.

De emplastris glutinantibus. Cap. X

Quidam hæc sanguinaria & uulneraria, id est cruentis & uulneribus adhibenda nuncupant. Opus eorum est coniungere diuisas partes, & cōglutinare, ut in pristinam unitatem particula reducantur. Verum non modo cruenta protinus glutinantur, ubi sanguinem ex diuersione profluentem ad huc spongia deterserimus: deinde futuris aut sibilis coarctauerimus: sed etiā sinus ueteres, cum ab omni inflammatione immunes, & pueros medicamentis appositis effecerimus, committuntur, coeuntque. Dicitum est in Therapeutice methodi libris, medicamentū primario, atque ex se se, fordis de terforium appellari, secundaria uero ratione carnem producens & glutinans. Non enim tanquam ipsum carnē generet aut uniat, neque tanquam hæc natura solius opera non sint, sed quod talibus impo-

sifis medicamentis ulcera carne replentur ac coe-
 unt, appellationē hanc fortita sunt. Opus ipsorum
 proprium est, affectam partem recrementis uacua-
 re, ne uidelicet sanies carnis generationem, glutin-
 ationemque impediatur. Indicatum porro est, glutin-
 atoriam carne expletibus esse sicciora: item quae
 carne explet detergendi uim omnis rosionis seu
 morsus expertem referre. Glutinantibus autē non
 absterforijs proficis, uerum desiccantibus solum
 esse licet. At cum cicatricem quoque ducentia phar-
 maca multo his (praeterquam quae abunde astringunt) sic-
 ciora sint, statuamus demum, & quae glutinant &
 quae cōiungunt, moderatius istis exsiccare. finis au-
 tem glutinantium est, nullam inter coitura subna-
 sci humiditatem permittere. cicatricem uero con-
 trahentium non hanc tantum impedire, sed etiam
 nunc consistentem in alijs quae mox cicatricem du-
 cent cōsumere: adhaec callum obducere, & astringen-
 do in durare. Quae carne implent, sanguinem
 ad refectionem idoneum, tum pro quantitate tum
 pro qualitate uentur: ac tantum talemque, quanto
 natura & quali ad carnis generatione indiget. Cae-
 terum mordicationis profus ex pers medicamen-
 turum ulcus seruat, si quidem tale acceperit: si ue-
 ro fordidum, necesse est tantum pro sua ipsius po-
 testate detergens sit, quantum crassitudinis sordes
 habuerit: quin etiam carnem recens iunctam mor-
 dere & exedere debet. Vnde palam colligitur
 id, cum tale existat, ulceri carnem non esse inductu-
 rum, nec cauitatem carnis repleturum, sed quae potius
 colligat imminuetque. Atque huius rei causa
 medicamentū quod fordidus copiosius repurgan-
 dis est, quod de antea dixi, non semper carnem po-
 test gignere, nisi uel ex uberiore oleo, uel rosaceo
 liquatum, sicut quod oleosum & quod ex charta
 inscribitur, deterfionis uehementiam remittat, uel
 ex cerati mixtura rosionem deponat. Huiusmodi
 sunt plures multiplicis usus uires, quae admodum
 Macharonis emplastrū, & Iliis. Scopus igitur sin-
 gularū id genus in Therapeutica methodi libris
 declaratus est: Simplex facultatum materia in alio
 opere priori, Composita in praesenti tractatur. Ac
 primum sanē in eo meminisse oportet naturae cor-
 porū quae curanda susceperis. Nam humida, eoque
 mollia, quemadmodum mulierum, puerorum, eu-
 nachorum, & qui muliebriter degunt, imbecillio-
 ribus medicamentis indigent: uirorū corpora, po-
 tissimum qui ex uirilibus munijis & sole durum cor-
 poris habitum conciliantur, ab imbecillibus nihil
 praesidij sentiunt. Quapropter nec glutinantia utro-
 rumque corporum cōmunia sunt, sed quae ex argen-
 tispuma oleo & aceto preparantur (in priori libro
 de ipsiis egimus) imbecillā mollemque carnem glutin-
 ant. Quae bitumine, arugine, squama, aloe, &
 myrrha constant: robustam & duram. Itaque bitu-
 men ipsum per se in harum uirtutum scopio conti-
 netur. ac nulla ratione solum ex oleo liquatum u-
 surpare poteris, ut quod friabilius sit, quam medi-
 camento emplastrū forma faciendo coueniat. Vt
 igitur emplastrum fiat, ceram & resinam ei admi-
 scemus, a quibus denuo uirtutem eius solutam iri-

A scientes, interdum aes, uel eius squamam, saepe alo-
 en uel myrrham, uel in summa siccas aliquid me-
 dicamentum non inepte adijcimus.

Ex bitumine Barbara.

2 Prima hic quoque ab Andromacho scripta
 apponam ipsis illius uerbis.

Barbarum, quo uitor.

Cerae, picis, resinae, bituminis, singulorum dena-
 rium pondo ducentorum. thuris drach. xxiij. olei
 heminas. Aliud, Picis pondo lib. ij. bituminis,
 cerae, singulorum pondo libram. guttae ammoniaci,
 mannae, singulorum pondo unc. sex. cerussae pon-
 do unc. ij. olei heminae dimidium. aceti heminas
 quatuor. hoc Aphrodas admiratus est.

Aliud nigrum.

B Picis aridae, resinae aridae, bituminis, singulorum
 pondo libram. cerussae pondo unc. vi. mannae, a-
 tramentij sutorij, aruginis rasae, singulorum pondo
 unc. ij. olei heminae dimidium. aceti tantundem.

Aliud ex emplastro Gallii.

Seui caprini denarium pondo triginta. arugi-
 nis denarium pondo octo. cerae denarium pondo
 quinquaginta. aristolochiae, bituminis, picis, sin-
 gulorum denarium pondo uiginti quinque. guttae
 ammoniaci denarium pondo duodecim. chalba-
 ni denarium pondo duodecim s. sulphij denarium
 pondo octo, mannae denarium pondo duodecim.
 preparato.

Aliud, quod inuictum dicitur.

C Cerae denariū pōdo centū. saui taurini denariū
 pondo xxx. bituminis denarium pōdo xxv. picis
 denarium pondo uiginti quinque. terebinthinae dena-
 rium pondo uiginti quinque. nitri denarium pon-
 do uigintiduum s. aristolochiae denarium pondo
 duodecim. chalbani denariū pondo viij. myrrhae
 denariū pōdo xviij. thuris denariū pondo xij. s. am-
 moniaci denariū pondo viij. amomi drac. viij. car-
 damomi denarium pondo xij. opopanax dena-
 rium pōdo octo. medullae ceruinae denarium pon-
 do quindecim. aruginis denarium pondo duode-
 cim. aloes denarium pōdo octo. bdellij denarium
 pondo sedecim. olei heminas duas, ego uero adie-
 ci propoleos denarium pondo duodecim.

Aliud quod cruentis uulneribus imponitur, Iuliani.

D Argenti spumae, bituminis, cerae, picis brutiae,
 singulorum denarium pondo quinquaginta. resinae
 frictae denarium pondo quindecim. aris squa-
 mae denarium pondo duodecim. thuris denarium
 pondo quatuordecim. chalbani denarium pondo
 octo. chalcitidis denarium pondo quatuor. aloes
 denarium pondo sex. gallae denarium pondo qua-
 tuor. myrrhae denarium pondo quatuor. aristolo-
 chiae longae denarium pondo sex. aristolochiae ro-
 tundae denarium pondo quatuor. olei ueteris he-
 minas quatuor. nos olei heminas tres.

3 Quod Heras conscripsit barbarū, sic habet.

Nigrum emplastrum.

Ad cruenta uulnera, ad diuisiones notata di-
 gnas, maxime capitis: ad fistulas, sinus, fracturas.
 Conuenit etiam hepaticis & lienosis: citra inflam-
 mationem glutinat, benefacit etiam neruis, carti-
 lagini

laginibus, & ossibus præcis. Cohibet etiam miri-
fice sanguinem erumpentem. Insuper ualet ad tu-
bos & sinus, glutinat enim insigniter. Item in abs-
cessibus humore ablato hoc imponit. Est etiam
ad sanguinem cohibendum præstantissimum, præ-
fertim in ijs qui sanguinem reijciunt: duo uero in
pelles illita, unum pectori & lateribus imponito,
alterum dorso: præter opinionem sanguinẽ sufficit.
ualet insuper ad canum hominumq; morsus: in to-
tum phlegmonem arcet. Idem ea quæ uulneribus
adhibentur superat, ut experientia indicauit. Hye
me diebus septem soluitur, per ætatem quinçq; si
uero necessitas urget, tribus. Cera, picis, bitu-
minis, pityinæ singulorum pondo libram, mannae
pondo uncias sex. cerussæ pondo uncias quatuor.
Chalcæti pondo uncias quatuor. opopanax pondo
unc. ij. olei semunciam, alij selibram. acetum hemi-
nas duas. Ceram, bitumen, oleum, acetum paulu-
lum relinquentes, in olla recenti liquato: deinde pi-
cem & resinã adijcito, in minima frustra diligenter
contusa. Vbi semicoctũ fuerit, tollito ollam, & ali-
quamdiu refrigerato: & percolatis, atramentũ su-
torium aceto ex duabus heminis restate tritũ pau-
latim inspergito, ne efferuescat: quando autem ef-
fundis, leuiter ignem subministrato mouens: cum
nõ inquitat, cacabum deponito: opopanax in
reliqui acetum parte pridie madefactũ infundito, ut
dissoluat: mox cerussam mannaq; unã pariter tri-
ta inspergito: & paululum tepescitẽs, ut in unum
coeant: obserua ne opopanax, & manna aduran-
tur. refusa in mortariũ, ibi refrigerari sinito: ac rur-
sus subacta reponito, atq; uitõr. Porro manifestũ
est etiam alia barbara, quæ tum Andromachus,
tum reliqui tradiderunt, eodem modo confici o-
portere. Quidam opopanax cacabo non inijci-
unt, sed leui ex aceto factõ liquata in mortario su-
perfundunt. Cum eo nõnulli miscent mannam &
cerussam, quemadmodũ ego quõsq; sepius feci in
mortario terens ex aceto, & quæ liquari possunt,
liquefacta infundens. Subinde uero atramentũ su-
torium duntaxat cum opopanax leue factum ca-
cabo indidi: mannam cerussamq; inspergens.

Aliud barbarum, Heras. 4

Heras soli huic præscripsit, barbarum: ego ue-
ro antecedens etiam simpliciter appellauit, & si ni

ARGUMENTA CAPITVM LIBRI III.

Proœmium. Prædicat q̄ felicitate omnes neurototos
(quibus nerui aut tendines uulnerati erant) ratione a se
primum inuenta curauerit: cum prius ab imperitis me-
dicis neurototo pleriq; perderentur. Cõtra empiricos,
& eos qui negant contrarijs facultatibus prædicta phar-
maca simul misceri oportere. Arguuntur huius libri,
declarare q̄ multa ipse ex inuenerit: quia dã ratione pro
neurototo remedia inuenit. I. Quomodo ex erro-
ribus sui temporis medicorum & præceptorum, perue-
nit ad ueram generalem rationem neurotosis mēden-
di, per pharmacata siccantia & calida, siue medicocriter si-
ue multum calida (absq; astrictione.) Differentia re-
mediõrum cum uel denudatus est neruus: uel punctus
tantũ, & partes superiacentes integre: tum enim tenuio-
rũ partũ & fortiori opus est medicamine, nec id æque
in calore & frigore symmetrum esse necesse est. 2. Enu-

grum ab ipso nuncupatum, quoniam plerique ex
recentioribus medicis emplastra ex bitumine bar-
bara nominare consueuerunt. Heras de ipso sic
ad uerbum.

*Barbarum ad recentia uulnera, sinus, canum hominumq; morsus,
condylomata, inflamata, ad articularum uitia omnia
in principio, & podagram.*

Cera, picis, resinæ frictæ, bituminis iudaici, sin-
gulorũ pondo minã. argenti spumę denariũ pōdo
x. cerussæ denariũ pōdo v. opopanax denariũ
pondo iij. olei heminã. acetum cyathũ. cera, pix, bitu-
men, resina incoquantur, donec illiquata fuerint.
Deinde reliqua cũ oleo tritici inijciuntur. His abla-
tis ab igne, & aliquantulũ refrigeratis, acetũ paulu-
tĩm instillat. Talis sanẽ barbarorũ emplastrorũ for-
mula est: ego ubi paucis exposuero quomodo ip-
se utar, sermonem de eis finiam. Sunt autẽ duo, unũ
ad maxima uulnera, alterũ ad minima. Quod itaq;
ad maxima adhibetur, hæc recipit.

Barbarum Galeni.

Picis pondo libras octo. cerę pondo libras vi &
uncias octo. pityinæ pondo libras quinçq; & unci-
as quatuor. bituminis pondo libras quatuor. olei
pondo libram & uncias sex. argenti spumę, cerus-
sæ, æruginis, singulorum denarium pondo uigin-
tiquatuor. thuris pondo selibram. aluminis liqui-
di denarium pondo duodecim. fisci pondo uncias
quatuor. opopanax, squamæ, chalsani, singulo-
rum denarium pondo duodecim. aloes, opij, myr-
rhæ, singulorum denarium pondo quatuor, tere-
binthinæ pondo uncias uigintiquatuor. mandra-
goræ succi denariũ pondo sex. acetum heminas sex,
quæ ualet libras quinçq;.

Simplicioris Barbari Symmetria est talis.

Picis, ceræ, resinæ pityinæ, resinæ frictæ, bitumi-
nis, horum quinçq; singulorum pondo libram. ar-
genti spumę denarium pondo decem. cerussæ de-
narium pondo quinçq;. æruginis denarium pondo
quinçq;. opopanax denarium pondo trium. olei
hyeme pondo uncias nouem. ætate pondo unci-
as sex. Quæ liquari possunt, siccis in mortario ace-
to acri leuigatis affunduntur. Quod si sedando lo-
ri aptius uoles medicamentũ reddere, hyofcy-
ami succi denarij pondo unius. S. item opij tantun-
dem admisceto.

D meratio particularis pharmacorum huiusmodi, quæ
partium sunt tenuium & siccã: Liqueores, terrena, me-
talla, succi expressi (ut laurinum, cedrinum) lixuria sta-
cte, Cerealia, amara. 3. Digressio: De diligentia ad-
hibenda circa plãtas cognoscendas & reponendas. Loca
plantis reponendis cõmoda. Cognoscenda esse diligenter
simplicia omnia, & quorãnis accersenda ex illis locis, uel
bi optima nascuntur. Nihil prodesse methodũ curandi nõ
dignoscẽti simplicia uera a falsis. Quod scire oporteat
nõ modo uires simplicium in genere, sed etiã distictẽ &
exquisite secũdũ gradus. Sæper enim ad quantitatẽ asse-
ctũ, medicamentũ qualitatis modus & intentio respõde-
re debet. II. Historia primã inuentionis illi curandi
neurototos in adolescente quodam. De cerato cum
euphorbio. 2. Digressio: Quod neurototos cũ uul-
go nuncupet, non solum illos quibus nerui, sed etiam
quibus

quibus tendines vulnerati sunt, & quibus nerui contu-
si. Quodq; eadem curandi ratio fit, & idem periculum,
sive vulneratis sive contusis, tum neruis, tum tendinib.
Denominibus non esse contendendum. 3. Pergit ab-
soluere historici curati a se neurothlasti adolescentis Cif-
qui neruis contusus erat. (Obiter, q̄ tendines singuli
membranis neruosis induantur.) De lido pharmaco,
& altero ex dracuculis; quo excepto cetera lido simi-
lesit. De pharmaco ex aceto. III. Rationem suam
medendi neurotroctis cum particularibus medicamen-
tis & manuali administratione euidenter exponit. De
pharmaco ex aceto. Vulnere bis aut ter die perfundi
debere oleo bene calido: nō tepido, nec frigido: & cum
opus fuerit abluī, hoc etiam cum oleo fieri, non cum a-
qua. Quir noxium sit frigus vulnerebus neruorum,
cum historia. Pharmacum ex euphorbio cum castoreo.
Lanz oleo imbuta calida seruanda: alij sicis superim-
positis. Aeger ad quintum aut septimum usq; diem do-
mū se continet. Acetum ne sit uinosum. Oleum esto te-
nuum partium, minime astringens. 2. Enumerat di-
uersa remedia parabilia, quibus pro occasione usus est
in neurotroctis curandis, ubi alia non aderant, & semper
cum successu: quod fortuito ei non contigisset, nisi uni-
uersali quadā motione prahabita ea inuenisset. Et quod
huiusmodi omnia actu calida & ab initio applicare soli-
tus est: tum postea etiam, si prius enema non recte ap-
plicata fuissent. 3. Euphorbium uetus exsoluitur & im-
becille est, proinde copiosum ceræ admiscendum erit:
recens, parcius: quod duabus historijs comprobatur. Ve-
tus euphorbium quomodo dignoscatur, & quomodo
miscendum sit oleo. Duratio eius (item thapsia) & pro-
zere diuersa ad cerā oleumq; proportio. 4. Ceræ ad
oleum alia proportio ut liquidum fiat ceratum, alia ut
emplastrōdes. Emplastici pharmaci cōpositio, & de
resinæ admixtione. Resinarum differentia. Quod
dicit medicus inter componendum de crassitie uel liqui-
ditate satis iudicaturus sit: Et q̄ parum ne an nimium
calefaciat, ipse curati ut brachio suo per aliquot horas
imponens experiri debeat. 5. Propolis recens quan-
tum praestet resinis. Quidam per solam propolin curas
eius est, & alter qui profundius uulnus habebat pauco
thy malli liquore addito. In molli corpore aliquid olei
etiam addendū. Fermentum. Sulfur apyron cum
cetera pharmaco. Aphronitrum, nitrum, & aphrolitrum
laudat, quæ etiam euphorbio & alijs praesentibus saepe
usurpant. Olei calidi per fusio quibusuis remedijs ad-
iungēda. Arsenicum quoq; & eo absente sandaracham
saepè adhibuit. Item calcem uitam, extingentam, lotam.
6. Contra empiricos, q̄ fortuito casu unū, ad affectū
aliquē, inueniatur aliquādo remediū: ratione uero, mul-
ta simul, cū simplicia, tū eis cōposita. Necessē est ali-
quādo cōponere: & ad id recte faciendū, in quo quæli-
bet gradu sint, sciendum: id quod Empirici nesciunt, &
multa congenera coaceruat in unum compositū, quod
& ipse Galenus fecit antequam facultates & gradus sin-
gulorum satis cognoscere: deinde paulatim alijs atq;
alijs demps nihil deterioris pharmaci inuenit, cuius
compositio paulo post dicitur. Enumerat etiam sim-
plicia singula compositionis, qua olim ad neurotroctos
usus est. 7. Liquidiora pharmaca cum omnibus uul-
neribus, tum neruorum praecipue, magis conueniunt.
Emplastica tamen parantur aliquādo propter diuites,
q̄ balneantes eis commodius utantur, manu exerta for-
ras. Nam si uulnus in pedibus sit, balneo, saltea ad qua-
tuor primos dies, profusus abstinentum: Diuitibus ta-
men, qui omnino abstinerere nolunt, super emplastro in
pede, lintea multa oleo perfusa deligare docet. IIII.
Quod & tendinum naturam perspectam habere oportet
recte medicaturum neurotroctis, ut per chireurgiam
aliquādo, si opus sit, tendines abscindere possit in tras-
uerso eorum uulnere: aliquando etiam a cute excoriant
de separare, si uulnere hiantē futura faciendā esset.

A Quomodo in Pergamo monomachorum cura ei 25
annos nato commissa sit: & q̄ cum prius multi moreren-
tur, nullus sub ipsius cura mortuus sit. 2. Historia,
Quomodo in transfuro uulnere, in inferiore & anterior-
e parte femoris, tendines à musculis excoriantē sepa-
rauerit: & ita musculos profunde conseruit. Et q̄ aliqui
anatomes imperiti, male cum imitati sint, membranas
quibusuis musculis subiectas ante futuram separantes,
ubi non opus erat: in tendinibus enim solis periculum
est, qui licet membranam instar dilatentur, semper ta-
men membranis crassiores & duriores sunt, exceptis
tantum duobus qui in imo summe uentris à rectis mu-
sculis procedunt & perueniunt sunt. De imperitia ana-
tomitorum ante se. Quod aliqui stulte ligamēta non
cognoscentes, tanquam neruis aut tendinibus uulnera-
tis timeant, cum sine periculo sint, ut opte insensibilia,
& ab ossibus tantum procedentia. 3. Alias partes mer-
dicanæ alijs indigere. In anatōme peritū, & aliquoties
exercitatum esse oportere. 4. Historia pueri conuul-
sione sepiamo die mortui, cui puncturam ex stilo haben-
ti intus in brachio supra medium eius, Empiricus phar-
macum quoddam imposuerat, nudis quidem neruis &
magnis uulnerebus conueniens: puncturis non item,
quæ fortibus & acerbis indigent. Puncturæ os dila-
tandum duabus in cuti scissuris secundum rectos angu-
los se diuidētib. Punctura alia sine periculo est, alia
periculosa cui neruis subiacet. 5. Contra Empiricos
anatomem negligentes, & ex libro eam didicisse satis pu-
tantes: quodq; non semel aut bis tantū, sed saepius eam
exercuisse oportet. Quod non solum maiores neruis
uulnerati, sed minores etiam, qui radicum instar in cuti-
m sparguntur, puncti, & non bene curati, periculum
asserant: Non cognosci autem minores istos neruos, nisi
ex frequenti anatōme. Partium corporis ex dissectio-
nibus peritus, & compositionis ususq; pharmacorum
methodum tenens, neurotroctos semper recte curabit.
C V. Compositiones ex metallicis pharmacs ad neuro-
troctos. 2. Quod propter humanorum corporum dif-
ferentias, duas compositiones in promptu habere oportet,
unam ualentiorē, alteram imbecilliorē, quarum
exempla praescribit. Ceræ & aliorum proportio. De
ponderibus & mensuris. Oleum. Frictio cum aceto.
Thuris modus. De resinis, diuersis, loriga praecipue:
& quantum resinæ admisceri debeat. De galbani mi-
xtione, uiribus, & quantitate miscenda. Loco galbani
adeps subtilis accipi potest: quorum animalium a dipes
praesent. Ceræ modus. VI. De medicamine compo-
sito ex euphorbio. Euphorbij duratio, & quomodo æ-
tas eius & uis cognoscatur cum alias, tum ex linimento
(quod recipit euphorbij partem 1. ceræ 3. & olei 12.) in
balneo illito. Euphorbium plus minus ue accipien-
dum pro ætatis eius ratione. Triplex linimentum ex eu-
phorbio compositio, imbecillis, media, & ualentissima,
quæ supra posita est. 2. De ceræ, olei, resinæ, picis, ea-
rumq; proportione, ut uel acopi, uel cerati finiqui, uel
emplastri instar medicamen fiat. 3. Propolin resinis
& picis praesare. Resinarum differentia: & rursus de ua-
ria proportione olei, ceræ, resinæ & euphorbij. VII. Me-
dicamentum ex liquabilibus confectū. Liquabilem
alia igne, alia humore quopiā solui. Descriptio phar-
maci ex opoponace aceto dissoluto, cui propolis, ceræ,
& alia igne liquata miscentur. Antiballomena loco pro-
polis. Pharmacū ex pingui pice in aceto coctum cum
opoponace uel sagapeno, utile puncturis & morbis à can-
e rabido, experimento Galeni: conueniens duris cor-
poribus ut siq; teneris uero, cum ungento aliquo uel o-
leo discutiente liquatū. 2. Aliud pharmacum ex ad-
ipibus, & alijs quæ solo igne liqueunt, compositum: cu-
ius usus est, neurotroctam partem supercalefactam ca-
lidis medicamentis, & irritatam recreare: quo factō, ad
prius & fortius medicamen reditur. VIII. De me-
dicamento ex simo columbarum, quod in rusticis ubi
euphor-

euphorbium deest usurpari potest. IX. De medicamento, quod ex herbis constat. De herbis amarissimis astrictione, & acris non immodice. Terendi modus peculiaris: & proportio subtilissimi illius mollisq; pulveris ad ceram. X. De sumptuosissimis pharmacorum confecturis ad nervos uulneratos: Et primū q̄ diuities medicamentorum uilia & parabilia, utcumq; bona contemnāt, pretiosa tantum, rara, & odorata requirant, quod historis diuities cuiusdam probat. 2. Pharmacorum pro neurotrois, raris, & odoratis compositum in gratiam eiusdem diuities: & alia tria pro eodem. Alia preciosa ubi uulneratus est neruus. Canon, Quod in puncturis opus sit acrioribus pharmacis, quæ uulnus aperit seruent: ad neruos uero nudatos, illis quæ modice astringant cum discutiente & morsus experte facultate:

A ut sunt amomum, nardi spica, malabathrum. XI. De medicamentis ab alijs medicis ad neurotrois profectis: & q̄ ueteres remedia quidem nonnulla scripserint, methodum uero utendi & uulnere differētijs nullas docuerint. Pharmacum ex metallicis a medico quodam sui temporis acceptum, quod apud nullum illorum qui compositiones pharmacorum scripserunt, reperit.

2. Quatuor compositiones ex Aesclepiade, quarum prima Aegyptiaca dicta (cū discutiente aliquo oleo dissoluenda) mox in tertia parte ex Andromacho reperitur. Tertia & quarta faciunt ad neruos abscissos, & in magnis uulneribus nudatos. 3. Aegyptia Andromachi, & quid differat a descriptione Aesclepiadis, paulo ante posita ab initio secundæ partis. Eiusdem fusa ad puncturas.

GALENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM PER GENERA

Liber tertius.

PROOEMIUM.

De uulneribus neruorum.



T hæc amici commētaria uobis paro, qui iam ex ipsis medicinarum operibus comperistis quàm efficax sit nostra neruorum curatio: nempe ex qua omnes seruati sint, nō autem māci, nec claudi redditi, quæ aliter curatis accidere conspexistis: quemadmodum etiā nonnullos conuulsionem correptos, uel cū dolore, uel putredine, uel febre mortuos. Par autem est hosce libros ad aliorum quoq; manus peruenturos, qui scriptis bene uti non possunt. uel quia a præceptore medicæ artis speculationem non didicerunt: sed omnino rudes, quasi uix initiati & prorsus in exercitiū permanent: aut quia perperam edociti adhæserunt ijs qui composita medicamenta solo usū citra rationem esse inuenta asserunt. etenim ij manifesti contentione sua errant. altero modo nō minus prædictis errant ij, qui nullum pharmacum ex simplicibus facultate contrarijs confici oportere arbitrantur. Verum hos medicamenta superiore libro citata coarguunt, ut quæ magnas ipsorum uires ex contrarijs inuicem simplicibus compositis ostentent: imō etiā in libris hunc subsecutus præstantissima pharmaca ex contrarijs uirtutibus composita indicabuntur. Nunc de nostra curatiōne ratione, quā in neruorum uulneribus excogitauimus, toto hoc libro differemus: ostendentes quantam eiusdem facultatis medicaminum copiam, tum ex generalis sanandi scopi indeptione, tum ex simplicium uirtutis cognitione inuenimus.

Quis communis uulneratorum neruorum curationis modus, & que medicamenta specialia. Cap. I

Speciāuimus omnes præceptores præsidio, quod iam recentiores medici sanguinariū seu cruentis opitulans (Græcis Enamon dicitur) & glutinatorum appellare solent, uti. Nam in initio medicamentum aliquod ex enamis imponentes, uulneris oras committere seu glutinare moliebantur. Si uero phlegmone eas obiederat, calida aqua li-

B beraliter fouebant oleum affundentes ac triticifarinam ex hydrelæo decoctam, epiplasma applicabant. Quin etiam gladiatores in parella uulneratos, supraq; hanc in lato tenuiq; tendine, pari modo ab ipsis curatos uidit: forsitan melius dicas nō curatos, sed perditos, paucissimi enim illorum, & ij claudi superuixerunt. Et uero etiā permultos in manu summa tendones, per quos digitiflectuntur extendunturq; uel contusos uel minimo punctu læsos, putrescentes adeo conspexi, ut coctis præsertim diutius in aqua similes apparent. Non enim secus exoluuntur & consistētia emollescunt, qui superiorem sanandi modum experitur. Itaq; ipsum reprobaui, ut qui partem uulneratam putrefaceret. Quoniam uero præsentia omnia ab humiditate ac caliditate id pati prænoscebam, curationem per siccantia refrigerantiaq; molendam esse deprehendi. Rursum apud me contemplatus,

C frigidum uero ab Hippocrate neruis inimicum dicit, optimum fore neruorum uulneribus medicamentū intellexi, quod & siccaret, & inter calidum esset ac frigidum, uel non multum a medio ad calorem recederet: calidū uero etiā esse satis posse, modo siccandi potestate polleat. Etenim calor citra humiditatem putrefacere nihil habet. Insuper illud quoq; cum cogitando adinuenissem, multum referre nudæ parti affectæ medicamentum offeras, an per alia corpora ei præposita, conuenire ad uerti alijs in nudato neruo uti pharmacis, alijs cū punctus fuerit, partibus quæ ipsi præiacent illæsi.

D Vbi etenim nudo neruo medicamentum adferas, ibi prædictam auxiliorum integrā indicationem assumi ratio est: præpositis autem partibus saluis, tenuius pharmacum inueniendum est: cuius uirtus interiorētes particulas permeando non dissoluatur, sed in altum penetret. hoc autem efficere tale pharmacum posse, si ualide siccet, & si non calore & frigiditate medium sit ac symmetron: ne que offendere, dū efficacia ipsius calefacendi uel refrigerandi in particulis, qua neruos corpori præpositæ sunt penetrandis imbecillior est redditā.

2 Atqui inuento iam præsidiorum scopo, in

substantiæ eorū tenuitate, deinceps materiæ mentionem facere oportet. Plurima igitur quæ calefaciunt tenuiorū esse partium, permulta rursus quæ refrigerat crassiorum, in Simplicium medicamentorum speculatione didicimus. quippe una solum interea qualitas acris cum tenui substantia nonnunquam sit, eoq̄ inter omnia quæ refrigerandi vim obtinent, tenuiorū partium acetum est quam acerrimum, quod etiam caloris exigui particeps esse demonstrauimus. calefacientium uero liquores prohi tenuissimā habent substantiam: & apud omnes iam homines Cyrenæus primas tenere cognoscitur: qui si non adsit, etiam medico utimur: & ipsæ quæ cum ipsis ab orientalibus plagis afferuntur, cuiusmodi est quod Sagapenum appellamus. hoc genere comprehenditur & liquor euphorbi in occidentis orbis regionibus natus, siue liquorem ipsum, siue aliud quid nominare uelis, nobis in toto commentario euphorbium hoc medicamentum uocare sufficit, quemadmodum iam omnes consueuerunt. Quinimo & inter ea quæ in nostra regione proueniunt & panacis, & tithymallorum liquores subtili facultate præditi sunt. Et uero etiā omnes nominati liquores generose calefaciunt, opobalsami uero qui subtilis & ipse est, non admodum calefacit. Ex terrestribus autem nitri spuma tenuem substantiam habet, item quod ex aqua facile soluitur aphonitrum, si ad corpora terrestria uidelicet relationem fieri inaudiamus. Subsequitur nitrum nomine berenicium, & asia petra, cuius flos etiam omnium terrestrium est subtilissimus. Porro ex metallis auripigmentum & sulfur, tum subtilia, tū calida sunt, quibus succedit misy, aris squama, & chalcitis, paululum simul astrigentia. Quare ista quoq̄ chalcitide frequenter in subtiliorum medicamentorum compositionibus utimur. Citra calorem uero manifestum tenuium partium metallica sunt, spodium & pompholyx: adde uocatur psoricum, subtilis abunde est & chrysocolla. Cæterum inter succos laurinum si mul cum eo, quod calefaciendi uirtute ualde pollet, quæ sensibus percipi queat, tenuem esse didicimus. Nihil enim minus eo cedrinus excalcificat, calore tamen qui sensibus subijcitur, propter substantiæ suæ tenuitatem, illi cedit. Eiusdem cum cedrino generis est lixiua quæ stacte, id est stillantia dicitur: atque hanc ipsam, quæ ex materia subtili ista fit, cedrinum oleum uirtute superat. Ex malo igitur & sicu, eaq̄ magis agresti, quam uocatur caprificum, item ex tithymallis combustis, huiusmodi lixiuium conficimus. Præstantissimus est ex tithymallis qui characias nuncupatur. Cæterum ex seminibus frumentarijs, uti nominant, subtilissimum est eruum, sine insigni calefaciendi potestate. lolum uero cum insigni: hordeū nequaquam calfacit. Mediam inter ea materiam obtinent, qualitatis amara, quæ multum tenuibus substantia cedunt, crassī licet nihil habentia. Nonnulla ipsorum à medijs tantillum declinarunt: alia ad calorem, alia ad frigiditatem, quorum omnium materias in opere De simplicibus medicamentis ex-

Galen.

A cutus sum: quemadmodum etiam omnium fructuum duri corticis, ac nucū generis, in quorum numero sunt amygdalæ amaræ & pistacia.

3 At stirpium materiæ in præsentia non meminī: redire enim ad principium cogito, atq̄ exponere quādo, quoq̄ modo singula per rationem nobis inuenta usurpauerimus. Hinc enim puto bonæ indolis iuuenes incitati iri, ut medicamentorum materiam cognoscant, ipsimet inspicientes, non semel aut bis, sed frequenter. quoniam sensibilem rerum cognitio, sedula inspectione confirmatur, cuius rei iudicium est euidentissimum, quod gemini per omnia similes esse nobis uideantur, differentes autem ipsi, qui ipsos inspicere consueuerunt. Hanc itaq̄ sedulam inspectionem negligas. Proinde herbarum, fruticum, & arborum materiam prorsusquam è terra eximantur, contemplari pulcherrimum est, dum fructus uidelicet futuri sunt, dum eduntur, dum augetur, & dum uigent. Hæc siquidem continua eorum speculatio docebit te, quando potissimum ipsos comode decerpas, ac in siccis domunculis repositos custodias, ne à solis radijs exurantur, neq̄ ab humiditate ex tecto uel muris madescant. id optime fiet, si domus neq̄ subterraneæ sint, neq̄ alijs uiciis, neq̄ sub tegulis, fed ostia ad meridiem spectantia habeant, prope quæ tamen medicamenta reponi nō debēt. Amici uos admoneo, ut in hoc quoq̄ me sequamini, si artis opera pulchre obiri uelitis, nouissim enim, quomodo ex omni natione præstantissima quotannis medicamēta mihi adferantur, eo quod perditī illi omnigenarum rerum comemptores (Græce rhopopolas uocant) uarijs modis ea contaminant. Præstiterat forsitan non hos solum, sed multo magis etiam mercatores qui illa aduehunt incusare, atq̄ his multo magis ipsos herbarios, item nihil minus eos, qui radicum liquores, succos, fructus, flores, & germina ex montibus in urbes conferunt: his siquidem omnium primi in eis dolum exercent. Quisquis igitur auxilium undiq̄ copiam habere uolet, omnis stirpium materiæ, animalium, metallorum, & absq̄ metallica natura terrestrium corporum, quæ ad medicinam usum ducimus, expertus esto, ut ex eis & exacta, & notha cognoscat, deinde in commentario meo, quem De simplicium medicamentorum uirtute prodidi, sese exerceat. Nisi enim hoc modo instructus ad præsentis operis præsidia ueniat, uerbotenus quidem medendi modum sciet, opus uero nullum ipsa dignum perficiet. Fingat namque ipsa, quæ de neruorum uulneribus prædixi, quædam aliquis cognoscere: adulterata uero medicamenta per ignorantiam compositioni insicere, uel neq̄ omnino exacte facultates ipsorum intelligere: an non erit necessarium frequentius hunc errorem quam recte agere? mihi quidem uel admodum uidetur. Iam uero ad plenum uirtutes cognoscere ab eo multum differt, quod est cognoscere. Etenim solum cognoscere, scire est an medicamentum siccare, uel humectare, uel refrigerare, uel calefacere sup̄re natura nos possit, accurate uero

tom. 5

O

cogno

cognoscere, præter hoc etiã uirtutis quantitatem sciuisse est. Quædam enim pharmaca calorem tepidum generant, corporibus nostris admoda: quædam moderatum, quemadmodum alia hoc paulo ualidiorem, nonnulla iam sic feruentem, ut urere possint. Conuenit igitur medicum non modo affectus qualitatem, sed etiã ipsius, ut ita dicam quantitatem coniectasse. nam haud ita proprie quantitas in qualitate dicitur, quanquam dicatur tamen, ut febris magna & parua. ac tantus usus est eorũ, quæ sic dicuntur, ut iam proprii uim obtineant ipsa, perinde ac pyxis, de omni materia, & χαλκίος faber ferrarius, & ζωγράφος pictor, & λευκόνιον ligni sectore, dicitur: quum hæ appellationes de buxco uase, æris fabro, animalium pictore, quercus sectore, proprie dicantur. Et in summa, omnia quæ ex uocato à grammaticis abusu inceptit: deinde uero propria dici credita sunt. Hæc quidem attulimus propter eos, qui parum opportuno tempore de sermonis proprietate arguantur. Quod autẽ dicere desit, tale est, nempe quod exiccari desiderat, nõ simpliciter siccantem indiget medicamento, sed conuenienti mensura. Copiosa quidem humiditate auctum, insigniter exiccante: parua, parum hoc faciente, quemadmodum multa admodum resiccantem; non tamen extreme, neq; in summo. siccitatis enim quantitatem, humiditatis copia respondere conuenit.

CAP. II Ego itaq; dum cõmunẽ neruorũ uulnerum curationis modum immutare primum ausus sum, conieci in quantam humiditatem caliditatemq; affecta pars recidisset. Et cum adulescens quidam mihi ostensus esset in primo articulo mediũ dextræ manus digitũ, totum circa neruum locum humentem adeo ex contusione habens, ut iam putresceret: partem sanẽ putrescẽtem cataplasmate ex lixiuua stillatitia & hordei farina (sic autem nosti me Omen Iylin Græcis dictam nominare) fuit: non putrescentem uero, fed tenfam dolentemq; oleo calẽte liberaliter perfudit; inde cum lana sicca madorem exhaustissem; ceratum tam liquidũ illeui, quã in fracturis utimur, cui euphorbium sit admistum. Confectum autẽ mihi fuerat hoc quoq; mea industria huiusmodi occasiõ. Profectus ad me quispiã hyeme uehementi, ostendensq; genu, facile dicebat rigore id affici: statim uero calefactiõibus iuuari. Rogabat igitur huiusmodi aliquod medicamentum darem, ut qui profectus in frigore inalgeret doleretq; uehementius quã aliàs. Nunc igitur, inquit, loturus discedo, mittam autem ex balneo qui medicamentum accipiat. hæc cum dixisset abiit. at ego cum tale nullum medicamen ad manus haberem, euphorbiũ cum oleo triui; & ceram liquatam immiscui, paulo post cum amicus pharmaco ferẽdo puerum misisset, exhibui. Dolore protinus cessante, inde in alijs particulis similiter affectis uti præcepimus, de quibus mox dicetur.

2 Nunc ad nerui uulnerati sermonem redeo, propter eos qui nihil quod ego nunc dico intelligunt: uitio autem uertunt dictumculas, quos inue-

nitẽ auguror Neurotrõtus, quasi neruifacios dicat; perperã eos nominari, qui in tendonibus uulneras accepserunt. Tẽdones enim ipsi puto uocari, qui extra manum toti carpo, id est brachiali, & digitis super tenentur. Quanquã sanẽ non ignorem manifestius, magisq; proprie Tenontrõtus, id est in tendonibus uulneratos ipsos nominari; tamen cũ omnes in neruis fauciõs nuncupare soleant, & ego ne quis innouare me appellationem dicat, conuetam pro uera suscepi, etsi nec illa sine ratione abire in consuetudinem potuerit, plerisq; medicis tendones etiam neruorum nomine uocantur occupantibus. Verum siue in neruis, siue in tendonibus uulneratos appellasse maui, neq; ob hæc uoces incolumes erunt, neq; cõuulsione laborabunt, quemadmodum neq; manci fient, nec morientur. appellatio siquidẽ nec seruauit hominem unquam, nec perdidit, sed medicamentorum facultas utrunq; efficit. Atq; ego hæc immutans, putrescentes conuulsos, mancos, nonnullos etiam pereuntes, sanos uiuosq; reddo. nam neruos contusos habentes sicut ille habuerat, in neruis uulneratos anteciperant, non in neruis contusos nuncupare. Cæterum curatio communis est, & periculum æquale amborum: nempe contusorum & uulneratorum uel neruis, uel tendinibus.

3 Itaq; homo ille putredine ita circa primum mediũ digitũ articulum orta, cum superficialium tentione doloreq; infestaretur, multo melius habere cœpit die postero, quo uice hordei farina, et uorum farinam ita ita lixiuua commiscuimus. Ac tertio sanẽ cum similiter etiã curaretur, iam quidẽ in alijs particulis dolorem omnino non perceperit, ex contusione uero neruosum quoddam corpus crassæ membranæ perfimile exertũ est, quod mediocriter me cõmouente facile totum semiputridum excidit. Videbatur omnibus contemplantibus hoc corpus neruis totus esse qui computruisset, ut qui ignorarent quo pacto tendones hi neruosis membranæ conuelati, per brachiale procedunt, & super totos digitos extenduntur. Mihi uero putridum ex cõtusione attollenti tendo saluus apparuit. Cum igitur uel pastillo uno, uel trochisco, uel ut cuiq; uocasse libet, quorum in numero est & ille Polyida, soluto ex hepsenate, uel syreo, id est sapa, (nam & hoc pro arbitrio nominare liceat) apparentẽ nerui particulã prius in unxissem: rursus eodem modo & cataplasmate, & unctione ex euphorbio in ipsẽ locis sicut prius, utroq; usus sum. Quarto iam die omnia cõposita circa contusum quidem antea, ulceratum uero tunc primum digitũ articulum intus, considerabam quorsum à cataplasmate transgrededer. Visum igit est si neruus inflammatione profusus uacaret, ad cicatricem ducentia transire: si uero phlegmones ipsius scirrhosum quidquã remaneret; aliquod ex abunde siccantibus exhibere. Quoniam igitur nõ nihil ex ea reliquũ esse uidebat, medicamentũ ex dracunculi radice cõfectum prius usurpauit; quod alia eadem cũ Aegyptio pharmaco quẽ Iliis uocatur cõtinet; assumptum autẽ dracunculi radice. Ab hoc ue-

ro deinceps Minerua dicta usus: inde ad ea, quæ cicatricem ducunt, perrexi. At cum aliū curare passillo sapia diluta nudatas vulneris partes illinens, euphorbium extrinsecus imponebam, tantum cere ac resinæ miscens, unde emplastrī crassitudo simul fieret, & euphorbij vires conseruarentur. Cæterum quomodo ad hos scopos respiciens medicamentum componas, deinceps declarabimus. Et tamen aliud quoque ex aceto pharmacum conficimus, hoc spectantes, uti ipsius spissitudo & subtilis aceti virtus, cum refrigerantis facultatis exolutione incolumis permaneat.

CAP. III. De his sanè quomodo composita sint, post paulū tractabitur. Nunc quia neruis vulneratis medendi modū ex rationali indicatiōe nurgatorio illo empiricorū casu repudiato inueni, totam cogito ipsam dicere, ita ut nullam distinctionem præteream, sermonem ab initio rursus repetens. Quando igitur vulneratū aliquē protinus suscipio, interim per liquida pharmaca curationem molior, interim emplastris: lanæ extrinsecus quam mollissimā oleo calente imbutā applicans. Quod si medicamentum ex aceto usurpem, aceti parum oleo admisceo, ac his tēre quotidie soluo, & oleo calente foueo. Si noctes longæ fuerint, etiam in his soluere consueui, idque magis facio, dum ulcus ad medicamentis eroditur. Nam ubi initio tali medicamento utenti æger nec se mordet, nec dolere, nec tensionē percipere mihi dicat, die soluo & foueo mane semel, & uesperī iterum: oleū uero quo fouemus, satis calens esto, uerū ita ne uulneratū forte offendat. sicut enim frigidum huiusmodi affectibus maxime est contrariū, sic tepens non omnino utile. Nāque in primo De simplicibus medicamentis uolumine didicimus, ut aqua in eo que calens aut frigida sit, maxime contraria facere nata est: ita quoque oleū. Nam frigidū corpori admotum, perspiratū quodāmodo ipsius obstruit, imò prohibet: calidum uero digerit ac extenuat. quod tibi etiam ex carnibus in eo coctis licet condiscere, similiter enim prærancidus friabiles efficit, etsi protinus cum animans maceratus est, in eo coquas, aut sartagine frigas, propter quod & ego fomentum ex oleo satis calente usurpare malui, tepidum semper uitans: adhuc autem magis frigidum. Porro ab aque usu in tota curatione ita tempero, ut ne attingat quidem ulcus, proinde cum sanguis initio statim ad uulnerata parte eluendus est, ex oleo id facere expedit. Vbi autē iam ægrī mediocriter habentes lauacro utuntur, neque tunc affectum locum in aquā demergere ipsis cōcedendum: magna siquidem ex parte nerui in manibus uulnerantur. Memini cuiusdam ex huiusmodi uulneratis, qui cum diem quartam citra omnē dolorē ageret, par tempore affectū absque phlegmone uideret, multo in frigore domo egressus ad opus quoddam necessarium, eique diu immoratus domum rediit, membro uniuerso ad ceruicem usque tenso, idque cum ingenti ipsius dolore. Postquam uero quodam me accersente profectus ad eum, uidi quibus in malis esset: oleū ex itinere refrigeratum à particula auferri iussi: ca-

Galen.

A lente uero totum membrum foui: deinde ceruicis partem aduerfam lanis oleo respersis, & medicamento liquido ex euphorbio, simul cum castorio hominē statim mitigauit: & somno accedente usque ad uesperam omnia cessarunt symptomata. præ omnibus igitur danda opera est, ut lana permaneat calida, siue oleo tantum, siue oxelæ, hoc est aceto & oleo quoque imbuta fuerit: fiet hoc si alia lanæ sicca extrinsecus circumponatur, & æger intra teetum cum hyems fuerit, ad quintum usque uel septimum morbi diem sese contineat. nam si eousque nec phlegmone aliqua tentet, uacetque prorsus dolore, & nullam sentiat tensionem, in posterum tutus erit. Curabis autē ne in aceto uinosum aliquid appareat: quemadmodum oleum quoque ut omnī adstrictione uacet. Neque igitur quod crudum uel immaturū dicitur, adhibebis: neque id quod ab Hispania uehitur, ac uocat Hispanū: imò nec aliud quodlibet ex his quæ oleæ surculos habent. Optimum oleum est tenue, quale in Italia Sabinum. alibi uero in nationibus Romano imperio subiectis, quæ nullam astringendi uim obtinent.

B 2 lam uero qualis res sit rationalis indicatio, & quanto ditior nuda experientia citra methodū uel hinc condiscēs. Cum permultis neruorum uulneribus sæpe in itinere, in nauigio, in agro, uel in ciuitate, sed procul à meis ædibus incidissem, nec medicamentis ex euphorbio copia adesset, nec illius quod ex aceto conficitur, nec alterius, pharmaca quorum forte fortuna eo loco facultas erat uulneri imponentes, propositum semper sumus affectū. Noui etenim me ipsum in agro propolum recentem, liquidam & pinguem, quam agricola habebat, uulneri imposuisse: interim fermentum solum, interim ambo cōmissa. At fermentum quam uetustissimum esse: propolum uero contra habere conuenit, quantum ad tempus attinet. Sin autem uetustior sit, ex oleo iuxta ignem, uel in sole emolliatur. Rursus in alio quodam rustico succum thymalli fermento mistum imposui, quem prope ipsius cohortem succreuisse conspexeram: quippe fermentum ut recens cōtemnebam. nonnquam & propolum ex oleo liquefactam fermento subegi, sed prius aceto quam acerrimo dissoluto. Præstat oleum esse uetus in huiusmodi missionibus puta ex oxymelite & fabarum farina, uel eruorum, uel Iolij, uel ciceris, uel lupinorū amarorū, uel tenuiore polentæ puluere, uel hordeacea farina, quibus in urbibus usus sum cataplasmatibus, non solum in his quos iam phlegmone prehenderat, sed etiam protinus ab initio. In agro cum et picem liquida apud fabrum inuenissem, fermento mistam imposui. item apud alium eruorum farinam illo subactam, cuius penuria etiam prædictarum quæuis misceri potest. Quinetiam oxelæum solum quod caleret lana exceptum, statim dum aliud nihil haberem obtuli, confusus aceto abunde acris & uetusto. In alio refrigerato, quod ante horā unam, uel longius etiam tempus neruus contusus esset, quousque mihi quoddam idoneum medicamen adferretur, expectaui, partem oleo foueri præcipi-

tom. 5

O 2

ens

ens, interim aceto prius admisto, quoniam aer per astatem calidissimus erat, mixtura ex utroq; diu-
tissime foui, donec aliud medicamentum allatum
fuit. Singulis autem prædictis farinis permixtam
quoq; statim sepe illui, & mox à principio, & po-
stea, cum homo medicamine quodam quod cru-
entis imponitur non probe usus esset.

3 Hæc itaq; omnia quomodoq; applices
medicamina, calida qualitatibus offeras. Et uero
etiam cum domo mea egredi festinans aliquando,
medicamentum nullum in promptu compositum
haberem, dedi cuidam familiari uetus euphorbii,
in unxiq; leue factum ex oleo ueteri, donec humi-
di cerati spissitudinem haberet, tendinis punctu-
re in manu admoueret. Reuerfus igitur interroga-
ui uulneratum, multumne calor in parte affecta
sentiret: ille medicamentum quendam respodit se per-
cipere. Rursum igitur quaesui, an rosionem à medi-
camento in uulnere sentiret: ille cum se non rodii,
sed ueluti prurium quendam sentire dixisset, phar-
maci ad noscitur usq; adherere permisi. Quonia
uero cum imposita abstulisset, calor in affecto lo-
co mediocri mihi apparuit, neq; punctus hians:
satius mihi uisum est eodem uti medicamento. &
uero cum uulneratus altero die prospere haberet,
item tertio & quarto, ad finem usq; idem pharma-
cum usurpauit: quod cõtemplatus quidam, in alio
uulnerato similiter recenti euphorbio in eundem
modum usus est. Quare necessario calor ægrum
multus, & commotus, & dolor in ulcere subsecu-
tus est: adeo ut homo ad me deductus sit, tãquam
hoc præter omnium opinionem accidisset. Atq;
ego statim re intellecta, quod impositum erat ab-
ieci: foris autem per oleum ipsi adhibito medica-
mentum ex aceto imposui, quod si non in provin-
ctu fuisset pharmacum ex euphorbio copiosioris
ceræ particeps admouissem. Quapropter nō opor-
tet, uti paulo ante diximus, probatorum medica-
minum facultates ac species ignorare, nec quæ ce-
lester uirtutem mutant: tum quæ rursus diutino
tempore conseruant. Nam ex his, quæ caducæ ac
statim euanescent calore habent, euphorbium
est. Id autem cognosces, etiam si nō manduces, co-
lorem contemplatus: quippe ut non ab initio cine-
reum, uerum subpallidum & subflauum redditur
in ueterascens, statim etiam siccum abunde uide-
tur tunc, & uix inter leuigandum ex oleo recenti
protinus imbibito dissoluitur. At subito ipsum o-
leo miscendum non est, sed prius in mortario sen-
sim terendum, ne dilatescat. Quid item opus est di-
cam, quod etiam gustanti tibi recens, percipiat
feruentissimum, ut linguam adurat, uetus autem
exiguam efficiat caliditatem: iam alijs quoq; mul-
tis pharmacis exillem potentia pauculis annis re-
tinere contingit, attamē euphorbium post thapsi-
am: hæc enim ab anno admodum imbecillis reddi-
tur, ut bimula prorsus expiret: euphorbium uero
cum principio bonum fuerit, & probe repositum
asseruatumq;, etiam anno tertio adhuc uim aliquã
retinet: interim & quarto, quinto autem & sexto
iam exoluitur: deinde procedente tempore in to-

rum elanguescit. Porro id quo me aliquando cum
inueterato oleo sine cera usum esse dixi, quinq; an-
norum aut sex erat euphorbium. Vnde usum ip-
sius mensura comprehendere nemo potest. Nam
recens oleo decuplo cum cera tripla commisce-
tur, ueterascens copiosius ei immittendum est: tri-
mum uero & quadrimum uel duplicatum prioris
pondus, uel æquale cera.

4 Cum igitur pharmacum consistentia simi-
le ac opis dictis unctionibus habere uoueris (quæ
spissitudo liquidæ etiam cerati est) oleum ceræ qua-
druplum esse curabis. Vbi uero ad emplastri spe-
ciem fiet, ceram omnino æqualem oleo miscere o-
portet, maxime si sicca fuerit, & uetusta: sicut re-
cens & pinguis pauciore oleo indiget, ut certum
in emplastri modum efficiat, idq; magis adhuc per-
astat. Itaque si ceratum emplastri formula fa-
cere statueris, ceræ ex oleo liquefactæ qua dixi sym-
metria sextam recētis euphorbii partem admisce-
bis, ut illius una sit drachma, ceræ sex. olei item sex
uel quinq;. Sed quoniam & cera glutinās ac uisco-
sa non est, quemadmodum resina & pix: ideo hæc
uel illa uel utriusq; partē cerato admisceo. Clarum
igitur est, dum hæc miscentur, nō amplius olei pa-
ri illis portione affundendum. Etenim cera ad li-
quiditatem multo pingui indiget: at resina quæ
quidem arida prorsus sunt pauco: liquidæ & sic-
cæ quandam substantiam ad emplastri crassitu-
dinem assumere postulant. In ceris igitur non ma-
gna humiditatis ac siccitatis differentia est: in resi-
nis, sicut etiam in picis genere: contra, arida ab hu-
midis permultum differunt. Omnium ergo resina-
rum siccissima est, quam nonnulli frictam, alij co-
lophoniam appellant. Huic succedit, quæ ex fric-
tilibus impura, nec fricta sumitur, quam si purges,
in fricta mutabitur. His ambabus siccior est, quæ
dicitur pitynon phlyema, ac si dicas picea gemi-
natio. Hanc sane ceu squalidam, in præsentis em-
plastri compositionem nō esse idoneam ratus, ab-
ieci. Vfus autem sum fricta & liquidis. Iam uero
ex his quoq; nōnullæ diutius liquidæ permanent,
quemadmodum terebinthina: alia cito inarescit,
sicut strobilina: media utriusq; est abietina. Quin-
etiam facultate calidior est quidē strobilina, mox
uero abietina, deinde terebinthina: compresis res-
nam miscere nō ausus sum, ut quæ nonnullis astrin-
geret. Putabit forsitan aliquis nobiscum dissentire
Dioscoridem Anazarbeum in sermone De resi-
nis, hæc uerba scribentem, primo De medica-
teria commentario. Ex omnibus resinis principa-
tes terebinthina datur, post eam lentificina, tum
ei quæ de picea raditur, & abiete: post quas pinea,
strobilinaq; numeratur. In his enim Dioscorides
tanquã de infima strobilina, optima uero terebin-
thina sentire uidetur. Verum ego ex his tribus re-
sinis strobilina, abietina, terebinthina principem
certe strobilinam calore, secundam abietinam, po-
stremam terebinthinam esse dixi. Quemadmo-
dum igitur qui inter Italiæ uina austera optimum
ponit uinum Italicum: alius ad qualitatem unam
sermonem referens: alius absolute de tota ipso-

rum substantiā pronuncians, uerus deprehenditur. Eadem ratione etiā inter resinas optimam, tanquam medicamentum in multiplices usus accommodatum, merito terebinthinam affirmaueris, non tamen caliditate primas obtinere. Itaq; ut aiebam, licet tibi quamlibet resinam cerā miscenti simplex ceratum glutinantius efficiere, quod ex oleo & cera duntaxat cōponimus. Hic uero experientia quoq; utilitas est, quæ de cōiectura nostra decernat. potes enim ubi triplicatam ceram terebinthinæ cōmiseris, intelligere, emplastrine spissitudinem iam medicamentum acceperit, an adhuc ficcius sit, ac copiosiore in super resinam desideret. Quapropter ubi hunc in modum experienti tibi medicocriter habere usum fuerit, miscbis tunc medicamento quod conficis duodecimā partem euphorbij. At si ignores euphorbij exacte sit calidum, an non nihil à tali discedat, post confectionem linteo paululum illius medicamenti illinum tuæ ipsius tibiaræ uel cubito horis aliquot imponito: postea si modice calefacere deprehendis, bene temperatum esse medicamentum arbitraberis. Quod si uel nullum sensibilem calorem edat, uel iusto feruentiorem, integrum est aut pharmacum remittere, aut intendere; remittere quidem mistura cerati: intendere apposito euphorbio.

5 Atqui si propolim pinguem habeas, eam omnibus resinis aptiore fore tibi intelligito, ut quæ uaporosam spiritus crassitiam, humoresq; superfluos elicere, ac ex alto foras ducitare suapte queat natura. Si quidē resinæ cum cera emplastri spissitudinis gratia, non tanquam curationis consilio adsumuntur. Propolis autem curationis ipsius scopo continetur, atq; hac aliquando sola, ut dixi recentis, quantum ad humiditatem attinet, usus sum in agricola quodam duro corpore: ac mirum est; quomodo sola ad usq; finem adhibita adiuuerit, adeo ut nullius pharmaci præterea uenerit necessitas. Alteri qui puncturam profundiore haberet, tithymalli cuiusdam exigram quid liquoris admisi sui: mollioribus uero corporibus medicamentum tactu durius apparet, nisi olei mistura uehementer ipsum mollias. Quin & alia medicamenta omnia quæ neruorum uulneribus adhibentur, liquida & mollia esse conuenit: mollitiem igitur quoduis oleum cōciliare, robur uero medicamenti uetus oleum tueri potest. Ut autem propolim in agro nonnumquam accōmodaui, tanquam melius pharmacum ijs quæ tum affuerant eligens, ita fermentum rursus in alio admouī medicamenti inopia, quoniam hoc quoq; in alio fixa extrahere & discutere sciebam. quanto autem uetusius fermentum; tanto est præstantius. Porro huiusmodi res nō solum facile in agris reperiuntur, sed etiam sulphur uinum, cum nonnumquam & ipso sum uisum miscens cum tetrapharmaco. Huic igitur & aphrolitrum, & berenicililitrum, & aphrolitrum non lapidosum, sed uere aphrolitrum, quod spumæ consistentiam habet, adijciens frequenter usurpauī, non modo in agris aliorum penuria, sed etiam præsentibus enumeratis medicamentis hoc

Galen.

nomine, ut animi sensum experientia explorarem, probaremq;: ac uulneratus talis rei solo usu conualuit, fatus uidelicet oleo. Hoc enim commune tibi esto in omnibus medicamentis quæ hic dicuntur neruorum uulneribus conducere. Iam uero & quod à medicis uocatur arsenicum, ab ijs autem qui attice omnia uolunt proferre arthenicum, adiunxi tetrapharmaco, quod animo conceperam experientia uolens pertentare: rursus cum id non adesset, sandaracham uti uocant, sicut calcem restinctam & usquam, lotam & illotam, minus autem uiuæ, plus restinctæ, & plus adhuc lotæ adieci.

6 Caterum de exacta cuiusq; componendæ quantitate paulo post dicemus, ubi hæc simplicia omnia, ususq; ipsorum distinctiones retulerimus. In hoc enim sermone propter empiricos, qui experiptosi, id est incidentia seu casu plurima cōpositorum medicaminum inuenta esse putat, usum mihi est cōmemorare neruorum uulnera curandi rationem, à me citra casum repertā inde, quod sanationis ipsorum scopum, & simplicium pharmacorum facultates cognoscerem. Etenim ex casu unum aliquod simplex medicamentū inuenitur, rationalis autē methodus plurima simul inuenit; & uarias ipsorum compositiones. Quæ igitur ex alto humores educere digerereq; natura possunt, neruorum uulneribus ex usu sunt. Quandoquidem uero nonnulla caliditate immoderatam, uel mordacem uehementer acrimoniam, uel acidam qualitatem coniunctas habent, alia ipsis pharmaca admisceri ratio est, quæ prædictos excessus sine uirtutis offensa temperare queant. At hoc fieri recte non potest, nisi cuiusq; medicamenti nō modo qualitatis genus, sed etiam quantitatem in ea cognoscas. Quædam namq; ut ostendimus in commentario De simplicibus medicamentis, in primo calefacientium ordine collocantur, à temperatis paululum abscedentia, alia in secundo magis inde declinantia, alia tertio, nonnulla quarto, quæ urere iam queant. Igitur pro uehementiæ uirtutis cuiusq; pharmaci proportione, miscendorum facultas inuenitur, modo simplicium omnium temperamenta intelligas. Empiricorum hæresis sola genere cōsimilia propter uniuscuiusq; medicamenti naturæ ignorantiam miscet: & qui hanc nouerunt, sola eadem miscent, quia excessus quantitatem certo non cognoscunt. Quod itaq; ipse primum præparauī medicamentum, ex multis eiusdem generis compositum est, quoniam nondum cuiusq; uirtutis quantitatem exacte pernoscebam. Inieci etenim nonnihil arsenici, sulphuris, misyos, calcis lotæ & illotæ, & pompholygis, similiter spodiij, item squamæ aris, chalcitidis usitæ, lotæ & illotæ, ad hæc non usitæ. Hæc igitur prius in aceto quā acerrimo diebus multis, sole æstiuo leuia reddidi. Quæ superfundī his debebant, cera erat necessaria, & mellis nonnihil prius expurgati: resinæ pro pemo dum omnes, propolis, pix, & ladanum. Li quida cyprinum, susinum, opobalsamum, amaracinum, gleucinū, cedrinum, & oleum ricininum

tom. 5

O 3

&

& uetustum. Ex singulis autem liquoribus, quos non multo ante recensui paulum aliquid, postremo aliàs aliud auferens experientia gratia, nihil simpliciora singula quibus in hunc diem utor, inferiora esse animaduerti: ipsorum autem symmetria mox ponentur. Itaque ex aceto, & liquoribus talia cofeci, cera, resinarum, propoleos, & picis non nihil adiungens, pari modo ex columbarum stercore & herbis tenuium partium.

Minus ergo molesta sunt liquida pharmaca cum alijs, tum neruorum maxime uulneribus, utimur etiam emplatri modo compositis, propter eos qui se laeuare uolunt. Lanis enim ablatis, ac tali pharmaco solo adhaerente minore cum molestia lauant. Praedictum enim est neque tunc uulnere affectam partem aquis respergendam si in manu id contigerit: pedem uero si is laesus sit, non madeseri qui potest: sed tunc a balneo primis quatuor diebus abstinentum est. Quoniam uero omnium huius tempestatis hominum, & eorum iam etiam qui ruri degunt fortitudo perijt, qui lauare se quotidie consueuerunt, e quidem qui non adeo delictijs affluunt (sunt hi maxime pauperes) ut plurimum obtemperantes nobis habemus: diuites uero & praesertim potentes admodum illos, uel aegre obtemperantes, uel prorsus immorigeros experimur. Optimum igitur fuerit nec ipsis mereri: uerum cum ne scio quo modo alius ob aliam causam, quidam nostrum inuiti, quidam uero ipsoform mollitiem tollerare coguntur, tale quippiam factitare consueui: uulnerata parti pharmaco aliquod in emplatri modo imponens, extrinsecus iterum multiplices panos oleo tinctos plures superiniijcio, quibus rursus extrinsecus factam ex linteis accommodo, quam deinde in ipso rursus balneo, cum aeger in solium est ingressurus, oleo prius perfundo: & loto uidelicet iam omnia imposta aufero; utorque praedicto totius curationis genere.

CAP. IIII. At uero patet omnibus eum qui pulchre neruorum uulneribus prospectus est, etiam particularum naturae peritum esse oportere. Nam antea comprehensum est, tendines pariter in quos musculi plurimi desinunt, non mediocriter condolere, primum quidem conuulsionem generantes, dein putrescentes & ipsos, uicinas simul partes ueras inficere. Nonnulli autem eorum ceu membranae tenues laetque sunt, quales in femorum terminis ad genua spectantibus, tum intra manus, infraque pedes subiecti sunt. Omnes enim qui in manibus pedibusque sunt, satis quidem coeuentes cutem contingunt: qui uero in patellam perueniunt, a circumposita cute per excoriationem abscedunt. Mihi etiam hoc forte fortuna contigit: etenim neruorum uulnerum curatione iuuenis adhuc cum primum ex Alexandria in patria reuenter annos uiginti octo natus, excogitauit. Quia uero singula pharmaca quae adiuuenerat medicis amicis non solum ciuibus, sed etiam uicinis exhibuerat, ut omnia usum ac experimentis firmarentur, uisumque erat, haud noui quomodo, ciuitatis nostrae pontifici, gladiatorum curationem mihi soli tradere, quam uis iuueni adhuc (uigelsumum

nonum enim tum primum attingebam) tunc uulneratos in priore infernaque femoris parte inuento praesidio curauit: in ijs sane qui per traserum percussis erant reliquum tendinis ipse amputans, ut tanta esset mihi curatio: qui uero paruum uel perdirectum uulnus acceperant, cum securitate simul & metu totam sanandi deductionem exerceat. Nam cum omnes ante nos medici plurimum aqua calente ipsos fouerent, & triticea farina ex hydrelaeo modo decocta illinirent, ego sane aquam omnino non obtuli: oleo autem frequenter respergens simul cum praedictis pharmacis, statim omnes sanitati restitui. Quando quidem uero multi superioribus annis fortuito perierunt, mihi tamen ne quidem unus uel ex neruorum uulnere, uel alio mortuus est, alter pontifex succedens illi, qui mihi tum me de di officium commiserat, similiter & ipse a septem mensium intervallo gladiatorum curationem fidei meae concedidit. Si quidem primus autumnali solstitio, secundus uigente uere pontificatu gestit. Rursus post hunc, omnibus a me seruatistertius, quartus, et quintus pari modo gladiatores mihi curandos tradiderunt, ut iam permultum illam medendi curationem exploratam habeam.

2 Quinetiam hoc tempore tale quid industria inuenimus, cui animam aduertere maxime illos medicos conuenit, qui uulnerum curationem recte administrare cupiunt. Contemplatus enim gladiatorem quendam ex his quos equites nominat, transfersam diuisionem in priore ac inferiore femoris parte habentem, eamque satis altam, ac uulneris labrum intuitus, sursum alterum reuulsum, infra alterum quasi ad patellam detractum, non dubitauit distantes inuicem musculorum partes futuris contrahere, curatione illa quae per latitudinem dicitur neglecta. Itaque ueritas tendines ipsos consue, demudatis prius illis, sic altioribus futuris usus flum, haud ignarus carnosam ipsam musculorum partem periculo uacare, tendines uero non item: quamquam hoc nullum ex preceptoribus facientem uiderim. Quidam siquidem ipsorum in huiusmodi uulneribus solas cutis oras consuebant, nonnulli in carnis partibus musculos ipsos fuere ausi, id in superficie ipsorum facere solebant: proinde si quando uulnus insigniter altum, non secundum membri longitudinem cogerit, summam quidem musculi partem glutinabant, reliqua uero totam inglutinata relinquebant. Etenim in uulneribus iuxta membri longitudinem factis deligaturis uulnerati musculi partibus inuicem contrahendis sufficit. Per transfersum uulneri accepto, cutem deligaturam nihil prodesse possit: ex sola futura totum absolutum. Haec igitur nisi quis altas faciat, musculi in profundo partes inglutinatae permanent. Caeterum nonnulli opus a me confectum imitantes, anatomes imperiti, ab omnibus musculis subiectas membranas auellunt, nescientes has simul cum musculis tuto consue: tendines autem similiter ipsis dilatatos non mediocri cum periculo. Verum quomodo cum illi dilatati fuerint, tamen crassiores adhuc durioresque membranis sunt: tenues abunde illos uidebis, & in omnibus iuxta abdomen musculis

musculus, præterq̄ duobus rectis, quibus obliquo rum membranose aponerosos (si sunt nervoli ex musculus exortus) incumbit. Alius tendo nullus præter enumeratos membranæ modo dilatatur. Quippe seruant omnes lati crassitudinē magnam satis, ut neminē latere queant. Atqui sympathia, id est naturalis cōsensus superpositatū partū usq̄ ad ipsum neruorū principiū non minus quàm in femoris termino musculus tum in cubiti gibberū, quē Cræci Ancona uocant, tum in calcaneū inser tis accidit. Dilatant itaq̄ utriusq̄ tendines, sed ita ut crassitudinem notandam retineant: calcis tendo ex fura descēdens magis adhuc robustus cras sissq̄; ceu ex tribus neruosis exporrectionibus cō positus apparet. Latuit autem hoc ætate nobis ma iores anatomicos, sicut & pleraq̄ alia in totis mu sculis, ac multo etiā magis in uenis, arterijs, & ner uis. Multi uero iam ex meis sodalibus etiānum hæc omnia nouerunt: & discipulis ostendunt, li bris meis anatomicis perceptis. Memini sanē ex a natomoe euidenti, nihil ut quis putauerit com mune cum opere De medicaminibus componen dis habentium, timens ne ex huiusmodi inscitia errates uel uniuersam curandi rationē suspectam haberet, uel frustra membranas auellerent, fugien tes inde sicut falso existimant noxā futurā. Quem admodum alij quidam, cum non ualeant ligamen ta cognoscere, ea tanq̄ nervos & tendines uulne ratos suspecta habēt, à periculo alioquin remota, quomodo cūq̄ afficiantur: utpote insensilia, & ex olsibus nō musculus orta sicut tendines, uel ex ce rebro spinaliq̄ medulla ut neruū.

3 Optime igitur uelut alia pleraq̄, etiam in his permutati medici clarissimi dixerūt, medicinæ par tes multam opem requirere: tum quæ manu, tum quæ medicamentis, tum quæ uictu medetur, ac sa nē maxime illā quæ manu curat, reliquis duabus indigere. Itaq̄ si frequenter in simijs cuiusq̄ tendi nis, et nerui positū ac magnitudinē contempleris, exacte memineris etiā si humani corporis inci dendi copia tibi unq̄ suppetet, singula ut uidisti celeriter inuenire. Quod si in exercitatus omnino facias, nihil inde promoueabis: quemadmodū nec medici bello germanico, barbarorū corporū infe ctionis potestate habentes, amplius quippia dīdi ceruntq̄, quæ coqui intelligunt. Etenim Empiricorū anatome fortuita occasione contingens pro lixi nugamentū est, simile capris, quæ iuncis acu tis cōpunguntur. hæc nugacior est ex libris anat omicis insitutio, non ab similibus ijs qui secundū pæ ræmiā, ex libro gubernatores esse dicunt. Quandoquidem enim cōtemplosati palām à præceptore ostensos in corpore neruos, & tendines ipsorum, nisi denuo eos uideant, & tertium, & sæpius deinceps, loci accurate, in quo positi sunt non memi nere, multo minus ex lectione poterūt addicere.

4 Itaq̄ huius tempestatis Empiricorum opti mus, cum libros omnes anatomicorū perlegisset, puerū filio in interiore brachij regione, supra me dias ipsius partes in schola quandoq̄ punctum, pharmaco emplastico curare aggressus est, cuius

A experientiam ex nerui uulnere curato paulo ante acceperat, puerumq̄ ob id ab inflāmatione ac do lore immunem uidens, in totum curatū putabat, uerum repetente septimo die cōuulsus periit. Ille igitur cum factum quasi cuius ratio, aut causa dari non facile posset, nobis recenseret: ego uero medi camenti cōpositionis scripturam recitaret postu lassem, ei cum id statim egisset, hæc protinus subieci, nunquid recensendo, quæ puero neruū uul nerato nuper contigerunt, plus aliquid narratio ni adiecisti, quàm quod medicamēti mirifice pue rum recens uulneratum curantis experimentum habueras? Ut autē ille confessus est nil se aliud ser moni addidisse: rursus igitur in quā, audi à me quid gestum sit. Notabile uulnus erat nerui percussū, quod medicamento hoc curatum esse dicitis: & qui dem audacter in id genus uulneribus iterū eo uti tor; punctus autē neruorū angustam cutis diuisio nem habentes tale pharmacū sanare non potest, sicut nec id quod puncturis mendendis dicatū est, ipsi neruo nudo adhibitu. Quippe multo calidius est, magisq̄ mordet, q̄ ut nudus neruus erosionē eius & ardorē sustineat. Vbi uero & cutis, & mem brana super ipso, item caro præposita est, mordax medicamentū, si tenuiū etiā punctū sit, eadē ratio ne neruo medet, qua pharmacū tuū, quādo ipsum solum nudum neruum affectum contigerit. Præci pua autem danda opera est, ut oræ angustiorum punctuum aperta sint, ut calidum medicamen ex trinsecus applicatum per eas uapores educat, at trahens humiditatem circa affectum locum in al to latentem. ob quam rem in id genus puncturis orificium duabus in cutem sectionibus secundum rectos angulos diuidere oportet; atq̄ tū hæc, tum alia multa prius relata dixi ei, qui in pueri neruo uulnerati curatione errauerat adeo, ut ex praua mendendi ratione ipse cōuulsus interierit. Itaq̄ om nes norunt etiam punctæ partis naturam indi care nonnunq̄ uulnus absq̄ periculo, nonnunq̄ suspectum esse, cum neruum subiectū uiderimus, ut in puero ad brachium puncto: non enim ferme ne locus potest exprimi, ubi quæ per alā in totam manum pertendunt, brachio inseruntur.

5 Et sanē hic quoq̄ demirari est Empiricorum litigandi studiū, qui quidem in alijs, omnibus me dicinge opus quodlibet subinde contemplosati, me lius ipsum imitari cōcedunt, quàm si raro uiderit: itidem melius eum quodlibet opere perfungi, si fre quēter illi adsueuerit. sola uero quæ ex corporum incisione cognoscuntur posse quæmpiām firmiter assequi, modo anatomicorum uirorum historiā perlegerit: cum uel ex ijs, qui à præceptore ostensas corporis partes conspexerunt, nemo semel uel iterū speculatus adamussim memoria tenere possit, sed frequenter illum conspiceret conuenit. Ner ui autē non modo magni in alto particulas mul tas corporis permeant, sed interim quoq̄; solum dī sributorum tanquā radices quædam sunt, in quibus uulnerati nisi probè curentur, subiacentium magnorū consensorium affectū obtinent, unde hī prodeūt, quos in anatomicis administrationibus

accurate pertractauimus, ab omnibus qui me præcellerunt omisso. Atq; has radices nisi crebro in simijs fuerit intuitus, fieri non potest, ut cum humanum corpus in cōsecutionem nactus fueris, exacte deprehendas; quemadmodum multo minus in anatome fortuita, quam & speculationem uulnerariam nominant, locum ex sola lectione inuenire queas; quanq; nec aliquis permulta uulnera ipsemet inspiciere poterit, si ea excipias quæ in bello contingunt, in quibus & ipsis nemo dum saucium cito curare studet, contemplantur, ubi uulneratis partibus nerui, ubi arteriæ, uenæq; subiacent. Videntur itaq; in huiusmodi affectu curantionib. anatomes imperiti similes ijs qui iter in lectione cæci faciunt, eoque uehementer errant. Verū qui inter ipsos partium & experientia ex incisione cognita, & methodum cōsecutionis, ususq; medicamentorum coniunxerit, is semper neruorum uulnera uti nos sine omni periculo curaturus est, ut nec principior ulla pars cōdoleat, nec uulneratus neruus, aut cōtus inflammatione laboret; ubi iam hæc sunt, multo minus uel putredo, uel claudicatio, uel conuulsio, uel ipsa mors comitabitur.

Consecutiones medicamentorum ex metallicis, ad neruorum uulnera. Cap. V

Ex metallicis medicamentis astringentia uitare consulum est, præsertim ubi compositi pharmaci usus in punctura ueniat; que uero detergendi uim obtinent, sicut æris squama, ex usu sunt. Cæterum omnia metallica, cum crassiorum partium existant (multum enim terrestris substantiæ in se continent) artificij nonnihil in præparando requirunt, quo tenuiora fiant. hoc igitur ex aceto facere quam acerrimo excogitauit, præsertim quod ex uino non aufero consecutum est, ac si ex tali non sit, sed admodum uetus, eo utitor. Attende tamē diligenter in gustu, ne tibi uel minimam uini qualitatem referre uideatur, tale quippe acetum ualidam excedendi secandiq; uicina potestatem non habet. Iam uero metallica ex acerrimo, et q̄ fieri potest uetustissimo, substantiaq; tenuissimo leuigare oportet, eum qui consistentiæ crassitudinem deuitat. Præstat autem id in sole æstiuo perficere. Sunt quidem ex metallicis quæ nec cōminui nec cribrari postulant, cum facile ab aceto soluantur, sicut chalcitis, & misy. Nonnulla & contundi & cribrari desiderant, quemadmodum æris squama. Cum igitur primum præparatū medicamentū, immiscui ei & arsenicū, postea superfluū esse putauit. etenim ex æris squama & misy, & chalcitide medicamen compositum iri, abunde mihi satis uidebat. miscui autem prima cōsecutione etiam æruginem combustam; nam quæ ignem experta non erat, tanquam iusto mordaciore suspicatus sum; deinde tamen non uisæ paucillum simul adieci, quantum aliorum portio ferebat. Pari modo chalcitidē, crudā sanē paucissimam, uisam uero æqualem misy & æris squamæ indidi. Præstantius autem omnibus compositis fore sperauit, imò etiam usu deprehendit, in quo plurima æris squama inesset, dein chalcitis combusta, postea misy. Quæcūq; igitur miscebis pharma-

ca, ad solem, ut dixi, uerno tempore, multis deinceps diebus in puluerem ex aceto macerissimo redigantur: quanto enim longior tempore trita fuerint, hoc tenuiorem substantiam cōsequantur, ideoq; angustis uulneribus aptiora; sicut in neruis denudatis, admodum tenuia ex dentiaq; cauenda sunt, ob quod prædicti pastilli omnibus idgenetria conueniunt: siquidem nonnulli astringentia quoq; assumpserunt. Porro celebres ex illis sunt, qui ad Andronem, Polydam & Pasionem auctores referunt. Sunt & alij quidam quartus & quintus illis ualētiores, quibus ego subinde utor. Symmetria uero ipsorum perfectæ fermonis processu dicentur, nunc de eorundem usu tantū explicasse sufficiat, quòd tritos ipsos aridos, postea rursus siræo, id est, sapa, adiecto ita terere conuenit, donec sordium spissitudinem recipiat medicamentum, & æqualiter leue fiat. uocant autē nunc omnes apud nos & siræon, ex multo decocto natum. id autem nihil uinosum habeat, quale non ex auferarum uinum, sed quammaxime dulcium musto præparat, neq; ex primo fluente, sed postremo. Si igitur tale mustum exiterit, coquendum est, dum ad dimidiam partem mensuræ cōsumatur: si minus tale, ad tertias coquendū est. Huiusmodi quidem decocto pastillos soluere expedit, ut mellis crassitudine linamentis excepti, neruis denudatis imponantur, maximeq; ex ipsis tēperiores, qualis Polydæ est: ac multo sanē magis, si corpus sit tenerum ac molliusculum, in quo & prorsus a pastillorum usu te abstinerere tutius est, alijs utentem pharmaci, de quibus iam sermo factus est, iterumq; fiet. Neruo autem nudo, linamentis cooperto, extrinsecus uinum aliquod ex ijs quæ ad angusta uulnera conueniunt, superdandum est. Quorum sunt quatuor genera, unum hoc, quod ex metallicis conficitur alterum quod ex liquoribus, inter quæ referunt & illud quod ex euphorbio constat: tertium ex columbarum stercore: & quartum misce à me appellatum, quo etiam ad neruos tenerorum corporum omnino denudatos utor. Ex his quatuor unum quoddam toti affectu particula circumdandum est ita, ut sanarum quoq; partium multum uelut comprehendat, præsertim superpositarū, quas bis die, uel ter, si necessitas incidit, perfusione fouere oportet. Quinetiam nocte interim, linamentis quidem denudato neruo impoitis: cæterum eo quod extrinsecus ad motum erat ablato.

2 Porro quum permagna humanorum corporum sit differentia, tum in natiuis ipsorum temperamentis, tum ætatum mutationibus, in super uita studijs, nulla ratione quod componitur medicamentum omnibus cōuenire potest. Quamobrem duo in promptu habeto, alterum ualentius eiusdem generis reliquis, alterum mitius, quibus inuicem misitis, dum usus postulat, permulta inter hæc media iuxta mixture quantitatem constituas. Si namq; parem utriusque portionem confuderis: mistum exacte medium amborum erit: quòd si alterius plus adijcias, tantum à medio ad illud summum recedet, quāto mistura superauerit. Esto igitur

tur ualētissimū metallicū ex his constructū, unam partē crude chalcitidis habeat, duas misyos similiter crudi, tres aëris squamæ: in ualētissimū, unam itidē misyos & chalcitidis, sed utriusq; combustit; squamæ quatuor, at uero amborum medium, quo subinde uafus sum, tale esto. Misyos, chalcitidis, aërginis, cuiusq; usti pars una, aëris squamæ partes tres. His, sicut prædixi, contritis, ceræ in ualētissimū modū duplum, in altero duæ partes & s. miscētur: in medio, quod intra hæc consistit, partes duæ, & quarta: sicut in primo trium quod ualētissimū esse dixi, omnes partes numero sex ex misy, chalcitide, & squama collectæ nascunt. His ergo duodecim ceræ partes adijciēt. At in medicamento in ualētissimū, si metallicorum sex partes existant, ceræ octodecim apponas: in mediocri amborum medium. Sunt autē inter octodecim & duodecim media quinque & decem. Siue igitur denariū unum statuas, unam esse partem, omnium uidelicet tot denarios adijcito quot partes, siue unciam, siue libram. Sic enim apud Romanos cōsuetudo est nominari tot uncias uel libras. Porro mensura quidē apud ipsos est, qua oleum metiunt, insecta discretæq; lineis, totā in duodecim partes diuidentibus, atq; integra mensura ab eis libra nominatur: duodecima uero eius portio uncia. metallica igitur & cera in lance alijs uncijs ponderantur, oleū cornu metiuntur. Itaq; prædictis pharmacis omnibus iuxta ceræ proportionem oleum immittatur, superetq; in singulis ipsis dimidium, ut si cera uncias viij. compleat, oleum duodecim, hoc est integram libram pendat. Esto autē id Sabino simile, partium tenuiorum minimæq; astringēs, aut etiam si uetus sit, præstat. Acerbum uero, & quod ex oleæ furculis confectum est, nequaquam cōuenit. Cæterum omnibus medicamentis cōmemoratis, ubi metallica ex aceto pluribus diebus in mortario trita fuerint, thus candidissimū & pingue admisceatur: deinde rursum unā cum metallicis diebus aliquot leuigetur, priusq; ceratum eis immisceas. Quanta uero ex omnibus metallicis copia colligis, huius partem dimidiā thus cōtineat. Quod si mollius medicamentum facere postulas, amplius quā dimidiā: sicut ubi acris expetis, minus dimidiū adiungas. Et uero etiam ceræ cum oleo liquatæ resinam quandam ex ijs quas recensimus, misceas licet, scies acius ipsam adiecta strobilina fieri: mollius terebinthina, medium utriusq; abietina. Ex harum genere larix quoq; est, prædictis planè humidior, cōsistentia uero similis liquidæ piceæ, quam loco terebinthinæ infitores uendunt, ignorantibus eas discernere: est autem talis resina odore, gustu, & facultate quā terebinthina acrior. cū hac igitur & terebinthina, larix persimilem potētiam obtinet, sed tenuioribus partibus maioreq; discutendi uirtute prædita est. Miscebis igitur ceræ sextam superiorum resinarum partem, uolens medicamentū emplastri figurā induere. Nam unī ceræ pondore resinæ uncias duas adijcies: sin autē liquidā insigniter fuerit, uel unam tantum miscece satis est. Attamen si ut in modū emplastri pharmacum

A fiat, nihil curas, resinam addere non admodum opus est. & chalbanī uero æquale thuri pondus indes, ubi mitissimū reddere medicamentum statuis, dum ualentius, dimidium: quando ipsorū medium, id quod inter æquale & dimidium est. Verbi gratia, si quatuor thuris denarij fuerint, duos chalbanī impones, ualidū permanere medicamentum postulas: mite, quatuor: medium tres. Vt enim molle & dolorē leuans quippiam habet, ita quoq; purificū, quod sanè & plurimīs mollitibus accidit. Quare cum neruo denudato pharmacū adhibes, non adeo chalbanum esse cōmissum oportet. Quod si nudus ille non est, haud mediocriter ipsius admistio dolore auferendo cōuenit: ideoq; tale etiam medicamentum acuto sensu præditis, teneris & cacochymis paratum habere expedit, in quo plus chalbanī adiectū sit. Omnia siquidem metallica exasperant, doloremq; concitant, & ex liquidis acetum, unde merito ex illis cōfecta phar-maca aspera uidentur, & dolorifica, ob quam rem & fots ex oleo, & chalbanī mixtura similiter ipsis idonea est: nihil autem minus tenuum partium adeps chalbano dolorem sedat. Quare uelim te aliud quoq; medicamē ex his aliquod præparatum habere, quod ex metallicis cōposito miscece possis, tum in diētis corporibus, tum in ijs quæ asperum & dolorificum quandoq; medicamentū perceperint: deligēdus autem adeps, qui tenuiorum partium existat, cuiusmodi sunt agrestiu animantium, maxime leonis, pardī, hyænæ, & ursi, ad hæc uolatiliū, maxime anserum: horum inopia agrestium gallorū gallinarumq;, ita uero anserū quoq; syluestriū. Nam animalium quæ in urbibus aluntur, & tanquam in ocio cōclusa sunt, humidior est adeps & crassior. Cæterum quando pharmaci cōsistentia cerati spissitudinem habebit, ceræ tertia uel quarta pars admisceatur: uel si adeps humidus nimium esse tibi uideatur, licet & ceræ dimidiā adijcere: quemadmodum & ubi sicca fuerit, quartam: cum mediocriter habet, tertiam. Porro huiusmodi ceratum quod utile nobis futurum est, ex seuis nominetur.

De medicamento quod ex euphorbio componitur. Cap. VI

Dictū mihi est & antea uetus euphorbium recentiori multo inferius. Si igitur anniculum sit, etiam Cyrenæo magis succo excalfacit, præsertim eo quem nunc habemus, ex quo per aquæ irrigationem stirpes augent, & ad liquoris copiam generandam preparant. Nam post annū unum abum de calidum est: deficit autē iam non mediocriter a recentī, bimum adhuc magis a nouo degenerat: quemadmodū trium aut quatuor annorū, etiam hoc magis. Vetusioris uirtus omnino resoluitur. Cognosces autem, ut dixi, quam ætatem, quamq; uim obtineat, & colorem & cōsistentiam eius respiciens. Colore quidem uetus nouo flauidius pallidiusq; apparet: cōsistentia durius & siccius. Iam si gustu uoles discernere, non coniecturalem eius dignotionem, sed firmam habiturus es: quod uero dixi, calfactoriam unctionem ex eo me confecisse extemporalī usu exigente, exactissime pharmaci

maci facultatem tibi indicabit. Constat autem hac symmetria. Vna pars est euphorbij, tres cere, olei duodecim: ceram quidē euphorbio triplo copiosiorē, oleum uero quā ipſa cera quadruplo eſſe cōuenit. Vbi igitur in hunc modum medicamentum cōpoſueris, fricata eo parte aliqua manifesto licebit dignoſcas, quanta uirtute obtineat, maximē autē in balneo innotefcit. Si quidē ab aere quidem mor dentur, ſed magis adhuc ualide ab aqua, ubi fuerit ualida, & Euphorbium recens & forte. Tale igitur conſecutus, & hanc ipſam cōmemorata m unctiōnem audacter puncturis imponito, in quibus oſculum obturare uereriſ. Si imbecillius fuerit, auge meſuram euphorbij pro imbecillitatis ratione, interim partē unā ac dimidiā iniiciens, interim duas, nonnunquē etiā pares cere, & plures ſi uetus nimis extiterit. Primus ſanē uſus in puncto neruū, uel tendonē, ad ſecundū te deducet. Si naq; & uulneratus ipſe eroſionē ſenſiſſe dicat, tibi q; ipſi partes puncturā ambientes calidæ appareant, tum ipſa punctura magis ac par eſt elata, & ora inflammatioe ſubafficiantur, uel olei copioſioris miſtura, uim medicamenti remittes, uel cōpones aliud ad priorē ſymmetriā, aut euphorbio uetuloſiore moderatū ita efficiēs. Quod ſi e contrario quā dixi, eueniat, uirtutē pharmaci adaugebis. Si mediocriter omnia habere uidebunt, ſeruabis. Itaq; cōſecuta ceram triplo euphorbio copioſiorē cōtinens, aliarū eſt ualentiffima, cum illud (quemadmodū diximus) recens additur: quin cuplo autem habens inualidiſſima; quadruplo capiens, medio inter utraq; ordine conſiſtit:

2 At ſi uelut unguenta proponis efficere, qualia à medicis a copia, id eſt laſitudinē leuantia, nun cupantur, oleum cere quadruplum immiſcebis. Si uero ut in fracturis liquidum ceratum parare, duplū: quando cera & ſicca & pinguitudinis expers fuerit, etiā amplius quā duplum: plerunq; uero ſufficit unius partis dimidiū duplo apponere, ut tota cere meſura duarum partiū & ſemiſſem fiat. Atqui in modum emplaſtri medicamen cupiens imponere, oleum pari meſura cere miſcebis, ſiquidem ambiens fuerit calore temperatus: ſin cere uetus & arida & illud frigidum eſt, paulo amplius: ſicut cum cera eſt pinguis, ambiēs calidum, paulo minus. Id aut minus duodecima utroq; uer ſum medijs portio eſt, etenim & undecim, & tredecim nonnunquē olei uncias cere libræ miſcut, tum pro eius cōſiſtentia quantitate, tum aeris circumflui caloris frigoriſq; raro autē paulo plus, uel minus: uerum ut colligationē, pinguitudinem uifcoſitatemq; haberet, nec friabile eſſet, aut facile diſſolueretur, aut à cute decideret, adiunxi reſinā ei, potiffimum ſi aderat, terebinthinā ueram: ſin minus, paratiſſimam ubiq; quā frictā & colophonitā appellant, eamq; pari cum cera pondere conſeruat enim medicamenti quibus iniecta eſt, prorem cōſiſtentiam, ubi & ipſa medioriter habeat: quippe notum eſt ut in omnibus alijs, ſic in reſina quoq; maioris minorisq; rationem cōſiſtere. Itaq; ſi pinguior liquidiorq; nonnunquē appareat, ſcien-

A dum eſt, ceratum quod ex cera cum oleo liquata prouenit, liquidius multo quā fuiſſet, euoluſurū. Summatim, in neruorū uulneribus, cum interim ab exacta mediāq; medicamentorū emplaſtri modo conſectorū conſiſtentia erratum fuerit, ad molliore potius tendere, ſi in inquinatum quoq; ſit, quod conſectum eſt: ſimili ratione & quod conſiſtentia mediocri eſt. Pix artē cerati conſiſtentiam ſeruat: optima uero, ſicut dictū eſt, in talem miſturam pinguis exiſtit, quemadmodum & reſina. Si liquidam reſinam iniicias, quali cōſiſtentia eſt terebinthina, tertiam ipſius partem cere eſſe oportet: atq; ipſa terebinthina recens, ueteri longe eſt liquidior. Memento te igitur, quod de cera & reſina audiuiſti, id in omnibus obſeruare, nec enim ex ſiccis, & aridis uel tempore, uel ex primaria natura, uerum ex mediocribus conſiſtentia, tantum cuiuſque miſcendum eſt in medicamentorū cōpoſitione, quantum à me ſcriptum inueniatur. Eſto igitur quod uim & ſubſtantiam prædicti medicamenti mediocrem habet, cere, reſinæ frictæ, & olei pares portiones continere ipſius euphorbij ſextam, ut ſingulorum ſit illorum libra, euphorbij uncia dua. Quod ſi molliuſ ipſum reddere uoluerimus, octauam euphorbij partē iniocere ſufficit, hoc eſt unciam & dimidiā, in recente & calidiſſimo uelut præcenſui, euphorbio ſymmetria hæc deſinita: nam ſi uetuliſſus ſit, eoq; imbecillius, copioſius hoc aliorū portione eſſe debere, prius indicauimus. At ſi non reſinam duntaxat, imo etiam picem iniocere eſt animus, ſeliſtram utriuſq; miſcebis, ut modus cere ſit æqualis.

3 Quancq; multo præſtat medicamentum, ſi reſinæ picisq; loco propolim cere parem adiungas. Quod ſi ipſa pinguitudinem non habeat ſimiliter reſiniſ, ſi adhærens pharmacū, ut falciſis ligari non opus ſit, eſſe curemus, terebinthinam, uel laticem nominatam, uel etiā ſyncomiſtem pineam inde mus: uoco ſyncomiſtem, quā in alueis & dolijs comportant ligna multa, ac lapidoſa corpora in ſe habentem, quæ liquata, dum percolatur pura tūc, ſicut colophonia, & fricta dicta redditur. Quin & reſinas autorhythus, id eſt quali ſponte fluētēs admicere licet. nominant ipſas in Lacedæmone, ac alijs regionibus nonnullis protorhythus, quaſi primiffuas dixeris. in Cilicia uero nuncupant talem reſinam capnelæon, liquidius omnibus reſinis tum liquidiore, tum calidiorē, tum partibus tenuioribus præditam: quare potentia quidem hæc medicamenti quod componis conferet, ac maxime iniicienda, cum euphorbium roboris expers fuerit. Porro & inter alias reſinas odorator eſt, ſicut terebinthina & abietina. enim uero dictum eſt antea, terebinthina abietinam eſſe calidiorē, hæc uero ſtrobilinam. Differt autem à prædictis reſinis, quod uocatur ſtrobilinum phyſema, & pitynum, adeo ſiccū, pinguedinis expers, a reſenciſq; utriuſq; celeriter, ut in piſa cōtundatur, & cribro ſecernat, quare ad propoſiti medicamenti cōpoſitionē nec tibi hæc cōueniūt: uſus tamē ſum frequentiffimus, cū euphorbiū anniculū exiſteret. Porro dū cōpo-

nitur, olei, cerae, resinae frictae, singulorum pondus libram misceo. picis pinguis felsibram, & his liquefactis, euphorbij pondus unc. ij. si imbecillius sit, si, si terebinthinam cerae adijcere uoles, unā. Medicorū pharmaci cōsistentiā faciēs, si cera terebinthinam liquidā & recentē triplo superet, huius uero exiccatae tēporis spacio resinae dimidiū pōdus oleo adequato. Totū autē ex tribus misitū, oleo inquam, cera, & terebinthina, cum sit librae unius ac semisis, euphorbij anniculi unc. i. accipiet; si tale non extiterit, unā & semissem, unde sicut iam subinde dictauimus, euphorbiū pro tēporis ratione augere nobis est integrum. Quinetiam, si uulneri impositū pharmacū primo usu uidetur quodammodo imbecillius, euphorbiū oleo leuigatum, medicaminē emplastro, manibus autē subactō licet admiscere; sic enim nobis facientibus, promptē unitatē accipit. Cæterū in prima pharmaci cōpositione satius est ceratū rasum seorsum, ubi preparaueris ita leui facto ex oleo euphorbio admiscere. Quippe ijs quæ liquata sunt, ipsi superfusus in mortario, plerumq; fiunt encerides nominatae, praesertim ambiente frigido. A quam uero cerae liquefactae cū resina cōmittere nō est necessarium, sicut ego ab initio factitabam, tantū ei admiscens, quantum in ipsa cōctōne consumendum erat.

Medicamentum ex liquabilibus confectum. Cap. VII

Liquabilia uoco medicamenta, tum quae ignis commercio colliguntur, tum quae ex humidis quibuslibet, uelut aqua, aceto, & uino. Ex aceto itaq; circa ignē liquefcit gutta ammoniaci, sagapeni liquor, et panacis similiter, quem appellatione composita opopanaxena uocant. Igni uero liquefcunt propolis, cera, resina, ladanū, feuum, chalbanum, uerū hoc in duplici uase colligare melius est. Non minamus autem sic, cum in cacabo, qui aquam calidam habeat (prunis enim incumbit) uas alterum consistit, praeter liquabilia etiam chalbanum continēs. Habeto autem tale quoddam confectū medicamentum saltē unum, & si duo habere praestaret, quorū ualidius erit huiusmodi. Opopanaxem ex aceto dissolutum diutius cōterito, huic postea liquefacta super igne propolis, chalbanum, resinam terebinthinam misceto: singulorū itaq; aliorum pars una esto, propolis uero recentis pinguisq; sex: quod si secca uetusq; cōtigerit, praestat omnino talis non uti. At si aliam non habes, duas portiones, non unam miscibeis: sin abis propolis, eius loco picem pinguem immitte, qualis est brutia, & quae ex regionibus circa Pontum apponatur, pinguis simul & odorata, quam in nigri amara cinū inijciunt, quale prius omne confictebatur: nunc enim & sine ea subalbidum amaracīnū componunt. quod si tali etiā careas, alia utitor terebinthina, sicut praediximus, duplicata. Ego nonnunquam uel solum medicamentū ex pingui pice cōfectum impositū, quo etiā ad canum morsus utor: hoc namq; solam picem pinguem ex aceto acri cōctam huiusmodi symmetria continet. Sextarium unum Romanum aceti. libram unam picis. opopanaxis quadrantem. quod est uncias tres. hoc phar-

macum ulcus ex rabiosi morfu cicatricem ducere non sinit, sed punctis in nervosa aliqua particula idoneum est, quippe quod puncturae oras conuulere nequaquā permittat. Quoniā uero durum est, in duris solum corporibus eo utemur, qualia sunt fossorum & messorum. Sin autem puero, uel muliere, uel molliore corpore puncto, hoc tantum quispian uelstrum praesens habeat, idem cum unguento aliquo discussorio, amaracino maxime & opobalsamo colligare licet, deinde cum irino & comageno: haec si non adsint, gluciū, id est musteo, fursino, & cyprino: his quoq; desideratis, oleo ueteri liquefaciat, uel si in Alexandria forte fuerit, ricinino & raphanino: haec siquidem copiosissima in illa ciuitate habentur, sicut etiā in uniuersa Aegypto. Atqui in illis regionibus sinapinū oleum haud aegre reperiri potest, cuius & ipsius parte aliquando mista pharmacū acerrimū fore, nemo ambigit, ut ad puncturas cōiuentes aperiendas conducatur. Patere autē cuiuslibet arbitror ex praedictis, si & loco opopanaxem sagapeno prius in pila ex aceto trito liquefactam resinam, propolis & adipe quampiam acriorem adijcias, eiusdem generis medicamen futurum.

2 Alterum uero mollius est genus pharmacorum liquabilium, sed acetum non habet, quod resinis & propolis & seuis tantum praeparatur, cera quoq; propter ipsiusitudinem adiecta, ex cuius mixtura pharmacū tactū cōmodius redditur. A deps poro tenuium partū acrisq; esto, sicut leoninus, & pardalinus, & post hos hyena & ursi. Sed de amferino quid attinet dicere, praesertim cum anseres rusticis fuerint: Quin et tauri uetusus adeps et hircinus huc conuenit: nam cum mista natura ac facultatis existant, temporis intervallo (quia terrestres acresq; sunt) ad maiorem acrimoniam declinant, similiter uidelicet plurimis quae uetustescunt: sic namq; & ipse porcūs adeps omnium cum sit mollissimus, temporis processu acrimonia acquirat. Idem uino, aceto, & melli accidit. In horum autem medicamentorū genere sunt etiam medullae, longe uero praestat ceruina, & utulina. Horum acris coagulum, & iam uehementiori pharmacorum generi propinquum existit. Itaq; & huiusmodi aliquod pharmacum habere te cōsulo, ut cum a forti aliquo medicamento supra modum morfam partē uulneratā indignatā offenderit, oleo prius eam totam, huiusmodi quopiam cōtegas: sic namq; placata ea rursus ad acrem curandi modum redire poteris. Ego itaq; dum partem in neruo uulneratam quandoq; soluissem, uulnus irritatū cōtemplatū, pharmacō liquido forte fortuna praesenti, quod ex adipe cōstat, ad aures inscriptum, id in uase duplici calfactum affectae particulae illeui, ac subito inde auxiliū ipso aegrotantis sensu accessisse percepi, quippe statim omnis dolor quieuit: atq; ita a nobis fluita secundū naturā habere uisa est.

De pharmaco ex columbarum stercore confecto. Cap. VIII

Columbarum in turribus rusticorum agentium sterco acre est, quo interim ruri usus sum in adolefcēte nerui uulnere affecto: atq; hoc agricola cum uidisset

uidisset, qui fundi curā gerebat, erat enim non inprudens, imitatus semper usurpat, & neruis uulneratis medetur. Porro compositio & usus idem est medicamini ex euphorbio, alijs nimirum eodem modo habētibus, sed euphorbij loco stercore indito. Verum sterces hoc subtilitate euphorbio cedit, eoq; duris corporibus in agris ex usu est. Misui aliquādo ipsū & metallicis, experiunt gratia, statim à principio cum eis terēs ex aceto ad solem, sicut nuper docui, multoq; acrius medicamentum euasit, quemadmodum & cum aruginem uiuam, id est non combustam, acceperit.

De pharmaco ex herbis composito. Cap. IX

Insuper ex herbis tenuium partium ad neruos uulneratos medicamentum composui, initio quidem ex dictamno, amaraco & aristolochia tan, postea uero & ex alijs, mei ipsius periculum facies, an recte compositionem ipsorum coniectura assequeretur, atq; omnia quo uolebam, perduxit. Idoneo uero ad id herbæ amaritudinem sine adstrictione gustu referant, uel acrimoniam quidē, non tamen immodicam: tales sunt præter prædictas, maron, amaracum, polium, argemone, chamæpitys, centauryum, quæq; eius notæ in Simplicium medicamentorum doctrina commemoratæ sunt; quemadmodum etiam radices omnium aristolochiarum, dracunculi, cucumeris agrestis, bryoniae, altheæ, iridis, acori, mei, asari, phu, gentianæ, & panacis: omnium enim id genus materiam in Simplicium pharmacorum commentarijs exposui. At radices herbasq; totas non modo scire oportet, accurate confusas tenuibus cribris fecerunt, sed etiam denuo exacte ligare, ut arida collyria, quo usq; in puluerem redigantur: nam quod crasis constat partibus, neruos uulneratos nihil iuuat, qui subtilia ut diximus, pharmaca requirunt. Cæterum concisum medicamentum, leuigatumq; liquido aliquo excipiat, cerati specie habente æa symmetria, quæ in euphorbio prius indicata est. Quantum enim in illo bimulti euphorbij, tantum ijs dictamni, mei, & acori iniiciendum est, & quæ his similiter calida gustu percipiuntur: quantum uero illis trimulti, tantum his aristolochiæ, iridis, dracunculi, gentianæ, aliorumq; id genus, quæ perinde atq; hæc amara sunt, immittemus.

De sumptuosius pharmacorum confecturis, ad neruos uulneratos. Cap. X

Non abs re fuerit etiā eiusmodi pharmaca cognoscere: usus enim ipsorum quandoq; sed rarius incidit, quemadmodum uulnorum frequenter: ubi enim quispiam pharmacorum, medicinarumq; studiosus non plura quingentis myriadibus habere, uel uoluit uti dedignabatur: multo magis uel diues aliquis, uel monarcha odoratum simul, & quod multa constet pecunia, uolet habere pharmacum. Porro diuitis citati, cuius in primo De pulsuum prænotatione suppressio nomine memini, quemadmodum & nunc, qualis erat, ex duabus ipsius actionibus eiusmodi condiscet. Vlcus famuli malignum ipse sanare conabatur, ubi autē nihil promouit, mihi hominem tradidit: ac cum uideret cu-

ratum, medicamenti scripturam postulabat, nesciens multas quidem malignorum ulcerum esse differentias, multas item medicamentorum, sed arbitratus unum pharmacum omnibus posse mederi. Cum igitur qui applicabat, neq; artificiose ipso ueretur, postq; audiuit, quibus constaret, essentq; omnia utilis precij, hoc inquit mendicis serua, me autem sumptuosius aliquid doceto. Quin etiam puello diu ex auribus laborante, ubi ipse multis quibus usus erat medicaminibus, citra methodum, nihil attulisset præsidij, nobis illum quoq; curandum adduci præcepit; posteaq; audiēs re quadam uili puerum sanatum, non postulauit à me pharmaci scripturam. Hic igitur ipse contemplatus multis, quibus nerui uulnerati erant, digitos & abscessos, & putrefactos: quosdā uero perijisse, uel mancos redditos; deinde intelligēs nullum ex eis qui à me curati essent, periclitatū, omnes uero celeriter sanos euasisse, pharmacū cupiebat aliquid à me accipere odoratum simul & sumptuosum, quo neruorum uulnera posset sanare: ego sanè multas iam sæpe tum familiaribus, tum amicis medicis scripturas iuxta prædictam methodū ex tempore compositas tradideram, ut experimentis compositionis ipsorum ratio confirmaretur, sumptuosum uero, cuiusmodi ille uolebat, pauperculus hominibus nullum utiq; dedi, ratus melius esse remedia ex paratu facillimis componi. Cum igitur diues ille odoratum sumptuosiusq; medicaminis compositionē aliquam sibi dari petijisset, plures ei scripturas donauit prædicta methodo factas, quas ille cum experiri festinaret, tum liberis, tum seruis neruis uulneratos sibi conquirere iniunxit: medicamentis autem supra omnem spem operatis, primum sanè me laudauit, ut qui citra inuidiā ac liberaliter scripturas ei communicauerim, postea etiam donis profectus est: etenim ad huiusmodi quoq; officia præptus erat.

2. Porro medicamentum quæ ei dederam, confectura est talis. Cinnamomi, dictamni, mari, singulorum denarium pondo quadraginta. hæc namq; odorata sunt & subtilia: at amaraci quasi non boni odoris nequaquam miscerem cogitauit, deinde quoniam Romæ ægre poterat inueniri, sicut & maris, uidebam autem illum ægre parabilibus gaudere, quemadmodum & sumptuosius, apposui scripturam etiā illius paucillam quiddam partis unius, ut pro quartam uel quintam partem uinculam: hæc confusata, cribroq; subtilissimo secreta miscere iussu cerato ex opobalsamo optimo, & cerâ tyrrhenica facto: comodū uero esse conieci, si cere partes octo opobalsami decem receperit, at ne friabile medicamentū foret, sed sibi cohærens unum quoq;, etiam resinæ terebinthina, quæ & ipsa esse odorata, modo sit optima, partem unam adieci. Verum si generosius, ut dixi, medicamentum facere proponas, non unam cuiusq; herbæ commemoratæ partem immittas, sed amplius, ut una & semis fiat. Hoc igitur ab experientia probatum est medicamentum. Alterum ex eodem cerato, & liquore cyrenæo compositum, mistura pro portione euphorbij facta: tertiumq; aliud ex ambobus mistis confectum

fectum: quartum deinde, quod staten myrrham accepit. In quibus autem neruus nudus est, sibi cerarum ex cera quæ Myreplice, id est unguentaria, vocatur, & unguētis apud Romanos dictis spicæ, & foliato composuit: duodecimā partem pompolygis ei admiscens, siue eloti masculino genere, siue elota: foeminino malis dicere: nihil enim, quomodo cumq; dicas, uel præsidij, uel nocumēti pharmaco adferes: licet autem tibi & ex tyrrhenica cera ipsum præparare: nec prohibet quicquā sine prædictis unguentis tyrrhenicā ceram ex narodo proba liquefacere, in duplici nempe uasculo, quod in omnibus unguentis commune est. At ratio cerato spicæ nardi, amomi, folij malabathri, & pompolygis eloti pares singulorū portiones miscibus: etenim in puncturis, sicut præceptum est, actoribus pharmacis est opus, quæ uulnus apertum perpetuo feruēt; denudatis autem, mediocri astrictione, cū digerendi uirtute absq; mōsu prædita afferre conuenit. Quancūq; & amomū astrictioni sit aliquatenus particeps, magis autē ipso nardi spicæ, & malabathri solium.

De medicamentis ab alijs medicis aduersus neruorum uulnera prodiitis. Cap. XI.

Vniuersam neruorū uulnera curādi rationem, quam ego deorum quādam prouidentia composui, nullus ante me cōscripsit: medicamēta tamen quæ neruorum uulnera quedam curare promitterent, cōposuerunt sine distinctione, & uario utendi modo: neq; in angustis punctibus sanandi rationem, qualis futura esset, indificantes, neq; in latioribus uulneribus, uel denudato neruo, uel tendine, uel cōtuso: multo minus si pars affecta phlegmone infestaretur, uel etiā gangræna propemodum. Porro unum quēndā nostræ ætatis medicū pharmaco utentem uidi, perinde ac me is ex metallicis præparatis, indistincte quidem & ipsum. quoniā uero ex paucis sponte nascētibus ipsum componi audieram, quod autem multis constat, ego illo tempore præparaueram, cogitauī pluribus ademptis aliud rursus ex paucis cōpositum inspicere, ac experientia inquirere, multōne ab eo, quod uariā mistura paratur, inferius esse uideretur, an paulo. Quouis igitur modo curauī etiā medicaminis, quod medicus nostræ ætatis habebat, scripturam accipere: & statim præparato simili, eadem ipsum polliceri & præstare, ac uariū illud comperi. Huius igitur cōpositio in hunc modum scripta erat.

Cera pondo uncias sex. olei uncias nouem. misyos pondo drachmas sex. chalcitidis denarij pondo unius. squamæ aris pōdo uncias duas s. thuris pondo unciam & s. chalbanū pondo uncia. quæ si quari possunt, hoc est cera & chalbanum, liquefacta metallicis in aceto acri prius accurate tritis superfunduntur: hoc pharmacum haud scio quis cōposuerit, neq; enim apud Asclepiadem pharmacionem scripturam inueni, nec apud Petronam, nec Andromachum: etsi omnes antiquiores medici optima medicamēta conscripserint: planē autem constat nec apud Heram Cappadocem, nec Mantiam, nec Heraclidem Tarentinum reperiri.

Galen.

A qui magnam pharmacorum experientiam habuerunt: imō nec apud Archigenē, aut Philippū. aut apud aliquem eius discipulum: insuper Sorani libris de medicamentis perlectis omnibus, item Me necratis, Critonis, Damocratis, & aliorū qui medicaminum cognitione claruerunt, apud nullum hoc modo citatum pharmacum comperi.

2 Quæ uero apud uiros iam dictos habentur, deinceps scripta indicabo, ac in initio à Pharmacione Asclepiade facturus sum, qui in tertio interiorum medicaminum, quas etiam Marcellas inscribit, hunc in modum docet.

Andromachi Aegypti ad uulnera cruenta, ut Asclepiades præscribit: facit ad neruos, musculosq; præfissos: ite ad punctus, contusiones, luxata, artus fractos: ualet etiam ad abscessus: est item lippientibus glutinatoriū, inuata capite dolentes, & ad multos affectus utile est remedium.

Argenti spumæ, ceræ, singulorum denarium pondo cētum quadragintaquatuor. guttæ ammoniaci denarium pondo septuagintaquatuor. terebinthinæ denarium pondo triginta sex. lanæ succidæ combustæ denarium pondo duodecim. squamæ aris, squamæ stomomatis, thuris, aristolochiæ rotundæ, singulorum denarium pondo octo. olei ricini heminas tres. argenti spuma & oleum, incoquantur, ac ubi mutata fuerint, cera resinaq; adijcitur: cum non inquinant, ammoniacum indas dilatado, & tunc lanas succidæ, ac reliqua. Hoc medicamentum quanto uilius ex stomomatis squama euasit, tanto deterius ad neruorum uulnera factum est: si nāq; punctus solū fuerit, etiā aris squama superuacua est. Quippe nullum metallicū his conducit, nisi prius ex aceto acri pluribus diebus leue factū fuerit: quancūq; in nudis neruis & tendonibus bonum fuerit remedium: at si iam phlegmone coniuncta est, liquare ea ex rosaceo conuenit. & sic emmōto, hoc est in linteolo illito uti. Vbi uero nō adest phlegmone, molliora humidioraq; statim ab initio potiora sunt medicamentis durioribus ac sicciorebus, præstatq; liquata ipsa in digereute quodam, uel mitigatorio medicamine usurpare. Voco digerētia quidē uetus oleum & ricini num & sicyonium: mitigatoria autem rosaceo, chamæmelinum, & quod ex althea conficitur: his fortiora, eoq; durioribus corporib. magis idonea sunt, quod ex cucumeris agrestis radice in oleo de cocta, & quod ex iride, bryonia, & aro paraf: his ualentius est ex dracunculo, aristolochia & panace factum. Porro nos frequenter etiam ex abietis semine, oleo, item ex populi flore confecto usi sumus: nam hæc diutius Sabino oleo intingimus, quæ igitur de eiusmodi medicamentorū usu dicta sunt, uos memoriter seruantes, ad alia quæ explicanda ueniunt, traducere operæpretium esse arbitror. Quod autem nobis institutum erat facere, agrediemur, apponemus em̄ & alia eiusdem facultatis medicamina, quale est & quod ab Asclepiade post prædictum his uerbis scriptum est.

Claudij Philoxeni chirurgi Aegyptium ad prædicta uitia.
Argenti spumæ, ceræ, singulorum denariū pondo
tom. 3 P docen

do cētum sexaginta. guttæ ammoniaci denarium pondo octoginta. propoleos denariū pondo qua draginta. resinæ siccæ, terebinthinæ, squamæ aris, thuris denarium pondo sedecim. lanæ succidæ cō bustæ, squamæ stomomatis, singulorū denarium pondo viij. opopanax denariū pondo quatuor. ricinini heminas tres. hoc igitur pharmacum superioris esse simile omnibus apparet, & utendi modum eundē cum nuper à me citato habebit: quin etiā ad hæc duo emplastra, aliud tertium Asclepiades sic ad uerbum in quibus tradidit.

Fulsum Piscatoris.

Facit ad cruetā uulnere, et nervos præcisos: item ad uetera cicatricem ægre ducentia & fluentia ulcera: quin & probe emollit duritias, maxime in mammis oborientes: utimur eo ad canum hominumq; morsus: summe facit ad pastinacæ, draconis, aliorumq; seuorum piscium ictus: in totū uirtutem habet mirabilem. Argenti spumæ, ceræ, singulorum denarium pondo cētum, terebinthinæ, manna, thuris, chalbanī, minij sinopici, singulorum denarium pōdo viij. olei sextarium. Nec ipse ergo Asclepiades hoc pharmacū ad punctus tendinum ac neruorū, sed ipsis præcisus utile esse promittit: cū uidelicet maius uulnus extiterit, & neruus nudus appareat. Quippe aptiora tūc sunt medicamenta, quæ mitigatoriam & mediocrem uim obtinent, cuius generis est nuper ab ipso citatum. Itaq; hæc tria emplastra in medio fere libro Asclepiades produxit: superius etiā aliud multiplicis quidem usus emplastrum, melius autem ijs tribus ceu ad neruos præcisos, corruptosq; tradidit. Verba Asclepiadis ita habent.

Mosehionis catagmaticum. Valet ad recentia uulnera neruorum præcisos, & cum contusione diuisiones: facit etiā ad fracturas cum uulneret enim uulneribus auxiliator, & ossa calla obducat conuenienter deligatur a impostum. prodest hydropticis incipientibus: item facit ad testiculorum contusiones: tollit circa anū emittētas: sanat rhagadas butyro dilutum: ad hec gutturis tumores quas Græci bronchocelas appellant: soluit omnē duriciem: curat luxatos, & fractos articulos, item pedum, manuumq; callosas excrescētiās, quos clauos uocamus, ut eos etiā citra excoriationem auferat. Summatim, medicamentum est utilissimum. Confectio hæc recipit.

Argenti spumæ pondo minā, quæ continet denarios centum sexaginta. picis aridæ denariū pondo centum sexaginta. seui uitulini denarium pondo centum sexaginta. resinæ terebinthinæ denariū pondo octoginta. manna thuris denarium pōdo octoginta. ceræ denarium pondo quadraginta: e ruginis, opopanax: chalbanī, singulorum denarium pondo octo. olei ricinini heminā. acetī parē mensuram. liquoris sycaminī heminā. picis liquidæ tres cyathos. Argenti spuma tenuissima, & cicinum oleum in uas fictile uel æreum coniecta, signi q; supraposita coquantur, cum efferbuerint, seum & manna thuris adijciuntur, mouenturq; assidue: ubi confluxerint, pix, cera, resina induntur, & donec non amplius inquinent, incoquantur, deinde chalbanum, post ærugo & opopanax ex aceto soluta insperguntur, liquor sycaminī, & pix liquida in aliud uas transfusa coquantur, &

cum cōmissa fuerint, seu confluxerint, priori pharmacō immittuntur: & rursus supra ignem posita, quousque non inquinent, incoquantur: ac in uinum demissa triduo relinquuntur, postea subactis manu, in linteolumq; illitis utimur. Oportet autem post medicamen impostū linteum uino madefactum exprimere, & tunc medicamento circumdare. Porro nostri præceptoris Lucij confectio sic habet. Seuū ac oleum prius liquefacimus, ac ubi soluta fuerint, manā leuissimam factam, & spumam argenti inspergimus. postquam confluxerint, reliqua facimus.

3 Cæterum laude dignus est hic quoq; Asclepiades, qui confectione medicaminum modū adscribat, non ut Andromachus omittat, qui necquam uirtutem habeat apponit. deniq; primum est tribus ab Asclepiade traditis, à me scriptum emplastrum Aegyptium, quod & ipse Andromachi esse confirmat, neq; cuius sit uirtutis, nec quomodo præparandum sit, aut ut edum Andromachus indicauit. Verū simpliciter tanq; uulgare quoddam pharmacum, libro De exterioribus facultatibus quem ipse secundum inscripsit, proiecit. Primum enim omnium scripsit, quod ipse nominat panta-gathium, quasi dicas ad omnia ualens, deinde hoc Aegyptium, aliud ut dixi nihil adiungens; habet enim eius dictio in hunc modum.

Aegyptium.

Argenti spumæ denarium pondo centum quadraginta quatuor. ricinini heminas sex. ceræ denarium pondo centum quadraginta quatuor. guttæ ammoniaci denarium pondo septuaginta duum. terebinthinæ denarium pondo triginta sex. lanæ combustæ denarium pondo octodecim. squamæ stomomatis denarium pondo octo. squamæ aris denarium pondo octo. aristolochiæ denariū pondo octo. nonnulli myrrhæ denarium pondo quatuor. opopanax denarium pondo duum. his ad finem adscripta sunt marinæ aquæ ad irrigandam ceram heminas octo. Quid sibi uelit, cum dicat, ad irrigationem ceræ, manifesto nō scimus: intelligere enim plura licet. Mirandum uero quomodo in alijs omnibus cum Andromacho conuenit, mensuram ricinini parem non ponat. Andromachus enim heminas sex, Asclepiades tres scripsit. Neq; uero etsiam apposuit quod in fine scripturæ ab Andromacho adiectum est, nonnulli myrrhæ denarium pondo quatuor, opopanax denarium pondo duum. Rursus adiunxit ipse in combustis lanis succidīs, quod in Andromachi scriptura nō habetur. post dictum Aegyptium theriacæ emplastræ quinq; retulit Andromachus: deinde aliud fuscum, quod ad Eubulum autorem refert; postea rursus aliud fuscum, quod Mineruam nominat. Post hæc iterum alia fusca simpliciter duo, quibus subnectit aliud: ubi sic ad uerbum scriptum est.

Fuscum mygmaticum, hoc est ad neruorum punctus utile. Andromachi.

Guttæ ammoniaci denarium pondo octo. ceræ nouæ denarium pondo octo. terebinthinæ denarium pōdo octo. aris combustis denarium pōdo

do octo. picis aridæ denarium pondo quadragin-
ta, ut autem Zeno ait, minæ dimidium, & quar-
tam partem. Argenti spumæ denariū pondo qua-
tuor. aloes indicæ denarium pondo duum. aristo-
lochizæ denarium pondo duum. chalbani dena-
rium pondo duum. æruginis denarij pōdo unius.

alijs denarium pondo duum. thuris denarium pon-
do duum. olei hyeme quartam hemina partem,
æstare octauam. acetī tres cyathos, quibus ammo-
niacum dissoluatur. Hoc uerisimile est ab ipso no-
minari nygmaticum, ut quod neruorum punctu-
ris ex usu esse queat.

ARGVMENTA

CAPITVM LIBRI IIII

Cap. I. Argumentum primi libri huius operis: de
inde præsentis, in quo ager de ulceribus quæ ægre cica-
tricem admittunt, siue quia ipse locus affectus influen-
tem corruptum humorem, quæ priuatim caoethe, id
est maligna dicuntur, de quibus priore loco ager: siue
quia simpliciter propter influentem humorem pars af-
fecta nimium humidam non coalescet: de quibus poste-
rius. Quod ut in libris Therapeuticæ methodi primi-
mum ratio quædam uniuersalis, deinde materia in par-
ticularibus propofita fit: ita hic etiã facturus sit. Sco-
pi duo sunt generales ad omne ulcus non malignum,
repellere quod influit, discutere quod influit, neu-
trum autem sine dolore fieri potest: cum uel exasper-
rentur partes affectæ, uel supercalefiant inde: ita ut dy-
sepsulosis neurum conueniat, multoq; minus mali-
gnis. Quid ergo faciendum? 2. Utendum primo ab-
stergentibus & siccantibus. Vicus enim ab initio ut
pote fordidus est, facilius ualidiora feret pharmaca.
Dein ubi primum iam purum & siccum fuerit, alijs
eiusdem generis mitoribus utendum, non tamen ita
imbecillibus, ut rursum fordescat ulcus: sed siccantibus
cum adstrictiue aliqua. Quod si siccum satis euadat
ulcus, manserit autem impurum, ab stergeribus uten-
dum: de quibus in libris de facultatibus simplicium,
& accuratius in therapeutica methodo dictū est, quam
ante hæc legisse oportet. Experimentis singularibus se-
probatæ, quæ hinc genere præcipit. Sine morfu sic-
cantia pleræq; metallica esse: & quibus corporibus a-
lijs, quibus illora applicare conueniat. Quod dilu-
culo imponenda sint. Præmittenda si opus fuerit phle-
botomia, uel purgatio, uel ambo: Varicem superia-
centem excindere: Iecori aut lieni prouidere: aut par-
tes circa ulcus incidere, aut callum laborum circuncid-
dere: Aue, si nullo istorum opus sit, statim ipsa ulcera,
quantum fordidum uel humoris habeant, & medicamen-
ta, quæ uel siccent, uel abstergant tantum, uel utrun-
que, & in quo gradu, considerare oportet. II. Enum-
merat singularia remedia, quibus ulcera maligna sine
morfu & asperitate siccantur. Metallica primum cum
terre speciebus, & ex ijs primum mediocria, inde for-
tiora & imbecillia, tandem uehementia quæ nunquam
sine alijs applicantur. Quod corpora mollia, cacochy-
ma, phlegmatica, alba, minus ferant mordacia &
fortia pharmaca, eisq; mitia & sine morfu siccantia ap-
plicari oportet. Quæcunq; tenuium partium sunt,
æa magis discutiant, & minus mordent. Oleosa, mol-
lentia, & acria, cauere debent malignis ulceribus.

III. Quomodo medicamentis siccis modo com-
moratis in ulceribus dysepsulosis & malignis utendum
sit in manuali administratione: & de ratione deligandi.
Si quis calor, aut rubor circa ulcus sit, aut si qua duri-
tis, quid agendum: Si uarix supra ulcus: Si splen uicia-
tus: Si corpus plethoricū aut cacochymū. 2. Quo-
modo in una quæq; solutione deligati ulceris inspicien-
dum sit, fordidum ne an purum sit, ut medicamentis pro-
re nata mutantur. Et quod ulcus aliquando fordidum
fiat propter nimis calida & mordentia pharmaca quæ
carnem colliquant: itaq; cauendum esse ne quis tunc e-
tiam ad acriora transeat. De balneo, quod eo abstru-
endum sit, si fieri potest: sin minus, quomodo utendū

Galen.

eo. De spongiæ usu, & quod quandoque omitti pos-
sit. IIII. Compositionis medicamentorum quæ in
modum emplastris sunt, ratio communis, & exemplum
particulare. Aquam & oleum uitanda esse. Cera
electio, subactio, & proportio ad metallica. Quando
mitioribus, quando fortioribus utendum. Exem-
plum & modum commixtionis pharmaci, quod reci-
pit, Acris & æruginis usitorum, diphrygis ana 3. i. (uel
pro diphryge aluminis fisti 3. s. cera recentis 3. to. cui, si
reces nō sit, olei uel resinæ aliquid addatur. V. Duo
medicamenta ad huiusmodi ulcera quæ memoriæ pro-
didit Asclepiades quorum primum in prima parte, al-
terum in altera continentur. VI. De scriptis ab An-
dromacho emplastris cicatricem ducentibus, primum
in simplicibus, deinde dysepsulosis, tertio in malignis
ulceribus. Primum autem reprehendit eum quod sine
distinctione remedia scripserit, & uehementiam aut
imbecillitatem eorum non distinxerit: Et quinque eius
emplastra partim nominat, partim describit. Videtur
autem unum deesse: ipse enim hic & infra de sex memi-
nit. 2. Sex Epuloticæ compositiones Andromachi
cum distinctionibus Galeni: Hac autem parte, prima
tantum ex istis sex consideratur. Chirurgicæ admini-
strationis, præstare ut pars ulcerata cōprimatur quæ
circumiacentes solum. Quoro die soluentia sit deligatio,
& inspicendum ulcus: ut pro re nata medicamina
mutari, aut remitti, intendi ue queant: & quibus adie-
ctis utrunque fiat. Quæ mitia sint pharmaca. Cera pro-
portio. 3. Altera compositio de sex Andromachi, è
chrysololla &c. De cera & oleo rī mixtionē. 4. Re-
liquæ 4. ex ijsdem sex, quarum prima constat diphry-
ge, &c. 5. Quod hic de remedijs malignorum, quæ &
Chironia uocant, præcipue agat. Epuloticæ ad Chiro-
nia secundum Dioscoridem descriptio. 6. Aliud ad
desperata ex Primione. Adipum differentia. Sidia.
Austera & acera quid differant: Et cur atringentibus
aliquando tenuium partium pharmaca misceantur.
Quæ pharmaca per eclipsin efferantur, ut asbestus, le-
pis, terebintina. Thus. Ad emplastris formam quæ
misceantur. Myron & elæon differunt. 7. Adhuc
est in explicatione præcedentes emplastris: Et primum
causas referi cur tam uaria ad eosdem affectus pharma-
ca ueteres composuerint, & etiamnum componi opor-
teat. Adeps uitulinus: Medulla ceruina & uitulina.
Resinæ. Fraus pro oleo uerere axungia fibris & mem-
branis exemptis oleo mixtam uendentium. Olei & a-
dipis uetustiorum uires à recentibus quantum differat.

Ulcera diuturna & maxime maligna quæ. Astrin-
gentia & discutientia simul misceri in prædicto empla-
stro laudat. Symmetria & diuersitas compositionis
partium prædicti emplastris. 8. Emplastrum parego-
ricum Andromachi ad ulcera irritata, & de paregori-
cis in genere. VII. De scriptis à Critone emplastris
μαλθηκωδιν quæ. Pix media est inter malthacoed & sic-
ca remedia. Quæ autem media sunt uerisque extremis
sine periculo misceantur, etiam si non exacte media sint
in cal. frig. hum. & sicco, sed parum ad alteram esse oppo-
sitis facultatibus. De nominum istorum cal. f. hu. & sic-
ci acceptionibus. Quod pharmacum calidum aut frigidum
nominemus, quod temperatum hominem calfa

tom. 5

P 2 cerc

cere aut refrigerare potest. Secundum indicationes varias eadem etiam simplicia ulcera curandi ratio in diuersis corporibus euariat. Vlcerū diuersitas: & quæ quibus medicamenta conueniant, in primo, secundo & tertio ordine singillatim enumerata. 2. Redit ad pharmacum Critonis, de pice & lithargyro in eo, & cæteris simplicibus. Coquendi modus. Longæ coctionis emplastrum utilitas. Solum etiam ladanum præferim recens dysepulotus ulceribus conuenire. 3. De pharmaco Critonis ex chamaeonte, &c. & quid differat à superiore. VIII. De emplastris Heraclidis Tarrentini. Ex quibus duo hac parte describit: & docet uarianda esse medicamenta, id quod amethodi præstare non possint. De frictione ad solem aut ignem cum acetō aut uino, & ubi una alteri præstat. 2. Alia tria eiusdem. De diphryge per se. 3. Alia duo. De chryso colla per se cum cera, & de alijs, quibus Galenus per se cera solum adiuncta ad dysepulota usus est. De cera & cerati admixtione: De refinis, & quod larigna omnibus hic sit præferenda. Adipes: & quod taurinus sicissimus subtilissimusq; sit omnium. Aliud eiusdem. Rursus de prædictis & alijs alibi ab Heraclide scriptis pharmacis. Cera proportio. Et quomodo Galenus hoc ipso pharmaco usus sit, & quō alibi ab Archigene describat. IX. De pharmacis apud Andromachū, quæ uel in trochiscos formata, usus tēpore ce-

raro excipiunt, uel sicca inspergunt: De emplastris eius supra dixit. X. Archigenis remedia, ad ulcera quæ ægre cicatricē ducūt, & quæ nigrescūt. 2. Eiusdem ad putrida & nomas. 3. Ad cancrofa. 4. Ad callosa. XI. Emplastra quæ Asclepiades ad huiusmodi ulcera scripsit. Causæ & differentia tres ulcerum dysepulotorum. Et primū de primo genere eorū, quod ob causam externam, ut prauam curationem, aut usum mollem, ægre cicatricem admittit. 2. De altero genere ulcerum dysepulotorū, reumatica uocant, quæ propter influentem humorem difficulter cicatricē recipiunt. 3. De tertio genere ulcerum, quæ dysepulota sunt ob prauitatem innatam ulceribus, cacothetæ & chironia proprie dicta. 4. Ad ulcera capitis uetusta & difficilia curata. XII. De emplastris Heræ ad ulcera curatu difficilia: Et primū de eo quod constat ex lithargyro, chamaeonte, &c. quod plurimum commendat. Chryso colla. Paregorica. Mina & cotyla, & olei ad prædictum pharmacum modus. 2. De alijs Heræ pharmacis polychrestis (etiam ad ulcera dysepulota facientibus) quæ in sequente libro explicanda pollicetur. XIII. De cæteris ad maligna ulcera ueteris dijs, & quæ uel ipse Galenus expertus est: uel a prætoribus, accepit: uel ab antiquis clarissimis medicis traduntur. Sunt autem numero 18. In sexdecimo docetur etiam chirurgica administratio.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM PER GENERA LIBER III.

CAPVT PRIMVM



RIMVS sanè liber in Alborum emplastrorū confecturis, tum alijs, tum eorum quæ ulceribus cicatricē ægre ducentibus conueniunt, finitus est: ubi distinximus cōmunitè appellata dysepulota, id est cicatricem difficulter admittentia, ab ijs quæ proprie cacothetæ, hoc est maligna dicuntur, & ipsa nimirum dysepulota. Quoniam uero quædam saniei humorumq; ulceratis partibus influentium uitio cicatricem egre admittunt: quædam ipsa affecta sede influentem succum quamlibet probum corrumpētē, ulcera secundo modo habentia, dysepulota & cacothetæ proprie nominant: in quibus interim totam partem affectam excindere, uel adurere nonnulli coguntur, aut medicamentis crustam inducētibus, aut igne utentes. At cum ampla sit latitudo utriusq; in eo, quod alterum altero magis minus ue dysepulotum, malignumq; est, tantum medicantium pharmacorum esse numerum oportet, quantum ipsorū quoq; ulcerum extiterit. Merito igitur omnes, qui unum duntaxat medicamentum ulceribus malignis cicatricem inducere promittens habent, successu crebro frustrantur. Nam duo minimum quæ idem pollicētur, eandemq; facultatē ostendūt, diuersa alioquin inter se nō simpliciter maioris, minorisq; uerum ut apertissime dicam, maximè ac minimi ratione: in promptu adesse illi conuenit, qui omnia id genus uitia curare proposuerit. Quæ admodū igitur commētario Therapeutices, me-

thodi in uniuersis affectibus primam omnium cōmunem auxiliōrum potentiam inueniri docebamus, dein materias, quibus illa continetur: ita nūc quoq; in ulceribus dysepulotis generalem pharmacorum, quibus illa curabūtur facultatem, quæ tandem sit, prius inuentam esse oportet. Indicata uero mihi est & hæc in illo opere, cum quidē nullus uitiosus habitus uulneratas partes infestat, duos scopos habens: unum, ut id quod influit, repellat: alterum, ut quod affectæ parti inhæret, infixumq; est, discutiatur. hæc autem contrariæ uires præstant. Si quidem influxū reprimunt, quæ sunt astringentia pharmaca: digerūt impacta iam exceptaq; trahēdi potestate prædita. Porro quæ adstringunt ut plurimum exasperant, atq; hac occasione molesta sunt. Trahentia uero, ac digerentia ex alto humiditates, non citra acrimoniam id efficiunt. Ac acrimoniam dolor quidam necessario sequitur ulceratam partem erodens. Atque sic propter dolorem, quem exasperantia erodentiaq; cōcitant, humores ulceratis partibus influentem irritari contingit: unde quoq; ulcus phlegmone obstruendi exedat: ex quibus dictis colligitur, ulceribus dysepulotis prædicia inueniri nō posse, multo minus adhuc malignis.

2. Quare talis pharmacorum materia, quoad eius fieri possit, inuenienda est, unde ulcus citra dolorem siccescat: quod accurate fieri nulla ratione licet, medico ignorante, quem effectum medicamentum exhibitū ostendit. Quippe ambobus cōponētibus, erodente pura & adstringētē, necessario ualidū existit. Verū sordes & humiditatis co-

pitia id genus ulceribus incumbens, ueluti propu-
gnacula quædam ulceratis particulis facta rosio-
nem ualentib. pharmacis adiungunt soluuntq. Itaq;
attendendum est, quantum primus usus humidita-
tis in ulcere deficcauerit: uel si etiam sordes ha-
beat, quantum harum quoq; absterferit. Ac ita se-
cundum, tertiumq; uti illo debemus donec purum
& siccum ulcus apparuerit. Vbi uero primū id ta-
le conspexeris, ad aliud medicamentum te conse-
res, eiusdem quidem speciei, sed priore imbecilli-
us. Nam ualidiora, dum mordendo ulcus dolo-
rem inferunt, si uires mouent, & phlegmonas cō-
citant. Quod si rursum multo imbecillius priore
pharmacum adhibeas, ulcus humidum sordidūq;
euidet. Hac igitur parte artificio utens medicus,
eo qui folo experimēto innititur, melior est, quod
sciat ulcus non alia medicamentorum uirtute cu-
rari, quam dum affecta pars eam siccitatem conse-
quat, quam in naturali situ sita possidebat. Quod
factum intelligimus, ubi neq; tenuis amplius fan-
ies insuat, neq; pus prodecat. Hanc dispositio-
nem ulcera nanciscuntur, quo dixi modo siccifē-
tia, hoc est adstricta, discussa q; deinde ubi sicca
quidem fuerint, uerum sordida adhuc appareant,
deterforijs pharmacis repurgantur, de quibus ipsis
quoq; nonnihil in opere De simplicibus medica-
mentis cōmemorauimus; omnis autē absolutif-
simaratio ac uia est tractatu De morbis curandis
per scripta, in quo prius exercitatum esse conue-
nit, qui hinc perfecte frugē reportaturus est. Hoc
uobis amici, quibus ista scribuntur, constare ma-
nifesto admodum noui: itidem sermonē sine ex-
ploratiōe in operibus facta probabilem non esse
quæ nunc à me dicuntur. Etenim uidistis subinde,
illis ipsis pharmacis quibus sine uia ac ratione
medici quidam utentes nihil proficiebant, multa
me eius generis ulcera perfanasse. Quamobrē in
memoria reducite medicamenta citra demor-
sum exsiccantia: sunt autem ipsorum pleraq; me-
tallica. At qui hoc etiam meminertis: quod combu-
stis elotisq; erosio quæ prius adfuit, edomatur
ac interit. His igitur in præsentiarum uti uobis li-
cet: elotis quidē in pueris, eunuchis, mulieribus,
& qui molli natura carne sunt præditi: item qui ad
sentiendū habiles admodum sunt, & uitioso succo
laborant. In alijs corporibus & illota usurpare
poteritis, mane primum ipsa ijs qui curantur ubi
probe concoxerint, adhibētes. Si uero & corpus
totum præparationem quandam requirat, & hæc
prius factam esse oportet: præcepimus de his in
commentario De morbis curandis. Nonnullis si-
quidem uel purgatio sola sufficit: quibusdam san-
guinis detractio: alijs utraq; hæc adhibere profue-
rit. Sunt in quibus superiacentem uariem excin-
dere satis est: uel lieni, uel iocinori prospicere: ali-
quibus ambientes ulcus partes scarificare: quæ ad
modum interim laborum callos amputare. Si ho-
rum nullo egenus, humoris copia simul cum for-
dibus inspicienda est, atq; ita ad idoneum medica-
men ueniemus, rursus simplicium singulorū me-
mores, quæ desiccant, nō tamē ulceris sordes ab-

Galen.

stergunt: item quæ abstergunt quidem, non tamē
probe deficcant; quæ uero utrunq; possunt effice-
re, prospiciemus ex quoto quodq; ordine existat,
quod maximum inter ea censeo, quæ ad curatio-
nem pertinent, neglectum tamen medicinalis ma-
teriæ scriptoribus. Nam hi soli omnes ipsius uires
dicere studuerūt: sicut etiam Dioscorides, quem
nulli eorum, qui in ea quasi arena defudarunt, se-
cundum esse quisquam dixerit.

CAP. II. Ego igitur deinceps omnia pharmacā
recensebo, quæ ulcera citra mordicationē exaspera-
tionemq; manifesta exsiccare possunt. Incipiam à
metallicis, quibus etiā terræ species adnumeran-
tur. Porrò cum uarie inter se differant, in eo quod
magis minusq; siccēt, à medijs orsus ad uehemen-
tius, uel obscurius exsiccantia me conferā. Siccanē
igitur modice lemmia sphragis, et cadmia: atq; hæc
magis ea quæ sua sponte nascitur, nec muratur in
torrentibus aut riujs in quibus metalla sunt: Por-
rò consueui eam magis siccantem reddere, per æ-
statem in sole, pluribus diebus terēs ex acetō, aut
uino colore giluo, substantia pellucida, cuiusmo-
di est in Italia Falernū: in Asia Tmolite, quod ui-
norum maxime siccare natum est. Hoc genere cō-
prehenditur & ariusū in Chio natum: item odo-
ratum Lesbium in Ereffo & Methymia. His suc-
cedunt omnia uetera, cum ex albis & alstringentibus
inuerterata sunt, in Italia fuliginū; Tiburtinū,
& Marsum; in Sicilia uocatū ab incolis Aminæū:
in Asia Apodisicum, et misyū. Sufficit enim mi-
hi hæc facultatum uniuersalium ueluti exempla
exposuisse. Iam uero cadmiū ex acetō acri, simili-
ter multis per æstatē diebus in sole preparo, sic-
catamq; repono, ut ulceribus malignitatem assu-
mentibus inspergi possit. Valentius hoc pharma-
cum est, chalcitis cōbusta eodem modo prius in
puluerem redacta: per se autem ignem nō exper-
ta tam ualens medicamentū est, ut crustas faciat.
Lotam igitur ipsam deinde siccata habere satius
est. Minus enim lora, q̄ uita deficcac, ac longe mi-
nor est minusq; mordax. Per simile huic medica-
mentū est etiam arugo combusta: quæ uero ignē
non experta est, fortissimū medicamentū est, sicut
etiam chalcitis. Verum hæc nonnihil etiam altrin-
git. & ea multo magis chalcanthū, quod inter me-
tallica maxime siccac. At arugo huius potentia
omnino particeps nō est. Misy autem & fori ut di-
dicistis chalcitidi genere cognata sunt, ex uña, ut
dicā radice producta: tenuius tamē misy appareat,
ac minus mordax & uires: crassius fori est, & utro-
que siccac imbecillius, quemadmodū & stibi ma-
iorem adstringendū siccandūq; uim ac fori possidet.
Porrò diphryges appellatū pharmacū ulceribus
ægre humiditatis uitio ad cicatricem ueniētibus,
aprilissimum est: ualde nanque siccac, etsi modice
mordet. Enim uero id quoq; præter acrem tum
qualitatem, tum potentia, uim habet adstrictoria:
quas tamen ambas fortiores & chalcitis cruda, &
chalcanthum repræsentat: siue id masculino ge-
nere, siue fœminino, siue neutro appellasse quis
malit. Nam hoc uobis semper succurrat, de nomi-
tom. 5 P 3 nibus

nibus contendendū non esse; ubi speculationem ipsius artis vsui necessariam ulciscere statueritis. Quin & alumen quodlibet ulcera fatis exsiccat, generose adstringens. unde nemo solis his ad ulcera utetur, sicut nec cruda chalcitide, & æruginē: usta uero & hæc & misy uisita sunt, & elota morsum quidē remittūt, uerū minus siccant. Itaq; lotis ipsis uti tutius est: quoniam permulta corpora, quibus mederi cogimur, unam quandam dispositionem habent, qua uehemētē commororū ferendū non sunt. Audiuiſtis autem ipsa frequēter, sed & nunc iterum commemorabo, atq; ad omnē sequentem sermonem memoriter teneri operæ pretium esse arbitror. Quæ igitur plethora uitiosq; succo laborant corpora: ad hæc tenera que tenera carne prædita, & ad sententiū insigniter habilia sunt, facile ex morsu, seu ofione phlegmonē recipiunt. In carne mollī præditorum numero continentur mulieres uidelicet candidæ, pueri, eunuchi, uiri cute alba: insuper qui regionem frigidam incolunt, humidih quoq; & pituitosi, eoq; molles & albi: quæadmodum si qui calidum tractum inhabitant, ut Aegyptum & Arabiam, duos corporum habitus, & siccos fortiuntur. Itaq; horum uobis ueluti memoribus appositurus sum quandam & aliam pharmacorū simplicium materiem, quæ malignis ulceribus curandis sit idonea. Sarcocolla igitur & ichthyocolia, & his magis adhuc chryso colla tali facultate prædita est: huc optime facit & plumbum cōbustum: post hoc fori, stibiq; hæc quoq; cōbusta: insuper plumbi crementū, probe siccant: quemadmodum & ferri squama, euidētius tamen stomomatis. Porro æris squama, præter q̄ quod siccata, etiam abstergit purgatq;: un de pura quoq; ulcera efficit, q̄ reliquæ squamæ nō possunt. Quare si hæc omnia medicamentis arida ulceribus malignis ac cōtumacibus inspergis, mirifice uidebis citra erosionem ea desiccari, sicut etiam uidebis citra cōtumacibus concremata, purpurarum, olstreorū aliorūq; id genus adhibueris. Quin & quod græce diaphanes, Romanis lapis dicitur specularis, ex ijs est, quæ leniter ac sine morsu exsiccat, qui uisus ulceribus ægre cicatricē admittentibus, nō item malignis ac rebellibus cōducit: quippe minus exsiccat, q̄ illa requirant. Idem potest uitrum ustum, & tofaceū illud, quod in areis uasis calfactorijs concreuit. Cæterū ægyptiæ spinæ fructus, galla omphacitis, hoc est immatura, balaustii, malicoriū, radices, herbæq; non pauca ultra siccandi, etiā astringēdi potestatem habent, nam & aristolochia, iris, acorum, artemisia, panacis radix, argemone, chamæleontis nigri radix, cyperum, dracūculus, gladiolus, affatum exsiccat. his euidētius adhuc centaurium, & posium, quibus paulo imbecillior est terra nomine eretrias, uti ualentior est ampelitis. Talis sanè medicamentorum simplicium ad ulcera maligna ac cōtumacia materies existit, extrinsecus aut nōnulla ipsis apponitur, quæ quidem per se uehementē potentia gratia non admoueri, sed alijs misceri solent, ueluti arugo ignem nōdum experta, calx uiua, & illora,

A & molle aphroditrum. Quanto enim spumantius, tanto præstantius est utraq; facultate, tum qua minus mordet, tum qua magis digerit. Didicistis enim & in opere De simplicibus medicamentis subtiliora crassioribus hac uirtute inter omnia, que si nulli speciem comprehenduntur, præcellere. Porro nihil tam nobis uitandū est, quam pharmaca generis oleosi, quæ Hippocrates malthacode, id est mollicina nominat: cuiusmodi sunt omnes adipēs, præsertim porcorum, dein resina, postea cerata: alia uero ratione & quæ indurata remollunt, malactica Græcis dicuntur, non cōueniunt, chalbanum, bdellium, gutta ammoniaci, styrax, medulla: Item alio modo acria, piper, zingiber, sinapi, canchry, multaq; eius generis alia.

Quomodo medicamentis sicis modo commemoratis in ulceribus ad cicatricem ægre ueniunt, & malignis uitandum sit. Cap. III

Huiusmodi ulcera uitioso plena humore necessario existunt: pleraq; uero ipsorum etiam sordes copiosas cōtinent. Quoniam ergo sicum ali quod pharmacum ipsis sumis inspersum, cōuenit, prius ea linteolo mollī, puro, et sicco extergere. ubi ulceris cauitatem medicamentō impleueris, plumsa emplastrī labris attenuadis accommodati extrinsecus superadūm est: atq; huic rursus linamentū undiq; æquale foris iniiciendum: cui spongiam ex aqua, aut uino tinctam applicabimus. At in primis curandū est, ut spongia frigida permaneat: quod ex facili fiet, si frigida ipsam continue citra deligaturæ solutionē foueas: sed fasciā ei iniicere ac circumdare debes, ut Hippocrates in commentario De fracturis edocuit, maximam offensam fore rarus ex deligatura quæ ad elegantē formam, non usum conducit. Si igitur fasciā una fuerit, inferne sursum tribuenda est, siue tibia, siue genu, siue talus, siue cubitus, siue manus summa, siue alia quæuis pars laborauerit. Quod si duabus uti uelis ut in fracturis: altera parte affecta sursum ferretur dumtaxat: altera deorsum prius, mox in superiore parte desinet, eodemq; cū priore perueniet. Quamobrem hæc fascias ex linteis, nō panniculis esse, ut omnes nouistis, expedit. Tertio autem quoq; die nō singulis soluendum membrū est, sic ut aqua non adhibita, quo dixi modo nuper, mollī, puro, & sicco linteo saniem ulcersi abstergas. At si ambiētēs ulcus partes phlegmonodes quippiā representent, liquidū medicamentum latum extrinsecus plausum super accōmodandū est ex meo Phoenicino, non simpliciter liquefacto, sed cui plurimum quoad fieri potest uini astringētis adiectum sit. Neq; tamen quolibet oleo liquare ipsum conuenit, uerum si rubor quispiam, uel omnino calor in circumpositis ulceris partibus exuperet, astringente, & refrigerate, aliquo id faciendū est. Sunt huiusmodi myrteum & melinum, si hæc non adsint, adhibeto et quod omphacinum, & omotri bes nominat. Si durities maior extiterit, oleo ueteri, uel ricinino ipsum Phoenicinu liquefacies. Sed tutius fuerit, si nihil in ambiente ulcus loco uitiosi appareat, superpositæ regiōi liquidū medicamen

ad mouere, quod repellat, si quid prius uel prauum, uel plusquam par est influat, maxime cum in cure ulcus obortum superpositam uenam uaricosam habeat, quæ dū magna est, ac colore nec rubrum, nec probum sanguinem, sed atrioiorem, magisq; melancholicum continere uidetur, excidenda uenit. Interim uero contigit, ut uena tali excisa ulcus statim ad cicatricem ueniret, etsi iam annu durarat: uerum ipsius loco iuxta diuisionem ubi uena erat excisa, ulcus malignum ac contumax oriretur, cui cicatrix induci non potuerit. Igitur id genus uitij præstat, uiribus ægri consultis, à uenæ incisione auspiciari: deinde pharmaco purgare, melancholicū humorem, & cum hoc etiam pituitosum educere: quoniam is quoq; unā non nunquam cum melancholico influū, dum uarices generantur. Postea ipsam uenam ulceri suprapositam in longum scarificare commodum est: ubi abunde uacuatis, ei ipsi uenæ sectæ prius medendum: posteaquam exacte iam cicatricem ducere uidetur, tūc maligni ulceris curationem, ut prædictum est, aggredere. Iam uero lien interdum male affectus, uitiosi talis humoris autor est, sicut & iecur, quibus ubi prospexeris, sic tandem ad ulcus curandū uenire oportet: pari modo, si uniuersum corpus cacochymū uel plethoricū existat, prius expurgare uacuareq; ipsum expedit, quā medicamentum ulceri admoueas.

2. Porro intra ulceris per arida medicamentum curationē, quod est cunq; solueris, aduertendum est qualem nam in particula effectum ediderint: sciendumq; ac in memoria habendum ab ijs quæ desiccant, non autem detergere ualent, cuiusmodi sunt illa quæ astringendi qualitate obtinent, ulcus purum non efficiunt. At quæ præterq; quod siccant, adhuc etiam detergant, ea non modo siccam, sed purā quoq; totam partē exulceratā efficiunt. Præterea notandū uenit pura ulcera ab ijs me dicamentis, unde prius cum essent fordida, nihil ro sionis percipiebant, nunc erodi, morderiq;. Quæ causa est ut à ualentioribus absterforijs pharmacis admittiora minusq; mordacia digrediamur, ubi ulcus adamuissimum purum inuenierimus. Quæ admodum rursus in fordidis ad magis abstergentia transimus, nisi ex rosione fordida apparuerint. Hoc siquidem medicis etiam ab his existimatis, nonnunquam imposuit, ut ad absterforium ualentius acrisq; se conferret: unde iterum ulcus erosum, ex æquo fordidum, uel etiam magis adhuc, altera solutione usum fuerit, carne à medicamento colligata ipsum scedante: nam in prauam saniem degenerat colligescens caro; ceterum quicquid ex his ipsis tenuioris consistentiæ est, à pharmaco distat, reliquum ibidem circa ulcera concretū, fordes ipsi redditur. Quare animum attēdere oportet, utrū uelcuis carne quæ subest excisa, ac colligescente fordidum euaserit, an quia medicamentis fordibus auferēdis aptum requirat, impositum uero tale non sit. Indicat autem ulceris maior facta cunitas, tum oræ rubetiores calidioresq;, cum medicamentū acrimonia fordidatur. Fortan igitur super

uacaneum fuerit in præsentī commentario, compositorum medicaminum usus rationem modumq; ascribere, quippe in Methodo curandi explicatum. At quæ necessaria sunt, & magnam noxam adferunt neglecta, satius est bis rēre, ut fidelius memoria inhereat, repetere. Ponamus igitur & hoc etiam in talium ulcerum curatione, siquidem citra totius corporis offensam fieri poterit, ægrum à balneo abstinere: perfricari linteis largiter, mox oleo, deinde halteribus, exerceri, si crux fuerit affectum: uel cursu, si partes superiores male habeant. Quod si à balneo temperare sine totius corporis noxa non poterit, soluere deligaturam non oportet: uerum ut ligatum est membrum lauare, & aquam calidam ex spongia exprimere, aliamq; mox frigidam infundere, ut nullus in deligatura calor sit reliquus. Iam si curatio succedere uideatur, etiam absq; spongia alligata sanari potest, si Phœnicinum liquefactum, ut dixi, extrinsecus imponas, & citra spongiam, quæ fascijs comprehensa uelut in fracturis, ægrotæ corporis parti orbiculatim circumdatur.

Compositio medicamentorum, quæ in modum emplastri sunt. Cap. IIII

Quoniam malignorū, & difficulter cicatricem recipientium ulcerum curationis summus est cōpus, ut medicamentū citra morsum exiccet, aqua uero & oleum maxime omnium humectant: ab eis abstinendum est, ita, ut nec per se adsibeantur, nec siccis quæ recensissimus misceantur medicamentis. Itaq; cera deligenda est, neq; natura, neq; uetustate sicca: uerū recens & pinguis natura, quæ in sole emollita arida medicamina dicta, excipere poterit: sin autem sol absit, apud ignem calefacta subigatur: & in calidam aquam demergatur. Non enim aqua in totū miscetur, sed statim ab ea emollescere desinit: antequam ulceri fuerit imposita, symmetria uero mixtura est talis:

Mediocre medicamentum hoc modo efficitur.

Quarta pars metallicorum cere adijcitur: ualentius erit, si tertia sumatur. Porro cum ipsa metallica minus magisq; immordacia siccaq; existat, uirtus in ijs quæ magis siccant, intendit: quæ minus remittetur: quemadmodum rursus tutior leniorū usus est: mordaciorum periculosior. Dicitur nāq; frequenter est, nonnullas naturas corporum, tum cutē, tum carnes magis sensorias habere: quibusdā has ambas minus esse sensorias. Item pro maioris minorisq; sensus ratioe, doloris etiā affectus sequitur, ut & phlegmones. Accedit huc non mediocri differentia, q; quis molli sit carne, uel duriore, boni maliq; succi, uel plethoricus, uel uacuus uel medio quodammodo inter enumeratos affectus. Vnde colligo unum omnibus idoneum medicamentum præparari nō posse: sed qualescunq; ex similibus specie confectum fuerit, hoc uti sciet ille, qui methodum isto libro traditā artificiose didicerit. Exēpli gratia in subiecta materie, si pares utriusq; æruginis, & aris cōbusti partes misceas: aluminis scissi partis unius dimidium, ut totum tribus, uel duobus denarijs semis, uel uncij totidem

constet, sufficiet decem ceræ denarios adijcere de narijs. decem uero uncias, uncijis, in temperati & medijs facultate pharmaci cōpositionem. melius fiet, minusq; mordebit, si loco aluminis scissilis di phryges accipiat, cuius uno denario integro inie- cto, quæadmodum æris quoq; & æruginis, medi- camen erit præstantius. Quod si æruginē morda- cius facturâ suspicati lene prorsus ipsium fieri pos- tulemus, cōbustam apponimus. Insuper si expur- gare fordes statuerimus, æris squamæ denarij di- midii addetur, ut tota medicamenti symmetria ta- lis euadat. æris, æruginis usq; diphyrgis, singulo- rum partes æquales, hoc est cuiusq; denarij pon- do unius. æris squamæ denarij dimidiū. Hæc pin- gui cera, ut dixi, mollita excipiant, ubi siccor pau- lo fuerit, quàm ut cōmemorata excipiat miscen- dum est myrtem molliendo, uel melinū, uel len- tificinum, uel riciniū, uel cyprinū, uel omotribes oleum uetus, uel recēs Hispanum, uel quod apud nos ex oleæ furculis præparat. Aut si omnino nihil oleosum medicamento adhibere placet, laricē res- sinam admisceto, cuius si copia non est, terebinthi na eius loco utendū. Cæterum hoc semper in me- moria tenēdum est ijs, qui hæc legunt, maxime ad primum quod dictum est, tanquam præstantissi- mum ueniendū esse, mox ad secundū, & tertium; deinde ad alia quæ post tertii sunt, ceu pro phar- macorū uirtutis & potentie pportione, sermonis ordinē nobis usurpantibus. His igitur auditis quis- piam, & simplicium medicamentorum uirtutibus intel- lectis dijudicare poterit, quæ maiores nostri ad ulcera cacoethe pharmaca cōscripsere. Sicut uer- bi gratia Asclepiades cognomento Pharmacion in tertio Extrariorū in hunc modum tradidit.

Quæ medicamenta memorie prodiderit Asclepiades Ca. V

Ad chironia & curatu difficilia ulcera medica- mentum accōmodatū. Aeris squamæ pondo un- ciam. æruginis rasæ pondo unciam. ceræ selibram. resinæ laricis pondo uncia semis. ea quæ liquari possunt, aridis affunduntur, quibus exceptis, ac cu- rioso mollitis utitor: item platysma exiguum soli affectæ parti, ut ulcus tantū comprehendat, inij- cto. Cæterū ambiētes particulas pharmaco, quod phlegmonem arceat, circundare oportet. Inter cu- randum tertio quoq; die soluere: deinde fomen- tis mitigare, idemq; emplastrum, quod à latitudi- ne platysma uocatur, abluendo emollire, ac rursus imponere, donec cicatricē inducere incipiat. Hęc est medicamenti scriptura. Pulchre uero author ipse adiunxit, ad chironia. nominant enim sic ul- cera, non mediocriter sed maxime maligna con- tumaciaq; generosum hoc medicamē est, ut quod ex tertia ceræ parte metallica contineat, æruginē sanē pharmacū ualentius: æris squamam, multo illa moderatius, aramē & ipsium generosum. Me- diam ac symmetram habet temperiem, ut etiam modice maligna curet, si non tripla, sed quadrupla ceræ portio alijs cōmista fuerit: moderatius ad huc extiterit, si quincupla adijciat, ut nondum ca- coethe, sed ægre cicatricē ducētia persanet. Quæ- admodum etiam si metallicorū sex partes cera ca-

A piat. ut sit æruginis, & squamæ utriusq; denarius. ceræ duodecim. laricis quod exigit proportio, quæ erit, si tres ipsius denarij imponantur. At ubi cera pinguis est, & si minus resing addat, spissitu- dinem, quanta sufficit, medicamentum habebit. Si quidem huiusmodi pharmacis resina ob consi- stētiam inditur, ueluti & myrteū, uel lentificinum. Ego certe attico nonnunq; celypo ceram emolli- tam miscui: ac usu didici, uel nihil uel parum adeo medicamētū ab illis, quæ sine hoc præparata sunt, superari. Manifestum autem est me hæc ad futuri medicaminis robur referre. Nam auxilium ad aliquid spectat: quippe mollius pharmacum ad moderatiora cacoethe, id est, minus malefica, mag- nis quàm uehementius conducit. ubi igitur ulcus ipsum minus malignum est, ora uero prætumida ac dura, Græci ochthodes appellat, potior in his est celypus. Benefacit etiam his cerui, utulijq; me- dulla, quam leueme ante factam, ceræ prius admi- scere oportet. Dein sic in unitatem coactis ijs me- tallica trita, ut in puluerem redigantur, excipien- da sunt: ut quæ rosionem pariant. Omnia uero sicca, ac teres tria pharmaca, quantum satis est, an- tea leuigentur, ut est Galla, Cytinus, Malicorium, Aegyptiæ spina fructus: quoniam id genus om- nia ægre fiunt leuia: sicut facile, quæ ex succis & liquonibus resiccatis proueniunt, myrrha, aloë, acacia. & quæ his sunt genere finitima. Cæterum recte Asclepiades ad finem superioris medicamē- ti scripti hæc uerba adiecit. Et hæc triduo soluito, c fomentisq; mitigato, idemque emplastrum ablu- tum emollito, rursusq; apponito. Nisi enim diu- tius cuti pharmacū adhæserit, nihil efficit. Quod & plerisque medicos latuit, arbitantes si ter die saniem ab ulcere deterferint, melius se facturos ijs qui bis idem faciunt. Qui uero semel soluunt, ad ipsi sunt quod ægris tanquam negligentes male audiunt. Cōuenit hic quoq; uos meminisse quod in plerisq; nostris commentarijs dictum est, qua- litates uidelicet omnium uicinorum corporum mutuo in se quicquam agere: et si alterū ipsorum multo sit ualidius. Hac nanq; ratione specie quod- dammodo inter se similes fiunt spacio temporis, tamen si permultum differant, ubi autem qualitas medicamenti curando corpori similis specie fue- rit, utilitas maior sequitur. His igitur rationibus, qui primus emplastro ante imposito ubi statuit, laude dignus est: & nos ipsum se qui multo magis decet, cum quod ratione inuenit, experiētia com- probatū cognouerimus. Nec temere triduo quo- que ipsum foueri singulis uidelicet solutionibus præcepit. Nam quia ualens medicamentū est, me- rito lenitionem desiderat. Satius igitur est in ulce- ribus non ita malignis, cerā quadruplam, uel quin- cuplam amborum simul metallicorum esse.

2 Post hoc pharmacum alius Asclepiades de- inceps tradidit, quod his constat. Aeruginis pōdo uncijs duabus. squamæ pōdo unc. duabus. diphyr- gis pondo uncia. ceræ pondo libra. laricis pondo uncijs tribus. Hæc rursus symmetria simplicium medicamentorum eadem est quæ superior. In illa enim

enim scriptura æruginis & squamæ, utriusq; pondo unciam adijciēbat. ceræ modum ambabus triplo maiorem: siquidem omnes uncias sex eius admiscendas censuit: resinæ uero semiunciam supra utriusque metallici portionem. Secunda scriptura, illius quidē loco, uncia semisis, tres imponendas iubet: metallicorum uero pro una uncia singulorum duas. ceræ libram cum in priorē scriptura selibram immittat. Clarum itaque est diphryges solum in secunda eum apposuisse. Ac si unciam ipsius immittendam alijs duplicatis præcipit, modo simplicibus uniuersis in priorē scriptura misit diphrygis semunciam addiderit, talem medicamenti confecturam habiturus es. Squamæ pondo unciam. æruginis pondo unciam. ceræ selibram. resinæ laticis pondo unciam semis. diphrygis semunciam. Eadem omnino & hæc est prior, si diphryges excipias: quod tam moderatum est pharmacum, ut etiam solum inspersum ulceribus, quæ cicatricem difficulter admittunt me deatur. Similiter & æs combustum, ualentior autem longe arugo, ut uel fordida admodum & humida curare nequeat, si solam eam inspergas. Exedit enim, & mordet insigniter. Porro in chironis ulceribus, alijs mista pharmacis tantum de uehementia quidem uirtutis suæ remittit, augeat autem illorum, ut compositum ex omnibus pharmacum fiat præstantissimum. Quæ uero ratione prædictis medicaminibus ærugo mista fuerit, hac & uis calx, exigua proportione aliorum multis à quibusdam adiecta, extincta mediocre est pharmacum, elota prorsus leue, & mordacitatis expers. Hoc igitur emplastrum exempli gratia adscripsi, quod iuuenes in particularib; exerceri uelim, nec uniuersalibus solis esse contentos. Rursus autem reuocato ad initium sermōe, ad Andromachi medicamenta digrediar.

De scriptis ab Andromacho emplastris ad ulcera maligna. Cap. VI

Apponam igitur causa exempli, quæ ex cōpositis medicamentis ad cacoethe ulcera conuenire usu probata sunt: ab ijs exorsus quæ scripsit Andromachus, quæ nō iniuria queas accusare, quod citra distinctionem pharmacia tradiderit. Hac enim omissa, per multos medicos male ipsis uti contingit, ideoq; nonnunquam scopum mirifice adsequi, interim ab illo errare, permultū delabentes. Cum igitur ualidissimum aliquod recensere cōueniret, omnia ordine protulit Andromachus. Ab hoc rursus aliud moderatissimū, imbecillimū uero scriptis, nulla distinctiōe apposita. Auspicatur igitur ea ipsa hoc titulo. Cicatricem inducentia. Mox ita subdit. Cadmiæ tostæ pondo libram. chalcitidis uisæ pōdo libram. ceræ pondo libras quatuor. resinæ aridæ pondo libras tres. myrteī pondo libras tres. unum aridis miscetur. Ab his uero deinceps in hunc modum scribit ad uerbum.

Medicamentum ex ladano.

Et symmetria apposita, iterum deinceps aliter ut Alcimion. Deinde hic quoque symmetrijs expolitis, infert pharmacum, inquires, ex

A hordeo. Post huius compositionem in hanc sententiam iterum scribit.

Aliud cicatricem inducens.

Resinæ sicca denarium pondo octodecim. diphrygis denarium pondo quatuor. spumæ argenti denarium pondo sedecim. ceræ denarium pondo decem. olei cyathum & dimidiū. ut hoc sit ei medicamentum ab initio sextum. His subiungit iterum alia sex, unicuiq; præponens, Aliud uolens nimirū cicatricē inducens, nos inaudire. Quinq; igitur sunt epulotica, quibus uti mos est, nec malignis, nec ægre cicatricem ducentibus idoneis. Sextum ad ulcera quidem dyssepulota, id est quæ cicatricem difficulter recipiunt, non tamē iam ad cacoethe, quæ nobis maligna dicuntur, ualet. Reliqua uero sex adiecta malignis profunt, uirtute inuicem diuersa, quibus alterutrum ab eo adscriptum esse oportebat, nēpe uel rationalem, ac methodicam disciplinam conficiendo uehementiæ differentiam, tanq; nobis intellecturis ad maligna ora ulcera ualentioribus utēdum remedijs, ad mediocria imbecillioribus: uel Empiricorum more posuisse quædam horum medicaminum phagedænicis, in summaq; exes, ac passis esse utilia, quædam cauis, quædam uehementer fordidas. Iis uero, qui phlegmonodem simul, aut scirrhosum affectum habent, aut labra ulceris dura, uel prætumida, uel nigra, uel alterius cuiuspiam coloris, sin gulis propria: horum autem nihil ille effecit. Postea sex facultates cicatricem inducendæ ordine retulit, quarum ego compositionē cum proprijs distinctionibus narraturus sum.

2 Primum itaque ab eo scriptum, æruginem, & squamam cepit, remisit autē minuitq; uim ipsius ceræ mistura, quæ octo partes amborum, quatuor utriusq; explet. Etenim æruginis, & squamæ cuiusque unciam miscere præcipit, ceræ uncias octo, admodumq; commode cauit, qui id composuit, miscere aliquod mollicinum, græce malthacedes dicitur, oleū dico, & seuum, & cœsypum, & butyrū, & resinam. At si pinguis cera nō adsit, metallica ægre miscbuntur. Ac si iuxta ignem uel in sole calido miscere ipsa cogamur, paulo post pharmacum indurefcet. Quapropter cum ulceri fuerit impositum, sagum suum æger durum contingere putabit. Quippe eiusmodi medicamenta omnia talem habet usum. Si uero calidis manibus tractetur, tātum ex ipsis recipit magnitudinis, ut emollitum dilatarumq; toti ulceri imponat, atque etiam oras contegat. Cum altum ulcus extiterit, totum ipsius cauum medicamine indito replebit. postq; hoc rursus aliud platysina super accommodabitur, quod & labra cōprehendat: huic deinde rursus linteus pannus frigida madens tantum undiq; obijcitur, ut medicamentum occultet: postremo extrinsecus spōgia mollis fascia ex linteo excepta uel semel, uel his adfecta partē orbiculatim ambi ente tantæ magnitudinis, quò totum ulcus cum labris, ac superpositorū ipsis aliquid subiectorumq; complectatur. Deligatio à duobus principijs fiat, uocant sic quoties tota pars mediæ uinculi affecto

loco incumbat, crus autem utrunq; in oppositum deducatur. Postremo si pannus tam sit ualidus, ut semel iniectus spongiam tuto contineat, illic terminis consuetur, eo quod superfluit forfice adempto, sin imbecillis, rursus utrunq; crus ducetur, simili robore ad id quod affectum est attractum, quod imprimis obseruare conuenit, cum in primo fasciæ traiectu, tum uel maxime in secundo. Quin nec illius oblitisci te oportet, cuius prius quorum ad nos memoria peruenit, Hippocrates inuentor extitit: olim ab omnibus ante ipsum medicis, nunc ab his, qui artem parum legitime didicerunt, per errorem commissi. Putant enim satius esse, partem exulceratam incompressam seruare, utrinque uero ligamentum ei circumponere, quod quam sit incommodum ac noxium Hippocrates demonstrauit. Igitur ubi hæc primo die peregeris, altero aqua frigida spongiam per rigato. Si ambiens aer calidus, & siccus fuerit, his hoc terue in dies singulos faciendum est, ac deligatura tertio quoque die soluenda, per hiemem etiam quarto. Cæterum inspicienda est, à medica menti uirtute facta inalteratio, tū in ulceris cauitate, tum in labris, tum in locis ea ambientibus. Porro unde hæc discas, libri De temperamentis suppeditant; nec non in opere Therapeutices methodi de his ulceribus tractatum est. uel enim siccius, uel humidius, uel calidius, uel frigidius, q̄ prius & totum membrū affectū, & singulæ eius partes apparuerit. Insuper considerabimus, num quid ex oris ademptū sit, uel emollitæ quodammodo uel attenuatæ sint, item colorne mutatus, & an sordium copia eadem remanserit, unde cognosces utrum fortius, uel mollius, uel simile priori medicamen imponendum ueniat. Poteris sanè & primū ipsum ex facili immutare, si mollius uoles reddere, misto inter molliorū paululo cuiusdam olei astringētis, aut myrtei, aut rosacæ, aut melini, aut lentiscini, aut mastichini, aut cyprini: sin ualidius, aut squama, aut æruginē, ex quibus utriusq; paulum adamsissim leue reddes, ut subigēdo adijcias. Nos, uti nouistis, uel mite aliquod pharmacū ulcero inspergimus, eiq; medicamen emplastrodes superimponimus. Nulli dubium est mitia pharmaca mihi dici, diphryges, sarcocollam, chalcitidem uisitam; item cōbustum & æs, & æruginem, & chalcanthū; quæ ignem non experta acria omnia sunt; combusta, moderata, lota post combustionem, lenia, rosionisq; sunt expertia. Præstat aut sicut præ diximus, & emplastrū missioni adaptare: aliqd̄ ex alijs medicamentis imponere, quorū deinceps meminit Andromachus, idq; non modo simplicium uires, sed mensuram quoque inspicientes, ut in eo quod iam commemorauimus. Quatuor enim partes ceræ, cū æruginis & squamæ, utriusq; una miscentur. Tres fortius ipsum efficiunt, sicut quinq; imbecillius. Eodem modo in alijs agendū est, puta in eo quod prædictum sequitur, octauū ordine, tali symmetria.

3 Chrysocollæ denariū pondo duum. Squamæ denarium pondo duum. ceræ denariū pondo sex.

A diphrygis denarium pondo duum. Squamæ argenti denariū pondo octo. rosacæ, uel myrtei parum; in hoc pharmaca chrysocolla & diphryges ipsa per se inspersa, malignis ulceribus curandis sufficiunt, squama ualidius, asperius, mordaciusq; medicamentum est, eoque argenti spumam autor admiscuit subueritus squamæ uiolētis, cupiēsque ipsam mollioris pharmaci mixtura mitigare, ac resolueret. Sin absq; cera quatuor illa iuxta dictam temperaturam misceas, medicamen aridum inspersile, Græci uocāt epipaston, habiturus es ad malignorum ulcerum curationem non inefficax. At ubi emplastrum facere conaris, cera miscenda est, & propter metallicorum copiam, necessario etiam liquidorum in præsentī facultate meminit Andromachus, rosacæ nempe, & myrtei, cera namq; modica nimis est pro metallicorum modo. Cum igitur chrysocolla, squamæ & diphrygis binos denarios, argenti spumæ octo misceri iubet, quatuordecim uidelicet uniuersos efficiens, uel cerā pingue permultam, uel oleosum aliquod pharmaco affundere debet. In superiore medicamēto cera quadruplo metallica superabat. unde spuma argenti ablata, ex alijs licet pharmacum cōponere, quem admodum ego nonnunquam factitauī. Quod si fiat, myrteo non opus erit, cera ut dixi, pingui adhibita, si dura sit, liquidum aliquod miscere oportebit. Quāobrem nonnulli in id genus pharmacis ceræ appofuisse uidentur, alijs nouæ, alijs recentis; non per louem ipsius atatem, sicut in alijs medicaminibus, sed humiditatem requirentes. Est etenim reuera melior noua, sed non iam ut bimumlam, trimulamue reijcias.

4 Cæterum ad sequens emplastrum ire tempus est, quod habet in hunc modum: Diphrygis denarium pondo octogintaquatuor. argenti spumæ denarium pondo ducentorum quadraginta. ceræ denarium pondo trecentorum octodecim. olei heminas sex. Poterit autem hoc pharmacum ulceribus nondum malignis, uerum cicatricem ægre recipientibus eam obducere, quoniam exicat, sed non ualide, ut quod post ipsum scribitur: minori tamen symmetria conficiendum est, idem enim ei hoc est. Diphrygis denarium pondo quatuordecim. argenti spumæ denariū pondo quadraginta. ceræ denarium pondo quinquadragintatrium. olei myrtei pondo uncias decem. Nam Andromachus ipse pharmaca, horum seculpta sunt. Hoc igitur cicatrici obducēde reuera est, respondēs ex cadmia confecto, & glyceæ nominata, de quibus sequenti sermone dicemus. Huic subscriptū, ualidius qui dem est, non tamen primo ex hisce sex, uerum septimo à primordio finitimum, in quo squamæ, & æruginem ceræ quadruplæ commiscuit. Diphrygis enim adhuc denarium pondo sedecim. argenti spumæ denariū pondo quadraginta octo. ceræ denariū pondo sexaginta sex adijcit. Inde horum copiarū gratia coactus est & myrtei olei heminalemis affundere. Numeretur ergo hoc quoque inter ea, quæ cicatricem generant. Quod statim subiungitur, eiusdem generis, mitissimum uero, mini

in quibus mordax ex plumbo combusto & eloto, spodio, cadmia, diphryge, & terebinthina compositum. Zenonem aiunt, chalbani quoque miscere, quod mihi in prædictis uidetur superfluum. Scribit igitur ipsius symmetriam talem. Eloti plumbi denarium pondo duum, spodij denarium pondo quatuor, cadmiæ tantundem, diphrygis denarij pondo unius. Excipit ea terebinthina denarijs sex. Zenonem dicit chalbani addere denarij dimidiū. Si quidē ceu molliendis labris callosis, ac duris, eo quæ præce obthodese, id est prætumidis appellatis id facit, proce admiscet. fin ad ulceris malignitatem & contumaciā, nō itē. Nam quamuis chalbani quoque receperit, etiam sic a malignorum ulcerum præuinitate uincetur. Magis autem uerisimile uidetur duodecim hæc ordine se cōsequentiā pharmaca ad cicatricē ducendā idonea scripsisse. Etenim præter duo ex ipsiis, puta septimū a principio, & octauū, alia omnia ulceribus quidē ægre ad cicatricem uenientibus, sed nondum malignis medentē. Item duodecimū inter ea similitur quidem cicatricē obducit, imbecillius autē est quæ ut cacoethe persanet. Cōpositio quoque huius hæc capit, molybdænae denarium pondo centū, diphrygis denarium pondo sedecim. foreos denarium pondo decem. cyprij tosti denarium pondo octo. resinæ terebinthinae denarium pondo octo. ceræ denarium pondo quadraginta. myrtei denarium pondo quadraginta. Porro minoris symmetriæ quæ huic proportionē respondeat, omnia eiusmodi pharmaca conficere oportet: scientes ipsa conseltim duram ac faxeam duritiē acquirere. Tantum igitur cuiusque præparare satius est, quanti usus fuerit, præsertim si hys usus ipsorum excipiat. At si quartā singulorum partem capias, molybdænae quinque & uiginti denarij erunt, quatuor diphrygis duo & sex semis foreos, tosti misyos duo, terebinthinae duo, ceræ & myrtei pares portiones, utriusque decem, amborum simul uidelicet uiginti. Porro in omnibus eius notæ pharmacis, illa quæ liquari possunt, liquefacta & refrigerata, deinde rasa ficcis diligenter in puluerem redactis admisceto. Nam si liquida ipsi affundas, sæpē fient grumi ceræ modo: (Encerdis Græci uocant) maxime cum frigus fuerit. In sole feruenti si mistura fiat, licet ea superfundere, mouendo uehementer rudicula primū, deinde cochleario, præstat autē in hisce omnibus, rudiculam palmæ esse ramusculum.

5 Hæc Andromachus indistincte sicut diximus, duodecim pharmaca tradidit, hoc ipsi tantū cōmunitur præponens, Epulotica, hoc est ad cicatricem ducendā idonea. Ego uero differentiā ipsorum manifestor (ut arbitror) exposui, quæ cordatum uerum ad dextrum particularium usum, ueluti manu ducere queat. Insuper aliorū polychreston, id est multiplicis usus medicamentorum meminī, ut ad alios plerosque affectus, ita ad ulcera dysepulota, id est ægre cicatricem ducētia aptorum, quæ nos sermone procedēte persensebimus, ubi pharmaca, propter uariam utilitatē polychresta Græcis dicta, aggrediemur. Impresentiariū peculia-

ter de ijs sermo nobis est, quæ ad maligna, dysepulota faciunt, eaque potius maligna quæ chironia nō nullis appellantur, quemadmodum et ipsi Andromacho. Ordine itaque ex duodecim medicamentis modo relatis, cum duo ad carbunculos prodiderit, unum ad herpetas, quartum aliud post tria hisce uerbis conscripsit.

Epuloticum ad chironia, Dioscoridis

Magis uarium quidē medicamentū cōponens, non tamen suprascripto ualētius, in quo cerā quadruplo copiosiorē quæ utriusque, nempe squamæ & æruginis miscerat. at in nunc proposito pauciore cera metallicorū proportione iniecta, liquari ipsam pauco myrteo iubet aut rosaceo, quantitate corū non adscripta. Iam uero uniuersam eius sententiā ex Andromachi uerbis apponam.

Cicatricem obducens, ad chironia, Dioscoridi.

Chryfocollæ denarium pondo duum, æruginis rasæ denarium pondo duum, ceræ denariū pondo sex, diphrygis denarium pondo duū, spumæ argenti denarium pondo octo, rosacei, uel myrtei modicum, ut liquefiat. Hoc pharmacum adamusissimum superiori illi conuenit quod inter cicatricem obducēntia locum, ut dixi, octauum obtinet, post id positum quod squama atque æruginē constat, sola illud æruginē nimirum superas, ideoque cicatricem illud inducentibus adscriptis. Maiora tamen de ipso pollicetur, ad chironia conuenire id dicēs: Et uero hic quoque optimi medicaminis mentionem facit in istum modum.

Medicamentum obducendis cicatricibus ex collectaenis Primionis, ad desperata.

Hoc nomen desperata ulcera illa, quorum curationem plerique aggressi non absoluerunt, sed tantum ab insanabilibus desistere ei significat. Fidem huic medicamentō, quod præter alia usū quoque probatum est. Hanc autem eius compositionem scribit: Soreos denarium pondo uiginti, quatuor, aluminis scissilis denarium pondo sedecim, malicorij denarium pondo sedecim, calcis uiuæ denarium pondo sedecim, thuris denarium pondo triginta, aduū, gallæ denariū pondo triginta, ceræ denariū pondo centum uiginti. seui uitulini denarium pondo centū sexaginta, olei ueteris hēminam. Hæc est simplicium medicamentorū symmetria ad præsentis cōpositi preparationem: at quo modo illud preparandum sit omisit, ut in alijs etiam multis, quæ confecturæ narrationem requirunt, nam in hoc quidem uel admodū facilis est, ut paulo post dicemus. Cæterū uos scire in primis uolo, ut si quando uitulinum pingue desideretur, eius loco uetus suillum, quod nominat ærungiam, admiscendum, uerum salis expers, & nō multorum nimis annorū. Vetus itaque oleū abunde fatis digerit, sic adeps quoque, idque citra rōtionē ambo efficiunt: bubulus similiter quidē digerit, sed nō æque morsu caret: mediū locum obtinet uitulinus, quo porcino acrior, hoc bubulo mollior. Itaque pharmacum, quo de sermo institutus est, ualidissima continent, sorī, alumen scissile, malicorium, gallam, nō digerēdi facultate eximia, sed adstringēdi, ut

uocant, prædita. Clarū est autē gallam semper adijciendam esse quæ uocatur omphacitis, id est immatura: alumen uero ægyptium, & scissile, cuius penuria, rotūdum quod scissili quidem est crassius, sed non minus astringens. Quod autem malicorium putamen mali granati uocatur, omnes nouerunt. Breui adeo tempore uiget, si uelis aridū contudere, & in puluerē redigere, seu leuigare. Nanque dum arefcit malicorium, imbecilliorē quoque uim sortitur, cum humore eius discusso pereuntē. Quare tutius est succosum prius ex uino decoquere, donec fiat friabile. Vinum autē austerum prorsus, sed neque recens esse oportet (nam austera nisi uetera sint, crassarum partium existunt) neque uetustū adeo ut iam acre existat. Etenim recens penitiora corporis non permeat, uetus acre & mordax est. ergo ætate medium potius est, quod plurimum intra quinque, & decē annos consistit. Postulat locus hic in memoriā reducere, quod multi sæpe didicerunt, de austeris, acerbis, in totum de astringentibus uinis, cibus, & pharmacis, ac primum de harum uocum significationibus agendum est. Austerum enim Græcis idem sibi uult, quod medicriter astringens: acerbum, quod ualde ac uehementer id facit, genus utriusque commune adstrictionis uocabulo signatur, non etiam utrum ualide an obscure ea fiat declarante. Omnia igitur astringentia contrahunt, ac densant meatus, adhuc uinciunt, ac continēt partium sibi inuicem coherentium substantiam, atque minus magisque hoc pro astringentibus quātitate efficiunt. Caterum stringendo ac desando summa corporis quod astringitur, uirtus illorum excluditur, & in altum ire prohibetur. ob quam rationem pulchre nonnulli medicorum huiusmodi pharmacis alia subtiliū partium, & acri potestatis prædita indere cogitarunt, a quibus ueluti ductæ adstringentium uires in profundum corpus peruentāt. Hoc igitur pharmaci propositi autor considerauit, qui calcem uiuam ei addidit. At in Andromachi libro calcis uox omisa est, uiuæ nomen ascriptum, medicis compendij gratia & pleræque alia sic interpretantibus. Nimirum igitur in ipsis medicamentis ad ulcera uix cicatricem recipientia & maligna compositis squama simpliciter apposita, citra adscriptionē aris & scissile, sine uocabulo aluminis, & terebinthina absque adiectione resine, subaudiimus quæ ipsi sic in dictione omiserunt, quæadmodum & nunc in uocabulo uiua-calcem: nuncupant enim per excellentiam ipsam, restinctā, & uiuam, appellatione non minus & alijs quæ uruntur, accommodata. Itaque uiua calcem mista emplastri huius autor acerbis medicamentibus ualidum compositum reddidit, ut uirtus eius inimum usque penetrer. Quoniam uero ex ualentissimis cōfectura est, ac nullum mitigatoriu, nec leniens, nec cōcurrens aliquod continet, merito thūs ei, quod puri mouendo pharmacu est, admissiuit. Si igitur sicco composito uteris, ulceri ipsum inspergens, sic uehemens admodum esset, mordax, asperum, & exedens. At quia emplastrum id facere proposuimus, perspicuum est unicuique, resina,

uel cerā, uel adhuc adipem, uel medullam miscendam fuisse, ac si nondum ex his emplastri spissitudinem accepit, oleum aliquod affundendum cum autem addo aliquod, inaudiendum est tibi præterquam quod proprie, & simpliciter oleum dicitur, etiam quod cum adiectione rosaceum nominatur oleum, uel myrteū, uel cyprinu, uel eius generis aliquod. Distinctum nanque est iam sepius, quid discriminis sit, rosaceum unguentum dicas, an oleum rosaceum, & unguentū cyprinum, an cyprinum oleum, aliaque similia.

7 Merito igitur eiusmodi pharmacorum mixturam non eandem omnes fecerunt, qui id genus emplastra composuere. nam quod plures huius differentie causæ existant, non ratione, sed mea ipsius experientia deprehendi. Nonnumquam enim ex paucis numero simplicibus medicamentum subito preparaui, interim ex pluribus, alijs ex plurimis, uel omnibus eiusdem generis. Insuper quia nonnulla apud nos abunde copiosa, quædam ex toto non essent, aut paucissima eo tempore, ex ijs quæ habebam medicamentum composui, usu ita postulante: deinde cum experimento id probatum inuenissem, ita semper usurpauī. Sæpe fortiora quædam pharmaca composita, quædam imbecilliora ultro facere institutus, ut uarijs affectibus accommodata haberem, diuersas compositiones aggressus sum. Præterea hac ratione motus, quod pars exulceratione laborans plures requirat facultates, ut eū simul & caua est, & fluida, & sordida, & oris prætumida ac dura, & fluxionem ex superioribus recipit. Si nanque pharmacum, ad omnia quæ sic exulceratis partibus acciderunt ualere cupias, diuersarum uirium materias miscere necessariū est. At si unum aliquod primum quod urget, sanare studeas alijs neglectis, non est quod pharmacorum uarietate requiras. Clarū est igitur & illos qui ante me eiusmodi medicamenta confecerunt, ob prædictam rationem dissensisse, ueluti uerbi gratia in proposito pharmaco, uitulinū pingue autor cepit, quod oras induratas emolliat. Proin duplicē ei usum adhibere debebat: unū ut molliusculo medicamini (maltha cōdes appellauimus) ad unitatē siccorū faciendam quæ primum erant utilia: alterū, ut & ipsam aliquam partem affectæ symptomata seu accidentia persanaret: uerum multo utilius medulla ceruina induratis oris adhibetur, quæ si non adsit, uitulina, si ueritatem desiderat, humida aliqua & non acris resina. Nam omnes resina humiditatis gratia simul & uiscositatis, quam habet cognatā, sicca medicamenta ueluti colligant: quia uero non euidenter habent acrimoniam, ulcus nequaquam irritant. Quapropter nonnulli merito talibus medicamentum cōfecturis admiscerunt uel terebinthinam uel laricem nominatam resinam. Meminisse autē uos inter componendū oportet illius etiā, quod a plerisque medicorum negligitur, a quibusdam per ignorantiam committitur. Credunt enim instructoribus, uetus oleum dare se affirmantibus: ignari, quomodo ipsius loco uēdant adipem suillum ue-

terem, ex oleo cōmuni liquatum temperatumq; sed membranā prius diligerenter expētis. Apparet sic, crassum inspicientibus: si odorēris, uetustatis graueolentia repræsentat. Similitudo igitur est fœtoris, qui uero utriusq; ad unguem meminit, manifesto alterum ab altero discernit. Alia liquidē est odoris ad ipsas, alia ueteris olei proprietates. Accedit huc, quod crassitudo ipsius adulterati continua non est, nec similis, quemadmodum olei ueri. Quin & crassius in uasis fundo, tenuius in summo euadit: ob quod etiam id adulterantes permouent, dum emptoribus tradunt. At si reuertat quoc; sit oleū, sine tali asu sua sponte natū, nomen quidem hoc obtinet uetus, uis autem trīmulī non est propinqua trigenario, aut quod annorum quatuor est, nullam confinitatē cum quinquagenario habet, siquidē tēporis spatīo, cum inueterarunt, tum oleum, tum adeps, rosionem quandam acquirūt. Atq; hoc ego expertus sum ideo, quod oleum ac adipem uetustissima forte quadam haberem, à patre multis annis obseruata: quæ ipse rursum ambo admodum iuuenis adhuc, copiosa reposui, ut iam inueteratis eis uti possem, ubi patris essent consumpta: sed etiam post hæc iterum ambo sæpe recondi, ut uetustescerent, tantaq; mihi nunc illorū copia est, quanta uel centū annis ui scūro sufficiat. Propterea pharmacum de quo sermo est, oleum & adipem quadraginta annorū recipiens, semper apud me ulcera diuturna præter modum maligna, quā opinio ferret melius sanauit. Sūt huiusmodi ulcera, in quibus ipsa affecta pars in tam uitioso habitu consistit, ut quāuis sanguis nutriendi causa ad eam perueniens probe sit concoctus, tamen mutet ipsum, corrumpatq;: si uel id quod influit adeo prauo succo præditū est, ut etiam si pars nihil passa fuerit, ab illo certe ipso solo erodatur. Mirifice igitur medicamenti compositor astringentia pharmaca repellendi facultate prædita assumpsit, ut nihil parti affectæ, dum curatur influat: quædam digerentia, ut sanies in laborante particula cōtēta per halitū digerant uacueturq;. Symmetria uero ipsorum ita habet. Aluminis scissilis, & malicorij, ut quæ ualidissime astringant, minus iniecit, utriusq; denarium pōdo sedecim in idem miscens. sorios sesquiplum utriusq;, hoc est denarium pondo uiginti quatuor, minus quidem astringentis, non minus autem sic cantis: scissilis quoq; & malicorij æquales utriusque portiones indidit, gallæ ad triginta denarios duos apponens, ut omnes ex pharmacis denarij octoginta octo colligerentur. His opposuit ualide digerens & siccans medicamentū calcē uiuā, cōtēnus sedecim denarijs, qui astringentiū uires sufficit detradere. Centum igitur & quatuor denarijs est medicinalis medicaminūb. collectis, plus quoq; thuris adijcere conueniebat, & hoc mitius euasisset pharmacū, quod copiosius illud recepisset. Cæterum uehemens ipsum seruare curans, minus adiecit, tibi autē licet bifariam ipsum componere: nam ubi priora ceruque condiueris, omniaq; simul commiseris, aceruo in duas portio-

Galen.

nes diuiso, alteri parti sedecim thuris denarios, alteri duplum indito, deinde liquato, & postquā refrigeraueris radito ceratum ex liquabilibus medicamentis cōfectum, quod & ipsum in duas partes seingito, alteram ei quod plus thuris habeat, alteram reliquo admiscens. Atq; de ceræ & adipsis symmetria prima coniectura latitudinem magnam satis obtinet, nobis hæud planē intelligentibus, quale tandem crassitudine medicamentum futurum sit. At postquam omnia mista fuerint, clarum sit, tenerius an durius æquo sit redditū. Quale in altera cōpositione diligentius nobis coniectandū est & de his ipsis, & simul cum ijs de oleo. Sicut enim citra rationalem methodum medicamenta componere, ita uim illorum certo & accurate cognoscere sine experientia nemo potest. Hoc itaq; medicamentum Andromachus ipse desperatis auxiliari dixit.

Ab hoc uero deinceps quoddam ad paronychias tradidit, ac post hoc rursum sic ad uerbum scripsit. Ad cacothē ulcera in Valeria Secunda, subaudiendum nimirū est, usus sum. Materia sanæ pharmaci, innuit curatione quidem se, à uehementibus relinquit, sed posse ea quæ uehementiū medicaminum adhibitione irritantur mitigare. Compositio itaque eius hæc capit. Tyrhenicæ denarium pondo octo. subaudi uidelicet ceræ, seu taurini denarium pondo quatuor. terebinthinæ denarium pondo quatuor. plumbi usti denarium pondo quatuor. Linamētis excepto utitor. Hęc ipsius uerba sunt. Male autem fecit quod ad quæ cacothē seum maligna conuenire id dicat, non declarauit, nec quod uehemēs sit, aut mitigatoriū adiecerit. Diuersa nanque sunt mitigatoria pharmaca: nam quædam tantillum etiā affectus iuuant, nonnulla uero uel paululum dolores, aliqua nec iuuant, nec offendunt, sed dolores tantum leniunt, de quibus aliās agemus, multa eius generis longo usu explorata scripturū, ac quædam mirifice adeo symmetrijs cōposita, ut omnino iuuent: interim etiam ipsos tantum affectus agrestitū, ut ita dicam, ulcerum perantēr. Verum ex illorum materie est cera tyrhenica, & plumbum ustum, non tamen terebinthina, & taurinum seuum.

CAP. VII Verū de eiusmodi ulcerib. ac pharmacis sermo, ut dictū est, peculiaris in posterū nos expectat, nunc de curatu difficilib. uel chironijs, uel quomodo cūq; appellasse uelis, differere propositum est, ex quorū numero sunt & hæc quinque uniuersa in quarto Critonis lib. conscripta.

Que medicamēta Crito scripserit, medicamentū ex ladano.

Optimum medicamen Epuloticū, ex ladano: conuenit pratumidis cum duritia ulceribus, & cauis: deligatum uero membrum, in diem quartum cōtinendū est. Picis aridæ denarij pondo ceterum. eruginis rase denarij pondo uiginti quatuor. aris combustū denarium pondo quindecim. squamæ rubræ denarium pondo uiginti quatuor. ladani pondo uncias nouem. argentæ spumæ pondo libras tres. olei sextarium unum semis. uini optimi sextarium unum semis. Hoc emplastrum præparauit.

tom. 5

Q

raui

raui & ego, materia recepta quæ nullum maltha-
 codes, hoc est mollicinum pharmacum contine-
 ret. Sic enim uocat Hippocrates omne genus me-
 dicaminum quæ connatam humiditatem habet,
 qualis in pingui est, singulisq; oleosis medicamē-
 tis, & quidem in ipso oleo & aqua. Quin & resina,
 cerasq; mollicinum quippiam obtinent. In medio
 sporum, dico aut siccorū temperamento & molli-
 cinorū, pix cōsistit: eo q; ambobus generibus citra
 offensam admiscetur, quemadmodū tum argenti
 spuma, tum arida pharmaca quæ circa mediā tem-
 periem uersantur, etiā si non nihil ad utrumuis ex-
 cessum interm̄ declinent. Hoc genere cōprehē-
 ditur pix quoq; quæ secundū siccitatis ad humidi-
 tatis oppositionē manifesto iam à medijs recessit,
 secundū alterā oppositionē calefacientiū & refri-
 gerantiū, non item calefacit em̄ modice, atq; ideo
 medicamentis quæ pus mouent, admisceet. Quam
 obrem in pposito medicamine arida pix medijs
 attribuit; atq; hac magis argētī spuma, & alia quæ
 siccandi uim obtinent. Porro cū & hic error com-
 mitti possit, disputationem de ipsa institua, the-
 oremate primum ad multa utili in memoriā reuoca-
 to: quanq; id in alijs operibus, maxime de Simpli-
 ci medicina, & Therapeutice satis abūde sim exe-
 cutus. Calidū enim & frigidū, humidū & siccū
 medicamēti appellamus, quod corpus nostrū cale-
 facere, uel refrigerare, uel siccare, uel humectare
 queat, ad optimū hominis tēperamētum collatio-
 ne facta. Medium uero quoddā hoc est inter alia
 temperamēta uitiosa, quæ etiā calida, uel frigida,
 uel humida, uel sicca nominamus à præpollēte in
 ipsis siue qualitate, siue facultate, siue substantia,
 siue tēperie malis dicere, denominationē facien-
 tes. Eadem ratione neq; si à superante in mistura
 elemento uniuersam tēperiem denominare uel-
 is, rerum scientiam offēdes. Offensum enim est
 in medendi methodo præsidia per indicationem,
 ab ipsis quidē affectibus, cōtrariā illis tēperaturæ
 inueniri: à tota uero animantis cuiusq; natura, atq;
 à singulari rursus partiū, propriæ & similis, unde
 si & ulcus simplex cauū habeat quis, ab ipsē quidē
 genere, sed quæ non mediocrē differentiam
 in particularium speciebus habet, curatio sumet;
 atq; ob id demonstrauimus ulcerum omnino simi-
 lium quædā à medicamentis, quæ ad plenū siccet,
 persanari, puta, radice panacis, aristolochia, acoro
 iride; nonnulla à solo thure, licet hoc carnē non in-
 ducat, sed illas naturas ad suppurationē perducatur,
 quas aristolochia carne replet. Sicut autē in corpo-
 ribus curādis differētia particularis permagna est,
 ita quoq; in ulceribus, nam simplex, cauū, & purū
 ulcus à medio criter siccātib; curatur; sordidum
 uero & malignū, & oris prætumidis ac duris quidē
 med, sed carne ad cutem fluida, ualidissime siccan-
 tia requirit. In his igitur ulceribus, quoniam & de
 ipsis uerba facimus, thus est imbecillū medicamē,
 ut ne pus quidem cōcoquere, uel mouere possit,
 argenti spuma hoc est ualidius, sed medijs tamen
 & ipsam inferius. At pix arida mediōrū gregi an-
 numeratur, quemadmodū hanc superat exican-

A do æs cōbustum, chryso golla, & diphryges. Porro
 euidenter siccatur chalcitis combusta, ærugo, misy,
 atramentū sutoriū, aris squama, atq; altero modo
 ea quæ sunt acerba, galla omphacitis, id est imma-
 tura, malicorium, alumen. Exeunt autē, non uita,
 chalcitis, ærugo, misy, & calx. Quæ iam fortissimas
 facultates habet, in omnibus corporibus eandem
 actionem ostendere uidentur. Imbecilla manife-
 stam differentiam indicant; at si mentem adhibe-
 as, neq; minus in ualentibus pharmacis magnū a-
 ctionis discrimen deprehendes, quam in mollib;
 & duris corporibus obeunt. Etenim mollia citius
 accendunt, uehementius molestant; & maiores
 phlegmonas concitant.

2 Cum igitur hæc nō modo ad præsentia, sed
 B alia quoq; multa quæ hoc cōmentario continen-
 tur, uilia dixerim, rursus ad propositum pharm-
 cum reuertar: in quo picis aridæ denarium pondo
 centum, à Critone scriptū fuisse retulimus: argen-
 ti spumæ pondo libras tres, cum neutrum propria
 facultate ulcus caeothēs persanare queat, uerum
 ut medicamen quod componitur, emplastrū spec-
 em induat, recte præsidijs admista sunt. Quanti-
 tas autem ipsorum artificiali coniectura sumpta,
 dicto nuper pondere statuta est: cauente hoc illo
 qui composuit, ne tam exiguum utriusque ualidis
 medicamētis miscetur, ut mordacia erodentiaq;
 C fiant ægris molesta: uel tam multa mole, & pon-
 dere, ut ipsorū uirtutem dissoluant. nam aris squa-
 ma admodum siccatur abstergitq;, atq; hac etiā ma-
 gis ærugo, quæ ambo efficacia sunt, & carnē ex-
 dunt; æs cōbustum nec à quoquā intendi, nec resolu-
 ui postulat, mediocri facultate præsentibus com-
 modum. Constat autem olei mēsuram ex his qui-
 buscum miscetur, & coctionis quantitate conijci.
 nam quæ metallica preparas ad siccandū sine ullo
 morsu, coquere diutius oportet. Atque hæc ratio
 est, cur Crito coctionem quoq; ipsis hisce uerbis
 apposuerit. Argenti spumam & oleum coquito,
 donec aliquatenus coauerint: deinde spumā aris,
 æruginem, dum confluerint & colore bonum
 acquirant, mox picem adijcito. Posteaq; refrigera-
 tum fuerit, ladanum ex uino tritum; obseruans ne
 ex hoc adiecto, efferuescat. Postremo supra ignē
 lenem unita defundito, subigitoq;. Hæc quidē co-
 D ctionis scriptura est, licet etiā copiosiore oleo ad-
 iecto, diutius coquere primum argenti spumam,
 deinde his iniectam æruginem, squamam, & æs.
 Etenim ubi diutius coquantur, duplicē in huius-
 modi ulceribus potentiam consequuntur. Quippe
 magis siccant, & minus erodunt. itaq; de alijs sim-
 plicibus pharmacis, quæ in proposito emplastro
 Crito percensuit, satis mihi dictum est; ladanū autē
 sermonem uitauit, q; etiā solum ex uino tritū ul-
 ceribus ægre ad cicatricem uenientibus condu-
 cat: nō quia uini potētiam requirit, sed si oleo ad-
 misto id coquas, pharmaci uim obtundas: adeo
 autē ualidum non est, ut obtundi desideret, quem
 admodum ærugo, uel chalcitis, uel squama, uel ta-
 le quippiam, & propter id mollius. est autem tale
 recens: nam ulceribus difficulter cicatricem du-
 centi

centibus accommodatissimū est. In Cypro igitur ubi plurimū nascit̄, medicus quidā recēs adhuc & molle id genus ulceribus ipsū molliēs imponebat, q̄ si paulum induruisset, ex myrteo emolliebat, huius inopia, ex cyprino, uel rosaceo,

3 Aliud autem medicamentum non multo post hoc in quarto uolumine Crito hisce uerbis conscripsit.

Pharmacum ex chameleonte: facit ad eadem, quæ Tyria: inducit egregie cicatricem ulceribus curatu difficili bus, callosis, et ueteribus, medetur itidē anti rhagadijs, condylomatiss, & duritijs.

Argenti spumæ minā, ceræ minā dimidium. æruginis minæ pars quarta. chamæleōtis octaua, olei minā. oleum & argenti spumam incoquito, rudicula mouēs donec crassitudinem accipiat, & fiat melinum. Quod ubi feceris, æruginem inspergito, deinde ceram diligētē liquatam adijceto, & ab igne sublato, chamæleontem indito. Cum in unitatem coierint, in mortariū fundito, ibiq̄ subactum excipito. Hoc medicamē uice ladanī, chamæleontem eiusdem sanē uirtutis accipit. Ambo nanq̄ ulceribus uix sanabilibus cicatricē inducūt. differunt tamen, quōd illud æs combustū habeat, minime uero ceram: hoc ceram quidem, sed es nō continet. Atque hic recte autor fecit: qui in illo, ceræ loco ladanum, ad siccorum medicaminum unitatem faciendam usurpauerit: hic uero nihil tale habēs, ceram miscuit, quæ sanē remollit medio criter, non tamen cicatricem generat, potuisset autem & hic plus olei infundere, sicut uetus, uel ricinum. Ego uero huiusmodi pharmacis lentificum quoq̄ inijcio, quod plurium facultatum est participes, liquidem emollit non nihil, digerit, & astringit, quibus omnibus difficultia cicatrici obducendæ ulcera cum oris induratis indigent.

Quæ medicamenta prodiderit Heraclides. Cap. VIII

Opportunum iam est etiam pharmacorum ab Heraclide Tarentino in tertio lib. ad Asfydamanem scriptorū meminisse. uir nanq̄ fide dignus est si quisquam alius, qui sola experientis ipsius probata comemoret. Is igitur uir hunc in modum conscripsit ad uerbum.

Aduersus ulcera uetera.

Squamæ pars una. æruginis rasæ partes quatuor. cerati myrtei partibus octo excipiunt̄. Heraclides itaq̄, tanquam medicis cōmentariū scribens, adiecit cerato myrteo excipito. Sunt autē pleriq̄ huius tempestatis tam audaces, ut prius quā d. præceptoribus habitum quendam medicum acquiescē, huiusmodi libris confidentes, optimis pharmacis citra methodum utant̄, ideoq̄ frequēter de prospero successū frustrētur. Iam uero myrtei cerati plus minusū e adijciētē, nūc humido & molliore medicamento, nunc duriore & sicciore uti licet: in primo quidem usu latiore consuetura, sicut dictum est, in secundo propius accedente, nam ulcus intuentis, si minus quā par est excitatum sit, uehementius pharmacum reddemus, ut magis siccet: sin plus ac conuenit, mollius ipsū, copiosioris myrtei cerati mistura faciemus.

Galen.

A Quia metallicorum uis, nō solum ab hoc, sed etiā quouis cerato resoluitur. Ab hoc cum deinceps scripsisset, alia (inaudire autem uidelicet oportet uirtus) ista subiunxit. Squamæ leuigatæ acetū asfundito, ac sub Canicula leuigato, mellis spissitudinem faciēs, uel incoquito, postq̄ siccum fuerit, in puluerem redactū, cerati partes octo misceto, ac uttor ad recētia uulnera, & uetera ulcera, & rafa, & attritus, & perñiones non minus ulcerosos. Hæc uobis de hoc pharmaco sunt intelligenda: Ad alia quidē, mediocriter, octo partes cerati squamæ adieceris, ad uetera nimium, hoc est curatu difficultia, si partes sex, aut quinq̄ illius apponas nihil peccabis: ualentioribus enim indigent. Hæc de medicamento narrationem sic scripsit Heraclides, Potēs in super squama super ignem resiccata uti. illius autem sermo innuit, si alio quopiam tempore medicamentum cōficiamus, loco caloris ex sole, igne utendum esse: quanquam huiusmodi omnia æstiuo sole meliora fiant multis diebus trita, quædam ex uino, quædam ex aceto. Subtiliora igitur sunt, quæ ex aceto leuigantur, atq̄ ob id melius detrahunt, attenuant, siccantq̄. Verum ad cicatrices ducendas ex uino trita meliora. in usu sunt hæc prius excicatis, deinde purgatis ulcerib. quæ cicatricē ægre recipiunt. Siccabuntur itaq̄ ipsæ quæ ualde siccant, purgantur per detergentiā, cicatricem ducunt asfringentibus.

2 Aliud. Deinceps aliud pharmacum scripsit Heraclides, eiusdem quidem materiæ, sed nō ualidum: quia argēti spumæ multum cum diphryge mistū est. Etenim argenti spumæ triginta quinque denarios, diphrygis octo, in id consiciendas esse consulit. Atq̄ hæc cerato excipit, quod ceræ denarios quadraginta, olei tres heminas capiat. Ego subinde usus sum solo diphryge cum tali cerato, non quidem ad phagedanica, & chironia, & putrida (multū enim uirtute separatur ab ijs, quæ talia curant) sed ad illa quæ citra magnam malignitatem ægre cicatricem ducunt. Quare si & argenti spumā ipsi admiscēas, eamq̄ copiosam, medicamen reddes imbecillium. Post hoc, aliud ad eadem ita scriptum est. Ceræ denariū pondō duo decim. resinæ terebinthinæ denariū pondō trium. squamæ denariū pondō quatuor. ladanī denariū pondō quatuor. bituminis denariū pondō trium. Ladanum & squama separatim teruntur, deinde alia liquefacta ex myrteo oleo, miscentur. Quod si molle ladanū fuerit, liquefacto. Hac scriptura palam indicauit Heraclides ladanū durum mortario solum ipsū esse leuigandū. humidum simul & molle, super ignem liquādum, uel solum uel cum oleo modico, quod me nō modo in hoc, uerū in gutta ammoniaci quoque facientem uis distis. Est uero & quod post hoc sequitur medicamentum à Tarentino conscriptum ad eadem hæc symmetria compositum. Chalcitidis denariū pondō uiginti quinque. cadmige denariū pondō duo decim & semis seorsum teruntur, uinum maris expers, quod Græcis dicitur aparchyton, miscetur: ubi esserbuert, superfunditur, ut hæc modice irri-

tom. 5

Q 2 gentur

gentur: postea leuigantur donec siccescant. Et ceræ drachmīs quinquaginta, resinæ terebinthinæ drachmīs triginta, in olei myrtinæ hemina parte octaua liquefactis, ad hoc ceratū, de siccis drachmas uiginti ammifceto. Hoc quoq; medicamentū nihil habet ex ijs quæ malthacode, hoc est mollicina nominauimus. Verū in missione ad ceratū qui exercitatus est methodis rationalib. à me propositis, is conuenientem in singulis ulceribus missionis quantitatem commode faciet. Pulchre autem uinum aparachyton, hoc est cui marina non addita est, calidum chalcitidi, & cadmiæ affundit, ut qui chalcitidis acrimoniam calorū ipsius beneficio auferre studeat.

3 Aliud huic proximum insigne pharmacum scriptum est, ex tot & talibus simplicibus cōpositum. Squamæ stomomatis denarij quatuor. æruginis rasæ denarium pondo duum (in quibusdā exemplaribus scriptū est denarij pondo unius) chryfocollæ denarium pondo quindecim. Leuigatis alijs carā cum resina modica liquefacito, ne pharmacum durefat, ubi commissueris, utitor: desuper autem spongiam aceto expressam imposito. Demetrius Bithynus aiebat ipsam chryfocollam solam calente admodum cera exceptam se usurpare. ostendit item Heraclides hoc in medicamine resinam non primo usu eiusmodi pharmacis misceri, sed ut lentorē quendam ad emplastri spissitudinem conciliandam ipsis exhibeat, præsertim cum cera nec natura pinguis, nec recens, sed dura atq; arida fuerit, & quidem stomomatis squama præterquam quod astringendi uim habet, etiam ualide exiccat. Demetrius autem Bithynū dixit chryfocolla sola cera excepta uti, quod nimirum recte faciens Demetrius in hunc modum usurpauit, quemadmodum ego quoque sæpe non chryfocollam, sed alia quoq; singula ipsa per se molli cera resoluens, ad huiusmodi utor. Nemini uero dubium est, me alia singula dixisse, nimirū ea quæ id genus ulceribus prodesse supra recensui, & terrere in singulis quæ curo, ægre sanabilibus ulceribus talia medicamenta cum cera componentem. Interdum enim chryfocollam cera excipio, non nunquam æs combustum, uel squamā, eamq; uel stomomatis, uel ferri, uel aris: interim æruginem uiuam, uel combustam, sicut etiam misy & chalcitidæ: aliquando ex austeris aliquid miscemus, quorum supra meminimus, quoties id quod influit, repellere conatur, ex quorum numero est alumen, malicorium, galla, cytini, balauistiū, aliaq; his similia. Itaq; si de mihi adhibita, nullum haecenus commemoratum medicamentum repudiandum esse, exercete usus eorū uiam & rationem qua uoti compos fiat, quemadmodum ego. Cæterū cum alia quoq; duo haudquaquam contemnenda medicamina deinceps à Tarentino scripta sint, non ab re mihi uisum est ea quoq; addidisse, eorum ita que prius feci tradidit. Squamæ denarium pondo quatuor. manne denarium pondo quatuor. aluminis scissi denarium pondo duū. misyos denarium pondo duum. trita ex aceto in pastillos digerito,

A qui singuli pendant denarios duos, & reponito, cum uisus poscet, ceræ denarium pondo quatuor, resinæ ptyinæ denarium pondo duum, leui taurini denarium pondo quatuor, liquata refrigerare finito pastilloq; misceto, utitor ad uulnera, tanquā glutinatorio, & quod inflammationē arceat. Hæc quidem Tarentinus, nos uero sic temperato ad ulcera commode usurpari dicimus: uerum ad cacothæ tale ceratum miscendum non est, quippe cera sola, uelut in prioribus declaratū est, hic sufficit. Ac si ex mollicinis quippis miscere oportebit, id exiguum myrtem, uel cyprinum, uel rosaceum esto. Nihil item lædes, si resinam laricem appellatam adiungas, nec si terebinthinam, quæ licet minus idonea sit aduersus hoc genus ulcera, non tamen reijciēda est. Alias uero resinas nisi prædictarum magna sit inopia, miscere non oportet. Sic de seuo intelligendum uenit, neque enim hoc apponere debemus, nisi ulceris oras emollire cupiamus. Porrò quod taurinum pingue inter alia omnia, quæ manufetorum animantium sunt, maxime siccet, non semel audiuistis, quippe superat ipsum subtilitate, tū leonis, tū pardī, tū hyenæ adeps. Potius igitur est, ubi adipē miscere oportet, anserinum indere, uel magis anserum in pascuis degentium. Satis enim est tenuis, & mitigans.

4 Iam cum adhuc restet medicamentū superioris Proximū, in quo disciplinæ principū fecit, ita factus Heraclides, Ipoterion, quasi dicas expressorium, præsertim ad teneros, quonia alterius tū materię, tū uirtutis quā diximus cōuenire ijs, qui ualida medicamenta nō sustinent, sed eroduntur, exagitantur, & fluxionem acquirunt, sermone de eo differemus, cū de id genus medicamentis agemus exponendum. Nunc ad similia præscriptis descendam, tantum insuper de ijs apponens, quod etiam altero lib. quem Stratiotem, hoc est militem Heraclides inscripsit, eadem pharmaca repetit, in tertio sibi ipsi duntaxat dissentiens. Hic enim simpliciter scripsit: ceræ denarium pondo quadraginta, uerum in Stratiote, appositū est, alij denarij pondo sedecim. atq; hoc rectius est, quia multa ceræ mistura medicamentū uim aufert. Præterea in lib. quos ad Antiochidem scripsit, horū ipsorum medicaminum meminit Heraclides, atq; in primis primi, quemadmodum in his, ita in illis quoq; commentatus. Ad nimisquā inueterata & callosa hoc uteris: squamæ parte una. æruginis in quibusdam exemplariibus punctis distinctum Δ. Scribitur est: in alijs lineam superscriptam habet oblongam. ut uel quatuor partes, uel unius quartam partē significet. Idē in prædictis exemplaribus uarie ipsorum scriptū inueni. Quare in hoc quoq; utilitas posita operis est, ut pharmacorum differentias potius pernoscere. Nam solus ipsis recte uti possis. Hoc igitur ipsorum medicamentum quod propositum est, si quatuor æruginis portiones capiat, admodū acre futurum est. At si quartam æruginis partem inijcias unī squamæ portiunculæ, mediocreparmacum habebis, puta ad maligna, potissimumq; si non ex sola cera, sed cerato ipsas temperes: præ-

diximus ceram, & mollem, & nouam esse oportere, si talis non sit, apud ignem paratum, calefacientiam, uel in sole, & cū myrte pauxillo emolliendam, itaq; eruginem, & squamam ei commiscendam: ostendimus quoque post huius cōmentarij principium optimum hoc esse pharmacū, ex squama & arugine confectum, si cera quadrupla adiecit sit. Atque ob id frequenter ipso utor, cum aeris combustū aequali pōdere plurimum admisso. Apposuit autē medicaminis huius usū in libro, quē ad Antiochidem Tarentinus edidit, ea quæ suis cōmentarijs supra nominatis omisit. uniuersam igitur ipsius seriem orationis adducam, habet autem in hunc modum.

Ad uetera quidem admodum & callosa hoc ueteris.

Squamæ parte una, aruginis quarta. Hæc leuigata, myrteo cerato duro, quod octo partes cōtineat, excipiuntur, usūq; sunt, sed prius aqua frigida ulcus eluitur.

CAP. IX. Modo producam quæ ex Andromachi pharmacis eadē promittentibus omiserā. Antea namq; emplastra dūtata retuli. Quæ uero medicamenta ex paffillis præparata, ceratis admistis dū usū postulat, ægre sanabiliū uel cerū epulotica, hoc est ad cicatricē ducendam apta, esse dicit, uel quæ sicca inspergunt, ea in præsentiarū subiungā ab illo qd̄ inter arida iuxta finē scribitur, exorsus.

Sicca Andromachi. Aridum cicatricem ducens.

Ostreorum cōbustorum denarium pondo duum. mannæ denarij pondo unius. cadmiæ obolorum pondo quatuor, aliās denariorū pondo quatuor. Tritis utitor etiam ad nomas.

Aliud Aridum ad idem

Picæ corticis denarium pondo sex. aristolochiæ denarium pondo sex, pumicis denarium pondo quatuor. resinæ sicca denarium pondo quatuor. mannæ denarium pondo sex. clarum est, colophoniam ipsum dicere. iridis illyricæ denariū pondo ij. Leuigatis utitor.

Aliud cicatricem ducens, etiam malignis.

Picæ corticis denariū pondo vi. cornu ceruini combustū denarium pondo quatuor. cadmiæ denarium pondo octodecim. mannæ denariū pondo quatuor. aruginis rasæ denariū pondo duum. Tritis utitor. Aliud. Gallæ denarium pondo quatuor, cerussæ denarium pondo octo. myrte denarium pondo quatuor. spumæ argenti denarium pondo octo. retrimenti plumbi denarium pondo quatuor. Tritis utitor. Horum quatuor medicaminum primum simplex est admodum sine moris acrosione siccat, obscure astrictionis particeps. Secundum ob picæ corticem adiectū, sensibilem alstringendi potentia obtinet, qualem habere conuenit ea, quæ cicatricem probe ductura sunt; tertium non modo corticem picæ, sed aruginē quoque capiens, ijs conducit quæ sordicem facile ulceratis adnascentē fouent: quippe sordes ipsorum tollit, & cicatricem nō impedit. Quartū loco picæ corticis myrtum habet, aliaq; citra erosionē exiccantia. Post hæc, ubi alia tria arida scripserit, quorum ita ad uerbum subdit.

Galen.

Aliud Aridum ad excrescentia cicatricem ducens sine moris, ut Harpocras.

Sandaracha, chrysolcollæ, arsenici, pares singulorum portiones, facit et ad maligniora. Hoc pharmacum nihil cum prioribus similitudinis habet, sed ulceribus propter nimiam humiditatem carne excrescentibus conuenit, ut quæ etiam repurget. Nam talis potentia est sandaracha, & arsenicum, quibus unum ex ijs quæ mirifice maligna iuuant adiectum est, nempe chrysolcolla.

Quæ scripsit Archigenes. Cap. X

Quæ Archigenes de libro ueteris ulceribus in secundo Medicamentorum uel id genus scripsit, sic ex illius dictione ad uerbum sonant.

De ulceribus quibus callus obdici nō potest, & ueteribus.

Ulcera uetera ita cicatricem ducunt, communi quodam oleo expurgatis uetustissimum cum linamentis imponitur. Vel arugo rasa cum cerato rosaceo, quod paulum resinæ habeat excepta imponitur. Item squamæ aeris rubri quam plurimum cerato myrteo exceptum, usurpatur. Vel amyli elotipartes tres, seu uitulini partes tres. ceræ tyrrhenicæ pars una. liquatis quæ liquari possunt amyli miscet, & usū est. Vel diphrygis & squamæ aeris, singulorum denarium pondo quatuor. mannæ denarium pondo octo. ex aceto probe leuigentur, dum mellis spissitudine fiat: ceræ denarij triginta duobus cū olei hemina & semis liquefacta superfundito, ac unita utitor. linamētō excipito uel pauore oleo splenium facito. Vel chalcitidis, cerussæ parem mensurā, salis cōmunis duplā, argenti spumæ portionē duplo q̄ salis maiorē, uino oleoq; alternis leuigās, ut liparo hoc est pingui medicamēto utitor. Vel argenti spumæ, cerussæ, diphrygis æquale pondus, chalcis uiuæ duplum cum myrteo cerato usurpato. Vel diphryges, squamā, galiam parī mensurā, eruginem dimidia, cum cerato myrteo, nonnulli & pitynam resinam admiscunt. Vel cucumeris agrestis radicem inspergito. Desuper linamentum filatim cōcerptum ex frigida imponito, repurgat, & cicatricem obducit.

Ad ulcera in quo cuiq; corporis loco, quæ cicatricē ægre ducit.

Erysimi semine leuigato, mistoq; dum sordium habeat speciē, splenij modo imposito, celeritē ulcera ad cicatricē perueniunt, uel maligna.

Aliud cicatricem inducens senilibus.

Ad senilia retrimento plumbi cū myrteo cerato utitor. Si uetustū ipsum cupias, adipē porcinū addito. Quæ nigricant ulcera, prius pane hordeaceo fouebis, & panī cocto butyrū & cerussam parī pōdere diligētē in unitatē rediges, & uteris.

De putridis & nomis. 2

Putridis & nomis erui farinā, alumē liquidū, panis similaginci internā micam, porcinā ueterē, uel aliam carnem salsam, uetustam, illotam, terebinthinam liquidam, mel optimum parī mensura simul cōtusa imposito. Vel aristolochiæ ac cicinorum foliorum succi æquales partes, aruginis dimidiam ex aqua, sed mellis spissitudine illimito, paululū partis incolumis apprehendēs. Si crusta non decidat, elaterij, eruginis parem modum adijcito.

tom. 5

Q 3

Bene

Bene facit ad putredines fori tritū crassius insper-
sum, & supra siccom linamentū conceptū im-
positum. Vel aristolochiā rotūdā, & gallam æqua-
li pondere ex oleo circumline. Vel cucumeris a-
grestis radicem, uel brassicā, uel betā, uel lapathi
folijs silligatam calido cinere recondito, cum autē
emollita fuerit, cōtrariā imponito: ualide purgat.
Vel summos germinantis oleæ surculos in uino
coctos cum melle aspergito. Vel chalcitidē insper-
gito: desuper uero pāniculos siccos filatim excer-
ptos accommodato. Elateriū, uel lini semen tritum
cum chalcidato imponito. Vel thymo, & staphi-
de agrestis aut fatiua cō fisis coctis aspergito. Vel
ficulneis folijs in puluerē redactis cum melle. Vel
nitrum cum cumino. Et farinā cum melle. Vel fi-
cus agrestis radicē cum melle. Vel squillā coctā
ex melle. Vel ueratri cum melle. Faciunt itidē hec
ad phagedanas, nigrītiās, & nomas. Vel fores
denarium pondo duodecim. chalcitidis denariū
pondo decem. misyos denarium pondo quatuor.
cum aceto longe acerrimo tribus cyathis conterito
donec inareiscant, & excipito, utere uero specil-
lum ex eis tingens, atq; in ulcus deuoluens, dein-
de linteolum simplex œnelæo madens superim-
ponito. Quod si phlegmone adest, alterci semen
quod hyosciamon dicitur, cum polenta, uel bras-
sicam cum melle inspergito. Quibus autem uer-
mes adfunt, cerussam, & polium æquali pondere
cum pice liquida inungito.

De cancriosis. 3

Cancriosis, & malignis ulceribus cancri fluuīati-
lis cōbusti, cadmię pares portiones tritas inspergi-
to. Aut cinerē cancriū cū cerato imponito. Aut
erysimi semē leuissimū ex melle faculentum faci-
ens, splenij modo imponito. Sūme facit ad chiro-
niā, & uetusta, & cicatricē ægre ducentia; item ad
contumaces & malignas nigrītiās tibiariū, & quæ
in mamillis sunt. strumas, ac parotidas extrahit. se-
uū bubulū pondo libras tres, (ut quidam aiunt)
quinque terebinthine pondo uncias quinq; man-
næ pondo sexuncem. terræ sardæ dictæ qua tin-
ctores utuntur, pondo uncias quinq;. Quæ liqua-
ri possunt, aridis misceto, ac in unuuo coactis uti-
tor. Aut lentem coctam cum melle, aut oleæ uirē-
tis surculos, aut utrunq; imponito.

De callosis 4

In ijs quæ callum contraxerunt, & prætumidas
oras ac duras habent, dulciciq; uocantē ulcera, cō-
muniter quidē per experientia, bene facient uren-
tia, proprie uero, litrum torrefactum, calcē uiuam
cum urina pueri impubis circumlinito, aut ærugi-
nem, thus, salem, mel inungito.

De emplastris que Asclepiades ad huiusmodi ulcera
conscriptit. Cap. XI

Præstantissima de id genus ulceribus Asclepia-
des tradidit cognomento Pharmacion. cum enim
unum sit omnibus ipsiis cōmune, nempe ut diffi-
cilter ad cicatricem ueniant, quædam quod male
curantur, uel molliu sculo uictu a medico regunt,
cicatricem non ducunt, nullā de se malignitatem
habentia; quædā uero suo uitio ægre sanantur, uel

quod prauī humores ipsiis insuāt, uel q̄ exulcera-
ta pars talem iam affectum habuerit, ut quamuis
probus qui insluit, sanguis existat, ipsum corrup-
pat. Asclepiades igitur eiusmodi ulcera tribus di-
stinguens generibus, de singulis proprium sermo-
nem instituit, quæ ego quoq; illius uerbis deinceps
ascribā, enarrans decernensq; si ambiguis quæ-
piam in sermone appareat. Itaq; de primo horū ul-
cerum ac medicaminum genere ita Asclepiades
ad uerbum differit. Vbi callum partes contraxe-
rint, & ægre ad cicatricem ueniunt, confecturis in
fra positis utendum est.

Andrea emplastrum, omnem excreseciam reprimens: item
ulceribus cruentis, ac uulneribus conuenit, inflamma-
tionem arceat, facit ad partē, sinus iungit, ualeat ad
ulcera fluētia, diuturna, et quæ difficulter
cicatricem admittūt.

Argenti spumæ pondo tria. squamæ aris, chal-
citis, æruginis rasæ, singulorum unc. iij. aceti he-
minam, olei ueteris, pondo libras octo. præpara-
tur sicut prædictum est.

Asteris medicamentum ad idem accommodatum, pro
be autem digerit.

Argenti spumæ pondo libram, olei ueteris pon-
do libras duas semis, æruginis pondo unc. chal-
citis pondo unciam. squamæ rubræ pondo un-
ciam unam. aceti heminam.

Ambionis ad idem.

Argenti spumæ pondo lib. ij. olei ueteris pondo
libras iij, chalcitidis pondo unc. ix. squamæ aris
denarium pondo quatuor. aceti heminam, confi-
cito in eundem modum.

Typilonen quod philosophorū dicitur. Facit ad ulcera fluida, &
diuturna, ægreq; cicatricem sumētia, ossa corrupta reducit.

Argenti spumæ pondo lib. iij. olei ueteris sexta-
rios iij. chalcitidis pōdo lib. ij. s. aris squamæ dena-
rium pondo xxv. aceti heminā. Argenti spumam
& oleū usq; ad cōsistentiā incoquito, deinde squa-
mam leuissimā factā adijcito, assidue mouēs. Ac
cū bene habet, chalcitidē ex aceto tritā paulatim
medicamento aliquatenus refrigerato immittito,
deinde ponēs supra ignē rursus incoquito usq; dū
nō cōiunginet, cū in pilā demissū rursus cōtenderis
ac fulbergens excipito, et ad supradicta uitia ueteris

isus uocatum emplastrum Giliuum, ad fluenta diuturna, mudi-
gna ualeat, ac uix curabilia maxime in partibus extre-
mis, consiciendum est mollius ac tenerius, densa-
tur enim repositum, & siccius euadit: ita habet.

Argenti spumæ denar. pondo c. minij sinopici
denar. pōdo viij. diphrygis, ceræ, chalcitidis cōbu-
stæ, sing. §. in alio exēplari, sing. pondo denar. iij.
chalcitidis crudæ denariū pondo. ij. olei heminas
duas. Argenti spuma & oleum coquunt, dum ite-
rum ac tertio efferuecant. Hoc facto, aquæ modī
cum digitis instillat, mox diphryges, chalcitis to-
sta leuis facta inspergiē, sub manu aquā instillado,
donec nō amplius medicamē inter coquēdū stre-
pat, ubi consistērit, cerā indito. Adinst aut chalcit-
is crudæ, & minū ex oleo modico cōtrita, cū be-
ne habet pharmacū, hæc immittito, cōtinue mo-
uens, cū recte se habet, in pilam cōjicito, ac rursus
tundito, subigitoq; excipiens uitor.

Aliud Scribonij Lari pharmacium accommodatum.

Ceræ denariū pōdo centum. argēti spumæ denariū pōdo xl. olei myrtēi heminā. i. misyos cōbuti, chalcitidis uſta, aluminis ſciſi uſti, ceruſſæ, reſinæ terebinthine, ſingulorum denariorum pōdo duodecim. componitur eodem modo.

Aliud. Compeſcit in oculis ſtaphylomata, ualet ad ulcera curatu difficilia.

Minij ſinopici denarium pōdo quindecim. argenti ſpumæ denarium pōdo centū. ceræ denarium pōdo xl. pityinæ denariū pōdo xx. chalcitidis denarium pōdo xxx. ſalis ammoniaci denariū pōdo unius. thuris denariū pōdo unius. olei heminam præparato quo dixi modo.

Aliud in Aphrodis. Facit item ad condylomata, & rhagadas contumaces.

Argenti ſpumæ denariū pōdo xlviii. terebinthina denariū pōdo xxviii. miſyos toſti, chalcitidis toſtæ, ſing. denariū pōdo viij. minij ſinopici, chalcanthi ſing. denariū pōdo iiii. olei ueteris heminam. aquæ heminā. ceræ denarium pōdo quadraginta. ricini pōdo librā, alij cyathi dimidium. ſicca ex aqua leuigantur. Atq; de his hæc tenus.

De ſecundo uix ſanabilem ulcerum genere, de quibus Aſclepiades hoc modo ſcripſit ad uerbum. 2

Ad fluentia ulcera, & curatu difficilia conſecturis infra ſcriptis utemur.

Medicamentum ex chameleonte, quo uſus eſt Philoxenus ad fluentia & egre curabilia ulcera.

Argenti ſpumæ pōdo librā. olei ueteris pōdo libras duas. chamaeleontis radicis pōdo trientem. ariſtolochiæ pōdo trientem. chalbani pōdo uncias duas. gallæ pōdo uncias duas. thuris pōdo uncias duas. conſicito ſicut prius.

Aliud quod Thebano adſcribitur.

Argenti ſpumæ pōdo librā. olei ueteris ſextarium unū. chalcanthi denariū pōdo xxiiii. chamæleontis, denariū pōdo xij. ariſtolochiæ tantundē, chalbani denarium pōdo octo. thuris denarium pōdo octo. componito ſimiliter.

Aliud ex arundinibus, ad fluentia, & chironia ulcera, item ad cuiuslibet ſerpentis ictum.

Argenti ſpumæ pōdo libram, olei ueteris pōdo lib. ij. chamæleontis nigri radicis, ariſtolochiæ, gallarum immaturarū, ſing. pōdo denarium quatuor. chalbani, guttæ ammoniaci, thuris, ſingulorum pōdo uncias duas. præpara mouens radicibus arundinum uiridium.

Cæſi nominatum Gangrenicum pharmacium accommodatum.

Argenti ſpumæ denariū pōdo centū uiginti. olei ſextarios duos & dimidium. chamæleontis nigri radicis denariū pōdo ſedecim. acetii ſextarios duos & dimidium. æruginis denariū pōdo octo. picæ corticis denarium pōdo viij. myrrhæ denarium pōdo iiii. præparato ſicut priora.

Nigrum ex pyrite lapide uocatum, quod ad Læmonicum reſertur.

Valet ad fluentia, difficilia curatu, & phagedænica ulcera, facit item ad ſitulas impoſitum. emollitq; omnem duritiā. Argēti ſpumæ, bituminis, ſing. denarium pōdo c. picis, ceræ, ſing. denariū

A pōdo viij. pyritis, terebinthina utriuſq; denariū pōdo xxv. propolis, aluminis ſciſi, ſing. denariū pōdo xv. ammoniaci thymiamatis drac. xij. chalbani, aloes, utriuſq; drach. viij. æruginis, mannae, utriuſq; drach. v. olei ueteris ſextarios ij. Argenti ſpuma cū oleo incoquitur, donec coierint, mox bitumen, pix, cera, reſina, propolis iniicitur. Quibus liquefactis, refrigeratisq; ærugo, & lapis pyrites immittitur, deinde ammoniacum, cum cacabus ab igne ſublatus, modice reſixerit, alumen, chalbanum, mannaq; inditur, & mediocriter cocta in frigidam demittitur, ac diem noctemq; ſi nuntur. Subactis utitor.

Aliud, facit ad curatu difficilia.

B Picis, ceræ, pyritis, ſing. pōdo denariū xij. guttæ ammoniaci denarium pōdo x. bituminis denarium pōdo quinquaginta. argenti ſpumæ denarium pōdo quadraginta. propolis denariū pōdo octo. ſciſſilis denarium pōdo quinq;. æruginis denarium pōdo duum. olei ſextarium.

Aliud nigrum ex ſalicibus ad idem.

C Miſyos peregrini, aluminis rotūdi, chalcitidis, cretæ ſutoriæ, quæ melanteria Græcis dicitur, eruginis raſæ, aluminis ſciſſilis, gallarū immaturarū, ceruſſæ, ſing. pōdo ſelibram. ceræ, reſinæ ſiccæ, picis brutiæ, bituminis, ſing. pōdo lib. ij. acetii acris ſextarij dimidiū. olei omphacini pōdo lib. ij. ſalicis ſurculorū tenerorū foliorū pōdo lib. ij. folia ſalicis in acetū mittito, igniq; ſuprapoſita coquito, mouens ſine requie, dum tertia liquoris pars relicta fuerit: ſicca uero tundito, & cribro tenuiſſimo ſecernito, deinde in mortarium coniecta his humorem expreſſum adijcito, teritoq; diligenter, tanq; cephalica medicamina. Quæ autē liqueſieri poſſunt, uſq; dum non coinquantur coquito: poſteaquam refrigerata raſeris, leuigatis immiſceto, ac in pilam coniecta excipiens utitor.

Indum Therſei chirurgi, ad eadem.

D Ceræ, reſinæ frictæ, picis aridæ, bituminis liquidi zacynthij, ſingulorum pōdo lib. ij. ceruſſæ, æruginis, chalcitidis, miſyos peregrini, melantheriæ, aluminis & ſciſſilis & rotundi, gallæ omphacidis, hoc eſt immaturæ, malicorij, thuris, ſing. pōdo ſelibram. acetii quantum ſufficit. Quæ liquantur, eo ſpiſſitudinis ut non inquinent coquito, ſicca tundo, tenuiſſimo cribro cernito, aceto perfundito, & liquabilibus excipito.

Aliud Cyzicenum: facit ad diuturnos affectus, & neruos præcioſos.

Thuris quā optimi, ceræ, myrrhæ, ariſtolochiæ, chalcitidis, ſilyricæ, chalbani, ſing. pōdo denariū quatuor. terebinthina, argenti ſpumæ, ſing. denarium pōdo viij. olei heminam. omnia in uas aereū conijcito, ſuper cinerem molliuſculum coquito, mouens donec in frigidam deſcendens mellis habeat ſpiſſitudinem. Deinde tollito mouens. Hoc in pelliculam illitum imponito, & ſoluito hyeme poſt ſeptimū diem, æſtate à quinto.

Aliud ex Colleſtaneis Philoxeni.

Thuris, myrrhæ, croci, ſilyricæ, bdellij, ſquamæ aris, chalcæthi, chalcitidis, aluminis rotūdi & ſiſſi,

myfyo peregrini, guttæ ammoniaci, propolis, uifci quercini, opopancis, malicorij inclufi, fingulorum denarium pōdo iiii. ariftolochie denarium pōdo viij. ceræ denarium pōdo centum. quod minam infcribit feui taurini, denarium pondo centum. refinę terebinthinæ denarium pōdo feptuagintaquinę. quod Græce triatettara, hoc eft tres minæ quartas partes nuncupat. refina in ollam fictilem nouam coniecta coquat̃ donec odorem amittat, deinde feuum & cera cōcifa adijciantur, liquenturq; ficca tundantur, & tenuiffimo cribro incernantur, deinde ab igne depofita, quæ liquefacta funt aliquandiu refrigerari permittant̃, quibus ficca inſpergito, curioſe mouens. myrrhā uero, thus, bdellum, opopancem ex aceto trita in mortario habere oportet, quibus ea quæ in olla funt immittenda, terendaq; ne in grumos ceræ modo coeant. Cum bene habuerit pharmacū, pyxide lignea irino prius illita reponitur.

De tertio genere ulcerum, quæ uix ad ſanitatē perueniunt, Aſclepiades hæc ad uerbum ſcripfit.

Ad ulcera quæ nequam coruēt, aut ſi coeunt, rurfus ſoluuntur, uel carne corrupta, uel etiã oſibus ſubiectis labefactatis, huiusmodi confecturis utendum eſt.

Ad chironiã & quæ difficilem curationem habent, medicamentum confectum.

Squamę aris, æruginis rafæ ſingulorum pōdo unciam. ceræ pondo ſelibram. refinę larcis pōdo unciam ſemis. Quę liquatur, aridis miſceto, excipitoq; ac uitior curioſe ſubigens, latiuſculū ceratum ſoli affectæ parti inijciēs ut ulcus tantū comprehendat: ambientes uero particulas medicaminē quod phlegmonem propellit, circūdare oportet, tertio curationis die ulcus ſoluere, dein fomētis lenire, ipſumq; ceratum ablutū emollire, ac rurfus imponere, donec cicatrix appareat.

Aliud accommodatum.

Æruginis, squamę aris, ſingulorum pōdo uncias duas. diphyrgis pondo uncia unam. ceræ pondo libram. larcis pondo uncias tres. præparato ac uitior, ſicut prædictum eſt.

De medicamentis quæ nominantur cephalica, id eſt capiti accommodata ſic ad uerbum Aſclepiades tradidit.

De ileonti cephalicū ad diuturna, & quę difficile curantur. oſſa corrupta educit: Aeris squamę, manne thuris, refinę ſicce ſingulorum denarium pōdo cētum. aceti heminas duodecim. Terito ſquamā ex aceto. & cum leuis facta fuerit, thus in minutiffimū puluerē redactum adijceto, & refinam. paſtillos fingito, quos in umbra deſiccabis. in uſu, cum callum auferre conaris, medicamentū partem unam. cerati ex roſaceo cōfecti æqualem ſumito. In alijs uero ſit medicamētū portio una. cerati partes tres uel quatuor. Nam temperamētum ſubiectis affectibus cōuenire oportet.

Cephalicum ex nigro Viride, quo uſus eſt Tryphon Archeus. Facit ad diuturna, & uix ſanabilia, oſſa corrupta reducit.

Aeris squamę pondo denariū duodecim. manne, thuris, guttæ ammoniaci, refinę pitynię ſicce, ſeui uitulini curati, refinę terebinthinæ ſingulo-

rum pondo denarium ſedecim. ceræ, olei, utriuſq; quartam minæ partem, aceti heminam, conficito ad modum prædictum.

Philote cephalicum. Ad diuturna, difficultiq; ſanatu, oſſa corrupta reducit, & callos conſumit.

Terræ eretriadis denarium pondo centum. æris ſquamę denariū pōdo quinquaginta. ichthyocollæ denarium pondo uiginti quinque. aceti heminas duodecim. Ichthyocollam minutim contuſam in uas uitreum cōijcere oportet, acetum affundere, ut iriget̃ur, diſſolutam medicamini præparato immittere, ubi miſcuerimus, paſtillos formare, uſus indicatus eſt.

Dionyſii Samij.

Terræ eretriadis pōdo minā. aris ſquamę pōdo minæ dimidiū. ichthyocollæ quartā minæ partem. thuris octauā. æruginis rafæ octauā. myrrhæ decimam ſextā. aceti congios duas. cōponito ſub æſtu Caniculæ, in ſole omnia cum aceto ſimul terens. Ichthyocollam uero tenuem faciens aceto modico in uaſe uitreo imbuito, deinde cū miſcueris ijs quæ ſunt in mortario, paſtillos fingito quatuor ſingulos denariorum, quosdam octo, & deſiccato: ubi utendum erit, medicamenti partē unā cum tribus cerati ex roſaceo confecti ſumito, ſplenijſ lanam ſuccidam aceto madentem ſuperdato, fiſtulis pharmacū partē unam, cerati roſacei duas, collyriã faciens indito.

Emplaſtrum ex herbis, ut Lucius præceptor conficiebat.

Anagallidis flore cæruleo denarium pondo quinquaginta ſex. papaueris agreſtis denariū pōdo quinquaginta ſex. hyoſcyami uiridis foliorum, & porrorum uiridium, ſingulorum denarium pōdo lyi. ſquamę aris denarium pōdo ſex. manne denarium pondo xx. refinę pitynię ſicce denarium pondo xvi. aloes denarium pondo ſex. aluminis ſciſilis denarium pondo quatuor, rotundū tantundem. ſalis ammoniaci denariū pondo quatuor. ceræ pondo minam, olei ueteris heminas ij. aceti quantum ſatis eſt. Herbis diſtinger contrariſis, acetoq; ſolutis, humorem ad medicamentū cōfecturam exprimito.

Iſis capiti accommodatum. Ad chironiã, & curatu difficultia.

Eſt item cruentis idoneum, quod Græci ememon appellant.

Ceræ denariū pondo centum. refinę colophoniacæ denarium pōdo ducetorum. guttæ ammoniaci, ſquamę aris, thuris combuſti, ariftolochiæ tenuis, æruginis, ſalis ammoniaci, ſingulorum denarium pōdo octo. chalbani, manne, myrrhæ, aloes, ſing. pōdo denarium pondo duodecim. aluminis rotundi denarium pōdo ſex. olei ueteris heminam, aceti quantum ſufficit, præparato ac uitior interim mero, interim diluto medicamine.

De ſcriptis ab Hera uulibus emplaſtris ad uix ſanabilia ulcera. Cap. XII

Alia ſanę quædam emplaſtra uſus multiplicis tradidit, quæ ulceribus quoq; ægre cicatricem ducentibus, & malignis eſſe accommodata affirmat. unius uero proprie ad ea ſola conducentis meminit: ſic ſerē de ipſo ſcribens ad uerbum.

Emplastrum ipsius Hygieni ad multa utile, boni coloris. Facit bene ulceribus, quae ad cicatricem aegre perueniunt: item ad ad paronychia, quo nullum extat praesentius.

Argentispumae chrysitidis pondo minam. cerae pondo minam. chamaeleontis nigri radicis denarium pondo triginta sex. eruginis rasae denarium pondo octodecim. chrysocollae denarium pondo quadraginta. olei heminas tres. Argentispumam cum oleo leni igne coquito, donec inferuescere incipiat: deinde cum ab igne depofueris, aeruginem inspergito, iterum coques moueto quousque colore proprium receperit: mox ceram indito: cum bene medicamentum habet, chrysocollam, & chamaeleontem, in mortarium demissis acetum instillato: ualet ad eadem, chrysocolla etiam contenta: quanquam & sine hac longe mitigatissimum est: summeque iuuat neruorum punctus: item cum a neruis, uel musculis eluere quid oportet: ac quemadmodum fecit Heras, ad finem sermonis de emplastro scribens, chrysocolla addita non est mitigatorium, seu leniens. quippe astringens aliquid pharmacum hoc continet: at quae ob dolorem uidelicet mitigantur, relaxantibus indigent. Nam in hoc solum accidens mitigari postulat: & subinde mitigantia dolorifici ipsium affectum offendunt. Verum uehementiori malo succurrentes, dolorē primo lenimus: deinde sic ad ea quae morbum curare possunt accedimus. Itaque chrysocolla, sicut & prius dictum est, medicamen est ex ijs quae ad ulcera uix curabilia mirifice faciunt: quemadmodum pleuraeque alia, quae praeterquam quod uehementes faciant, etiam nonnihil adstringunt. Porro nullum huiusmodi medicamentum est mitigatorium. Quoniam uero minam, & heminae meminit, spumae argenti minam unam in ijs cere praecipiens olei, heminam (dictum naque mihi est etiam in superioribus commentarijs, nonnullos uiginti uncijs, quosdam sedecim minam aestimare: ut heminam, alios uncijs nouē, alios duodecim) distinguenda quoque haec ueniunt. Sumetur autem distinctio ab ijs quae pharmacum promittit, & metallicorum quantitate: etenim propter sollicitationem coqui assatum postulat, eoque plus olei accipere, ob metallicorum autem mistionem, quae non pauca sunt, oleosam humiditatem exigit. Cum igitur nec pingue, nec medullam, nec resinam liquidam capiat, oleum augere ratio est. Itaque si minam ceu uiginti uncijs aestimeris, olei certe tres heminas infundemus, singulas unciarum duodecim. Sin autē sedecim reputauerimus, olei heminam ceu unciarum nouem licet immittere. Licet etiam duodecim unciarum in ijs cere, si coctura durior fieri debeat. Nam id talibus medicamentis est utilissimum uel metallicorum causa, quorum non mediocri copia existit. Si enim chamaeleontis denarius triginta sex adnumeret aeruginis quidem octodecim, chrysocollae quadraginta denarijs, sient uniuersi nonaginta quatuor. qui et ipsi copiosi olei misturam requirunt, maxime cum ceram denarios simul centum addi praecipiat: omnino enim uel sic multo oleo erit opus.

2 Hoc igitur emplastrum Heras conscripsit, ad firmas ulceribus aegre cicatricem coherentibus ex usu esse: Alijs uero usus multiplicis eodē in libro scripsit, post multa ipsorum opera subdidit, cicatricem aegre sumentibus, uel malignis quoque, uel chironijs idonea. Nam & Arbarzation ab ipso dictum commendat aduersus maligna, pascentia, & difficilia curatu. Item Ilim ut gangranas cohercentem; deinde tertium his uerbis suspicatur. Boni coloris - cruētis idoneum, cicatricem inducēs, quod chironijs simul auxiliari dixit. Insuper quartum, cui nomen indidit. Panacea - adhac quintum Icesif.

CAP. XIII De emplastro igitur, uario usu ac commodatis sequenti libro disputabimus, ubi simul ea quae Heras commendauit, ascribentur; hic autem, quae uix sanabilibus (chironia nonnulli uocant) medentur, longo usu tum a praepreporibus nostris, tum a nobis ipsis explorata, quorum non nulla ab antiquioribus quoque uiris praclaris approbata sunt: quemadmodum & illud quod in libro cui titulus est Mantiae pharmacopola de re medica scriptum inuenio, uerba ipsius ita sonant.

Aeruginosum Mantiae. I

Aeris usti pondo minas quatuor. resinae pityingae siccae denarium pondo octo. cerae denarium pondo octo, aeruginis denarium pondo decem. olei heminam. terrae cimoliae denarium pondo quatuor. thuris denarium pondo quatuor. squamam eris denarium pondo quatuor. Sicca leuigata in mortario finito: ceram liquefactam cum oleo tritis superfundito, finitoque pauillo tempore combibere: aceti heminam addito: per triduum terito quantum aceti excipiat, immittens, ut liquidum cerati fiat spissitudo. utitor ad omne uulnus, & uetera & uix ad cicatricem uenientia ulcera, & quaecumque cancrofa sunt, cum panniculis filatim conceptis: supra splentum uero lanam succidam uino oleoque madentem leuiter alligare oportet: bido uero per aestatem solueret: hyeme triduo, ac ulcera tepente aqua ablueret in profundis uulneribus ipsas oras leuiter linamentis interciperet. Quippe medicamen linamentis excipiat aptum est, & pus mouet. Postquam uero pura fient ulcera & crusta excidet: ceram miscendo aequalem aerugini ad cicatricem perducito. Exterit & carbunculos citra dolorem, omneque passēs malignum sistit, perfanatque. utitor quoque ad herpetas, & ungues putridos: similiter autem ad omnia uino & oleo utendum est cum lana. Praeterea dentes erosos medicamine repleto.

Bonum nostrum. 2

Cerae, picis, bituminis, singulorum pondo libram. mannae, aeruginis, cerussae, singulorum pondo selibra. malicorij, gallae, spinae Aegyptiae, iridis illyricae, aristolochiae rotundae, chalcantidis, singulorum pondo trientem, hoc est uncias quatuor. aristolochiae uero longae, & aëris combusti, utriusque pondo sextantem, hoc est uncias duas. Sicca & aceto pluribus diebus terito, ut etiam prius ostensum est. ijs probe elaboratis, quae liquari possunt cum oleo liquata heminam ipsis superfundito, manna inspergens. ubi liquefacta refrixeris, cum que deraferis, aridis ex

aceto leuigatis sic admisceto, ut ne interfundendum grumos cere modo facias, idq̄ potissimū ambiente nos aere frigidō.

Aliud, nostrum. 3

Bituminis, aluminis liquidi, singulorum pondō libram. picis, resinæ ptyinæ, ceræ, pondō libras duas. aristolochiæ rotundæ, gallæ, spinæ Aegyptiæ singulorum pōdo uncias octo. malicorij, aris usti, manna, aristolochiæ longæ singulorum pondō uncias quatuor. olei ricinini aut ueteris, si illud nō adsit, pōdo libras duas, quatuor singulæ uncias duodecim cōtineant, ut omnes simul uncia collectæ sint uigintiquatuor. Preparato hoc quoque eodem modo cum prædicto: metallica ex aceto teruntur: deinde sicca adijciuntur: rursusq̄ leuigantur. Postea cum luti spissitudinē habuerint, liquata miscentur, ut prædiximus.

4 *Aliud.* Bituminis, resinæ terebinthinæ, picis brutiæ, singulorum pondō olei denarium pondō uigintiquatuor. argenti spumæ, cerussæ, manna, æruginis, squamæ, opopanacis singulorum partes portiones. olei denarios xxxiij. ladani pōdo uncias duas. quæ ualēt denarijs sedecim. aceti heminas duas. Hoc quoq̄ pharmacum perinde ac superiora duo, conficitur.

5 *Aliud.* Chrysolle, squamæ, stomomatis, singulorum denarium pondō quatuor. æruginis, & chalcanthi utriusq̄ dimidium, hoc est singulorum pondō denarium duum. ceræ denariū pondō uiginti quinq̄, hoc est uncias tres & denarium unum, resinæ terebinthinæ pondō uncias duas, hoc est denarios sedecim. ceram cum terebinthina liquefacito, deinde alijs admisceto, bifartā medicamentum conficiens: interim ut prius citata, aceto conterens arida: interim sine hoc curiose leuigata, liquefactis misceto. Esto autem terebinthina liquidior, sicut plerunq̄ larix appellata. In summa, omnibus his pharmacis quæ chironijs conuenire palam est, laricæ resinam si loco terebinthinæ miscetas, non peccabis.

6 *Aliud.* Ceræ pondō unc. iij. hoc est denarium pondō uigintiquatuor. aris usti, squamæ, æruginis, singulorum pondō denarium duum, ut trium horum simul denarij sex existant. cera esto pinguis, ut quæ cum rosaceo uel myrteo modico emolliat: arida probe leuigata excipiantur, quæ admodum in omnibus medicamentis, quæ ad chironia parantur, uehemētē est necessarium. Quin etiam, ubi sicca ceræ fuerint admista, melius est ea dīu in mortario contundere.

7 *Aliud.* Ceræ pondō uncias sex. æruginis partem sextam, quæ est uncia una. aris combusti, resinæ laricis, singulorum pondō denarium triū. ut ambo simul habeant denarios sex. cera pinguis esto: inq̄ aquam calentem proiecta quō mollior fiat, manibus subigatur, æruginem & aris in eam recipiendo: postea contundendo in pīla ubi resinæ quoq̄ missio paulatim instillanda fiet.

8 *Aliud.* Cadmiæ pondō uncias tres dimidio chalcitidis ponderi misceto, quod est uncia semis, tritis probe unum austerū affundito, &

A rursus leuigato. ubi mellis consistentiam habuerit, ceratum ex cera, & resina fricta compositum immittito. Sint autem cuiusq̄ partes portiones unius uncie, ut ambe duas uncias efficiant: myrte liquefacti paucillimū adijcito.

9 *Aliud.* Olei ueteris, uel ricinini heminam, ceræ, picis, bituminis, singulorum pondō, manna æruginis, cerussæ, dimidio minus quam in dictis, quod est cuiusque selibram, malicorij, gallæ, spinæ Aegyptiæ, iridis, aristolochiæ rotundæ, chalcanthi, singulorum trientem, qui ualet uncias quatuor. aris combusti, aristolochiæ rotundæ cuiusq̄ sextantem, qui pendit uncias duas. Quæli quantur, aridis antea ex aceto leuigatis commiscebis, ut prædictum est.

B 10 *Aliud.* Cadmiæ, chalcitidis, singulorum pondō denarium quadraginta. ex uino tritis pluribus diebus, ceratum quod ex oleo & cera constat, immittes. Sin autē olei libras duas. ceræ denarij ducenti. At fatius est hoc minori symmetria cōficere: Cadmiæ, & chalcitidis singulorum denarij pondō decem. ceræ & olei, cuiusq̄ denarios quin quaginta inijciendo.

11 *Aliud.* Cadmiæ combustiæ, chalcitidis ustræ, terebinthinæ, ceræ, singulorum parem mensuram. Arida ex uino conteres.

Aliud ex ricinino. 12

Aeruginis denarium pondō unius. aluminis liquidi libram. malicorij, aris combusti, manna, singulorum trientem, qui ualet uncias quatuor. gallæ duplum adijcias, quod est uncias octo. picis, ptyinæ, singulorum pondō libras duas. bituminis dimidio minus, hoc est pondō unum, quantum aluminis liquidi etiam indideris, aristolochiæ rotundæ, quantum gallæ, pondō uncias octo. longæ aristolochiæ dimidiū, hoc est uncias quatuor. olei ricinini pondō libras duas. metallica ex aceto conteruntur, ut in superioribus.

13 *Aliud.* Ceræ pōdo uncias tres. aris combusti, squamæ, æruginis, sing. pondō denarios ij. ceram prius in aqua calente calcifices, manibus rosaceum admiscēs emollies, deinde arida excepta in mortario contundes diutius, ut uere omniū fiat unitas. Tertio quarto uel die hoc & alia eiusmodi omnia soluito, spōngiam extrinsecus ex aqua uel posca imponens.

D 14 *Aliud.* Ceræ pondō uncias sex. resinæ laricis eius dimidiū, hoc est uncias tres. æruginis tertiam partem, aut laricis pondus, hoc est uncias tres. picis brutiæ pondō denarium trium. chalcitidis ustræ similiter denarium pondō trium. Coniucito & hoc ut prædictum.

15 *Aliud.* Aeris combusti, squamæ, æruginis, parem cuiusq̄ mensuram, ceræ sescuplā misceto. Ceram ut prædictum est, calente prius aqua madidam subigito, ac interea dum hoc agis, uel rosaceum, uel myrteū adijcito: deinde in pilam immittito. Præstat autem trium pondō ceram æqualem miscere, quam recentissimam, mollissimam, pinguisssimam, ne multo humore oleoso indigeas.

16 *Aliud.* Aeruginis, terebinthinæ, partes

utruſq; partes, ceræ triplo plures, aluminis ſciſſi-
lis cadmiæ, ſquamæ, ſingulorum quadruplum, ut
æruginis pars una ſit em terebinthinæ una. ceræ
ſij. ſquamæ, cadmiæ, aluminis ſciſſiſilis, uniuſcuiuſ-
que ſij. ubi arida contuderis, cribraueris, in pulue-
rem exacte redegeris, in mortarium cœiectam ce-
ram & terebinthinam contundito ſicca aſpergēs:
piſſillum myrteo, uel roſaceo madefaciēs, in aere
calido: nam in hoc facile tudentur, maxime ſi id
æſtuo ſole fiat. Vſus eſt is qui aliorum quoq; ni-
mirum ulcerē prius deterſo aphrolitro, & poſtea
eloto per melicratū, tum per ſpongiā probe pur-
gato, ut madoris ſit expers: deinde ſuper id pla-
ryſmate, hoc eſt latiore linteo, cui emplaſtrum illi-
tum ſit impoſito, poſtea duplici linamēto aqua fri-
gida tincto extrinſecus ſuperdato: præterea noua
ſpōgia molli: & tertio aut quarto die id reſolues.

Acetum, hoc eſt abſq; ceræ noſtrum. 17

Argēti ſpumæ pōdo libras tres, olei ricinini ue-
teris pondo libras quatuor ſemis, acetū quāmac-
rimū libras duas, eris ſquamę nigre, chalcitidis, eru-
ginis, ſingulorū pondo uncias duas. Argenti ſpu-
mam cum oleo prius coquere oportet, donec ſtri-
gmētū ſpſiſſitudinē accipiat: deinde metallica plu-
ſculis diebus ex aceto trita adijcere: atq; ſi inco-
ques, quouſq; non coſquinet. Licet etiam ſtatim
ab initio argenti ſpumam cum oleo & aceto, dili-
genter miſtam coquere: ac ubi ſemicocta fuerint,
ſquamam, chalcitidē, & æruginē immittere. Vo-
co autem nunc librā olei & acetū, Romanā, quæ
uncias duodecim uelocius cōtinet. Quin & ſex
olei libras tribus argenti ſpumæ pondo interdum
committo. Et nimirum ſecundum hanc ſymme-
triā diutius incoquantur. Cum præparas & hoc
pharmacum, præſtat argēti ſpumā cum ſolo oleo
eſſe coctam: deinde metallica cū aceto inijci. V-
bi uero tria fuerint, cuiuſq; uncias duas dixi immi-

tendas acetū libris duabus, argenti ſpumæ tribus,
olei ricinini ueteris libris vi. uel, ut prius dixi qua-
tuor ſemis. Hoc medicamētum & ſiſtulas iungit,
& calloſas iam exſiccāt, contrahit, & claudit. At ſi
bona uictus rationē uſus quis fuerit, non reſoluū-
tur. Plenitudine uero inſigni collecto, periculum
eſt ne pars ex fluxione, inſeſtante phlegmone tur-
ſus tenetur, & ſiſtula aperiantur. Et uero inuetera-
tis ulceribus, & dyſepulotis, hoc eſt cicatricem æ-
gre ducentibus, quæ & chironia nominant, nō ſo-
lum id pharmaci imponimus, ſed etiam liqueſa-
ctum oleo ueteri, uel ricinino, ac linamento exce-
ptum, etiam ſi puris uel minimum nondum in ul-
cere antea fuerit, concoquit ipſum, & generat, &
crasſum efficit. Cæterum ulcus triduo ſolues, ſi ni-
hil prohibet. Quod ſi ſtomomatiſ ſquamæ fuerit,
præſtat: ſi minus eam habeas, nec nigram, cyprii
æris ſquamæ inijcietur. Conſeci aliquādo hoc em-
plaſtrum, phrygi quoc; lapidis uncia admiffa, in-
terdum etiam chryſocolle uncia, ſicut & amborū
nonnunquam, glutinæ & magna uulnera.

*Aliud ad teneros ex iſtlem ulceribus nimis graui-
ter conſiſtantes.* 18

Cerę pondo. roſacei pondo. ceruſſę pondo un-
cias octo. ſalis ammoniaci pōdo uncias quatuor,
ſquamæ cyprię pondo unc. duas. thuris pondo un-
ciam. calcis uiuę pondo unciam. aluminis ſiſſilis
pondo unciam. æruginis pondo unciam, malico-
rii pondo unciam. Vſus prædictis idem eſt. No-
uem in præſentiarum ſunt pharmaca citra roſa-
ceum compoſita decimum enim illud. Ex nouem
quin; ſunt pari pondere, calx uiuā, malicorium,
thus, alumen ſiſſile, & erugo. Squamę duplo ma-
ius pōdus eſt, & hanc fal ammoniacus duplo exu-
perat: hunc ceruſſa: huius ſeſcupla rurfus cera in
libram unam reducta, quam & roſa-
ceum habet.

ARGUMENTA

Proemium. Quæ polychreſta dicantur. De primis
& ſecūdis qualitatibus. Quæ tractata ſint in præceden-
te libro, & quæ tractanda in iſto. Cap. I. De poly-
chreſta que Heras ſcripſit: hac parte primum eius po-
lych. deſcribitur. 2. Alterum eiufdē, panacæa titulo:
cuius ſingula etiam ſimplicia examinat. 3. Iſidis uel
Epigoni emplaſtri (quod alij uocant Hermonis hie-
rogrāmati, uel ex adytis Vulcani in Aegypto) titulus,
compoſitio, differentia ab aliorum deſcriptionibus.

Modus cerati quo cum miſeri debet, ut purget & cic-
atrice claudat ulcera. Draunculus quomodo colli-
gendus, & q; per ſe etiam cōueniat malignis ulceribus.

4. De emplaſtro ex dictamno (de quo uide etiā cap.
3. par. 4. et cap. 5. par. 1.) Quomodo ipſe Galenus empla-
ſtrum hoc compoſuerit. 5. Hiceſium nigrum. Vide ca-
pite 2. par. 2. & cap. 4. pharmaco. 7. 6. De emplaſtro
ex duabus ariſtolochijs: in quo licet ex diuerſis compo-
ſitu repellentia & adſtringentia præcellunt. Simpliciū
eius conſideratio, uide etiā cap. 4. pharmaco. 9. 7. De
Azanitzæ emplaſtro. 8. Emplaſtrum piſcatoris diſſi-
nopidis. 11. Quod ſcripturus ſit Critōis emplaſtra,
quæ Heras non habet: & ea in quibus ab Hera diſſerit,
ut in Hiceſio. 2. De Hiceſio ſecundum Critōnē. (uide
etiā ſupra cap. 1. par. 5. & inferius cap. 3. pharmaco. 7.)

CAPITVM LIBRI V

Diſcretia quod ad pōdera in ſimplicibus quibuſdam
huius emplaſtri: & primū de mina. Obiter, quinā olei
modus metallicus admittendus. Congius. 2. Iſis em-
plaſtrum uiride, diſſerens ab Heræ deſcriptione ſupra
cap. 1. par. 3. & diligentius deſcriptum. Quō Galenus id
parauerit. 3. Emplaſtrū Macharionis. 4. Dyſrachti-
tis ſecundum Damocraem. 5. Emplaſtra duo ex ſa-
licibus. III. De ſcriptis ab Aſclepiade eiufdem gene-
ris emplaſtris. Quod utile ſit eaſdē compoſitiones ad
diuerſis ſcriptas repeti. 1. Emplaſtri piſcatoris cōpo-
ſitio, prima ſecundum Aſclepiadem, altera ſecundum
Galenum. 2. Venatorū emplaſtrū. 3. Chalcidei eri-
plaſt. 4. Sacrū ex dictamno. uide ca. 1. par. 4. 5. Dio-
phanthi chirurgi. IIII. De emplaſtris Andromachi
ex eodem genere. primū, tertium, 4. 5. & ſextum, Chlo-
ras. I. uirides inſcribit: Secundū uero ſordidū. In ſe-
xto, de hordeis uſtis docet. Polychreſta unde dicantur.

Hiceſium nigrum ſecundū Andromachū, & quid
diſſerit ab Heræ & Critōnis ſupra poſitis deſcriptioni-
bus. Alia eiufdem deſcriptio ſecundum Heraclidem
Taſentinum. & quid ea ab alijs uariet. Hiceſium
minus. 8. De Cyzienco ſecundum Heram & An-
dromachū, & quid diſcrepet: Quomodo Galenus id
dem parauerit. De eodem ſecundum Aſclepiadem.

9. Aliud Philoxeni: Sed hoc etiam adiungendum ut detur, ut ingrediētia prae se ferunt. Nos separatim hac solum gratia, quia ab initio huius capituli Galenus decem Andromachi emplastra descripturum se pollicetur. 10. Emplast. ex duab. aristolochijs, (Vide supra cap. 1. par. 6.) V. De emplastro ex dictāto uerfus Damocratis. Vide supra cap. 1. par. 4. 2. In Græco, Eiusdem uerfus continet de emplastro Tyrio: qui quoniam infra libro 6. cap. 9. repetitur, omisi sunt hic ab interprete Latino. VI. De trochiscis siue emplastris orbiculatis polychrestis (qui usus tempore liquore aliquo diluuntur) secundum Asclepiadem, in hoc & sequente capite. Sunt autem hic numero 14. De tertio uide etiam infra cap. 8. par. 11. De quarto ibidem 10. de sexto ibidem par. 5. de octauo ibid. par. 27. de undecimo ibid. par. 8. VII. De alijs 14. trochiscis, adhuc ex Asclepiade. De primo ex haliacabis, uide capite 8. par. 7. VIII. De trochiscis 24. ab Andromacho scriptis. Polychrestis sunt, sed præcipue ad uitia sedis, erysipelata, nomas, herpes, &c. Quintus Isidori inscribitur: uide alios Isidori, paulo post, pharmaco 13. & supra cap. 6. par. 6. De septimo, uide cap. 7. par. 1. De octauo cap. 6. par. 10. De decimo cap. 6. par. 4. De undecimo, ibid. par. 3. IX. De diuersis aridis medicamē

tis Andromachi, numero 37. Quorum plerisque hi & huiusmodi tituli inscribuntur, Excedens, Sine morfu ficcans, Sanguinem sistens, Cicatricem inducens, Ad hæmorrhoides, Ad nomas. De tricesimo uide etiam supra cap. 6. par. 7. X. De aridis ex Asclepiade. Primum autem docet quomodo & quo ordine sed. Andromachus & Asclepiades scripserit: ille quidem consue, hic uero distinguens generalia medicamenta à topicis,

Cephalica, quæ nudatis ossibus tum capitis tum alibi conueniunt, arida esse conueniunt: emmota enim nudis applicanda non sunt. De ordine generalium medicaminum deinceps dicendorum, ex Asclepiade, qui est: Cephalica, Epulotica, deinde reliqua, sine ulla topicis. 2. Arida Asclepiadis 22. In sexto monet, quod media non simpliciter epulotica dici debent, sed cum adiectione, ulcerum simplicium, uel malignorum, uel aliter dylepulotorum. Priora aliquot inscribuntur cephalica & epulotica: sequuntur epharotica undecimo loco & deinceps, qualia ea sint & quando adhibenda: Postremo ad nomas. XI. Asclepiadis remedia 10. ad carbunculos: Et primum anthrax quid, & quæ in genere medicamenta ei conueniant. Sunt & aliarum promissionum pharmaca, ad nomas, ad sanguinem sistendum, &c.

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM PER GENERA LIBER V.

PROOEMIUM.

De medicamentis usui multiplici accommodatis.



E medicamentis Polychrestis futura hic est disputatio: uocantur autem Græci Polychrestis, quæ multis affectibus conueniunt: suntque nonnulla ipsorum non modo specie, sed etiam genere diuersa: omnia uero ex contrarijs constant medi-

caminiſibus, etiam iuxta secundas qualitates, ac uires non tantum primas. Patere arbitror cuius primas me appellare caliditatem, frigiditatem, siccitatem, & humiditatem, atque ex harum coniugatione quauis compositas. Secūdas uero quæ ipsas sequuntur, ut in quinto libro De simplicibus medicamentis uberius percensui, ostendens nonnulla non solum composita medicamina, sed simplicia quoque ut nascuntur emollire, quædam indurare: quædam modum alia obstruere, alia reserare, alia sordes gignere, alia abstrigere, alia attenuare, alia crassitatem admoliri, alia densare, alia rarefacere, alia carnem inducere, alia repurgare, alia cicatricem ducere, alia exulcerare, alia trahere, alia repellere, aliasque similes eorum differentias. Porro dictum mihi est & superioribus commentarijs, quæ contrariorum facultate medicaminum necessaria esset mixtura, cuius etiam nunc paulo post mentionem facturus sum. Melius enim mihi uideretur duo quædam tria uel medicamenta celebra, quæ multiplicem usum exhibeant, præscribere: deinde compositionis ipsorum rationem interpretari. Exordiar autem ab his quæ nemo non nouit, quippe in Herge libro, cui titulus est Narthex, id est ferula me-

dicaminum prodita: tum apud illos qui libros De medicamentis condiderunt. At quia superiori libro De uirtutibus, quæ ulcera dylepulotica, hoc est uix cicatricem ducētia curant, uerba fecerim, animi esse nunc quoque: emplastra illa multiplicis usus primum exponere, quæ causa malignorum, (nonnulli chironia nominant) composuimus. Alia uero usus dicta multiplicis, quod multis quidem affectibus alijs conferant, non tamen etiam chironijs, ea rursus seriatim referre proposuimus.

Quæ scripserit Heras. Cap. I.

Itaque cum opere medicamentorum Heras Cappadox emplastrum quoddam ad huiusmodi ulcera mirifice faciens tradiderit, inde sumam exordium, uerba ipsius adscribens, quæ in hunc modum sonant.

Boni coloris, eruentis uulneribus idoneum, cicatricem ducens. 2.

Conglutinat, perfecte implet, atque cicatricem ducit, solum cum cerato magisque adhuc circa cicatricem inducendum efficacis est: ualet etiam ad chironia ulcera, aliasque similia summo opere. Nam callos consumit, deinde genuinam carnem generat ualde album. Ceræ pondus libras duas, frictæ podo libras tres, æruginis rasæ pondus uncias sex. mannae podo uncias tres, olei heminas quinq; acetix sextarium. Liqubilia siccis admiscetur: usus est emplastri ad uulnera, cum rosaceo temperatum, pus generat, cerato soluto ad cicatricis generationem repurgat. Quidam tamen resina frictæ libras duas, & terebinthinæ tantundem ingerunt: atque sic præparatum, ærugine rassa ipsum exceperunt, ut collyrii tenorem haberet. Atque hoc imposuerunt, ubi callos consumere studeant, propter enim hæc facit, ut etiam ossa separet. Merito igitur & empla-

strum hoc Heras commendat ceu ex æruginis, et aceti copia efficacis, si quid in superiore libro dicitur meminimus. Laudat item Panacæa ab eo uocata, quam deinceps uerbis illius appono.

Panacæa Heras, a nonnullis Sanitas nominata. 2

Ad omnem passionem & malignitatem, sistit autem nomas, neque crustas facit, neque circumpositis partibus duritiæ cõciliat, rûpit ac tabefacit omnem corruptum, ut nihil differat ab uuis pãsis humectis: colibet sanguinis eruptione, tum aliam, tum que per hæmorrhoidas fieri solet, myrteo dilutã, ite hæmorrhoidas ipsas tabefacit, & cõsumit, insuper fistulis medetur, & carbunculis, sanat ægilopas, & chironia, ut uocãt, in summa uix sanabiliũ, & diuturnorũ genus, latetibus locis, uel uti utero, unguento cyprino liquatũ, exterioribus præstat, ut alia singulari sic apponere. At omni ulceri impostum, quauis agrestis, mitius statim id efficit, dolores minuet, & uigilias. Compositio autem eius hæc est. Chamæpityos denarium pōdo quatuor. symphyti denarium pōdo quatuor. chamæleotis denarium pōdo quatuor. marrubij denariũ pōdo quatuor, apud alios sex. polij denarium pōdo sex. centaurij tenuis denariũ pōdo sex. helenij denarium pōdo quatuor. aristolochiæ denariũ pōdo quatuor. thuris denarium pōdo duodecim semis. myrthæ denariũ pōdo trium. albes denarium pōdo sex. chalbanij denarium pōdo sex, oboli unius semis. olei denariũ pōdo centum octoginta. mellis triginta. propolis denarium pōdo duodecim semis. aluminis fisci denarium pōdo sex, oboli unius semis. terebinthinæ denariũ pōdo sex, oboli unius semis. chalcitidis denariũ pōdo sex, oboli unius semis. bituminis denariũ pōdo quinquaginta. terre ampelitis denarium pōdo quinquaginta. argenti spumæ denariũ pōdo quinquaginta. gallæ denarium pōdo trium. pulueris iridis denarium pōdo trium. Contusæ pridie herbe & radices oleo inmittuntur. ubi nocte tota in eo durauerint, mane argenti spuma, ampelitis, bitumen iniicitur: supra ignem lenè incoquantur, ubi spissitudinè adepta fuerint, olla ab igne tollitur. Sint autem in alio uase mel, resina, chalbanũ, propolis colliquata, que oportet simul cõmiscere, in ollam fundedo: deinde arida, quibuscunq; medicamentum coquitur, donec nõ coinquinet. Rursus ab igne deposito myrtha leuis facta, & thus inspergit, est aut aduertendum ne quando effervescat, & quantum fieri potest in amplo spatio coquat: difficulter em restingui potest, si quid attingat. Hæc quidem Heras de Panacæa; nobis autem materiẽ ipsam a medicamentis, que priore libro scripta sunt, ad ulcera uix sanitatem recipiẽtia differre notandum est, nam illa solis cõstant metallicis, que dam paucis, quædam pluribus, pauca illorum radices ac herbas cõtinent. At Panacæa hæc secus habet. recipit enim hæc chamæleontẽ & centaurium, quorum utrunq; maligna ulcera iuuare idoneũ est. ac epist præterea aristolochiã, & iridem, imbecilliora quidem centaurio & chamæleonte, quantum ad malignorum ulcerum curationem attinet, nõ ta-

Galen.

men repudianda. Herbas autem ualẽtes assumit, quæ uel solæ maligna ulcera curare possunt sæpe numero, chamæpityn, poliiũ, & symphyton, quibus ualentius est marrubium, & helenion. Itaque marrubio etiam solo uti queas in his que carnem abunde humidam circa ulcus habent, & fordido rem; helenion uerò, neque his cõuenit solũ inspersum, sicut nec aliud quoduis acre. Si quidem didicistis in opere De simplicibus medicamentis, acris & amarorũ medicaminũ discrimen: nempe acria irritare, mordere, calefacere, & fluorem in affectis partibus cõcitare: amara uerò exiccare citra morsum & calorẽ, eoq; exulceratis partibus cõducere. At quoniã ex herbis istis cõpositione parantur, institutũ erat, emplastrum inde nõ siccum quod inspergi possit efficere: ad emplastrũ uerò cõfecturam, uel cerã, uel resinã, uel omnino argenti spumam diutius cõctam adiecturũ erat, unde uirtus herbarũ solueretur, miscuit ipsis nõnulla medicamenta tam ualida, ut ulceribus per se exhiberi nõ queant. Valida autẽ hæc duplicem cõmuni tũm & qualitatẽ obtinet: nõnulla austera acerbamq; alia acrẽ & acerbã. Huius igitur gratia ex ijs que acrimoniam sortita sunt, heleniõ miscuit, ex ualide autẽ adstringentibus (hęc enim austera & acerbata nominamus) alumen & gallã immaturã. Qualitates autẽ utraq; ualentes habet chalcitis, quæ admodũ & uires in ipsis cũ sit acris, & adstringens. Enim uerò dictum est superius necessariã esse malignis ulceribus, & præsertim cũ fluiori sint obnoxia, qualitatẽ austera. His ergo omnibus quæ dixi, admista argenti spuma est, resina, & thus, quod pharmaciũ emplastrũ formã acciperet. Sed argenti spuma ex mediã materia est: thus cõcoquit, et pus mouet, si tanquam ad probe temperatã naturam respicimus. nam id humidioribus corporibus carnem producere ostendimus, Quinetiam ex medicamentis quæ cõcoquant, quæq; uim à pure mouendo, quasi purificam uel expuratoriam dictam habent, nullum ualenter digerit, sicut nec acre. Si quidem talia mediocriter excalefaciunt: ita & emollunt magis & exiccant. Quare thus etiã recte admistum est in propositi emplastrũ cõpositione, uti mitigatorium quid & lene accipiat. Huius nimirum potentia oleum quoque est, emplastrũ coquendi causa secundum primã rationẽ adiectum, secum uerò duas facultates inferens, mitigatoriã uidelicet & quæ ualida pharmaca obtundit, siue hæc acris, siue austera uirtute sint prædita. Certe ampelitis terra siccatur, & digerit, nihil mani festo acre continens: propterea malignis ulceribus idonea est, & si solam per se tritam inspergas. Chalbanum uerò & ipsum eo quod cõcoquit, emollit, mitigat, & dolorem sedat, prædictæ cõpositioni adiectũ est, cum thus easdem uires, sed imbecilliores habeat chalbanum, facultates ambas ualentiores possidens. Terebinthina resina ipsa quoq; simul cum detergendi, discutiendiq; facultatem habeat, etiã affectus tales quod cõcoquat quippiam obtinet. Bitumẽ uerò cum calore nõ admodum uehementi siccare nouimus. Quibus

tom. 5

R

omnibus

omnibus emplastri aut or medicamentum tracto-
 rię uirtutis propolim nimirū admiscuit, quoniam
 eius usum multiplicē esse uoluit. omnia uerō quę
 multiplicē usum prestant, maxime uarias potesta-
 tes habere necessitas est, ut plurib. uirijs medean-
 tur. Sic etiam nō parum mellis addidit, sciens ip-
 sum siccans, digerēsque putrescentibus esse accom-
 modatissimū. Quippe & ipsum ex ijs est, quę nō
 putrescunt, & mista a putredine referuat, præterq̃
 extreme ad putrescēdū idonea, quę humida sunt,
 & calida. Atq̃ mel copiosius alijs, medicamētū cō-
 positor indidit. Nam lī tria quę coqui desiderant,
 excipias, bitumen, argenti spumam, terram ampe-
 litidem, alijs maius est: atq̃ his iplis bitumini, ar-
 gētī spumę, & ampelitidi, tantū adiecit olei, quan-
 tum coctioni commodum erat futurum, cōiectu-
 ra & ab alijs sumpta, quę sicca pharmaco immit-
 tuntur. Insuper omnibus perfecte coctis, myrrhā
 & aloen uoluit inijci, quę ambo citra rōtionē sic-
 cant: uerū differunt, q̃ aloē adstringat, myrrha te-
 nuiorū partium sit, magisq̃ siccet. Cæterum haud
 scio cūr Herę uisum fuerit minoribus symmetrijs
 Panaceā hanc cōscribere, quā alijs maioribus con-
 ficiunt. Siquidem nōnulli omnia duplicata habe-
 re ipsam tradiderunt: alij quadruplo copiosiora.
 chalbani sanē denarios sex, obolū unū semis, He-
 ras numerauit. alij decem & semissem: quę admo-
 dum alij rursus uigintiquinq̃, augentes simul &
 alia ad proportionem ut nūquam dicatur in sym-
 metriā, obolus uel semiobolus. Itaque aduerte-
 re uos oportet, panaceas apud alios scriptas, huic cō-
 ferētes utrum omnia duplicata, an quadrupla ha-
 beant. Ac si sint omnia aucta, non putare illas ab
 hac esse diuerfas.

Iſis, à quibusdam Epigoni dicta. 2

Multiplicis usus est medicamentū, quod Iſidem
 appellant, ab omnibus commendatum. Ego ue-
 rō apponam modo quę Heras de illo memoratę
 prodidit. Hęc illius uerba sunt.

Medicamentum à nonnullis Epigoni dictum, ab alijs iſis.

Facit ad omne uulnus, & ad uulnera capitis cū
 oſiſi præſione, sanat citra destructionē ac perfo-
 rationem, ualet ad punctis: item paxillos infixos
 & hominum morſus: uenenū trahit uiperę, scorp-
 iij, draconis marini, pastinacę. Curat fracturas ar-
 tuum cum uulnere, callum enim obducit citius,
 tutiusq̃ facit ad fistulas omnes recentes, ueteres
 foueas seu dehiscētia ulcera, sinus, phymata, pa-
 rotidas, abscessus in mammis & alis, aut ut ne ſiāt,
 aut ut facti curentur, commodum saniei fluxum
 nobis facientibus. Strumas item aufert cum tunic-
 cis, celerrime pus educens, sistit oculorum fluxio-
 nes fronti impostum, tollit ltuorem: gangranas
 nō patiē latius serpere, putredinē purgat, in sum-
 ma ad quoduis bonū est: hęc recipit. Cera dena-
 riū pōdo centū. terebinthinę denarium pōdo du-
 centorū, secundū alios centū. squamę aris rubri
 denarium pōdo octo. aeruginis rarsę denariū pon-
 do octo. aristolochię rotundę denariū pōdo viij.
 thuris denarium pōdo viij. salis ammoniaci dena-
 rium pōdo viij. guttę ammoniaci denariū pon-

do viij. aluminis combustū denarium pōdo sex.
 aris uſti denariū pōdo viij. myrrhę denariū pon-
 do duodecim. aloes denarium pōdo duodecim.
 chalbani denarium pōdo duodecim. olei ueteris
 heminam. aceti acris heminas duas. Quę liquari
 possunt, siccis in mortarium superfunduntur. Sic
 quidem Heras Iſim scripsit, non etiam particula-
 rem omnem usum ei apponens, ut in alijs consue-
 uerat. Insuper quod ad Epigonum illud refert, à
 plerisq̃ dissentit, quos exactius de Epigono scri-
 psisse arbitror, cum alia, tum illud quoq̃, nempe
 q̃ in carcere cōclusus fuerit, et postquā quendam
 ualde potentem crasseret, inde liberatus sit. Adie-
 cisse uerō ipsum aiūt præscripto medicamēti, dra-
 cunculi radicē, atq̃ ego ita semper usus sum: quo-
 niām & præceptorū meorum unus usurpabat, ap-
 ponens in prædictā symmetriā Herę, dracunculi
 denarios viij. in super & olei hemina dimidiū. ace-
 ti heminā unam. ad hęc colophoniā resinā, nō ut
 Heras terebinthinā. Sed et in emplastri cōfectiōe
 ab illo dissentiebat: chalbani aceto cū alijs in pila
 elaborās, atq̃ ita admiscēs ea, quę admodū & He-
 ras inquit, liquabilibus: deinde medicamentū ma-
 nibus plurimū emolliebat, attingēs acetū quama-
 cerimū. postea in uase areo reponebat, & perfu-
 sum lōgo tēpore seruabat: atq̃ ita excipiēs uteba-
 tur. Appellauit autē ipsum, uelut etiā alij quidam
 Hermionis sacri scribæ: alibi scriptum inuenias ex
 adytis tēpli Vulcani in Aegypto hoc quoq̃ esse:
 quę admodū & illud quod ex dictamno constat.
 C Symmetriā uerō simpliciu medicamentorū, quę
 illi constituitur, omnes propemodū æquale scri-
 psentur: proinde titulus licet diuersus existat, nō
 opineris aliud esse atq̃ aliud, & quod ex adytis sa-
 crum dicitur, & Hermionis sacri scribæ, & Epigo-
 ni. nam omnes has appellatiōes habet. Liquidum
 autem cum cerato liquido purgat, & ulcera cica-
 trice obducit. Quidā ex cerato triplicato diluū ip-
 sum tradiderunt: nonnulli duplicato, utriq̃ sym-
 metriā indefinite distinguētes. In quibus etenim
 ulcus purum satis efficitur, si trib. cerati paribus
 temperatum fuerit, non oportet duplicatum adij-
 cere. In quibus autē minus purgatur, ibi ceratum
 duplo magis assumentum. Nouimus enim effica-
 cius omne id genus medicamentū esse, quod nō
 multo cerato miscetur: imbecillius, quod mul-
 to. Nihil mali est autem de dracunculo quoq̃ ea-
 tenus dicere: quod per æstatem caule exsiccat,
 & herba tota, radicem amputare oportet: deinde
 in domo sicca, solem nō habente repositam, pau-
 lo post dies sex uel septem in orbiculos diuidere,
 eosq̃ silo trañctos in sicca domo & à sole remota
 rursus suspendere, ac sic ubi medicamentū præ-
 parare uoles, radicem cōtundere: quę ipsa quoq̃
 seorsum per se tusa & leuigata probe, ut puluis si-
 at, malignis ulceribus medetur.

Emplastrum ex dictamno.

Item quod ex dictamno emplastrum cōficitur,
 Sacrum appellant: dicentes & hanc scripturā in
 Vulcani templo iuxta Memphim inuentam esse:
 omnes ipsius huiusmodi symmetrijs meminerūt,
 uel

uel parum adeo ab his differentibus. Sufficiet autem uerba Heræ & de ipso ascriptisse, quæ in hæc modum habent.

Sacrum ex Vulcani templo in Memphi.

Facit ad recentia cruenta, fluentia: ad neruorū præcisiones, uetera ulcera, suppurantia, contusa, putredines, carbunculos, nigricias, ulcera fluctantia, cicatricem egre admittentia, parotidas, pernioles, abscessus, strumas, furunculosa, duritias: tela educit, aculeos, ossa ex capite: sanat ferarum ictus, scorpionum morsus, phalangiorū, muris aranæ, hominum. ualet ad omnem colli dolorem: humeri, articulorum, uice malagmaticis. Siftit oculorum fluores, non modo recentes, sed etiã ueteres. tollit capitis dolorem inunctum rosaceo dilutū: & uteri dolore sedat, tum illitu, tum suffitu. necat insuper feras reptiles suffitu. Hæc recipit. Olei ueteris heminas duas, argenti spumæ denarium pondo centum. æruginis rasæ denarium pondo viij. squamæ denariū pondo sex. colophonix liquidæ, aliij pineæ denariū pondo quinquaginta. manæ denariū pondo duodecim. guttæ ammoniaci denarium pondo sedecim. æris combusti denariū pondo viij. diphrygis denarium pondo sex. gentianæ denarium pondo sex. aloes denariū pondo viij. chalbani denariū pondo duodecim. propolis denarium pondo viij. ceræ denarium pondo uiginti quinq;. aristolochiæ denariū pondo decem. dictamni cretici denarium pondo decem. argenti spumæ & oleum in olla magna supra prunam incoquito, ut omnino aut ferè non inquinat, deinde cacabum deponens, æruginem in dito squamamq;. & coquito ne prorsus inficiat. postea rursus auferens, resinam, ammoniaci guttam in iuce cribrata, mouens donec feruere desinat: mox cum repositis paululumq;. dimiseris, tollito, atq;. æs, diphryges inspergito, rursus coquens quoad non inquinat. Interdum enim his iniectis remittitur. postea deponens, ceram addito, iterum coquito, usquedum non polluat: quod celeriter accidit: dein cum deposueris, propolim immittes ac repones denuo paulisper lines, ac de posito, adde aloë, mannã, dictamnū, aristolochiã, gentianã. His abũde refrigeratis, singula leuissima insperges, moues: si nõ inficiat, tolles: si minus, leni igne coques. Hæc quidẽ Heras de emplastro scripsit. Cõposuimus autẽ id nos interdū & sine coibusto ære & diphryge: unde quæ in alto latebat, magis attrahebat, emolliobatq; magis discutiebatq;. nõ tamẽ ulcerib; ægre cicatricẽ ducentibus idoneũ. quinetiã ipsum citra dictanũ cõfecimus, rursus alijs apponentes chrysocollæ denariū pondo sex. ut maligna ulcera felicius sanaret.

Hicesium nigrum. 5

Medicamen titulo Hicesium, usus multiplicis, quidam gignendi casu scripserunt, Hic est. Heras itaq; de ipso hæc tradit.

Hicesium ad uulnera & canū morsus, duritias diffundens, ad parotidas, condylomatã, & maligna. Item est attrahens, & glutinatoriũ: ualeat insuper ad aquã inter cutẽ.

Argenti spumæ denarium pondo centum, bituminis Iudaici denarium pondo centum, terræ

Galen.

A ampelitis denarium pondo centum. manæ, propolis, singulorum pondo denarium uiginti quinq;. chalbani denarium pondo duodecim. scissilis denarium pondo duodecim, & semis. terebinthinæ denarium pondo duodecim semis. iris denarium pondo sex. olei immaturi heminas sex. mellis heminam unam. chalcitidis denarium pondo septẽ semis. gallæ omphacitidis denarium pondo sex. myrrhæ denarium pondo sex. Argenti spuma, bitumẽ, ampelitis cum oleo incoquuntur: ubi semicocta fuerint, propolis, resina, et chalbani, ex melle separatim cocta miscentur, postq; constiterint, reliqua adjiciuntur: mouetur autẽ spatha ex tædã ligno confecta. Huius emplastri misturæ pondus non idem omnes, ut in sequentibus ostenditur, tradiderunt.

Nigrum ex duabus aristolochijs. 6

Celebre quoq; emplastrum, usus multiplicis est, id quod ex duabus aristolochijs conficitur, quod ipse Heras quoq; his uerbis descripsit.

Nigrum ex duplici aristolochia: facit ad articulos solutos, fluori obnoxia repurgat, implet inmissum.

Picis pondo libram. ceræ pondo libram. bituminis pondo libram. terebinthinæ pondo libram. manæ pondo selibram. uel uncias septẽ. æruginis rasæ pondo selibrã. cerussæ pondo selibrã. chalcathi pondo uncias quatuor. aristolochiæ longæ pondo uncias quatuor. allyricæ pondo uncias quatuor. malicoriij pondo uncias duas. gallæ immaturæ pondo uncias duas. æris combusti pondo uncias duas. spinæ pondo uncias quatuor. aristolochiæ rotundæ pondo uncias quatuor. acetẽ heminam. riciniñi uel olei ueteris heminam. Quæ liquefieri poterunt, si mul liquato: deinde cerussam, æruginem, & chalcathum cum aceto leuia facta inspergito: mox super ignẽ usq; dum coiuerint, arida infriatõ igne subtrãcto, dehinc desula subigito. Hæc tũ Heras, tum aliij de ipso scriptum reliquerunt: ratio autem eius qui id composuit, nõ obscura est, recordantibus quæ hic & in priorib; cõmentarijs dicta sunt. Constat enim ex cõtrarijs facultatibus, attractricibus, & repultricibus, quæ commune habent, ut excicent. Superat autem in eo repellentiũ uirtus, quæ ad est adstringentibus, chalcatho, malicorio, gallæ, æri combusto, & spinæ. ob hoc etiam ad solutos, id est laxatos articulos cõuenire ipsũ affirmat: aristolochiam autem & in idem astrictorijs admiscuit, utpote rarefaciendi & digerendi potestate prædita. Vt autẽ emplastrum fieret, nec siccum, sed ut superinducit posset medicamentum, oleum et cera mista sunt, cera quidẽ eũ materies solum, sicut & oleum, si commune fuerit hoc, nec riciniñum uel uetustũ: quippe didicimus hæc calefacere & digerere. Terebinthina uerò resina præterq; quodẽ emplastri compagem medicamento conciliet; cum cera hoc sola nõ possit, etiã emolliens quid, & digerens, detergensq; obtinet. At eũ thus eadem præstat, mannã adstringendi uim totã & qualitatem assumpsit. Vocant enim sic thuris micæ concussu elisas, corticis parum item participes. lam & bitumen abunde liceat, ad emplastri cõfe-

tom. 5

R 2

ctio

ctionem idoneum medicamen. Atq; hæc de illius compositione sufficiunt. Porro emplastri huius auctor, cum uellet medicamenta ualenti uirtute prædita miscere, æruginē & acetum ipsis adiecit, quæ ficcare, exedere, & usq; in profundū corporis penetrare, atq; alia deducere possunt: miscerent autem hæc cum digerentibus, ut humores crassos particulis quas curamus, infixos attenuēt. Restat igitur & de cerussa quippiam dicere, quam ceu ad emplastrum conficiendum aptam, nō ut aliquid cooperaturam admiscuisse illum, est perspicuum. Ego uerō argēti spumam potius adiecissem, quæ & emplastris conuenit, & refrigerat. Cerussa uerō alijs quibusdam utilis, ad propositi emplastri uires nihil præsidij affert.

Emplastrum Azanite. 7

Emplastrum Azanitæ uarij usus, & nobile, de quo Heras ita scribit.

Emplastrum Azanite.

Picis aridæ pondo unciam. ceræ pōdo uncias tres. adipis suilli pōdo uncias tres. seui taurini pōdo uncias tres. œsypii pōdo uncias tres. resinæ pinæ pōdo uncias quinque. Facit ad maligna omnia, gāgrenas, fistulas, recentia uulnera, ambusta igne, perfrictis prodest, ut acopon, item pessulus est emolliens: conuenit ad uteri ulcera, phymata, & parotidas. Cum ulcera caua fuerint, copiosiore utitor medicamento, ubi ad cicatricem inclinare uident, parciore. Porro medicaminis proprietas est cōcretum humorem sordidum per summa gignere. benefacit lippientibus, palpebris suprapositum: oleum medicaminis affectui opponit, quare obseruato ne infundas. Cum autem præparas, picem, ceram, seuum taurinum inijcito: ubi fuerint liquata, adipem suillum: mox resinam: postremò œsypum, ubi refrigeraueris. Totum aut igne non flamma liquefacito, maxime ualet in quibus nerui, uel musculi percussi sunt, item ad maligna.

Emplastrum Halicis, seu Piscatoris, ex sinopide. 8

Halicis celebre, & multiplicis usus emplastrum nihil minus quàm priora Heras ita tradit.

Halicis ad uetera, & quæ cicatricem egre ducunt: item digerit, præsertim in manillis duritiis, utinam eo tanquam optimo ad plurima.

Ceræ pondo minam. argenti spumæ pōdo minam. mannae pondo denarium viij. terebinthinæ denarium pōdo viij. chalbani denarium pondo viij. sinopidis denarium pondo viij. olei ueteris heminas duas. Oleum et argenti spuma dum non inquinant, incoquantur, deinde cera resinaq; liquefactis ipsis, sublatiscq; ab igne sinopidē immittito, & chalbano, postea manam. Idem facit ad marinorū ictus summe. usus quandoq; eo sum in quodā à pastinaca percusso, summoq; dolore uexato, & mirifice profecit. Similiter & in ijs qui à scorpione morsi erāt. Hactenus Heras. Deinceps uerō Critonis emplastra inspiciamus.

Quæ scripsit Crito. Cap. II

Heras librum unum De medicamentorū compositione fecit, cui titulus Narthex, id est ferula. Quinque uerō tales Critonis præter illos de exor

natione seruatur. In quarto horum quinque emplastra prædictis similia specie cōmemorat: quædam ut Heras in totum similitudo confecta: nonnulla insuper quorum Heras non commemorat, quæ ego mox ordine apponam: non etiam si alicius aliter quàm ab Hera descripti mentionem facit, omitterens, quem admodum in Hicelii emplastro factitalle apparet. Alia namq; pōdera & mensuras huius emplastri Crito scripsit, sicut alij quidam, non ut Heras posuit. Incipiam igitur à primo Hicelii, in cuius simplicium medicamento uideri inter omnes non conuenit.

Emplastrum Hicelii. 1

De Hicelii medicamento hæc ad uerbum Crito. Hicelii ad omne uulnus recens, uetus, cōtusa, luxata, fracturas, phlegmonas, & omnē dolorem quem protinus sedat. facit ad abscessus, phymata, strumas, carbunculos, parotidas, phygetta, cōdylomata, impetiginēs, clauos, nigritias, hæmorrhoidas phlegmone tētatas, fistulas, ambusta igne dilutū myrteo olei rosaceo, ualet ad ulcera, aculeos, tela, canū hominumq; morsus, ferarū ictus. Itē ad sanguinem cohibendum utitor, & loco maligmitatis ad omnia. Oleum uerō nō adhibēdum est: iam lippicētibus in linteolo collyriū adhibetur: si autem splenia semper maiora: iuuat quoq; hydropicos.

Terræ ampelididis, bituminis, argēti spumæ, singulorum pondo minas duas. ceræ, thuris, terebinthinæ, popolis, singulorum pōdo minas sex. chalbani, aluminis fisisilis, singulorum pōdo minam quartam partē. myrrhæ, gallæ, iridis, singulorum denariū pōdo xij. chalcitidis denarium pondo sex. mellis heminas duas. olei omphacini congios duos. quidam heminas duas. Ampelitis, bitumē, argēti spuma, cum oleo coquuntur, humore prius expresso, ut fiant leuia. Incoquantur autem igne non acri, spatha ex tædarum ligno asidue mouētur, ne subsidant, nam citissimè comburuntur. Quæ liquari possunt, in alio uase liquefacito, melle liquari seorsum cocto, ut coeāt, ac in caca bo pulchre cōsertis misceto: rursus enim resoluuntur. his præmissis: dein de arida inspurguntur, aliquatenus refrigerata: postremò thus, ac ubi in unitatem coierint, utitor. Hanc scripturā ab Herodoto accipi. Hæc sanē Crito de Hicelio scriptare liquit. Videtur autem in simplicium medicamentorum unde totum cōponitur, symmetria ab Hera dissentire, ac partim hæc discordia manifesta est, partim diiudicari uix potest. Eras enim Hæc faciēs omnium pharmacorū pōdus in denarios redigit. Crito aut ampelidem terram, bitumē, argēti spumam nō pro denariorum pōdere scripsit, sed duas singulorum minas inijciendas censuit. At ab his dissentit qui de pōderibus & mēsuris scripserūt, quantum uidelicet minæ pōdus ex fiat: nonnulli enim sedecim unciam esse dicunt, Alexandrianam ponētēs uiginti uncias pēdere, aliam sedecim; atq; hoc quidē adhuc leuius est: uerum ex his qui minā in denarios redigit, alij centum, alij pluriū denariorum esse cōfirmāt, quia &

unciam pleriq; septem denarios & semissem uale
re maluit: alij septem duntaxat, reliqui octo. Hæc
cum ita se habent, quot denariorū minam à Cri-
tone positam æstimare oporteat, inuenire opero-
sum est. Apparet autem in alijs quoq; centum de-
nariorum minam esse uelle, ac si ita res habet, du-
plicatā Hicelii compositionem ab eo scribi puta-
bimus, cum Heras trium horum medicaminū
priorum terra ampelididis, bituminis, & argenti
spumæ, singulorū denarios centum posuerit: Cri-
tone pondus in ductos redigēte. Videamus igitur
an sequentia duplicato consentiant: quædam
namq; apparent, quædam non item. meminit er-
go post tria prima, ceræ, thuris, terebinthina, pro-
polis, singulorum minæ dimidium, hoc est dena-
rios quinquaginta immittendū præcipiens. Ete-
nim proposumum tanquā minā centum denarijs
ualeat, symmetriam esse scriptam. Quod si est, in
thure, pro manna uidelicet posito, Crito cum He-
ra conueniet. Pari modo in propoli, non tam è te-
rebinthina. Quippe uiginti quinq; denarios Cri-
tone scripsisse oportebat, cum Heras duodecim
& semissem statuerit. Porro in cera maxime uiri
cōtrouersant, discordatq; quippe cum Heras ce-
ram omnino non iniiciat. Didicimus enim illius
uim esse, mediocriter emollire. Cæterū apud Cri-
tonem deinceps scripta est, chalbani, scissilis, sin-
gulorum quarta minæ portio. Atq; in hoc uir He-
ra suffragatur. Nam quarta pars minæ, quæ cen-
tum pendet denarios, uiginti quinq; denarios effi-
ciet, qui dupli sunt duodecim s. ab Hera scripto-
rum. Iam uerò à minæ uocabulo digressus, in se-
quentib; Crito myrrha, gallæ, iridis, singulorum
denarios duodecim cum prædictis miscendos iu-
bet, in hoc Hera consentiens. Siquidem ille sex
cuiusque adijciendos præcepit. Inde rursus Crito
chalcitidis denarios sex tradidit, hic non multum
ab Hera discordans. Nam cum omnia duplicata
sint, conueniebat & chalcitidem non sex, uerum
quindecim denarios habere, ubi Heras septem et
semissem scripsit. In melle quidem uiri concordos
sunt, cum Heras heminam unam, Crito duas po-
suerit. Restat autem de oleo quæstio magna, non
solum inter duos illos, sed alios quoq; , qui medi-
camentū hoc scripserunt, sicut pro precedente sermo-
ne dicemus. Hi igitur inter se hæc uenas differunt:
etenim Heras olei immaturi heminas sex scripsit:
melius enim sic, q̄ ut alij quidam dixerunt, cy-
athos sex. Quippe in coctione argenti spuma, bitu-
men, terra ampelidis, ubi semicocta fuerint, tum
alia singula Heras immittēda existimat. Atqui se-
micocta fieri nō possunt, cyathis sex immisisis. Sci-
mus enim plerosq; ex his qui pharmaca compo-
nunt, subinde centū argenti spumę denarijs, duas
heminas indere. Atq; hoc iam etiam totum antea
in primo huius operis uolumine comprehensum
est, nempe metallicorum quoq; uncias nouē, he-
minam esse licere, sicut quidam putarūt. Quin &
duodecim iniicere possumus, ut alij præcipiunt,
prohæ docti, si medicamen diutius coctum fuerit
(licebit autem hoc ipsum copiosiore oleo imposi-

Galen.

to) maiorem succidendi uim acquirere. Quod si ab
igne statim sublatū fuerit, minus propter olei pau-
citatē exiccaturum: emolliturum autem magis
& mitigaturum. Quare sex cyathi omnino repu-
diandi sunt: sex autem heminæ, quæ singulæ un-
cias nouem faciunt, iniiciendæ. At si largius medi-
camentū uoles incoquere, quo siccet euidentijs,
nichil obstat etiam duodecim unciarum heminas
infundere. Itaque Hera sex heminas scribente, li-
quet Critonem duodecim heminas immittēte o-
portuisse, ut simul in hoc, sicut in alijs duplicata
mēsurā existat. Verum scripti sunt ab eo, olei om-
phacini congiij duo. iterum hic quoq; damnandi
sunt, qui heminas duas posuerunt. Ergo si congiū
sex heminarum esse statuemus, uirorum consen-
sus manebit: si uerò nō heminas sex, uerum sexta-
rios sex ponamus, nō parua dissensio orietur: mul-
ta nanq; erit copia, ut ad portionem aliorū, si olei
sextarios duodecim infundas. Hæc quidē in præ-
sentia de Hera & Critonis in proposito pharmaco
discordia. Cum uerò ad Andromachum uene-
rimus, dicitur itidem non nihil de illius cū utroq;
partim consensu, partim controuersia.

Isis uiridis. 2

Isidem hic quoque scripsit, quemadmodū alij
prope omnes: quia diligētius tum usum ipsius
uniuersum, tum præparationem tradidit, ac simul
nō nihil ab Hera discelsit, uisum mihi est etiam ab
hoc scripta ad uerbum subiungere.

Isis, quam nonnulli Epigoni uocant.

Per se ad squamarum abscessus facit: item cras-
sa osium fragmenta innatantia iuuat, linamento
uel splenij modo imposita: ualet ad aculeos, omni-
umq; ferarum ictus, & morsus. sanat omnes pun-
ctus, & uulnera ferro facta in bello, & aliter: curat
etiam fistulas imposita, & ut collyrium indita, dis-
cutit callos, & cōglutinat: alteri temperata ad om-
ne uulnus linamento, & splenij instar adhibita ua-
let: prodest ad maligna & diutina, ac ab alijs cor-
rupta, in quib; de uralis prius, medicamentū diluto
utor: mirifice facit & ad sinus cōglutinādos, dum
magni fuerint. Nam exiccandis illis coniungen-
disq; cōuenit, linamēto quoq; imposita, tum per
se, tum alteri mista, in quibus adenes aliquos, uel
institas mēbranas eliquare uolumus: utor etiam ad
fracturas cum uulnere & sine hoc. Callū enim du-
cit celerimē, & partes affectas astringit. Insuper
in quibus aliud malagma non proficit, ipsum exa-
cte prodest, & unguēs ex offendiculo uacillātes,
uel cōfirmat, uel extrudit, & dētes ex ictu motos
stabilis. Summatim infinita sunt, quibus differēter
adhibiti, cōducit. Est autem & diluta hæc, in-
temperati pars una sumitur, cerati partes due nō-
nunquam, atq; adhuc magis diluitur, sed usus &
exercitatio in hoc requiritur. Fit nanq; ceratū in-
terim & per resinā pityinam. Compositio autem
talis est. Gutte ammoniaci, æruginis rase, salis
ammoniaci, squamę eris, eris usti, singulorum de-
narios viij. aluminis rotūdi denarios sex, aristolo-
chia, thuris, singulorum pondo denarium octo,
myrrha, aloes, chalbani, singulorū denariū pon-

tom. 5

R. 3. dō

do duodecim. ceræ pondo denarium octo. resinæ coloploniæ pōdo denarium sex. nōnulli terebinthinæ tantundem. olei veteris heminas duas. acciti heminas duas. Epigonus uerò & dracunculi radicis fucci denariū pōdo duodecim, & marrubij fucci tantundem, & fereos fucci denarium pōdo viij. Omnia diligenter confusa ac cribrata mortario iniiciuntur, ac paulatim acetum in sole affunditur, donec terendo totum acetum consumatur: ubi leue factum fuerit, liquefacta & refrigerata ra factq; diligenter, ijs quæ in mortario sunt, admiscetur, ac subacta excipiuntur. Hæc scripsit Crito. Ego uerò sine liquore fereos ipsum præparauī, & nonnunquam de alumine ademi, usufq; sum præscripta ratione in neruorum uulneribus medicamento. nam ualentius efficitur, aceto acerrimo un dique circumfusum. reponitur, & diebus circiter quindecim emollitur.

Medicamentum Machæronis. 3

Celebre simul & multi usus est. Conuenit affectibus ulcerum, de quibus totus hic liber scribit. Sic autem Crito ipsum protulit ad uerbum.

Machæronis.

Ad omnia recētia uulnera, cōglutināt & phlegmonem arceat, præsertim ubi contusio fuerit. Rabiosi canis morsum summe curat, ampliori loco impositū ac muratū frequentissime: pilulæ quoq; modo sumptum fabæ magnitudinis dieb. triginta, ad omnem passionem facit, maxime phagedænicam. Item ad aurium naturaliumq; ulcera: in ossibus denudatis carnem producit, narium ulcera sanat. Est etiā uiride: diluitur rosaceo uel omphacino. Hæc recipit. Aristolochiæ rotundæ pōdo unciam. chalbani pōdo unciam. opoponacis pondo unciam. æruginis pōdo uncia. iridis illyricæ pōdo unciam. guttæ ammoniaci pōdo unciam. myrrhæ pōdo unciam. terebinthinæ pōdo uncias septem & semis, ceræ uncias septē & semis. olei omphacini pōdo uncias septem & semis. Dimidium olei cum æruginē ad leuorem teritur, reliquum cum cera & terebinthina coquitur.

Dysfrachitis Damocratis ad uerbum.

Ethoc ex celebrium lateq; usu patentium phar macorum numero existit: scribit de eo Crito in hunc modum.

Dysfrachitis. 4

Mirum in modum facit ad sinus callo undique circūdatos, & fistulas, impositum: si orificum sit, quod linteolum medicamento illitum queat excipere, inditō, ac citius proficiet. Vitor hæc compositione in humidis, fluentibus, ac diutinis affectibus, tertio quoq; die ut plurimū ipsum mutans. Podagrīcos quoque iuuat mirifice in accessione principio illitum ac in latum circumpositum, qui & ad consuetas ambulationes, & uitæ usus dimittant, citra balneū ad tridū, diesq; aliquot in eius usu permaneant. nō enim materiae dat accessum, ut affectus inuiscrescat. Conuenitq; omni ulcero ad fere partes cerato admisum: in uetera fœces, melius euadit. Aluminis rotundi denariū pōdo viij. squamæ denarium pōdo duodecim. æris combusti de

narium pōdo quatuor. aristolochiæ denariū pōdo nouem. chalbani denarium pōdo decem. guttæ ammoniaci denarium pōdo duodecim, aliq; decem. thus denarium pōdo nouem. myrrhæ denarium pōdo nouem. styracis denarium pōdo quindecim. misyos denarium pōdo trium. chalcitidis denarium pōdo trium. scyllæ medullæ denarium pōdo viij. picis liquidæ denarium pōdo quatuor. iridis illyricæ denarium pōdo nouem, secundū alios quatuor. terebinthinæ denariū pōdo decem, aliq; septem. pitynē denarium pōdo decem, aliq; sex. ceræ denariū pōdo septuaginta quinque. olei pōdo libram & semissem. quidam etiam medullæ cerui denarium pōdo octo adijciunt. Squamam, æs, misy, chalcitidem, scyllam, ex aceto prius quam acerrimo in sole terito, ut leuia fiāt: maxime leuigatis arifollo chiam, & iridem adijcitur. Hæc prius confusa, tenuiq; cribro excreta, rursus aceto circumfusa terantur. Atq; hoc tandiu facito, q̄ diu aspredinem sentias, non parcens aceto sumptitando. Postquam leuia fuerint, alumen addito, facitōq; hæc donec & illud in puluerem redigatur: deinde myrrham, mox thus, ab hoc ammoniacum, postea styracē, postremo picem indito. Hæc in calido sole torrentur, quo styrax elaboretur. Vbi iam leuitatē & frigumentorū crassitudinē nacta fuerint omnia, cerā, resinas & oleū liquefacta, & paululum decocti, chalbano superfundito, idq; cōmitū in pila terito, ac quæ liquefiūt modo dice refrigerata indito, tunc chalanū demittens dissoluensq; in uas fictile percolato, ac ubi deaferis cum ijs quæ in pila sunt, permisceto.

Emplastrum ex salicibus. 5

Quod ex salicibus constat, præclarum, & in multis usus idoneum similiter prædictis, Crito hifce uerbis recensuit.

Emplastrum ex salicibus.

Prodest cruentis ulceribus impositum, articulis solutis, fistulis inditum, staccidis carnis humididq; præsertim quæ in extremis partib. extāt. Valet itē ad erysipelata, aliosq; plurimos affectus sine uisuris. Misyos, chalcitidis, æruginis, ceruffe, gallæ, aluminis scissi & rotundi, cretæ sutoriæ, seu melanteriæ, singulorū pōdo uncias sex. ceræ, resinæ pityniæ, picis, bituminis, salicis foliorū, singulorū pōdo uncias ij. olei heminas quatuor, uncias quatuor. chalcanti pōdo uncias sex. malicorij pōdo uncias sex. acetis sextariis sex. salices ex aceto incoquant, donec relictū fuerint sextarij duos: deinde ærugini, ceruffæ & cretæ sutoriæ prius tritis, folia immittito, simulq; ad leuorē terito, deinde sicca leuigata, rursusq; exprimito, postea liquefacta superfundito. Hoc Asclepiades sine chalcatho & malicorio præparat, sicut in secundo huius operis cōmentario docuimus. Aliud post hoc ex salicibus Crito in istam sententiam edidit.

Ex salicibus lite, id est emplastrum simplex, ut

Herodotus.

Cretæ sutoriæ, melanteriæ, gallæ omphacitidis, aluminis scissi, rotundi, singulorum pōdo uncias sex. ceræ, bituminis, picis aridæ, salicis folio-

rum, pityinæ, singulorum pondo libras duas, olei pondo libram. aceti sextarij dimidium.

Quæ tradidit Asclepiades eiusdem generis emplastra. Cap. III

His annumerantur ex supra scriptis, tum quod ad Piscatorē refertur ab omnibus cognitum, tum quod ex dictamno constat, sed quia Asclepiades manifeste de ipsis scripsit, ob id etiam nunc eorundem mentionem faciam. Porro commodum ex eo quod bis uel ter scribit, aliud insuper accedit: puta ut cognoscamus in quibus simplicibus miscendis, ac piscorum pollicitis, scriptores illorum inter se conueniant, in quibus item discordent.

Fisium piscatoris. 1

Ad cruenta uulnera & nervos præcisos ualet, item ulceribus uetustis cicatricē egrè ducentibus & fluentibus. concludit, quin & emollit optimè, præsertim in mæmbris ortas duricias. medetur canum hominumq; moribus. insigniter ualet & ad pastinacæ & draconis, aliorumq; seuorū piscium ictus. In summa, uirtutem habet mirificam. Argenti spumæ, ceræ, cuiusq; denarium pondo centum. terebinthinæ, manne, thuris, chalbani, minij sinopici, cuiusq; denarium pondo octo, olei sextarium. præparato sicut prædiximus.

Fisium piscatoris quomodo confecerit Galenus.

Argenti spumæ, ceræ, cuiusq; denarium pondo centum. terebinthinæ, myrrhæ, sinopici, æruginis rase, squamæ, singulorum denarium pondo octo. aristolochiæ denariū pondo octo. thuris denarium pondo uiginti quinque. diphrygis denarium pondo sex. chalbani denariū pondo duodecim. guttæ ammoniaci denariū pondo duodecim. olei heminas duas. conficito quemadmodum superiora.

Emplastrum uenatorum, pharmacum accomodatium. 2

Facit ad quadrupedum ictus morsusq;, & ad reliqua uenenum iaculantia. Argenti spumæ pondo minam. olei ueteris, squamæ aris rubri, ceræ, resinæ siccæ, singulorum pondo, guttæ ammoniaci pondo trientem. chalbani, minij sinopici, singulorum pondo uncias duas. Argenti spumam, squamam, & oleum ad spissitudinem usq; incoquito, deinde ceram ac resinā iniicit. Cum liquata fuerint, ab igne tollito, & ammoniacum dilatarū immittito: ubi refrigerint, chalbani & ammoniacum indito, sinopicum inspergens, ac in mortarium defusus mollicisq; utitor.

Emplastrum Chalcidensis. 3

Conglutinat, inflammationē arcet, diuisiones cum cōtusione iuuat, sinus coniungit, resiccat, & abscessus prohibet, ossa corrupta educit, maxime autē & in partibus extremis ualet. In uniuersum mirabilis cōpositio est. Argenti spumæ, squamæ aris, resinæ, pityinæ, ceræ, singulorum denariū pondo centum. guttæ ammoniaci, chalbani, cuiusq; denarium pondo sedecim. diphrygis denariū pondo duo decim. aristolochiæ leuissimæ denariū pondo quadraginta. olei ueteris sextarios tres. Argenti spumæ, squamæq; ex oleo coquantur, ac ubi colorem mutauerint, diphryges immittitur, deinde cera, resina, pityina, uel pinea. Liquatium ut nō in-

quinet, ab igne tollitur, ac ammoniacum elotum iniicitur. Postquā liqueferis, aristolochia pharmaco iam refrigerato inspergatur, & cōtinuè moueatur, deinde in mortarium immittito, ac subigito, excipiensq; utitor.

Ex dictamno Sacrum cōpositio miranda. 4

Benefacit neruis musculisq; præcisils & contusis, uetustis & sanatu difficilibus, ossa corrupta educit, aculeos & telorū cuspidēs quæ infixæ sunt, corpori eximit, nec minus digerit, iuuat capitis dolores & oculorum fluxiones. Est etiam magna pleuriticis & hepaticis idoneū: efficax est & ad cuiuslibet uirulentis ictus. Argenti spumæ denarium pondo centum. colophonix denarium pondo quinquaginta. ceræ denarium pondo uiginti quinque. guttæ ammoniaci, aristolochiæ, singulorum denarium pondo sedecim. manne, chalbani, uniuersuiusque denarium pondo duodecim. æruginis, dictamni, aris usti, aloes, propolis, singulorum denarium pondo octo. diphrygis, aris squamæ, gentianæ radices, singulorum denariū pondo sex. olei ueteris hyeme heminas duas, per æstatem unā ac s. præparatur quo dixi modo. Huius scriptura ab Hera in horū pondere uariat: nam Asclepiades dictamni denarios octo, Heras decem iniicere præcipit: & uero etiam aristolochiæ, & guttæ ammoniaci hic cuiusq; denarios sedecim, Heras sedecim quidem guttæ ammoniaci, aristolochiæ uero decem. Ceterum Heras oleum indistincte scripsit, solum heminas duas eius iubes infundere: Asclepiades autem hyeme tantum, æstate uero unam & dimidiam.

Diophanti chirurgi, quo usus est Phylacus. 5

Argenti spumæ denarium pondo cētum quinquaginta. cerussæ, picis, squamæ aris, ceræ, singulorum denarium pondo octodecim. æruginis, resinæ pityinæ siccæ, manne thuris, propolis, singulorum denarium pondo duodecim. chalbani, aristolochiæ, cyperi, singulorum denariū pondo sex. dictamni, trifolij, guttæ ammoniaci, singulorum denarium pondo trium. illyricæ, artemisiæ, polij, mar rubij, singulorum denarium pondo duum. olei ueteris heminas duas, ad dictum modum præparat.

De scriptis ab Andromacho eiusdem generis emplastris. Cap. IIII

Emplastra uarij usus, simul & cicatricē egrè ducentibus idonea, hoc in libro percēfere statui, ex quorum grege sunt & decem illa longè optima inter ea quæ scripsit Andromachus.

Viride Euangeli. 1

Resinæ terebinthinæ, secundum alios siccæ, denarium pondo quinquaginta, alij uero cētum. ceræ denarium pondo uiginti quinque. thuris, squamæ, chalbani, aloes, singulorum denarium pondo trium. falsi ammoniaci, opopanax, æruginis rase, aris usti, aristolochiæ, guttæ ammoniaci, aluminis scissilis, secundum alios rotundi, singulorum denarium pondo duum. ichthyocolle denarium pondo trium. aceti heminas quatuor. olei quartā hemine partem, secundum alios octauam. Vitor uermiculari arugine non imposita.

Strigmentosum emplastrum quo utor. 2

Ichthyocollæ pōdo uncias iij. sarcocollæ pōdo uncias tres. eretria pōdo felibrā. terræ Samiæ pōdo uncias quatuor. myrrhæ pōdo unci as quatuor. thuris pōdo uncias sex. squamæ aris pōdo uncias octo. falis ammoniaci pōdo uncias tres. æruginis rasæ pōdo uncias sex. aluminis scissilis pōdo uncias duas. aloes indicæ pōdo uncias quatuor. chalbanī pōdo uncias quatuor. ceræ pōdo libras duas. terebinthinæ pōdo libras duas. olei pōdo libras quatuor. aceti quod Ichthyocollæ irrigandæ sufficit. sicca leuigata liquidus insperguntur.

Aliud Viride. 3

Resinæ pityinæ denarium pōdo ducetorum. guttæ ammoniaci denarium pōdo quinquaginta. opopanacis denarium pōdo octo. ceræ denarium pōdo centum. propolis denarium pōdo octo. chalbanī denarium pōdo octo. squamæ aris denariū pōdo duodecim. æruginis denarium pōdo duodecim. aluminis rotundi denariū pōdo octo. misyos denarium pōdo septem. falis ammoniaci denarium pōdo octo. chalcitidis denarium pōdo quinq. sulfuris ignem nō experti denarium pōdo octo. thuris denarium pōdo duodecim. fellis taurini sicci denarium pōdo sex, uel humidī denarium pōdo duodecim. cyprini heminas sex, aliq. quatuor. aceti quod satis est.

Viride Epicuri multa promittens. 4

Ceræ denarium pōdo ducentorum. colophonæ denarium pōdo trecentorum. squamæ denarium pōdo sedecim. aris usti denarium pōdo sedecim. æruginis denarium pōdo sedecim. aristolochiæ tenuis denarium pōdo sedecim. aloes denarium pōdo uiginti quatuor. aluminis rotundi denarium pōdo duodecim. myrrhæ denarium pōdo uiginti quatuor. chalbanī denarium pōdo uiginti quatuor. falis ammoniaci denarium pōdo sedecim. aceti heminas quatuor. olei heminas ij. interim pauciores.

Viride multa promittēs Alcomionis uel Nicomachi, ad fistulas, nigritas, uel nomas, glutinat ossa, & educit.

Strumas discutit. 5

Chalbanī denariū pōdo sedecim. aris usti denarium pōdo octo. squamæ denarium pōdo uiginti quatuor. ceræ denarium pōdo quinquaginta. seu caprini, uel uitulini denarium pōdo quinquaginta. thuris, resinæ siccæ, guttæ ammoniaci, terebinthinæ, nitri, aristolochiæ, singulorū denariū pōdo uiginti quinq. bryoniæ denarium pōdo duodecim. orcheos herbe denariū pōdo duodecim. iridis aridæ denarium pōdo quatuor. aloes indicæ denarium pōdo duodecim. aluminis scissilis denarium pōdo octo. fellis taurini denarium pōdo octo. aceti heminam. olei heminam. Quam autem non inquirat, utere cum rosaceo.

Viride ad herpetas, item ad chironia & difficulter ad cicatricem. uentientia, ulcera, ut Andromachus. 6

Hordei combusti denarium pōdo decem. eruginis denarium pōdo octo. ceræ denarium pōdo octoginta. cyprini heminam. Hoc medicamē

æruginem multam continet, pro cera & cyprini symmetria, nam hordeum combustum si per se inspergitur, chironia ulcera iuuat, neq. intendit ceræ & cyprini uires, neq. æruginis resoluit: ablato ipso, simile pharmacū redditur, multis quæ superiore libro ad huiusmodi ulcerum curationē scripta sunt: non tamen multum cyprini affumentur, præsertim si cera pinguis existat, sed quantum ad ceram erugini admittam emolliendam capere necessarium est. Superiora omnia emplastra hoc nomine uano usui seruati, quod medicamenta emollientia, trahentia, digestoria, concoctoria, insuper citra rosionem siccantia assumperint: plurima in forum etiam ualide astringentia, quorū uirtus est humores affectē parti influentes repellere. Pōdo dīctorum medicaminum potestatis materias nominatim in operis De simplicibus medicamētis sexto, septimo, octauo, nono, decimo & undecimo libro expressas habetis. Multorū autem hoc commentario nominatim memini, ac iterum meminero. Quinetiam hoc pharmacū in presentia apposui, eorum quæ nuper dixi, mentionem facere desiderans, quia id quoq. superiore libro commemoratis genere simile est, ac propriū magis uti debatur, illis ipsū appendere.

Hicesium nigrum Andromachi. 7

Hoc emplastrum Andromachus non ubi uita dia tractat, sed superius prope initium, in symmetria multum euarias, ab eo quod prius Critonē & Heræ prodidisse indicaui, scribitur hoc pacto. Bituminis denarium pōdo trecentum. terræ amplitididis denariū pōdo ducentum. argenti spumæ denarium pōdo sexaginta. chalbanī denarium pōdo triginta sex. terebinthinæ denariū pōdo triginta sex. scissilis denariū pōdo triginta sex. propolis denarium pōdo septuagintaduū. manne denarium pōdo quinquaginta. myrrhæ denarium pōdo duodecim. iridis denariū pōdo duodecim. chalcitidis denarium pōdo sex. gallæ denarium pōdo decem. olei congium unum & dimidium. mellis heminæ dimidium. Rectefecit, qui de mina ambiguitate relicta, omnia per denarios conscripsit, ut de solo congio quætionem institueramus. In hoc enim melius egerunt, quiflex sextarios posuere, à triplicato aut bitumine proportio illius quod Heras immiscuit, scripturam exoriri sint. Etenim Heras cētum denarios, hic trecentos posuit: & si in quibusdam exemplaribus non fide dignis ducentos inuenerim. Terra sanè ampelitis duplo eam quam Heras scripsit, planè exuperat. Argentum autem spuma, quam & ipsam ampelitis pondere æqualē esse cōueniebat, multo minor ab eo iniecta est. Nam denarios sexaginta huius miscet. Chalbanī uero triginta sex denarios immittens, proportionem cum Hera & Critone nō seruat, quemadmodum in alumine scissili. paululum em̄ hic ab exacta proportione declinat, quæ triginta septē & semissem inijcere iubet: quod aliarum ipsius misturarum proportione, ad quinquaginta denarios excedit. iam uero in propoli nonnihil discordat, quantum ad duplicatam

proportionem spectat. Item in manna à Critone & Hera recedit, quippe centum denarios, ceu ad illorum proportionē insectos esse oportebat. In chalcitide etiam multum admodum à proportione subtrahitur: in alijs parua controuersia est, nisi in melle, cuius heminas tres tãquam ad illorum proportionem immisisse ipsam conueniebat, at is hemina dimidium adjicit. Ita quoq; in oleo tres congios miscuisse debebat, si non à Critone discrepare uoluisse: si uero cum Hera conuenire, octodecim heminas. uerum ipse congiũ & dimidium conscripsit.

Vt Tarentinus Heraclides Icesii nigrum emplastrum tradiderit.

Ad omne uulnus, maxime quæ in extremis partibus sunt, dolore uindicat & cõglutinat. Item caninum morsus, & furunculos sanat, duricias discutit, præsertim mamillas oblidetes, ani condylomas succurrat. Argenti spumæ denarium pōdo centum, bituminis tãtundem, terræ ampelididis idem pondus, manna denarium pondo uiginti quinq;. propolis totidem, chalbani denarium pōdo duodecim semissem, aluminis scissi, resina terebinthina pares mensuras, iridis denariũ pondo sex, chalcitidis denarium pōdo septem & semissem, gallæ denarium pōdo octo, myrrha tantundem, mellis hemina unam, olei immaturi heminas sex, argenti spuma, bitumen, & terra cum oleo coquuntur, & spatha ex tædarum ligno mouentur. Cum consistent, propolis, resina & chalbanum adduntur. Hæc autem prius melle in coquuntur. Quibus mixtis, olla statim ab igne tollitur, & sicca insperguntur. Hæc quum Heraclides tradiderit in libris ad Antiochidem, demiror quomodo nonnulli post eum scripturã ipsius non obseruauerint. Heras sane ubiq; Heraclidem imitatus esse uidetur, præterquam in myrrha & galla. Nam dum Heraclides utriusq; horum denarium pōdo octo miscet, Heras utriusq; sex iniecit. Insuper Asclepiades in secundo libro de Exterioribus, omnia proportione quadruplo maiore quàm Heras tradidit. Adde qd olei omphacini heminas duodecim, Crito cõgios duos conscripserit, etsi omnia duplicata compositio ipsius habeat. Quare nonnulli mihi uidentur adscripsisse heminas duas. Quod ipsum rursus tãgerit, tum Hera & Tarentini scripturæ magis aduersatur: quidem Heras cẽtum octoginta denarios posuit, in pondus nõ mensuram oleum reducens, tanquam hemina denarios sexaginta pendente; nam Attica nouem Italicas uncias conficit: pendunt enim nouem Italica uncia, quas in cornibus insectis metiuntur, septem uncias ponderales & semissem, quæ sexaginta denarij sunt, singulis uncis octo denarios recipientibus. quare etiam hic cum Heraclide Heram consentire uidetur, cum tres heminas iniiciat, Asclepiades duodecim: quoniam omnia in ipsius compositione quadrupla sunt. Heras autem quoniam pharmaci in Tarentini scriptura magna moles fieret, uidetur mihi quartam omnium portionẽ posuisse. Nam in myrrha, ut dixi, & galla paululum mutare uide

tur. Ac quum alijs quoque hoc Icesii emplastrum tradiderint, qui exactius, in eo cuius preparationem ex cõctione coniecimus, Tarentino concordati facti sunt: qui autem negligentius, uel in uno solum, uel in pluribus simplicibus dissonasse ab Heraclide uidetur. Proinde superfluum fuerit, de his mentionem facere: præparandum enim medicamentum est, ut Heraclides iussit, uel ut Heras, qui parum adeo inter se differunt.

Heraclides Liten icesion hanc esse dicit.

Bituminis denarium pondo quinquaginta, argenti spumæ denarium pōdo quinquaginta, olei heminas decem, coquito. Vbi coierint, ceræ denarium pondo quinq; inijcito, chalbani, myrrha, singulorum denarium pondo quinq;.

Cyzicenum Hera. 8

Hoc quoque inter celebra emplastra refertur, ab omnibus propè cõscriptum, magno in simplicium medicamentorum symmetria confectum. Nonnulli tamen discordant, uti innotescet, cum subiungemus, quomodo quisque componendum censet. Heras igitur de præsentem emplastro ita ad uerbum scribit.

Cyzicenum.

Facit ad recentia uulnera, & uetera depascetia, duritias præsertim in mammis discutit, extrahit, repurgat, implet, glutinat, cicatricem ducit, tollit cancerosas durities, fistulas, & in quibus scalpello uti non licet, ut in ceruicæ, collyrij loco uitior, abcessus furentes mitigat, phymata discutit, ganglia & contractiones siue coitus dissoluit abrupitq;: tela, ossa, lignorum fragmẽta educit, crustas citra dolorem deijcit: in depascetibus, magnis emplastris quæ splenia nominant, uti oportet. Insuper strumas dissiptat, sanguinis eruptiones cohibet, & uescicæ morbis summe prodest. Hæc autem recipit, Thuris, myrrha, croci, iridis Illlyrica, bebelij, singulorum denarios quatuor. squamæ denarium pondo duodecim, chalcantii, aluminis scissi, rotundi, guttæ ammoniaci, misyos, putaminum mali granati dulcis, singulorum denarium pōdo quatuor. aristolochia, gallæ omphacitidis, utriusque denariũ pondo octo, chalcitidis, singulorum denarium pondo quatuor. uisci quercini, opopanax, aruginis rasæ, acaciæ, floris rosarũ, singulorum denarium pōdo octo. terebinthina pōdo minam, alij denariũ pondo quinquaginta. liquoris papaueris denariũ pōdo sex, ceræ minas duas, secundum alios denarium pōdo quatuor. seui uitulini curati minam. alij denarium pōdo centum quinquaginta. aceti communis heminas uiginti. Vini quod sufficit in sicca immittitur. Hæc de Cyziceno cum Heras scripserit atq; Andromachus, uidebitur quibusdam maxima esse dissensio: cum Heras thuris, croci, myrrha, & eius quod deinceps ab eo positum est, denarium pōdo quatuor immiserit, Andromachus octo. Verũ quod iam prius obseruandum nobis esse dicebam, id etiam nunc dicturus sum, si omnia simplicia pharmaca licet duplicata horũ quæ alij scripserunt, miscere, eadem fiet symmetria, quemadmodum si & tripli

cata omnia iniicias: ac nunc Andromachus omnia ferè duplicata miscuit, cū Heras simpliciā ipsa indiderit. Ac etiā hie discrepant, quod ille aloen addat, Hera secus faciēte. Quinetiā in panacis radice differentia est: cum Heras opopanacem tantum scripserit: Andromachus non hoc solum, sed etiam panacem. solent autem sic uocare radicem herbae, quam panacem appellant. Adiecit autem Andromachus papaueris liquorem, doloris euitandi gratiā: acaciam uero & rosarum florem, tanquam astringentia. Porro coctionē pro more suo Heras adiunxit, Andromachus omittit: quippe qui ipsē etiam raro illam soleat apponere. Caterum ex eo quod acetī cōmunis heminas duas & uinum siccis infundit, planè innuit se arida ex uino uel aceto leuigari uelle: deinde liquefacta his superfundit. Heras autem neq; omnino acetī aut uini meminit, & ad calcem coctōis ita adscripsit. Caterum arida & opopanacem in cacabum conijcito, & ubi unīta fuerint, defundito, mollitoq; irino unguine manus inquinans. Ego ipsū Andromachi more conficio, opopanacem cum siccis in mortario terens. si ualentius & quod magis dīgerat medicamentū facere desiderem, acetum inter leuigandum admiscens: si magis astringens repellensq; uinum: quemadmodum rursus & id nunc austerum, nunc giliuū, nūc uetus, nunc aestate medium assumens. Nam quod austerum est nec uetus, magis astringit: quod uetus nec austerum, ualentius dīgerit.

Cyzicenum ut Asclepiades.

Scriptum est hoc emplastrū etiam in quarto, ubi omnia ordine, quae ad malignitatem pharmaca habere consuevit, commemorauimus. Et uero nunc quia ipse pariter ab Hera, & Andromacho euarat, factus mihi esse uidetur ipsius uerbis in tertio libro De exteriorū pharmacis tradita subiungere.

Cyzicenum.

Facit ad diutinos affectus, & neruos præcisos. Thuris quam optimi, cere, myrrhae, aristolochiae, chalcitidis, illyricae, chalbanī, singulorum denarium pondo quatuor. terebinthinae, argenti spumae, singulorum denarium pōdo octo. olei heminam. Omnia in uas æreum coniecta, supra leuem prunam coquuntur, mouenturq; donec in aqua frigida demersum, mellis spissitudinē habeat, postea mouendo tollitur: hoc illitum pelliculae imponitur: hyeme post septimum diem, aestate post quintum soluitur.

Aliud ex ijs quae ad Phlozenum referuntur.

Thuris, myrrhae, croci, illyricae, bdellij, squamae, aris, chalcitidis, chalcitidis; aluminis rotundi & scissilis, misyos peregrini, guttae ammoniaci, propolis, uisci quercini, opopanacis, malicorij preclusi, singulorum denarium pondo quatuor. aristolochiae denarium pondo octo, cere, seui taurini, singulorum denarium pōdo centum, quod minam inscribit, resinae terebinthinae denarium pōdo septuagintaquinque, quod tres minae quartas appellat. Resina in ollam fictile coniecta, donec odore

A amittat cōcoquitur. Deinde seuum & cera cōcisa iniiciuntur, & liquefunt, arida contunduntur, & cribro tenuissimō incernuntur. postea liquida ab igne tolluntur, quibus aliquatenus refrigeratis arida insperguntur, & curiosè mouentur. Habere autem oportet ex aceto trita, myrrhae, thus, bdellium, opopanacem, quibus quae in olla sunt, adijciuntur, terunturq; ne grumi cerea modo fiant. ubi autem recte habuerint, in lignea pyxide irino uigentō prius illita reponuntur.

Emplastrum ex duabus Aristolochijs, ut Andromachus. 10

De hoc in eam sententiam scribit Andromachus ad uerbum.

Emplastrum ex duabus Aristolochijs.

B Resinae frictae pondo libram. cereae pōdo librā, picis pondo libram. ciceos, uel olei ueteris heminam unam, & cyathos duos, cerussae pondo uncias sex. æruginis pondo uncias sex. chalcantii pōdo uncias quatuor. mannae pondo uncias sex. aristolochiae longae pondo uncias quatuor, rotundae pondo uncias quatuor. erethriae pondo uncias sex. Illyricae pondo uncias quatuor. gallae uncias duas. acetī heminam. ego amplius: malicorij pondo uncias duas. sicca ex aceto teruntur, deinde liquabilia.

Emplastrum ex dictamno Democriti. Cap. V

Diximus frequenter metricascriptiones non solum ad memoriam, sed etiā ad misturas exacte commensurandas prosa oratione conscriptis esse commodiōres. Cuius gratiā etiam nunc medicamentum ex dictamno perfectam in Democriti scriptis symmetriam perferuans apposui. Emplastrorū unum insigniū numero ascribitur, Solūmq; quod recipit dictamnum creticum Dracmum, medetur prospere serpentium Percussibus uenenatis, ac moribus Quadrupedum cum storū et si rabies quaedā agat. luit ulcerum callos, & neruos perditos, Et musculos, & alto chartilagines Corpore putrescentes, quae incumbunt ossibus. Colli, mammillarum, dorsi quoq; ulcera Perfanat, & diu si iam durauerint. Ac omnia simul quae facere paulo antea Dixi emplastrum nomine scilicet Aegyptium. Hoc admodum cum sit bonū, quidam omnibus Vnum bonis reputant usu præstantiam, Haudquaquam nempe experti multa pharmaca. Concinnatur misturis his, lithargyri Drachmas habet ducentas: istis additur Olei uetusti libræ quarta portio: Alij magis quartam uolunt partem heminae, Et quinquaginta cereae drachmas ponticae, Colophoniam proba q; plus cera duplo. Alij malunt terebinthinae parem modum, Aëruginis quoq; aloes necnon Indicae, Item combusti aris & diphrygis boni, Cutisq; sedecim, semissemq; ponito: Quaternas & uigenas drachmas chalbanī, Mannae pares, thurisq; bis duodecim, Ammoniaci uiginti bisq; & quinq; bis;

Et sexdecim iungantur propolis atticæ,
 Aristolochiæ longæ bis drachmæ decem.
 Aeris cyprij squamæ drachmæ duodecim.
 Et gentianæ radicis siccissimæ
 Aequale, cunctis herbæ his dictamni quoq;
 Siccæ, sed habentis florem, drachmas bis decem
 Lenis, lithargyrum at cum oleo demittit
 Olla recenti, cui patulum eo figulus dedit.
 Pruna leni coques, mouens rudicula
 Quo usq; spissitudo mellis attic
 Fiat, paribus at squamæ immisis partibus.
 Rurils magis coquas, ac postquam pharmacum
 Giliuum fuerit, æs misceas & diphyrges,
 Crallumq; reddens pharmacum ut non polluat
 Ceram, relinamq; unâ dictis addito.
 Quibus liquatis, ubi probe coiserit,
 Emplastrum, ab igne tolles, cumq; adieceris
 Propolimq; mannâq; aloen, atq; chalbanum
 Ammoniacumq;, tunc ubi refrixerit,
 Feruorq; ignitus pharmaci subsederit,
 Aristolochiam perquam leuissimam
 Et gentianam dictamnumq; inspergito,
 Spatha atq; medicamentum agitando sedulo
 Mansibus tibi magdals ipse effingens habe:
 Eaq; mala ad quæcumq; est prædictum uitior.

De pastillis Asclepiadis. Cap. VI

Quemadmodum emplastra à colore, non fa-
 cultatis professione nominât quidam medici, me-
 lina, candida, fusca, & gilua: ita pastillos, Græce
 Trochiscos, ab efformationis figura uocât, nō ad
 unum affectum, sed admodum multos conferen-
 tes. Nos quoq; igit ipsos imitari, deinceps omnes
 præclaros, siue pastillos, siue orbiculos (utroque
 enim nomine appellantur) describemus. Recte
 autem illi singulis quid possent efficere, præposue-
 runt: præsertim Asclepiades, cuius etiam primi
 pharmaca quæ in tertio De exterioribus libro
 prædidit, apponam.

Pastilli Asclepiadis. 1

Aristarchi Tharsei pastillus ad plura utilis. Fa-
 cit ad recētia uulnera, & uetera: prodest treditini-
 bus & fatiis, curat fistulas, aures suppurates, ossa
 corrupta, nomas, reprimit omnē carnis excrecē-
 tū: tollit pterygia, ualeat ad uteri affectus, sanat o-
 zanas, phagedenas, cōdylomata: iuuat in uetera-
 ta & quæ difficilē curationē habent: utilis est prin-
 cipio pthilicis, lienosis, cœliaciis, dysentericis, tri-
 bus obolis in potu familiariter datus: succurrit syn-
 chitici, gingiuarū nomis: in summa, exteriorib; &
 interioribus uitijis auxiliatur. Myrrhæ denariū pō-
 do sex, croci denarium pōdo triū, crocomagma-
 tis denarium pondo trium. cytinorum denarium
 pondo sex, chalcantii denarium pondo sex. alu-
 minis scissi denarium pondo sex. aloes denarium
 pondo sex. uino falerno excipiuntur, fiuntq; orbi-
 culi seu pastilli, & in umbra deficcantur: ubi usus
 necessitas est, humido conuenienter diluuntur ad
 commemoratos affectus.

Pastillus Neapolitani. 2

Myrrhæ, thuris, singulorum denarium pondo
 sex. gallæ, lycij, aluminis, crocomagmatis, aloes,

A singulorum pōdo denarium octo. cytinorum de-
 narium pondo duodecim. æris denarium pondo
 viij. uino falerno excipiuntur.

Andronius inscriptus. 3

Cytinorum denarium pondo decem. scissilis
 denarium pondo quatuor. chalcantii denarium
 pondo duo. myrrhæ denarium pondo quatuor.
 thuris, aristolochiæ, gallæ, singulorum denarium
 pondo octo. salis ammoniaci, denarium pondo
 quatuor. hæc passo excipiuntur.

Polyide spiragis. 4

Malicorij denarium pondo sex. myrrhæ dena-
 rium pondo octo. aluminis scissilis denarium pō-
 do quinq;. thuris denarium pondo quatuor. chal-
 canthi denarium pondo trium. fellis taurini dena-
 rium pondo sex. uino dulci excipiuntur.

Coracina spiragis. 5

Facit ad tonillarū phlegmonas, & uuas laxa-
 tas: gingiuas madentes reliecat, nomas curat, &
 sedis affectus, fistulis callum exerit. Aristolochie
 cretica rotundæ, cytinorum, chalcitidis tostæ, thu-
 ris, myrrhæ, chalcantii, crocomagmatis, aloes li-
 dicæ, fellis taurini, singulorum pondo denarium
 octo. passi quantum satis est.

Pastillus ad nomas. 6

Brathyos denariū pondo quinquaginta. myr-
 rhæ denariū pondo trium. foreos, misyos cyprij,
 chalcantii, thuris, singulorū denariū pondo duū,
 uino excipiunt. Aliæ scripturæ habent, oleo folio-
 rum denarium pōdo duum. myrti siccæ, orcheos
 herbæ, utriusq; denarium pondo quatuor. arseni-
 ci, quod auripigmentum uocant, denarij pondo
 unius. myrrhæ denarium pondo quatuor.

Ex scriptis Heraclidis. 7

Orcheos denarium pondo duum. arsenici de-
 narium pondo quatuor. gallæ denarium pōdo o-
 cto. squamæ denariū pondo sex. foreos denarium
 pōdo octo. myrrhæ denariū pondo duum. thuris
 denarium pondo duum. acaciæ succi denarium
 pondo duum. uino excipiuntur.

Pastillus ex stirpibus inscriptus. 8

Malicorij, myrti foliorum, nucis putaminum
 siccorū, spinæ fructus, singulorum denariū pon-
 do octo. gallæ denariū pondo quatuor. salis fossi-
 tij denarium pōdo octo. omnia comminuuntur:
 friabilia in aceto macerantur, ac in uas fictile con-
 iiciuntur: deinde torrentur, & cum aceto leuigan-
 tur. Vbi bene habuerint, myrrhæ denarios qua-
 tuor, thuris denarios duos in iugicito, & pastillos fin-
 gito, usus eius est cum aceto.

Pastillus qui à Terentio inscribitur Stipticus, hoc est astringens: Facit ad quamlibet nomen & aut affectus. 9

Sandarachæ, misyos, calcanthi, aluminis scissi-
 lis, singulorum pondo denarium duum. myrrhæ,
 squamæ æris, aloes, chalcitidis, singulorum pon-
 do denarium trium. cytinorum mali puniceæ, rosa-
 rum floris, gallæ singulorum pondo denariū qua-
 tuor. acaciæ succi pōdo denarium octo. mali gra-
 natij putaminum pondo denariū octo. excipiuntur
 myrtorum decocto ad dimidiās coctorum.

Pastillus ad serpentis, Arei ad Herpetas. 10

Terræ cimolijæ pondo denarium octo. misyos
 torridi

torridi denarium pondo sedecim. minij sinopici pondo denariu trium, singula cum aqua seorsum terito, deinde simul miscens in pastillos digerito, utus est ex aceto.

Alius ex origano. 11

Origani, olea foliorum, acaciae, chalcanti, salis hispani, singulorum denarium pondo duum. aceto excipiuntur.

Ex collectaneis Lari medicamentum commodatum. 12

Argenti spuma, uel cerussa pondo denarium triginta octo. aluminis fisci pondo denarium duo decim. acaciae pondo denariu octo. croci, thuris, diphrygis, opij, singulorum pondo denarium duum. ex aqua terito.

Aliud ualde generosum. 13

Aluminis rotidi, chalcitidis, cretae futoriae seu melanteriae uel foreos, singuloru denarium pondo duum. misyos, malicori, utriusq; denariu pondo quatuor. calcis uiuae denarium pondo sexdecim. aceti sextariu. Mali cortex in aceto decoquitur, ac cu dissolutus fuerit, teritur cum acacia, postea ceteris adijciuntur, & ubi bene habent, fiunt pastilli: cum opus est, diluuntur aqua.

Pastillus Therpti ad serpentina ulcera, & ubi passionem oportet sistere, facit etia ad oris uitia, ad aures suppuratas, item cutis uitia que ex antebinata uocant, tollit. Carnis excrecentiam reprimitt.

Narium ulcera, & sedis affectus sanat. 14

Corticis malorum puniceoru pondo denarium decem. gallae omphacitidis pondo denarium octo. aristolochiae tantundem. aloes pondo denarium quatuor. myrrhae pondo denarium octo. fisci pondo denarium duu. thuris pondo denarium quatuor. chalcanti pondo denarium quatuor. passo excipiuntur.

Pastilli Galii Hieracis Thebani, ex uescarijs: facit ad capitis ulcera, epinyctidas, & narium ulcera que Graeci psyracas nominant, uinat rhagadas, & quaecumq; citra dolorem ad cicatricem uoles ducere. Cap. VII

Cerussa pondo libram. spume argenti pondo libras decem. aluminis fisci, alica cabi, hoc est ueli cariae corticis, chalcanti, sinopidis, singulorum pondo selibrum. aceto excipiuntur.

Lucij Proceptoris pharmacium consecutum. 2

Aluminis, aeruginis corinthiae, minij sinopici, singulorum mensuram heminae aequalem, aceto diluuntur.

Ex libro Awei ad sedes depastas, serpentina, carnem exrescentem, pterygia, aures suppurantes, ulcera curatu difficilia, sanat rhagadas & condylomata. 3

Scissilis, minij, sinopici, aeruginis rase, gummi, gallae, cytinorum, singulorum pares portiones. aceto diluuntur.

Magni Philadelphi ad praedictas dispositiones. 4

Aluminis fisci, aeruginis corinthiae, chalcitidis, minij sinopici, singulorum pares cyathi mensurae partes, aceto subiguntur.

Pastillus ad erysipelata. 5

Croci pondo denarij unius, opij tantundem. cerussa pondo denarij duum. passo diluuntur. alia lectio habet, glaucij pondo denarium octo.

Andromachi croceus, medicamentum accommodatum. 6

Argenti spuma pondo denarium quatuor. hoc est unciae dimidium, cerussa uncias quatuor, sul-

A phuris ignem non experti pondo unciam. croci, opij, singulorum pondo unciam unam. succo solani excipiuntur. cum opus est, passo diluuntur.

Casj Neapolitani. 7

Cerussa, acaciae, glaucij, opij, cuiusq; parmenturam, passo subigito, & continue perungito.

8 Aliud, Cerussa, acaciae, singulorum pondo denarium viij. guttae ammoniaci pondo denarium quatuor. croci pondo denarium duum. opij pondo denarium duum. succi polygoni, uel seridis, uel solani, uel cynoglossi.

Ex libro Agathini. 9

Cerussa pondo denarium sex. mannae, thuris, singulorum denarij pondo unius. crocomagmatidis, sulphuris ignem non experti singulorum pondo denarium duum. ex ouis affatis uitelloru pondo denarium sex, passo excipito.

Ad Rhagadas & condylomata, curat etiam ani rhagadas & nemas, Menesthei pharmacium. 10

Aloes pondo uncias sex. croci pondo uncias tres. aluminis fisci pondo uncias tres. uino diluuntur, & fiunt pastilli.

Apollophanis, Ad rhagadas & condylomata. 11

Stimneos denarium pondo octo. acaciae denarium pondo sex. aeruginis denarij pondo unius. opij denarium pondo duum. thuris denarij pondo unius. s. myrrhae denarium pondo duum. gummi denarium pondo quatuor. uino maris ex parte pastillos fingito.

Vel ut Nicolaus.

Stimneos pondo denarium octo. acaciae tantundem. aeruginis pondo denarij unius. opij pondo denarium trium. myrrhae pondo denarij quatuor. gummi tantundem. uino excipito.

Magni ad rhagadas, & condylomata: fisci nomas. 12

Aloes pondo denarium viij. acaciae pondo denarium quatuor. gallae pondo denarium iij. croci pondo denarium duum. thuris pondo denarij unius. myrrhae pondo denarij unius. uino subiguntur.

Pastillus ex succis, inscripius ad nomas & scabiosos affectus. 13

Lycij indicij, Aloes Indicie, myrrhae, aris, aluminis fisci, chalcanti, cytinoru, thuris, singulorum pondo denarium quatuor. succi myrtoru hemine dimidium. composito, & in pastillos digerito.

Petronij pastillus qui Viribus appellatur, medicamentum ad rhagadas, & condylomata: in magnis doloribus accommodatum, & cito liberat. 14

Stimneos, acaciae, plumbi combusti & eloti, singulorum pondo denarium sexdecim, cineris cyprij, ericae fructus, aluminis fisci, thuris, chalcanti, myrrhae, opij, singulorum pondo denarium octo. uino excipiuntur, & fiunt pastilli. cum utendum erit passo diluuntur.

Pastilli ad Andromacho conscripti in libro De exterioribus. Cap. VIII

Pastillus Dorij, qui per anam immittitur. 1

Stimneos, pondo denarium sexdecim. acaciae tantundem, alij viij. aeruginis pondo denarij quatuor. draganti. succi papaueris pondo denarium trium. quidam duum. gummi pondo denarium quatuor. myrrhae, pondo denarij unius. thuris pondo denarium

riū. iij. alij unius. uino uel ut alij aqua excipiuntur.

Pastillus multiplicis usus & pus educens, & relaxans. 2

Corticis thuris pondo denarium duum. aris squamæ pondo denarium quatuor. cum uino factos ex melle diluito.

Muse remedium. 3

Aluminis scissi, aloes, myrrhæ, chalcantii, singulorū pondo denarium sex. croci, crocomagmatis, singulorum pondo denarium triū. cytinorum pondo denarium quatuor. mulso ex falerno facto excipiuntur.

Ad erysipelata ex Agathocle. 4

Cerussæ pondo denarium viij. aluminis rotundi, crocomagmatis, sulphuris ignem nō experti, singulorū pondo denarium duum. tritis solani fucus superfunditur, & pastilli, dum usus postulat, uino austero formantur.

Isidori ad nomas. 5

Lanæ succidæ pondo denarium quadraginta. scobis plumbi, squamæ, bituminis, singulorū pondo denariū decem. aluminis fiksi, rotundi, mali punici corticis, gallæ, misyos, chalcitidis, thuris, singulorum pondo denarium quinq;. myrrhæ pondo denarium duum. amurcæ heminas octo.

Pastillus Niger quo utor. 6

Malicorij denariū pondo decem. aristolochiæ, gallæ, singulorum pondo denarium viij. aluminis fiksi, aloes, singulorum pondo denarium quatuor. myrrhæ, chalcantii pondo denariū duum. thuris, pondo denarium quatuor. uino excipiuntur. & cū res exiget, uino dulci diluuntur.

Pastillus ex uescicarijs. 7

Argentī spumæ pondo denarium uiginti quatuor. cerussæ pondo denarium duodecim. uel uiginti quatuor. alicacabi radicis pondo denarium viij. chalcantii, aluminis scissi, singulorum pondo denarium quatuor. minij quātum ad colorem accipiendum satis est, ex aqua subiguntur.

Pastillus ex origano. 8

Oleæ foliorum uiridium pondo denariū octo. mali punici corticis pondo denarium sex. origani pondo denarium iij. acaciæ pondo denariū xij. chalcitidis, aluminis scissi, misyos, singulorum pondo denarium iij. uino austero diluuntur.

Pastillus ex rhu. 9

Gallæ pondo denarium trium, acaciæ pondo denarium quatuor. chalcantii pondo denariū quinq;. chalcitidis denarij dimidiū. aluminis fiksi pondo denarium octo. rotundi pondo denarium quatuor. misyos pondo denarium trium. malicorij pondo denarium quinq;. squamæ pondo denarium quatuor. myrrhæ, aloes, aristolochiæ, singulorum pondo denarium duum. thuris corticis pondo denarium quatuor. taurocollæ pondo denarium triū. rhu ex coriarij cheniciis quartam partem. alij dimidiū. aceti heminam unam, et s, ex quo rhus madeficit ac teretur.

Polyida sphaegis. 10

Aluminis fiksi pondo denariū trium. thuris pondo denariū quatuor. myrrhæ tantundem. uel pondo denariū octo. chalcantii pondo denariū duum.

Galen.

A cytinorum pondo denarium duodecim. fellis taurini pondo denariū sex. aloes pondo denariū octo. uino austero excipiuntur.

Pastillus Andronius. 11

Cytinorum pondo denarium decē. gallæ pondo denarium octo. myrrhæ pondo denarium quatuor. secundū alios octodecim. aristolochiæ pondo denarium quatuor. chalcantii pondo denarium duum. aluminis fiksi tantundem. alij pondo denariū quatuor. misyos cyprij pondo denarium duum. passo diluuntur. utere ad multa polychresto pharmaco.

Pastillus Achille. 12

Spumæ, misyos, aloes, singulorum pondo denariū duum. aristolochiæ pondo denarium octo. aluminis fiksi pondo denarium quatuor. myrrhæ pondo denarium duum. thuris pondo denarium quatuor. gallæ pondo denarium octo. chalcantii pondo denarium duum. corticis mali punici pondo denarium octo, fellis taurini pondo denarium duum. aceto subiguntur.

Pastillus ad nomas Isidori celebris. 13

Mannæ thuris pondo denarium triginta. cytinorum, aluminis fiksi, gallæ, cuscusq; pondo denarium octo. chalcantii, aristolochiæ, myrrhæ, misyos cyprij, calcis uiuæ, singulorum pondo denarium decem. acaciæ pondo denarium octo. excipiuntur uino, uel aceto, & leuigata usui sunt.

Pastillus alius ad multa. 14

Gallæ pondo denarium octo. cytinorum pondo denarium duodecim. aris combusti pondo denarium octo. æruginis pondo denariū sex. aluminis fiksi pondo denariū octo. chalcantii, acaciæ, fellis taurini, thuris, aloes, lycij, myrrhæ, [altas & misyos] singulorum pondo denarium octo. Sub canis æstu multo aceto teruntur.

Pastillus Apollonij Archistratoris Smilinus aut Alcinion in usum multiplicem. 15

Cerussæ pondo denarium decem. argenti spumæ pondo denarium quinq;. aloes pondo denariū quinquaginta. aluminis fiksi pondo denarium quatuor. thuris pondo denariū quatuor. myrrhæ pondo denarij unius. cimoliæ pondo denarium uiginti quinq;. uino excipiuntur. interim cum uino, & rosaceo utor.

Ad erysipelata quo utor. 16

Argentī spumæ pondo libras septem. cerussæ pondo denarij unius. opij, sulphuris ignem nō experti, croci, singulorū pondo uncias tres. passo excipiuntur. cum usus est passo diluuntur.

Glaucij ad multa faciens. 17

Aluminis liquidi pondo denarium centū. myrrhæ pondo denarium octo. croci pondo denarium octo. passo diluuntur.

Ad erysipelata Bonus. 18

Acaciæ pondo denarium octo. misyos pondo denarium quatuor. opij pondo denarium duum. thuris pondo denarium quatuor. cum aceto excipiuntur. facit etiam ad herpetas.

Alius ad eadem. 19

Opij pondo denarium quatuor. acaciæ pondo denarium quatuor. diphrygis pondo denariū qua-

tuor. aluminis fisci pondo denarium quatuor. ex aqua diluuntur, cum aceto utitor.

Alius ad erysipelata. 20

Cerussa pōdo denarium octo. sulphuris ignē nō experti pondo denarium quatuor. papaueris pōdo denarium duum. ruta foliorum pondo denarium duum. aluminis fisci pondo denariū quatuor. cimolix pondo denarium duum. amyli pondo denarium duum. melle & aceto diluuntur.

Ad herpetas Tiberij Casaris. 21

Diphrygis, succi papaueris, aluminis fisci, acacia, singulorum pōdo uncias tres. aceto uel aqua diluens utitor.

Cerantis usus multiplicis. 22

Arsenic denarium pondo triginta duum. [aristolochix denarium pondo triginta duum, alij octo. iridis denarium pondo triginta duum] gallæ pondo denarium sexdecim. alij octo. aluminis rotundi denarium pondo sex. chalcitidis denarium pondo sex. squamæ æris denarium pondo sexdecim. chalcanti denarium pondo octo. refinæ sicæ denarium pondo octo. aceti cōgios quatuor. caniculæ sub estu æreo mortario & cochleario leuigant. Quòd si æreū mortariū non habeas, squamæ minam iniicito, quæ ualeat denarijs centum.

Pastillus cognomento Bithymus in Sicilia confectus, ad nomas, fistulas, pterygia, cum cerato facit ad herpetas, erysipelata, & alia. 23

Mali punici corticis denarium pondo sex. gallæ denarium pondo sex. iridis Illyricæ denarium pondo quatuor. aristolochix denarium pondo sex. chalcanti denariū pōdo trium. aluminis fisci denarium pondo sex. chalcitidis denarium pōdo sex. misyos denariū pondo trium. nitri denarium pondo duum. thuris denarium pondo duum. cadmiæ denariū pondo sex. æris squamæ denarium pondo quatuor. chrysocollæ denariū pōdo duū. ex aceto sub Caniculæ æstu preparato.

Pastillus ad condylomata, & an inflammationes, & pterygia. 24

Thuris, acacia, stimmeos, singulorū denarium pondo duum. æruginis, myrrhæ, opij, papaueris, gummi, nardi celticæ, singulorum denarium pondo duum. ex uino austero trita inunguntur.

Arida uariæ speciei seu generis, à prænomatis auctoribus indicata, quibus singula conueniant. Cap. IX

Quæ scripsit Andromachus in calce operis De exterioribus.

Aridum exedens sine morfu. 1

Sandarachæ denarium pondo duum. arsenici denarium pondo duum. calcis uiuæ denariū pondo iij. mannæ denarium pondo iij. tritis utitor.

Facultas sanguinem comprimens, quæ utitor. 2

Chalcitidis, misyos, mannæ, singulorum denarium pondo quatuor, alij duum. tritis utitor.

Flaua, quæ utitor. 3

Chalcitidis pondo denarium centum. atramenti futorii, Græci uocant chalcanton, denarium pōdo quinquaginta. misyos torrefacti denarium pondo uiginti quinque. æris combusti denariū pondo duodecim & s. leuigatis utitor.

Sanguinem supprimens Magni. 4
Misyos cyprj denarium pōdo septē. atramenti futorii totidem. corticis picæ denarium pōdo iij. mannæ thuris denarium pondo iij. squamæ æris denarium pondo iij. æris usti denarium pondo xv. chalcitidis denarium pōdo xv. calcis uiuæ denariū pondo octo. alij denarium pōdo quadraginta. gypsi torrefacti denarium pondo quatuor. alij quinque. tritis utitor.

Sanguinem cohibens Aphrodisæ. 5

Chalcitidis denarium pondo sex. mannæ thuris denarium pondo duum. refinæ terebinthinæ, frictæ, singularum denarium pondo quatuor. utere tritis ad hæmorrhoidas.

Aliud ut Harpocras. 6

Sandarachæ denarium pondo duum. arsenici denarium pondo quatuor. calcis uiuæ denarium pondo octo. pastillos fingito ex aqua diebus quadraginta terens, & sic inungito.

Aliud ad hæmorrhoidas quo utitor. 7

Arsenic denarium pondo octo. sandarachæ denarium pondo octo. elaterij denarium pōdo quatuor. thapsiæ denarium pondo duum. chrysocollæ denarium quatuor. calcis uiuæ denarium pondo quatuor. tritis utitor.

Aridum Galii, uarij usus, ad pterygia. 8

Argentii spumæ denariū pondo octo. eruginis denariū pondo x. leuigatis utitor: commendatur.

Ad pterygia bonum. 9

Chalcitidis, caricarum combustarum, malicorij, squamæ æris, singulorū pares portiones. cum opus est, mel coctū misceto. emplastri modo imponito: alternis diebus soluito, detergens: nō madesfaciens, nec respergens.

Florida quæ utitor. 10

Sandarachæ denarium pondo triginta duum. alij sexdecim. aluminis fisci, myrrhæ, facis croci, singulorum denarium pondo sexdecim. iridis totidem. cyperi denarium pondo sexaginta sex.

Florida Magni. 11

Casiæ denarium pondo uiginti quatuor. aluminis fisci, gallæ, foreos, misyos, singulorū denarium pōdo quatuor. sandarachæ denariū pondo octo. malicorij denarij pondo unius. myrrhæ obolos quatuor. cinnamomi obolos quatuor. croci denarium pōdo duum. myricæ fructus denarium pondo duum. tritis utitor.

Aridum capiti accomodum. 12

Iridis denarium pondo quatuor. thuris, panicis, aristolochiæ, singulorū denariū pondo duum, tritis utitor, etiam ad nomas.

Aridum cicatricem inducens. 13

Ostreorum cōbustorum denariū pōdo duum. mannæ denarij pōdo unius, cadmiæ obolos tres, contritis utitor, & ad nomas.

Aliud Aridum cicatricem inducens. 14

Picæ corticis denarium pondo sex. mannæ denarium pōdo sex. aristolochiæ denarium pondo sex. pumicis, refinæ, singulorum denarium pondo quatuor. iridis Illyricæ denarium pondo duodecim. leuigatis utitor.

Aliud cicatricem ducens, & ad cacothec. 15

Piceæ corticis denarium pondo sex. cornu ceruini combustum denarium pondo quatuor. cadmię denarium pondo duodeuiginti. cerussæ, mannæ, singulorum denarium pondo quatuor. æruginis rarsæ denarium pondo duum. contritis utitor.

16 *Aliud, Gallæ denarium pondo quatuor. cerussæ denarium pondo octo. myrrhæ pondo denarium quatuor. argenti spumæ denarium pondo octo. retrimenti plumbi denarium pondo quatuor. trita usurpantur.*

Male siue obstetricis, generosum ad condylomata & rhagadas. 17

Gallæ, molybdænæ, singulorum denarium pondo octo. myrrhæ, cerussæ, singulorum denarium pondo quatuor. tritis utitor.

Oncorid est auxiliator ad omnia. 18

Iridis loco molybdænæ, argenti spumæ duas partes inijecto. reliquorum ciususcq; unam.

Aridum exedens, Lecanię Aerei. 19

Arsenicum pondo libram. calcis uiuæ denarium pondo duum. in aqua terito diebus triginta, mutas quotidie bis aqua in sole deinde reficcatis utitor.

Encastima quasi infessio, id est quod infessu curat hemorrhoidas, Phanię. 20

Atramenti futorij, aluminis fisci, chalcitidis, misyos crudi, sandarachæ, singulorum denarij pondo quatuor. trita omnia habeto. ubi usus uenerit, ueterem urinam salitam urini sextarij duorum mensura in fischilem peluim inijecto, medicamento uero denarium pondo duo decim superfundito urinæ, ut semper duo sextarij seruentur. hoc utitor insidens diebus septem. nam in his actione promouet. ubi sordidum in fundo subsisterit, anum circumlinito.

Aridum carnes cicatrice obducens citra erosionem, Harpocratis. 21

Sandarachæ, chrysocollæ, arsenici, pares singulorum portiones. item ad cacothecæ facit.

Pestillus ad nomas, dictus Astelepius. 22

Chalcitidis, arsenici, pares portiones. calcis uiuæ duplum. Habet etiam sandarachæ æqualem reliquis portionem.

Ad ani uitia. 23

Alumine liquido nucis magnitudine cum mellicyathis duobus cocto utitor.

Siccum ad nomas, quo utor. 24

Squamæ, arsenici, chartæ cõbustæ, plumbi ursti, singulorum denarium pondo quatuor. sulphuris ignem non experti denarium pondo quinq;. leuigatis utitor.

Aliter. 25

Squamæ, arsenici, sulphuris, plumbi combustis, aris, singulorum denarium pondo quatuor. sandarachæ denarium pondo quatuor. æruginis denarij pondo unius. chartæ combustę denarij pondo quatuor. utitor cum rhodino uel melle.

Crispi odoriferum ad nomas. 26

Squamæ, arsenici, sandarachæ, singulorum denarium pondo duum. gallę denarium pondo quatuor. myrrhæ denarij pondo unius. thuris tantundem. atramenti futorij denarij pondo duum. chartæ

Galen.

A cõbustæ denarij pondo quatuor. leuigatis utitor.

Antipatri ad nomas. 27

Chrysocollę pondo uncias sex. arsenici pondo uncias sex. arido utitor & cum rhodino.

Aliud ut Alcimion. 28

Arsenicum denarium pondo duum. squamæ denarium pondo trium. chrysocollæ denarij pondo unius. sicco & cum rhodino utitor. aqua dilutum cicatricem ducit cum heredo rhodino.

Aliud Publij ad nomas. 29

Calcis uiuæ denarium pondo quatuor. arsenici, squamæ, chalcitidis, sandarachæ, singulorum denarij pondo unius. tritis utitor. nonnulli sandarachæ denarij pondo unius, & dimidij.

Medicamen ex plantis, ad nomas probum. 30

B Mali punici corticis, chrysocollæ, aloes, singulorum denarium pondo quatuor. arsenici, sandarachæ, singulorum denarium pondo duum. aluminis fisci denarium pondo quatuor. chalcitidis denarium pondo quatuor. myrrhæ siccæ denarium pondo octo. oleæ siccæ foliorum tantundem. tritis utitor.

Aliud Alcimionis. 31

Myrti syluestris denarium pondo octo. malicorij, oleæ foliorum, myrti nigræ, & corticum, singulorum denarium pondo duodecim. spinarum cineris denarium pondo octo. ficulnæ cineris denarium pondo sedecim. orcheos herbę denarij pondo octo. arido cum melle utitor.

Aureum quo utor. 32

C Malicorij denarium pondo uiginti quinq;. aluminis fisci denarium pondo decem. atramenti futorij, misyos, singulorum denarij pondo octo. squamæ denarium pondo sexdecim. gallæ denarij pondo quindecim. melanteriæ ex clauis confectæ denarium pondo quinq;. chalcitidis, aris combustis, singulorum denarium pondo octo. leuigatis plurimum ex aceto utitor.

Aliud recens efficacia ad nomas, Philini inalterat,

& pus educit. 33

Aphronitri pondo libras duas. mellis tantundem. aphronitrum melle subactum urito, deinde leuigato, admisceto iridis Illyricæ pondo uncias sex. trito utitor, & cum melle.

Aridum erodens. 34

D Arsenici, sandarachæ, singulorum denarium pondo duum. calcis uiuæ denarium pondo quatuor. alij trium. leuigatis utitor.

35 *Aliud, Calcis uiuæ, arsenici, atramenti futorij, singulorum pondo denarium quatuor. ex aqua calida plurimum terito: reficcatis ac tritis utitor.*

Aridum erodens Melitonis. 36

Auripigmenti, sandarachæ, calcis uiuæ, pumicis, singulorum denarij pondo quatuor. in aqua triginta diebus conterito, sed quotidie illa mutata. ubi inauerint tritis utitor.

Aridum insigne ad hemorrhoidas praclarum Apollo-

nij Tarfensis. 37

Chalcitidis usq; squamæ, arsenici cõbusti, atramenti futorij, singulorum denarium pondo quatuor. diphrygis denarij pondo duum. foreos cõbusti obolos quatuor. argenti spumæ combustæ

tom. 5

S 2 obolos

obolos iij. alum inis fisci denarium pondo iij. æris usti tantundem. leuibus factis utitor.

Que Asclepiades in librorum quinto de exterioribus, quos Marcel- las inscribit, arida conscripserit. Cap. X

Andromachus arida, quæ affectui cōueniunt, ijs quæ affectis profunt, admiscuit. Verum Asclepiades in quinto seorsum quæ ad affectum cōducit: seorsum item quæ parti affectæ utilia sunt, exposuit. Nam parte omiſſa, tradidit cicatricem ductentia, crustas inferentia, ad nomas conuenientia & carbunculos, tum quæ uocāt à sanguine conti- nēdo, ischæma. Cum loco autem affecto, quæ ad polypodem, ozenas & sanguinis profluvia ex naribus, ad oris nomas, gingiuas humidas, in genis duras excrementias, ad paronychia, pterygia, anirhagadas, & hæmorrhoidas. Quædā etiam à parte affecta denominationē fortiter conueniunt tamen & alijs partibus, cuiusmodi quoq; Cephalica, id est capiti succurrentia à medicis dicta, quæ eximie ossibus cōducunt: quanquā & totius corporis exulcerationes carne replere possunt. non enim capiti quatenus caput est, prodesse sunt nata. Nimirum etiam nisi os denudatū sit, usum ipso- rum non requirimus: sed in nudatis quoniam pin- guia pharmaca uitamus, siccis solis utimur, fugiē- tes Emmota à medicis Græce appellata, quod li- namentis inunctis offerantur. Quemadmodū au- tē in ossibus in capite denudatis usum ipsorum ap- tis- simus est, ita etiam in alijs omnibus denudatis ossi- bus, siue brachij, siue cubiti, siue radij, siue femo- ris, siue tibiae. Quare nos etiam arida Asclepiadi scripta deinceps proditur, cum ipsum prima om- nium cephalica scripsisse inueniamus, prima po- nemus, quod non solum ossibus in capite denu- datis, uerū & alijs omnibus simili modo affectis ipsa sint accommodata: deinde quæ cicatricem du- cunt percensimus omnia hie in interiecta, præter- greſſis quæ affectum locum attingunt: postea que prædicto iam mihi ordine sequuntur, omnia ag- grediar. Nonnulla sanè ex siccis medicamentis du- plicem usum obtinent, ut & siccis ipsis uti possi- mus, et cum alijs quibusdam mistis, sicut idem A- sclepiades quodq; in dicit.

Arida Cephalica. 2

1. Aridum Cephalicū, quo usus est Lucius præ- ceptor. tollit squamas, ossa corrupta educit; caua implet. medicamentum pingui caret. Iridis Illyri- cæ, panacis, singulorum denariū pondo quatuor. aristolochiæ denarium pondo duum. mannae tan- tundem. alijs sine aristolochia. omnia contundun- tur, & cribrantur, uti licet per se & cum melle.

Medicamentum ex silphio, xallosa consumit, & fordidā purgat, & caua replet, ulcerum relictas tunicalas exedit. 2

Resina ptyinæ siccae denarium pondo duode- cim. pumicis torrefacti uino restincti, iridis Illyri- cæ, aristolochiæ, singulorum denarium pōdo viij. silphij denarium pondo quinquaginta. æris squa- mæ denarium pondo duum. thuris denarium pō- do quatuor. arido & cum melle utitor.

Medicamentum ex eruis, Xenocratis. 3

Erui fului farinae denarium pondo viij. Illyricæ

A denarium pondo decem. mannae denarium pon- do quinque. aristolochiæ denarium pondo quin- que. squamæ tantundem. tritis & cum melle uti- tor. Aliæ lectiones habent: bryoniæ radice dena- rium pondo viij. mannae, squamæ, iridis, singulo- rum pondo denarium duodecim. erui denarium pondo decem. aristolochiæ longe denarium pon- do quindecim.

Medicamentum quod ex Serapiade inscribitur. Squamas tollit, car- nem facit, ex ijs quæ ualde reficiant. 4

Serapiadis orcheos, iridis Illyricæ, marrubij sic- ci, singulorū denarium pondo viij. erui farinae pō- do denariū decem. aristolochiæ denarium pondo octo. sicco & cum melle utimur.

Tryphonis Cephalicon, aufert squamas. 5

B Picea corticis, squamæ aris, pumicis cōbusti, singulorum denariū pondo sex. manna, thuris, aris- tolochæ, iridis Illyricæ, resina ptyinæ, singulo- rum denarium pondo quatuor. myrrha, aloes, sin- gulorum denarium pondo duum. sicco & cū mel- le usus est. in Athenæi scripturis sine picea corti- ce medicamentum est. habet autem & gallæ pa- res mannae portiones.

Aridum cicatricem inducens Asclepiades. 6

C De omnibus ulceribus recentibus & uetustis curatu facilibus, & difficilib. in medicatoria. Me- thodi libri tertio & quinto differimus. Quæ- tiam in huius operis prioribus, caurū ulcerum sine omni casu pharmaca carne replentia, uirtutē terforiā sine ullo morſu obtinere docui. Quæ au- tem cicatricem inducunt, cum eo, quod citra ero- sionem astringunt, magis excicare, quæ uero su- percreſcit carnem tollunt, calida esse & acia. Quinetiā quæ optima esse inter ea quæ cicatricē ducunt existimem, tum in commentario De mor- bis curandis prædixi, ubi omnium affectuum cu- rationis methodi ostensæ sunt, tū prius in hoc præ- senti opere, cum de ijs quæ ulceribus cōueniunt ageretur. Asclepiades aut pharmaca sicut & An- dromachus cicatricem inducentia conscripſit, nō distinguens, utrum nullo alioqui malo constitū- tia ulcera, an quæ propriè ægre ad cicatricem uenientia dicuntur, quæ permultum in uicem differ- re ostendimus, cum singula proprium curationis scopum habeant. In quibusdam tamen ascripse- runt, quod ad cacoe the faciant, uel rursus ad cō- dylomata & rhagadas. At quanquā Asclepiades magis Andromacho distinguere soleat, tamen in his quæ cicatricē ducunt, distinctionē nullam pō- fuit. Verum quæ ego recēsi, tū in medendi Me- thodo, tū in hoc opere, indicabunt si mentē adhib- eas, quomodo singulis descriptis utendum sit.

Aridum cicatricem inducens Asclepiadis cineritum, quod cineris speciem referat nominatum, ex Magni medicamentis.

Calcis uiuæ denarium pondo sex. mannae thuris, squamæ, singulorū denariū pondo quatuor.

Aliter.

Calcis uiuæ denarium pondo duodecim. squa- mæ, mannae, singulorum denarium pondo quatuor. sed ut Archibius uult squamæ denarium pon- do viij. mannae denarium pondo viij. uel quatuor.

in alijs scripturis calcis uiuæ denariū pondo viij. **A**

Vt Heliodorus.

Calcis uiuæ, mannae thuris, singulorum denarium pōdo viij. Squamæ denariū pondo quatuor.

Fulvicum cicatricem ducens. 7

Misyos torrefacti denariū pōdo viij. Squamæ æris, denarium pondo decem. mannae denarium pondo sex. tritis utitor.

Magni, cicatricem ducens. 8

Diphrygis, Squamæ, singulorum denariū pondo quatuor. Ilyridis, mannae, singulorū denarium pondo duum. contritis utitor.

Medicamentum ex punice. 9

Pumicis torrefacti uino restincti denarium pōdo octo. Squamæ, mannae, singulorum denarium pondo quatuor. iridis, resinæ pityinæ sicca, singulorum denarium pondo quatuor. tritis utitor.

Aliud Ptolemæi celebris, facit et ad curatu

difficilia. 10

Piceæ corticis denarium pōdo sex. cadmiæ tostæ denarium pondo viij. Squamæ, cornu ceruini combusti, mannae, singulorum denarium pondo quatuor. tritis utitor. In alijs exēplarib. habetur, plumbi combusti & eloti denarium pondo quatuor. molybdænae denarium pondo octo.

Arida crustas inducentia. 11

Diximus quoq; hæc acris & adurentis esse potentia. Quare etiam usus ipsorum est, tum in his, que propter nimiam humiditatem ac intēperiem partis affecte, tū propter putredines partibus quibusdam innatas proueniunt.

Crustas obducentia, Asclepiadis.

Melinon Lucij præceptoris quod crustas inducit, callos excindit inpersum, & appressum summo specillo. compefcit autem, & difficilibus curatu cicatricem inducit, si quis tenuiter trito medicamento utatur; nimirum puluillo instar lanuginis utēs. chalcitidis crudæ, cadmiæ, singulorum denarium pōdo quatuor. ieiunium cum salua excipit tantum, ut solum ipsū pharmacum humectet. Deinde collige, & operculo cludēs, sine melinū fieri: ubi in umbra desiccaueris, leuiter circūferens pistillum, trita excipit, sicut prædictū est. Apud alios uocatur medicamentum fuscum, excipitur aceto quamacerrimo, & siccatur leuigaturq;. In alijs scripturis sicut Eunomus Asclepiades usus est; Habet autē sic: Chalcitidis denarios duodecim. cadmiæ denarios sex. sandarachæ tantundem aceto excipiuntur.

12 Aliud, Chalcitidis, chalcāthes, cadmiæ, singulorum tostorum paria pōdera. excipito saliuā.

Aliud, quod inscribitur robustum. 13

Chalcitidis tostæ, chalcanthi, sandarachæ, cadmiæ, singulorum pondo denarium octo. sicca inspergito.

Quod ex quatuor constat. 14

Chalcitidis tostæ, misyos tosti, diphrygis, cadmiæ singulorum pondo denarium quatuor.

Crustam inducens ualde generosam. 15

Aluminis fisci, atramenti futori, gallarum, misyos cyprii, singulorū denarium pondo sedecim. foreos denarium pondo quatuor. cōtritis utitor.

Galen.

Accommodatum ut Eunomus. 16

Misyos peregrini denarium pōdo sedecim. foreos denarium pondo duodecim. æris combusti denarium pondo duum. lapidis fisci combusti denarium pōdo octo. atramenti futori, sandarachæ, aluminis fisci, singulorum denarium pōdo iij. tritis utitor inspergens, & spicillo comprimens.

Ad nomas. 17

Putrida ulcera cū ambientes partes depascunt, nomas proprie appellantur: ac cōstat tales affectus uehementissimis medicamentis indigere: nam in ipsis sæpe etiam cauterijs utimur.

Ad nomas, Asclepiadis. Pharmacum Lucij præceptoris ad nomas. 18

Sulphuris uiui, auripigmenti, Squamæ, singulorum denarium pōdo duum. æris combusti, quantum color exigit. arido & cum melle utitor.

Publij præceptoris. 19

Auripigmenti denarium pōdo quatuor, Squamæ denarium pōdo duum. elaterij denarij pondo unius, chartæ quantum ad colorem satis est. ut autem Eunomus usus est, arsenici, Squamæ, singulorum denarium pondo quatuor. sulphuris uiui, elaterij, singulorum denarium pōdo duum. chartæ cōbustæ quātum ad colorem sufficiti. [In alijs scripturis est, sandarachæ denarium pondo quatuor. Squamæ denarium pondo sex. arsenici denarium pōdo quatuor. elaterij denariū pōdo duum. chartæ combustæ denarium pondo quatuor.]

Ex scriptis Aræi medicamentum ad nomas, quod etiam sordida purgat citra morsum rosaceo dilutum, facit etiam ad uulnere rosiones, dedit Theopropus. 20

Arsenicī, chartæ combustæ, plumbi usti & eloti, Squamæ æris, singulorum denarium pōdo quatuor. Singula per se teruntur, postea simul miscentur. utitor ad prædictos affectus. Ptolemæus autē ita usus est. plumbi combusti, arsenici, Squamæ, chartæ combustæ, singulorum denarium pondo quatuor. sulphuris uiui denarium pondo duum. tritis utitor.

Vt autem Apelles.

Medicamentum accōmo datum, quod ex charta inscribitur, nomas non solum sistit, sed etiam in cipientes prohibet. facit & ad dysentericos, insusum cum rosaceo. Cum autem ait insillatū dysentericis, suspensionem subesse de nomine indicatur. Compositio ita habet. Chartæ combustæ, plumbi combusti, æris combusti & eloti, arsenici, Squamæ stomomaris, singulorum æquas portiones, sulphuris uiui dimidiū. tritis utitor uel cum melle, uel rhodino.

Moschionis ad nomas. 21

Elaterij, chartæ combustæ, Squamæ æris, singulorum denarium pondo duum. auripigmenti denarium pōdo quatuor. æruginis scolociæ, salis ammoniaci, singulorum denarij pondo unius. tritis utitor, & cum rhodino.

Odonisrurum Lucij præceptoris. 22

Squamæ, galla, utriusq; denarium pondo quatuor. sandarachæ, arsenici, singulorum denarium pondo duum. myrrhæ, atramenti futori, utriusq; denarij pondo unius. thuris denariū pōdo duum.

tom. 5

S 3

elaterij

elaterij denarij pondo unius. chartæ combustæ quantum colorem efficit.

Non autem sic.

Squamæ, gallæ, myrrhæ, singulorum denarium pondo octo. sandarachæ, arsenici, elaterij, singulorum denarium pondo quatuor. thuris denarium pondo trium. atramenti futoriij tantundem. chartæ quo colorem acquirat.

Vt Præfion.

Arsenici, squamæ, singulorum denarium pondo duum. chalcantii denarij pondo unius. [sandarachæ denarium pondo duum. myrrhæ, thuris,] gallæ, singulorum denarij pondo unius. chartæ denarium pondo iij. tritis & cum rosaceo utitor. Heraclides hanc scripturam habebat. Gallæ denarium pondo sex. arsenici, sandarachæ, squamæ singulorum denarium pondo quatuor. thuris, denarium pondo triū. chalcantii tantundem. myrrhæ minæ denarij pondo duū. chartæ denarij pondo viij.

Vt Cleobolus.

Squamæ, sandarachæ, arsenici, singulorum denarium pondo duum. myrrhæ, thuris, atramenti futoriij, gallæ, singulorum denarij pondo unius. chartam, ut colorem accipiat.

Ad carbunculos. Cap. II

Carbunculus ulcus est crustam cito cū inflammatione totius partis circumdatæ ualida faciens, ut & febres uehemētes, & extrema periculosa inferat. Quare ipsi crusta ualens medicamētum imponere oportet, & ex his quæ ad nomas conduce dictum est. circumpositas autē partes cataplasmatīs fouere, quæ æqualem uim habeāt, ut repellāt, & mediocriter refrigerent, & digerāt. Verum De cataplasmatīs in proprio libro dictū est. Nūc ab Asclepiade scripta percensebimus.

Ad carbunculos medicamenta ab Asclepiade prodita, medicamentum Malsilotæ. I

Hoc propter uires exposuit, quod carbunculos ad superficiei perducatur, & multos auferat. Chryfocollæ, nitri tosti, lapidis asii, arsenici, sandarachæ, misyos tosti, chalcitidis, aluminis fisci, diphrygis, singulorum denarium pondo quatuor. trita omnia singillatim simulq; in uas æreum cyprum reponimus: dum usus poscet, imponimus, apprimentes spicilli latitudine, donec carbunculus nigrescat. Deinde supraponimus infra scriptū Viride, qd ita habet. Thuris, æruginis rasæ, squamæ æris, singulorum denarij pondo unius, aluminis fisci obolos quatuor. falsis ammoniaci obolos quatuor. ceræ denarium pondo septē, obolos tres. resinæ pityinæ aridæ denarium pondo quindecim. olei ueteris heminam unam. arida in sole cum aceto teritur, quæ liquefieri possunt, liquatur, & immittuntur: ubi rursus contuderis, assumēs utitor. Apud Demosthenem Malsilotam qui pharmacum composuit, olei habet duas heminas.

Apionis ad carbunculos. 2

Nitri rubri, arsenici, sandarachæ, chalcitidis, atramenti futoriij, diphrygis, singulorū parē mensurā. aceto leuigetur, & exiccatis, rursusq; tritis utitor.

Apollonij organici. 3

Chryfocollæ, aluminis scissilis & rotundi, sandarachæ, ochræ, misyos crudi, atramenti futoriij, singulorum denarij pondo unius. tritis utitor.

Florida Magni ad putredines nomas, carbunculos, pterygia, aures suppurantes. ualet etiam ad oris nomas. 4

Aluminis fisci denarij pondo octo. chalcitidis denarium pondo sex. sandarachæ denarium pondo trium. mali punici corticis siccae denarium pondo duum. atramenti futoriij denarij pondo unius, misyos denarium pondo duum. nitri omphacini fisci, singulorum denarium pondo duum. sicco & cum melle utitor.

Aliud Diodori. 5

Gallæ omphacinae denarij pondo quatuor. misyos, chalcitidis, auripigmeti, sandarachæ singulorum denarium pondo duum. aluminis fisci, atramenti futoriij, lapidis asii, diphrygis, nitri rubri, singulorum pondo denarij unius. tritis inspergito, comprimens specilli summo.

Sanguinem sistens Asclepiadis, Lucij præceptoris medicamentum conseruatum. 6

Chalcitidis denarium pondo sedecim. mannae denarium pondo duodecim. terebinthinae aceto subactæ, siccis consperge locos, unde sanguis profuit. in alijs inuenimus duo magis, chalcitidis denarium pondo octo. mannae denarij pondo sedecim. terebinthinae frictæ tantundem. Vt autem Dioscorides Tharseus tradidit Areo Asclepiadeo pharmacum mirifice sanguis profluua comprimens. Chalcitidis denarium pondo octo. mannae denarium pondo sedecim. resinæ siccae denarium pondo octo. gypli tantundem. alia contunduntur, cribrantur, miscentur, in ærea pyxide reponuntur. ubi usus postulat, pares portiones medicamenti cum gypho miscentur.

Ex libris Heraculidis, medicamentum ad hæmorrhoidas, hoc est usque ad sanguinis ex naribus profluua, lanam inuigens & ea uoluens, tanquam clycium. 7

Acidi mali punici corticis pondo uncias tres. aluminis Aegyptij pondo uncias quatuor. chalcitidis pondo unciam. tritis utitor, naribus uero lanam medicamento repletam imponito.

Hercules cognomento, ad sanguinis eruptiones, hoc loco cauterij usus est. crustam autem inducit. facit etiam ad pterygia, reprimunt omnem excrecentiam, ossa educit, squamas discedere facit. 8

Soreos atramenti futoriij, chalcitidis usæ, singulorum denarium pondo quatuor. tritis utitor.

Sanguinem sistens accommodatum. 9

Misyos peregrini denarium pondo sex. atramenti futoriij totidem. piceæ corticis, chalcitidis, singulorum denarium pondo quatuor. mannae denarium pondo uiginti. gypli denarium pondo quatuor. tritis utitor.

10 Aliud, Thuris pondo unciam. misyos peregrini pondo denarium quatuor. gallæ omphacinae denarij pondo quatuor. chalcitidis denarium pondo quatuor. fuberis combustæ denarium pondo octo. rhu coriariæ denarium pondo quatuor. tritis utitor.

De emplastris polychrestis, quae simul ad putrescentes particulas, sepedones & nomas profunt.

Procum. Argumentum huius & praecedentis libri. Sepeidum. Nomae unde dicta, phagedaenae quae exedant. Cura malignorum per morsus expertia, putridorum per mordentia. Libri de facultatibus simplicium, in quibus exercitatus aliquis, & alijs recte uti, & noua componere poterit. De medicamentis quae de nouo componuntur, ratione primum: deinde experientia accedente, si quid deesse uideatur, emendari potest, id quod si opus sit iterum atque iterum. Cap. I. De emplastro ex herbis secundum Critonem. (Vide infra cap. 4. & 6. ab initijs. ubi hic legitur *σπερσίου*, id est marubij, infra capite sexto habetur prasu, id est porri.) Herbae acres. Loci unde colligendi. Frigida herbae, & de reliquis ingredientibus. 2. Adhuc de eodem emplastro. Quis sit scopus communis in ulceribus lepra. Sarcotica quae, & epulotica, quod quae uariet dum pro ulceris puritate aut fordite, & pro sensu uel exiguo uel exquisito, mitiora aut fortiora adhibentur.

II. De emplastro de scylla, &c. secundum Critonem. Ordo procedendi in cura ulcerum putridorum.

2. Acria omnia cerato mixta, sarcotica sunt. Cum uero iam purius euasit ulcus, & nos magis carne imple re uolumus, plus cerati addendum, tantum scilicet ut ne amplius mordeant, neque iam minuant, sed augeant carnem. Cerati proportio. Non diuersus est scopus, si pro diuersis circumstantijs plus uel minus cerati acri bus phar macis misceatur. Quaeuis acria emplastra huiusmodi, multo cerato admixto, sarcotica & epulotica in ulceribus malignis sunt. III. Critonis emplastrum ex cote. Quod perquam calidum sit. Cur ad lecta ei sine adstringentia simul & discutientia, & quid utraque per se sola efficiant. 2. De ceteris Critonis emplastris. Aniceti titulus, usus, & compositio. *πυρρὸν*, id est resina cum cera mixta quadruplex differe ntia, impetiginis ferae, & quibus remedijs inuenitur. De simplicibus in hoc emplastro. abstergentibus. stypticis. Caricarum decoctum. Acetum. IIII. Emplastrum ex herbis secundum Andromachum. (Vide cap. 1. & 4.) 2. Alia duo Andromachi emplastra eiusdem generis.

VII. Fusca polychresta scriptura hac praemittit. de remedijs in uentione triplex: & de coniecturalis spei uel expectationis differentia secundum magis & minus. Uniuersalem simul methodum & exercitationem in particularibus coniungi oportere: ut quis & aliorum remedijs recte uti, ea quae minuire, mutare, & ipse noua componere possit: & etiam sine titulis ueterum compositiones, quo pertineant iudicare. Methodum uniuersalem anemine ante ipsam scriptam esse, neque medium ad puncturam nerui ab acuto aliquo, ut stylo. Quomo

do quis compositi uires conficiat ex naturis simplicium cuius exemplum mox subiicitur in 2. parte. 2. De fusco emplastro Aegyptio usque ad finem: de quo etiam in sequente cap. 8. & infra cap. 9. Primum autem reprehendit Andromachum, quod pleraque compositiones simplices scripserit, nec uires & usus aperuerit. 3. Praedicti fusci uires ab Andromac. omittas ipse inquirat ex simplicium naturis, in hac & quarta parte. Cotyla ponderis nomen incertum. Ponderis libra Romana olearia. Libram & unciam aliam esse ponderis, quae nimirum semper eadem est: aliam mensuram, quae pro liquoris diuersitate uariat. Quae proportio oleo & lithargyro in praedicto emplastro conueniat: cotylam nouem unciarum ei conuenire. Si parum olei sit, non satis tenax fieri emplastrum: & si nimium quoque lithargyrum, nigrescat. Resina admixto. Cera alba. pro cicino aliud uetus oleum discutientis.

4. Vis praedicti emplastri, discutere crassa, & puscutia, mollire, siccare, uulnera glutinare (ratione squamae acri & stomomatis) & alia non pauca ulcera & apostemata iuuare. ammoniacum. phar macorum qualitates primae, secundae, tertiae. Simplicia huius emplastri. Styptica & discutientia quaedam miscenda, quaedam non. Emplastrum est sale. Ana collemata. Neruis nudatis & abscissis quae phar maca conueniant. Emplastrum huiusmodi emmora potius & liquata ad mouenda quae siccata. Quid differant medicina quae nudatis neruis, & quae puncturis tantum conueniunt. Acria circa uulnus ponenda, neruo nudato: in ipso aut uulnere quae abstergerit & laxat quae asringentibus mixtis. VIII. De eodem fusco Andromachi secundum Asclepiadem & Critonem, quid quod inter sit inter ipsos & Andromachum. Coctio eius. Utilitates. 2. Alia duo emplastra Andromachi, Minerua, & puncturorum. quod multa alia emplastra ad diuersos usus Andromachus scripserit uti rib. non expressis, & quibus tria tantum receserit, quorum unum anodynum inscribitur. 3. Iterum reprehendit Andromachum, & optimum quoddam eius polychrestum cum calce phar macica amici cuiusdam sui experientibus probatum describit. Calx. Olei ad caetera proportio. Alia duo fusca, quorum primum simpliciter caetera recipit. 4. Alia tria Andromachi fusca, sphaerophagum, Ironis, & Hellepontium: quod uel timum etiam cum Herae descriptioe coferat. IX. De polychrestis emplastris senarij Damocratis: & primum de Tyrio. 2. Aliud eiusdem, 3. Aegyptium eiusdem. uide supra cap. 7. part. 2. aegyptus quomodo uratur. 4. Eiusdem aliud simile Aegyptio, ad eadem utile: pro lithargyro molybdanum aliqui iniecit. X. De discutientibus, & attrahentibus. emplastris: quae sit eorum materia: quaeque forma emplastri gratia admisceant. Cur eisdem asringentia & quibusdam ad dant. Obiter, sarcotica fieri tunc praedicta, tunc ualde abstergentia, si cerato ei misceant. Asringentia sarcoticis non conuenire. 2. Emplastra discutientia & attrahentia quae Andromach. scripsit, num. 33. 3. Attrahentia emplastra quae Asclep. scripsit, num. 8. 4. Eiusdem discutientia 10. 5. Damocratis senarij de discutientibus quinq.

VI. De emplastro ex herbis secundum Critonem. Ordo procedendi in cura ulcerum putridorum. 2. Acria omnia cerato mixta, sarcotica sunt. Cum uero iam purius euasit ulcus, & nos magis carne imple re uolumus, plus cerati addendum, tantum scilicet ut ne amplius mordeant, neque iam minuant, sed augeant carnem. Cerati proportio. Non diuersus est scopus, si pro diuersis circumstantijs plus uel minus cerati acri bus phar macis misceatur. Quaeuis acria emplastra huiusmodi, multo cerato admixto, sarcotica & epulotica in ulceribus malignis sunt. III. Critonis emplastrum ex cote. Quod perquam calidum sit. Cur ad lecta ei sine adstringentia simul & discutientia, & quid utraque per se sola efficiant. 2. De ceteris Critonis emplastris. Aniceti titulus, usus, & compositio. *πυρρὸν*, id est resina cum cera mixta quadruplex differe ntia, impetiginis ferae, & quibus remedijs inuenitur. De simplicibus in hoc emplastro. abstergentibus. stypticis. Caricarum decoctum. Acetum. IIII. Emplastrum ex herbis secundum Andromachum. (Vide cap. 1. & 4.) 2. Alia duo Andromachi emplastra eiusdem generis.

VII. Fusca polychresta scriptura hac praemittit. de remedijs in uentione triplex: & de coniecturalis spei uel expectationis differentia secundum magis & minus. Uniuersalem simul methodum & exercitationem in particularibus coniungi oportere: ut quis & aliorum remedijs recte uti, ea quae minuire, mutare, & ipse noua componere possit: & etiam sine titulis ueterum compositiones, quo pertineant iudicare. Methodum uniuersalem anemine ante ipsam scriptam esse, neque medium ad puncturam nerui ab acuto aliquo, ut stylo. Quomo

CLAVDII GALENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM PER GENERA LIBER VI.

PROOEMIUM.



VPERIORE comentario emplastra dicta graece polychresta, quae multis conueniant affectibus, distinguentes, ea collegimus quae praeter alios, etiam ulceribus, aegre ad sanitatem peruenientibus, mederi pollicentur: in praesentia uero ad aliud emplastrorum genus multiplici usui accommodatum di

grediar, quae singula tamen alia multa faciunt, tamen ad particulas putrescentes aliter affectas quae uulnera quae proprie curata difficilia nuncupant. Erem has putrilago depascit, eo quod turba medicorum hos affectus nomas appellat: illa uero uno loco sine putrilagine circumscribita sunt, ut et phagedene dicte, uicina quidem depascit, non tamen ea putrefaciunt, febresque inferunt, quae si quae depastione cum putrilagine sustinent, accidere consuevit. Summa curatio eius erat in praedicto

dicto ulcerū ægrè curabilū genere (chironia & q̄
uocat) medicamēta inuenire, quatenus licet rōsi-
onis expertia, ualide aut exiccātia, at hæc que nūc
scribent, omnia mordacia sunt, si quis ipsis solis,
nō cerato tēperatis utat. Quæ aut cerato miscēt
purgare quidē ulcusfordidū et carne replere pos-
sunt: atq̄ etiā duritiē quandam & tensionē discu-
tere, nō aut difficilia curata sanare. Indicāt ipsorū
uirtutē affectus quib. bene adhsberi credita sunt.
Quod s̄a superius admonui, & nūc dicturus sum:
meminisse uidelicet oportere illorū que in opere
De simplicib. medicamētis prodita sunt. In cuius
primis libris methodū seu rationem exposui, quā
medicaminum facultates inueniant: simul quoq̄
in plurib. exēplis eius exercitatione proposita: in
sequentib. uerō singulorū nominatim mentionē
fecit. Nam illorū memor, ex facili rationē eorū qui
hæc pharmaca à nobis modo proposita cōposue-
runt, assequeris, & uidelicet ipse quoq̄ alia confi-
cies, quocūq̄ tempore prius expertorū inopia la-
boraueris, multa siquidem huiusmodi nō paucis
cōtingunt in itinere, cum alio, tū maxime nauali.
Quando quidē etiā in patria quidā manētes, phar-
macorum apparatus, unde ægros curabant, amise-
runt, ut præ tristitia ipsi tabefacti, perierint. Opti-
mum igitur medicamēta s̄a explorata secun-
dum dictam methodum usurpare: sin aut, ut dixi
nō nunq̄ hæc desideremus, habitū talem nos ha-
bere: quo similia s̄a abunde expertis possimus
cōponere: quemadmodū & me sæpe agentem in
itinere & alibi uisidisti. Nōnulla igit̄ quæ proprio
marte in huiusmodi temporū occasiōib. cōdidī,
postq̄ experientia uocabsem, nihilo peiora uel
celebratissimis apparuerūt. Nam primā ipsorum
compositionem ex cōiectura artificiali molimur:
postea uerō cū nōnulla per experimentū proba-
tissima uisa fuerint, nōnulla à scopo absint, secun-
da rursus correctio fit, & tertia nonnunq̄ qua ad
perfectiōnem eius quod præstare uolumus, ipsa
redigimus. at sine methodo, & in prioribus, & in
Therapeutices libris exposita uti prædictis recte
nemo potest: tātum abest ut similia ipsis cōficiat.
Iam igitur huiusmodi emplastra expōdar.

CAP. I Emplastrū ex herbis appellatū, prope
omnes, qui insignita emplastra in uno libro uel plu-
rib. collegērūt, tradidere: nō multū in mixture sim-
plicium pharmacorum symmetria discrepantes.
Incipiam ergo & hic à Critone emplastra prius il-
la cōmemorans quæ in quarto De simplicib. me-
dicamentis ita ad uerbum literis mandauit.

Emplastrum ex herbis, quo utor.

Facit ad carcinomata, putredines, strumas: ad
suppurationē perducit & exprimit: lepras amouet,
furūculos soluit, podagricis prodest, callosas
durities emollit. Idē capiti cōducens sine foratio-
ne squamas tollit, ossa aliquatenus educit: idē ad
recetiā uulnera & ad nomas linamēto exceptum
ualet, repurgat, implet cō rosaceo cerato: una ip-
sius parte ad duas cerati, interdū tres uel quatuor
adiecta. Cū myrteo cerato duab. partib. uel trib. ci-
cauricē ducit. Herbarū ex siccis locis maritimis,

anagallidis quæ cœruleū florem habet, papaueris
ceratitidis, marrubij, alterci foliorū tenerorū,
singulorum denariū pōdo quinqueagintalex. hæc
in pilam seu mortariū cōiecta terunt: in alio autē
mortario habent squamā aris tribi denarij xxv.
mannæ denarij xx. resinæ pityinæ sicca denarij
xvi. aloes totidem, fisci aluminis denarij quatuor,
rotundi totidem. Hæc in sole leuigantur: ut fordū
crassitudinē cum aceto habeant. Deinde herbæ
mixta, donec probe coeant terunt: postea ceratū
fit ex chizæ ceræ denarijs centū: secundū alios mi-
na, olei ueteris heminis duab: seruefacito et misce-
to. Heras ita. Quidā uerō duas anagallidas immit-
tunt, aliqui & chrysocollæ & terræ eretriadis, &
salis ammoniaci, & auripigmenti, singulorum de-
narijs quatuor. Porro quæ Asclepiades de hoc
emplastrō præcepit, tum quia in præcedenti li-
bro indicata, tum quia his ferē similia sunt, super-
uacūū mihi uidetur denuo de ipsis scribere, com-
munem omnibus sermonem nunc aggressuro.

Primum sanē qui medicamentum hoc cōposuit,
herbis acribus usus est, ut humores prauos afflic-
tis partibus infixos uehementer digereret: atq̄
ideo ex siccis & maritimis locis esse iubet. Contra-
rias autem ipsis alias frigide uirtutis usurpauit, ad
acrium uehementiam leniendam mitigandamq̄:
quales sunt altercū & papauer. Habent em̄ quip-
pam etiam doloris mitigatorium, puta stupidam
refrigerationem propinquis partibus inferentes.
Stupor enim mediocris dolorem soluit, ait Hip-
pocrates. Apposuit autem ex metallis quoq̄ aris
squamam, & alumen scissile, de quibus prius dixi
mus: quod sanē utrunq̄ medicamen ulceris. mali-
gnis conuenit. Aloen uerō miscuit ex ijs quæ ad
stringunt, & sine morsu exiccant medicamentis.
Item mannā ex ijs, quæ cōcoquunt, leniunt, & ad
suppurationē perducunt: pityinā ceu materiam
emplastrō cōficiendo idoneam: sicut & ceram &
oleum. At simul cum hoc acrium medicaminum
uehementiam ipsa mitigant: pityina tamen etiam
siccare potest, & quo siccior, hoc magis, qualem
inijcere præcipit. Nōnullos aut miscuisse pharma-
co chrysocollam & terram eretriadem, ambo cū-
raturā difficilium ulcerum remedia. Econtrario sal
ammoniacus, & quod auri pigmentum uocatur,
propter acrimoniam ulcera natura apta sunt iri-
tare: atqui etiam putridis conueniunt.

2 Proinde non admodum utile est proposi-
tum nobis in sermone pharmacum ad ulcera chi-
ronia. In quibus uerō putredo aliqua subest, hanc
comprimere idoneum est, saniem quæ illam facit
discutiens. Eadem medicaminis potentia &
strumas medetur. Verum quia detestoria quæ-
dam continet, ideo quoq̄ lepras purgat: etenim
consilium in hoc affectu est, cutis induratum sum-
mam partem uelut deglubere, id quod ea effici-
unt quæ præter quàm quod supra modū siccant,
etiam detergent. Nam si cutis uitium in natura-
lem habitum redire possit, nemo exiccata supra-
modum siccaret. Quoniam uerō quod leprosum
iam est, curationē nullam habet: proximi fuerit,

qui in omnibus insanabilib. scopus cōmunis est, incurabilem partē ex corpore excindere. Excinduntur autem nōnunquam ferro, interdum igni, nōnunq̄ medicamēto, uel adurentibus, uel digerētib. simul & detergētib., quale est modo cōmemoratū. Quemadmodū igit̄ hic sermo omnis lepræ cōmunis est, sic & ille qui de carnis repletionē tractat. Nā quia carne explētia diēta medicamēta, sicut in tertio libro methodi de morbis curādis ostēsum est, uirtutē habēt deterforiā citra erosionē: quæ uerō huius sunt materiæ, in hoc prælenis pharmacū nōbis proposiūt, partim abstergēdi uim, partim lenitate afferūt, Ideo liquidū ceratū ex cera resinaq̄ in oleo liquefactis cōfectū ipsi miscemus. Siquidē cera & oleū, ut acrimoniā obtundūt, ita sunt emplastica, id est quæ meatus obliuēt ac obducūt, eoq̄ fordes producūt. resina uerō morsus expers emplastica uirtutē nō habet, sed deterforiā: ulcerib. quidē iā mordacē, nō ulceratis blandā & sine morsu. Ceterū misturę symmetriā cōiecturā quidē ante experiētiā, uerū sciētifice post experiētiā deprehēdemus, nōscemusq̄ simul purū ulcus deterforiā uim sine morsu requirere: fordidi ualidiorē, quippe cutis propugnaculū est: fordities, purū autē nudū cōtingēt occurrit. Quinetiā ex corporibus ipsi nōnulla sensibilib. magis substantiā habēt, quēdā minus, alia molliorē, alia dūriorē, quę ratio est, cur Crito in proposito medicamēto ad unā partē ipsius nōnunq̄ duas ceratū, aliquadō tres uel quatuor misceri iubeat: nō tñ distincte pronūciāuit, quādo duas, quādo plures adijcere oporteat, tanq̄ qui pharmaco utēt, uersatus iā in arte sit, & quæ a me nūc dicuntur, secū estiamare queat. Rosaceo quidē preparari ceratū præstat, nō tamē insignis excessus in huiusmodi ulcerib. est, etiā si oleo liquefiat: attamen in his quæ phlegmōnes quippiā habēt, rosaceum oleo potius est. Porro de carne implenda omnino à phlegmōne tuta sunt. Pulchre autē Crito ascripsit in ulcerib. quæ ad cicatricē duci postulāt, myrteo oportere ceratū preparari, ac in medicamētis carnē gignentibus, & in his quæ cicatricē inducunt. Etenim usus, & compositionis ipsorū methodus, in medēdi Methodi libris exposita est: in particulatibus autem materijs exercitatio, cum huius sit operis, sequenti libro exponetur.

CAP. II Aliud deinde eiusdem generalis potentie emplastrū his uerbis Crito cōscripsit. Aristolochiæ rotundæ denariū pōdo xxx. alij xv. tridid denariū pōdo xxx. alij xv. pitynæ siccæ denariū pōdo xxx. alij xv. ammoniaci, myrrhæ, styracis, squamæ eris rubri, singulorū pōdo denariū xv. scyllæ tostæ denariū pōdo centū & octo, aceto acerrimo diebus quadraginta terito, quādo cancellula sidus orit̄. Squama primū, & styrax, paulatim ex utroq̄, deinde gutta ammoniaci, & æs, & scylla insiciunt̄, ut elaborēt̄. paulo post resina, inde myrrhæ: cū leuia facta fuerint, reliqua sicca miscentur. Expletis autē diebus, eiusmodi ceratū fingit̄. Cera pōdo quinq̄, alij denariū pōdo ducentorū quadraginta. terebinthinæ pōdo libram, alij

A denarium pōdo xxx. olei sextartios duos & s. alij heminas sex. chalbani denarium pōdo xxx. picis liquidæ tantundem. postremō chalbānum indito. deinde ubi refrigeraueris curioso excipito. Hæc quidē medicamenti compositio. De usu autē eius hæc ad uerbum Crito scribit. Syncero medicamine utitor, in capitis fracturis, fistulis, nomis, & excrescentijs, item ad oscula ulcerum apertenda, & hypophorā, id est ulcus dehiscens. sin uoles diluere quo carnī generandæ idoneū fiat, & cicatricem inducat, parti unā medicamēti duodecim cerati rosacei adijcito: in ambustis uni parti octo immittito. Hæc sanē de usu pharmaci Crito recte tradidit: tanquam acri ipso & aperti & digerenti, ideoq̄ & excicati usus in fistulis, supercrescētia

B carnis, putredine, hoc est nome, & ad oscula aperienda, hoc est in sinib. & angustis orificijs. In capitis autē fracturis cum sine foratione curationem molimur: sunt autē tales, quæ ad usq̄ mēbranas cerebri nō perueniūt: uerum carnis producēdæ gratia rosacei cerati partes duodecim miscēs, donec ad cicatricem peruerint. Melius autē est dicere, donec ulcerū concuuitas repleta fuerit. Necessariō em depascētia ulcera, quæ dixi eadē esse cum putrilaginosia, à ualidis medicamētis curant̄, quale est & modo proposiūt. Primū quidē putrescentes particulę expurgant̄, atq̄ hinc cauæ reddunt̄: ubi uero putredo cessauerit, mudificationē repletionemq̄ requirunt̄, ac posteaq̄ repleta fuerint, tum etiā cicatricem inducentia desiderant.

C 2 Ipsū autē pharmacū, cum cerato nondum mistum fuerit, quia acre est, non solum carnē generare nō potest, sed etiā supercrescētia auferit, quemadmodū ipse Crito dixit. Atq̄ huius meminisse maxime oportet, quod dictū est & in superiori emplastro, quod ex herbis appellauit, multauidelicet ex calcascentibus & abstergentib. composita, licet admodū acria, si cū cerato temperentur, carnem progignere. Nōnulli desperant de ipsi, cū uel duplo copiosiore cerato misto mordere adhuc conspiciant, adeo ut carnem producere non possint, quemadmodū in hoc emplastro habet. Nam cum multo acrius, magisq̄ mordax sit eo quod ex herbis inscribitur, ad carnē creādam inutile est, quamuis quaduplo mistum cerato fuerit. Prudentis igit̄ est, & in huiusmodi medicamētis usurpandis uersati, initio quidem statim in telligere, quod partes cerato misceri oporteat: si autē post usum primum medicamentum acrius adhuc apparuerit, quā ut carnem generare queat, conijcere quātum adhuc ex cerato adijciendum ueniat, sicut Crito in proposito factitauit. Neque em̄ exiltimes cū prima statim cōiectura inuenisse duodecim cerati partes misceri oportere, sed sciuisse copiosius quā quod emplastro ex herbis immittit̄ misceri, quanto uerō copiosius, post primam coniecturam reperisse. si namq̄ octo partibus mistis mordax etiā nūc apparebat, decem admiscuit: quemadmodū si etiam decem, ad duo decim peruenit. Quoniam uerō, ut dixi, pro foradum copia, & ulceris humiditate, tum eorū quæ

simul afficiuntur, sentiendi acumine & hebetudine, item mollitie & duritie corporis habitus, cetera ti quantitate immutatae conuenit: quod saepe dictum est, considerate nos expedit, recordates quantitate usus in huiusmodi omnibus describi, cum utroque facilis illinc uia ad alia usque ad summa fiat: Summa dico omnium eiusdem generis scoporum completiones, de quibus si unum exemplum nunc proposuero, uos semper ipsius meminisse oportet, neque saepius de illo uelle audire. Dico igitur scopos congeneres esse, hoc est simili genere comprehensos, ut plurimum cerati misceatur, si ulcus purum & siccum fuerit, & corpus eius qui curat subtili sensu praeditus ac molle: ut uero minimum adijciatur, si humiditas multa & sordes in ulcere fuerit, & corpus egri durum ac hebetis sensus. Bene tamen omnibus quae id component, digerentibus, aeris squama admista est, medicamentum exiccans, sed quod non parum adstringat. Non solum autem in hoc emplastro cognoscendum uobis est, propter cerati copiosam misturam carne explens, & ulceribus non malignis cicatrici obducenda idoneum euadere: sed etiam in alijs omnibus quae eiusdem uirtutis sunt. His subiungit Crito medicamentum diacones, id est ex cote, quod se uti affirmat, ita componendum praecipiens.

Emplastrum ex cote. Cap. III

Ex cote, quod nobis in usu est, facit ad omnia diuturna, & peculiariter ad capitis dolorem, fronti impositum: ualet ad laterum dolores longos, iuuat podagricos, ischiadicos, scapularum dolores, dentium cruciatus, attritis partibus impositum: educit etiam & extrahit menses pestifini supra positum, auxiliatur stomacho laborantibus, tum ijs qui fluxu uexantur, & cibum uel alimenta non retinent. Est etiam prorsus utile sine aduisione, & ijs quae acre medicamentum non sustinent. Conuenit etiam ad duritiem iecionis, & lienis, necnon ad strumas & ischiadicos. Proprie uero usus in ipsis fiat diebus septem: si molles sunt, quinque: aquam pars uel oleum non attingat, donec ulcuscula, quae psudracia dicuntur, fecerit, & saniem crassam attraxerit: deinde ubi exolueris albo cerato ex aqua utitor. Sin efficacius uoles, medicamento acone quod ex pipere constat. Ceram, chalbani, terebinthinam, pitynam frictam, olei laurini, olei ueteris, singulorum pondus libram. squamam aeris pondus libram & semissem. aruginis pondus uncias sex. guttae ammoniaci pondus unciam. sinapis, adarcem, sulphuris, singulorum pondus unciam. abrotini, centaurei, atramenti futorij, salis ammoniaci, thuris, salis comumis, aluminis rotundi, argenti spumae, propolis, cocci cinidij, singulorum pondus uncias tres. omnia simul contunduntur, & cribrata uana cum liquefactis, cum oleis excipiuntur. Haec sane propositi emplastrum compositum est, non parum superioris praestans caliditate: sinapi enim habet, & adarcem, sulphur, & coccum cinidium, tanto calore praedita, ut ulcus faciant, quibus diutius adhaerent: iam & laurinum ex his est, quae abunde calfaciunt, deinde atramentum futorium & sal: didicistis

A autem, haec adstrictionis quoque non esse experientiam, falem pauca, sed atramentum futorium multa. Verum de adstringentium medicaminum mistura cum digerentibus, antea in emplastris usum multipliciter expositum est. Omnino enim quippiam uarijs utile esse non potest, nisi contraria quoque uirtutis participet. Siue enim digerens uirtus simpliciter sola esset, ad unam speciem affectuum conduceret, quam digerere conueniret: siue adstringens ad aliam unam ubi quod influit, reprimendum est. Quare incipientibus ex humorum influxu generari affectibus, adstringentia conueniunt: digerentia uero line adstringentium mistura, ubi nihil propter euacuationem prius factam influere potest. Nam si superfluitas quaedam humorum existat, non solum digerentium humorum in affectibus partibus contentus, sed etiam alij ad ipsos accessus: cum digerentia ad se trahere soleat, uelut eos quos continent ac contingunt humores, ita etiam eos qui in profundo corporis existunt. Miscet ergo digerentibus sustentia & reprimentia, merito qui ad ipsorum compositionem descendit, ratione hac usus, experientia uero attestante rationi. Quare non iniuria, licet consilium habeat in proposito calefacere & exiccare, eoque etiam ulcera concitare, mistum est & adstringentium quippiam, sed quae non sufficiant ad multa uehementer calefacientia pharmaca, duo haec, atramentum futorium & sal: quin etiam aeris squama pari ratione mista est: & alumen, quod a uehementer adstringendo graece styteria appellatum est.

C 2 Aliud emplastrum scripsit Crito, quod Mesianum appellat, diuersum materiae genus habens a superiore & illo quod mox a me consequenter describetur: uocat hoc Crito ipse inuictum, exaceribus pluribus medicamentis compositum, cum Mesianum tale non sit, ut postea suo tempore demonstrabitur. Quinetiam cephalica alia nominans, quorum generalis uirtus paulo post explicabitur, post Mesianum consequenter inuictum ab ipso appellatum subiungit, eiusdem uirtutis cum praescripto, quod diacones, id est ex cote uocabat. Verba Critonis in hunc modum sonant.

Aniceton, quasi dicas insuperabile.

D Facit ad omnia, extrahit, rumpit, purgat, glutinat, pus per spleniū educit, & per indita linamenta. & ubi soluitur semper sordes habet. Cum oleo & aceto, diffundit duritias, & nervorum contractiones iuuat, sine irrigatioe impositum, ne refrigerent, & unguenti uice dilutum facit, ut acopo, hoc est medicamentum laesitudinibus accomodatissimum: sicut enim in morborum principijs laesitudines, & eas quae sine causa manifesta proueniunt. Est etiam malagma extremarum corporis partium in magnis splenijs impositum. item crueta glutinat, futuris uel fibulis iuncta, si plicati lintea ex folio aceto splenio superimponas, astate quidem frigidum, hyeme autem calidum. facit ad plantarum pedis uita, ad contusiones, putredines, & digitorum affectus, ite fracturas cum uulneribus. licet neque carnem generante, neque quod cicatricem inducat, alio uel, sed soli credere. ualet ad hominum, canum, & ferarum

morfus. maximum hoc est quod pollicetur, nempe abcessus latentes in colo & peritonæo prohibere ne fiant, antequam in uomica exierint, aut factos extenuare, & in intestina conijcere. Imponendum autem est splenium loco, & desuper cētunculum ex aceto & oleo calente, irrigandumq; bis quotidie: non soluetur autem nisi triduo uel quadriduo. Deinde adhibito fomento ad uaporē rursus imposito: uocarum autem est Insuperabile, propter mirāda & multa ipsius opera. Squamæ æris denarium pōdo quinquaginta octo. pyrethri, staphidis agrie, cocci cniidij, sinapis feminis, cachrys, columbini stercoris, aristolochiæ tenuis, æruginis, misyos cyprii, eruce feminis, cumini, singulorum denariū pōdo xvi. nitri, salis ammoniaci, singulorum denariū pōdo xxxij. lauri baccarum, manna, iridis, singulorum denarium pōdo centum uiginti. aceti acris sextarios sedecim. decocti caricarum cyathos quatuor & dimidium. Tinsa cribra taq; omnia simul, cū aceto ad leuorē teruntur sub aestu canicula: ubi siccū & uiride euaserit, sicuum decoctio adijcitur, & simul emollita rolluntur, & in olla æris rubri reponuntur. Decoctum autem caricarum ita habet. Caricarum pinguium pōdo libras quinq; aquæ sextarios sex: coquuntur nec sextarios duo relicti fuerint. usus est, una pars medicamenti aceto diluti, ut sordes representet, ad sex partes resinæ cum cera iunctæ. Est autem syncerum quod inde constat, hoc est, resinocerū: ceræ pars una, resinæ frictæ tres, cum oleo pauco liquefacto. medium: ceræ pars una, resinæ duæ. dilutum uerò & abunde temperatū. ceræ pars una, resinæ tantundem. dissolutum: cerę partes duę, resinæ una. quod supra quā dilutum: ceræ partes tres, resinæ una. Scribitur etiā impetiginis agrestis conuenisse syncerū impositum. Hæc Crito ad uerbū prodidit. Ego à fine eorū quæ dixit, sermonis principium statuiam: feras impetiginis nominant, quum à medicamento imbecilliter siccantibus nihil iuari uident, à ualidis autem irritari. Opus igitur in ipsis est medicamento efficaci abunde, non tamen uehementer mordaci, quod, ut dixi, ex artificiali cōiectura compositum experientia probatur. Cōstat propositum pharmacum ex multis acribus tenuiorum partium & digerentibus: habet autem & quædam citra erosionem detergentia, & nonnulla parū adstringentia. Itaque acria ex his quæ continentur, sunt pyrethrum, sinapī, coccus cniidius, columbinum stercuris, ærugo, hæc æ lauri, nitrum, sal ammoniacus, item aceti acre, tale namque insciendum censet. Detergentium summe quidem lenia immordaciq; sunt, iris & aristolochia, atq; ijs adhuc magis, ut ex genere cōcoquentium iam sit, manna: generosius autem cachrys & staphis agria. His adhuc præcellit cuminum, & erucæ semen: misy cyprii sine morfu quidem exiccat, sed nonnihil etiā astringit, quæ admodum & æris squama, ualidum & ipsum medicamen. Oportebat enim, ut prius demonstratum est, medicamentum hoc adstringentis uirtutis ut cunque esse particeps, eoq; squama copiose admi-

sta est. Si uerò & manna reuera manna sit, & non thus, ipsa quoq; aliquantulū adstringit. iniecta est autem & hæc multo copiosior quā squama merito, ut acrium pharmacorum uehementiam leniat, simulq; humores in afflicta parte contentos coquat. Porro caricarum decoctio mitigatissima est, & maxime coquit, simulq; quodammodo digerit. Hæc igitur omnia mista multi usus medicamentum iure effecerūt. Acetum uerò efficaciam eorum plurimum iuuat, in quo pharmaca æstiuo sole conteri præcepit. Omnia enim sic preparata tenuem substantiam acquirūt, eoq; in corporis altum uirtus ipsorum penetrat.

Quæ Heras eiusdem generis emplastra tradiderit. Ca. IIII

Emplastrum ex herbis quomodo Crito præparat prius posui, & ipse Heras similiter conficit, sic ut Crito eius meminit: differt tamen in confectio ne per scyllā: nam ammoniaci, myrrhæ, resinæ piryinæ, styracis, squamæ & scyllæ tantum cum alijs Crito miscet, quantum Heras: sed in aristolochia & iride discordat. Quippe Crito scripsit, aristolochiæ rotundæ denarium pōdo triginta, iridis siccæ tantundem, alij quindecim. Heras autem sic protulit, aristolochiæ, iridis, singulorum denarium pōdo quatuor. Rursus quoq; post hæc Crito iuxta confectio nis finem tradit, expletis diebus ceratum huiusmodi facito. Cerę pōdo libras quinq;, alij denarium pōdo ducentorum quadraginta. terebinthinæ pōdo sextam: alij denarium pōdo triginta. olei ueteris sextarios duos & s. alij heminas sex. Mihi uerò non placet, pro quinq; libris ceræ denarium pōdo ducentorū quadraginta medicamento miscere. Interim namque loco libræ centum denarios ipsi scribunt, interdum loco minæ: atqui nullus unquam libram tam exiguā posuit, ut denarios quadraginta octo penderet. Hoc enim accidit, dū pro quinq; libris, denarij ducēti quadraginta immittuntur, sic neq; pro libra terebinthinæ denarios triginta.

Emplastrum Serapionis & hoc Crito in opere medicamentario in hæc uerba conscripsit. Emplastrum Serapionis, quod nonnulli Aegyptium, alij Venereum uocant. Cap. V

Facit ad omne uulnus, cui innitendum est, omni desperatiōe abiecta. Valet ad pūctus, aculeos, parotidas, perforationē, phymata, excolādo conglutinat, tollit omnē duriciē, iuuat epinyctidas, articularum epiphoram, aurium contusiones, sanat & ulcera senilia, chironia, & quæ crassas oras obtinent. Olei ueteris heminas tres, argēti spumę denarium pōdo ducentorum, guttę ammoniaci denarium pōdo centū sexaginta octo. resinæ colophoniæ pitynię denariū pōdo sexaginta octo. ceræ denariū pōdo centū sexaginta octo. chalbani denariū pōdo uiginti. æruginis denariū pōdo quinquaginta, alij uiginti. myrrhæ denariū pōdo quatuor, alij octo. Argenti spuma coquitur ex oleo donec medicocriter coiuuise uisa fuerint: dein de olla ab igne deposita, gutta ammoniaci immititur, postea resina, postremo cera: ubi singula curiose liquata fuerint, ne aduratur, olla ab igne rur-

sus sublata, chalbanū aspergitur & ærugo: iterum super ignem ponit, coquiturq; donec melinum fiat, & iustam crassitē nanciscitur: postremo sublato myrrha adijcitur: ac ubi moueris, defundito, pelleq; excipiens reponito.

Vt Andromachus. Cap. VI

Tres huius emplastrī confectiones tradidit Andromachus, primam ad præscriptio Critonis nonni hīl differentē, deinde alia duas magis euariantes. Promissionē autem medicamentū & præparationē recte prius Crito cōscripsit: Andromachus in hanc sententiā de ea præcepit.

Emplastrum ex herbis.

Anagallidis cœruleū florē habentis, marrubij, papaueris agrestis, alterci uiridis, singulorū denarium pōdo lvi. squamē denariū pōdo xxv. thuris denariū pōdo xx. resinā sicca denariū pōdo xvi. aloes tantundem. aluminis fisisilis denariū pōdo quatuor. ceræ pōdo minam. olei ueteris heminas duas. aceti quantū satis est. Multi quidem utraq; anagallidem in emplastrū ex herbis conserunt. Theocritus autem & terræ eretriæ, & chrysocole, & falsi ammoniaci, & auripigmenti, singulorū denarium pōdo quatuor.

Alia emplāstra ex eodem genere, de quibus scripsit

Andromachus. 2

1 Ad gangrænas, putredines, nomas ueteres, & cacoethas, lisdori Antiochei. Argenti spumæ denarium pōdo quatuor. æruginis rasæ denarium pōdo viij. olei cyathos sex. Gallus Aelius cyathos duodecim, & æruginem scoleciā si ue uermicularem. Argenti spuma & ærugo in cacabum leuigata mīstuntur: olei tres cyathi superfunduntur: coquuntur pruna non nimis acri, mouenturq; spatha lignea, donec uiridia fiat, postea ab igne sublata, ac in pilam euacuata contunduntur, dum calidus est medicamentum. Deinde rursus in ollam transferto, & tres olei cyathos superfundito, mouetoq; ne adurā, quousq; melinum fiat, in coquito, ac rursus eximes terito ut collyria, iterūq; excipiēs in ollā coquito, mouēdo quousq; rubrū colorē accipiat, & rursus ex cacabo in mortarium defusa magis terito, atq; iterum quarto in olla coquito, ita ut in unum coeant: rursusq; dum calent euacuato, tritaq; excipito, & in rubra pyxi de reponito, ad prædictaq; utitor.

2 Post cōmemoratum emplastrum, alterius deinceps his uerbis Andromachus meminit.

Liquidum emplastrum ad nomas, quo, utor, & ad alia multa.

Ceræ, resinæ terebinthinæ, singulorum denarium pōdo octo. adipis taurini curati denarium pōdo quatuor. chalcitidis denariū pōdo duum. squamæ æris denarium pōdo trium. mannae thuris denarium pōdo duum. gallæ immaturæ denarium pōdo quatuor. olei myrtei heminas quinque. Arida cum aceto teruntur: deinde sic liquabilla superfunduntur.

Fusca multiplicis usus pharmaca. Cap. VII

Quod auxiliorum quædam ratio sola inuenit, quædam experientia, quæ & ipsa rationē requirit, nonnulla utriusque opem postulant, subinde uo-

bis demonstratum est. Ad hæc etiam quod ratione & usu comperta cōiecturali uia ad eorum quæ inquiruntur, inuentionem perueniunt: quæ uerò per rationem sperata sunt, usu cōfirmantur. Quin etiam spei cōiecturalis, non mediocrem, quemadmodum & in uniuersa uita, maioris minorisq; esse differentiam: nō enim pluuiam hyemali solstitio, & caniculæ ortu futurā similiter speramus: quæ hyemali frequenter, sub caniculæ aestu raro accidit. Porro cum omnium artium opera frequentifirmantur exercitio, nō satis est, generalia ipsarum addiscere duntaxat, sed etiam in particularibus exerceri subinde oportet: nam actionū usus seu exercitatio, ad perfectorum possessionem uia est. Quare ego quoque in omnibus commentarijs, quos uobis, amici, petentibus composui, non solis communibus theorematibus cōtentus fui, sed exēpla etiā multa, exercendi gratia adieci, quibus ipsorum cognitionē uobis euidentiorē, magisq; firmam fore sperabam. quemadmodum igitur in alijs omnibus medicinæ partibus, ita & in neruorum uulnere curatione feci, primum uobis rationalem uiam ostendens, qua ad præsidiorum inuentionē perueniatis, deinde materias in quibus uires à ratione inuētas cōtineri didicistis: siquidē in cōmētarijs, qui uidecim numero sunt, De simplicium medicamentorū facultate particularium materiarū uires uniuersas, uel plurimas, easq; utilissimas exposui: nam ut præsidij nunquam destitueremini, hoc esse necessariū demonstrauimus, nō solum ut uos ipsi quoq; preparatorum ab alijs medicaminum inopia, auxiliorum copiam haberetis, nam Erasistratus etiam, quum stomaticum medicamē in illo profectionis loco ad manū non esset, interdum herbarum succos quibus abundabat, usurpauit, sed etiā ut si illorū autorū scriptiones perierint, ipsi queamus similia perditis conficere: in super, ut ab alijs inuentis recte utamur, proposito in opere exercitatos esse profuerit.

Quid opus est tantū quoq; afferri utilitatis cōmōre, ut quæ compolitis medicamētis superflua iniecta sint, & contra quæ primi illorum autores omiserint, discernere possimus? sicut in tertio libro ostendimus, sermonem De medicamētis ad neruorum uulnera idoneos facientes. Ita uerò & nunc indicabimus, exercentes uos in ijs quæ me seniores medici inuenerūt. Vniuersalis etē methodus, neq; cum distinctionibus exacte, neq; sine ijs imperfecte à quoquam priorum tradita est, imò nec medicamentum quod curare promittat, neruos ab acuto aliquo punctos, cuiusmodi sunt acus, & puerorū styli, ad quos quisquā memoriæ prodidit, qd ipsum hoc solū facere optime possit. at ego certe eorum innumerabilem copiam prædicto libro percensui. Quidam tamen ipsorum nimis diligētiōres, cum multi usus pharmaca notatu digna scripsissent, præter alia quæ facere ipsa pollicentur, adiungere, interdum quidem & neruorum uulneribus esse accommoda, interim neruorum & musculorum præcisionibus, aliquando etiam puncturis ipsorum, uel contusionibus auxiliari

hant: uobis autem ex ijs quæ didicistis, licet cogno-
scere ante experientiam, possibilia ne quis an im-
possibilia de quibus scripsit, pollicetur. Sed etsi
non adscripta fuerint ea quæ ex natura sua facere
solent medicamenta, tamē in quibus ipsis sit uten-
dum, uobis intelligere est integrum. Vt igitur ceu
exēpli gratia exordiar in emplastro quodā multi-
plicis usus, quod Andromachus in libro De medi-
camentis extrinsecus corpori adhibitis, ordine se-
cundum posuit, haud indicans ad quæ maxime ip-
so utendum sit, exerceri rursus uobis licet, quomo-
do ex cōmemoratis simplicibus medicamētis cō-
positi uires sint cognoscēde. Andromachus enim
ita ad uerbum prodidit.

Aegyptia. 2

Argentī spumæ denarium pondo centum qua-
dragintaquatuor. ricini heminas sex. ceræ dena-
rium pondo centum quadragintaquatuor. guttæ
ammoniaci denarium pondo septuagintaduum.
terebinthinæ denariū pondo triginta sex. lanarum
combustarum denarium pondo octodecim. Squa-
mæ stomomatis, squamæ aeris, aristolochie, thuris,
singulorū denarium pondo octo. nonnulli myrrhæ
denarium pondo quatuor. opopanax denarium
pondo duum. marinæ aquæ denariū pondo quin-
quaginta ad ceram conspergendam. Hęc quidem
scriptura pharmaci boni, & reuera usus multipli-
cis est: uerum ipse dicendum omisit, in quibus eo
utendum erit. Si igitur cuiusq; simplicis medica-
menti uirtute ante exposita, quemadmodū nos in
undecim libris factitauimus, & methodo quapiā
scripturae compositionis medicaminum scripta,
sicut à nobis quoq; præcedente libro factū est: ui-
uentibus amicis huiusmodi scriptiones exercitij
gratia protulisset, ut ad quos affectus utile esse cō-
positum medicamentū posset, decernerent, nimirū
hominis institutū laudassetus. Quoniam ue-
ro nihil horum egit, quis non ipsū omnino accu-
satione dignum censeat? unde medicamentarij ip-
sius libri, qui complurium optimorum medicami-
num compositiones habent, merito à medicis ne-
glecti sunt. Nam inter sexcentos, uix unus artis ab-
solutiōē habere uidetur; alij idiotarum modo fa-
ctis habent, si medicamētis manifesto scriptis recte
uti queant. At quid oportet dicere de huiusmodi
medicis? Cum etiam Empiricorū nonnulli, ut uo-
cant, quamuis celebres ex artis operibus conspi-
ciantur, tamē ignorare se fateantur, quam ratio-
ne ullum huiusmodi inuentum esse pronunciant.
Inutilis igitur ipsis est fuscæ huiusmodi emplastrī scrip-
tura, quæ color tantū in titulo docet, uires nō item,
quas pro colore scriptas esse præstiterat.

3 Quoniam itaq; Andromachus uirtutē ipsius
dicere neglexit, nos ex mistorum specie & faculta-
te inuenire conemur. Argentī spumā, medij tem-
peramētī calfaciendū & refrigerandū, paulum ad
licetatem inclinare didicistis. Præterea usum eius
in emplastris esse duplicē, nempe si non liquefiat,
ceumateriæ dumtaxat momentū adferre: si liqua-
ta fuerit, etiam siccare posse, idq; magis, si diutius
cocta fuerit. Nunc tamē quæstio est, quatenus in-

Galen.

coqui debeat, cum Andromachus sex heminas ri-
cini, quod est olei ricinini, miscendas esse tradide-
rit. Quot enim unciarū Romanæ libræ, heminam
esse uelit, non explicuit; & si melius erat hominē
qui Romæ degerat, librarum, sextariorum, & un-
ciarum meminisse, relinquere autē heminæ uo-
cabulum Græcis ciuitatibus extra Italiam usitatum.
Si ergo in omnibus ipsis idem nomen heminæ ef-
set, nulla utiq; foret quæstio. Nunc uero quū per-
magna quantitatis inter eas sit differentia, conue-
niebat ipsū monere, se uel Atticam, uel Alexan-
dreoticam, uel Ephesiam, uel aliam quampiam he-
minam dicere. Nam permulti qui de mensuris &
ponderibus scripserunt, nouem uncias Romanæ
libræ heminam medicos in Pharmacorum libris
æstimasse produnt, alij duodecim uncias ab eis re-
putari affirmant, sicut Romæ olei libram ex more
appellant. lam uero quendā audiui, qui heminam
à medicis in pharmacorum cōmentarijs traditam
sedecim uncias Romanas pēdere diceret. At non
parum refert ad medicamentū uirtutem, uel mag-
nas, uel paruas heminas iniicere. Ego sanē olei li-
bram Romæ uocata, quam per incituris distincta
cornua metiuntur, ponderaui quādoq; discere cu-
piens quantū grauitatis pondus contineret, inue-
ni duodecim olei mensurales, decem uncias pon-
deralib. æquales. Quare medicos in libris De me-
dicamentis accuratus scribere oportebat, quales
uidelicet uncias, uel libras medicaminū liquido-
rum immiti uellent, mensurales ne, an pondera-
les; perspicuū enim est, liquidorū horū corporū,
sicut etiā solidorū, alia grauiora, alia leuiora esse,
ac singulorū liquidorum que in pharmaca mittun-
tur; pondus alio libro declarauimus, sed in præsen-
tia id quod propositum est, repetamus. Etenim si
nouem unciarum mensuralium singulas heminas
esse statueris, ex tribus, septē & uiginti uncias pro-
duces, Si in octo denarios quanc; uncia diuidas,
denarios duentos & sedecim habebis: si duode-
cim uncias singulas heminas æstimes, fient nimirū
sex & triginta uncia, denarij uero ducti octo gin-
ta octo, singulis uncias in octo denarios diuisis. Ex-
pertus sum ego plerūq; cum argenti spumam ex
oleo coxissem, æqualem ipsius misturā libræ quid-
dem argēti spumæ ponderali, mensurali uero olei
parem fieri: quod si copiosius iniicias, & coctam
uidelicet diutius, maiorem uim siccandi afflue-
re. In candidis emplastris coloris gratia cerussam
quoq; argēti spumæ miscemus, omnino æqualem
ponderē; immittitur autem hemina nouem uncia-
rum, iuxta ponderalem argenti spumæ libram, co-
lorem feruare uolentibus, eo quod diuturnior co-
ctio nigriorem spumā efficiat, sed oleo pauco in-
dito, medicamentum minus glutinans euadit: pro-
inde quidam uel terebinthinā resinam, uel quam
uocant colophoniam, quantum licet pellucētē
miscuerunt, conantes neq; colorē offendere, neq;
medicamentū uirtutem, adijcereq; resinæ mistura
tenacitatem, quod non facile decidat, quippe me-
dicamentum, si tanto oleo tantum argenti spumæ
& cerussæ coquantur, arenidū ac friabile redditur.

tom. 5

T Non-

Nōnulli eadem ratione cocto medicamini albam ceram indiderunt: spumæ tamen argenti duplum olei habenti, si nihil etiam resinofum, uel cerofum immittas, ex coctione glutinans erit, & multo magis, si cum argenti spuma olei triplum misceas, hoc est, si olei mensurales uncias quibusdā argenti spumę ponderalibus cōmittas. Consentaneum igitur est, Andromachum nouem uncis mensuralibus oleum ricini immitti iubere, ut sex heming uncias quinquagintaquatuor expediant mensurales: qđ idem est, ac si dicas, mensurę Romanę libras quatuor & s. At clarum est ricini inopia, interim uetus oleum eius locum assumendum esse. Ego subinde & sicyonium infeci emplastris digerentibus, & cum illud non adesset, aliud mea ipsius industria simile illis effeci: radicibus cucumeris agrestis, bryonię & altheę in eo decoctis.

4 Quod uero propositū medicamen digerens, emolliensq; Andromachus esse cupiat, ricini olei, & copiosa guttę ammoniaci mistura palam indicat. Nam argenti spumę cerā pondere parem, ammoniacum dimidium esse præcipit. Et si in multis nobilibus emplastris non dimidium, sed quarta pars, uel quinta, crebro septima et octaua, non unquam decima pondere ad argenti spumę proportionē medicamenti huius immittatur. De cera didicimus, qđ in huiusmodi pharmacorū cōpositionibus materię locum obtinet, non uirtutis efficaciam adiuvat. Adest uero & ei uis quaedam emolliendi exigua, sed non illius ergo proposito medicamini admista est, quę eademmodū nec terebinthina resina, quantū multo uiribus qđ cera præstantior sit. Etenim magis mollit quam illa, item calfacit & digerit, ex quibus cera ne alterum quidem efficit. Verū gutta ammoniaci sola imposita, squalidum aridumq; reddet medicamentum: quantum uero ad emplastræi confectionē, quam Gręci uocant emplastropeia, attinet (neq; enim ita appellasse noceat) utilis est tum cera, tum resina. Quippe mollit digeritq; medicamen uel solius ammoniaci beneficio, quod quidem inter emollientia principarum occupat, in digerentibus uero concertat. Porro si quę in libro quinto de Simpliciu medicaminū facultate dicta sunt, in memoriam reuocauerimus, ad intelligendum quale nam huiusmodi medicamenti temperamētum esse oporteat, nihil adhuc recentiori disciplina indigebitis. Nam primę facultates effectiue medicamentis sunt, in calore, frigiditate, humiditate, & siccitate. Secundę mollientes, digerentes, repercussoria, attractrices, coherices, deterforia, & exedentes: quemadmodum & Tertię dicuntur, quę glutinant uulnera, cicatricem inducunt, & carnem generant. Compositum igitur ex oleo ricino, & gutta ammoniaci medicamentū abunde potest digerere, emolliere, & nimirum etiā siccare, ubi materiā idoneā assumpserit, ceram, resinam, & diutius coctā argenti spumam. Ad hæc uero iubet insicere lanas combustas, aristolochiā, medicamenta quę plurimū digerunt, & exiccāt. Præterea meminit pharmaci quod concoquit & digerit, nempe thuris. Quod si myrrhæ

nihil & opopanax adiecit (quosdam enim ait & ex his aliquid miscere medicamento) illam sanē scimus non ignauiter calefacere & exiccare: opopanax uero & generosius adhuc hæc utraq; efficeret: insuper attenuandi dirigēdiq; facultate præstare, sed huius quidem paucillum inditur, timente opinor eo qui ipsum apponit, medicamētū acrimoniam, uolentesq; non solū digerens, emolliensq; emplastrum, sed uulneribus quoq; idoneum efficere. Propterea igitur & squamam aris & stomatis cum ea miscuit, quæ præterq; q̄ ualde siccant, astringendi etiam uis fortita sunt. Ergo propter horum misturā propositum nobis in sermone emplastrum, Aegyptium cruentis uulneribus, ulceribusq; alijs non paucis bonum medicamentum redditur. Quinetiam ad abscessus, & omnia quę discutit postulant, subinde audiuitis medicamentum quæ simul cum digerentibus etiam astringentium aliquod capiunt, tutiora fieri: quæ uero sine astringentibus digerunt, efficaciora quidem, sed non perinde tuta: sæpe enim fluxiones attrahunt, dum corpus quod curatur, plethoricū est, uel praui succo obnoxium. Sin autē uacui corpus est, ac superfluitatibus liberum, promptius medicamentum, quæ magis discutit, sola sine astringentibus assumpta, ad finem perueniunt. At cum pauca id genus corpora quibus medicamenta afferunt, reperias, iccirco securius esse uisum est, miscere etiam nonnulla repellentia. Ita sanē & emplastro digerenti quod ex sale conficitur, quidam adiecerunt chalcanthi paululū, quamuis & sal ipse astringens quippiam possideat. Igitur propositū medicamentum fortiter digerere competum est, ut etiam pusillam non admodum copiosum sine cutis perforatione discutere queat, emolliere in scirrhum & quomodocunq; indurata: item magna uulnera conglutinare, quemadmodum & ulceribus iam ad malignitatem declinantibus cicatricē obducere, alijsq; omnibus affectibus qui digerendi simul & repellendi uirtutem desiderant, in quibus sunt & quæ fronti, dum oculi fluxione laborant, imponuntur, uocata à medicis anacollemata, id est agglutinaria. idem hoc pharmacum conueniet, & neruis simul denudatis, & si in parte quapiam abfecti fuerint. Etenim præcisi si ex consensu non periclitantes, adhuc etiā subiectis sibi partibus, in quas inserunt, sensum adimunt, indigent tamen in quibus tali pharmaco. Nam quę humectant, facile eos putrefaciunt, ob quod & pastilli siccantes, etsi abunde astringant, tamen denudatis neruis cōueniunt, qui nondum ad phlegmonę uigorē peruenierunt. Hincq; indignantur, irritanturq; ab huiusmodi pharmacis: sed de his postea, quę de proposito emplastro dicenda restant, apponamus. Quonia pleurę medici ex inscitia id genus emplastra dura imponunt, cum liquata linamentis excipere præstaret, uel etiam in cofectione statim molliscula reddere: postea cum in magnis diuisionibus ubi nerui denudati sunt, experimentum de ipsis fecere, sperant in puncturis multo utiliora fore, ignorant & hic maximam quandam speculationem

de qua differui modo, uos docens, quæ ratione inueni, inde per experientiam confirmari cognoui, propterea etiam nunc ad moneo. Multo namque calidiora, et quæ digerant magis pharmaca, punctus neruorum requirunt, quam cum omnino denudati fuerint, uulnere insigni facto. Quippe nudati ueritatem acrida calidiora admodum medicamenta propter erosionem morumque non ferunt; uerum relaxantia digerentiaque astringentibus mediocriter mista postulant. At quoniam etiam melius est ambientes uulneris particulas acribus & tenuibus, multumque digerentibus, quale est Euphorbio confectum, contegere, nos sane propositum emplastrum satis posse quæ prædixi, efficere cõiectauimus, etque preparato experientie testimoniũ accelsis

CAP. VIII. Postea aliquando in Asclepiadis & Critonis libros medicatioris incidens, deprehendi ipsos non ut Andromachus quoque, confuse sed cum manifesta distinctione uirtutem ipsius scriptitasse. Igitur tum huius gratia, tum quod in connectione in quibusdam ab Andromacho dissentiant, potius uisum est mihi etiam eorundem uerba subiungere; deinde ita & de ipsorum discordia in medicamenti compositione non nihil dicere.

Use Asclepiadis & Crito de proposito emplastro conscripserint.
De emplastro Aegyptio ab Andromacho tradito, Asclepiades in hunc modum differit.

Andromachi Aegyptium.

Cruentis uulneribus accommodatum, facit ad neruorum, musculorumque præcisiones, punctus, contusiones, iuuat detortos ac luxatos articulos. Est & lippiensibus collyrium, cõfert capite dolentibus; Summatim ad multos affectus utile est pharmacum. Argenti spumæ, ceræ, singulorum denarium pondo centum quadraginta quatuor. guttæ ammoniaci denarium pondo septuagintaduum. terebinthinæ denarium pondo triginta sex. lanæ succidæ combustæ denarium pondo decem & octo. squamæ aris, squamæ stomomatis, thuris aristolochiæ rotundæ, singulorum denarium pondo octo. ricini heminas tres. Hæc præfatus Asclepiades, deinceps coquendi modum tradit, Andromacho neque hanc partem cõpositionis in emplastris obseruante, siquidem in omnibus ferè omisit; uerum de coctione dicta sunt non pauca in libro quarto, & nunc paulo post dicetur. Aequum autem est inspicere controuersiam quam Asclepiades in simplicium medicaminum quantitate cum Andromacho suscepit. Non enim sex heminas ricini ut Andromachus, sed tres iniicere præcepit. Ceterum in aristolochia nullam Andromachus distinctionem fecit, ipse rotundam adiecit, sicut & in lana combusta succidam addidit; quancumque idem pondus quod Andromachus immittat. Hæc igitur ipsius uerba sunt. Lanæ succidæ cõbustæ denariũ pondo duodeuiginti. aristolochiæ rotundæ denarium pondo octo. Quæ uero ad calcem posuit Andromachus, neque omnino Asclepiades meminit, neque de myrrha, neque de opopanace quicquam locutus, multo minus de marina, quæ manifesto Andromachus apposuit, marinæ, inquitens, ad ceram irrigandam

Galen.

A denariũ pōdo quinquaginta. Hoc enim nec Asclepiades, nec Crito adiunxit, attamē aristolochiam rotundā Crito æque ac Asclepiades indidit, quæ admodum et lanæ succidæ denarios octo decim, & olei ricinini, ita enim ad uerbum scripsit, heminas sex. Coctionem emplastrī Asclepiades his uerbis docet. Argenti spumam, & ricinum incoquito, do nec in unũ coeant, deinde squamas, ubi color bonus apparet, reliqua immittito. Apud Critonem hoc modo traditur. Argenti spuma cum ricino coquitur, dum mellis spissitudinē habeat, hoc facto, squamæ insperguntur, abundeque incoquantur, quo usque digitos non inquinēt; postea terebinthina & cera; ubi in unũ coierint, ammoniacũ prius apud ignē digitis emollitũ: cum iam ab igne deponit, lanæ succidæ puluis inspergitur, postremo thus; deinde ita tolluntur. Porro & ad quæ medicamentum ualeat, accuratius Crito his uerbis exposuit.

Aegyptia.

Omnem diuisionem cõtusionemque à phlegmone præferat. Valet ad quoslibet ferarum morfus. iuuat phlegmonas sine ulceribus factas. benefacit etiam neruorum & musculorum doloribus sine causa abortis.

Aliud Andromachi Fuscum. 2

Scriptit alia quoque fusca Andromachus superior quodammodo genere similia; uocat alterum Athenam, hoc est Mineruam; alterum Nygmaticum, id est puncturam accõmodatum. Minerua quidē ad plures efficitur, quam Nygmaticum conuenit, præsertim cum ulceribus cõsistentes: quoniam magis uaria est, magisque astringentibus insuper pharmacis participat. Nygmaticum uero magis laxat, & hac doloris mitigatus est. Itaque de priore medicamentum ita ad uerbum scriptum reliquit.

Fuscum, Minerua.

Argenti spumæ denarium pondo centum. terebinthinæ denarium pondo triginta sex. ceræ denariũ pondo uiginti quinque. minij sinopici denarium pondo uiginti quatuor. guttæ ammoniaci denariũ pondo triginta sex. chalbani denariũ pondo duodecim. aloes denarium pondo octo. diphrygis tantundem. aris combusti, mastiches, singulorũ denarium pondo sex. aristolochiæ denariũ pōdo quinque. propolis tantundem. mannæ denarium pondo sex. squamæ aris denariũ pōdo sex. lapidis alii denarium pondo trium. trifolij seminis denarium pondo duum. symphiti radices denariũ pondo unius, obolorũ quatuor. olei heminas quatuor. De altero fusco sic ad uerbum Andromachus scripsit.

Fuscum Nygmaticum.

Guttæ ammoniaci, ceræ recentis singulorum denarium pondo octo. terebinthinæ denariũ pondo trium. aris combusti denarium pondo octo. picis aridæ denarium pondo quadraginta, ut Zeno uult minæ dimidium, & quartam portionē. argenti spumæ denariũ pōdo quatuor. aloes indicæ, aristolochiæ, chalbani, singulorũ denariũ pōdo duũ. æruginis denarij pondo unius, alij duũ. thuris denarium pondo duum. olei per hyemem quartam heminæ partem. per æstatem octauam partē. amonia-

tom. 5 T 2 monia-

moniacū ex tribus aceti cyathis diluatur. Jam uero & alia multa cum his emplastra prodidit Andromachus, nihil aliud ipsi apponens quam coloris nomen, quæ constant quidem ex contrarijs facultate medicamentis: sed alia ipsorum laxandi & doloris tollendi uim maiorem obtinent: quædam di gerendi, & attrahēdi, nonnulla astringēdi. Quare nos etiā ipsos omnibus fidentes cōmode uti conuenit, ad ulcera quæ uix cicatricē recipiunt, & cacœthæ, fortius astringentibus: ubi lenire & laxare propuleris magis relaxatibus: ubi trahere & discutere conaris, ijs quæ calefaciēdi uirtute præpollentē habent, quæq; prauos humores in mala affectione ad sese trahūt. Quibusdā et hoc adiectū est, Fuscū simplex quo utor. Tria inquit deinceps talia uaria mixtura descriptis, quorū ipsorū etiā confessionē ipsiusmet uerbis allegare melius esse uideē

Fuscum, simplex, quo utor.

Argentī spumæ denarium uigintiquatuor. ricini heminam unam. æris combusti, mannæ, resinæ, singulorum denarium pondo quatuor. colophoniz denarium pondo octo.

Aliud Isidori ad dolorem sedandum.

Argentī spumæ, ceræ, singulorum denariū pondo triginta sex. olei heminam unam & s. resinæ colophoniz denarium pondo quindecim. squamæ æris denarium pondo nouem. mannæ denarium pondo octo, incoquito.

Aliud quo utor.

Argentī spumæ, resinæ siccæ, singulorum denarium pondo centum quadraginta quatuor. squamæ denariū pondo uigintiquatuor. olei heminas tres. Quemadmodum autem his cōmemoratis tribus adiunxit, alijs quod ipse utatur, alijs quod dolori leniēdo sit, ita de alijs testimoniū perhibuit, theriacas ipsa nominans. Tertium igitur ab initio his uerbis traditum est. Theriaca qua utor. Hanc sequitur alia rursus, cui præscriptum sic est. Eupatoris Theriaca.

3 Verum de Theriacis postea dicemus: nūc autem de Fuscis adhuc quæ prodidit Andromachus dicere cogito, quorum quod uires ille & cōfecturas neglexit, accusandus est. Statim igitur primo omnīū scripto amicus quidam medicus usus est, permulta facienti: etenim ulcera, quæ cicatricem ægre ducunt, præsertim ubi callosa & dura labra ulcus amplectantur, claudūt: prodest etiam putredini, fistulis: sinus iungit, & magna uulnera: summam multiplicis usus est: componentium ipsam pharmacorum symmetria hunc in modum scripta est. Argentī spumæ denarium pondo centum qua draginta quatuor. olei heminas quinque. calcis uiuæ, thuris, æris combusti, terebinthinæ, aristolochiæ, singulorū denariū pondo quadraginta octo. picis, ceræ, ammoniaci, singulorū denarium pondo nonaginta sex. ita quidem Andromachus scripsit: licet tibi etiā minori mixtura ipsam præpare: singulorū quæ numerauimus quartam partem miscendo: fiet enim compositio talis. Argentī spumæ denarium pondo triginta sex. calcis uiuæ, æris combusti, thuris, terebinthinæ, aristolochiæ, singu-

lorum tertiam argenti spumæ partem, hoc est, denarium pondo duodecim. deinde picis, ceræ, guttæ ammoniaci, singulorum duplo maius pondus quam in dictis quinque medicamentis erit, aristolochia dico, terebinthina, thure, ære cōbusto, & calce, quam uiuam & recentē esse oportet. Ita pharmacum etiā ad putrida utile fiet: cum autē Andromachus omnia medicamēta per denarios scripserit, melius egisset, si et olei secundum eandem symmetriam meminisset: ut quod inijceretur, totidem denarios penderet: aut si non hoc, certe conueniebat ipsum Romanorū libræ mentionē facere, nūc autem heminam scribit, consuetam de hac mensura ambiguitatem nobis relinquens, nouem uel uidelicet mensurales uncias, an duodecim esse heminam uelit. Mea quidē sententia, perfecta symmetria sex uncias pōderis capiet: quia Romanorum libra duodecim uncias pendit. Si ex quarta parte componis, nota est proportio, ne clatere arbitror, uel si denarios quis dicat ad absolutā symmetriam quadringentos octoginta assūmū, eo quod ponderalis uncia octo denarijs ualeat. Insuper aliud quoddam inter fusca ab Andromacho positū est, quod & ipsum calcem uiuā recipit, eiusdem cum superiore generis, præponit autem ei. Fuscum Eubuli, & secundum hanc symmetriam præparat. Argentī spumæ pondo libram. ceræ pondo minam. æris cōbusti, æruginis, terebinthinæ, singulorum denariū pondo duodecim. resinæ siccæ denarium pondo sedecim. guttæ ammoniaci denarium pondo octo. thuris denarium pondo duodecim. opopanax denarium pondo octo. olei heminas quatuor. aceti totidem. In quibusdam exemplaribus scriptum est, heminæ dimidium: & rursū dupliciter conficere ipsum licet, scienti copiosius acetum ualentissimum medicamen efficere. Quinetiam aliud Fuscum, cui hoc ipsum præponitur.

Aliud Fuscum.

Refert Andromachus memorabile est hoc pharmacum ex marina præparatū similibus uitijs, quibus præscripta accōmodum. Compositio eius talis est. Argentī spumæ, ceræ, singulorum minæ dimidium. chalcitidis quartam minæ portionē, squamæ æris denariū pondo sedecim. thuris denarium pondo octo. terebinthinæ quartam partē & octauam. (minæ uidelicet) guttæ ammoniaci quartam partem. marinæ aquæ heminam, alij heminæ dimidium. ricini heminas tres. ammoniacū marina mæ ceræ. hæc sanē Andromachus retulit, eatenus cōfectionis mentionē faciens, ut diceret ammoniacum cum marina, prius uidelicet macerandū. De chalcitide uero & squama nihil posuit, quanquæ hæc ex marina leuigari queant, sicut etiam coquit cum argenti spuma, cera, & terebinthina.

4 Ut igitur nullum aliud Fuscū à quouis alio queratis, adijciam alia duo eiusdē autoris. Vocat alterum ipsorum Phthirophagi, quod hæc recipere dicit. Argētī spumæ denarium pondo centum. resinæ denarium pondo quinquaginta. guttæ ammoniaci denarium pōdo triginta. ceræ denarium pōdo quinquaginta. æruginis rasæ denariū pondo quode-

duodecim. Squamæ æris denarium pondo duum. aristolochiæ denarium pondo octo. centaury radicis tantundem. olei heminas duas.

Alterum autem trionis medicamentum ex his constare ait.

Argenti spumæ, picis siccæ, utriusq; pondo denarium centum quadragintaquatuor. terebinthinae, guttæ ammoniaci, singulorū pōdo denarium septuaginta duum. mannae thuris denarium pōdo sexaginta duum. seui utulini denariū pondo centum quadragintaquatuor. ceræ denarium pondo triginta sex. aristolochiæ, æris combusti, æruginis rase, chalbani, opopanax, singulorum denarium pondo nouem. acetii hemine dimidium. olei, & ricini, utriusq; hemina unā & semis. Perspicuum est, terebinthinae, guttæ, & thuris pondus duplo pondere ab argenti spuma, pice, seui utulino, superari uelle. ceræ quadruplo. aristolochiæ, æris ufi, æruginis, chalbani, opopanax sexcuplo decuplo. atq; hoc pharmacum abunde in usum uenit multiplicem, quemadmodum & alia præcedentia, quibus omnibus auida et utendum est.

Hellepontiæ ut Andromachus.

Celebre & hoc emplastrum inter fusca retulit Andromachus hac symmetria. Argenti spumæ denarium pondo centum. picis denariū pondo quin quaginta. ladanii denarium pondo uiginti quinque. æruginis rase denarium pondo octo. æris combusti tantundem. Squamæ denariū pondo duum. olei ueteris denarium pondo ducentorum. Quoniam uero Andromachus ab Hera pharmacii compositione differt, uisum mihi est et Heræ prodita adiungere, quæ ad uerbum ita sonant.

Hellepontiæ per spiratu digerens, phlegmonem propulsans.

Valet ad strumas, panos, parotidas: impositum splenium attrahit, pus maturat, rumpit, conglutinat. In summa, omnibus igne cōbustis benefacit, mitigat etiam podagricos. olei ueteris denariū pondo centū. picis siccæ denariū pondo quin quaginta. ladanii denarium pōdo uiginti quinque. argenti spumæ denarium pondo centum. æruginis rase denarium pondo octo. chalbani denarium pōdo quatuor. Argenti spuma ex oleo trita coquitur. Cum autē coeunt, pix, & ærugo immittuntur: deinde ladanū, chalbanumq; atq; sic in mortarium transfusa, molliuntur, & usui sunt. Quidam ut boni coloris sit, & fuscum, miscet etiam squamæ denarium pondo octo. nam alioqui fit nigerrimum. hoc in podagris etiam non semel usus sum; & cessit felicissime. Oportet autē tædas lignorū loco usurpare. Manifestū est autē uiros inter se dissentire in alijs paululum, in alijs uero symmetria plurimum. Nam duplo copiosius quam Heras Andromachus immittit. Potest itē præparari aliter, cum sciamus, si plus olei iniectum fuerit, diuturniorem fore coctionem innui, ipsūmq; medicamentū magis exiccans futurum: si minus, breui coctionem futuram, & pharmacum inualidius exiccaturum.

Quæ scripsit Damocrates usus multipliæ medicamenta.

Tyrium emplastrum. Cap. IX

Post hæc referam emplastrorum adhaerescientium sine facis, quis usus & confectio.

Galen.

A Ad diuisiones faciunt non magnas bene, Et carnis ipsius ampliora uulnera Medicantur: à quadrupede & morsus corpore Summo: recentes discutiunt furunculos; Quibusq; iam pus est, uapore digerunt. Item auferendo crustas is, celerrime Cicatricem inducunt opera nulla manūs. In fronte posita, fluxus quamproptissime Lippientium cohibent, sola quamuis ceperis. Huius generis, præstantius primum efferam Emplastrum facile inuenitur, cui color bonus Atq; efficaciac, Tyrium nos dicimus. Tyrium colore refert id quod purpuram, Si quo decet modo fiat: sic præpara. Sit libra iniecta quinque lithargyri

B Boni, semel ceræ capiatur, insuper Ter pityinæ pinguis, & non lignea; Aeruginis præstantis æris, chalbani, Aerisq; combusti, pariter squamæ bonæ: Cuiusq; misceto quaternas uncias. Pinguis olei sex, & deceni pondo addito. At curioso emplastrum coquito in hunc modum. Lithargyrum mitte ex oleo leuissimum Fictilem in ollam no uam, sed hanc mafusculam. Vbi conteres manibus, mouebis ac spatha, Deinde flamma acri atq; continua coques. Cum mellis accipit iam spissitudinem, Aerugo & squama miscantur: incoqui Permittito satis: dehinc æs adiungito: Rursus coqui paruo relinquens tempore,

C Paulum defendens ex olla medicaminis. Refrigeratum manibus, & digitis teras, Boni coloris atq; durum ubi conspicias, Sic pityinam, ceramq; reliquis indito. Deinde cunctis rite unitis paululum Stillato rursus: & colorem si bonum Et temperamentum uides, mox tollito Ab igne fictilem, & subactum chalbanum Apponito. si pharmacum sit durius, Multo resolues oleo, faciens sic bonam Temperiem, in aliud inde uas transfundito Frigidum: & subactum manibus ita reponito.

Aliud eiusdem cum superiore generis subijciam. 2

Medetur, ante quos citauit affectibus: Nec est, quod ulceribus malis, diutinis, D Calloq; pressis applicet felicis Cicatricem, etiamq; ore natas pustulas Per sanat absq; rorsione, rhagadas Ani, nodosas durities, callos demit. Sic præpara, lithargyri minam boni. Sed mina libra est, eius & pars tertia, Mina semis probata ceræ ponticæ, & Aeruginis minæ quadrantem rasilis, Atri chamæleontis octauam probi Partem: radix bona est regione Cretica Nascens primum, Cilicia deinde, præter hæc Olei uetusti plusquam mina paululo: Quod si non fuerit, usurpato uel recens. Lithargyron leuem simulq; oleum noua Totum siglina conditum, rudicula Mouens coquito: ubi consliterit, & melinon

Fuerit, adijcito æruginem, ceram dein:
 Qua iam liquente ab igne tollens ollulam,
 Chamæleontis paululum conspergito,
 Vnita cum, frigerataq; quod fatis,
 Transfundito in pilam, post sic reponito

Aegyptium. 3

Aegyptium quod seruat absq; phlegmone
 Diuisa quælibet, contusaq; omnia,
 Quadrupedum morsus cunctorū, & serpentium,
 Item subortas absq; ulceribus phlegmonas,
 Nervos dolentes citra causam, & musculos.
 Laudans hoc Andromachus dabat sodalibus
 Suis, in pharmacis peritus maxime.
 Aiebat esse ter quadraginta quidem
 Denarios lithargyri, & duodecim
 Bis alteros, ceræ quoq; albæ ponticæ
 Totidem, ammoniaci ter viginti lucidi,
 Et duodecim alios, thuris & bis quatuor.
 Squamæ vero aris, & squamæ stomomatis,
 Cuiusq; rursus mixturæ bis quatuor.
 Puræ terebinthinæ ter addas duodecim,
 Octodecim heminas oleiq; ciceos,
 Combustæ totidem fordidæ lanæ heminas.
 Docebat ipsam isto modo comburere,
 Ollæ recenti, quæ sit ore latior,
 Impone lanam copiose succidam,
 Operculum gypso prius uel glutino,
 Vel terra figulari, cui sit commista aqua,
 Illinito, sed largo igne mox comburito,
 Contusa facile quando cribro incernere
 Fuerit, habere recte tunc uidebitur.
 In clibanis quoq; ipsa & in fornacibus
 Ignitis nimium limiliter exurere.
 Ita capiebat tritorum quem est par modum,
 Coquere lithargyron iubet leuissimam,
 Torumq; ricinum: temperatis inuicem,
 Mellisq; facta tandem spissitudine
 Squamæ aspergere, cōcoquere & quantū sufficit,
 Vtq; adeo dum non inquinet, & tunc addere
 Terebinthinam & ceram. dein cum coferint,
 Ammoniacum confectum digitis mollius,
 Posturus ab igne ollam, thus tritum inspergito,
 Penultimum ac lanæ immundæ puluisculum,
 Sed ante thus, pauxillulo aut post tempore.
 Quidam uolentes istud proprio pharmacum
 Dici titulo: squamam reuellunt alteram,
 Squamæ unius bis octo indunt denarios.
 Utuntur aris squama, non stomomatis.

Aliud. 4

Nihil priore peius agit Aegyptio
 Eadem, at melius & quandoq; si confecerit
 Crassum accurate medicamentum quispiam,
 Vtetur ad eadem ipso non improspere.
 Olei libras & ricini quinq; continet,
 Chrysitidisq; argenti spumæ quatuor.
 Squamæ aris terq; sedecim denarios.
 Terebinthinæ præstantis ter duodecim.
 Mannæq; thuris tantundem. pondo duo
 Ammoniaci synceri, ceræ ponticæ
 Albæ duas libras semissem & insuper.
 Coquito oleum, squamam, necnon lithargyron,

A Donec coierint, & color sit optimus,
 Fiatq; satis emplastrum durum; deinde sic
 Terebinthinam pones ceramq;, hinc mollius
 Ammoniacum digitis confectum: postea
 Feruente ab igne ca cabo deposito
 Mannam iniicies iam frigerato pharmaco,
 Frequenter hoc feci citra lithargyron,
 Molybdenæ bonæ pari sumpro modo:
 Vfusq; sum ad quæ dixi iam suauissime,
 Probatorisq; id coloris condidi.

Emplastra ad digerendum & extrahendum. Cap. X

Qui compositorum medicaminum uirtutes descripterunt, emplastra quædam ab extrahendo e.
 pispassica, sicut alia à discutitiō diaphoretica nominantur: alijs utranq; extrahendi, et digerendi facultate adesse testati sunt. Etenim uicinæ sibi uirtutes sunt, eorum quæ in alto latent attractrix, & attractorū digestrix. Nam quæ trahunt, etiā non, nihil omnino discutunt: & quæ discutunt, pariter trahunt. Verū in digerentibus medicamentis discussoria uirtus: in trahētibz attractrix præpoller. Cōstant itaq; attractrices simplicibus pharmacis, quæ humorum superfluitates ex profundo in cutem extimā possunt extrahere. Discussoria ex his constant, quæ attractū possunt suapte natura digerere. Vt autē emplastrum fiat, quemadmodū supra dictum est: huic argenti spuma, illi resina, alij cera, alij oleum, reliquo pix admiscetur, quæ nec insignem digerendi potentia, nec extrahendi continent, sicut uel propolis, uel calx, uel medulla, uel chalbanū, uel asiæ petræ flos, uel spuma nitri, uel aphrositū, uel acerū, uel lixiua stactæ, piper, linapi & struthiū, salesq; tum qui edī possunt, tum ammoniaci: ad hæc pleraq; alia, de quorum facultate in cōmentarijs Simplicium pharmacorū dictum est. Nunc autem emplastra, quæ iam experimento satis probata sunt, exequar: Tantū adhuc ipsis adijciens, quod nonnulli etiam astringentiæ pharmacæ extrahentibus miscuerunt, ueritū quod accidit, ubi humorū superfluitas fuerit. trahunt liquidem plus interim accōuenit: ut non solum ex partícula quæ curatur, attractiōnem in alto, sed etiam ex omnibus uicinis moliantur. Comprehensum est & antea, cum de carnem generantibus facultatibus ageremus, & extrahentiæ & digerentiæ, uelut omnia quæ magis q̄ oportet detergunt, carnis expletia fieri cerati mixtura: In quibus uirtus quidem ualida est, copiosioris: in quibus imbecilla, pauerioris. Quod si cōpositum extrahēdi uel digerēdi præditū potestate medicamentū, astringens quoq; aliquid habeat: tali pharmaco ad carnem generandam, propter uim attractorū utendum non est, quæ ad uulnera glutinanda & sinus tum ad ulcerū cicatricē ducendā utilis est: ad carnis productionē non ita. Dictū mihi est abunde iam de hoc.

Andromachi emplastra ad digerendum & extrahendum. 2

salsum ad multa. 1

Salis communis pondo libras iij. squamæ aris pondo uncias iij. magmatis pōdo felibram. mannæ pondo libram. ceræ pondo libras xiiij. olei cyprini pondo libras xvi. acetum adijcitur.

Aliud

*Aliud Theude Sarcophagi ad cacothē, fistulas, terrea
dines, & strumas. 2*

Resinæ terebinthinae, thuris, ceræ, singulorum pondō uncias iiii. argenti spumæ pondō unciam. quidam auripigmenti e quale pondus pro argenti spuma ponunt. squamæ rubræ pondō uncias iiii. æruginis rasæ pondō uncias viij. salis ammoniaci pondō uncias sex. acetī heminam. Ego amplius capio, nempe olei heminam. uini heminā. acetī sciliciti tantundem.

Aliud ad digerendum Candidi, quo iutor. 3

Terebinthinae pondō libras tres. ceræ pondō libras viij. chalbanī, nitri, lapidis asii, singulorū pondō uncias duas. thuris pondō uncias iiii. medullæ ceruinæ pondō uncias iiii. guttæ ammoniaci pondō selibram. propolis pondō uncias tres. olei lauri pondō uncias sex. seui taurini pondō selibram. Quæ sicca sunt, liquidis admiscendo.

Aliud ad strumas auctore Nymphodoto. 4

Asii lapidis denarium pondō viij. aphronitri tantundem. seui uitulini, calcis uiuæ, singulorū denarium pondō xvi. ceræ denarium pondō xxiii. terebinthinae denarium pondō trigintaduum.

Aliud ad discutiendam bronchocele, hoc est gutturis tumorem, quo Clemes Sertorius curatus est. & ad duritias. 5

Argenti spumæ denarium pondō quinquaginta. resinæ pityinæ denarium pondō quadraginta. olei ueteris heminas x. chalbanī denariū pondō iiii. æris combusti denarium pondō uiginti. guttæ ammoniaci denarium pondō quadraginta. aluminis fisci denarium pondō iiii. mannæ thuris tantundem. ceræ denarium pondō quinquaginta. postremo chalbanum & mannā inijcito.

Aliud ex aspidibus ad discutiendam strumas, item ad podagras. 6

Terebinthinae, lapidis asii, bituminis, singulorū denarium pondō cccix. aphronitri, adipis uitulini, ceræ, baccarū lauri, guttæ ammoniaci, singulorū denarium pondō trecentorum quadraginta. lapidis pyritis denarium pondō octoginta. calcis uiuæ denarium pondō centum octo. aspidum cineris denarium pondō centum quadraginta. olei ueteris heminas ij. postremo cinis pharmaco refrigerato inspergitur: sin minus, perit.

Aliud ad extrahendum Sarcenithæ. 7

Terebinthinae pondō minam. ceræ tantundem. nitri pondō minas duas. bdellij denarium pondō trigintaduum. guttæ ammoniaci tantundem. olei, marinæ, uel muricæ, cuiuscq; heminas duas. minij denarium pondō trigintaduum.

Aliud Ctesiphontis, quædā dissoluens, quædā cogens & extergens. 8

Aphronitri pondō libram. mannæ thuris pondō libram. lixiuæ fractæ pondō libram. quidam etiam acetī librām addunt.

Aliud ex sale, ad extrahendum. 9

Salis cōmunis denariū pondō lxxx. cerussæ tantundem. olei ueteris heminas tres. atramenti futuri denarium pondō xxiii. acetī cyathi dimidium.

Aliud ex sale aliter. 10

Cerussæ, salis cōmunis, singulorum denarium pondō quinquaginta. olei ueteris heminas viij. aristolochiæ denariū pondō viij. propolis denarium pondō decem. hoc Silo commendabat.

A *Aliud ex terra pelagiæ ad digerendum. 11*

Argenti spumæ pondō minas quatuor. terræ pelagiæ, salis ammoniaci, cerussæ, ceræ, singulorum quartam minæ portionem. acetī heminam. olei heminas quatuor.

Aliud Cyrti ad attrahendum. 12

Iridis illyricæ, mannæ, terebinthinae, aphronitri, pumicis, singulorum denarium pondō quinquaginta. guttæ ammoniaci denarium pondō uiginti quinq;. chalbanī denarium pondō sedecim. canchryos denarium pondō duodecim semis. ceræ denarium pondō centum. alij octo. olei heminam.

Aliud ex radiculis. 13

Resinæ, nitri ruffi, ceræ recentis, baccarū lauri, colophonæ, seui uitulini, guttæ ammoniaci, singulorum denarium pondō septuaginta. cyprij decimam sextam heminæ partem, nonnulli autem uisci denarium pondō quinquaginta.

Aliud atrabens, Harpalum. 14

Guttæ ammoniaci denarium pondō viij. ceræ, iridis, mannæ, pipēris, sulfuris uiui, pumicis, singulorum denarium pondō quatuor. terebinthinae denarium pondō octo. olei parum.

Aliud atrabens Harpalum. 15

Terebinthinae pondō minas octo. pumicis denarium pondō quindecim. nitri denarium pondō sedecim, guttæ ammoniaci tantundem. ceræ denarium pondō quatuor. minij quod possit ea colora re arida cum aceto subiguntur.

C *16 Aliud. Sinapeos denarium pondō quatuor. nitri tantundem. ceræ denarium pondō viij. terebinthinae denariū pondō triginta. baccarū lauri, calcis uiuæ, singulorum denarium pondō quatuor. olei decimam sextā heminæ portionem. cyprij denarium pondō viij.*

Aliud ad pus discutiendum. 17

Ceræ, terebinthinae, resinæ, picis siccae, seui uitulini, nitri ruffi, baccarū lauri, calcis uiuæ, pumicis, guttæ ammoniaci, singulorū æquale pondus.

Aliud Codami Regis. 18

Ceræ, nitri ruffi, resinæ frictæ, singulorum denarium pondō centum. guttæ ammoniaci, propolis, singulorum denarium pondō uiginti quinq;. uisci quercini denarium pondō duodecim semis. olei sextarium. lixiuæ fractæ tantundem.

Aliud discutiens meliceridas. 19

D Olei ueteris denarium pondō c. argenti spumæ denarium pondō nonaginta unius. guttæ ammoniaci, chalbanī, utriuscq; denarium pondō xix.

20 *Aliud. Argenti spumæ denarium pondō centum. salis cōmunis denarium pondō sexaginta. olei ueteris heminas sex.*

Aliud atrabens & digerens ad multa uilite. 21

Argenti spumæ, cerussæ, chalbanī, singulorum pondō libram. salis fossiti, æruginis rasæ, singulorum selibram. olei sextarios tres. atramenti futuri pondō uncias duas.

Aliud ad digerendum ex struabio. 22

Argenti spumæ pondō libras duas. olei pondō libras tres. cerussæ, picis, terebinthinae, singulorum pondō uncias quatuor. ceræ pondō uncias duas. mannæ pondō uncias tres. aristolochiæ pondō un-

cias duas. struthij tantundem. gallæ pondo uncias tres. uini boni heminas tres. uinum ultimum infundito.

Aliud ad digerendum, ut Scribonius. 23

Argenti spumæ pondo quinq; olei pōdo quinq; que. pityinæ sicca pōdo quinq; propolis pōdo octo. uisci de quercu lecti pōdo quadrantem.

Aliud trahens & digerens. 24

Ceræ nouæ, resinæ pityinæ sicca, nitri, singulorum denarium pōdo centum. olei heminas tres. nonnulli thuris denarium pōdo centum. lixiuæ factæ heminas tres. Ad duritias, guttæ ammoniaci denarium pōdo duodecim misceto. chalbanii tantundem. æruginis rasæ, uisci de quercu lecti paria pondera.

Aliud ad frumas Mutiani quo utor subinde. 25

Terebinthiæ pōdo unum. ceræ pōdo viij. propolis pōdo unum. chalbanii pōdo viij. uisci de quercu lecti pōdo viij. His liquefactis, fæcis combustæ uncias duas inspergito, aphronitri pōdo viij. Deinde ubi carbonibus imposueris, olei heminas tres inijceto, postea sublatis, cucumeris agrestis radicis unciâ inspergito, gladioliradicis uncias quatuor. asii floris tantundem.

Aliud Antipatri. 26

Nitri, terebinthiæ, olei ueteris, singulorū pōdo libram. aquæ sextarium, & amplius, ubi cocta non ebullierit, immittito guttæ ammoniaci pōdo uncias duas. chalbanii pōdo unciâ. bdellij pōdo unciam unam. thuris pōdo uncias duas. sandarachæ pōdo uncias duas. lapidis asii pōdo unciâ. duas. Asii & sandaracha ex oleo pauco leuigantur, liquabilia raduntur, & aridis miscentur.

Aliud ad digerendum Antipatri. 27

Molybdænæ pōdo denarium trecentorum. ceræ denarium centum quinquaginta. terebinthiæ denarium pōdo triginta. chalcitidis denariū pōdo sex. chalbanii denariū pōdo viij. myrrhæ denarium pōdo viij. mannæ denarium pōdo viij. olei per hyemem heminas quatuor. per æstatē iij.

Aliud Xenocratis, dolorem sedans, ad digerendum, ut Castus, medicamen Polythomi ad podagram. 28

Cerussæ denarium pōdo centum quinquaginta. ceræ pōdo tria. terebinthiæ denarium pōdo triginta. aphronitri denarium pōdo triginta. olei ueteris heminas tres.

Aliud ad digerendum meliceridas, Alexandri. 29

Salis Hispani, argenti spumæ, cerussæ, singulorum pōdo libram. ceræ pōdo unciam. terebinthiæ tantundem. chalbanii & opopanicis pōdo uncias duas. sinapeos pōdo uncias sex. olei ueteris pōdo tria. acetii sextarios viij.

Aliud Sanitas, digerens, & extrahens, ad mammillas ex uisco. 30

Argenti spumæ pōdo libras duas. olei pōdo libras duas. uisci quercini pōdo tridentem. gallæ tantundem.

Aliud pus uacuans sine rupturâ, ut Asclepiades. 31

Resinæ pōdo libras duas. ceræ pōdo libras duas. nitri pōdo libras viij. butyri pōdo libram. adipis leonini pōdo libras sex. olei ueteris pōdo libram. simul liquefacito, quotidie emplastri modo imponens medicamentum, utitor.

Aliud expressorium, humores & abscessus, maxime in genu, & articulantibus sine incisione extrahens: a phlegmone presertim: uulneribus utiliter admouetur. 32

Plumbi scorizæ terebinthiæ, singulorum denarium pōdo centum. olei ueteris heminas duas, postremo resinam.

Aliud digerens, cutem rumpens, cicatricem ducit, humores eloccat, quo utor. 33

Visci quercini denariū pōdo sexaginta. picis denarium pōdo quinquaginta. guttæ ammoniaci denarium pōdo centum. ceræ denarium pōdo quinquaginta. resinæ frictæ denarium pōdo quindecim. lapidis pyritis denariū pōdo decem. chalbanii denarium pōdo viij. manne, iridis illyricæ, eachryos, stercoris columbini, singulorum denarium pōdo iij. alibi & mellis heminas quatuor.

Que scripsit Asclepiades attrahentia. 3

Album attrahens, facit ad frumas, & particulares abscessus, curat fistulas, & ægylopas, ut sine incisione liberet, ualet ad rheumatica, & curatu difficilia, benefacit hydropicis. Argenti spumæ, cerussæ, salis, singulorum denarium pōdo octoginta. olei ueteris sextarium. Sal, cerussæ, argenti spumæ ex oleo ipsi adiecto teruntur, deinde cum oleo mista, & in uas fictile confecta coquantur, mouenturq; assidue, donec nō inquinent. Dehinc in mortarium transfusa, rursusq; tunc excipiuntur, & uti sunt. Aliud. Argenti spumæ denarium pōdo centum. salis denarium pōdo quinquaginta. olei heminas tres. ceræ denarium pōdo quinquaginta. terebinthiæ denarium pōdo duodecim.

Aliud. Mannæ denarium pōdo sedecim. aluminis scissi denariū pōdo viij. olei ueteris heminas duas. Aliud. Argenti spumæ pōdo libram. cerussæ pōdo libram. salis fossi iij pōdo libram. ceræ denarium pōdo quinquaginta. terebinthiæ denarium pōdo uiginti quinq;. mannæ denarium pōdo sedecim. aluminis scissi denarium pōdo viij. olei ueteris heminas duas & semis.

Aliud Lucij ad predictas dispositiones medicamen compositum, sicut ad ulcera rheumatica, diuturna & vix sanabilia.

Argenti spumæ, cerussæ, salis ammoniaci, atramenti sutorij, pityng, singulorū denariū pōdo c. olei ueteris sextarios iij. acetii sextariū i. ceræ denarium pōdo quinquaginta. preparato ut supra dixi.

Aliud salubre pharmacum ad prædictos affectus compositum.

Argenti spumæ, cerussæ, salis, aluminis liquidi, singulorum denarium pōdo centum. olei ueteris sextarios decem. acetii sextariū unum. ceræ pōdo selibram. resinæ terebinthiæ pōdo selibram. conficito ad modum predictum.

Aliud nigrum attrahens.

Valet ad frumas, parotidas & particulares abscessus, dissoluit omnem duritiæ, præstat item maglatis boni uicæ, sicut usus est Antonius Hebraeus: ite facit ad articulorū uitia. Salis fossilis pōdo libram. argenti spumæ pōdo libram. strigmeti purissimi pōdo libras quatuor. chalbanii denarium pōdo quinquaginta, salem & argenti spumæ conterito: deinde strigmeto adiecto studiose rursus tūdito: in uas fictile cōiecta, igniq; supraposita coquito, mouens sine requie, & cum nō amplius in-

quinat, ab igne deposito, chalbanum ligneo pistil-
lo nuncum addito. ubi soluta fuerint, in pilam tras-
fundito, ibiq; contulsis utitor.

Aliud quo usus est Andromachus.

Facit ad strumas, parotidas, mammarū duritias,
particulares abscessus, contentū humorem extra-
hit, sinus iungit, iuuat fistulas, ægylopas, facit ad flu-
entia ulcera, uetera, & uix sanabilia. Cerussæ, salis
folsitij, singulorū denarium pondo octoginta.
aramēti futorigi denariū pondo duodecim. olei ue-
teris heminas tres. aceti heminas quatuor. salem in
tenuissimum puluerem redactum cerussamq; ex
oleo coquito, ac dum nō inquinat moueto. ubi he-
re habuerint, depositis ab igne, atramentum futori-
um aceto tritum inmittito, & exiguum cōtinue
inspergens, caue ne effervescat: deinde in morta-
rium transfusa, rursusq; tumsa excipito, & utitor.

Que scripsit Asclepiades discipulientia, ex illius uerbis. 4

Tumoribus dissolutis, & in humorem digestis,
infra scriptæ compositiones conueniunt.

Cerine Ctesiphontis.

Valet ad strumas, ganglia, parotidas, māmaram
abscessus, ut nullum aliud pharmacū tumor es re-
soluit, & quicquid humidi continetur, rarefacien-
do elicit, sinus glutinat, iuuat fistulas & ægylopas,
ut citra incisionē liberet. Est etiam malagma utile
coxarū, id est coxæ morbo laborātibus, podagricis,
arthriticis, post accessiones impositū toto affe-
ctu leuat. Hec recipit. Ceræ, terebinthinæ, nitri,
olei ueteris, singulorum pōdo libram. aquæ hēmi-
nam. nitrum & aquam terito, ut ex toto soluātur;
& in uas fictile coniecta igni imponito, uase coo-
perto coquito, ex interuallis moueto. Cum autem
strepere adeo desierit, liquabilia inijcito, mouens
assidue, donec non inquinēt: in mortarium trans-
fusa rursus tundito, inde excipiens utitor. Vel hac
ratione preparatur: quæ liquari possunt, liquefaci-
mus: & cum dissoluta fuerint, nitrum ex aqua leui-
gatium adijcimus: idq; paulatim mouentes assidue,
cauentesq; ne effervescat.

*Alia quo usus est Menecrates, precipue in strumis et mammarum
duritie. quippe perforat eas, & contentum humorem
excernit; sinus iungit, & ad cicatricem perducit.*

Ceræ, resinæ terebinthinæ, resinæ lignosæ, chal-
bani, olei ueteris, aphronitri, singulorum pondo li-
bram. ficulnei cineris sextariū, qui pendit uncias
uiginti. resinas in uas aretū aut fictile iniectas, igni
que impositas liquefacito. ubi percolaueris quan-
tū satis est chalbano emolliēdo, postea liquabilia
simul mista quousq; nō inquinēt coquito, deinde
ab igne repolita refrigerari finito, & his aphroni-
trum adiungito, mouens continue, & contusa ci-
neribus leuissimis inijcito. postquam permiscue-
ris excipito, & utitor. quinto quoq; die soluto, de
inde tertio, donec tumores forati fuerint: postea
quotidie inter curandum soluto.

*Alia ex aphronitro, à quibusdam Dionysia dicta, pharmacum ad
predictos affectus compositum, quo usus est Largus.*

Ceræ, terebinthinæ, mannæ, aphronitri, singu-
lorum pondo libram. olei sextarium. aquæ lixiuij
pileatorij sextarium. misyos crudi pondo uncias
ij. componito sicut dixi.

Aliud ex asio medicamentum, ad predicta uitia compositum.

Ceræ, terebinthinæ, nitri, singulorum pondo li-
bram, thuris selibrā, lapidis asii floris, olei cyprini,
utriusq; selibrā. aquæ lixiuij pileatorij quod satis
est. arida cum aqua pileatoria dissoluuntur, ut sor-
dium crassitudinē habeant, & studiose leuigantur;
que liquari possunt, liquefiūt, & refrigerant, tritis
inmittunt, ubi cōtuderimus, excipientes utimur.

Aliud Asianum Neapolite, sicut ad eadem.

Ceræ pōdo lib. s. nitri rubri pōdo lib. lapidis
asii floris pondo lib. s. mannæ pondo selib. myrrhæ
pondo uncias tres. olei ueteris pondo lib. aquæ
pileatorie heminam. preparatur superiore modo.

Aliud ad idem.

Ceræ, terebinthinæ, singulorum denariū pondo
centum. nitri spumæ, olei ueteris, mannæ thuris, sin-
gulorum pōdo libram. lapidis asii floris pōdo seli-
brā, chalbanij, propolis, guttæ ammoniaci, singulo-
rū denariū pōdo xij. aquæ pileatorie quod sufficit.

Aliud gulum ex libris Democratis, eadem efficiens.

Argēti spumæ, cerussæ, salis folsitij, singulorū pō-
do lib. minij sinopici pōdo selib. ceræ pōdo unc. ij.
terebinthinæ totidē. olei ueteris heminas ij. aceti
quātū sinopico soluēdo sufficit. cōficito ut supiora

Aliud ad eadem.

Argentij spumæ, cerussæ, salis folsitij, singulorū
pondo libram. minij sinopici pōdo selibrā. ceræ
pondo uncias iij. chalbanij pōdo uncias duas, resi-
næ terebinthinæ tātundē. olei ueteris heminas ij.
aceti quo rubrica dissoluatur: conficito ut dixi.

Aliud ex mastiche ad eadem.

Ceræ pondo lib. mastiches, mannæ thuris, sino-
pidis, aphronitri, singulorū pōdo selibrā. olei myr-
tei pondo uncias tres. marinæ aquæ uncias tres.

Aliud Neapolite ad eadem.

Argentij spumæ, cerussæ, salis folsitij, singulorū
pondo libram. minij sinopici, ceræ pityinæ, singu-
lorum pondo selibrā. chalbanij pondo uncias du-
as. olei heminas tres, aceti quantum satis est.

Discussoria scripta à Damocrate. 5

Ad digerendum melinum emplastrum efficacē
Infantium strumas non ueteres, insuper
Et duritias musculorum, item & cutis,
Et phlegmonas, quæ durant multo tempore,
Carnem replet, ducit cicatricem probe.
Sic conficitur. Excellentius lithargyri
Plerunq; libram. item cerussæ selibrā.

D Ad hæc receptat pondo libram quoq; noui

Pinguis olei. immissa ast ollæ lithargyrus
Ex oleo coquitur, ubi iam spissitudinem
Habet sordis, leuem cerussam tum capit.
Cum non inficiens, temperie & bona admodum
Pauloq; durius uideris, inmittitur
Cera, & pityina, quibus liquatis ollula
Ab igne feruens tollitur: tunc protinus
Ammoniacum, tum cera manibus ut solet
Atq; digitis subacta, iuxta ignem inditur.
Postea mouetur pharmacum rudicula,
Rursusq; mollitur manibus, sic conditur.

Aliud.

Aliud ad omnia hæc: strumas ipsas uero
Magis resoluit, & laborantes iuuat.

Præcordia ne abscessus, quibus est cautio,
 Tumore quopiam atq; metu exerceat.
 Hunc obtinet confecturam, nigrum quia est.
 Picis humidæ, siccæ, pondo libras duas.
 Densiq; vitrei, duas bituminis,
 Fricta pityinæ quatuor. ceræ capit
 Tres, thuris unam libram & partem tertiam,
 Squamæ aris uncias pariter bis quatuor,
 Recentis olei communis quinque uncias.
 Thus, squama teritur, quibus aceti apponitur
 Mensura iusta. ut curioso trita sunt,
 Et crassitudinem mellis tenent, coques
 Ceram reliquaq; tum simul oleo nouo;
 Et sic leuigatis calida suprafundito.
 Vbi diligenter manibus omnia robore
 Commisueris, contectula pelle condito.
 Nam exasperatur, crustula atq; obducitur.

Damocratis compositiones ex sale, discussorie.

Hoc preparato simul, ut præstans pharmacum.
 Bonæ cerussæ, & argenti spumæ bonæ,
 Cususcq; pondo, denasq; salis uncias.
 Omnis uero est sal albus multum pharmaco
 Futuro utilis. atqui longe præstantior
 Ammoniacus confectus & purus mari,
 Et tres uetusti libras olei pondere.
 Oleum coquito, reliqua & trita simili modo
 Quò duriora aduscq; sint malagmate;
 Nam seposita multo remollescunt magis.

Aliud.

Aliud melius, nam duritias discutit
 Cunctis ualentius inueteratas nitit.
 Et bronchocelas, & magnas meliceridas.
 Et contumaces strumas, necnon ancylas.
 Sic conficitur. Libram salis leuissimæ,
 Tenuis, duas cerussæ, tot at chalbani
 Fac uncias, totidem puræ propoleos.
 Aristolochiæ binas pariter uncias,

ARGVMENTA CAPITVM LIBRI VII.

Cap. I. Malagmata quæ dicuntur : q̄ mediocriter ca-
 lida sint, in hum. & sicco temperata, uel parum ad alte-
 rrum uergentia, dummodo calidiuscula sint. Metho-
 dus curandi indurata: & q̄ alij discutiētia mollientibus
 commisceant, uel æquo pondere, uel alterutris præua-
 lentibus. Quod ipse his facultatibus, non simul in uno
 medicamento, sed alternis utatur. Fortia cum infirmis
 componenda. Materia & gradus mollientium medi-
 camentorum, id est quæ magis, quæ minus molliant.

2. Scirrhus durus & sine dolore est, phlegmone do-
 let: medius inter eos affectus (qui scirrhus phlegmono-
 des uel quæ dici potest) non dolet nisi cum tangitur.

De differentia magnæ & paruæ phlegmones aut du-
 ritiei. II. De usu parygii, ad duritiem cum phlegmo-
 ne aliqua: Quod parua phlegmonæ medeat, si recen-
 tissimum fuerit: duritiei uero, paulo uetustius cōuenit,
 idq; eo magis, quò durior tumor & à phlegmone dolo-
 req; alienior fuerit: medijs medio modo. Cerælon &
 alia parum mollientia paruas phlegmonas sanant: ma-
 gis mollitæta, paruas duritias sine phlegmone: quæ ma-
 xime molliant, maiores duritias scirro finitimas, ut me-
 dullæ, bdellium, styrax, ammoniacum. Et plura singul-
 latim de styrace, ammoniacum, adipibus, medullis.

2. De resinis. Siccitæia aduersari mollitibus. Thus,
 scœnogræcum. Oleosa quæ sint, nempe calida & hum.
 cum quadam uiscositate. Ammoniacum, propolis, gal-

A Præstantis olei libras annosi duas,
 Crassissimum si fuerit, addes alteram.
 Coquito similiter, temperatumq; probe
 Ab igne tollito, leuigatam tum quoq;
 Aristolochiam insperges, inieceris ubi
 Mollita, propolim scilicet atq; chalbanum.

Aliud ad digerendum Damocratis ex calce uisæ.

Valde bonum strumas soluit per halitum.
 Omnem tumorem reprimat, necnon hepatis
 Vel splenis affectus aquosos curat, &
 Excretionem urinæ ualde promouet,
 Et inueteratos dissoluit coxendones.
 Nempe Vlpianus hoc iuuenis industrius
 Utens auxiliabatur ægris plurimis.
 Sed continet libram ceræ unam ponticæ,

B Vnamq; frictæ, præterea unam pityinæ,
 Calicis recentis uisæ quoq; pondo unciam.
 Aluminis fisis similiter unciam.

Aequale pondus arsenicisq; pontici,
 His suauolentis paulum aceti affundito.
 Maiore tere in mortario quoad fit satis,
 Ceræq; resinæq; miscens paululum
 Olei, liquato flamma ignis quamacerim,
 Ac temperans omnia, faciens malagmata.
 Nec pharmaci inquinantis crassitudinem
 Reponito, utens excipe nouo splenio.
 Aiebat optimus medicamentum pater
 Morbis diuturnis præsidium suscipi
 Istud bonum: quibus item longa uisceri
 Cuiuslibet inflammatio præcordia

C Induruerit, auxiliari uel maxime.
 Quippe id sudores excitat, præcordijs
 Duritiem tollit, morbos soluit protinus.
 Retenta naturalia diu menstrua
 Paucis diebus adeo impositum prouocat.
 Nos calce dempta duplum alumen indimus.
 Et melius pharmacum erat, haud facies pustulas,

banum, opopanax. 3. Quomodo utendum sit prædi-
 ctis: & de ipsa chirurgica administratione. Balnea, pro
 positio deinceps dicendorum. III. Mollientium qua-
 tuor gradus determinat, & primum enumerat ea quæ
 primi sunt ordinis. 2. De gradibus secundum qua-
 tuor primas qualitates: q̄ quædam ambigere uideantur
 inter finem præcedentis & sequentis initium. Et q̄
 multa experiētia in singulis opus sit, ad exacte pronun-
 ciandum de gradibus simplicium. 3. De secundi or-
 dinis malactico emplastro Mnasæ, quod constat oleo,
 lithargyro, & adipe uiuillo: & quot eius differentia esse
 possint, pro simplicium ætate, & pondere, istdem aut di-
 uersis. 4. Vnius pharmaci compositionē unam non
 omnibus cōuenire, sed alijs aliam: proinde nullam sim-
 pliciter præferendam esse. Quod Andromachus Mnasæ
 emplastrū hapalen inscripserit. Eundem reprehendit,
 q̄ uires & differentias remediū secundum mæ-
 gis & minus non adscripserit. IIII. De malagmatis
 suis emplastris mollientibus, quæ Aesclepiades perscrip-
 sit, numero 9. Ex quibus quartum inscribit Lucij ma-
 lagma, quod naldidissimum & ultimi ordinis esse dicit:
 & quid Heras ab Aesclepiade in eius compositione uar-
 riet, prolixè ostendit: demum uires eius & aliorū in hoc
 capite præscriptorum ostendit: & Incidentia quædam mi-
 scenda ad scirrhos. 5. De opopance & aceto cum si-
 mo caprino, quæ septimū mox pharmacū ingrediunt.

7. Vide parte 5. 8. Aliud quod simplicia pharmaca admodum calida, attenuantia, & incidentia recipiuntur autem emollit. V. Malagmata ab Andromacho scripta, numero 38. ex quibus septimum decimum polyarchij nomine, triplici compositione describitur.

VI. Damocratis malagma fenarijs conscriptum.

VII. De pharmacia chalafticis: & primum, q̄ sic uocentur quæ partes intensas relaxant: ut malactica, quæ duras molliant. In phlegmonis tenditur cutis, uel propter tumorem subiectum, uel simul & ipsa inflammata.

Prima differētia remediūm scirrhi & phlegmones. Phlegmonæ & duritiæ quid idē, quid diuersum. Scirrhus, alius est purus & sine sensu, qui solis ualde discutientibus & attrahentibus, quod in phlegmone non licet, curatur: alius cum sensu aliquo, per mediocriter discutientia curandus. Quomodo phlegmonæ & erysipelas durecat, si pharmacia nimis seceat, refrigeretur, astringatur. Altera curationis differētia: Lenioribus in phlegmone uerendum. Fortibus enim & dolor irrita retur, & attraheretur materia. Triplex differētia remediūm ad phlegmonas, & de materia chalafticorū.

2. De Menecratis libro Autocrate monogrammato: & Damocratis laus, qui remedia ueribus scripserit, ut depraurari nequeant. VIII. Damocratis fenarij de Menecratis emplastro diachylon. Periphrasis accidentiū in uulnere musculi uel nerui. Ad podagricos. Simplicia & apparatus. 2. Eiusdem alia confectio, radibus maluz adiectis. 3. Adhuc de eodem. 4. Alia compositio ad eosdem affectus. IX. De acopis. De nomine & uario usu acoporū: & quod olim hoc uocabulum uim medicaminis significauerit, iam uero constantium tantum: quæ in acopis omnibus humida est. Pharmacorū secundū consistentiā differētiā, liquidis si-

num est cereæxon, minus minusq̄ cerata liquida, hapala, amylynta. Acoporū differētia nomina à diuersis facultatibus. Oleum, simplicissimum acopum: primum oliuarum, deinde raphaninū, sinapinum, selaminum, iliaceum, &c. Cateri ad profundas & uehementiores lassitudines, relaxantia quadam & modice cassaficientia miscentur, ut galbanum, resina. Chrima acopon elatinū. Adipes. Duris corporibus acopa fortiora conuenire: mollibus, mitia. Myracopa, id est acopa odorata. X. Acopa & myracopa Asclepiadis, numero 40. Ex quibus nonū dydodes cognominatur, à galbani odore puto: cui simile est & re & nomine septimum Andromachi sequente capite. Pharmacum 23. & reliqua deinceps ad sinem usq̄ capitis, omnia ferè faciūt ad podagricos, arthriticos, ischiaricos: quanquam & præcedentia plerq̄ ad easdem & alias neruorum ferè affectiones, commendantur. XI. De acopis Andromachi, numero 21. quorū aliqua nihil ab Asclepiadis acopis differunt, nisi pondere simplicium. Septimo dydodes cognominato, simile esse diximus re & nomine nonum Asclepiadis in præcedente capite. XII. Glenci ni descriptiones 4. & primo secundū Andromachum.

2. Secundum Critonem. 3. Secundum Dioscoridem. 4. Secundum Heram. XIII. Acopa 4. ex libris Heræ. XIII. Damocratis acopa 4. fenarijs per scripta: Et primum quæ nam acopis omnibus communes sint facultates. Simplicia acopi quod diamelitos dici potest (licet diuersum ab eiusdem nominis acopis quinto & sexto Asclepiadis, cap. 10. supra positis.) Eiusdē apparatus & usus. 2. Chloracopi cuiusdā (quod ab euphorbio denominandū uidetur) usus, cōpositio, & apparatus. 3. Aliud parabile. 4. Myracopi ex fæctæ, & opobalsamo, etc. & uariæ eius confectioes.

GALENI DE COMPOSITIONE

MEDICAMENTORVM PER GENERA

Liber septimus.



MALAGMATA uocant medicici, quæ partes præter naturā induratas emollunt, calido omnia temperamēto medio cri prædita, non tamen exiccantia, quemadmodum nec humectantia manifesto. Nam cum exacte molliētia medi-

dium quodammodo ordinem inter humectantia sic cantiaq̄ sortiantur, indurescentium substantiæ ueluti fusionem quandam molliunt. Nominantur autem molliuia, licet in alijs paululum ad siccādi humectandiq̄ uirtutem inclinēt, si modo subiectā partium quas cōtingunt, substantiam queant diffundere, quod nimirum propter moderatū in eis calorem accidit. Ac quod ubi durities diffusa fuerit, digerentium medicamētorum usus ueniāt, in tertio De simplicium facultate medicaminum, et in decimo quarto Therapeutices methodi libro comprehensum est. Indurescentia igitur quæ ex methodica seu rationali arte non curata scirrhum contrahunt, optime curabuntur, si medicus spectet, quantum egrī corporis substantia à mediocri humiditate, ac liccitate, recesserit, quemadmodum etiam si affectus constitutionem quatenus sit aucta inspiciat: præterea consideret inter ipsa pharmaca quæ magis, quæ minus emolliāt. Huc nanq̄ spectant primus usus emollientis medicaminis,

cōiecturalis quidē erit, sed cum artificio. At post unum aut alterū diem num intēdere medicamenti uirtutem, an remittere conueniat, intelliges, ut in prioribus & medendi Methodo dictū est. Quæ propter medicici digerentia pharmaca cōposuerūt, ceu scopos ambos sibi proponentes, tum ut partīs duritiem quæ iam in scirrhum degenerat, diffunderent; tum ut per halitum digererent, non uicissim, utroq̄ utentes, quemadmodum me frequenter facere conspiciatis: uerum semper duo ipsa composito medicamine molientes. Notum porro est omnibus, in mistura uel emolliantia, uel digerentia esse copiosiora, tū maioris minorisq̄ rationem in ipsis esse non exiguam. constat quoq̄ subinde paria facultatibus misceri: ac necesse est, sicut in alijs medicamentis, ita in his etiam, si probe mederi cupias, plura eiusdem generis pharmaca uel certe duo habeas, ualidissimum puta totius generis, & moderatissimum, ut ex facta ipsorum mistura diuersa & conuenienti, multa quæ intra summa contineantur medicamina efficias. Non enim pingue eandem uirtutem obtinet quam bdellium, styrax, & gutta ammoniaci: quemadmodum nec inter ipsos adipes anserinus, & gallinaceus, uel pardii, uel leonis, uel hyænæ, uel alterius cuiuspiam animalis. Nam secundum animalis temperamentum, etiam adeps est, nempe calidiorum magis ex calcasto, siccorum uero euidentius siccat. At uul-

gus medicorum nouit leoninum adipem in utroque, calfaciundo dico & digerendo, longe esse ualentissimum. Proximū locum habet pardī adeps, adeo ut parū emolliat, minore autem in calfaciundo digerendoque præditus uirtute est anserinus, habetque plus quiddā in mollitudo: pari spatio ab hoc recedit adeps gallinaceus. Hi igitur omnes tenuiorum partium substantiam inter quadrupedā animantia obtinēt. at differentia rursus permagna in illis est, cum nullus quidem mollissimus ac humidissimus, eoque aliorum imbecillimus sit, ut teneris corporibus conueniat, cuiusmodi habent mulieres, pueri, eunuchi, & uiri delicatiores, in umbra, ocio, & frequentibus potabilis aque balneis, effe minati. caprarum uero & boum pingue quanto sullo est ualidius, tanto magis corporibus, natura durioribus, & inter duriora scirrhosioribus conuenit: taurorū hircorumque, in ualidioribus, tum corporibus, tum affectibus proficit.

2 Eadem uero & alijs in minoris maiorisque ratione inter se est differentia. Porro ab imbecillioribus auspicabor, si prius de duritie, ac scirrhī affectu quædam prælibaero. nam cum phlegmone laborantibus & indurescentibus cōmune sit accidens, digitis prementibus reniti, distinguitur affectus, doloris sensu & indolentia: hoc enim non amplius utriusque cōmune est. Quemadmodum uero in alijs omnibus quæ suapte natura recidere in se mutuo possunt inest confinium utriusque aliquatenus particeps, ita quoque tumorū phlegmone laborantium, cum scirrhīs absque phlegmone, quales induratis accidunt, mediā quædam est dispositio, doloris quidem expers, si non digitis imprimas, dolēs autē si id facias: quæ clarioris breuiorisque disciplinæ gratia, uel phlegmonē scirrhosam, uel scirrhum phlegmonoden dicemus, non hic tumoris magnitudinē animū attendentes. Nam phlegmone & scirrhū formæ affectuum nō quantitatis in altero ipsorum nomina sunt: cum phlegmone uel propter partē inflamatæ magnitudinem, uel ob tu morē præter naturā magna euadat: parua autē, cū aut paruum locum possidet, aut exiguū tumorem habuerit. Dicet nunc mihi parua phlegmone scirrhique parui curatio, sicut & magne magnique, per affectuum speciem, hinc enim & aliorū quæ magna & parua dicuntur curationis notio intelligitur. Itaque magna phlegmone cataplasmatas ac humidis quibusdā medicamentis sanatur: parua cum scirrhosa durities mista fuerit, itidem cataplasmatas; interim uero medicamentis cerati modo cōfectis & liquidis, insuper & emollientibus emplastris. Talibus autē & parua durities tollitur, sed in hac quidē simplex scopus, quemadmodū & phlegmone consistente est: cum uero durities phlegmonodes quipiam habuerit, cōpositus quoque scopus efficitur.

De medicamento quod quia liquidum est, Parygron Greci appellant. Cap. II

Acideo quoque medicamen quodammodo compositū est, ueluti et hoc quod Parygron nominant omnibus cognitum: magnificè uero cum ab alijs quibusdā, tum Hera cōmendatū. Medetur enim

A id particula parua adhuc phlegmone cōsistens, non multo post confectionem tempore, sed protinus impositū: ubi uero duritiem a dolore alienam pars affecta acquisierit, uel paulo recenti uetustius utile est: quæadmodū etiam si phlegmonodū affectu omnino sit libera, melius in ea uetustius medicamentū proficit; enim uero medicamentū tepus pro duritiē intentione uidelicet equaliter augere conuenit, & si partē ualde induratā, ne uetus quidē pharmacū emollierit. Quippe uaria hoc Parygrū dictū medicamentū quoque promittit, & potest; quoniam materiam mistam quoque seu uariā obtinet, siquidem adeps suillus & cera mollientiū sunt imbecillima; argenti spuma uero & cerussa nihil habent quod emolliere possit, quemadmodū antea didicimus. Porro Heras quæ pharmacū hoc omnium maxime laudauit, ex hisse ipsum conficit his uerbis. Adipis suilli recētis curati pondo uncias quadraginta quatuor. ceræ pondo uncias uiginti quatuor. cerussæ pondo uncias sex. argenti spumæ tantundem. quæ liquari possunt, siccis superfunduntur: temporis autem spatio medicamentū cōsistit, spissaturque. Sicut ceram & adipem suillum imbecillē molliendi uirtutis esse dixi: ita quoque si oleo paulum ceræ miscas, id quod a medicis cereæ non dicitur, efficit. Oleum autē uidelicet esse cōuenit, nec quod uocant omphacinū & omotribes, quasi dicas immaturū & crudum, nec quod olea succulos in confectione assumpsit. Itaque tam imbecillia molliantur etiam paruis medicantur inflammationibus. His autē fortiora breuem duritiem sine phlegmone persanant: his adhuc ualidiora maiores, quæadmodum & quæ duritiē in scirrhum propē degerant curant, efficacissima sunt, cuiusmodi est medullarū genus, in maioris minorisque ratione inter se differentiu, ut deinceps explicabo. Itē bdellium utrunque, Arabicū & Scythicum, insuper styraces: siquidem & horū efficacissimus est colore pallidus, qui etiā optimus in Pamphilia nascitur: qui uero hoc magis fuscus est, ubique reperit, potentius multo pallidior inferior, at temporis processu & ipse aureū colorē acquirit. Hoc itaque priore inquam in antidotis propter caritatem utimur, ac tu propterea principii quodcūque est styrace præparas, semper hoc uteris. Item si familiaritū quis in

D pharmacorū sumptibus magnificus existat, illi quoque ex huiusmodi styrace medicamentū componens: in alijs optimū ex fusco genere deliges, & odore potissimum & colore iudiciū eius sumens: nam niger deterior est. Cæterum his quæ indurescētia ualide emolliunt, gutta ammoniaci ascribitur, eaque magis pinguis & noua. His minus sed tamē & ipsa efficacia sunt caprarū, boumque pingua: inter ea ipsa hircorū ac taurorū, ualidiora sunt: boum uero & caprarū his quidē imbecilliora sunt, nō tamen & ipsa a citionis expertia: hædiorum autē & uitulorum his ipsis adhuc imbecilliora sunt, porcino tamen efficaciora: at leonis, pardī, hyænæ, & anseris euentius his digerunt, nō magis emolliunt: quanto etiam subtiliorē substantiā caprino & bubulo seuo habent. Cæterū gallinaceum mediā inter anserinum

serinum & sullum sedem occupat. Quemadmodum & medullarum optima est uisulina.

2 Ad hæc resinae quæ non acrem odorem habent, si dictorum cuiuspiam miscentur, tenacitatem medicamentis compositis præbent, emolliendi uirtutem non auferunt. aptissima est quæ chia uocatur & larix: post hæc pinea, inde abietina: trobilina uero uehementer acris est: pityna seu picea, quæ proprie physema nominat, pinguitudinis experta admodum exsiccat. Has igitur fugere, chia uero & abietina uti oportet, non ipsis per se, uerum cum cera & quopiam alio, quod affectui conducere uideatur. Et uero pix brutia facultatem eandem obtinet, ut quæ glutinans quiddam ac pingue habeat. Cæterum pix alia non miscenda est, sicut nec bitumen, ut pote iusto sicciora: eni uero ea quæ exsiccat, mollientibus esse cõtraria didicimus, quoniam uero pineam & frictam resinam, & colophoniam appellare consueuerunt, sciendum uenit & aliam quandam esse colophoniam, chia mastiche per simile, molliens aliquid habent, quemadmodum illa & thus: in super Aegyptia mastiche non nihil emollit, sed maior uirtutis ipsius portio concoquit, digeritq; item & thus quandam molliendi uim obtinet, uerum hoc quidem coctum ex usu est, ueluti & foenigræci semen: etenim & hoc probe coctum emollit, ac magis adhuc pingui permistum. At quæ citra coctione ob consistentiæ siccitatem dilui, liquari, dissoluiq; desiderat, oleoso quopiam indigent, cuiusmodi sunt, oleum ipsum cum nihil astrictionis habet: item balneorũ strigmenta, præterea quod uocatur susinum; adhæc multo etiam magis comagenum: huius quoq; ordinis est butyrum, tum althææ & foenigræci decoctum. Porro in tertiam mollia & ualidissima, quod genus sunt bdellium & styrax, gutta ammoniaci idẽ potest quod & propolis: atqui hoc in bdellio distinguendum est, quod Scythicũ altero Arabico multo adhæc sit præstantius, præcipue nouum & molle, quod etiã pingue nominant: cõsuetudo siquidẽ hæc est inter recentiores medicos, in huiusmodi medicamentis quod emollientis est, pingue appellasse: hoc autem uidelicet humidius quoq; est. Cæterũ chabbanum & qui opopanax dicitur, præterq; digerunt, etiã quid molliẽs occupat: opopanax aut digerendo, chabbanũ molliẽdo coquẽdoq; præcellit.

3 Talis sanẽ mollientiũ pharmacorũ facultas est. Tu uero cum uel scriptum aliquid in libris medicamentarijs discussis & examinaueris uel ipse composueris, auditis nuper pharmacorũ secundũ maioris minorisq; rationem differẽtjs: intellectus item corporum affectuumq; diuersitatis, ualida ualidis, imbecillia imbecillibus adhibebis: at ubi post primam medicamentũ impositionem aliud applicas, oleo simplici pingui partem affectum uere conuenit. Porro de his quæ tenacia ac glutinosa nominantur, nullũ auferendũ est priusq; sua, spon te abscedant: atqui si laueris, permittenda sunt. uisanda aut medicamentosa rã aquarũ lauacra, præsertim quæ chalcantrosa, aluminosa, & sulfurosa sunt. Hæc quidẽ sufficit uiris cordatis ac pruden-

Galen.

tibus, quiq; in medicinae operibus exercitati peritiam aliquam sunt adepti. Quoniam uero omnes eiusmodi non sunt, & propositum hoc cõmentario, non ut in opere De morbis curandis, methodum solam exponere, uerum simul cum particula rsum uno atq; altero exemplo, pharmaca usu compta subiungere oportet, quæ maiores nostri in medicatoria artis parte celebres literis mandauerunt, ad speciales mollientium pharmacorum differẽtias perueniemus, à mollissimis quæ & paruis inflammationibus medentur, exorli.

CAP. III. Ex cõpositis emollientibus alia quidem (ut ita dicam) imbecilliora primo ordine statuantur: quædam non multo his ualidiora, secundo: & quædam alia, tertio: adhæc nonnulla quarto. Cæterum primi ordinis mollientibus ad exiguas durities & in mollibus seu teneris corporibus uti, sicut prædictũ est, expedit: ad fortiora his corpora & affectus, secundi: quemadmodũ & tertij, & quartj, pro illorum proportione. Describunt autem & eorum cuiuslibet propria.

Emollientia medicamina primi ordinis.

Butyrũ, resina colophoniam, & cera candida non uetusta, singula tria pondere æqualia, in uiscum liquata, primi ordinis mollientia sunt. Et liquidum medicamen quod Parygrum appellatur, eorũ numero ascribitur, cum recens fuerit: ueterascens autem maiorem digerendi uim acquirit. At emollientium imbecillimũ est, cera cum butyro liquefacta: aut ex susino, aut comageno: atq; his imbecillius est quod dicitur cerelæũ: quasi ex cera oleoq; cõfectum, cum in libram olei laxantis nulla astrigendi uirtute prædit, cera unciaẽ duodecim uel se decim iniecta fuerint. Iam ex uis cerata facta, exiguiam quandam relaxandi potestatem possident. Valẽtiora his, uerũ imbecilla adhuc & ipsa, cerata ex œlypo, resina, & cera pari pondere liquefactis: sin aut uetustiora quodammodo ipsa fuerint, olei cuiusdã laxantis, uel susini, uel comageni, uel adipis sit illi, uel gallinacẽ, uel anserini mĩsurã requirunt.

Mollientia medicamenta secundi ordinis. 2

Quemadmodum in simplicibus medicamentis quatuor generum ordines fecimus, qui maioris in se minorisq; ratione distinguunt, aliquorum autẽ ambigua esse uirtutẽ diximus, utrum ad primi ordinis sinẽ, an in secundi initio locanda sit, ita de secundo, tertio, & reliquis deinceps. In quibusdam uero audacter pronuncians, alia in principio huius, alia in termino huius ordinis cõsistere dixi: sicut nonnulla citra appositione, uel primi, uel secundi, uel tertij, uel quartj ordinis esse retuli. Multum uero experientia particularis in uarijs & corporibus & uitijs seu affectibus huiusmodi pronunciatã desiderat. Quare si quis post me æque studio sus, & ueritatis uehemens amator extiterit, ne temere ac subito, ubi bis tẽr uel usus expertusq; sit, ferat sententia: frequenter enim ei ex longa experientia, quemadmodũ & mihi usu uenit, in secundo ordine dicta, in tertium incipientẽ trãspõni oportere uidebuntur: uel in principium tertij absolute. Cum enim corpora quibus medicamentã adhiben-

tom. 5

V tur

tur, ipsiq; affectus nō exiguum differentiae excessum in maioris minorisq; ratione obtineant, diffusissimum est de omnibus eadem pronuciare. Accedit huc, quod ipsa simplicia medicamenta non paruo diuariat discriminine. At ego cum in praestantissimis uirtutem pro unaquaq; specie ac genere ostenderit, si quis in deterrimo per experientiam examinationem moliat, examinabit quidem falso, non autem facultatis ipsorum ordinis distinxerit. Itaq; longe tutissimum est, medicaminum ipsorum inter se differentiam secundum maioris minorisq; rationem accurate scribere, quemadmodum & in alijs feci, & nunc facturus sum.

3 Sane quidem emplastrum Mnaesao autore compositum rectissime secundo mollientium ordini ascripseris, omnibus certe qui eius meminerunt, conuenientibus, ex oleo ueteri, argenti spuma, & adipe sullo componi: in quantitate uero horum singulorum discrepantibus: atq; eo quod nō nulli ex recēti adipe, quidam ex ueteri quem iam omnes uocare solent axungiam, componant. In his quidem imbecillimum fiet ex argenti spuma, sullo adipe, & oleo, neutro ueteri: ualidius, oleo quidem ex ijs ueteri, altero autem recenti addito: his ualidius ex ambobus uetustis. Ex eo igitur quod recens aut uetus oleum adepsq; immittitur, quatuor differentias prodibunt: alias quidem ambobus recentibus, alijs uetustis: nonnunquam oleo quidem ueteri, adipe uero recēti: uel contra, oleo quidem recēti, uetusto autem adipe indito. At extrium ipsorum simplicium medicamentorum mutua symmetria alias plures differentiae emanabunt: uel enim pari pondere & mensura haec tria miscentur: ac multi affirmant, ab ipso Mnaesao cōfectum tribus paribus constare: uel duobus quidem paribus, tertio non pari, sed minori, aut copiosiori: uel tribus mistis imparibus. unde clarum eua dit multas fore differentias: copiosa si quidem argenti spuma iniecta, medicamē potestate mollius fiet: pauciore, ualidius. ac magis emolliet si plus adipis immittamus: digeret fortius si oleum augeamus. Praeterea aliud quiddam accedit copiosiore oleo imposito, quod magnā uim ad medicamen ut magis digerat efficiendum obtinet: est autem hoc, sicut primo libro diximus, si magis incoquas. Si igitur solam argenti spumam in oleo copiosiore coquas, medicamentū euidētius exsiccat: in uberiore uero oleo coques, ubi plus indideris, si emplastri spissitudinem habiturum sit: q; si id non cures, sed aequali tempore tum id quod minus olei cōtinet, tum quod plus habet, incoquas, liquet potestate emollientius futurum, cui oleum uberius mistum fuerit, quemadmodum si & cruda argenti spuma oleo commista a copo uti uelis.

4 Quare quod iam saepe dixi, semper ipsius meminisse uolo, non sicut quidam sententias absolute de pharmacis ferunt, sic & nos facere, absolute dicentes, hanc medicamentū compositionem illa esse potiore. Nam utraq; ad diuersos specie affectus recte cōposita esse potest: interim ad eundem diuersis tēporibus. Haec igitur omnia modo

amērelata, qui prius audiuit, non diligens modo uel memor, sed natura etiā prudēs, utiliter & cum fructu leget ea quae distincte & scripti & scripturus sum. Ac in propositis medicamentis distinctio- nes ibi exponam, trium quatuor uel syllabarum appositione comprehensas: qualem inquam appositionē in pharmacō praesenti libro proposito Mnaesai, Andromachus appendisse uidetur: nam in melinorum emplastrorum catalogo, undecimū ordine cum id scripisset, non simpliciter dicere cōtentus fuit, ut in prioribus cōmemoratis, Aliud, atq; Aliud, ipsis praeponeus, sed Tenerū adiecit. Itaq; hoc uolebam ipsum in omnibus fecisse, & in ipsis melinis a tenerrimo incepisse: inde uero digressū ad paulo fortius innuisse a scribēdo, pauillo quodam secundum q; illud hoc esse ualentius: hoc rursus tertium esse fortius: deinde hoc quartum: uel ut rursus si aliqua aequalem putari habere potentiam, id ipsum admonuisse: uel si periculū timeret in eiusmodi pronuciatis, certe simplicia emollientia pharmaca praedoceret, maioris ac minoris ratione in ipsis definita, ut qui mollentia emplastra multa deinceps ab ipso scripta legit, ualidius quidē esse intelligat, qd ex styrace, ammoniaco, bdellio, propoli, chalbano, seuo taurino, hircinoq; & medullis cōfectū est: imbecillū, quod nullū ex his continet, sed uel omnia in ualida uirtute, uel hisce quidē ipsis ualentiora: media uero temperaturis, uiribusq; uel q; unum aliquod ualidū aut duo imbecillibus mista sint. Constat enim interposita maioris minorisq; latitudinē, omnibus medicamentis non exiguā inesse, in cōmuni uniuersis ipsis uirtute, generatim aestimatis: iuxta quam pharmaca cōgenera & conformia, id est eiusdē generis, ac eiusdem speciei dicuntur, quemadmodum & alia generis, uel speciei differentijs euarantia.

CAP. IIII. Cum igitur haec mihi distincta sint, quibus instructus, non magno negotio & ualentiore uirtute & imbecilliore praedita quae digno scere, narrationē ipsorum aggrediar: deinde conscripta ab expertissimis medicamentorum uiris, si ue emplastra, siue malagmata uoles appellare, per cēsebor: auspicator autē a medicaminibus ab Asclepiade in quarto libro Exteriorū, quibus titulum indidit Marcellas, editis.

Asclepiadis malagmata. I

Amythaonis malagma ad praecordiorū tensiones: soluit omnem duritiam, facit etiam ad difficiles articularum motus. Guttae ammoniaci pondō uncias triginta sex. cera tantundem. terebinthi ne pondō uncias octo. bdellij pondō uncias octo. thuris, myrrhae, utriusq; pondō uncias quatuor. chalbani pondō unc. octo. cyprini heminas iij. Myrrha, thus, bdellium, uino madesiūt: ammoniacum aceto diluuntur: omnia cōtunduntur pistillo, cyprino inuncto, quousq; perfecte dissoluūt. Hoc medicamentum, uetus, celebreq; est, sicut & quod Asclepiades post hoc in istum modum tradidit.

Diasmyrnon Apollonbanium, id est ex myrrha, medicamentum accommodatum. 2

Ad praecordiorū tensiones. soluit omnem duritiam

tiā, benefacit hepaticis, nephriticis, ualet ad omnem neruorum sympathiam, articularum dolores, detensionesq̄ leuat. Ceræ terebinthinæ, guttæ ammoniaci, bdellij, myrrhæ, propolis, iridis, styracis, singulorum pondo uncias sedecim. irini unguenti faculæ quantum sufficit. uini odorati quod satis est. præparat sicut prædiximus. Quod succedit huic, ab Asclepiade scriptum, dignius quidem ac celebrius infra scriptis existit uerum ad indurationum solutionem illis inferius.

Aliud Dioscoridis medicamentum accommodatum. 3

Ad difficiles artuum motus, & ligationem, hoc est obstrictos articulos, Græci uocāt Ancylas; tollit omnem duritiam, facit ad interaneorū affectus abcessusq̄ profundos. Ceræ pondo minam, resinæ frictæ, chalbani, iridis silyricæ, singulorū minæ dimidiū. irini faculæ quod satis est, uini quantū sufficit. medicamen tusile est: cōficitur sicut priora. Pharmacum antedictō succedens ab Asclepiade scriptū, idem est ei quod Heras ad calcem medicamentarij sui libri conscripsit: paululum uero quiddam in symmetria quatuor simplicium pharmacorum euariat, uti innotescet cum ambo scribimus. Prius autem ab Asclepiade proditi mentionem faciemus, quod ad uerbum ita habet.

Lucij præceptoris ad articulos contractos, quas ancylas nominant, inscriptum. 4

Facit ad abcessus in alto corporis obortos; item ad neruorum contractiones, & articularum ligationes, siue cōtractiones, quas ancylas uocamus; succurrit opisthotonicis, id est cū ceruix in posteriorem partem reflexa est, nec prorsum retrahi potest. ualet ad omnem neruorum dolorem ex cōsensu. est etiam acopon bonum irino, uel cyprino, uel laurino solutū; emollit ueteratas, cōtumacesq̄ duritias. Bdellij, seui uitalini, guttæ ammoniaci, iridis silyricæ, singulorū pōdo denarium xvi. opopanax, chalbani, cachryos, styracis, thuris, singulorū pondo denarium viij. piperis grana numero centum sexaginta, ceræ, terebinthinæ, singulorū pondo selsibræ. uini quod satis est. tusile est medicamē: superiorum modo conficitur. Vbi igitur Heras ab Asclepiade in simplicium symmetria dissenserit, quod pollicitus sum, iam indicabo. Primum omnium scripsit Asclepiades medicamentū: bdellij denarium pōdo sedecim. Heras autem nō bdellij, sed bdellij pōdo denarium octoginta, qui quinquies sedecim faciunt; deinceps seui uitalini denarios sedecim scribente Asclepiade, Heras quinquies totidem posuit, sicut & bdellij: nam octoginta denarij, quinquies sedecim comprehendunt. Tertium ab his medicamentum Asclepiades subiunxit guttam ammoniaci, & huius sedecim denarios iniiciendos censuit. Itaq̄ iuxta priorum proportionem Heram quoq̄ octoginta denarios scripsisse cōueniebat; posuit autē non octoginta sed centū. quare uiginti plures illo indidit. Aliud post cōmemorata pharmaca protulit Asclepiades hisce uerbis, iris silyricæ denarios sedecim. Heras huius proportionē seruit, octoginta scribens; post prædicta medicamenta opopanax denarios octo Asclepiade-

Galen.

des scripsit: Heras autē hic quoq̄ proportionem seruauit, quadraginta ponens. chalbani denarios octo Asclepiades iniicit, Heras etiā in eo proportionem repræsentat, quintuplam censens immitendam. Quippe quadraginta denarij, quinquies octonos absoluunt. Septimum medicamen Asclepiades ita exposuit, cachryos denarios viij. oportuit igitur & Heram, si proportionē obseruabat, quadraginta indere, nunc autem nō sic, uerum duplices, puta sedecim ipse conscripsit. octauis, styracis Asclepiades meminit, denarios octo iniiciens; Heras proportionem huius, quintuplo immisso, obseruauit. Nonum pharmacum posuit Asclepiades, thuris denarios viij. miscens: Heras non quintuplum, sed duplum sumere præcipit. Decimi, piperis meminit Asclepiades, cētum sexaginta granis iniemis: cui Heras rursus cōsentiens, octingētos iniicit. In quibusdam exemplarijs haud noui quomodo uiginti scripta sint, quemadmodum in alijs centum & octo. Undecimum tradidit ceram Asclepiades sicut & duodecimū resinam terebinthinam, utriusq̄ selsibræ immittendæ existimans. Ratio igitur exigebat & Heram, si proportionem uolebat referre, quintuplū utriusq̄ indere, quod erat singulorū libras duas. insuper libræ dimidiū. Ille uero non ita, sed libras, & uncias quatuor miscere iubet, unde clarum euadit Heram cachryos duplum ad proportionem imponere, sicut & thuris. ammoniaci uero guttam quaduplo copiosorem adiecit, quemadmodum & terebinthinæ, ceræq̄ triplo. Etenim in his tertia parte exuperauit. Atq̄ hac re totam medicamenti compositionem Asclepiades confecturæ similem effecit. Exuperans enim in symmetria cachryos, molle nihil habentis, sed digerens duntaxat, adauxit ei & emollientia, thus puta, ceram & terebinthinā. Hoc igitur medicamentum Lucij quidem præceptoris nominat Asclepiades: ubi uero differat ab Hera, per censui. cæterum extremi mollientium ordinis est, ut quo nullum indurefcentia magis emollire comperias. Porro medicamenti autor huc etiam animi intensionem direxit, ut quod in scirho induratis continetur, digerat, discutiatq̄. Reliqua pharmaca præcedentia, parum iam dicta superant. Habēt enim amplius incrassatorum uiscosorumq̄ humorū incisoria quæ sæpe tumoribus scirrhosis ex usu sunt, cum uiscosi humores illos produxerint.

5 Itaq̄ opopanax modice attenuat, uocant autē sic radicē panacis, cuius caulis liquor e expresso opopanax faciūt: est enim deterforiē non incisorie uirtutis. Acetū autē cum stercore caprino secat, deterget, digeritq̄ uehementer, nō modo humores incrassatos ac lentos, uerū solidas etiā partes ipsas. Quædam appolita sunt medicamina ordine propositum sequenti, quod Alcmionis titulum habere dixit. scribit ergo de priore in hunc modum.

Aliud, ad magna Marci Terentij Asclepiadis, ualde generosum, ad idem. 6

Præcipue ualet ad uteri inflationes, inscribitur Asclepiadeum medicamentum, eo quod ad Asclepiadem Bithynum autorem referunt. Myrrhæ

tom. 5 V 2 dena

denarium pondo trium. opopanacis pondo felib. ceræ pondo libram semis. chalbanī pondo uncias tres. mannae pondo felibrā. guttæ ammoniaci pondo felibrā. resinæ frictæ pondo libram semis. acetī heminā: Utendum est eo etiam ad omnem nervorum ex consensu dolorem.

Aliud Alcimionis titulo inscriptum. 7

Ceræ pondo librā & semis. resinæ colophonix pondo libram & semis. guttæ ammoniaci pondo libram semis. chalbanī pondo uncias tres. myrrhæ pondo uncias tres. opopanacis libram semis. propolis pondo uncias tres. acetī sextarios duos. stercoreis caprini pondo uncias tres. Ammoniacum teritur acetī sextario iniecto: Deinde his myrrha, thus, opopanax adduntur, rursusq; leuigatur. Propolis post chalbanum contunditur: cera, resinæq; coquitur, olei heminis duabus affusis: ubi confluxerint, propolim & chalbanum adiicito, movens continue: postquam dissolueris, ab igne sublata refrigerari sinito, & derafa leuigatis indito: cum una miscueris excipito, ac utitor.

8 Post nominatū malagma, aliud in Asclepiadis libro scriptum est, quod quidem molliendi facultatis parum, calfactorix vero plus obtinet: habet aut non gentianæ succum modo, sed peucedani & sagapeni etiā liquores, calida admodū pharmaca: ceterum mistum ei est & aphronitrum & lapidis alii flos, attenuatis incidētisq; potestatis medicamina. Iā sulfur viū calefacere omnes norunt, quem admodū & vinum picatū. subiūgam & hoc medicamentum ipsius Asclepiadis verbis.

Malagma Pharmiarum inscriptum, ad prædictos affectus.

Summe facit pleuriticis: quippe dolores subito in ipsis accessionibus soluit impositum. oportet autem ubi ipsū imposueris, rubore in parte affecta excitato splenium auferre, ac rursus intervallo temporis imponere: item diuturna vitia dissoluit.

Ceræ pondo libras quinq;. guttæ ammoniaci libras iij. frictæ tantundem. terebinthinæ pondo libram. thuris pondo libram semis. myrrhæ pondo uncias sex. aloes totidem. œsypī, gentianæ succi, peucedani liquoris, singulorū pondo uncias tres. sagapeni pondo uncias quatuor aphronitri pondo uncias sex. lapidis alii floris pondo uncias sex. propolis pondo uncias tres. sulfuris viui pōdo uncias quatuor. vini picati sextarios quinq;. picatum & gentianæ succum incoquit: quæ liquari possunt, ubi liquesceat, refrigerari sinito: guttæ ammoniaci, thus, myrrham, & aloen conterito, in pilam coniectis liquidum affundito, soluta studiose cōterito: arida vero tumā, cribrataq;, leuigatis indito, ac rursus diligenter tumis, liquida feruefacta adiungito, absq; grumis, qui encerides dicuntur: cum miscueris, excipito ac utitor.

9 Post prædictum aliud deinceps malagma persimile Asclepiadis hūc verbis conscripsit.

Aliud Neapolitani, præparatum est Aquilæ Secundille.

Vini picati sextarios sex. ceræ pondo libras sex. guttæ ammoniaci pōdo libras tres. frictæ tantundem. terebinthinæ pondo libram semis thuris pōdo libram semissem. myrrhæ, aloes, aphronitri, la-

pidis alii floris, gentianæ radici succi, singulorum pōdo unc. sex. sagapeni pōdo uncias quatuor. sulfuris viui pondo uncias quatuor. propolis pondo uncias quatuor. panacis radici pōdo uncias tres. sampschī pondo uncias tres. piperis albi pondo uncias tres: præparato ac utitor ut prædictum est.

Andromachi malagma. Cap. V

Malagma durum & aridum. Picis pondo libras tres. ceræ pondo libras duas. resinæ pondo libram. chalbanī pondo uncias duas. guttæ ammoniaci tantundem. mannae pondo uncias quatuor. acetī sextarios tres.

Aliter. 2

Picis pōdo libras quatuor. ceræ pōdo lib. duas. resinæ pondo libram. guttæ ammoniaci pondo libram. chalbanī pondo uncias sex. alij pondo lib. acetī sextarios tres.

Aliud Aristodis. 3

Picis pondo libras quatuor. ceræ pondo libras octo. resinæ frictæ pondo libras quatuor. terebinthinæ pōdo libras quatuor. guttæ ammoniaci pondo libras duas uncias viij. chalbanī pondo libram uncias quatuor.

Aliud ad artium ligationem, quas Ancylas Greci vocant. 4

Bdellij denarium pondo sedecim. thuris denarium pondo sedecim. guttæ ammoniaci denarium pondo octo. opopanacis denarium pondo octo. chalbanī denarium pondo viij. seui vitulini denariū pondo sedecim. piperis grana centum sexaginta, styracis denariū pondo viij. cachryos denariū pondo sedecim. iris illyricæ pondo sedecim. terebinthinæ minæ dimidium. ceræ minæ dimidium. cyprini heminas quatuor. vini quod satis est.

Malagma ex meliloto. 5

Nardi celticæ denarium pondo decem. cypri denarium pōdo viij. cardamomi denarium pōdo viij. iris illyricæ denarium pondo viij. myrrhæ denarium pōdo viij. croci denarium pōdo quatuor. meliloti denarium pōdo uiginti quinq;. guttæ ammoniaci denarium pōdo viij. terebinthinæ denarium pondo quin quaginta. ceræ nouæ denarium pondo centum. cyprini hemine dimidium. acetī quod satis est: quidā guttæ ammoniaci denarium pondo centum. ad interiora omnia.

Ex semibus. 6

Guttæ ammoniaci denarium pondo quin quaginta. ceræ denarium pondo quin quaginta. terebinthinæ denarium pondo quin quaginta. fenicigrati denarium pondo uiginti quinq;. seui taurini creati denarium pondo uiginti quinq;. iris illyricæ denarium pondo uiginti quinq;. niri denariū pondo uiginti quinq;. mellis heminas sex. acetī heminam. panacis denarium pōdo uiginti quinq;. cyprini parum.

Vt autem Philonides. 7

Fenicigræci feminis, anisi feminis, styracis, bdellij fordidi, manne, thuris, cardamomi, cypri noui, panacis radici, iris illyricæ, aphronitri, singulorum denarium pōdo uiginti quinq;. guttæ ammoniaci, terebinthinæ, singulorum denarium pōdo quin quaginta. seui taurini denarium pōdo sexaginta.

melliosi denarium pondo sexaginta. cera denarium pondo duum, mellis hemina dimidium.

Aliud ut Harpocra. 8

Foenigræci, niri, panacis, iris, singulorū denarium pondo viij. terebinthina, guttæ ammoniaci, ceræ, singulorum denarium pondo c. seui taurini denarium pondo c, mellis pondo libram. aceti sex rarios duos. apij feminis, cumini, fœniculi, singulorum denarium pondo quinquaginta. melliosi denarium pondo quinquaginta. alij xxv, sampsuchi denarium pondo quinquaginta. cardamomi denarium pondo quinquaginta. cyprino excipitur.

Malagma ex sampsucho, ad multa. 9

Ceræ nouæ, baccarū lauri, fœnigræci leuis, sampsuchi, singulorū denariū pōdo c, terebinthine denarium pondo centum quinquaginta. niri denarium pondo trigintaduū. piperis denariū pōdo trigintaduū, alij sedecim. cyperi denariū pōdo sedecim. cyprini heminas duas. uel styracini.

Malagma ex baccis lauri. 10

Ceræ denarium pondo septuagintaquinque. picis brutæ denariū pōdo septuagintaquinque. baccarum lauri denarium pondo septuagintaquinque. niri denarium pondo septuagintaquinque. resinæ frictæ denarium pondo septuagintaquinque. chalbani, guttæ ammoniaci, cæchryos, ameos, singulorum denarium pondo duodecim. piperis albi denarium pondo sedecim. cyprini heminas sex.

Aliud malagma boni coloris, ad multa accommodatum. 11

Ceræ pondo libram. resinæ frictæ pondo librā. guttæ ammoniaci pondo uncias sex. aluminis liquididi pondo unc. sex. salis floris pōdo uncias sex. quidam uisci pondo uncias sex.

Malagma Apollonias. 12

Ceræ denarium pondo octoginta. guttæ ammoniaci denariū pōdo octoginta. bdellij denarium pondo octoginta. iris illyricæ denarium pondo octoginta. resinæ terebinthina denarium pondo quadraginta. manna thuris denarium pondo quadraginta. cum irino contunduntur.

Malagma ex alumine, diter. 13

Ceræ denarium pondo centum. picis denarium pondo quinquaginta. aluminis liquididi denarium pondo uigintiquinque. ego autem quinquaginta. uisci denarium pondo quinquaginta.

Ad ischiadicos bonum. 14

Rutæ agrestis feminis, silphij, baccarum lauri, aphronitri, abrotoni, colocynthidis, cardamomi, ameos, singulorum denarium pondo quatuor. rutæ uiridis, picis, terebinthina, guttæ ammoniaci, ceræ, seui, singulorū minæ octauam partem. chalbani denarium pondo sex. opopancis denarium pondo quatuor. sulfuris ignem non experti, denarium pondo quatuor.

Ad lienosos. 15

Ceræ pondo minam. resinæ pondo minam. guttæ ammoniaci minæ dimidium. aluminis liquididi denarium pondo quinquaginta. strigmenti hemina. capparidis radicis denarium pondo quinquaginta. calaminthæ radicis denarium pondo quinquaginta. myrobalani facis, quod magma uocat.

Galen.

A denarium pondo quinquaginta. aceto aridis, oleo liquabilibus, adiecto utitor.

Malagma usus multiplicis. 16

Sinapios denarium pondo quatuor. manna denarium pondo duum. rutæ denarium pondo quatuor. aphronitri denarium pondo quatuor. capparidis radicis denarium pondo sex. guttæ ammoniaci denarium pondo quatuor. myrobalani denarium pondo uigintiquinque. & corticum denarium pondo iij. lapidis alii floris denarium pondo quatuor. fœnigræci denarium pondo iij. cardamomi denarium pondo quatuor. ceræ denarium pondo septuagintaquinque. resinæ denariū pōdo centum. mellis heminas sex. irini sedimenti heminam. acetum ammoniaco duabus heminis superfunditur.

Polyarchion ex epistola. 17

Cyperii, cardamomi, manna, ceræ, singulorum pondo minam. terebinthina frictæ pōdo minam semis. liquidæ pondo minas tres. cyprini quod satis est: ego bdellij pondo minam.

Alter scriptura.

Cyperii, cardamomi, bdellij, thuris, balsami, singulorum pondo minam. ceræ pōdo minam semis. resinæ frictæ pondo minas quatuor. cyprini heminas sex. uini odorati heminam unam semis.

Vi ego utor.

Cyperii, cardamomi, amomi, bdellij, singulorū pondo minam. ceræ, pondo minam semis. resinæ frictæ, terebinthina, pondo minas quatuor. cyprini heminam. casie, cinnamomi, guttæ ammoniaci, nardi indica, croci, myrrhæ, singulorum quartam minæ portionem. uini odorati quantum sufficit.

Malagma ad multa utile, Apollonij. 18

Ceræ, picis, resinæ frictæ, singulorum denarium pondo centum uigintiquinque. niri, thuris, singulorum denarium pondo quinquaginta. seui taurini, butyri, singulorum denarium pondo septuagintaquinque. celypi denarium pondo quindecim, aquæ cyathos sex.

Malagma ad hepaticos bonum. 19

Guttæ ammoniaci denarium pondo centum quadragintaquatuor. alij centum duum. bdellij denarium pondo centum quadragintaquatuor. croci denarium pondo duodecim. myrrhæ denarium pondo duodecim. ceræ denarium pondo centum D Quadragintaquatuor, alij centum. aceti quartā partem hemina. cyprini heminam. ego autem pono heminas decem.

Malagma ad rheumatismum stomachi & intestinorum. 20

Oenanthæ pondo unciam. omphacij pōdo uncias quatuor. phœnicobalani carnis pōdo uncias duas. acacia pondo unciam. rosarum pondo unc. omphacij pondo uncias iij. aloes pondo unc. iij. gallæ pōdo uncias quatuor aluminis rotundi pondo uncias quatuor. picis pōdo uncias iij. ceræ pōdo uncias tres. alij thuris, myrthei pondo uncias tres. uinum aridis affunditur.

Ad hydropicos & flatuosos. 21

Picis liquidæ pondo libram. ceræ pondo librā. niri pondo uncias sex. sulfuris uini uncias sex. aluminis fisci pondo uncias sex.

Aliud malagma ad ichiadicos, aliq; multa. 22

Ceræ denarium pondo septuagintaduom. terebinthinæ denarium pondo quadragintaocto. guttæ ammoniaci denarium pondo xxxij. propolis denarium pondo quadragintatrium. chalbani denarium pondo trigintafex. bdellij denarium pondo xxv. croci denarium pōdo quinq;. opopanax denarium pondo xij. nitrī spumæ denarium pondo triginta. irino unguine tundens utitor.

Aliud malagma Andree multis utile. 23

Pyrethri denarium pondo viij. croci gnidij denarium pondo viij. falsi ammoniaci denarium pōdo viij. cucumeris agrestis radicis denarium pondo viij. resinæ pinæ denarium pondo octo. terebinthinæ denarium pondo viij. ceræ denarium pōdo xxx. liquoris fycamini denarium pōdo xij. alij x. aphronitri denarium pōdo xx. thuris denarium pondo sexagintaquinç;. bdellij denarium pondo decem. guttæ ammoniaci denarium pondo x. alij xx. myrrhæ denarium pondo x. aristolochiæ denarium pondo decem, alij uiginti. piperis albi denarium pondo x. & longi denarium pondo x. xylobalsami denariū pondo decem. cardamomi denarium pondo decem. œsypi denariū pondo quindecim. hibisci radicis denarium pōdo decem. gladioli radicis denarium pondo decem. styracis denarium pondo decem. capparis radicis denarium pondo decem. iris illyricæ denarium pondo x. aloes Indicæ denarium pondo decem. chalbani denarium pondo decem. uisci de quercu lecti denarium pondo decem, alij xij. adipis anserini denarium pondo viij. resinæ sicæ denariū pondo duo decim. sedimenti iridis quod satis est.

Aliud Amythaonis ad thoracis, precordiorum, & stomachi dolores: item ad articulorum impeditones quas Ancylas Græci, ligatio nem Latini uocant. Insuper ualet ad abscessus,

& diuitias emollit. 24

Guttæ ammoniaci denarium pondo quinquaginta. ceræ denarium pondo uiginti. bdellij denarium pondo l. resinæ terebinthinæ denarium pondo xx. iris illyricæ denarium pondo decem. chalbani denarium pondo quinq;. bdellium, & ammoniacum uino perfunduntur, deinde etiam liquata miscentur, & irino adiecto simul leuigantur.

Malagma Antipatri ad colicos omniaq; leuigantur. 25

Silphij denarium pondo ij. helebriphaci denariū pondo iij. casia denarium pōdo iij. melanthij denarium pondo iij. staphidis agricæ denarium pondo quatuor. chalbani denarium pōdo iij. struthij denarium pondo quatuor. sulfuris uiui denarium pondo quatuor. panacis denarium pōdo septem. propolis denarium pondo septem. pyrethri denarium pondo septem. guttæ ammoniaci denarium pondo septem. nitrī denarium pondo septem. alij floris denarium pondo uigintiquinq;. ceræ denarium pōdo centumquingaginta. resinæ denariū pondo centum quinquaginta. olei heminam.

Aliud malagma Callinici ex Collectaneis Pacci; ad omnia. 26

Ceræ nouæ denarium pondo c. guttæ ammoniaci, terebinthinæ, bdellij pellucens, singulorum denarium pōdo quinquaginta. alterci seminis denarium pondo triginta. liquoris papaueris dena-

A rium pōdo uiginti. meliloti, myrrhæ, aristolochiæ, piperis, gentianæ, styracis, singulorum denarium pondo quindecim. thuris denarium pondo octo. croci denarium pondo viij. olei heminam. papaueris albi seminis denarium pondo quadraginta octo. nucleorum pineorum denarium pondo xx.

Aliud malagma Leucopyron. 27

Terebinthinæ pondo libras quatuor. ceræ pondo libras tres. guttæ ammoniaci pondo uncias vi. chalbani pondo uncias duas. opopanax pondo uncias duas. manna pondo uncias duas. scui taurini pondo uncias duas. cyprini parum.

Aliud emplastrum malagma generosum Crispi. 28

Myrrhæ, opopanax, chalbani, singulorum pōdo unc. sex. panacis radicis, manna thuris, guttæ ammoniaci, singulorum pondo lib. ij. ceræ, resinæ frictæ, singulorum pondo lib. iij. acetī heminas ij.

Aliud ad coxendicium, capitis omnesq; diuturnos dolores. 29

Ceræ denarium pondo uiginti quatuor. guttæ ammoniaci denarium pondo septem. terebinthinæ denarium pondo septem. thapsiæ succi denarium pondo octo. olei heminam.

Aliud ad aquam intercutem Cleopantis. 30

Ceræ, resinæ pinæ, aphronitri, singulorum denarium pondo centum. chalbani denarium pondo xij. propolis denarium pondo xij. guttæ ammoniaci denarium pondo duodecim semis. cyprini heminas duas. acetī heminas duas.

Aliud dolorem sedans Nicostriati ad podagram. 31

Ceræ pondo libram. guttæ ammoniaci pondo uncias sex. opopanax pondo uncias quatuor semis. meconia pōdo uncias tres. cyprinum ad confusionem illorum adhibetur.

Aliud ad apellas quos Græci Lipodermus uocāt, autore

Epidauo. 32

Thapsiæ radicis pōdo denarium trium. piperis nigri denarij pondo unius. seui utulini denarium pondo duodecim. thuris denarium pondo quatuor. xylobalsami denarium pondo diuum. resinæ denarium pondo sedecim. ceræ denarium pondo octo. liquata siccis superfundito.

Aliud malagma apud Asclepiadem dolorem suum mouendo,

tensionem subito tollens. 33

Ceræ Tyrrhenicæ pondo minā. seui taurini, adipis anserini, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, singulorum pondo minam. chalbani minā dimidium. D œsypi pondo unc. iij. rosacei heminas iij. unguenti telini, id est ex fenogracæ confecti heminam. olei boni tantundem. hæc igne non acri liquefascito, mouens sedulo: sint autem leuia in pila confusa. iris illyricæ denarium pondo tercentum sexaginta. aristolochiæ denarium pondo centum octoginta. hypocistidis leuigatæ denarium pondo nonaginta. gallæ leuigatæ denarium pondo trecentorum sexaginta. manna, bdellij, singulorum denarium pondo centum octoginta. cinnamomi, croci cilicij, myrrhæ, casie, nardi indicæ, iunci floris, calami aromatici, amomi, piperis, rhu succi, testudinis marine sanguinis, androsemi herbe, pyrethri, singulorū denariū pōdo trigintaquinç;. acetī ueteris heminā, in quo omnia medicamēta iniecta emolluntur tundunturq;, quousq; lentū ac elaboratum sit

fit medicamentum, deinde reponitur: ualet etiam ad thoracis, ac pulmonis rheumatismos, item syn-
cipitio dolentes confestim liberat: uocatur autem medicamentum Aesculapius.

*Aliud ad coxendicum dolores, optimum ab Hera Capa-
padoce acceptum. 34*

Picis liquidæ heminas tres uel duas, ceræ pondo libram. pityinæ pondo librâ. sulfuris uirui pondo libram. niri pondo librâ semis. staphiditis agricæ sextarium. pyrethri pondo libram. sectis combustæ pondo libras duas. cardamomi sextarium. chalbani pondo selibram. liquida siccis commiscentur.

Aliud malagma Bacchij, quo Cæsar usus est. 35

Adipis suillæ pondo minas duas. ceræ pondo minas duas. helenij, calami aromatici, panacis radicis, salis fossitij, uel ammoniaci, singulorum denarium pondo quinquaginta. bdellij pellucis, guttæ ammoniaci, singulorū pondo minas duas. iuncti floris, iris, singulorum pondo minâ. thuris, piperis, chalbani, singulorū denariū pondo uiginti quinq; coquito ut Cardameleum.

Aurium aliud malagma ad arthriticos, hoc est articulari morbo laborantes. 36

Resinæ strobilicæ pondo libras duas. axungia, chalbani, singulorum denarium pondo xij. ceræ denarium pondo uiginti quatuor. baccharum lauri denariū pondo duodecim. incoquito ut nouisti.

Aliud malagma ad laterum dolorem. 37

Cypeti, cardamomi, manna, guttæ ammoniaci, terebinthina, ceræ, irini, singulorū pondo libram. ammoniacū seorium coquito, liquabilia leuigato: ac cū irini cyatho liquefactis ammoniacū aspergito; deinde arida misceto, irino manus in quinans.

Aliud malagma Cloniaci boni coloris. 38

Auramenti pondo uncias iij. aluminis fissi pondo unc. iij. calcis uiuæ pondo uncias iij. resinæ frictæ pondo libras iij. ceræ totidem. acetum aridis, oleum liquidis additur: utitor itidem in lienosis.

Damocratis malagma. Cap. VI

Quoniam metris conscripta & memoris facile commendantur, & medicamentorum symmetrias exacte conferunt, ideo Damocratis quoq; pharmaca apponere consueui, inter quæ & hoc infra inscriptum numeratur.

Aulus omnino & malagmatis boni subinde ueniet medicina cultoribus.

Ad musculos conuulsos, articulos quoq;

Ruptos, & artuum fracturas: in super

Ad crassitiem neruorum, nec non musculos

Cum phlegmone induratos: ad morsus adhæc

Est efficax: lichenas & lepras demit:

Vt plurimum decem diebus additum;

Mutatur altero die uel tertio.

Picis nitidæ, siccissimæ libras duas,

Vnam pityinæ pone, unam & ceræ bonæ,

Ammoniaci rursus, liquidij atq; aluminis

Fac singulorum unam. duos acerrimi

Sextarios aceti: raro chalbani

Quidam uncias duas miscent, diutinas

Citius durities emollire qui expetunt.

Sic preparato. Partem aceti tertiam

Ammoniaco, atq; alumini superaddito,
Ac leuis reddens, in magno mortario,
Mellis recentis liquidij crassitudinem
Fingito, picem cum cæteris in fictili
Nouo incoque, ut perfrictu quin siccaueris
Totum, planè ab sit minimum, atq; superfundito
Sic leuis in mortario factis probe.

Et rursus ipsa tumdit, donec receperint
Flauum colorem, perquam similem melino.

At si statuis profus miscere chalbanum,

Post ceram immittes, & resinam pityinam,

Ab igne postquam cacabum posueris.

Quidam iniiciunt contra manna parem modum,
Alumen auferentes ex medicamine.

Vtuntur ad id uitij genus, & glutinant

Diuisiones his recentes uiribus.

Tu hoc utitor uel à primo statim die

Ad quos affectus retuli cum prenderint.

Ad pustulas, nec non has consequentia:

Sed splenio madentem aceto spongiam

Desuper iniicito, uinculo coarctans molliter.

Sic & lienosis ipsum perutile est.

Vbi suspicaris scirrhum cuiquam uisceri

Futurum, in trepidus utitor malagmate.

Post hoc pharmacum Damocrates scripsit quod ex sale confectum dicitur, hunc in modum exorsus.

Si in horum aliquo maneat diebus plustulis,

Et hoc parato medicamentum quamoptimum.

Deinde aliud quoq; ex sale post hoc cōmémorat, rursusq; post ambo aliud strumas discutere permittēs, & tocinoris lienosisq; aquosos affectus: mihi uero satius uisum est, hæc medicamenta inter emplastra digerentia referre.

De relaxantibus medicamentis. Cap. VII

Vocantur medicamenta quædam relaxantia, græce chalaistica familiariter omnibus prope recentioribus medicis uocabulo: in de nimirum sicut & nomen ipsum indicat, q; tenfas laxant particulas: quippe relaxari, ac in tēdi cōtraria inter se dicunt. Hippocrates itaq; hūc in modū quodā in loco scriptū reliquit: Cuti duræ emollitio, in tēsa relaxatio cōuenit. Si igi' proprie quis dictionibus uti uelit, nonnulla medicamina induratorū corporū malactica, id est emollientia esse dicet, ea nimirū que ipsorū soluent duritiē, quæ admodū & relaxatiā que tensioni medent. Porro in phlegmonis cutē tendi contingit, interim à subiecto tumore symptomata hoc capientē, interim & ipsammet simul in inflammatione laborantē, nō tamē phlegmones substantia partis inflāmata durities est, sed à cōuerso planè, sicut in libris de ipsa ostendimus, humiditas atque in ijs quæ scirrho consistant, non præpollens in affecta parte humiditas est, uerū durities. At tamē utriusq; affectus similis genere quodāmodo generatio est, & curatio: nascit enim ex cōfluxu humorum: curatur iisdem euacuatis, quanq; euacuationis modus in utrisq; idem nō est, sed uti in Therapeutices methodi cōmētario declaratū est, in quo etiā aliorū omnium affectuū sanandi rationē explicuimus, inflāmatis quidem particulis, tum repulsoria medicamentorum qualitas, morbi initio, tum

dificultoria semper ex usu est: scirrhis autem sola difficuliora sine repellente: itaq; summe indurata scirrhis, summe insanabilia sunt. Porro dignoscere me oportet, eo nepe signo, quod nullus affectus partibus sensus superstit: in quibus sensus quidem est, sed obscurus, hæc curantur pharmacis humorem in crassatum uidelicet digerentibus, non tamē ualide, ac uniuersim hoc agentibus: sicut digerentia medicamina faciunt, cuiusmodi uocant Græci atrahentia & excolantia. Mirari uero non oportet mutationē in duritiem ex inflammatis accidere, cum simul & confluens humor crasior est & uiscosus, & curatio medicamentis ualde exciccantibus administratur. Quemadmodū enim & in exterioribus permulta corpora quæ ipsum ignē contingunt, torrentur, ex aqua rursus emolluntur, ita etiam in inflammatis affecti loci humiditas, a calefacientibus & exciccantibus ualidius pharmacis quod relinquitur aliquid uiscosum crassumq; retinet, tenui discusso. Et hac ratione in morbis articularibus calli proueniunt & in renum uitio calculi. Quod si uero fluxio quæ phlegmonē cōmisit, cōsistentia sit tenuis, & curatio eius siccantibus & calefacientibus pharmacis adhibeatur, nihil scirrhisum relinquitur: imò refrigerantia uehementer astringentiaq; scirrhos procreare solent: ac multos ex erysipelatis immodice refrigeratis scirrhosos tumores habere cōspicimus, medicorum qui eos sanandos susceperunt, inscitia. Prima ergo medicamina quæ phlegmonis & quæ scirrhis medentur differentia est ea quæ diximus: altera, quæ propter dolorem inflammatis conuinctum non suffinet ualens medicamentū affectæ particule offerri: quippe hæc cum dolore actionē edunt, inflammationis ob affectum statim dolentibus, eoq; mollissima remedia desiderantibus. At uehementiora præter quæ dolores non soluunt uel mitigant, adhuc etiam exacuentia maiores phlegmonas cōcitant. Itaq; primus usus in dolentibus, phlegmonis est, qui medicamentis abunde humidis simul & modice calidis administrat. Alter paulo crasioribus, siccantioribusq; constat. Tertius relaxantibus nominatis, quæ nonnulli malagmatis ascribunt.

2 Sunt autem inter ea maxime emolliētia sanæ, quæ cerati speciem consistentia referunt, cum ex butyro, cera, adipibus, oleoq; relaxantia cōponuntur. Miscetur ipsis cœsypii, resinæ, picis parum, sicut & thus, & chalbanum: præterea non nihil tris illyrice. Porro inuenit Menecrates, ut ipse ait, & alij quidam ei attestantur, medicamentū ex succis appellatum, phlegmonis nondum uehementer dolentibus, esse remedio. Inscriptus est liber, quo pharmacum tradidit, Autocrator hologrammatos: certe Autocrator quasi dicas imperator, quoniā huic dicatur esse: Hologrammatos quia sine notis integris syllabis expressus est, duo, tria, quatuor, quinque, aliusq; quilibet numerus, uel resine, uel picis, uel alterius cuiuspiam medicaminis. Hoc autē fecit Menecrates, quod sepe non modo nolentibus errorē cōmittere in scripturis contingit, sed etiam per inuidiā quibusdā uolentibus: dum o literam

faciunt, per mediam rotundam lineam, alia per transversum ducta. I uero literam, r. faciunt, alia similiter transversim apposita: sicut etiam una linea ex r, & p. derasa, literæ i characterem relinquit contingit. Pari modo ex multis literis, aliorum appositione, aliorum cōpositione, aliorum ablatione, mutari notas seu characteres numeros indicantes accidit. At nihilo plus Menecrates posteritati cōsuluit, quum ij qui eius librum describunt, appellationes numerorum non integris literis, sed characteribus eas significātibus notent. Iure igitur Democritus libri medicamentorū metris descripti in pretio habiti sunt. Et si omnia hunc in modum tradita forent, optimum nimirū esset. Quoniam uero non pauca probatorum medicaminū relicta sunt, ideo alij quoq; Medicamentarijs libris indigentibus: quibus uariorum medicaminū compositiones nonnulli conscripserunt.

CAP. VIII. At uero medicamentum ex succis à Menecrate inuentum, trimetris hæc uerbis Damocrates cum alijs quibusdā duobus similibus ei præpositis prodidit.

Damocrates.

Præfati igitur, quo tandem pacto uulnera

A phlegmone secura recte glutines.

Posthac agemus quomodo cum phlegmone

Obsedit ipsa, curare queas commodè.

Cum musculo læso, uel neruo quopiam,

Vel & propinqua quando osi membranula

Puncta, diem post quartum continuus dolor

C Et phlegmonæ febresq; cum symptomatis

Multa uigilia fit deliria fit, sicut,

Ac siccitate linguæ, crescuntq; omnia

Quotidie, & magis mala in peius ruunt,

Et sæculenta sanies tenuis, uulnera &

Rubra insuper habent omnia hæc quæ corpora

Distentiones, phlegmonas, œdemata,

Turgores, uarijs tum abstine cataplasmatis,

Quod mos iuuenibus est facere, quod phlegmonū

Status effugientes non dent calumnijs

Occasionem. at arti qui fidit suæ,

Hunc deuenire cum languetibus in metus

Oportet, haud expectantem dum uicerit

Natura, uel fortuna quædam iuuerit.

Ergo pares, quibus consului affectibus

D Quod & podagricis medicamentum conuenit,

Aegris in omni tempore impositum manens.

Promptam agilitatem nam intermissionibus

Id gignit corpori, cito nec permiserit

Callis, nec facile crebris angustibus.

Morbos initio prohibet increfcere,

Cogit autem uigentes mox decrefcere.

Nisi ad alia descendas facile medicamina.

Hunc pharmaci in modum fit compositio.

Lithargyri leuissimi chrysitidis

Libras duas miscens, quatuor axungia

Valde uetusta, annosa, atq; crassissima,

Et non olentis, non nigra, non aspera:

Sic nanq; sumet pharmacum efficaciam.

Liquatæ diligenter olla axungia,

Membranulas salemq; mox sustollito.

In uas aliud ipsam percolans amplius.
 Adiectoq; oleo, rursus cura seruetur,
 Non omne ponēs oleum, sed partes duas:
 Tertia manebit in expedito condita,
 Si sit necessum iungere, ne absit longius.
 Vteris omnino per hyemem, cum in ditum
 Medicamini crassum oleum longo tempore
 Euaserit, lithargyrum & feruentibus
 Inspergito, leui igne & assiduo coquas
 Spatha mouens, præstiterit quam esse pineam.
 Cum ceperit mediocri coctum tempore
 Medicamen hoc emplastrū spissitudinem
 Necnon fœtorem simili pacto pharmaci,
 Confestim ab igne cacabum deponito,
 Faciens per ætatem paxillulo durius,
 Sed hyeme mollius, non inquinans tamen.
 Moueto, ad usq; quo modice ita refrixerit
 Sic deinde rursus manibus durioribus
 Totum subactum ex olla transferri iube,
 Cum poscet usus, iterum ualide mollesis,
 Mollisq; diligenter pelliculæ illinens
 Per magna superaccommodabis spleniā.
 2 Emplastrum uero hoc si quando efficacius
 Desideres ad neruos crassos, musculos,
 Durasq; mammas, atq; articulos in super
 Tumentes fieri, pondo radicū indito.
 Agrestis maluæ purarum acrecentium
 Sectarum in partes digiti crassitudine,
 A longitudine, in olla feruentibus.
 At cum madorem totum, & uires pharmacum
 Ex igne deposuerit, colo traipse
 Maluæ radicales, leuem & lithargyron
 Insuper coque tum ut prædixi, & reponito
 Simili modo rursus, eodemq; ipso utitor.
 3 Ambas eodem tenere id uirtutes ait
 Primus Menecrates inuentor pharmaco,
 Vir qui fuit habitu medicam erga artem optimo.
 Et enim recentia seruat citra phlegmonem
 Vulnera, eadem necnon diuisa glutino
 Iungere, quæ sunt & phlegmone obfessa ulcera
 Nimis, medicari & uulneratos musculos
 Quasit, sine quoquam alio, quæ succurrere
 Possunt cataplasmatis, fomentis spongijs.
 At omnia, quæ facere confirmaui prius
 Medicamen ex lithargyro, & axungia
 Facit, optimum uero pessum diutinis
 Recentibusq; uteri inflammationibus.
 Implere caua dilutum rosaceo
 Vel myrteo bono, & cicatricem addere.
 Summatim omne cataplasmā, necnon pharmacū
 Extrinsecus quod ipsis super inijcitur,
 Superfluum esse dicit isto utentibus.
 Profecto dignum scriptione est pharmacum,
 Cuius fides iam uel recepta est inuidis.
 Hunc in modum ipsum preparari dicunt.
 Septem olei libras æstiuis temporibus
 Indes, alias eius dimidium repperi,
 Pinguis, recentis pariter atq; axungia.
 Sed hyeme, sicut tradit, inieceris nouem.
 At sex leuissimi modo lithargyri,
 Fœnigræci addit dimidium sextarij,

A Et feminis tantundem combusti lini,
 Maluæq; agrestis pondo statuebat tria.
 Radicis, etiamnum cui succus sit recens
 Quaternis bis coquere ex aquæ sextarijs.
 Ollæ orificio amplo recenti fistili.
 Maluæ radix purgata, confisa itidem.
 Et tenuis, & contusa, ut fuerit indita,
 Mox addito fœnigræci elutum probe
 Liniq; semen, at cum succum emiserint
 Coctura, spissitudinemq; acceperint,
 Habeto succum expresseris quem linteo.
 Trutina at quaternas quando expendis libras
 Olei, commiscens, totum coque carbonibus.
 Cum uero tenues bullulæ ex maioribus
 Crebræ, contentis cacabo produerint
 Lithargyrum leuem protinus aspergito,
 Ignisq; non acris, sed assidue coque,
 Frictus sit dum usq; succus cum pinguedine.
 Erit ipsum medicamentum emplastrū melinum,
 Boni coloris, non inficiens, nec nimis
 Durum. uetustis hoc qui inuenit pharmacis
 Vocabat ipsum iure, & succis pharmacum.

Aliud. 4

Et hoc eodem prodit genere pharmacum,
 Alijs licet misturis ipsum præparent.
 Affectus ad quos retuli, prorsus facit,
 Summatim omnibus, & crudis, & quæ concoqui
 Facile mutari nequeuntq; ingentia,
 Et musculorum & membranarum uulnera
 Persanat, ipsorum nam facile subuenit
 Punctibus, arthriticis iniectum item omnibus
 Insectatos iam mitigabit diutino
 Dolore. picis assumit quam siccissimæ
 Libras duas. ceræq; totidem ponticæ
 Puræ, ter ebithinæ & liquidæ libras duas.
 Mannæq; thuris ueri unam pondo libram.
 At selibram, uel hæc paxillulo minus
 Albi recentis butyri pinguisimi.
 Reliqua diu liquentur, & quidem igne acris
 Assidue cernens amplius ne pharmacum
 Colore inficiat digitis contritum tuis.
 Quibus peractis sublata ab igne ollula,
 Mannam liquatis inde sic aspergito,
 Mouens medicamentum diu rudicula.
 Sic frigeratum, & mollitum reponito.
 Huic copiosumq; & recens rosaceum
 Contemperans, caua atq; ad carnis indiga
 Adeo ulcera utere, tendonumq; phlegmonas
 Tum quæ non facile in pus mutant candidum
 De Acopis, hoc est lassitudinem tollentibus. Cap. IX
 Quid Acopa medicamenta promittant, etiam
 nomen ipsorum ostendit. At copos, id est lassitu-
 dines Græci homines uocant affectus ex multo
 uehementiue motu, corporibus uel totis, uel par-
 ticulis quæ amplius laborarunt ob orientes. Porro
 molestæ sunt affectiones hæc potissimum ijs qui a-
 gitantur, mouenturq; uehementiores autem, iam
 & conuiescentibus negocium faciunt. Cæte-
 rum postea medicis in usu fuit, etsi non ad lassitu-
 dines medicamē ab ipsis sit cōpositum, sed uel ad
 dolorē diuturnū in alto corporis latentē, uel mo-

tum difficilem, uel particulae duritiam, uel tensionem, uel tumorem scirrhusum, appellare similitur acopa, & id genus omnia, modo humidam consistentiam acopis similem habeant, quae liquidis ce-
 ratis cuiusmodi & in luxatis, fracturisq; utimur, est propinqua. Quippe talis consistentia, liquidissimum est quod a iunioribus medicis cereleonum appellat, deinde illitus acopi, post hoc liquidiorum ceratum crassiore substantia praeditum, mox ceratum tenerorum & mollium, uti uocant, postremo amolynta, hoc est non inquinantia, similia ijs quae proprie epithemata dicuntur. His succedit emplastrorum consistentia, quae & ipsa in maioris minorisq; ratione, haud mediocrem obtinent differentiam. Quare nonnulli medicorum, quaedam nomine a sola consistentia ita desumpto, ceratomalagmata nuncuparunt, medicamenta inquam inter ea quae corpori imponuntur, non etiam quidem liquidia, duritiem uero tantam necdum consecuta, quam tam emplastra possident. Cum igitur omnes citatae differentiae non medicamentorum uirium, sed consistentiae formae sint indices, Acoporum appellatio, quondam sane medicaminum facultatem, postea consistentiam significauit, huiusq; rei causa cum distinctionibus ea nominare coacti sunt, hoc quidem Acopon relaxans, illud emolliens, uel calefaciens, uel a dolore tollendo anodynum, uel ab euocatione ex alto, & meatuum transmutatione metascriticum appellantes, sicut etiam ad hunc quendam affectum conferre, uerbi gratia paralyticum, coxarum laterumq; dolorē, uel comuniter ad uniuersos dolores. Natiuum igitur est medicamen simplex omnium lassitudinum praesidium, oleum uidelicet, quod & citra adiectionem nominat, quoniam uetustis temporibus solum quoq; erat, posteri cicinū apud nos ei apposuerunt. In Aegypto enim & hoc uetustum erat, & rursus post cicinum raphaninum, sinapinum, & sesaminum, aliaq; eius generis quemadmodum etiam apud nos crinum, id est ex lilio, mastichinum & lentiscinum, quaeq; his magis uaria sunt, uel usq; ad unguenta. Itaq; ne minem lateris arbitror medicamenta Acopa apud ueteres dicta, omnia liquidae consistentiae esse necessarium, quippe oleum solum lassitudines externis partibus ingruentes curat, in alto affligentes uehementioresq;, cum iniecto aliquo laxante pharmaco mediocriter calefaciente, ueluti chalbano, resina terebinthina, ad hanc colophoniam quadam nominata & fricta. Quibus calidiores sunt abietina & strobilina, terebinthina uero larix paulo calore praecellit. Caterum id genus omnia relaxantibus oleis miscetur, quale est Sabinum, iniecta interdū & cera. Iam uero Acopon ungentum est, in ijs qui iam etiam in corpore alto dolent, & oleum ex semine abietis, chamamelis, anethi, & floris populi nigrae, quorum mox dicemus confecturam, praeterea sulinum, & gleucinum, & comagenum, ex acoporum unguinum grege est, & quae ex adipis ac pinguedine componuntur, fusillo quidem moderatissime relaxanti, gallinaeo autem his uehementius, & hoc adhuc magis anserino. At pingue

A leoninum, & pardi ualidius est, ut iam uehementer calefaciat, eoq; insigniter discutiat. In medio horum consistunt, bubulum, caprinum, uulpis, & hyena. Haec sane uniuersa in genere sunt eorum quae proprie Acopa dicuntur, hoc inuicem discrimine uariantia, quod alia magis, alia minus calefaciant. Quapropter nonnulla genere toto Acoporum unguinum excidisse uidebuntur, si in mollibus ea corporibus examines, et si durioribus, cuiusmodi agrestium sunt, utilissima appareant; nam subinde etiam medicamina dura corpora ualentiora pharmaca sustineret; mollia uero & humida, ueluti puerorum, mulierum, & eunuchorum, eiusmodi medicaminum potentiam ferendo non esse. Insuper cuius notum est, & quae uocantur Myracopa, ex Acoporum cum unguentis temperatura fieri, nihilo ceteris praestantiora nisi odoris suauitate.

CAP. X. Quemadmodum igitur a uetustioribus longo usu explorata scribere consueui, ita nunc quoque faciam, ab Aesclepiadis scriptis sumpto exordio.

Quae Aesclepiades in quarto Exteriorum Acopa & Myracopa descripsit. 1

Acopon ad lassitudinum molestias, benefacit neruis condolentibus, hoc Themison utebatur, medicamen est uehementer bonum. Samsuchi sextarium unum, rosmarini sextarium unum, scaenigraci sextarium unum, cardamomi sextarii dimidium, brathyos sextarii dimidium, uini dulcis sextarios tres, olei uenafrani trepondo, cerae pondo duo. Arida in uino triduum macerari finito, quarto die oleum adijcere oportet, atque ubi sedulo agitaueris ac super pruna posueris, mouendo coquere, quando continue effuerit, liquorē exprimere, ceram concisam huic adijcere, & rursus supra ignem coquere, ubi cera liquata fuerit, ab igne tolles, sinesq; refrigerari: Postea uitreo uase uel stanneo repones, ac uteris nunc solo, nunc unum unguentorum admisto.

2 Aliud medicamen accommodatum. 3

Benefacit solutis, ac tremulis: item ualet ad omnem neuroium ex consensu dolorem, usus est Menius Rufus, succurrit post dagricis, arthriticis, ischia dicisq;, ut toto liberet affectu. Vfus eius est in exacerbationum interuallis, at in accessionibus diluto medicamine utimur. Samsuchi sextarios ij, scaenigraci sextarii unum, rosmarini sextarium unum, seminis meliloti sextarii unum, illyricae pondo unum, cyperi pondo unum, brathyos pondo unum, cachryos pondo unum, cardamomi selibra, iunci floris selibra, caliae selibram, abrotani selibra, myrti fructus selibram, lauri fructus selibram. Omnibus cotulis, ac in uas duplex unguentarium coniectis, ueni Thmolitis sextarios octo affundito, triduo maderis finito, deinde olei Sabinii pondo sedecim, irini pondo unum, lentiscini pondo unum, syriaci pondo unum, gleucini pondo unum, myrtei pondo unum, laurini pondo unum immittito. Igni superposita incoquito, deinde

deinde liquorē ex coctis expressum, in uas aliud
transfundito, rursus q̄ sine decoctis coquito, cerā
selibra adiecta, resina: laricis libra una. myrrhæ sta
ctē libra una. His liquatis, utitor sicut prædictū est.

4 Aliud. Sampfuchi pondo duo. fœnigræci
sextarios duos. rosamarinī sextarios duos. brathyos
pondo duo, sextarios duos. meliloti pondo duo.
cypeti pondo unū. iris macedonicæ pondo unū.
cachrysos pondo unum. cardamomi pōdo unum.
calami aromatici selibram. iunci floris selibram, ca
sile fistulæ, costi, eleliphaci, singulorum selibram.
hæccarum lauri selibram. cucumeris agrestis radi
cis selibram. myrti furculorū selibram. uini Tmo
litis odorati sextarios octo. olei Sabini pondo uig
inti quatuor. irini pondo unū. cyprini pōdo unū.
lentiscini pondo unum. gleucini pondo unū. myr
tei pondo unū. amaracini pondo unū. hedychroi
pondo unum. malabathri pondo unum. myrrhæ
stactæ pondo unum. opobalsami pondo unum. ce
re pondo quindecim. Arida imbuuntur, ac mada
fiunt, quemadmodum præcepimus, triduo, & his
oleum, & pleraq̄ unguenta adijciuntur. malaba
thrinum uero, amaracinum, hedychroon, stactæ,
& opobalsamum postrema referuntur, ut in me
dicamenti cōfectione cera iam liquefacta hæc in
dantur. Quomodo autem præparandum sit medi
camentum, & quis eius usus, iam ostendimus.

Acopon quod ex melle inscribitur. 5

Valet ad lassitudinū molestias, neruorū contra
ctiones, benefacit opisthotonicis, & canina con
uulsione affectis, dicit̄ Tetramyron, id est ex qua
tuor unguentis cōfectum. Mellis unc. iij. irini un
cias iij. rosacei unc. iij. cyprini uncias iij. gleucini
uncias tres. ceræ uncias tres. terebinthinæ uncias
tres. Mel seorsum coquitur, quæ liquari possunt, li
quesunt, & in mortarium coniecta omnia simul
cōquassant. leuiganturq̄, excepta usui sunt.

6 Aliud. Cyprini, irini, rosacei, gleucini, singu
lorū heminas sex. ceræ denariū pondo uigintiqua
tuor. terebinthinæ denariū pōdo viij. mellis dena
riū pōdo vi. præparato ac utitor sicut prædictū est.

Aliud, uocatur lexopyretion, id est febrem finiens. 7

Rosacei, irini, gleucini, cyprini, singulorū hem
inas quatuor. ceræ denarium pondo duodecim.
terebinthinæ denariū pondo xiiij. myrrhæ stactæ
denarium pondo quatuor. mellis cocti denarium
pondo sedecim. conficitur ut docuimus.

Aliud ex Collectaneis Aphrodisi. 8

Rosacei, irini, cyprini, singulorū heminas qua
tuor. ceræ denariū pondo duodecim. gleucini he
minas quatuor. adipis anserini denarium pondo
duodecim. terebinthinæ denarium pondo qua
tuor. stactæ denarium pondo quatuor. opobalsa
mi denarium pōdo duum. mellis cocti denarium
pondo octo. conficitur superiorum modo.

Aliud Acopon, fortitidum distum, ad idem. 9

Ceræ denariū pondo octo. terebinthinæ dena
rium pondo octo. chalbani denarium pondo sex.
guttæ ammoniaci denariū pōdo vi. olei ueteris he
minas ij. medullæ ceruinæ denariū pōdo viij. præ
parato ad modū prædictū, et utitor mero et diluto

Aliud ad omnem neruorum dolorem consentientem. 10

Resina: terebinthinæ denarium pōdo quinqua
ginta sex. ceræ terebinthinæ denarium pōdo uigintiqua
tuor. ammoniaci denarium pōdo trigintaduū. chal
bani denariū pondo xxxij. medullæ ceruinæ dena
rium pondo uigintiquatuor. mellis cocti dena
rium pondo uigintiquatuor. olei ueteris heminas
duas. ammoniacum aceto soluitur.

11 Aliud. Ceræ denarium pondo uigintiqua
tuor. terebinthinæ denarium pondo uigintiqua
tuor. chalbani denarium pondo sex. guttæ ammo
niaci denarium pōdo sex. olei ueteris heminas ij.
medullæ ceruinæ denarium pondo viij. styracis
denarium pondo sedecim. præparato similiter.

12 Aliud. Ceræ denarium pondo xxxiij. tere
binthinæ denarium pondo sedecim. chalbani de
narium pondo sex. styracis denarium pondo viij.
olei ueteris heminas duas. mellis heminam unam
semis. medullæ ceruinæ denarium pondo viij. salis
floris quantū satis est, ammoniacū aceto soluitur.

13 Aliud. Benefacit ischiadicis, & opisthoto
nicis, sanat omne neruorum ex cōsensu dolorem.
Ceræ pondo unc. vi. terebinthinæ pondo libram
unam. guttæ ammoniaci pondo unciā unam. ope
panacis pōdo uncias duas. chalbani pōdo uncias
duas. medullæ ceruinæ pōdo uncias duas. medul
læ taurinæ pondo uncias duas. celsipi pondo un
cias duas. olei irini heminam. mellis pōdo uncias
tres. conficito ratione prædicta.

*Aliud ad uehementes lassitudinum affectus, & neruorum
contractiones. 14*

Ceræ denariū pōdo quinquaginta. terebinthinæ
denariū pōdo xxv. aphronitri denariū pondo vi.
celsipi denariū pondo vi. mellis cocti denariū pon
do sex. guttæ ammoniaci denariū pondo sex. me
dullæ ceruinæ denariū pōdo vi. chalbani denariū
pondo sex. seui taurini denarium pondo sex. bac
carū sicarū lauri denariū pōdo vi. olei heminā. ui
ni marinæ expertis heminā. præparat̄ sicuti priora.

Aliud Acuntianum inscriptum 15

Ceræ pondo uncias ij. chalbani pondo unc. iij.
nitri pondo uncias tres. terebinthinæ liquidæ pon
do uncias tres. celsipi pondo uncias ij. seui taurini
pondo unc. ij. olei cyprini pondo uncias iij. olei
melini pondo unc. iij. irini pondo unc. iij. mellis
pondo unc. iij. olei cōmunis pōdo unc. ij. olei ue
teris pondo unc. iij. guttæ ammoniaci pōdo unc.
unam. thuris pōdo unc. unam. præparatur ut alia.

16 Aliud. Olei ueteris sextarium unum semis.
terebinthinæ pondo libram unam. guttæ ammo
niaci pondo uncias duas. cere pondo selibrā. chal
bani pondo uncias tres. celsipi pōdo uncias duas.
thuris pondo unciam unam. æruginis pondo unc.
duas, mellis heminas duas. medullæ ceruinæ pon
do uncias tres. seui anserini pondo uncias duas. ui
ni heminas duas. aphronitri pondo uncias duas.
conficitur instar superiorum.

Aliud Acopon uiride. 17

Succurrit opisthotonicis, ischiadicis, solutis, &
tremulis. Myrrhæ denarium pondo quatuor. gut
tæ ammoniaci denariū pondo quatuor. thuris de
narium

narium pondo quatuor. niri denariū pondo quatuor, æruginis denarium pondo quatuor. opopanax uncias decem. chalbanī pondo uncias quatuor, terebinthinæ pondo libras duas. ceræ pondo libras duas. malabathrinī unguenti sextarij dimidium, cyprini sextarij dimidium. acetī quantū sufficit. ammoniacū, myrrā, nitrū dissoluito: iam solutis opopanax, chalbanū adsumigo: his leuigatis liquata superfundito, miscetoq; exceptis utitor.

18 Aliud. Myrrhæ denarium pondo quatuor. terebinthinæ pondo libras duas. ceræ denarium pondo duum. unguenti melini sextarij dimidium. cyprini pondo uncias tres. irini pondo uncias tres. olei ueteris sextarios tres. opopanax pondo uncias tres. chalbanī pondo uncias quatuor. acetī quod sufficit. præparatur ut dictum est.

Aliud ad diuturnos affectus ualde generosum. 19

Ceræ pondo minam unam. olei ueteris sextarios quatuor. terebinthinæ pondo libram unam. myrrhæ pondo uncias quatuor. opopanax pondo uncias quatuor. piperis albi pondo uncias duas. chalbanī pondo uncias quatuor. medullæ ceruinæ pondo uncias quatuor. unguenti cyprini pondo unc. quatuor. irini unguenti pondo uncias quatuor. unguenti melini pondo unc. iij. rutæ uiridis surculorum pondo unc. iij. acetī quod satis est. cucumeris agrestis radices, & rutā cum aceto incoquito, deinde liquorem expressum aridis inijcito, leuigata accurate, liquatis excipitō, ac interdum pharmaco sincero, interdum diluto utitor. hoc autem pro ratione subiectorum affectuum fiet.

Aliud Bassi pharmacium accommodatum, hoc ipso usus, cum neruorum resolutione prius laboraret, seruitus est. 20

Olei myrteī pondo uncias quatuor. cyprini pondo uncias quatuor. olei ueteris pondo librā semis. atramenti sutorij pondo libram semis. ceræ pondo libram. terebinthinæ pondo libram semis, chalbanī pondo uncias tres. mannæ pondo uncias quatuor. opopanax pondo uncias duas. bryoniæ radices pondo uncias quatuor. æruginis pondo uncias quatuor. aphronitri pondo uncias quatuor. piperis pondo uncias duas. pyrethri pondo uncias quatuor. pinguis hædini pondo unc. sex. euphorbij pondo uncias quatuor. acetī quantū satis est. bryoniā, pyrethrum, cum aceto incoquito, deinde liquorem expressum, aridisq; probe leuigatis adiectum, liquatis excipitō, usus ostensus est.

Aliud ex castoreo solutis, & omni diuturno malo auxiliatur 21

Oesyri pondo unc. tres. medullæ ceruinæ pondo uncias quatuor. terebinthinæ pondo uncias iij. guttæ ammoniaci pondo unc. duas. chalbanī pondo uncias duas. castorij pondo uncias duas. piperis albi pondo unc. duas. euphorbij pondo uncias duas. adarces pondo uncias duas. niri spumę pondo uncias duas. opopanax pondo unc. duas. olei styracini pondo uncia unam. olei irini pondo uncias duas. olei ueteris heminam unam. ceræ pondo libram semis. componitur aliorum modo.

Aliud cuius usū Bassus longo tempore paralyti infestatus, etiam ab hoc morbo conuuluit. 22

Olei myrteī, melini, cyprini, singulorum uncias

A quatuor. olei ueteris selibram. ceræ pondo unum. terebinthinæ selibram. chalbanī uncias quinque. thuris uncias quatuor. opopanax unc. duas. æruginis uncias duas. bryoniæ radices unc. quatuor. aphronitri uncias quatuor. piperis unc. duas. pyrethri uncias duas. pinguis hædi unc. sex. euphorbij unciam unam. acetī quantum satis est, compositio huiusmodi medicaminum communis est.

Aliā collinitio podagrico, ac articulari morbo laborantium ex sale confecta, toto affectu liberat, usus eius est quotidie. 23

Salis sordidi, hoc est ipsius terræ pondo, aluminis fisci pondo. facis uini Italici sextarium. lapidis alii floris uncias quatuor. Arida studiose cōterito, & facce addita accurate leuigato, quibus olei ueteris sextariū affundito, rursusq; cōqualfato, ac excepto utitor. In alijs scripturis melle attico excipit.

B 24 Aliud. Salis sordidi pondo uncias iij. aluminis fisci pondo uncias tres. lapidis alii floris pondo uncias tres. thuris pondo semunciam. myrrhæ pondo semunciam. facis uini Italici sextarij dimidium, præparato uti prædiximus.

Aliā illinitio Patroclo Cesaris liberto composita, leuat toto affectu. Utendum est quotidie & mane ante balneum, & post ipsum, ad hæc uesperī. Sumentes ex pharmaco quod satis est, foluentē, & oportet pedes inungere, & citra confusionem infricare. 25

Thuris denariū pondo decē. piperis albi denarium pondo decem. aphronitri denarium pondo octo. myrrhæ denariū pondo quatuor. guttæ ammoniaci denarium pondo sex. acetī quantum sufficit, olei cyprini heminā unā s. sicca cōtunduntur cribroq; tenuissimo incernūtur, reliqua aceto dissoluntur, leuiganturq; deinde omnia simul miscentur, et tritis cyprinum inditur; exceptis autem utimur. 26 Aliud. Thuris denarium pondo octo. myrrhæ denariū pondo octo. guttæ ammoniaci denarium pondo octo. aluminis fisci, piperis albi, singulorum denarium octo. niri denarium pondo octo. acetī quod satis est, olei cyprini heminas duas. ceræ pondo selibram, quæ liquari possunt, liquefuit, & tritis adijciuntur.

Aliud Neapolite medicamentum, ichiadicis, arthriticis & podagricis accommodatum, toto affectu liberat. 27

Thuris, piperis albi, guttæ ammoniaci, myrrhæ, lapidis alii floris, aluminis fisci, niri, centaurij succi, singulorum pondo uncias duas. facis uini Italici sextarium unū. olei cyprini, laurini, myrteī, styracini, ceræ, singulorum pondo libram unam. terebinthinæ pondo selibram. chalbanī pondo unciam. opopanax pondo semunciam, liquata tritis miscetur.

Aliud Domitio Nigrino compositum quod toto affectu liberat. 28

Myrrhæ factæ pondo uncias duas. thuris pondo uncias duas. guttæ ammoniaci pondo unciam unam. niri rubri, uel salis sordidi pondo uncias duas. aluminis fisci, lapidis alii floris, colocynthidis partis interioris, mandragoræ succi, mellis, euphorbij, singulorum pondo uncias duas. unguenti crocini, melini, styracini, malabathrinī, laurini, gleucini, hedychoi, amaracini, pinguis utulmarini, singulorum pondo uncias sex. huius penuria utendum est medulla cerui uetustissima. ceræ pondo

pondo libram. chalbani pondō unciam. terebinthinae pondō sēlibram. opopanaxi pondō semiumciam. ficis uini Italici sextariū. præparato quem admodum supra dictum est. Hac confectura utemur post Podarcem, cui titulus est Pompei pretiosa, Aburnio Valenti compositam.

Medicamentum ex populo, beneficit ischiadicis, arthriticis, solutis, tremulis, ualet item ad usum quotidianum. 29

Populi nigrae surculorū pond. minam. cucumeris agrestis radicis pōd. lib. iij. casiae fistulae pondō lib. ij. unguenti crocini pondō lib. ij. croci pondō unc. iij. uini odorati sextarios xij. olei Sabini sextarios s. sampfuchi pōd. lib. iij. ceræ pond. lib. iij. surculos populi diligēter confusos in uase duplici unguetario cōtineto, ac his sampfuchū cucumerisq; radices in crassiora frusta cōcīsas adjicito: his uinum superfundito. Omnia diebus nouē macerati sinito: sequētī die oleum adijciatur, & rursus accurate tunsa igne nō acri incoquito, postea liquor expresso, cerā derafam & medullā leuē factam indito, igni imposta coquito, ubi liquata fuerint, ab igne tollens, crocinū adiungito, mouetoq; cōtinuē: crocinū uero leuē factū, terrestris testudinis sanguine excipito, ut olei ueteris crassitudinē habeat. Porro iugulāt testudo iuxta clauiculā arundine utrinq; transfixa. Liquata croco inficta rursus tundito, exceptisq; uitōr: medicamentū toto affectu leuat, multo autē præstantius euadit si testudinis sanguinem copiosum recipiat.

Aliud. Valet ad molestias ex perfrictione, & contusiones ex ictibus. 30

Populi nigrae surculorū pondō minā. cucumeris agrestis radicis pōd. minas iij. casiae fistulae pōd. lib. ij. medullae ceruinæ pondō lib. ij. croci pōd. libras tres. uini odorati sextarios xij. olei libras decem. sampfuchi pondō lib. iij. ceræ lib. iij. sanguinis terrestris testudinis quantumcunq; indideris, medicamentū nihil offendet. sed potius iuuabit. præparatur modo prædictorum.

Aliud Acopon ex ranis rubetis, hoc usus uir Xysticus, id est idulator & acopo & malagmate, ad toto affectu conuulsi, confectio ita habet. 31

Olei ueteris Sabini pōd. lib. iij. cucumeris agrestis radicis pondō lib. iij. ceræ pondō lib. tres. apochymatis pōd. lib. tres. adipis suillae ueteris pondō libras tres. ranarum rubetarum magnarum numero tres, uel si hæ non sint, paruorum quinque. medullae ceruinæ pōd. uncias tres. aphronitri pōd. uncias tres. sulfuris uiui pondō uncias tres. olei laurini pondō uncias tres. olei trini pondō uncias tres. unguenti malabathrini pondō libram. sampfuchi pōd. libram. radices in crassiora frusta sectas, ac in oleum simul cum sampfucho cōiectas, supra prunas incoquito, ubi radices inauerint, humore exprimito, radices quidē & sampfuchū abijcito, ranas in sportula textā imponēs, huiusq; oras consuens, & oleo expresso committens, rursus uas coopertum igni supraonito, ubi iam satis magnum temporis spatium intercesserit, ut ranæ illiquerint, sportula deposita humore expresso abijciatur. Reliquo oleo liquata indito, mouens sine

Galen.

A requie, postremo medullam & chalbani ad iungito, postq; soluta fuerint, ab igne tollito, ac modice refrigerari permittens, arida tunsa, ac tenuissimo cribro secreta inspergito, mouens assidue, in mortarium demissis, iterumq; tunsis, malabathrini unguenti pondō & semissem adiungito, & rursus tundito, excepta uase plumbeo, undiq; obturato, ut nihil perspiret, seruato: ueteris medicamento interim ut malagmate, facta morbi inclinatione, interim ut collinitione. Nam pharmaci quod satis est capientes, soluentesq; unguento, ut cerati liquidi spissitudinem habeat, utimur.

Aliud Piscatoris pharmacium accommodum. In cuius usu immoratus piscator, cum affectu adeo infestaretur ut corpore peruerso esset, toto malo liberatus est. data est confectio Valerio Paulino, habet autem in hunc modum. 32

Olei Sabini lib. iij. populi nigri surculorum libram. qui cum non adint, sampfuchō uti oportet duplicum illius adijciēs. habet autē & sampfuchū, cyprini, trini, mastiches. sing. librā. myrrhae factae sēlibrā. ceræ trientē, apochymatis lib. iij. adipis suillae pinguis lib. tres. sulfuris uiui uncias tres. nitrī spumæ uncias tres. chalbani lib. iij. medullae ceruinæ uncias quatuor. testudinum terrestrium decē sanguis immittendus est medicamini præparato, & iam trito. porro conficiendum est, uti diximus. In usu ad medicamentū libram acceptam opobalsami uncias iij, unguenti malabathrini unciam unam, condimenti gratia indere conuenit: hoc in quotidianos usus ita præparatur.

Aliud Piscatoris, à Valerio Paulino aliter confectum. 33

Ceræ pondō libras tres. cucumeris agrestis radicis pondō libras tres. apochymatis pondō lib. tres. adipis suillae pinguis pondō libras tres. olei Sabini pondō tria. cyprini pondō. susini pondō. crocini pondō. factae pondō sēlibram. medullae ceruinæ pondō & semissem. chalbani pondō & semissem. rubetas quinque. sampfuchi, uel populi nigrae surculorum pondō tria. sulfuris ignem non expecti pondō uncias tres. aphronitri pōd. uncias tres. testudinum plurimum sanguinem conficito, quem admodum prædixi.

Aliud Flauij Clementis confectum pharmacium accommodatum. huius usu nouimus homines toto corpore distortos à podagra chragragq; adeo conuulsi, ut citra noxam obambulaerent. 34

Olei Sabini pondō duodecim. cucumeris agrestis radicis pondō duodecim. ceræ pondō. terebinthinae pondō. medullae ceruinæ pondō. chalbani pōd. ranas numero sex. Oleum diuidimus, & seorsum in eo ranas, seorsum item radices incoquimus, deinde liquore percolato ad pharmaci confectioem utimur. Pharmacum autem acopi usum præstat: Hoc pharmacum Valerio Paulino dederūt scripturæ hunc in modū adijcientes. Sampfuchi pōd. unū & semis. unguenti crocini pondō. malabathrini pōd. opobalsami pond. uncias tres. testudinū decem sanguinem. medullae ceruinæ pondō duo. chalbani pondō duo. adipis suillae ueteris pondō tria. apochymatis pōd. ceræ pōd.

tom. 5

X do tria

do tria semis. sulphuris uiui pondo unciam. aphronitri pondo uncias quatuor. rubetas tres. testudinum quindecim sanguinem. & loco crocini syriaci pondo, samfuchi pondo semis ponitur: superiorum modo præparatur

Aliud Pompeij Sabini, pretiosum inscribitur, Aburnio Valenti præparatum fuit. 35

Vtile est ischiadicis, athriticis, podagricis, tremulis, & ad omnem nervorum dispositionem. compositio talis est. Samfuchi podo duo. fœnigræci pondo duo. meliloti pondo. rosamarin pondo. herbæ fabinæ pondo unum & semis. cachryos podo. cyperi podo. abrotini podo. cardamomi pondo selibram. baccarum lauri pondo selibram. uini odorati sextarios xxiii. unguenti irini podo quindecim. cyprini podo ij. syriaci pondo duo. ceræ pondo ij. terebinthinæ pondo. chalbanî podo unciâs duas. opopanacis pondo uncias tres. guttæ ammoniaci purgatæ podo uncias iiii. piperis longi, niri rubri, lapidis alii floris, colocynthidis partis interioris, aluminis fisisilis, singulorum pondo uncias quatuor, thuris pondo uncias quatuor. centaury pondo nuciâs iiii. mandragoræ succi, myrrhæ stactæ, mellis cocti, singulorum podo uncias quatuor. rubetas ranas magnas numero sex. testudinum terrestrium decem sanguinem. Medicamentum uarie componitur. aromatica sicca & crassius contusa, uasq; duplici unguentario iniecta, uino superfuso, triduum macerari permittimus: quarto die uino quatum satis est ablato, guttâ ammoniaci, thus, chalbanum, & opopanacem imbuimus, & reliquos succos. hæc dissoluta leuigamus, quibus factis leuibus, tunca cribrataq; alumem, nitrû rubrum, colocynthidem, lapidis alii florem, piper & reliqua arida immittimus, simulq; terimus, his myrrham, stactem, & mel adijcimus, sic iam præparatis, omnia liquida his quæ in uino macerantur affundito: igni superposita coquito, mouens continue. Vbi bona uini pars consumpta fuerit, humorem exprimito: cui ranas imponens, sicut supradictum est incoquas, & tunc liquida adijcias. Hæc liquata ab igne deponens, leuigatis indes, ac rursus tundes: exceptis utitor.

Aliud Acopon metasynticti, id est ex alto euocans, auxiliatur ischiadicis, arthriticis, solutis, & tremulis. utebatur Iulius Secundus, diuturnos affectus demolitur, capite dolentes adiuuat. 35

Adarces pondo uncias duas. myrrhæ stactæ podo uncias duas. aphronitri pondo uncias duas. euphorbij, opobalsami, sing. podo uncias duas. styracini unguenti pondo. arida tunduntur, cribranturq; his myrrha, stactæ, & opobalsamû adijciuntur, denuo tunsa styracino excipiuntur, ac interim per se, interim alteri missum usus est medicamentum, coctionem quoq; adiuuat.

Aliud Orphito compositum, cuius usu thoracis affectu molestio, & iam inueterato liberatus est. 37

Adarces pondo uncias duas. myrrhæ stactæ podo uncias duas. aphronitri pondo uncias tres. euphorbij pondo uncia dimidium. malabathrini unguenti pondo. foliati Romanis dicti pondo selibram. ceræ pondo uncias duas. opobalsami pon-

do uncias duas. præparatur in modum prædicti.

Aliud Neapolitæ, quod Agrippæ compositum fuit. 38

Adarces ablatis arundinibus pondo uncias iij. euphorbij pondo uncias tres. aphronitri podo uncias tres. stactæ podo uncias tres. opobalsami podo uncias tres. unguenti malabathrini primi pondo. foliati pondo ac selibram. hedychroi pondo selibram. crocini pondo selibram. nardi alianæ consecretoriæ primæ pondo selibram. ceræ podo uncias tres. conficito ut priora.

Aliud Myracopon. hoc est ex acopis & unguentis constantis regium, ad inueteratos affectus, item colicorum adiuuat. 39

Calami aromatici, carpopalsami, amomi, cardamomi, iunci floris, calizæ rosam spirantis, meliloti, samfuchi, herbæ fabinæ, fœnigræci, cyperi, nardi, piperis albi, singulorum podo uncias tres. myrrhæ troglodyticæ pondo selibram. euphorbij podo selibram. uini falerni sextarios xvi. unguenti malabathrini, primæ confectionis pondo ij. nardi primæ compositionis podo. foliati primi podo. opobalsami pondo. crocini pondo. styracini primi podo. amygdalini podo. comageni podo. glicuinii podo. irini podo. hedychroi podo ij. amaracini primi podo ij. coquitur unguenti modo: nimis q; bonum medicamentum est. Celeri Primipilario compositum est: benefacit ischiadicis, arthriticis, solutis, tremulis, ualere ad cœuulsa, ruptaq; item ad scirrosos uiscerum affectus, & cœcoctiones iuuat uentriculi orificio & dorso illitum.

Aliud compositum Aquilæ Secundille. 40

Euphorbij, opobalsami, myrrhæ stactæ, singulorum pondo uncias duas. niri spumæ podo uncias tres. ceræ tantundem. unguenti malabathrini podo. foliati podo selibram. crocini podo selibræ. nardi unguenti pondo selibram. hedychroi pondo selibram. amaracini pondo selibram. conficitur, quo dixi modo.

CAP. XI Hæc quidem sufficiebant. Etenim Asclepiades confectiones ipsorum & usus accurate tradidit: Andromachus autem, ut solet, negligentiùs, neq; ad quid eorum singula ualeant, indigens, sed nobis cõijciendum relinqûens. Nam ceu ad artis peritos scripturas semper conscripsit, uerum quoniam nonnulla acopa inuicem sibi similia, in symmetrijs discrepant, ideo hæc quoq; appofui, quod lectores ex ijs quæ Asclepiades aduocuit, de ijs simul ratiocinari queant, cuiusmodi acopa, quibus utijs potissimum conducant. Dicemus autem & nos, ubi uniuersales quosdam sermones de ipsis retulerimus, unde accuratiore uia ac ratione ad eorum dem usus, qui mentem dicendis adhibebunt, peruenient.

Acopum uiride Piscatoris. 1

Ceræ terebinthinæ, olei ueteris, singulorum podo & semis. aphronitri pondo uncias quatuor. chalbanî pondo uncia s tres. aruginis rasæ pondo uncias tres. opopanacis pondo uncias sex. guttæ ammoniaci pondo uncias tres. mannae pondo uncias tres. acetî pondo uncias duas. melini pondo uncias duas. cyprini pondo uncias duas. irini pon-

do uncias duas. seu caprini pondo unciam.

Aliud Acopon bonum. 2

Ceræ pondo xvij. aphronitri pondo uncias viij. baccas lauri numero viij. piperis albi denarij pondo unius. crocomagmatis quantū sufficit. medullæ ceruinæ denarium pondo duum. myrrhæ denarij pondo unius. ceræ denarij pondo unius. uini rhodiaci & aceti parum, aridis adijcitur.

Aliud Bassi Stoiici. 3

Cucumeris agrestis radicis pondo unū. aphronitri pōd. uncias iij. baccarū lauri sextarios duos. rutæ uiridis fasciculū manipularem, rosamarinū tantundem. olei Sabini ueteris pōdo decē. Radices & herbæ oleo incoquuntur, deinde exprimuntur, postea liquata superfunduntur.

Aliud. 4

Opopanax pōdo unciam. resinæ pondo unciam. resinæ pityinæ pondo ij. ceræ pondo. guttæ ammoniaci pondo uncias sex. cæsyppi pondo uncias duas. olei ueteris sextarium unum semis. salis floris pondo uncias duas.

Aliud. 5

Ceræ pōdo. medullæ ceruinæ pondo uncias ij. unguenti Babylonij pōdo. hedychoi pondo. stactæ pōdo. malabathri pōd. unciam. nardi pondo unciam. opobalsami pondo uncias sex. In marina uel muria medullam liquato, liquabilia curata simul committito, postremo opobalsamum. at si liquidum sit acopon, plus ceræ indito.

Aliud Acopon Quadrati. 6

Irii unguenti unciam. cyprini unciam. laurini unciam. olei ueteris unc. iij. terebinthinæ unciam. medullæ ceruinæ uncia. cæsyppi uncia. piperis uncia. nitri denarij pōd. iij. sulfuris ignē nō experit denarij pōd. iij. pyrethri denarij pōdo iij. melis unciam. liquata siccis miscentur.

Aliud Acopon sextidum 7

Terebinthinæ denarium pondo quinquaginta sex. ceræ denarium pondo uigintiocto. cæsyppi, mellis, medullæ ceruinæ, guttæ ammoniaci, chalbani, aphronitri, interdū opopanax, baccarū lauri, singulorum denarium pondo sex. olei ueteris sextarium. uini heminas duas. quidam castorij denar. pondo trium addunt.

Aliud ex sampsucho. 8

Ceræ pondo. olei omphacini sextarios iij. sampsuchi sextarium. uini ueteris sextarios quatuor. In aluæ fasciculum, herbæ mercurialis quam Greci linozostin uocant, fasciculum, cucumeris agrestis radices.

Aliud ut Antimachus. 9

Sampsuchi noui, rosamarinī, aspalathi, brathyos, id est herbæ Sabinae, foenigraci, singulorū sextarios duos, ceræ pondo. uini ueteris sextarios tres. gleucini sextarios tres.

Aliud à Philocle acceptum. 10

Olei decocti permultū. radicū cucumeris agrestis sextarios tres. ceræ minā. terebinthinæ minā. medullæ ceruinæ denarium pōdo uiginti quinque. adipis anserini denariū pōdo uiginti quinque. chalbani denarium pōdo duodecim semis. sampsuchi sextarium. rosamarinī sextarij. Hęc postremo cum

Galen.

A uino odorato tum leuigantur, tum miscentur: sit autem malagma ceræ copiosiore infecta.

Aliud Acopon accommodatum, ut Aphrodas. 11

Aphronitri denarium pōdo trium. piperis grana quadraginta. & longi totidem. thuris denariū pōdo sedecim. His tritis uini odori chij, uel rhodij heminam superfundito. mellis denarios nouē. deinde in patella liquato ceræ Tyrrhenicæ denarium pōdo duodecim. seu taurini denarium pōdo quadragintaduum.

Aliud. 12

Asphalartesis, id est crocomagmatis denarium pondo iij. medullæ ceruinæ denariū pōd. xij. cæsyppi denarij pondo sex. adipis anserini uel fusilli denarium pōdo duodecim. terebinthinæ denarium pōdo duodecim. irini denarios octodecim. cyprini, gleucini, singulorū denarios octodecim. Mel li quas, deinde siccis admiscetur, ac ubi simul cū his quæ in mortario sunt, leuigaueris, in usum condēs.

Aliud Acopon barbaricum, ex euphorbia: ad ischiadi cos, aliāq; multa. 13

Opopanax pōdo unciam. tyrrhēnicæ pōdo unciam. terebinthinæ pōdo uncias duas. chalbani pōdo unciam. guttæ ammoniaci pondo uncias duas. euphorbij pondo uncias duas. castorij pondo uncias duas. piperis albi pōdo uncias duas. medullæ ceruinæ pondo uncias quatuor. cæsyppi pondo uncias quatuor. limnestridis pōdo uncia dimidium. styracini, laurini, amaracini, singulorum uncias tres. olei ueteris sextarios duos. hedychoi uncias sex. preparato, utitor, ualet ad desperatos ne uorum affectus, item proprie ad ischiadicos.

Aliud Acopon quo Arminius Aquila curatus est: beneficit coxæ dicitur dolori, omniq; neruorum distensionī. 14

Opopanax pondo uncias duas. cæsyppi pondo uncias quatuor. casia pondo uncias quatuor. medullæ ceruinæ pondo uncias quatuor. ceræ pondo. styracini pondo uncias sex. irini pōdo uncias sex. laurini pondo uncias sex. olei ueteris pōdo unum. euphorbij pōdo uncias duas. guttæ ammoniaci pondo uncias duas. Euphorbium cum pauco melle misceto.

Aliud Chyri, ut Philoxenus grammaticus. 15

Ceræ pondo libras duas. guttæ ammoniaci pondo libram. chalbani pondo libram s. styracis pondo libram, bdellij pondo libram. myrrhæ pondo uncias duas. thuris pondo uncias nouem. cæsyppi attici pondo libram. propolis pondo libram. resinæ terebinthinæ pondo libram. olei ueteris pondo duo. cyprini, irini, unguenti amygdalini, singulorum pondo duo. syriaci pondo tria, opopanax pondo. præpara.

Aliud Acopon uiride ut Clemens Serorius, quo utor. 16

Aeruginis rasæ pondo uncias sex. resinæ frictæ pondo uncias quatuor. olei myrte pōdo. lenitici pondo. olei ueteris pondo. laurini pōdo duo. syriaci pondo. gleucini pōdo tria. pinguis agnini uncias tres. ceræ ponticæ libras tres. chalbani pondo libram. myrti tenerorum foliorum, rutæ foliorum uiridium, rosamarinū uiridis, lauri foliorum tenero

rum, singulorū uncias sex. herbæ saluæ selibram. A uiridia tunditur, & oleis per noctem & diem macerantur, deinde cum liqualibus incoquantur, cum ab igne deposuerit, arugo inditur, percolata reponuntur, facit ad omnem neruorum laborem.

Aliud Acopon calefaciens ut Castus, ad diuturnos affectus, & conuulsiones 17

Pissellæi sextariū. syriaci unguenti tantundem. iris illyricæ parem modum. terebinthinæ pondo libram. axungie pōdo libram. rasuræ naualis pondo unciam. Incoquito, ruta uiridi mouens.

Aliud Acopon Orionis Pexoris bonum. 18

Ceræ pondo libras sex. propolis pondo libras quinque. iris illyricæ pondo libras iij. terebinthinæ pondo libras quatuor. opopanacis pondo libras tres. olei ueteris pōdo quatuor. chalbani pōdo libras ij. olei lentiscini pondo tria. myrtæ pōdo iij. guttæ ammoniaci pondo libram. medullæ ceruinæ pondo libras tres. cæsypii pondo libras vi. baccarum lauri pōdo librā. styracini pondo tria. amygdalini pondo tria. seui uitulini pondo libras tres, & leonini pōdo librā semis. opobalsami pondo libram semis. præparato diligenter.

Aliud Myracopon bonum. 19

Malabathri, hedychoi, nardi, crocini babylo-
nij, singulorū selibra. stactæ, opobalsami, ceræ, co-
mageni, singulorū uncias sex. aloes uncias duas.
mellis uncias tres conficito.

Aliud Myracopon quo uitor. 20

Ceræ candidæ pondo uncias duas. adipis anse-
rini odoramentis conditi uncia. seui taurini odo-
ramētis cōditi unciam. adipis leonini odoramen-
tis conditi uncias duas. crocodili odoramētis con-
diti unciam. medullæ ceruinæ uncia. salis ammo-
niaci uncias duas. pipēris albi uncias duas. thuris
unciam. cinnamomi uncias tres. aphronitri uncia.
iris illyricæ sextarios duos. nardi unguenti sexta-
rium. malabathri Alexandrini sextarios duos. sta-
ctæ libras duas; syriaci crocini libras duas. mellis li-
bras quatuor. opobalsami sextarium. comageni li-
bras duas. parato uti nouisti.

Aliud Myracopon. 21

Ceræ tyrrhenicæ uncias sex. ammoniaci uncias
quatuor. euphorbiæ libras quatuor. pipēris albi un-
cias quatuor. limnistridis uncias quatuor. magna-
tis malabathri uncias sex. opobalsami pondo. ma-
labathri pōdo. stactæ uncias sex. foliati uncias sex.
nardi pondo tria.

Glucini confectio iuxta Andromachum. Cap. XII

Post prædicta acopa, Andromachus Glucini
confectiōē descripsit, non male ipsūm acopis un-
guinibus adiungens, quippe ad dolorem lāsitu-
dinemq; tollendā, longē est accōmodatissimum.
Traditur autem ab eo sic ad uerbum.

Glucini confectio qua uitor. 1

Myrrhæ pōdo libras duas. nardi indicæ pōdo
libras duas. costi pōdo libras tres. styracis pondo
libram. bdellij, sampfuchi, xylobalami, iunci odo-
rati, cardamomi, spathæ, iris illyricæ, misyos, asari,
sing. pōdo libras ij. meliloti pōdo, lib. nardi gallicæ
pōdo libram, aspalathi, calami, singulorum pōdo

selibrā. aristolochiæ longæ pōdo librā s. rosmari-
ni seminis sextarios duos. thuris pondo lib. iij. ca-
siæ pōdo lib. iij. fœnigræci sextarios duos. sphangi
pōdo libras duas. amomi pōdo libras duas. corti-
cis thuris pōdo libram. rosarum siccarum pōdo li-
bras duas. herbæ sabinæ pondo uncias sex. fœni-
culi pondo libras duas. balsami fructus pondo li-
bras duas. croci pōdo uncias tres. baccarum lauri
pōdo libram. pipēris albi pōdo libram. opobalsa-
mi uncias tres. malabathri foliorum pondo libras
duas. nuces pineas uirides duas. ruta uiridis pōdo
uncias duas. salis ammoniaci denarium pōdo
quatuor. nitri denarium pōdo quatuor. uini ue-
teris sextarios xij. musti boni amphoras duo s. o-
lei ueteris libras quinque, præparato diebus qua-
draginta. Hæc præfatus Andromachus, non ad-
huc confectiōnis modum, sicut Crīto adiecit, in-
super quorū libris italicis amphoram aut sextarijs
æstimet, silentio præterijt.

Glucini confectio Critonis in secundo De ornatu. 2

Crīto ad libri calcem, Glucini confecturā his
uerbis tradidit, Glucinum uim habet calefacio-
riam ac remittentem: uulua & neruis præsidium
est. huius confectiōnes multæ sunt: quæ uero sim-
plex dicitur, hunc in modum habet. Musti recen-
tis, ex uua Maronea, metretam siue amphoram in
uas stanneum coniectam, supra prunas incoqui-
to: ac ubi ter quaterue effuerit, in metretam si-
cilem transfusum, soli exponito: olei albi ompha-
cini congios sex addito, iunci odorati minas sex,
alij minæ dimidium, nardi, calami, aspalathi, singu-
lorum tantundem, palmæ elatæ minam. cyperi mi-
nam. cardamomi octauam minæ partem. amomi
tantundem. meliloti uncias quinque: sint autem om-
nia leuia, deinde diebus octo commouens, mu-
stumq; repurgans, uitior.

*Glucini confectio secundum Dioscoridem libro primo De ma-
teria scripsit autem ille in hanc sententiam.* 3

Glucinum simplex componitur ex oleo om-
phacino, iunco odorato, calamo, nardo gallico,
spatha, aspalatho, fertula cāpana, costo, & musto,
uinatijs, uasē quod aromata uinum & oleum con-
tinet, circumdati: triginta diebus, singulis bis mo-
uetur, postea expressum unguentum reponit. Vis
eius est calefacere, emollire, & remittere: benefa-
cit rigoribus, neruorum uulueq; affectibus: omni
Acopo efficax est, ut quod emolliat.

Glucini confectio ut Heras. 4

Quoniam Heras Glucini confectiōnem lucu-
lentius ipsis iuxta finem operis medicamentarij e-
docuit, illius quoque scripturam ad uerbum ita sub-
iungitur sumo. Olei Glucini cōpositio ad per-
fectiōnes, & neruorum uitia potissimum: uiuat o-
pisthotonicos, id est, quibus ceruix reflexa est in
posteriorem partem, nec in anteriore inclinari po-
test, lana ex eo irrigua locis affectis inieciat. Olei
uenafrani pōdo ducenta octo. uini falerni sexta-
rios xxx. musti aminci sextarios centū octo. hele-
nij pondo duodecim. spathæ pondo quinque. aspa-
lathi pondo quinque. hedyfari pondo duo semis, ar-
temisiæ maternæ pondo duo semis. myrrhæ pōdo tria

do ma, alij pondo, piperis albi pondo duo semis. A
 splachni seu musci pondo duo semis. xylobalfami
 pondo duo semis. aristolochiæ longæ pondo unū.
 uncias tres. myrti siccæ foliorum uncias duode-
 cim. bdellij pondo duo semis. iris illyricæ pondo
 duo semis. ityracis pondo unum uncias tres. casia
 fuluræ pōdo unū uncias tres. ladanij pondo unum
 uncias tres. cardamomi pondo unum uncias tres.
 croci pondo unum uncias tres semis. balsami fru-
 ctus pondo duo semis. thuris pondo quinq. cro-
 comagmatis pondo quinq. panacis pōdo unum
 uncias tres. calami aromatici pondo quinq. asa-
 ri pondo duo semis. casia nigra pōdo duo semis.
 amomi uua pondo unum uncias tres. iunci floris
 pondo quinq. costi pondo quinque. uncias tres.
 nardi gallici pondo quinq. fertulæ campanæ, que
 mellotos dicitur, pondo unum. uncias tres. sam-
 plicij pōdo unum. uncias tres. rosarum siccarum
 pondo unum, uncias tres. scentigræci libræ dimi-
 dium. opobalsami uascula quinq. malabathri un-
 guenti pondo. Arida tunduntur, & rariore cribro
 incernuntur, uino q̄ maceratur: bdellium, & si ari-
 dum non fuerit, & ipsum contunditur: sin pingue
 extiterit, uino ipsum in pila contundendo soluit.
 hæc in uas exiguū unguentariū stanneum q̄ cōie-
 cta, sed ita ut nihil expiret opertum, diebus duo-
 decim, & totidem noctibus sinuntur: mustum ue-
 ro cum his permaneat, uua pure expressa ut nihil
 roris cōtineat. Porro mustū in magnum ahenum
 condito, ut etiam feruori ipsius locus sit: omnia in
 uino macerata adijciunt: oleum uinum q̄ bis die
 spatha unguentaria ad horam agitatur: spatha ue-
 ro accurate detergatur, ne id quod acidū factum
 ei adhæret, medicamentum offēdat, dum rursus
 immittitur. Tegatur autem uas operculo, & desu-
 per phaliscis centonibus accurate circumdatur:
 uasi subsitrefris, quom iam dies quindecim prate-
 rierint, ammoniacum, et ipsum amomum inditur,
 crassius cōtusum. At trigesima die duplici uase su-
 pra prunas bis uel ter feruere unguentum permit-
 tendum est, opobalsamo adiecto: uase autem de-
 positio, ac modice refrigerato, unguentum desum-
 detur: reliqua sportulis, ut sunt calida, exprimere
 oportet: primum manibus, deinde prælo, & mol-
 lentes aliquid unguenti gratia, in ipsum malaba-
 thrinum unguentum conijcere, in calente aqua
 prius diffusum: item spatha permouere ut misceā-
 tur. Postea diem unū sinentes, uitreis uasis aut te-
 staceis picatis reponemus.

Que scripserit Heras Acopa. Cap. XIII

Acopon ad paralyticos, sinamatis ad omnem dolorem. 1

Rutæ uiridis pondo. pulegij sicci pondo. cype-
 ri pōdo. nitri denarium pondo quinquaginta. scē-
 nigraei pondo. linozostis siccæ pondo. marrubij
 pondo. rosamarinij pondo. aristolochiæ pōdo. amy-
 gdalarum amaratum desquamatarū modij dimi-
 dium. iris pōdo duo. terebinthinae pōdo duo. bac-
 carum lauri pōdo duo. cucumeris agrestis radicis
 pondo duo. guttæ ammoniaci pondo duo. fabinae
 libras duas. ueratri albi libras sex. myrti uiridis lib.
 tres. lauri foliorum siccorum libras tres. cera pō-

Galen.

do iij. bdellij pondo quatuor. uini heminas duas.
 albi uini congios xij. olei congios quatuor. con-
 tusis crassius ijs que tundi debent, aquam affundi
 totæ rursus tunsis, uinum oleum q̄ adiungito, &
 noctem sic esse finito, sequenti die incoquito, dum
 hæc innatantia decocta fuerint, & oleum a coctis
 qualitate accepterit: hæc omnia fiunt pedeten-
 tim: deinceps sublati, expressis q̄ recrementis, ce-
 ram, resinam, & bdellium adijcito.

Aliud uiride Acopon ad ischiadæ, & neruorum resolutio-
 nem. Hoc usus sunt in Phorte. 2

Resinæ terebinthinae pondo. māne uncias qua-
 tuor. chalbanij uncias quatuor. aphronitri uncias
 quatuor. guttæ ammoniaci uncias quatuor. opo-
 panacis uncias quatuor. seui caprini uncias sex. e-
 ruginis uncias quinq. cyprini heminam. irini he-
 minam unam & s. melini uncias quatuor. syriaci
 uncias tres. piperis uncias tres, quidā uero uncias
 quatuor. olei ueteris sesquifextarium. adarces un-
 ciam. aceti quod abūde sufficiat. Aeruginem, opo-
 panacem & aphronitrum cum aceto terito, reli-
 qua liquefacta superfundito.

Aliud Acopon ad coxendicem dolores diuinos, articulorum li-
 gationem & paralytim, admodum est efficax. 3

Olei ueteris & irini pōdo sex. laurini pōdo sex.
 styracini pōdo sex. cere pōdo sex. terebinthine un-
 cias duas. piperis uncias duas. euphorbij uncias
 duas. opopanacis uncias duas. chalbanij unc. duas.
 medullæ ceruinæ uncias duas. guttæ ammoniaci
 uncias duas. liquabilia ubi liquefeceris, siccis af-
 fundito, ac unitis utitor.

Aliud Acopon ad coxarum dolores, & in uniuersa
 sunt ad omnia. 4

Myrrhæ partem unam. pyrethri partem dimi-
 diam, leuigatis gluicinum affunditur, ut medica-
 mentum strigenti spissitudinem accipiat. Vbi
 usus postulat, rosacéo admisto utitor.

Democraetis Acoporum compositiones. Cap. XIII

Plurima medicinae cum studiosi dicuntur
 Acoporum de usu Myracoporum q̄ omnium,
 Hæc quæ sicut dicam, & quo conferant modo,
 Quæ ue ratione facias quodq̄ pharmacum.
 Ergo & dolores neruorum hæc omnia leuant,
 Carnis q̄ totius & musculum, quibus
 Molestia lassitudo est, aut perfrictio,
 Aut his dolores similes sine patentibus
 Causis obortentes: quin lassitudini
 Obnoxios, & frigori, haud faciles parant.
 Si qui usi prius ita prodeant ad munia
 Vitæ necessaria obeunda, corporis
 Et carne partes pabulo indigas suo
 Explet, perunctis assumpto a cibo locis:
 Qui conualescunt ægrè, hos & senes iuuant.
 Iplis per hyemem ad uesperam linentibus.
 Quæ porro acopa faciunt, alio uobis loco
 Exponam, & horum scripta subtingam ordine:
 In quem uel usum quoq̄ ueniant, mox transigā.

1 Nunc referā quo primū liceat facere modo.
 Namq̄ ammoniaci bis quinas quidem uncias,
 Siue uncias mauult quis, seu pondus aliud.
 Idemq̄ thuris, at quaternas chalbanij.

tom, 5

X 3 Cerul

Cerui medullæ tantundem: parem modum
 Simul atticis: deinde mittunt cœsypî.
 Terebinthina per lucidâ centum & bis duas.
 Mellis recentis optimi rursus decem.
 Aequalem tribuunt ponticæ ceræ modum.
 Adipis recentis anferis mollis decem.
 Vini phalerni quinq; plures' ue heminas.
 Aut pauciores paulo consiiciunt quoq;
 Itidem olei ueteris bis uiginti boni.
 Id autem graueolens haudquaquã commiseris.
 Sic namq; fiet, gratum ut sit hoc utentibus.
 Paratur sic. maufculo in mortario
 Simulatq; thus in grumulos confreris
 Et ammoniacum, uinum affundens protinus,
 Atq; hæc dimittens macerari mediocriter,
 Tere cochleari, in mellis spissitudinem
 Cogantur, addito mel unâ atq; cœsypum,
 Cerui medullam, quæ in pila coniesit:
 Ac deinde cera in ollula liquefco,
 Oleumq; totum iuncta & adipe & chalbano
 Terebinthinamq; colliquefacies, simul
 Superfundens coeuntibus in mortario,
 Sed spatula parua ut refrigerant permoue.
 Tum subigito tantisper hæc omnia manu
 Vnita bene dum appareant, & humidî
 Mellis boniq; crassitudinem habuerint.
 In stanneum uas condito, uel buxum.
 Hoc sedulo usus optimo ceu pharmaco.
 Est commodissimum & mulieribus quoq;
 Quis est oborta phlegmone intus uteri.
 Duriciam abigit inde, simul & scirrhî metum,
 Vbi pessulo usurpare pharmaco lubet
 Litum utero, quod indere hoc solent modo.
 Benefacit hoc idem ad dolores aurium
 Expertum ulceris, sineq; fluxu graues.
 Sergetici autem mitis irini unguinis
 Aut portionem quartam, aut trinam pharmaco,
 Calidoq; lanam intinctam addis foramini.

Aliud. 2

Et Viridacopon hoc efficax supra modum,
 Vnde & laborum exordijs facit magis
 Arthriticis, podagricis quoq; efficacis.
 Hoc ante balneas medicamentum litis
 Et pedibus & neruis incrassatis simul,
 Plures fuisse sanatos conspeximus.
 Habet boni thuris pondo libram unicum.
 Ammoniaci guttæ pondo libras duas.
 Aphronitri quamalibissimi solum libram.
 Tantundem puriusculi atticî cœsypî,
 Myrrhaq; lectæ, & non lignosi chalbani,
 Opopanacisq; puri singulorum omnium
 Octo uncias exacte pendens libra.
 Quatuor euphorbiæ recentis uncias.
 His asperi pares dato limnesit,
 Hoc nominant adarcen unguentarij
 In Italia insitiores, qui ue coeunt.
 Ceræ admodum bonæ duo pondo ponticæ.
 Terebinthina tot puræ, semissem insuper,
 Olei laurini, cypriniq; & glucini,
 Sergetici, iriniq; singulam libram.
 Olei ueteris, recentis quoq; lentiscini,

A Cuiusq; rursus horum immittes pondo duo.
 Aceti modicum, quo mixturas simplices
 Siccas abunde contritas, contemperas
 Liquidis unguinibus, & ceræ terebinthina,
 Ac chalbano, liquori panacis, & alijs.
 Vbi calida atq; adhuc feruentia in pilam
 Conieceris, cochleari manibus contere
 Valenter, unita omnia sic reponito
 In pyxidem, qualem paulo dixi prius,
 Audacter in ueteratisq; omnibus utitor.

Aliud. 3

Et hoc parabile passim Acoponitem bonum
 Potissimum per hyemem, si profectio
 Vsq; in malum opportunis facile subuenit.
 Quod puri recipit chalbani tres uncias.
 B Sed unam opopanacis recentis unciam.
 Floris salis tres, & quaternas cœsypî.
 Ammoniaci guttæ bonæ pondo libras
 Octo, atq; ceræ unam, pityniæ torridæ
 Non foetidæ, quaternas bis pone uncias.
 Olei sabini bis quaternas & libras
 Plus hyeme ceu libram oportebit indere
 Vini phalerni nigri denis uncijs.
 Sic præparato. Ammoniacum in mortario
 Contudito, atq; deinde uinum affundito,
 Paulisper macera, curiose conterens,
 Florem salis, tunc etiam adijcias cœsypum.
 Terens tum, ac faciens mellis spissitudinem.
 Liquatis colliquandis, in chalbano:
 Tum opopanacē adiunctum, rursus liquefacito.
 C Leuigatisq; prius in pila, unitis probe
 Superq; fundito, & manibus miscensita
 Pharmacum adhuc feruens uitreo uase condito.

Aliud Myracopon. 4

Et hoc Myracopon optimorum inest gregi.
 Nam fauuitatis plenum est; iuuat insigniter
 Quos nominauit paulo affectus antea.
 Stactæ bonæ recepat ternas uncias.
 Opobalsami tres, & mellis tres atticî,
 Ceræq; puræ ponticæ tres unguinis
 Crocini lyriaci quoq; quaternas uncias.
 Ammoniaci quamalibissimi, & leuis salis
 Sextantem, candidæ & puræ terebinthina
 Vnam unciam, atq; partem ipsius unicum.
 Et cinnamomi necnon, malabathrum quoq;
 D Libram adde, & partem libræ tertiam insuper.
 Sin absit autem malabathrum forsitan tibi,
 Adiunge nardi tantundem gangitidis.
 Istud bonis mediocriter unguentum additur:
 Abunde medicamentosum, ut nullum inuenis
 Aliud, uel irini tantum sergetici
 Vel cyziceni pondo, idem amaracini.
 His uteris ubi non adsit quod diximus
 Malabathrum, arbitror moderatum Myracopon
 Nihil minus sanè auxiliari utentibus.
 Sic consist. Accurate mel factum leue
 Adiunge, & stacten tritam modice misceas,
 Opobalsamumq; ac rursus exacte contere.
 Cera crocino terebinthina pura duplo
 Iniectis uasi, prædicta liquefiant aqua
 In alia olla; liquefactis inde malabathrum.

Et cunctis unitis modice, ut non ferueat,
Duplex deponere uas protinus ex cacabo.
Exacte refrigerato, & raso pharmaco,
Et addito ijs quæ iam prius recensui,
Mortario leuigato rursus dum probe
Totum uniuertur, fiatque unum pharmacum.

Voles at si ipsum reddere efficacius
Ad uitia neruorum, simul ad diutina,
Affectiones longas, tenfos musculos
Euphorbii recentis etiamnum & boni
Toti uncias duas admisceas ponderi,
Cum saleque, melleque, in super opobalsamo
Leuigatum ante, quo satis erit tempore:
Itaque omnia dicta in unum cum redegeris,
In pyxidem, uel uas uitreum reponito.
A balneis in usum potius ducito.

Cum regi facies principis Myracopon,
Perfacle uel paraignis sine commercio,
Opobalsami collectis ternis uncias.
Et optimi malabathri quindecim uncias.
Et cinnamomi tantundem boni cape;
Ceraque non olentis candidissimæ
Denarios decem: sic ipsum præpara.
Partem malabathri tertiam, & ceram quoque
Concisam multo in frustra minutissime
Argentea in tenui reconde phiala.

ARGUMENTA CAPITVM

Cap. 1. Mensuram dici & de pondere, & de uasis: quæ
rursus uel aridorum uel liquidorum mensuræ sunt.

Characteres ponderum & mensurarum. 2. De ponderibus id est, de minis, & libra eiusque partibus. 3. De mensuris liquidorum, & ponderibus earum in oleo, uino, & melle differentibus: de quibus etiam cap. II. citatur Orisabius. 4. De mensuris aridorum. 5. Alia incertia authoris traditio de signis & notis ponderum ac mensurarum. 6. De ponderibus, & mensuris, eorumque modo, & capacitate, & partibus. 7. De iisdem ex Cleopatæ de ornatu libris. 8. Aliter de iisdem. 9. De iisdem apud ueterinarios. In Græco hic rur-

CL. GALENI DE MENSVRIS AC PONDERIBVS LIBELLVS, SPVRIVS

IANO CORNARIO MEDICO PHYSICO INTERPRETE.

CAPVT PRIMVM



ONDVS grauitatis d
mensu iudicat. Men-
sura aut uasculi capa-
citate. Vasculum ue-
ro, tum aridæ, tum li-
quidæ quætitatis me-
sura existit. Quare
tres omnino dimense
quætitatis sunt disse-
rentiæ: una quidẽ pon-
deris: altera uero rerum aridarum, utpote quæ ue-
lut in aggerem accumulantur: tertia autem liquido-
rum. Caterum quoniã penẽ infinita pðdera ac men-

A Aqua calente plurimum, ut liquaueris
Ipsam refrigerato, deinde radito.
Tum leuia iungens rursus in opobalsamo
Et cinnamomo totum contere uiuens.
Quod restat ipsis suprafundens malabathrum.
Terens adunito manibus, sic condito
Argentum in uas aut uitreum, sed crassius:
Sic namque tuto habebis semper pharmacum.
At si trientem libræ addas gangitidis
Nardi, medicamen reddes longe suauius
Præstantiusque ad uitia adhuc recentia,
Synchrisma, cinnamomon tibi nisi suppetat,
Minimo quidem peius habebis, uere at bonum
Alio omni & multo Myracopo præstantius
At si proponis id facere efficacius
Ad quos retuli modo affectus, atlantici
Euphorbii iunges quæternas drachmulas
Nam sic erit suaue, nec inefficax
Misturis licet confectum paucioribus.
Cognouimus quosdam uti multis pinguibus
Medulla multa, & nonnullis aromatis,
Liquoribus, unguentis, & oleis aliquibus,
Quibus contra usus esse talia
Expertum boni, qui non probauerint
Misturas, neque naturas horum simplices.

F I N I S.

LIBRI SEQVENTIS

sum sequebatur collatio ponderum in mensuris olei,
uini & mellis, quæ cum supra cap. 3. habeatur, recte
ab interprete Latino hic ommissa est. 10. Dioscorides
de ponderibus: & de uensis uini olei ac mellis, quan-
tum singulæ appendant: de quibus etiam supra cap. 3.
De mensuris aridorum. (Notandum est hic Dio-
scoridem ita contulisse mel ad uinum, ut melli totam ui-
ni partem ampliusque dimidiam tribueret: quod tamen
Paulus proportionem mellis ad oleum habita fecit, non
ad uinum.) In Græcis præterea fragmentum
sequitur de notis ponderum, quod ceu super
fluum, Latinus interpres recte omisit.

sura, tum pro locorum, tum pro eorum qui eis u-
tuntur consuetudine, existunt: de his saltem quæ
omnibus maxime familiaria sunt, nobis sermo erit.

De ponderum ac mensurarum notis.

Verum quum quidam non integris literis, sed
per notas, hæc ipsa pondera ac mensuras signifi-
cent, præstiterit fortassis & nos in hac parte uete-
res imitari: atque primum characteres ipsos decla-
rare. Primum igitur litera χ , ubi α . literam habue-
rit incumbentem, chalcum, id est areum signifi-
cat, hoc modo χ . Si uero σ . ipsi χ . incubuerit,
choa, id est congium demonstrat, sic $\sigma\chi$. Si σ .
choenicum est $\sigma\chi$. Si η . chemam χ α uero litera si

incumbens *v.* habeat, & linea recta inferiorem ipsius apicem per obliquum secet, ceratiū, id est siliquium significat, hoc modo *ix.* Quod si *v.* ipsi *x.* incumbit, cyathum significat, *ix.* Si vero *o.* cotylam, id est heminam, *ix.* Porro linea circumflexa, quam nihil aliud circumstat, & quæ omnino per obliquum ponitur, obolum denotat. Si vero duæ sunt lineæ, quas nihil circumstat, duos obolos signant. *z.* qui gramma, hoc est scrupulam faciunt, quod per litteram *r.* quæ præ adiectū habet denotatur, recta amplius linea ipsam *z.* secante, hoc modo, *z.* Duæ autem lineæ iuxta alteram extremitatem consertæ, angulumque constituentes, ad similitudinem duorum apicum, qui in ipsius *x.* literæ pictura ad rectam lineam adscribuntur, drachmam significant, quæ & holca cognominatur, hoc modo *L.* proprie autem holca per *l.* litteram notatur, *o.* litera medium eius occupante, hoc modo *Δ.* Quod si *l.* litera ad *λ.* apponatur, libra significatur *λ.* Aliqui tamen alteram ipsius *λ.* lineam, per obliquum alia linea secantes, libram denotant, sic *Δ.* At vero litera *r.* intra angulum suum *o.* litteram habens unciam significat, *so.* *μ.* autem iuxta medium ipsius *v.* habens, minam denotat *M.* Si vero *v.* habeat mystrum *M.* Si *v.* medimnum *M.* Si *o.* modium *M.* Porro *τ.* complexens litteram *z.* & *v.* incumbens habens, tryblum significat, *τ.* *ξ.* autem supra se *z.* habens, xesten, id est sextarium designat *ξ.* Si vero *o.* habeat superscriptū, oxybaphum, id est acetabulum *ξ.* Aliqui tamen xesten, *ξ.* denotant, recta linea dissectum, hoc modo. *ξ.* *u.* autem incumbens *μ.* habens heminam indicat *h.* *x.* uero cum *z.* connexum, incumbente ipsius litera *μ.* ceramium signat *κ.*

De ponderibus. Cap. 2.

Mna Attica & Aegyptia habet uncias xvi
Mina Romana uncias xx
Libra uncias xij
Vncia drachmas viij
Drachma scrupulos iij
Scrupulus obolos ij
Obolus siliquas iij
Siliqua æreos ij
duasque tertij partes, ita ut obolus æreos octo complectatur.

De mensuris liquidorum Cap. 3.

Ceramium Italicum habet choas viij.
Chus siue congius sextarios vi.
Sextarius cotulas duas, quæ & Tryblia appellantur.
Cotula autem siue Tryblum, magna mystra iij. acetabula uero iij.
Magnum enim mystrum continet acetabulum unum & tertiam partem.
Acetabulum uero sesquicyathum habet.
Cyathus chemas paruas, aut mystra parua ij. hab.
Quod si uelis liquidorum mensuram pondus scire: Multæ enim rerum liquidarum differentia, iuxta lancis momentum existunt; id ipsum ex olei, uini, & mellis exemplo docebitur. Mel igitur uino grauius est quarta ampliusque decima par

te, quod fere totum tertiam eius partem facit. Habet enim eadē mellis ad uinum mensura, totū uini pondus, accedente insuper tertia eius ponderis parte. Ad oleum autem mel dimensum, dimidia eius parte ponderosius est. Habet enim totum olei pondus, atque insuper dimidiam eius ponderis partem. Vinum uero nona parte oleum excedit. Habet enim pondus ipsius totum, ampliusque nonam eius ponderis partem. Quæ res ut magis euidens & manifesta fiat, omnium mensurarum pondus sigillatim subiicimus; uelut in tabella depictum: ita ut manifeste constet, quod per pondera quæ singulis mensuris subiecta sunt Oleum, Vinum, & Mel, ex ordine demonstrantur.

Ceramium italicum habet

Olei. Vini. Mellis.
Libras lxxij. Lib. lxxx. Libras cvij.
Chus siue congius habet
Libras ix. Libras x. lib. xij. et dim.
Sextarius habet.
Vncias xvij. Vncias xx. Vncias xxvij.
Cotula siue hemina habet.
Vncias ix. Vnc. x. Vnc. xij. & dim.
Magnū mystrum habet
Vnc. iij. Vnc. iij. scrup. viij. Vnc. iij. & dim.
Acetabulum habet.
Drach. xvij. Vnc. ij. scrup. xij. Vnc. iij. scrup. ix.
Cyathus habet.
Drach. xij. sesquiunc. scrup. iij. Vn. ij. dra. ij.
Paruum mystrum habet.
Drach. vi. scrupulos xx. Drach. ix.
Oribalsium autem iuxta Adamantium, sextarium Italicum uini quidem iuxta mensuram uncias xxij. habere ait: iuxta pondus uero libram unam, uncias octo. Sextarium autem mellis, libra rum duarum & dimidia pondus habere tradit.

De mensuris aridarum. Cap. 4.

Aegyptia Artaba continet modios iij.
Modius Aegyptius & Italicus habet choenices viij
Chœnix sextarios ij.
Sextarius semifextarios ij. qui & heminae appell.
Hemina autem habet cyathos viij.
Atticus Medimnum continet hemiecta xij.
Hemiectum autem seu femodius choenices iij.
Quo fit ut medimnus habeat modios vi choenices xlvij. Sextarios xcvi.
Cæterum pondus harum mensurarum non facile est proferre, quod immensa diuersitas rerum aridarum, iuxta lancis inclinationem existat.

Alia incerti auctoris traditio, de signis et notis in ap
ponderationibus medicamentorum, tum
ponderum, tum mensurarum. Cap. 5

Signorum & notarum doctrinam ut necessariam non præter institutum fuerit adscribere, quo in pharmacorum preparationibus consuetudine ter posita cōperta, statim agnoscamus, et appōde ratione quæ ex ipsis indicatur deprehendamus. Proinde minam significat *μ.* litera *v.* incumbens habens *M.* Libram uero *λ.* adiectū habens *l.* Vnciam autem *r.* habens adiectum *o.* *so.* Apud aliquos uero reperit *v.* incumbens *o.* uncia signi-

ficatione *μ*. autem incumbente e. *μ*egas id est, partem, significat, sic *M*. At uero obliquum λ. apicibus suis ad dextram tendens, drachmam notat, λ. Si uero ad sinistra tendens apices, dimidiam drachmam 7. Romana autem litera s. apud quosdam trium obolorum nota est. Verum apud nos omnis ponderis dimidium indicat, S. Si uero eadem litera unica obliqua ponatur, obolum notat. Si autem dua, duos obolos. At græcum sigma intro conuersum, semiobolum significat. Porro *ξ*. litera, incumbente ipsi e. sextarium indicat *ξ*. uero incumbente v. cyathum *κ*. autem insitum habens o. holcā significat, quæ etiam drachma appellatur.

De ponderibus & mensuris. Cap. 6

Mina Italica habet drachmas cxliiij. Attica drachmas cxxiiij. Quare Italica mina est libræ unius & dimidiæ. Attica uero libræ unius, unciam iij. drachmarū iij. Vncia habet apud Italos drachmas viij. Apud Atticos drachmas viij. Drachma habet scrupulos iij. uncia uero scrup. xxiij. Libra habet uncias xij. scrupulus habet obolos ij. obolus habet areos viij. Medimnus porro habet hemiecta xij. hemiectum uero siue femodius chœnices quidē habet iij. sextarios autem viij. Quo fit ut medimnus habeat congios quidē xvi. chœnices autem xliiij. sextarios autem xvi.

Chœnix uero heminas habet iij. sextarios ij. Sextarius heminas duas cyathos aut xij. Et per has mensuras plerique græci metiuntur. Cæterum apud Italos reperitur congius iuxta mensurā quidem habere sextarios vi. heminas xij. Iuxta pondus uero aquæ pluuialis, quæ minime omnium fallit, drachmas dccxx. At uero acetabulum quarta pars est heminæ. Habet aut sextarius pondere drachmas cxx. proprie uero hemina Græca olei habet librā i. sextarius lib. ij. At Italicus sextarius olei quidem habet unc. xviij. uini uero lib. i. unc. viij. hemina uero olei uncias ix. uini unc. x. Verum nosse expedit mensuras iuxta pondus nō parum curari, secundum materiæ diuersitatem.

Ex Cleopatrae de ornatu libris. De ponderibus & mensuris Cap. 7

Mina ponderis nomen habet unc. xvi. drachmas cxxviij. scrup. ccclxxxiiij. obolos dclxviij. lupinos mclij. siliquas mmccciiij. areos mmmmm cxliij. Mina Attica habet unc. xij. s drach. c. scrupulos ecc. obolos dc. lupinos dcccc. siliquas mdccc. areos mmmmdccc. Mina Ptolemaica habet unc. xvij. drachmas cxliij. scrupulos cccc xxxij. obolos dcccclxiij. lupinos mcccxcvi. siliquas mmdcxij. areos mmmmm dcccxcij. Libra habet uncias xij. drachmas xcvi. scrup. ccclxxxviij. obolos dlxxvi. lupinos dcccclxiij. siliquas mdcc. xxviij. areos mmmmdcviij. Vncia habet drachmas viij. scrupulos xxiij. obolos xlviij. lupinos lxxij. siliquas cxliij. areos cccclxxxiiij. uocatur autem unc. tetraffaron italicū. Drachma habet scrupulos iij. obolos vi. lupinos ix. siliquas xvij. areos xliij. Denarius Italicus habet drachmā unam. Appellatur aut & alia æquiuoce drachma Ae-

gyptiaca, quæ sexta pars est Atticæ drachmæ pendens obolum unum. Scrupulus habet obolos ij. lupinos iij. siliquas vi. areos xvi. Obolus habet lupinos is. siliquas iij. areos viij. Semiobolus habet siliquas is. areos iij. Lupinus habet siliquas ij. areos iij. aut atticū semiobolū, in superque duorum areorum duas tertias partes. Siliqua habet Atticos areos ij. & duas tertij partes. Areus habet quartā semioboli partē, ita ut quatuor arei faciant semiobolum. Stater habet drach. iij. uocant eundem Tetradrachmon. Sed & dupondium drachmas iij. habet, & nux regia itidem drach. iij. Chema magna habet drac. iij. parua drach. ij.

Affarium habet drachmas duas. Cochlearium drachmam unam, cyathus drachmas x. aut unc. i. & quartam eius partem: scrupulos xxx. obolos lx. lupinos xc. siliquas clxxx. areos cccclxxx. Est autem cyathus sexta heminæ pars. Hemina mensura quidem habet cyathos vi. pondere uero drach. lx. uncias vijs. scrupulos clxxx. obolos cccclx. lupinos dxl. siliq. mlxxx. areos uero mmdcccclxxx.

Tryblium eandem mensuram capit cum hemina. Habet enim mensura quidem cyathos vi. pondere uero drachmas lx. Sextarius autem mensura habet heminas ij. pondere drachmas cxx. Appellatur autem apud Aegyptios sextarius Inium.

Acetabulum habet heminæ quartam partem, siue sesquicyathum. pondere uero drach. xv. Concha magna eandem cum acetabulo mensuram feruat. Habet enim mensura quidem sesquicyathum pondere uero drachmas xv. Concha uero minor, mensura quidem habet cyathi dimidium, pondere autem drachmas v. Mystrum magnum habet decimā sextam heminæ partem, quod est drachmas ijs. & quartam drachmæ partem. Mystrum autem paruum heminæ uigesimali secundam partē habet, hoc est drachmas ij. scrupulos ij. siliquam unam & undecimam siliquæ partem.

Congius mensura quidem habet heminas atticas xij. sextarios autem vi. chœnices iij. pondere uero drachmas dccxx. Chœnix mensura quidem habet heminas iij. pondere autē drac. clxxx. Porro in rustica cōperi, heminā tertiā aut quartam esse sextarij partem. Congium autē esse sextariorū ix. heminarū uero xij. Et amphorā esse sextariorū xxxvi. heminarum xliij. Metretam autē sextariorū lxxij. heminarum xcvi. Medimnum uero sextariorū cij. heminarum cxxxvi. Cæterum apud Syrios metreta est sextariorū Italicorū cxx. At uero Tryblium & acetabulum similiter habet quartam heminæ partem. cyathus heminæ sextam partem.

Aliter de iisdem. Cap. 8

Mina Attica habet uncias xij. Alia mina habet uncias xvi. Ptolemaica uero unc. xvij. Libra habet unc. xij. Vncia drac. viij. Drachma scrupulos iij. Scrupulus obol. ij. Obolus lupinos is. Lupinus siliquas ij. areos iij. aut Atticum semiobolum, in superque duorum areorum duas tertias partes. Siliqua habet areos ij. & duas tertij partes. Areus habet quartam semioboli partem, ita

ut quatuor ærei faciant semiobolum. Stater habet drachmas iiii. uocet & ipsum Tetradrachmū. Sed & dupondium drach. iiii. habet. Et nux regia itidem drach. iiii. Chema magna habet drach. iij. parua drach. ij. Assarion drach. ij. Cochlearium drachmam unam.

De mensuris ac ponderibus Veterinarijs incerti auctoris. Cap. 9

Vncia habet drachmas viij. Drachma habet scrupulos iij. obolos autē sex. Hemina habet uncias xij. acetabula uero duo. Acetabulū cyathos iij. cyathus habet mystra iij. Cochlearium autē est mystri dimidium. Acetabulum facit uncias vi. Cyathus facit uncias ij. Mystrum facit uncia dimidium. Cochlearium facit scrupulos vi. Drachma scrupulos iij. Obolus facit scrupulum. Sicliū habet uncia dimidium. Quum itaq; habeat cyathus mystra iij. fit ut sit mystrum unc. dimidium, & cum mystrum cochlearia ij. habeat, fit ut cochlearium sit quarta uncia pars. Mina habet unc. xv. drachmas cxx. Libra habet drachmas xcvi. Denarius habet scrupulos iij.

Dioscorides, de ponderibus & mensuris. Cap. 10

Ego amicissimē uir, de ponderibus ac mensuris sic diligēter rem tractaui, ut à minimis initio sumpto, multiplicatione usq; ad minā facta, progressus sim. Proinde siliqua idem p̄dōus habet cum æreo. Obolus autem æreos habet iij. unde semiobolus pondere habet siliquas is. Scrupulus habet obolos ij. hoc est æreos vi. Drachma quæ etiam holca dicitur, habet scrupulos iij. hoc est obolos ix. Vncia uero habet drachmas viij. scrupulos xxiij. Libra habet uncias xij. drach. xcvi. Mina iuxta medicum usum habet uncias xvi. hoc est drach. cxxviij. Italica uero mina uncias xviij. habet, hoc est libram i. & dimidiam, drachmas autem cxliij. Alexandrina mina habet uncias xx. hoc est drachmas clx.

De mensuris liquidorum. De uino.

Ceranium uini habet libras lxxx. Vrna lib. xl. Congius lib. x. Semicongius lib. v. Sextarius libram unam, uncias viij. Hemina quæ & cotyla uncias x. Quartū siue quartarius unc. v. Acetabulum quod est quarta pars heminae habet unc. iis. Cyathus qui est sexta heminae pars habet unc. is. & scrupulos iij. Chema uero quæ

A est cyathi quarta pars habet drachmas tres, scrupulum unum. Idem uero est pondus etiā aquæ & acetū. Dicunt autem pluuiā aqua uas implent, pondus minime omnium fallax exhibere, & congiū eius habere drachmas dccxx.

De Oleo.

Ceramiū siue amphora olei habet libras lxxij. Vrna libras xxxvi. Congius libras nouem, Semicongius libras iij. Sextarius libras is.

Hemina uncias nouem. Quartum uncias iij. Acetabulum quod est quarta pars heminae, habet uncias duas, daachmas duas. Cyathus qui est sexta pars heminae, uncias is. Chema quarta cyathi pars drachmas ij.

De Melle.

Ceramiū mellis habet libras cxx. Vrna habet libras lx. Congius libras xv. Semicongius libras vijs. Sextarius habet libras ijs. Hemina libram unam, uncias iij. Quartarius unc. vijs. Acetabulum uncias iij. drachmas ij. Cyathus autem habet uncias ijs. Chema uero quarta cyathi pars habet drachmas v.

De mensuris aridorum.

Medimnus habet hemiecta xij. Hemiectum choenices iij. Chœntx heminas Atticas habet iij. pondere uero drachmas clxxx. Cōgius mensura quidem habet heminas Atticas xij pondere uero drachmas dccxx. Sextarius mensura habet heminas ij. pondere drach. cxx. Hemina cyathos habet sex. pondere uero est drachmar. lx. Hemina Attici etiam Tryblium uocant, aliās cotylam appellatam. Acetabulum mensura quidem est heminae quarta pars, hoc est cyathus unus ac dimidius, pondere uero habet drachmas xv.

Cyathus habet drachmas x. Chema quæ est quarta Cyathi pars, habet drachmas ijs. Mystrū magnum decimasexta heminae pars est, & habet drachmas. iij. & quartam drachmæ partem. Mystrum paruum uigesima secunda heminae pars est, habet scrupulos ij. siliquam i. & undecimam siliquæ partem. Iustissimum uero mystrum scrupulos habet viij. Cochlearium scrupulos habet iij. Nucis regia magnitudo drach. habet vij.

Nucis pontica drachmam unam. Glandis magnitudo drach. dimidiū habet. Aegyptiacæ fabæ magnitudo obolos habet is. Erui æreos ij.

ARGVMENTA CAPITVM

Caput I De hirudinibus

Cap. II De reuulsione, quibus locis & quot modis fiat: uinculis, uomitu, clysteribus, cucurbitulis,

LIBRI SEQVENTIS

acribus medicamentis.

Cap. III De cucurbitulis.

Cap. IIII De scarificatione, & crurū incisione.

CL. GALENI DE HIRVDINI- BVS, REVVLSIONE, CVCVRBITIS, SCA-

RIFICATIONE, AC VENAE INCISIONE LIBELLVS. IANO
CORNARIO MEDICO PHYSICO INTERPRETE.

CAPVT PRIMVM



QUIDAM captas hiru-
dines concludunt, &
ad multa ipsis utitur.
Nam mansuetas e fa-
cile carnē cōtingūt.
Verum recēs captas
ad diem unum serua-
re oportet, modico
sanguine in alimentū
ipsis obiecto, ita em
virus ipsarum exprimitur. At uero usus tempore
pars cui hirudines adhibendae sunt, nitro prepa-
retur ac illinatur, aut unguibus confricetur, prōm-
ptius enim hoc modo adhærebunt. Oportet autē
ipsas in aquam tepidā, in puro ac amplo uase mit-
tere. Deinde spongia apprehendere, & sordibus
depuratis, per manus ad mouere. Vbi uero inhæ-
rēt oleū tepidū partī infundimus, ut ne perfrige-
retur. Cæterum in manibus ac pedibus, ipsam par-
tē aquae immittere oportet, in qua sunt hirudines.
Si uero modice attigerint, caudas ipsarū forpice
incidere expedit. Sanguine enim effuso, attrahere
non cessant, donec nos salem aut cinerē oribus ip-
sarū asperferimus. postq̄ uero deciderint, per cu-
cubitam uirus extrahere oportet. Sin minus, fo-
mentū per spōgias adhibeat. At si corpora adhuc
lachrymas fundāt, fabacea farina adspersa est.
deinde lana modico oleo imbuta obuoluitur. Si
uero sanguis erumpat, lintea ex aceto madida
imponant, aut galla usta, aut spongia liquida pice
imbuta ac usta adhibeatur. Verū nosse expedit,
quod hirudines sanguinē in profundo nō trahūt,
sed eū qui carnī adiacet exugunt. Vfus autē ipsarū
est cucurbitarū loco. Detrahimus autē ipsas, quū
dimidiam sanguinis partē attractam esse cōiecta-
uerimus. prohibemus autē & hō sinimus ipsas de-
cidere, donec sufficiens excretus fuerit. Nam pars
ipsa frigescit, tum ab hirudinibus; quae natura fri-
gida sunt, tum ab aere ambiente.

De reuulsione. Cap. II

Vehementissimas influxiones humorū, per re-
uulsoria auxilia impeditur, ne acuatim irruāt.
Reuulsoria autē auxilia, in fluxione ad pectus &
uentrē fiunt ad manus. Vomitiones autē, in fluxio-
ne ad infernas partes: quæ admodū etiā inclinatio-
nis ad uomitus reuulsio fit per clysteres aciores.
At uero ambas has inclinaciones, per supernū in-
quā, ac infernū uentrē, ad urinas & sudores reuel-
les. Sed & urinas, ad sudores ac secessus alui. Est et
reuulsorū auxiliū cucurbita māmīs ad mota. His
enim ad p̄cordia affixis, sanguinis impetum ad
nares, reuelles: sicut etiā immodicā eius per uterū
lationem. Reuellunt etiā acria pharmaca locis im-

posita, humorum ad caput ac uiscera lationes. Et
in summa, reuulsio faciendā est in humoribus sur-
sum repentibus, ad partes infernas. In his autē qui
deorsum repunt, uice uersa. & in intra uergenti-
bus, extra. & rursus in his qui extra uergunt, intra.
& si ad dextra repunt, ad sinistra. & si ad sinistra,
rursus ad contraria. Atq̄ hoc modo etiā lationes
in posteriorē partem, reuellantur in anteriorem,
& quæ anteriorem petunt, in posteriorē.

De cucurbita. Cap. III

Cucurbita præuacuatīs corporibus cōmodæ
sunt, in repletis em non utimur ipsis. eadem ratio-
ne & in cerebri ac membranarū eius inflāmationi-
bus, non utimur cucurbitis, in principio affectio-
num: quemadmodū neq̄ in alia aliqua parte inflā-
mata, uerum quū non influit amplius quicq̄, & ubi
prius euecuauerimus totū copus, & ubi opus
fuerit aut mouere & exagitare aliquid in inflā-
ta parte, aut foras attrahere. Dum uero sūt adhuc
affectiones, non ipsis ægrotare incipientibus par-
tibus sed uicinīs ipsarum, cucurbita inponēda est,
reuulsōis gratia. At in principio reuulsorū uterū
dum est. Cucurbitæ uis est materiam euacuare,
dolorem soluere, inflāmationem minuere, inflā-
tionē disēuere, appetentias edendī recuperare,
infirmū stomachum corroborare, animi deliquia
eximere, fluxiones ex profundis transferre ac lie-
care, sanguinis eruptiones cohibere, facultates
mēsum corruptrices attrahere, & mēses aliuare.

De scarificatione & uenae incisione. Cap. IIII

Scarificamus corporis partes, aut inflāmatas;
aut in seirum induratas, aut distentas aut dolore
affectas, aut fluxione in festatas, ubi fluxio iam fue-
rit sedata: aut acri materia incumbente, aut uene-
nosa facultate extrinsecus illapsa, aut ubi ex alijs
partibus ad aliam, transferre materiam uolumus:
quod crura scarificamus capite affecto: aut ubi re-
dundantē in corpore materiam imminuere cupi-
mus, & maxime quū redundantia facta fuerit, prō-
pter retentionē materiæ quæ cōsuetō more excer-
ni solet. Velut hæmorrhoidib. suppressis, scarifica-
mus crura preloata, aut calidæ fomētō in spōgia ad
moto. Porro uenā incidere sæpe in anno, minime
cōmodum puto. Nam unā cū multo sanguine uita-
lis spiritus excernit. Hoc aut frequentius consum-
pto, & tota corporis moles perfrigeratur, & om-
nia animalia opera peius fiunt. Quapropter à par-
tibus ignobilioribus, ueluti sunt crura, detractio-
nē facere oportet. Prodest aut scarificatio etiam o-
culis diuturna fluxione uexatis, & capitis affectio-
nibus, itemq̄ p̄cordis ac dorsi. Prodest etiā
anginis, & humoribus sp̄sis
ac impactis.

Caput I Causam quærit cur Erasistratus, cum multa parua remedia curiose conscripserit, phlebotomiam summum sæpe remedium uix semel, & obiter tantum, nominauerit: cum tamen clarissimi ante ipsum medici, in plurimis & acutissimis morbis ipsam usurpauerint.

Cap. II Quo animo phlebotomiæ remedium Erasistratus omiserit, alij aliter sentiunt: quorum sententias recitat. Cur phlebotomia abstinendum.

Cap. III Erasistrati sententiam refert de uenis & arterijs, & uasorum illorum tum naturali tum præter naturam habitu, in quo paremptosis quæque accidat, & alias ob causas, & ob sanguinis abundantiam. Et quomodo paremptosis causa sit, secundum eundem, febri, ac inflammationis tum simplicis tum uulnerum. Verba ipsius de remedijs utriusque inflammationis.

Cap. IIII Cum sanguinis abundantiam morborum aliquot causam esse fateatur Erasistratus, de modo euacuandi illum quæritur: Videtur autem optimus, phlebotomia, non inedia, quam Erasistratus probat. multa enim mala inedia effecta & symptomata sunt, præter id quod tardius euacuationem molitur, non statim ut phlebotomia.

Cap. V Quod phlebotomiam Hippocrates non neglexerit: quodque natura etiam sanguinem uacuando morbis succurrat: Et Erasistrati reprehensio, qui naturæ modum hac in re non obseruauerit. Et quod natura aliàs satis agat, aliàs nihil, aliàs parum, quo quidem tempore medicus supplere debet naturæ defectum. Addit exempla curationis Hippocraticæ per phlebotomiam.

Cap. VI Quod nullus uel dogmaticorum uel Empiricorum phlebotomiam reiecerit.

Cap. VII Naturæ opera euacuandi sanguinis usum ostendere: exemplum à purgatione uel inanitione mulierum, in mensibus, partu, statim à partu, & lacte, quod ex iisdem fontibus manat unde menses.

A quibus morbis tutæ sint mulieres quæ recte purgantur: & de hæmorrhoidæ uirorum. Et quod non ob hæc solum retenta morbi fiant euacuatione sanguinis curandi: sed etiam alij quidam, ut spasmus, & hydrops aliquando, itidem sanguine detracto per Galenum curati. Et iterum, quod naturæ imperiti & communis iudicij expertes sint, qui phlebotomiæ usum negant.

Cap. VIII Medici esse, non tam discere an secanda sit uena (id enim communi ferè iudicio constat) sed quæ, quando, & ubi secanda. Morbi ob hæmorrhoides retentas.

Cap. IX Contra reijcientes phlebotomiam. eod quod mensura eius certa statui ad unguem non possit. Quod ne in cæteris quidem remedijs ad amussim hoc fieri possit, quibus tamen feliciter utimur: quæle & ipse Erasistratus summum cholericis propemodum moribundis remedium celebrat, unum frigidum

dæ mixtum, à Chryssippo inuentum: cuius ille inuenta semper laudat, aliorum nihili facit.

Cap. X Quod sanguinis detrahendi mensura facile deprehendatur, & quibus indicijs: quæcum apparuerint, statim sisti potest sanguis, cum aliorum pharmacorum operatio sisti non possit pro arbitrio medici. Purgationis pericula. Modum etiam in alimentis, & cæteris omnibus obseruandum esse: nimium & parum nocere: non ideo tamen ea omitti.

Quod ubi noceret paulo plus iusto sanguinis emississe, ibi paulo minus iusto proficit, tantum abest ut noceat. quod enim ad modum perficiendū deest, alijs remedijs suppleri posse, aut repetita phlebotomia.

Cap. XI Eos qui se Erasistratios uocant, Erasistratum non intellexisse, ideoque omitendos. Et quod Erasistrati Chryssippo assentientis sententia fuerit, cum phlegmonis & alij & uulnerum, inedia adhibenda sit, phlebotomiam ideo mittendā, ne æger deficiat ob utriusque euacuationis genus: Venas autem inedia manitas, sanguinem in arterias transfusum facilius adferre cupere. Galenus eum reprehendit, quod per inediam uix longo tempore id efficiatur, & totius corporis incommodo, quod phlebotomia statim & curpius inferret.

Cap. XII Quod tunc saltem necessaria esset phlebotomia, cum sanguis non transit in arterias, sed in uenis manens eas descendit: Nō enim sola artuum reuinctio, quæ Erasistratis uentur, tunc sufficit. Et quod sæpe hæmorrhagias uena incisa sedauerit, refert aut quæ uena incidatur. Et quod sanguine misso præuenire possimus ne uasa rumpantur, & ob ruptionem inflammantur, ac ne opus sit inedia.

Cap. XIII Quod Erasistratus ipse scribat alijs aliud euacuandi genus cōuenire, ut gymnasium, balneum, uicium tenuem. Sit qui sanguinem rupto uase aliquo thoracis expuat: huic cum neque exercitium conueniat, neque balneum (hæmorrhagijs omnibus noxium, cum fluxum & turgidum reddat sanguinem, & corpora debilia molliatque reddat) restat utendum esse uicium tenui, quem triplicem facit, ut uomere à cibo (quod hic omnino non conuenit) pauca uel parum nutritientia fumere: sed hoc auget potius, licet parū, quam euacuet. tertio loco est omnimoda abstinentia: quæ nec ipsa conuenit. quanquam enim non nutrit neque auget sanguinem, tamen etiam non euacuat sicut proprie euacuantia dicta, sed per accidens tantum, si corporis motus aut calor accedant, unde succi & alimenta cute rarefacta expirant. Nam quieta animalia & tempore frigido latentia, nihil inaniuntur ob cibi abstinentiam. Inedia igitur per se non euacuabit eum, qui sanguis è thorace profusio laborat: inedia enim quodammodo est inter euacuantia & nutritientia: At ne per accidens quidem euacuabit, cum ita affectus motum & calorem omnem uitet.

CL. GALENI DE VENAE

SECTIONE ADVERSVS ERASISTRATVM

LIBER. AD GRÆCORVM EXEMPLARIVM FIDEM RECOGNITVS.

Iosepho Tectandro Cracouiensi interprete.

CAPVT. PRIMVM.



MHI equidem illud inquisitione quam diligentissima dignū videtur, cur nam Erasistratus, cum cætera quæ ad artē spectant, abūde satis pertractaret, ac circa minima quæq; tantopere curiosus esset, ut et quorundam holerū cataplasmatumq; decoquendi rationem conscripserit (quorum facultates usumq; si unquam aliquis alius declarasset, nō iniuriā eorundem cōficiendi rationem omittere potuisset, quandoquidē id nullius pretij sit, taleq; qd' à quo us ex vulgariis inueniri possit) de venæ sectione interim, nempe præsentant eo illo ac unico auxilio, quodq; uel ueterum sententia non minus efficacissimis remedijs extolleretur, ipse nullam mentionem fecerit. In illius enim operibus fermē ne nomen quidem unquam venæ sectionis, præterq; semel, reperiri potest, ubi ipsemet, quemadmodū unicuiq; considerare facile est, obiter potius præterq; instituit, q̄ studio insigni de sanguinis reiectione agens, illius cōmeminit, id quod ex ipsius scriptis intelligis, quæ sic habet Deligata uero quæ circa alas & inguina sunt, non sunt faciendæ more quorūdam, qui uulgatam curandi rationem imitantes non sanguinis gratia se hoc facere intelligunt, sed uinculis ualde comprimūt. Quod enim in deligatis corporis partibus sanguis plurimus recipiatur, ex uenarum tensione, earumq; sectione cōiectā dum est; ex incisa siquidem corporis parte, cum ea deligata fuerit, copiosior is effluit. Dum uero sanguinis reiectione contingit ex deligatura in tibijs ac brachijs facta, plurimū eius ibidem recipiatur. Postquam etenim qui circa thoracis partes ad est diminutus fuerit sanguis, tum ipsa quoq; reiectione multo minor pauciorq; fiet. Hoc autē ipsum imitari conant̄ hi, qui sanguinis reiectione laborantibus uenam secant. Sed in hacre Chryssippus multo consultius agit, quippe qui nō solum præsentia inspiciat, sed etiā imminentis periculi curam gerat. Huic enim periculo quod in reiectione accidit, aliud ex inflammatione adhæret, in quo quidem offerre aliquid cibi perquam difficile est; rursum autē ei qui cum uenæ sectione famem longo tempore tolerare debeat, ne dissoluatur uerendum est. Cæterum Chryssippus simulatq; nutrimentū in corpore iam elaborādum in loca soluta difficilia transulerit, eo tēpore quo dissolutionis periculū imminuet; postquā sic transf-

Galen.

lacionem fecerit, ex parato iam uenæ sectione nō utitur, & cibum offerre nō cogitur: ob idq; summa quæque ingenio superauit, ac q̄ sibi ipsi unde quaq; cōstet, frequētissimas meruit laudes. Quod autē nullius momenti hæc sint, & indigna omnibus modis, quæ uel ad Erasistrati solertiam, quam ille sibi in hac arte uendicat, uel ad auxilij uires referantur, culsibet constat. Quandoquidem si neq; apud Hippocratem, neq; apud Euriphontē, neq; penitus apud quenquam alium qui aetatem Erasistrati præcesserunt, tale genus auxilij in scriptis reperiretur, forte suspicari quis posset illum, tanquā de eo cuius usus nondum fuisset inuentus, aut apud celebres medicos approbatus, iure optimo uerba non fecisse. Verum cum permulti alij fuerint, quibus non in uno tantum eo demq; leui affectu, sed etiam in plurimis acutissimisq; frequens huius auxilij usus iam cōstiterat, ac eo pacto tum Hippocrates omnium bonorum artis medicæ autor, tū uetustissimi quiq; illo usi esse animaduertitur, qua quæso re Erasistratus cōmotus id adeo spreuit, ut ne rationem quidē ullam illius in enarrando habuerit: Etenim & quod illud non improbauerit ad certos affectus, reliquorū præsidiorum more ipsum referendo indicare, et causam ob quā id probauerit præscribere eum oportebat. Atqui hic in huius præsidij uiribus enarrantis tantopere inops fuit, ut neq; significauerit recipiendus ne sit, an posthabēdus usus illius, neq; unq; quid de illo sentiret proferre ausus fuerit, nisi in uno tantum, ut superius dictum est, affectu: quanq; uel ex his quæ ipse reticet, opinionis suæ summā manifestam facere uideat. Nequaquē em̄, si usum illius probasset, silentio præterisset. Neq; etiam cum minima quæuis, quæ ad leuandos affectus accommoda erant, describēda putaret, hæc utpote tam magna aliquem, etiam si ab eo non didicisset, propria opera cōsequi posse persuasum habebat.

D 2 Causa uero ob quā uenæ sectione ipse non sit usus, fortasse diuinatione opus habere cuiquā uidetur. Qui enim quis rescire possit quid de his Erasistratus senserit, quorum ne obiter quidem ille alicubi mentionem fecerit? Nihilominus fuere nonnulli qui in explicanda illius sententia quæuis uaticinari conati sunt; uerum hi dum inter se ipsos discrepant, in maximis erroribus uersari, manifeste sunt deprehensit. nam nemini ex illis eadē stat sentia; & quod multo grauissimum est, neque ab ipsis Erasistrati commilitonibus, discipulisq; Chryssippi Cnidij, quo primum autore de explodendo uenæ sectionis usu dogma suscitatum est, de illius sententia quicquam certi cōstitutum est.

tom. 5

Y

Hæc

Hæc autē quæ Apocemantes Stratoq; protulerūt planè ridicula sunt: uterq; em̄ dicit perdifficile esse venam secare, uel ob internotionē uas, uel ob arteriæ incisionem; nocumentum quippe ilico in gens imminere, si quando loco uenæ arteria diuidatur. His addunt quòd quandoq; aliquis præ timore mortuus sit, & alter etiam ante uas sectionem, alter uero eo iam secto referri nunquam poterit, tum quòd quidam irreparabilis sanguinis fluxu defecerit. Sed præterea illa quoque, quæ à reliquis ducuntur: nam alij quidem eorum afferunt uacuationis mensuram coniectura assequi multo esse difficillimum, idèoque necesse esse, ut aut diminue euacuanti nihil plus contingat: aut mediocritatem excedenti maxima impendat noxa: (quid enim, ut illi aiunt, uenæ sectio modum exuperans, à cæde differt?) Alij uero dicit quòd cum transfusus spirituum (Græce paremprosis) ex arterijs in uenas fiat, necessario inanitionem sanguinis per osculorum referationem ipse spiritus sequatur. Sunt & alij qui affirmant uenarum euacuationē inflammationis affectu in arterijs iam constituto planè superuacaneam esse. Atqui uniuersa talia quam credibilia alicui appareant, sunt tamen reuera falsa indignaque quibus adhiberi fides debeat; quæ his omnibus longe facilius habenda fuisset, si hæc in medium protulissent quæ dicta fuerant à cæteris quibusdam, qui ex eorum natura disputandi initium deprompserūt. Et quanquam uel aduersus hos longiore sermone alicui conueniret instare, huius tamen rei in præsentiarum ea propter nulla est occasio, quia orationem sic in immensam prolixitatem excrescere oporteret, propterea nihil urget ut ea quæ neque ab Erasistrato, neque à quouis alio ex Chryssippi discipulis dicta sunt, reprehendere aggrediamur. Commodissime igitur sermonem mihi instruxisse uidebor, si prætermisiss alijs ab ipsius Erasistrati placitis initium fecero, orationēq; ipsam quantum eius fieri potest breuissime absoluero.

3 Cæterum ille arteriam spiritus, uenam autem sanguinis receptaculum esse asserit. Deinde uero ubi grandiora receptacula diuisa fuerint, magnitudine quidem illa diminui, numero autem effici plura: ac cum nullus locus detur ubi circa terminum unius, uas aliud non existat, illa undequaque per corpus delata in tam minutos fines desinere, ut contentus in illis sanguis præ extremorum osculorum conniuentia intus retineatur: ob idq; etsi oscula uenarum arteriarumq; inter se uicina sint, sanguinem tamen proprijs terminis circumseptum, ac nullibi in uasa spiritalia insilientem permanere: & eo usque sanè animal legibus naturæ dirigi. Simulatq; uero causa quædam uiolenta irruerit, tum sanguinem ipsum in arterias transferri, & animal iam necessario agrotare. Causas item huius rei aliquas, præcipuamq; illarum sanguinis multitudinem esse, à quo & uenæ tunicam distendi referariq; fines qui prius clausi fuerant, transfundi etiam in arterias sanguinem, qui postea spiritum à corde delatum perturbans,

A illiusq; motum alterans, siquidem è directio atq; prope principem partem cõstitit, iam id febrim esse, si autem ab ipso retro repellatur, ac in finibus arteriarum condensetur, inflammationem tum existere. talibus ille rationibus inflammationem ex plenitudine adstruit. Verum quæ ex uulneribus contingit, eam quoq; sanguinis ex uenis in arterias transfusus causari ait, cuius rursus transfusus causam illam quæ ad euacuationem fit, sectionem esse putat. Cum enim scissis arterijs, post inflictum uulnus spiritus uniuersus ex laesa parte effusus fuerit, & periculum instet ne uacuum fiat locus, sanguinem, illo tempore, spiritus euacuatim gressum per osculorum referationes consequi solere ipsumq; explere. Si ergo spiritus foras emissus fuerit, hunc quoq; effundit: occluso autem illo atque obserato, etiam hunc ipsi spiritus à corde demandati impulsus, in locis uulneris uicinis cunctum coaceruari, & ea ratione inflammationem efficere. Sed concedamus age ipsi quæcunq; hoc tempore de febribus & inflammationibus dixit, uera omnia esse; nam alibi demonstrauimus ea nihil in se ueri continere. Doceat igitur ipse nos iam medicaminum seriem. At enim cum in multis alijs locis, tum in primis in tertio De febribus tractatu sic uerbatim. Circa ægritudinum igitur initia ac inflammationum generationes omnem sorbitionum oblationem auferre oportet: inflammationes enim quæ febres faciunt, ut plurimum ex repletionem fiunt. Si itaque hoc ipso tempore adiectiones concessæ fuerint, & concoctione distributioneque suas actiones perficientibus, uasa alimento repleta fuerint, inflammationes multo uehementiores persape fieri contingit. Hæc quidem ille de inflammationibus protulit quæ citra uulnus ex plenitudine eueniunt. De illis uero quæ ex uulnere suboriuntur in primo De febribus libro denuo in hanc sententiam recenset. Istis autem subsequuntur medendirationes quòd uulnera omnia ab inflammatione libera efficiant. Medicamenta enim cum sanis partibus illinuntur, claudendo atq; obturando prohibent ne sanguis de super fusus in loca dissecta irruat: quando quidem in illa quæ affectu carent, eoq; multæ arteriæ illic uenæq; recludatur, sanguis qui in arterias transfilerat, facile in uenas quoq; transfusetur. Quamobrem consequens rursus est, ut uulneratis nihil prorsus cibi inflammationis tempore offeratur: uenæ nanque cum alimento uacua existunt, longe facilius sanguinem in arterias ingestum assumet, quo sanè ita peractio inflammationes minus contingent.

4 Proinde quòd multitudo euacuanda sit, quodq; uenæ distentæ ac repletæ, in seipsis iterato quicquam recipere non possint, assentire ipsi Erasistrato nos fatemur: uerum quoniam pacto hæc euacuandæ sint, in dubium à nobis uocatur. Postquam itaq; euacuationem esse cõfessum iam semel sit, ego eam omnium facillimam atq; expeditissimam, uenæ sectione perfici arbitror, utpote per quam ipsas etiam inflammationes solas ce-

lenime euacuare possumus: cum è diuerso in edie,
preterquam quòd longum tempus requirant, eti-
am uniuersum habitum æqualiter euacuant. At
qui istud nequaquam conuenit: cur enim quis id
euacuet, quòd euacuatione opus non habet? Aut
cur eliquet carnes, cum sanguinem subtrahere li-
ceat? Ut interim noxas reticæ quæ ex inedijs ne-
cessario euenire solent, ac uirtute defatigatam &
succos biliosiores amarulentioresq; redditis, fre-
quentes ite cordis morsus atque inquietudinem,
tum deiectionū alui retentionē, & omnia deniq;
excrementa, acerbiora malignioraq; effecta. Quo-
rum Erasistratus nihil animaduertens; cæcorum
more, qui amplam cõpendiosamq; & planā uiam
in propinquo habentes, sæpenumero angustā ac
asperam prolixamq; errabūdī ineunt, & ipse tam
propinquā satisq; expeditā & amcnam semitam
spemēs, ad impeditam illam ac longam sese cõtu-
lit: quippe qui hoc tantū considerauerit, num quòd
ipse contendit, uia eò uergat, nō autē an compen-
diosa & sine periculo ducat. Nam q̄ uel inedia ad
plenitudinis euacuationē conferat ego quoq; cõ-
sentio; uerum longo tempore, magnoq; cum no-
cumento eam efficere id dico. Attamen Erasistra-
tum, qui quorundam iudicio Hippocrati par esse
uidetur, non puduit quòd neglecto tā insigni præ-
sidio, nihil credibile aut rationi consentaneum at-
tulerit, quin potius uelut de re abiectissima peni-
tusq; nullius pretij, uerba fecerit.

5 At Hippocrates ille medicus te, ò Erasistrate,
nulla ex parte inferior, nō sic de uenæ sectiōe pro-
nunciavit, sed quæ tu uerbis saltem admiraris, ea
sile opere palam est executus. Admiraris tu si qui-
dem naturam ipsam ut artificiosam simulq; prou-
dam animalis gubernatricem nullibi tamen eam
imitaris. Aut cum illam plurimis morbis sangui-
nis euacuatione medetētem frequēter animadu-
eris, carne in uno quidem unquam hoc idem tu
ipse fecisti: Cur etiā naturæ, quam laudas, opera
siletio suppressis? Cur præterea quando apud
Hippocratem reperisti multa huiusmodi scripta:
Mulieri sanguinē uomētī mensuris erupentibus
solutio. & Ab atra bile habitis similē effectum hę-
morroides præstant; sanguinis ite fluxus copio-
si, per nares liberat: apud te nihil tale, sed unico so-
lum uerbo laudata natura, opus autem illius nulli-
bi scriptum reperitur. Porro mihi sufficiebat, ut o-
pera illius antea ad perfectum addiscerem, a qui-
bus postea initio sumpto ad inuestigandū reperi-
endumq; id quòd æquum putabam idoneus eua-
si. Licet ergo mihi uenia eorum qui te admiran-
tur, dicere quod in conspicuo est, quòd scilicet mi-
hi aut modis omnibus demens, aut in naturæ ope-
ribus quamminime uersatus esse uidearis. Alteri
enim ex his duobus, uel quia illa nūquam cogno-
uisti, uel quia cognita iam dudum nō sis imitatus,
obnoxius existis. Aut fortassis in cubiculo aliquo
perpetuo delitescens, neq; aliquando ægrotū ali-
quem contemplatus, hæc scribebas, hincq; ad deo
nō iniuria naturæ opera ignoras, quæ alioqui pro
extrema dementia tua semper es prepostere admi-

Galen.

A ratus & imitatus; necnon postq; scribendi profun-
ciam inisti, legem scribendo es transgressus. Opor-
tebat em̄ primum te opera naturæ mihi describe-
re, deinde declarare: & quæ illa integre ac perfe-
cte proprijs conatibus incitata, & quæ morbosis
causis præpedita diminue agat: nam huiusmodi
ratio uiam ad inuenienda medicamētā nobis sup-
peditat. Cum etem̄ didicero quæ præbe at illa per-
ficiuntur, superaddido eo, in quo illa deficit, facile
ei adiumento esse potero: rursus si ipsa nihil peni-
tus mouet, id quòd quandoq; morbosarum causa-
rum uehementia superata patif, tum ego illud om-
ne fuggerere enitar. Tu uero nihil horū iudicans
domiq; te continens, ut qui forte ægrotorū uisita-
tionem, ut fertur, paruipendas, quòd tibi uideba-
tur scripsisti. Cæterum si tu ipse non perspexeras,
Hippocratis monumenta relegenti tibi addicere
integrum erat, & quæ perfecte integreq; ac ut ille
loqui consueuit, absolute natura mouente iudicē-
tur, & qua ratione illam quis iudicium non aggre-
diētē, pulcherrime imitari possit; quo etiā pa-
cto aggrediētē quidem eam, uerū debiliter mo-
uentem adiuuare oporteat. Si enim in his exerci-
tatus fuisses, talia te consulente audirem qualia a-
pud Hippocratem quoq; inaudio: Quæ iudican-
tur & iudicata sunt integre, neq; mouere neq; no-
uare siue medicamētis, siue alijs irritationibus, sed
finere. Istud quidem habes proprium naturæ inte-
gre mouentis præceptum: quòd uero huic succe-
dit, naturę & ipsum, uerum diminue ad iudicium
mouenti congruit, eamq; ob rē illi auxilio esse iu-
bens, dicit: Quæ ducere oportet, hæc quo maxi-
me natura uergit, per loca cõferentia ducēda. Na-
tura siquidem tum temporis expellere conatur id
quòd eam infestat; cum autē præimbecillitate fi-
nem operi imponere nō possit, nostra auxilia in-
plorat. Propterea etiam lateris inflammatione la-
borantes curans, iuxta humorū uergentiam inanē
re eos consueuit. Quid enim ait: Cum ergo dolor
ad iugulum extenditur, aut grauitas in brachio,
uel circa mammam, aut supra præcordia existit,
interna cubiti uena secanda est. Neq; dubites co-
piosum detrahare sanguinem, donec rubicundi-
or multo, aut pro puro rubidoq; liuidus effluxe-
rit, utrunq; enim contingit. At si dolor sub septo
transuerso fuerit, neq; ad iugulum ascendere, tum
aluis uel nigro ueratro, uel plepio subducēda est.
Rursus uero in quopiam renalium affectiōnum
concurfu præfatus: Et in rene dolor grauis quum
implentur cibo, uomunt pituitam. Quum uero
redundant dolores, æruginosa. Et melius quid-
em habent, soluntur autem quum cibi euacua-
ti fuerint: arenulæq; fuluæ subsident, & cruentum
mingunt, & torpor scemoris è directo; infert po-
plitem secare, hoc est, uenam quæ in poplite est
incidere. Illud uero quò modo dictum est? Ex
Margei famula ne sanguis quidem prodijt, nam
ut filiolum hæc peperit, ilico os ad uertebras co-
xarum detortum est. Porro dolor ex uena pro-
pe talum secta cessauit, quamuis tremores cor-
pus iam occupassent. At qui nunc ad occasionem

tom. 5

Y. 2

ipsam

ipsam eiusq; fomitem trāseundum est. Hippocrates siquidem te & occasionem morbi & generationem occasionis pendere iubet, id quod tu mea quidem sententiā multitudinem sanguinis praesertim molestiā inferente, nō de alio quopiā, praeterq; de uenae sectione dictū affirmare possis. Ergo praefata mulieri licet iam tremore correpta esset, ille secare uenam nō distulit, cum ē dīseruo nemo alter in tremoribus aequae atq; hydropisi, alio uē frigido affectu ullo sanguinem de trahere unquam ausus fuerit. In talibus enim ex calidi succi euacuatione adhuc multo magis corpus necessario refrigeratur, & innatus calor qui per affectū antea quoq; frigefactus fuerat extinguitur. Hippocrates uero ut ipsemet fatetur, multitudinem sanguinis ante ipsam affectum accumulata cōsiderauit; muliercula enim ā purgationis quas secundas uocat, non fuerat expurgata. Fomes autem seu nutrimentū occasionis, hoc est generatio, primaq; causa ob quam non sit probe expurgata, est ipsa cōtorsio uteri qui ad coxas contortus fuerat. Proinde cū retentiō euacuationē, inclinatio uero ad uterum, locū per quem euacuatio instituenda est, illi indicaret, uenā talo proximā incidit; talēq; Hippocrates sese in cunctis praestitit.

6 Sed ne laudibus uirum hunc extollentes Erasistratus tristitia afficiam, ut qui ipsi, ante eosq; Erasistratus, aduersus illum inimico animo esse mihi uisi sint, missa faciamus nunc Hippocratis monumenta: alio enim tēpore totam illius de euacuatione artem declarare constituimus: quin potius transferamus nos ad illos, quorum aliqui empiricam aliqui rationalem sectam sunt amplexi, quandoquidem ex his ā uenae sectione abstinere inuenio neminem. Nam inter dogmaticos Diolem ac Plistonicum Dieuchēq; & Praxagoram, unā cum Philotimo atque Herophilo & Asclepiade, uenae sectione usos fuisse comperitum habeo: quanquam Asclepiades contentio- nis adeo studiosus fuit, ut omnia ferme priora dogmata lacesserit, neque alicui prioris seculi homini, immo ne Hippocrati quidem pepercerit, hincq; adeo ueterum medendi rationē mortis meditationem nominare non sit ueritus. Atqui neq; hic eō impudentiq; uenerat ut uenae sectionē ē medicinalium auxiliorū numero explodere auderet. Quinetiam neq; inter recēiores aut uetustiores aliquis, non Mantias, non Athenaeus, non Archigenes, neq; Agathinus, tum deniq; neq; ex Empiricorum coetu quisquam: hi enim cum nihil eorū obseruent, quae rationi consentanea sunt, omniaq; experientia sola decernant, tamen ex his neminē mihi proferre poteris. Quando autem isti in omnibus alijs rebus ferē dissentientes, in hac sola conueniant, mihi planē concordia suspiciōne uacanti nihil magis sīde dignum esse uideatur.

7 Sed ne praestitium multitudinem opera naturae, quam tu scilicet laudas, obscuriora reddamus, mittamus hos si lubet. Nōne ipsa mulieres cunctas singulo mense euacuat, sanguine superfluo foras effuso? Muliebre enim genus ut

A quod domi aegeret, neque uehementibus laboribus exerceret, aut sub claro sole uiueret, ac ob utraq; hęc multitudinem humorū coaceruaret, ipsam euacuationem plenitudinis, tanquam remediū naturale obtinere opus habebat. Et unum quidem istud naturae opus est. Alterum uero purgatio post partum contingens existit: licet & foetura ipsa, species sit euacuationis. Nam ex sanguine uteri conceptus nutriri solet. Tū uero postquam editus est foetus, generatio lactis in mamillis, uacuatio hęc quoque est plenitudinis non parua: una siquidem & lactis & mēstruorum substantia est, amborumq;, ut quisquam dixerit, riuorum fontes communes, uenae sunt. Quam ob rem quibuscunq; per atatem menses fluere cessant, hęc neque in mamillis lac amplius colligunt; quaeque etiam purgandi tempora adhuc habent, ac interea lactant, haec non purgantur. Praeterea cum mulieri lactanti sanguis per locos eruperit, ilico lac huic euanescit. Ad hęc quaecunq; animantia utero nō gerunt, his neq; lac unquam adest: rursus quibus id suppetit, illa etiam ad concipiendum ā natura idonea sunt. At si iam addidisti quot commoda ex huiusmodi euacuatione muliebre genus maneant, quotq; nocumenta nō idem suppressis sequantur, haud uideo qui sufferas, quo minus sanguinem superabundantem modis omnibus euacuare acceleres. Mulier enim, Hippocrate teste, podagra non laborat, nisi menstrua defecerint. Sed cur ego contra hominem Hippocrati inimicum uerbis Hippocratis utor? uelim itaque audias iam ueritatem ipsam me praecone tibi denunciantem, quod mulier si probe expurgetur, neq; podagris, neq; articulorum doloribus, neq; lateris inflammationibus, neque peripneumonij capiat; sed neque epilepsia, neq; apoplexia obnoxia sit, aut spirationis uel uocis ablatione rite purgata ullo tempore infestetur. Num uero menstruis fluentibus, aut phrenitide, aut lethargis, aut conuulsionibus, uel tremoribus, rigoribus uel mulier aliquando correpta est? Num etiam uel melancholia laborantem, aut mentis impotem, aut quae ex thorace spueret, uel uomeret ex uentre sanguinem, aut capite laborantem, aut angina praefocatum, aut aliquibus id genus magnis & uehementibus affectibus impetitam cui menses recte excrenerentur, quandoq; conspexisti? Verum his retentis eam cui libet malo implicari facile est, huicq; rursus euacuationes medentur. Sed posthabitis mulieribus te ad mares iam confer, ut discas scilicet quod quibuscunq; pro consuetudine, superflua per haemorrhoides euacuātur, hi omnes uita morbis minime impedita agunt; quibus itē inanitiones supprimuntur, hi in perniciosissima quaeq; labuntur. Vtrum igitur neq; horū ubi uel anginam uel peripneumoniam incurrerint, sanguine euacuabis, aut potius ne desciscere uidearis ab ijs quae perperam didicisti, tot hominum interim paruipendes? Tu fortassis hoc facies: ego autem non haec solum, sed etiam spasimum hydropemq;, sanguinis euacua-

tionē sapientius sum medicatus. In hunc enim modum erudiuit me tum longa experientia, tum ratio ipsa, quæ mihi suggessit ut occasione ipsam eiusque somitem sic inuestigare. Quod autem experientia quoque istud me docuerit, si Empiricorum commentaria legeris, scire poteris. Ne igitur in posterum cum Hippocrate solo (quod euacuationē sanguinis laudauerit, cum uel in tremore, uel in hydropem, uel in alium quemuis frigidum affectum, mas quidem ob hæmorrhoidarum, mulier uero ob mensium retentionem incidere) tibi controuersiam futuram rere, sed & cum uniuersis medicis qui experientiam sectantur, uel potius cum uniuersa hominū uita. Videris enim tu commune omnium subuertere sententiam, præsertimq; si neges quod à natura cuiq; insitum sit, ut considerare possit sanguinem ob nimiam multitudinem euacuandum esse. Quis enim contraria contrariorum esse remedia ignorat, ut quod sententia hæc non Hippocratis tantum, sed omnium hominum communis sit; Tu uero præ odio quod aduersus Hippocratem concepisti, mea quidem sententia etiam alijs multo es demetior, idq; cum habeas naturam te ad hæc ipsa quotidie manu ducentem; nam hæc in ediam ciborum adiectione, ac repletionis euacuationibus, & frigus calefactionibus caloresq; refrigerationibus curat. Quod enim aliud est offerre cibū quam plenitudinē suppeditare; quid rursum excernere fæces, quam uiscera repleta exinanire; quid item meiere quam repletioni uiscera mederi? Pleraq; enim animantia frigore lacessita, latebras ac calidos specus in penetrabilibus terræ sibi inuestigant. Aliqua etiam ætatis tempore calore anhela, sese in aquam frigidam conijciunt, & in umbrosis locis uentoq; peruijs immorantur. Ego præterea frequenter uidi canem uomitū libimet studiose prouocātem; autem quoq; Ægyptiam clysterem imitatum; quæ omnia ab hominibus, ut qui ratione compotes sint, multo faciliore conatu perficiuntur. Accerse ergo hominem quempiam rei medicæ expertem, ad egrotum qui bona sit habitudine, iuuenis, multo abundans sanguine, quiq; præ angina aut peripneumonia suffocetur, postea hominem interroga, si quid cognoscat quod huic affectui succurrere possit, quis adeo demēs est, ut sanguinis euacuationē nō pronunciet; Cæterum Erasistratus ob contentionem quam aduersus Hippocratem præ se fert, ne id quidem quod communi omnium hominū suffragio receptū est probare uideatur; & ea propter reperit uel gruius ipsis inipientior; has siquidem æque atq; aquillas, præ longo usq; ad ultimos terrarū terminos uolatur, partim frigus, partimq; æstium euitantes, quod contraria contrarijs semper præstat, uidere licet.

8 Atqui, ut & antea dictū est, perspectū habere quod nō euacuandum sit sanguis, quibus ex eius multitudine periculum imminet, id præstantiam artis Hippocraticæ nō dum æquat; ego enim tum quo loco; tum quo tempore, quæue quantitate euacuatio instituenda sit, mihi declarari malle.

Galen.

A Scire namq; quādo uel uenam quæ in fronte est, uel illas quæ in hircis oculorum, seu sub lingua existunt, uel quæ humeraria uocatur, uel subalarem, uel quæ per poplitem penetrat, quæue præpetalum adest, incidere oporteat (prout de his omnibus Hippocrates docuit) hoc ipsum ego ratiocinationem medicorum arbitror esse. Verum quod contraria contrarijs medicanda sint, quodq; euacuatio repletioni opponatur, tantum abest ut admirer, ut etiam huiusmodi cogitatione bruta animantia participare dicam. Si autem auribus aperitis aut animo potius, ac deposita erga Hippocratem similitate, ueram rationem amplecti uolueris, aliquid iam quod illius arte dignum esset, dicere tibi possem. Eousq; em Diocles Plisfonticusq; ac Herophilus & Praxagoras atque Philotimus, necnon alij medici permulti inter se consentiunt, quod ipsi quidem non per sese, uerum diuinum Hippocratem secuti repererint, quo tempore quælibet uenæ quas supra commemorauit incidendæ essent. Cæterum q; ab atra bile habitis similiter hæmorrhoides cõferant, etiam istud Hippocrates perspicue docuerit non tamen omnes sciunt, sed quicq; sincere in illius scriptis uersati sunt; hi soli enim quomodo hæmorrhoides, dysenteria ac uarices fiant ab ipso perdidicerunt. Itē quod non semper horum unumquodq; si existat, prohibendum est; sed q; quandoq; coadiuuandum: uel natura quiescente (quando sic cõfert) ei totum committendum, adeo ignorat illi qui dysenteriam uaricesq; & hæmorrhoides immature præpropereq; medicari discunt, ut & ea moliant facere, quæ nō sunt. Porro ego quoq; uidi nō paucos ob huiusmodi euacuationes, quæ medicorum imperitia cohibitæ fuerant, aut atra bile, aut insania uexatos; quorū aliqui quoq; tū intercostali inflammatione, tū renali dolore correpti sunt; nōnulli uero ex alio sanguinem uomebant, aut eundē tustidē ex thorace spuebant, aut attonito morbo aquæue in tercutanea interibant. Hæc illa sunt quæ mea quidem sententia medicus unā cū præclara euacuationis arte cognoscere debet.

9 Quantum autem de sanguine exuperante euacuandum, idq; cum nō sit magni momenti, cur Erasistratus tanquam ex magnis quoddam contemplit; Aut cur homines illi aduersus omnes obstrepere paratissimi uigantur, dicūtq; euacuatio nis (quod perinde in alijs auxilijs accusandum foret) mensuram ignorari. Aut cuiusnam per deos immortales illum adeo exquisitè tenere mensuram arbitrantur, ut neq; excedat in quantitate, ne que deficiat unquam; num clysteris, aut purgantium medicamentorū alicuius, aut urinam cientium, uel cibi ullius potusue; Tempus itaq; esset ipsi, utpote omnia suspiciōe et infesta reddentibus, quiete scere omnino. Aut cur ergo Erasistratus purgatiuis medicamentis utitur, ac unū aqua frigida dilutum, tum alijs quibusdam, tum maxime cholericis exhibet, Chrysippumq; præceptorē suum, ut qui inuenerit prædidit nulli ueterū cognitum, quodq; & solum cholericos iam mortis proximis

tom. 5

Y 3

reli-

restituere possit, his verbis satis inuidiose laudat: Non etenim quousvis tempore, id præbet, sed usum auxilij huius ad occasionem uehementer præcipi- tem traduxit. Ego uero hæc in re ipsum non accu- so, præsertim cum tam absolute omnia quæ ad oc- casionem spectant, disquirat. Illud tamen in eo quis demirari possit, quod si quãdo Chryssippicũ quic- quam deo ceat, tum ut ex uerbis eius colligere licet uehementer sit audax, nihilq; ipsum profluxu neq; momentũ occasionis, neq; mensuræ difficilis con- iectura, neq; affectus periculum perterrefaciat, sed putet adeo exquisitè simul clareq; illũ et mensuræ & occasiõis rationem docuisse, ut decreta sua nõ medicis solum, uerum & popularibus usui futura arbitretur. At rursũ cum ex ueteribus medicis aliquem ob rerum inuenta laudare opus habeat, illic in de quaq; tergiuerfetur.

10 Age ergo, declaremus illis hoc etiã quod mensura in uenæ sectione multo facilius de- prehendatur, quã in cæteris quibusuis auxilijs. Nam & coloris mutationem sepe numero dispi- cere licet, hocq; duobus modis fieri potest, inter- dum quidem sanguinem ipsum fluentem, inter- dum autem ægrotum considerando. Ad hæc anti- mi quoque defectio in plurimis affectibus uacua- tionis terminum obtinet, sanguinis item fluentis uigor labescens, & pulsus mutati. Adde quod & medicus huius solius euacuationis liberam habeat facultatem sistendi quãdodocunque illi placue- rit, aliorum autẽ nullius. Nam ubi dandum sit ali- quod medicamentum, siue deiectionum, seu uo- mitorium, seu urinarum euacuationum, aut tho- racis uel capitis purgatorium, horum scilicet om- niũ prima exhibitio in tua potestate sita est, cæte- ra autem fortuna administratrice obtingunt. In- gens præterea in propinationibus pharmacorum periculum est, cum uel non commouetur purga- tio, uel quod in alium attractum est, non facile excernitur, uel cum dolore, moribus, torminĩ- bus, refrigeratione, pulsuum euanescentia, ac a- nimi defectu exprimitur, uel cum corpus uehe- menter perturbatur, interimq; paululum admo- dum euacuatur, aut euacuationis modum excedit: hoc enim ipsum tanquam omnium malorum ex- tremum in hac parte frequenter contingere so- let. Neq; enim ut uenæ in cistæ fluxum, superimpo- sito digito mox sistes, sic profliuatum alui tibi si- stere licebit. Verumtamen nemo ex medicis super- uenientium symptomatum mentis periculis a pro- pinatione pharmacorum abstinet, sed uelut nunc deceptus est, hoc modo non amplius uti cogitat. Sed quid ego purgatoria refero, ac in enarratio- ne fortium medicamentorum tempus tero, cum & cibi cufusq; in mensura erratum maxima affe- rat nõcumenta, quorum magnitudinem in exte- nuatis & imbecillibus hominibus, quicq; celeri nutritione egent, considerare facile possumus. In his enim si quid minus æquo nutriat, uirtutem ta- bidam reddet: contra, ubi quid modum exupe- rans naturæ oneri potius quã nutrimento fue- rit, illam penitus suffocabit extinguetq;. Anigi-

tur a cibi exhibitione abstinebis, eo quod men- suram illius non sine negotio assequi possis? At- qui ea quoq; ratione a medendi prouincia pen- tus abstinebis, nihil enim in medica artere reperis, quod nisi certa mensura usurpatũ prodesse pote- rit. Cæterum in sola uenæ sectione ne hoc quidem culpæ queas. Proinde errata quæ utrinque cir- ca mediocritatem contingunt, non parua noxæ sequuntur, maximeq; quia excessus perniciosissi- mos esse nemo neget: uerum in quo id quod infra modum est, periculo uacat, in eo excederem- dum non fuerit necesse. Sit em̃, si ita fors ferat, me- diocris detractio triũ heminarum, ubi si quatuor detraxeris, noxam maximã inferes: duas rursũ si euacuaueris, comodabit quidem id satis, lesio- nis uero nihil adferet: licebit naq; tibi unam illam heminam uel dylisteribus, uel inedia, uel frictioni- bus, uel sudoribus exhaurire, supra hoc quod & demuo detrahere si uoles, non ueraberis.

11 Sed qua ratione ego tam multa in medium affero, cõtenderẽ cupiens cum hominibus insul- sis, qui ad hoc quod nihil rationi consonũ loquũ- tur, etiã ea ipsa non agnoscunt, quæ ipsimet lau- dibus effere solent? Admirantur enim dicta Era- sistrati, ac nomen sibi ab illo uendicant, Erasistra- teos sese appellantes: uerum documentorum illius adeo ignari sunt, ut quid uis potius quã sententiam illorũ enodare ualeant. De uenæ ergo sectione tam proluxa, tamq; absurda nugantur, ut iure optimo quis non solum imperitiã illorum, uerum etiam impudentiam detestari possit: quip- pe cum Erasistratus in libro De sanguinis reiectione, in quo solo uenæ sectionis meminit, aperte dixerit, quod Chryssippus ob id non ueratur detra- ctione sanguinis, quo æger qui propter inflama- ones necessario in medijs continetur, perdurare possit. Ipsi tamen nihil minus quã hoc dicunt. Aut uis ne ea gratia ut homines hos negantes in posterum quoq; audiamus, idq; quum uerba Era- sistrati in promptu nobis adsint: atqui hoc nequa quam æquũ est. Audiamus ergo dicta ipsius, ubi ait: Multo consultius agebat Chryssippus, non so- lum quod præsens erat, inspiciens, sed & impen- dentis periculi curam agens. Adhæret enim illi quod in reiectione contingit, aliud ex inflamma- tione periculum, in quo cibum offende non facile est. Et uero qui cũ uenæ incisione longo tempore sine cibo permãserit, periculũ est ne dissoluat. Ap- tere enim illũ a periculo quod ex inedia accidit, cauere dicit, illudq; necessario secuturum putat, quia æger ob inflamationẽ fame longo tempore sit ex cruciatus. Hic quoq; nihil moror Erasistratẽs blaterãtes, cur ille hominib. inflamatione laborã- tibus cibos nõ offere iusserit, uerũ ipsi Erasistra- tum per uerba quorũ antea mentionẽ feci, semet- interpretantẽ habeo: ex tertio nimirum De febrĩ- bus, ubi de inflamationibus quæ ex plenitudine fiunt, didicit, & ex primo De uulneribus. In uul- que enim commentarijs nõ semel, sed sepe, uenas quæ inedijs exinanite sunt, ut sanguinem adfluen- tem denuo recipiant aptiores fieri, dicit. Quid em̃

atque His uero consequens est, ut uulneratis inflam-
 mationis tempore nihil tibi offeramus: uenæ enim
 cum à nutrimento exinanitæ fuerint, sanguinem
 qui in arteriis transiit, facilius suscipiunt. In-
 edia ergo tanquam euacuatorum auxilium quod-
 dam inflammationes discunt, eamque neque alia de
 causa inflammatione laborantibus iniungi dicit,
 quam quod uenæ euacuata sanguinem in arteriis
 insipientem, sic facilius suscipiant. Deinceps uero
 cum uenas euacuare uelit, possitque id, ita me dispa-
 menti, sine molestia ulla, celeriterque perficere, lon-
 gos ille infumit labores. Verum ego non uideo
 quo pacto seipsum quis implicando magis prode
 re possit: Non secabo, inquit, uenam, ut eger ad su-
 stinendas inedia sufficiat. Porro cuius rei gratia
 inflammatione correptos, fame excrucias? ut in-
 quit, uenas extirpauim. Quis ergo eas à principio
 non euacuasti: Proinde pueret me iam hominis qui
 in tam graua errata incidit, quicquid præter hæc,
 quibus tum perspicuis ipsius artis decretis, tum
 suis proprijs rationibus repugnat, & hoc ipsum
 ignorare deprehensus sit, qua de causa inedia sus-
 cipiantur, quamquam de usu illarum inulto antea
 Praxagoras satis copiose clareque scripserit, tum Hip-
 pocrates & Diocles, quantum ad hoc expectat, ni-
 hil prætermiserint. Hic uero ita rudis est, ut in-
 edias solas ad uenarum euacuationem assumedas,
 eaque solaratione laborantibus succurrendum pu-
 teret, deinde, per loue, euacuatorum remedium opus
 habens, negligens efficiatibus illis, quæ ue quocum-
 que quis uelit, celerrime ducere possint, ad om-
 nium leuissimum transeat.

12 Verum age, concedatur tibi & hoc, quod
 inflammationes ex uulneribus curari eodem mo-
 do possint, quo & illæ quæ ex multitudine pen-
 dent, quid tandem faciemus cum multitudine ipsa
 quæ in uenis etiamnum manens eas extendit non
 dum uero in arterijs impacta fuerit, quoniam pacto
 illi succurrendum erit. Ego sane in huiusmodi
 omnibus uenæ inanitionem summè idoneam
 esse arbitror. Incubatur ergo in thoracè tanta multi-
 tudo, ut periculum sit ne aliquid uas in eo rumpat,
 num uel se uenam non incidimus, aut artus po-
 tius laneis uinculis deligabimus? Illi quidem istud
 medium fidius suffecerit, quando quidem cum his
 loco reuulsit præsidij utendum censeret, non
 intellexit uenæ sectionem in reuellendo multo
 esse efficaciorē. plurimis enim inrestringibili
 sanguinis profluuii laborantibus, uenæ secta fluxum
 sistimus. At Erasistratum hoc quoque igno-
 rasse existimo, nam non cuiusuis hominis est ficere
 quæ uenæ eum ex aliqua corporis parte sanguis
 profluit, incidenda sint. Postquam igitur uenæ sectio
 efficere quæ maxime ea omnia potest, quibus hoc
 tempore indigemus, illum sane euacuationem u-
 nam cum reuulsionē pretermisisse certum est. Quid
 ergo tu amplius cessas, tēpusque inaniter infumis,
 & hominem conficis, cum possis illum uindicare,
 & a uulsi rupture, & quæ illam insequitur, infla-
 matione, & a famis cruciatibus qui inter remedia

inflammationis à te instituitur? Si enim multitudine
 rupturam efficit, tu illa euacuata id quod futurum
 erat, prohibebis: quod quidem si feceris, etiam ex-
 ruptura inflammationē de medio tolles: hac rur-
 sum sublata, non amplius inedia uisus nobis erit
 amplexandus. Tu autem eo quod inedia cuique
 consilere cupis, uideris mihi ipsemet affectuum
 qui in edia opus habeat, autor existere. Aut for-
 tassis graue tibi uidebatur, re quæ sædebat, exina-
 nita, nihil negotij deinceps præstolari.

13 Sed quid frustra ego tantū laboris infumo,
 quam tuum sermonem tibi in memoriā redigere
 possim. Sane em tu ipse nos docuisti in primo De
 salutarib. libro, ubi de multitudine generatione
 quæ in uenis consistit præfatus, illius quoque reme-
 dia ordine scribis, euacuationē scopū quidē om-
 nium ipsorum statuens: aliud uero illius genus, alij
 affectui cōferre inquit: Præterea quæ exinanitæ
 repletionē (sic enim alimentum multitudinē in ue-
 nis congelatum appellandam censes) tum exerci-
 tia, tum lauacra copiosa, tum ipsam tenuē uictus ra-
 tionē esse iubes. Neque idem euacuatorum auxilium
 cunctis cōferre dicis, ut quod neque omnes omnium
 illorum usui simul aduofacti sint: sed alijs lauacra, a-
 lijs tantum exercitia, nonnullis item uomitiones à
 cibo magis arideant. Ad hæc quod non ipsæ mor-
 bis omnes obnoxij sint, uerū hic epilepsia, ille san-
 guinis spūto, alter etiā uel hepatis, uel lienis affe-
 ctibus facile corripī possit. Nullo igitur pacto epi-
 lepticum quenquam balneis euacuare tentabimus,
 id quod tu quoque cauendum recte putas. Etiam
 uero neque sicut de trasis in thorace ruptura timor
 instet, huic exercitia iniungemus: periculum
 enim est, ne illorum uehementia etiam si non ad-
 sit multitudo, uel usitum tamen imbecillitatem
 ipsius exercitantis uena aliqua circa thoracem rumpatur:
 Qua ergo ratione illi succurrere debeamus,
 quæ nos edoce: siquidem quod euacuandum sit,
 uel tu ipse fateris, hincque adeo euacuato-
 ria illa præstida, hoc est exercitia, lauacra quæ fre-
 quentia, & tenuem uictus rationem abs te habemus.
 Cæterum exercitijs ne tumet quidem uti pu-
 taueris. Quod aut ad lauacra attinet, utendum ne
 his in hominib. sic affectis, an nequaquam utendum sit,
 tu planè nihil pronūciasti. Ego uero illud quod eu-
 uidenter apparet experientia corroboratū, aperte
 dicam: tum si de te quoque mihi uaticinari licuerit,
 quod tibi forte uisum fuit, aperiā. Tu enim ipse in
 tractatu De sanguinis refectione, deligationibus,
 remedijsque uteris, tanquam quibus solis plenitudi-
 nē reuellere, non aut balneis euacuare oporteat.
 Arbitror namque te, ubi ueniam supra sit, lauacra
 inhiabitur, cum interim reticueris, si ubi futura
 rupture suspicio adsit, ut illo uelis. Porro ut tu al-
 ter sentias, mihi nihilominus euidentis illud satisfaci-
 cit, quod uniuersis sanguinis fluxionib. ex balneo
 maxima noxa contingat, et causa huius perspicua
 est: Sanguis siquidem calido lauacro in uapores
 resoluitur, ac in spiritus redigit, propterea que ad mo-
 tum incitatur, & in tumore attollitur: ad hæc cor-

pora calidis lotionibus, mollia debiliaq; efficiuntur. Qui igitur fieri possit, ut cum ipsa iam molliora effecta sint, isq; qui ea rumpit, motum simul tumoremq; nactus sit, non facile afficerentur: Proinde haudquaquam per balnea illos euacuare conabimur, quibus ne propter multitudinē sanguinis uenae rumpantur, periculum impendit. Reliquum itaq; est, ut ad tertium euacuatorū auxiliōrum genus, puta tenuem diætā, cōfugiamus. Age sanē postquā hanc quoq; tribus modis operaris, nempe tenues paucos, uel, aut nihil nutriendos cibos offerens, uel nequaquam offerens, uel à cœna uomitū iniungēs, uideamus in primis quomodo tenuiter cibabimus: nunquid sumpta cœna uomitum prouocātes? Atqui si modo quadam tenuis ipsis uomitionibus intrepide uti uolumus, sic exercitiorum uehementiam nos uereri oportebit: hoc enim neq; plebeium quenquam latet. Superest ergo ut uel inedia precipiamus, aut pauca nutritionisq; expertia alimēta adhibeamus. Verum hæc quamuis non insigniter, nutriunt tamen & ipsa: nos uero nō addere aliquid, sed auferre potius cupimus. Ultimo igitur laboriosam illam, ac reuera perniciosam, æque atq; sacram aliquam ancoram, quæq; omnibus affectibus opitulari possit, famem accersemus, ac deinceps & Apolloniū & Dexippum ea gratia maledictis incessemus. At hinc te recordari percuperem illorum, quæ ipse de hac re docueris. nā tu ipse de inedia sic uideris sentire, tanquā ea ex numero euacuatorū auxiliōrum nequaquam esse possit. Verum simul ac prius, quod uolo demonstrauero, tū & testimoniorum quæ adducis, faciā mētionem. Nam inedia inter res existentes nullum obtinet locum, nihilōque magis subsistit, quā uel cæcitas, uel surditas, quæ omnia rerum existentium priuationes sunt. Ipsa enim ciborum adiectio ex rebus consistitibus est, unde & opus eius, corporis nutritionem esse inuenies; rursus subtractio eorundem, non eadem cum rebus existentibus est. Neque etiā proferre poteris aliquod opus illius, qualis scilicet illa est, quæ in sudoribus uenæq; sectione ac dysteribus contingit euacuatio, ne cō in edulij nutritio. Media igitur amborum, hoc est euacuationis & nutritionis, inedia est, ut quæ neque nutriat, neq; euacuet. Quamobrē ergo inquit illi multi ob inopiam ciborum famis tempore interierunt dixit: Non mehercule ob inopiam ciborum respondebimus. nam eadem quoq; ratione animātia in latebris degentia, sine ciborum copā perdit rare nequaquam possent. Perditat uero hæc, idq; ipsomet Erasistrato adserēte, quī & causam huius rei adfert. Vniuersa namq; animalia per exteriorē cutis superficiem, secundum quod magis uel mi-

nus de raritate participant, transpirare aīc. Quod autem uel magis uel minus rara superficies contingat, tum multas alias causas esse, tum illas non minimas, quæ secundum caliditatem & frigiditatem, ac quietem motumq; corporum permutatio nes fiunt. Si em̄ qui nos ambit, aer calidus existit, & animās exercitijs uacauerit, plurimum tunc ex eo defluere contingit. At in contrario rerum situtu, ubi uidelicet ambiens nos frigidus, insuperq; animal sine motu degat, densari illico exteriorē superficiē, defluereq; nihil profus, aut undequaq; parū, & ob id feræ quæcunq; latibula incolunt, alimētis opus non habent. Cum enim hæc subhybernus frigus, quo tempore in cauernis commorantur, toto corpore frigida segnesq; ac densæ ob quietem reddita sint, & exterior superficies iam adstricta fuerit, nihil tunc defluere par est, neq; etiā quod euacuatum non est, repletionē indiget, alioqui nutrimento opus haberent. ad quod in uestigandum ea propter incitantur, quod defectū quem ex inanitione perceperunt, opem ferāt. Patet ergo hinc quod & euacuatio quæ in tota superficie contingit, defectus sit causa: & indigentia ciborum ideo incumbat, quia quod inanitum est, repleri de uo desideret. Atqui posteaquā causa defecerit, ob quā solā animalia cibis indigebant, necessarium omnino est, ut & indigentia ipsa unā deficiat, atq; ea de causa animalia latebras incolentia sine cibis degere possunt, siquidem neq; ciborum adiectione indigent. Manifeste itaq; didicimus, quod non inedia, sed potius raritas cutis euacuet, quam si frigore atq; quiete densaueris, quid commodi amplius ex fame expectabis? Præterea cui de sanguinis spūto periculū imminet, necessarium tum exercitia, tū omnes supercalfactiones euitandæ erunt: ex uehementia etenim illorum uenæ rumpi plerunq; possunt. Supercalfactiones item ipsidem modis quibus & lauacra obsunt. Corpus ergo citra ullam calfactionem euacuabis: si enim id uel lauacris, uel exercitijs calfeceris, ipsas uenas adruptionē dudum inclinatas, maiore in modum lædes. Quæ ergo sic affectis consulendi ratio nobis superest? Inediæ namq; nisi hominem exercitari, aut quouis modo callieri contigerit, euacuare non possunt: uenæ uero sectionem ueluti & alia fortiter purgantia medicamenta, quemadmodum manifeste apparet, summē arbitror fugimus. Hæc est illa admirabilis sanē euacuantium præstidiorum opulentia, qua abundant hi qui ad inediā cōfugerunt, quæq; sola, si utemur, iam nobis nihil amplius cōtinget, ut quæ sola euacuare nullo modo possit, rursus quibus adiūcta euacuat, ea ipsa maiores longe alias noxas quā commoda euacuatione inducunt.

Cap. 1. Historia mulieris annorū 21. cui facies mentis purgationibus quarto iam mense retentis rubeo-
 scabat, rulsiebat, anhelosa erat. Erasistratij phlebotomi-
 am prohibebāt, cum sanguinem tamen per hæmago-
 ga ad uterum duci permitteret. hac enim obstitit fru-
 stra prius in ea tentauerat. Mulier iugiter paulo post uae-
 se pulmonis cum tulle rupto dyspnœa perijt, cum illi
 præter inediam & aruum (*κρόνον*) uincula & hæmago-
 ganthū adhibuissent. 2. Historia aliorum, qui phle-
 botomia per eisdem eis prohibita perierunt: synanchi-
 cis, & cuiusdam ueruo tempore rubeſcētis capite ac ocu-
 lis. Item historia mulieris, quæ menſibus retentis in fe-
 brim continuam inciderat, naturæ autē impetu per na-
 res effluo sanguine liberata est. 3. Quomodo reprehē-
 dit Erasistratus: & quomodo illi Erasistratus auctori-
 tate se defenderint in libris suis phlebotomiā negligens,
 utpote qui ne in synanchicis quidē, aut sanguine ad
 pulmonem conuerſo retentis mēibus eam adhibuerit.
 Teuthras subiungit, eam ob causam synanchicum ui-
 rum, & mulierē cui sanguis ad pulmonem uertebatur,
 ineredita phlebotomia occisos: & ab Erasistratus multos
 alios similiter. 4. Quod liber hic in Teuthrantis
 cuius & condiscipuli sui gratiam miniſtro eius ita dicta
 rūs sit, ut in publica diſputatione ab eo pronōtiatur e-
 rat: quod Erasistratij inde perſuaſi, nimis etiā prom-
 pti deinceps ad phlebotomiā facti ſint. Modum igitur
 præſcribit, neq̄ omnino phlebotomia abſtinendum eſ-
 ſe: neq̄ omnibus eam adhibendam, quibus inedia Era-
 ſtratus imperat. Quo autem in dicio, quibusq̄ ſco-
 pis obſeruatis uſurpari debeat, poſtea dicitur. 5. Cō-
 tra quosdam, qui & Erasistratum phlebotomia uſum
 aiunt: Aequipollere enim inedia phlebotomiæ: & quæ-
 cunq̄ de illa ſcripſit, de hac etiā intelligi debere, eamq̄
 in pluriſq̄ morbis adhibitam eſſe ab Erasistrato, quam
 quam uerbis non expreſſit, tanquam per ſe intelligi
 poſſit eius adhibito. Cōtra hos Galenus, quod Era-
 ſtratus omnino ſectio uenæ abſtinuerit, Chryſippū
 Gnidium ſecutus, & Serato ipſum: item Ariſtogenes &
 Medius. 6. Inſani eſt Erasistratum putare inedia pro-
 pretea uſurpaſſe, ut uenas euacuaret, tãquam inedia &
 phlebotomia æquipollant: ideoq̄ ubiq̄cunq̄ ille inedia
 conſuluit, iſis ſanguinem detrachere uelle. Opus eſt igitur
 certis indicationibus quibus diſtinguatur, quādo
 inedia potius aut phlebotomia utendum ſit. Si putareſt
 Erasistratus phlebotomiā inedia æquiuale- re, uſus illa
 eſſet, et inedia propter multa eius incōmoda reliquiſ-
 ſet. At conſtat eum contraſtium feciſſe, ut non æquiuale-
 ſſent, ſed omnino abſticiendam phlebotomiam puta-
 rit. 7. Quod Erasistratus uenam omnino non ſecue-
 rit, uerbis illius teſtaſ citatis ex primo lib. *Διακριτικῶν*,
 quæ conſtitit hitoriam ancillæ Chiræ (cuius mentio-
 nem ſupra fecit cap. 3.) cui curādæ Erasistratus ipſe præ-
 ſuit. Non inediam, ſed phlebotomiam, & omnia inedia
 contraria menſes promouere. Inedia ſiſtit meſes:
 phlebotomia, poplitis præſertim, ducit: Et quod noxia
 ſit cum phlebotomia iuncta inedia. Aqua frigida.
 8. De Critone ex plethora ſynanchico (cuius etiam
 ſupra memini cap. 3.) uerba Erasistrati. Videtur enim
 & illius omniſa phlebotomia mortis cauſa fuiſſe. 9. De
 eodem: Non credendum eſſe Erasistratū in curatione
 Critonis phlebotomiam adhibuiſſe, in narratione au-
 tem omiſiſſe, tanquam per ſe laſis manifeſtum futurum
 eſſet plethoram euacuandam eſſe. Nam ut hoc manife-
 ſtum ſit, diſtinctione tamen indiget in omni euacuatio-
 ne, quando euacuandam, qua menſura, quo loco, quo
 modo, quocies, qua materia. etc. Sic in alijs minoribus,
 imō cibus quoq̄, diſtinctiones aliqua à bonis medicis
 adduntur: Sic etiam in phlebotomia: ut non ſatis ſit in

A genere adhibendam eam intelligere, niſi cum prædictis
 circumſtantijs. Et quod non ſit uerifimile Erasistratum
 omiſiſſe ſaltē nomine de phlebotomia admonere, ſi eam
 probaſſet, qui reliqua parui momenti remedia diligen-
 ter & prolixè ubiq̄ enumeret. 10. De menſura phle-
 botomiæ. Quæ uenæ ſecundæ ſint multum referre, &
 exprimendum eſſe. Concluſio & anacephalæoſis di-
 ſtorum: Erasistratum, qui circūſtantias & ſcopos phle-
 botomiæ nullos prorsus expreſſerit, & ne ipſam quidē
 niſi ſemel obiter nominauerit, ipſam ſimpliciter non ap-
 probaſſe exiſtimandum eſſe. Contra Erasistratus, &
 eius ſcripta non legerint. 11. Quod ubi Erasistratus
 inediam præcepit, in iſis omnibus phlebotomia conue-
 niat. Et quod minus plerūq̄ peccauerit, qui omnino
 abſtinuerit incidiſſe uenæ, ut Erasistratij ueteres: quā
 qui temere & ſine prædictis diſtinctionibus uenam inci-
 dunt, ut iuniores Erasistratij. Et quod Erasistratus
 phlebotomia uſus non ſit, neq̄ eodem tempore phlebo-
 tomia & inedia cōueniant. 12. Quæ Erasistratus ſcri-
 pſit de ſanguinis educiōe eſt thorace, cōmuni eſſe phle-
 gmonis omnibus, & febribus etiam præſertim cū phle-
 gmonis: nempe, neq̄ cibum in eis tuto dari, neq̄ inedia
 unā cū phlebotomia fieri. inde enim morbus augetur,
 hinc uires ſoluuntur. Et q̄ phlebotomiam Erasistratus
 in ſanguinis educiōne ſeu ſputo citius admiſſurus
 uideatur ex eis quæ ſcribit, quā in febricitantibus:
 Cū tamen uena rupta in ſanguinis ſputo uel ante phle-
 gmonem, ſanguine præſertim detracto, ſedari queat &
 glutinari, ſimiliter ut in uulneribus & icibus: in febrili-
 bus autem ſemper pars aliqua iam inflammata ſit. Era-
 ſtratorum in conferendo & diſputando imperitia &
 ſtultitia. Erasistratum phlebotomia non uſum.

13. Erasistrati uerba expendiſſa, quorum hic ſenſus eſt:
 Sanguinem eſt thorace reddentes non euacuandos, id eſt
 ſanguinem eis non derahendum: quoniam paulo poſt,
 inflammatione ſcilicet oborta, inedia eis adhibenda ſit.
 Hæc ille: Quafi ante inflammationē, ut illam prohibea-
 mus, phlebotomia uti non liceat. Repetitur & alia ſæ-
 piſime dicta, contra dicentes Erasistratum phlebotomi-
 am uſum. 14. Quod uincula ſola non ſufficiāt ad ſan-
 guinis copiam auocandam, præſertim in plethoricis,
 in quibus brachia, manus, & crura uinculorum uſu ri-
 tantur, & tenduntur magis. Ex Erasistrati uerbis te-
 ſtimonium. q̄ ne in plethoricis quidem conſuluerit aut
 admiſerit phlebotomiam, ſed alia quædam remedia.

Alia Erasistrati uerba de plethora in diuerſis corpo-
 ris partibus eiusq̄ remedijs, ubi phlebotomiæ nuſquam
 meminit, immo ne frictionis quidem, ſed exercitiorum
 & balneorum. 15. Memorabiles uſus frictionis. Inedia
 q̄ epilepſiam promoueat iſis, quibus febtilis eſt ſto-
 machus, & hitoria Didorii. Exemplū plethoricis pe-
 riclitantis imminente epilepſia, qui propter ſtomachū
 debilem non poſſit inediam terre, frictionibus gymn-
 ſiſtis etiam non aſſueti etc. Quod talis nullo quā per
 phlebotomiam modo curari poſſit. Quod Erasistratus
 Chryſippum æmulatur, non phlebotomiam mo-
 do, ſed fortes etiam purgationes nuquam uſurpauerit.

16. Alia Erasistrati uerba, quibus probat q̄ ne illis
 quidem uenam incidit, qui ob ſanguinis aliquid ex-
 cecionem reterant male habebant: Et quod in omni-
 bus libris, ubi phlebotomia opus erat, inedia conſu-
 luerit. Quod minus peccauerit quā ſui temporis
 Erasistratij, qui ubiq̄q̄ Erasistratus inediam conſulue-
 rat, phlebotomia utebantur. Argumentum ſequen-
 tis libri. Scopi phlebotomiæ: Et quod neque pletho-
 ricis omnibus incidenda uena ſit, & incidenda quibus-
 dam non plethoricis.

CL. GALENI DE VENAE SECTIONE ADVERSUS ERASISTRATAEOS QUI ROMAE DEGEbant, LIBER.

Iosepho Tectandro Cracouiensi interprete.

CAPVT PRIMVM



VM Romam initio uenisset, incidi in medicos quosdam, qui à uenae sectione tanto perre abhorrebant, ut cum aliquando aeger quispian propter plenitudinem iam praefocaretur, ne tum quidē hoc auxilio uti uellent. Praeterea mulierculam quandam, quae uiginti uniusque annorum aetatem agebat, ac ex menstruae purgationis retentione faciem rubicundam obtinebat, tussiebatque paululum, & difficulter spirabat, illi curare adorti, primum quidem membra illius laneis uinculis leniter deligabant, & in inedia degere iubebant, uenam autem secare nolabant, nosque id facere uolentes, prohibebant. Quia uero domesticis ipsius mulieris familiariter utebantur, & aetate me erant multo superiores, facile ipsi est habita fides. Ego quidem illis uenae sectionem tum temporis suadere non constitueram, interrogauit tamen num mihi per eos liceret sanguinem ad uias uteri, remedijs quae hoc efficere possent, prouocare: quod cum illi concederent, sileo adij familiarem ipsius aegrotae obstetricem, quam & exhortatus sum, ut usum illorum experiretur: Verum illa remedijs huiusmodi, tempore quo factum id oportebat, usam fuisse se affirmabat, quando scilicet menstrua purgatio futura in expectatione erat, recitabatque remedia ordine, quae mulieri obtulisset, & haec quidem commoda alioqui erant, eamque obrem quo minus efficaciam fuissent, nequaquam illorum imbecillitate factum esse uidebatur. Postquam igitur ego ita percepissem, simulque à retentione sanguinis quartum iam mensē praeterisse animaduertentem, denuo cum medicis illis congressus, ut ad uenae sectionem sese conuerterent, persuadere eis conabar. Cum autem id facere noluisset, illorum animum demorabar, maximeque quia eniterentur, ut omni conatu apertis circa uterum uenis quamplurimis sanguinem superfluum illinc euacuarent: si uero alia quaequam uena secaretur, perniciosam ex eo euacuationē euenturam arbitrarentur. At his respondens, quod uel absque talis auxilij praesentia sanguis exuperans, sola inedia euacuari possit, taciturnus discedebam, nihil bonae spei de muliere propter tussim ac spirandi difficultatem concipiens. Aut enim rupto uase ipsam ex thorace pulmone uel sanguinem spuito eiecerunt, aut angina, uel laterali inflammatione, uel peripneumonia correptam iri praemeditabar, optabamque uotis omnibus, ueluti in delectu malorum fieri contingit,

Aut mulier laterali saltem inflammatione laboraret, Incuriebat quippe mihi terrorem, tum uehementia periculi quod ex angina peripneumoniaque subitura esset, tum ex ruptione uasis in pulmone le tale no commentū, id quod postea ipsa est subsecutū. Dum enim illa uehementius tussiret, sanguis etiā unā extrorsum ferebat. Atqui iam uel uulgo non pauci medicos obiurgabant, quod illi mulierculae uenā incidere uetuissent, sperabatque omnino futurū, ut etiam si prius non fecerint, hoc tamen tempore uerecundia ducti, usum praefati auxiliij concederent. Caeterū cum hi neque tum quicquam commoueretur, sed potius uincula membrorum fortius adstringerent, iuberentque uterū remedijs irritare, ac mulierē inedia sustinere, ego & ob atque & celebre nomē uirorum, nihil me amplius profecturum credens, illinc discessi. Mulier quoque ipsa non ita multo tempore interiecto, insanabili spirationis difficultate coercita interijt.

2 Anginosi praeterea nonnulli ubi eis à uenae sectione interdictum esset, istorum opera perierunt quam celerrimē Fuit & alter quispian, qui ueris tempore quum per totam hyemem magnopere repletus, sine exercitijs degeret, ac totam faciem unā cum ipsis oculis adeo rubicundam habere, quemadmodū si quis pronus capite in terrā delixo, cruribusque in altū protensis, sub huiusmodi figura perseueret, quinto tandem die preanhelitus difficultate suffocatus est. Hos etiā incutata est mulier, numero quarta, quā illi uenae sectionis hostes, retentione menstruae purgationis non pauco tempore grauata, eodem pacto ad interitum ferē pertraxerant. Nam primis tribus diebus ipsam in inedia conseruabant, febris enim continua laborabat, Quarta uero luce paxillū quid sorbitionis exhibentes, quintā sine cibis transigere iusserūt, in qua illa grauissime exacerbata delirans profliebat, & clamore iam extra fores ab illa sublato, uix tandem ab his qui eō cōfluxerant, retineri potuit. Verum hāc natura copioso sanguine ex naribus, effuso seruaui, & dabatur occasio qua non sine admiratione discere poteramus, quantam habeat facultatem ad huiusmodi affectuum medelam ipsa sanguinis subtrahitio: mox enim post sanguinis e naribus ruptionem, mulier ab omnibus symptomatis libera euasit.

3 Ego uero, quāquam antea sermonem cum medicis instituere ueritus fueram, cōiectans quā illi pro non admittendo uenae sectionis usu diciturū fuissent, cum tamen omnes animaduertentem, mulierem manifestē ex sanguinis euacuatione letuatam esse, saltem mortuos illos ad memoriā eis reuocandos duxi, quibus si quis uenam secuisset,

forte fuissent & ipsi seruati, afferebamq; ad hæc rationes quasdam. Hi uero uerba uilro citroq; inuoluentes seipso implicabāt, nihilq; prorsus certi stantiebant, ac postremo ad Erasistratū confugiebāt, quem utpotē primo De resectione sanguinis libro dicebant declarasse, quod uincire ipsa membra, quā uenam secare longe præstaret. Aiebāt præterea illum in opere quod De febris inscripsit, uenæ sectionis neq; à principio meminisse, quum alio qui ea omnia recensuerit, quæ de sanguinis resectione indicauerat. Ridendus enim modis omnibus esset, si uenæ sectione in eo affectu qui ea maxime indigere uidebatur ommissa, de alijs uerbis facere non desistisset. Asserebant quoq; qd Erasistratus ipse nō solum in opere De febris, uerū & in reliquis tractatibus omnibus, nomē uenæ sectionis reticuerit; neq; etem uel in quo de affectibus alui tractat, uel in quo de uirium resolutionibus, uel ubi de podagricis morbis disserit, aut cum de salutaribus agit, uenæ sectionis auxilio usus est unquam, idq; cum ille in De salutaribus tractatu sanguinis multitudinem præcipuam morborū causam esse arbitratu sit. Porro ego ea que dicebant, iterum demiratus, illos de hac saltem re interrogabam, num prorsus uenæ sectione non utendum laboraret, uel cum quis pulmonis ulceratione laceraret, uel anginæ more præfocaretur, uel ubi mensura purgatione, hæmorrhoidibus uel suppressis sanguis redundans ad partes thoracis propelleretur. Illi autē ad hæc respondebāt, ægrotos qui ab Erasistrato in cōmentarijs De diuisionibus descripti fuerant, nobis in mediū adducentes, inter quos in primis Critonē quendā, ac puellam ex Chio ortundam proferebant. Et quod illū quidem à principio anginosi cruciatibus correptum, atq; uehementer repletum, hanc uero menstruis reuētis, sanguinisq; multitudine uero pulmonem impetu delato, Erasistratus (quem admodum ipsemet in scriptis testatur) per uenæ sectionem nunq; curasset. Ceterum cum illi hæc adhuc loquerentur, superueniens Theutras quispiā cinis & cōmisit meus, ut erat moribus plane ingenuis, nō flectes istos unquam, inquit, ut qui eoque stoliditatis processerint, ut et illos in memoria reuocent, qui Erasistrati opera interiere. Quid enim, inquit, aliud in causa esse potuit, quod illi, quos nobis isti proponūt, tam prope perierint, nisi quod in eis prætermisum sit uenæ sectionis auxilium? Cur item illi interierūt, qui nuper euacuati ab his prohibiti sunt? Et eos deinceps omnes unā cum ipsis affectibus quos percipi fuerāt, quorūq; ego non multo antea meminī, nominatim ordinēq; recensuit, ibiq; in cachinum effusus manū me comprehendit, attrahensq; inuitum à medicis abduxit.

4 Quinetiam in sequēti die Erasistrati De diuisionibus commentaria in publicum producta coram uniuerso philosophorum cœtu relegabat, partim ut indicaret Erasistrati culpa, & Critonem & puellam illam Chinsensem perisse: partim uero, ut medicos natu grandiores ad colloquiū pro-

uocaret; uerum illi quia decertare cum adulescente infra dignitatem suam putabant, tum non cōparuerunt. mos enim illo tēpore erat, ut aliquis quotidie palam ad publicas quæstiones responsa daret. Quæsitum ergo à quopiam fuerat, num Erasistratus rectē fecerit, quod uenæ sectione nunquā sit usus. Hoc problema quando ita uisum erat ijs qui eō audiendi causa conuenerant, ego explicauī, propterea qd Teuthras hortabam me, ut ea quæ illic locutus fuissē, puero quem se ad me missurum receperat, dictare nō grauarer; quia uero breui in Ioniam abnauigaturus erat, ardentiorēq; animo uelle se ea prorsus habere dicebat, ego itaque amici consilij acquiescens, sermonem illum scriptis mandauī. Porro accidit ut liber per illum passim diuulgatus, per multorum manus præter sententiam meā uagaretur; atqui oratio familiari doctrinā magis quam publico cuiquam operi quadrans contexta eraticus enim ille, ut præfatus sum, eam dictari tantum cupiebat. Quamquam autem liber tam humili stylo conscriptus esset, multisq; defectibus respectu perfectæ orationis scateret, tamen eo ipso ille multo maiora effecisse uidebatur, quā sperare quis potuisset; omnes etenim hi qui sese hoc tempore Erasistratæos uocāt, contrariam priori rationem in euntes, iam inde uenam secare consulunt, nō solum cunctis his quos paulo antea commemorauī, uerum etiam quatuor febre correptis. Quapropter iuxta Stesichori factum, arbitror me illis palinodiam aliquam debere, in qua tamen eos eum primis admonēdos censeo, ut in sermonum commercio quantumcūque uelint, contentiose se gerant, deposita tamen in utranque partem propensionis temeritate, ægrotis parcere discant; neque enim uenæ sectio inhibenda est per omnia, neq; rursus illos quibus Erasistratus in eadē iniungit, omnes (id quod huius temporis Erasistratæi uniuersi afferunt) uenæ sectione egere arbitrandum est. Huc accedit, quod non facile cognitu sit, quibus omnibus huius auxiliij usus conferat: tum uel mensura, uel uena quæ secari debet, uel sectionis tempus non fine negotio reperiat: propterea qd illam in quouis morbo Erasistratum puto adeo neglexisse, ut & in his qui eam magnopere requirere uidebantur, ille ipsa uitā uetuerit.

5 Atqui per inflātionis tempus in inedia, ut aiunt illi, ægrotos degere iubens, hæc ad uerbū scribit. Venæ etem posteaq; euacuatae fuerint, sanguinem qui in arterias insiliit, facile suscipient: quod ubi cōiugerit, inflātionis minus accidit.

Si ergo inedia, inquit illi, uelut euacuationū auxiliū præcipit, multo sanè cōmodius ad uenæ sectionē sese contulisset: & quod quidem ipse, ubi celeriter euacuare cupit, multo cōmodius ad uenæ sectionem transisset; probē illi dicunt, nihilominus tamen hoc loco scopos qui illius usum aliquando impediunt, prætermiserunt: sed hos ego processu sermonis recēdere conabor. Queritur uero non quid absolute factu præstantius sit, uerum an Erasistratus præsidium hoc aliquando usurpasse re-

se reperitur. Hoc autem quum ego Romam primum appulsem, omnes qui ex Erasistrati discipulis erant, antea negabāt, nunc vero probatissimi quos ego noui, ab his tanq̄ in re minima discrepare manifeste animaduertunt. Ut em̄ ceteros præteream, Stratonem ipsum tibi in memoriam redigā, qui Erasistrato erat summa necessitudine iunctus, ac eam ob rem cum in ædibus illius scriberet, seruiuisse illi dictus est, inter alia hæc scribit:

Erasistratus iure optimo laudibus extollendus est, præcipueq̄ quod ea omnia quæ ueteres per uenæ sectionem curare conati sunt, ille citra illius usum medicatus est. Quanquam uel Strato ipse, curandi rationes se absq̄ uenæ sectione instituisse in commentarijs suis aperte fatetur. Neq̄ uero mirū est, quod Erasistratus Chrysiippum Cnidium in omnibus sequat̄, quippe qui præfatus fuerit, se plane id quod ille facit, uenæ sectionem nunquā approbaturum. Idem quoq̄ & Aristogenes & Medius, cæteriq̄ omnes qui Chrysiippi sententiæ sub scribunt, fecisse uidentur.

6 Quantum melius ad ægrotantium salutem at tinet, multo magis est, si credamus quod Erasistratus usus sit uenæ sectione: quantum autem ad huius seculi Erasistratæos, id non credere longè præstiterit. Extremæ enim dementiæ esset, si quis Erasistratū ea propter in affectibus paulo ante enumeratis, uenæ sectionem silentio præterisse putaret, quia ille uenas euacuandas censet, huncq̄ totius curationis scopum habeat. Nam qui hoc crediderit, in quibus nam affectibus Erasistratū inedia consulere comperit, namq̄ aperte constat istud euenire his qui uenæ sectionis auxilium, parē ipsi inedijs facultatem obtinere dicunt. Quod si tantumdem non ualeat, & quasdam diuisiones necessario postulet (quas inuestigare poterit is qui exacte perdiderit, quādo ipsam euacuationem uel per uenæ sectionē, uel per inediā solam, uel per utraq̄ commodius facere liceat) iam euidenter ratio eos cōuincit. Scripsisset etenim Erasistratus diuisiones has, si modo, ut isti uolunt, uenæ sectioni tribuendum quicquā partasset: eoq̄ pacto oratio istorum in utraq̄que uiam inclinando se ipsam prodit. Si namq̄ hæc eadem facultate pollet, Erasistratus & in tractatu De febribus, & in alijs plerisq̄ quorum superius commemorā, de uenæ sectione aliquid scribere, non temere posthabuit. Si uero uenæ sectionis præsidium eandem cum inedia dignitatem non obtinet, non recte illi sentiunt, qui nos ex his quæ de inedia scripta sunt, de uenæ sectione quoq̄ cōiecturā facere debere aiūt. Quanquam & in hac parte sermo ipsorum inediā inutile esse indicans, seipsū denuo implicat. Nam si ob id inedias probamus, quod uenis per eas euacuatīs affectus minui cōtingat, multo hercle commodius fuerit, ut euacuationē semel adhibita, ab inedijs abstinemus, ut quæ & ægros ingenti molestia afficere soleat, & uigilias ac inquietudinem, orificijq̄ uentris afflictionem, tum succorum corruptionem, necnon alui atque interdū urinae suppressionem inferant.

7 Quod autem Erasistratus re ipsa uenæ sectione nunquā sit usus, ex ægrotis quos in commentarijs De diuisione recentuit, manifeste colligere licet: in his em̄ cum omnia ea explicet, quæ in ter medicadum unquam gessisset, uenæ sectionis nullibi reperitur commemorasse. Cæterū quum prolixum sit, omnes per illum recitatos ægros nunc proferre, sufficit eorū tantum recordari, qui uel à grandioribus natu medicis, ut antea declaratum est, adhuc in memoria habentur, præcipueq̄ cum unus ex illis in priore, alter item in posteriore Diuisionum libro descriptus sit. Præterea com moda occasio est, ut in præfatiarū uerba ipsa adscribamus, quibus Erasistratus cūcta quæ circa ægros acta sunt, ordine enumerat, in hunc modū in libro priore describens: Puellulæ Chienis ea acciderunt: primū quidem illi purgatione longo tempore suppressa fuerāt, deinde subsecuta sunt tussicula, unā cū reiectione pituitæ. Processu uero tēporis & sanguinis reiectione superuenit. Tum quod ad circuitū purgationis attinet, interdū ille in quatuor, interdū duobus mensib. redibāt. Eūdem ferme diebus quibus purgationes fiebant, ipsa reiectione accidere solebat, diebusq̄ tribus aut quatuor perdurabat. Quapropter inde perspicuū erat illam id genus excretionem loco purgationis sortitā fuisse: nam & febricula ijs ipsi diebus infecta fuerat, quæ post hæc emendabatur. Hæc Erasistratus præfatus, deinceps de remedijs hoc pacto scribit: Primis autem temporibus ipsa potioni bus cæterisq̄ calfactorijs, deinde etiā per subditios uteri pessos, reliquaq̄ adeo quæ ad hoc quadrabat uictus rationē curari octepa est. Eratem circa uictus nos non intensā durities. Verum cum remedia nihil omnino promouerent, ac uno perpetuo circuitu grauitas in lumbos incumberet, humiditasq̄ nulla cōpareret, ilico febres continuæ, intensioresq̄ prioribus exorta sunt, quas & tussis uehementes, postq̄ corpus iam mollius factum esset, insecta sunt. Proinde periculosum arbitrii durantibus adhuc febribus purgationes facere, à medicamentis circa uterū penitus abstinuimus: reliquis uero remedijs usi sumus, quemadmodū & in huiusmodi & in alijs affectibus conseruimus. Præterea ad medendi rationem ipso purgationū circuitu obseruato, cibaria subtrahebamus, eaq̄ ratione reiectione sanguinis nō amplius quam semel eademq̄ pauxilla superuenit. Et tamen nihil loquebatur. Quinetiam purulenta reiectiones profluebant. Atqui hic de uenæ sectione mentio nulla est, cum tamen, prout omnes operum ipsius artis periti norūt, principium auxiliorum ab illa fecisse oportebat. Sed fortasse quis ex illorum numero qui ad omnia non grauantur promere spondere, defensusus Erasistratum dicet, quod remedia huiuscemodi per illum administrata non sint, uerum potius ab eo ea gratia nunc prodita esse, quod nos nihil eorum latere possit, quæ acta essent. Ad opinionem istorum redarguit id quod inferitur, dum hæc ait. Proinde periculosum arbitrii durātib. adhuc febribus purgationes facere,

re, à medicamentis circa uterum penitus abstinui mus: reliquis uero remedijs usi sumus, quæ admodum & in huiusmodi & in alijs affectibus cõsueuimus. Præterea ad medendi rationē ipso purgationū circuitu obseruato, cibaria subtrahēbamus. In his em Erasistratus aperte indicat se nō aliorū medendi rationē recitare, sed suā ipsius enumerare, atq; omnia quæ circa ægotam fecisset perferibere. Nam & abstinuiuius & arbitrati nec non usi sumus ac obseruato & subtrahēbamus cibaria alterum ex duobus manifeste declarat, aut q; Erasistratus propria remedia recitauerit, aut ea quibus alij usi sunt, ipse fuerit amplexus. Porro si ea amplexus est, quorum alij autores fuerūt, iam nobis euidenti coniectura colligere licebit, quid ille de uenæ sectione senserit. Per ipsam em ciborum subtractionem rursus nobis alterum duorum insinuat, aut quod illi in totum subtrahi, aut diminui debeant, id quod Erasistratus se in muliercula hac egrotā, quo tempore purgationis circuitus aduentabat, fecisse fatetur. Conueniunt ergo hæc in hac re cum omnibus scriptis illius, quod ille solam inediā ægotis seruandam consuluerit, uenæq; sectione nullo in loco sit usus. Nisi rursus hic aliqui dicant, mulieri illi uenā quidem sectam fuisse, uerum id auxiliū in enarratione omisissum esse, eo quod nō ipsi id adhibitum esse aut mare possimus, quāuis per illum non sit declaratū. Cur ergo de inediā quoq; non reticuit, cum de illa uel eadem ratione nobis suspicari licebat? Eadem autem ratio est, tum de potionibus, tum de calfactio- nis, deq; ijs quæ uero applicata sunt. Si enim neque de his penitus Erasistratus quicquā scripsisset, tamen omnino quod ea à medicis peracta fuissent, cogitare poteramus: quippe qui animo cõceperimus uniuersis auxilijs illud commune esse quod illa administrata fuerint, quamuis de eis nihil præscribatur. At Erasistratus exquisitæ perspicuitatis gratia omnia simul enarrare cõstituit, ne scilicet nata inde occasione aliquis, hæc quidem tanquam ægrotæ adhibita fuissent, adijcere possent: illa uero uel iam prætermissa, subtraheret. Præterea quoq; hæc Erasistrati enarratio, opinio nisi illorum euidenter repugnat. Si enim muliercula uenæ sectionem subiit, inediā frustra est usurpata, quin potius si ueritas fatenda est, non frustra solum, uerum etiam non sine noxa. Sed istud paulo post indicabimus: nunc uero illam frustra accersitam esse, ut explicemus, oratio ipsa postulat. Postquam enim per tempus purgationis quæ circuitu quodam fieri solebat, sanguine ad superna perlato periculū immineret, ne mulier quādoq; sanguinem expueret, Erasistratus plenitudinem minuerere cupiens, ad inediā se cõtulit: at qui hæc super uacanea plane est, si modo uenæ sectio qua momento temporis sanguinem superfluū euacuare facillimum fuerat, accersatur. Proinde illi qui Romæ mulieribus medebantur, rei quæ contigerat experientia maxime cõmoti, tempore quo eruptio mensuorum futura expectabatur, uenæ sectionem usurpabant. Neque uero quietem illis impe-

A pabant, neque ieiunium, sed aquam mulsam offerrebant, uictuq; humectante, ac lauacris affatim uti concedebant. ab his enim si uel mediocri quantitate sanguis fuerit subtractus, purgationes cõfestim exoriri solent, præsertimq; si infra poplitē, aut prope talum uenæ sectio fiat. Sed e diuerso si quis uenā sectā inediā sustinere imperauerit, non solum menses prius fluentes cohibebit, uerum etiam purgationes quæ iam inculpate euacuabantur, reprimet. Sanguis namque ciborum inopia arefit, & densior seipso redditur, eamq; ob rem ad fluendum ineptus euadit. Quæ igitur tum lotæ fuerint, & aquam mulsam, & cibos idoneos assumpserint, ac uinum neque austerum, neque crassum biberint, his purgationes proculdubio contingent, ob idq; ego inediā post uenæ sectionem non frustra tantum, uerum etiam non sine noxa assumi dicebam. Caterum uenæ sectionem puellæ illi Chienli non adhibitam fuisse etiam ex his quæ superuenerant, patet. Sanguinis enim aliquid quantum expuebat, quem nequaquam expulset, si euacuationem experta fuisset: demum cum præspirandi difficultate mortua sit, ne hoc quidem sic perpessa fuisset. Maximum præterea experimentum Romæ nostra tempestate à uenæ sectione est sumptum. Contigit enim quum uulgo mulieres aquam frigidissimam ex niue potarent, ut aut nullo pacto, aut proflus diminute purgarentur, has tamen medici uenæ sectione adeo incolumes conseruauerunt, ut neque sanguinem spuerent, neque laterali inflammatione, aut pulmonis, aut angina caperentur. Non ergo puellam illam Chiensem ab Erasistrato per uenæ sectionem curatam fuisse suspicentur. neque enim ipse quum alia quæuis enarraret, auxiliū uenæ sectionis, tanquam rem parui momenti prætermisisset, ob inediā, neq; hæc autem multitudinē sanguinis præfocata interisisset. Sed de hac in præsentiarum ista dixisse sufficiat.

B
C
D
8 Translato uero ad Critonem sermone, nar rationem per uerba Erasistrati adscribemus, quæ de illius affectibus fecit, sic enim habent: Critoni quidem repletio, initium ægritudinis fuit. Accessit ad hæc quod in plenitudinem anginofam iam inciderat, quæ sanè nihil aliud est quam tonsillarum liguleq; inflammatio. Plerumq; ergo contingit, ut qui in eam inciderint, suffocentur, ac nisi celerrime illis succurratur, breui intereāt. Cum autem Crito quoque in horum numero esset, prima quidem die illum more consueto spongij calfacientes medicati sumus, eoq; tempore cataplasmata illi applicata reliquimus, ut in curatione perpetuo essent. Exhibita etiam ei sunt catapotia ex castoreo ad aluum ciendam, quæ his commode subducta est. Neminem non animaduertere arbitror diligentem narrationis omnium eorum quæ circa Critonem acta sunt. Nam & calfactionem per spongas factam, & usum cataplasmatum, & carapotiorum retulit, adeoq; quod per spongas calefactus sit, manifeste declarauit, ac reliqua ut ordine gesta erant, studiose enumerauit. De ue-

nae autem sectione ex composito siluit, nempe quod auxilium istud ceteris uilius putauerit. At tenuia illa quae in his enarrationibus continentur, commemorare mihi nunc integrum non est: quamquam Erasistratus ipse rursus paulo post ait: Apparebat itaque nobis quod affectus ipsi ad pulmonem hepatis permutari incepissent, et angina iam illuc desuere, eoque febris auergeretur. Hoc loco affectuum permutationem sine hypochondriorum tensione factam esse arbitratus est, ubi quam diligentissime animaduertendum censeo, considerandumque quale illud sit, quod tibi in dictione hac occurrit, qua affectus permutari incepisse ait: num scilicet id ad partes quae inflammantur, permutatas pertineat, an ad sanguinis, qui inflammationem concitauit, transfusum. Mihi liquidum primum ex praedictis non cogitari quidem posse uideretur, alterum autem illorum uerum esse constat: nam & ego multitudinem in aliquam partem decumbentem saepius cohibui, quam illa propria uirtute deinceps in aliam quamuis repellendo transposuit. Istud ergo Critoni corrigillis apparet, ueruntamen neque tum temporis Erasistratus uenae sectionis unquam meminuit. Sed quid ait? totum thoracem unam cum hypochondrijs ipsis, cataplasmatibus tegebatur? Quemadmodum autem ex partibus quae circa ligulam & tonsillas sunt, sanguinis exuperantem permutatio ad loca inferiora fiebat, ita quoque illo ex inferioribus ad caput sursum perlato, contingebat partim febris non leuari, partim aggenerari symptoma, quo principium neruorum affectum esse indicabatur. Audi itaque & hanc Erasistrati sententiam: Cum autem ab aegritudinis principio iam decimum dies adesset, ac ab augmento sextus, quo tum febris uehementi insultu rediit, tum uersio ceruicis accidit, & sub uesperam tanta insensibilitas hominem inuasit, ut & lotium per stratum emitteret: non multo quoque postea augmentum febris aderat. Deinceps inferens ait: Videbatur itaque nobis quod affectus rursus uersus caput permutari incepissent, ac circa hanc permutationem febris rediisset, quae postea cum iam partes capiti uicinae afficerentur, intensa permanebat. Atqui uel nos aduersus hominem sequenti sermone insurgamus. Rectissime tu quidem Erasistrate dicis, affectuum permutationem ad caput factam esse inquis: multo uero melius fuerat, si non affectuum, uerum plenitudinis affectum causam, dixisses: ut enim corporis affectus partes permutari incepisse nemo dicere possit, ita neque ipsos affectus. Arbitror enim quod multo consultius diceret, quae uis quidem priores affectus, alios uero causa permutata exortos esse, quae in principio totius narrationis eadem ratione qua & repletio ipsa aderat, quam si ipse euacuasset, neque unquam inflammatio tonsillarum circa ligulam, permutationem ad infernas partes molita fuisset, neque e diuerso eadem illinc uersus caput ferri potuissent. Quapropter Critonem hunc eodem pacto quo & ancillula Chiesis interierat,

A quia illi uena secta non fuisset, mortuum esse constat. Sed istud quoque Erasistratus ipse pensasse animaduertitur: neque enim aliam ob causam ait, quod huic interitus causa fuerint ea quae ad pulmonem delabebantur, & quamquam statim ab initio hominem plethorico affectu implicitum esse cognouisset, tamen maximo ductus errore, haec euacuare non praeuenit.

Si igitur adstruere quisquam uelit, Erasistratum, quod & peritissimus medicus esset, & affectus illos tum Critoni ex repletionem, tum puella Chiesi ob menstruorum retentionem contigisse compertum haberet, subtractionem sanguinis nequaquam praetermisisse, quin potius utriusque sanguinem subduxisset, uerum id in enarratione consulto praetermisisse: quid uetat & me dicere, qualecunque illud ex euacuatorijs remedijs sit, applicatum quidem aegrotis id esse, in enarratione nihilominus non esse recitatum? Ecquis enim sanae mentis medicus ferre me posset, si haec dicerem? quum sanae symptomata illa usque ad mortem apparebant, propter plenitudinem illis accidisse, interitum item ipsum non alia de causa insectum, nisi quod plenitudo euacuata non fuisset? Quis etiam ferret istos qui dicunt, quod ex his quae Erasistratus egisset, minuta tantum perscripserat de uene sectione, eaque quae per elleboroscam moniamite sit purgatione, quia haec auxilia per se clara sint, nullam mentionem fecerit? Atqui si quis sola communi sententia, qua repletionem euacuandam esse indicatur, uenae sectionem significari asserat, ut quae etiam inter euacuatoria remedia annumeretur, quid inhibet eadem lege, alia cuncta euacuatoria praesidia intelligi? Ne ergo amplius ab Erasistrato solam uenae sectionem aegrotis adhibitam esse dicant, uerum reliqua quoque cuncta, clysteres, uomitiones, purgationes, lauacra, exercitia, frictions, rigationes, inunctiones, calfactoria cataplasmata, ceteraque id genus, quibus omnibus ille aliquando uti potuerat. Si uero non hoc solum sufficit, quod euacuandus eger sit, neque istorum auxiliorum doctrinae is finis existit, sed in primis modum euacuationis adhibere, posteaque quibus rebus haec adamussim indagetur de clarare, ac his occasione & mensuram & utendi rationem addere opus sit: se quitur sane quod qui saltem de scopo auxiliorum communi uerba fecerit, is nondum nulla ex parte auxilium meminisse potuit. Si enim commune quid protulisse suffecerit, frustra ille cataplasmatum, inediae, calfactoris quoque per spongias factae mentionem habuit: siquidem uero neque cataplasmata, neque inedia, nisi ab eo didicerimus, nostra opera inuenire possumus: uenae autem sectio, Erasistrato quoque tacente, unicuique manifesta est: Sed quamuis illis istud quis concefferit, absurdum cum sit, tamen ei qui auxilio hoc comode utitur est, multum etiamnum, eademque praegrandes considerationes supererunt. Inter has autem prima est, an, quemadmodum aliqui sentiunt, quamlibet uenam semper fecare nihil differat, aut prohibet in

singulis affectis partibus contineantur, quæ ipsarum plenitudinẽ quam celerrime euacuare possint. Secunda uerò, utrum semel aut sæpius subtrahere cõueniat. Tertia item, qua ratione in his intentiones inuestigandæ sint, quas ubi quis exquisitè considerauerit, mensuram euacuationis coniectura assequi possit. Quarta, in qua de occasione ad quam in primis uenæ sectio fienda est, num scilicet ea eligibilis sit, per demonstrationem docetur. Qui igitur à uenæ sectione profusus abstinet, apud hunc harum rerum omnium consideratio perit, è mediõq; tollitur: eam autem adhibenti, ut omnia ista sequantur, necesse est. Quamquam & in reliquis omnibus præsidijs eadem est ratio, ueluti uenari, scammõnij, uini, lauacrorum, cibiq;. Si enim in ægrotis curandis aliquo dicitur nobis uti nequaquam cõceditur, tum neq; occasio amplius, neque quantitas, neq; utendi modus, neque quicquam aliud ad inuestigandum reliquum fiet. At ille qui usum istorum probat, hæc omnia discute necesse habet, idq; non solum in efficacibus auxilijs, in quibus si uel parui momenti quid prætermittatur, cõfestim maxima noxa ægrotis imminet, uerum etiam in minimis quibusque; saneq; ita quotidie euenire uidemus. Proinde si quis medicus homini ægrotò gratificaturus auxilium aliquod describit, is neq; omittit occasionem qua nutrire ipsum iubet, neque cibum facultatesq; ipsius non determinat, neque uel facultatem uel parandi modum, uel utendi ordinem reticet, quin potius unum quodque horum illis qui tum ibi adsunt, quo pacto id fieri debeat, singulatim explicat. Quin etiam plerique in libris passim describitur ex ordine, quomodo omnia hæc administrari soleant, quorum nonnulli, quibus alioqui prolixitas sermonum cordi non est, in huiusmodi enarratione orationem protrahunt, idq; genus disciplinæ non multiloquium, uerum diligentem solertiam esse putant. Hippocrates etiam cum in plurimis suis operibus breuitati summopere studeret, tamen quod ad uenæ sectionem attinet, non est grauatus scribere, tum partem corporis in qua uas secari oporteat, tum euacuationis mensuram, unà cum occasione ipsa. Erasistratus autem, quem asseclæ sui uenæ sectione usum fuisse prædicant, multiloquus fuerit licet, tamen ut ego paulo post indicauero, principio uenæ sectionis nomen alijs præsidijs ne describere quidem dignatus est: deinde etiam omnia quæ iam recitata sunt, utpote tempus, mensuram, uasis situm, utendiq; rationem prætermisit. Econtra uerò qua ratione & maza subacta, & cataplasmata ægrotò offerenda sint, perscribere non est ueritus: immo neque olerum decoquendi modum silentio prætereundum putauit. Audi itaq; quæ ille in opere De alij curatione scribat: Prima quidem adiectione farina crassiuscula, tosta ac probe cribrata offerenda est. Cum autem illam offerre uolueris, in uasculo aliquo frigido infusam ac aquæ commistam exhibeto, non una uice uniuersum id quod daturus es,

Galen.

A uerum bis aut ter commiscens, ne maza arida effeeta ac solutioni inepta, multum humiditatis suscipiat, nullum enim horum cõfert. Ad edendum uerò danda sunt affatim cichoria in aceto nõ acriminosa, ac inter cibos cõsumenda, eadem cichoria cocta. Coquere uerò oportet duas ollas preparando, & in prima quidem iniecta illa decoquere oportet. Postquam autem probe admodum cocta fuerint, ac in altera olla aqua iã bullierit, transponere ipsa in eam conuenit: uerum cichoria reuincta sint, ut facile quouis transferri possint. At ubi ad perfectum cocta erunt, tum aqua effusa, sale oleoq; condienda sunt, exhibendaq; ut edant. Num ergo putas quicquã adhuc scribi posset curiosius, ab hoc præsertim qui ad eõ tenuitã considerauit, ut admonere operæ precium duxerit, quòd cichoria quòd facilius hincinde transferri possint, uincire oporteat. Patet enim cuiq;, quòd ea quæ resoluta sunt, non facile transferri quouis possint, ob idq; non solum nos qui medicam artem profitemur, uerum et coquos olera elixantes curæ habens, ipsos quo pacto illa liganda sint, edocuit. Eodemq; animo est præditus, sicubi uel cataplasmatum alicuius consiciendi modum tradit, uel tot stadia inambulare, uel toties perfricari, aut aliud aliquid huiusmodi iubet. Ob quæ omnia pleriq; illius superfluum curiositatem nõ solum non laudant, uerum & uituperijs incessunt, tanquam qui modum terminosq; constituerit, quantitate in infinitum sese extendente. Quis ergo credat hunc qui tã opere alioqui curiosus sit, ut alijs auxilijs, sic & uenæ sectione usum fuisse, cum de illa non alibi, quàm ubi de sanguinis reiectione agit, mentionem fecerit: Atqui ille neq; tum ea uisus est, sed e contra Chrysiptu, eo quòd uenæ sectionem ne utiquam usurpauerit, summopere laudauit, insuperq; demonstrationes quasdam attulit, quib; Chrysipti de uenæ sectione dogma modis omnibus asserere conat. Quòd uidelicet non magis sanguinem spuentibus, quàm his quibus aliqua corporis pars inflammationi obnoxia est, ea utendum non sit.

10 Caterum de hac quoq; re alio loco dicitur: nunc uerò quod antea eloqui exoritur eram, repetendum est, quòd Erasistratus scilicet quasi alioqui uniuersos suos sermones in immensum extrahere non consueuisset, & bis terq; interdum in diuersis operibus eandem sententiam replicasset, illas tamen uel semel quinque syllabas adscribere contempsit, quibus interpositum ceteris auxilijs uenæ sectionis nomen enunciare sibi integrum erat. Taceo hic quòd & quantitatem illius, ut in alijs fecit, & tempus, reliquaq; eiusmodi pro ut superius significatum est, indicare omnino debuerit. Proinde nonnulli medici fuere qui quantitatem euacuationis, signis quibusdam definitur, ueluti si uel color, uel robur, uel sanguinis fluxio mutetur, aut pulsus tempore subtractionis ex debilitate collabatur, ac sudores prorumpant. Ad hæc quidam etiam dolores addunt, & uomitus uementiores, exuperantesq; alui deiectiones. A-

lij etiam usq; ad animi defectionem, euacuati-
 nem producendam putant, presertimq; si illa pro
 euacuacionis portione contingat, & non ex hu-
 more qui ad osculū vētriculi influxit. Nam & ob
 bilē pituitamū, cum ea in os vētris influxerint,
 persape animi defectionem manifeste fieri uide-
 mus. Aliqui item tum coloris in toto corpore
 perimutatione, tum pulsuum alteratione commo-
 deratam subtractionem cōiectant, eamq; ob rem
 modis omnibus arbitrantur multo consultius es-
 se, ut consideratione ex succedentibus facta, de-
 nuo redeatur ad illius euacuacionem, quam si ea-
 dem semel copiosa fiat, nec defuerūt quidam, qui
 etiam constitutam quandam mēsuram illius pro-
 ponere auderent, perinde quasi duab. Atticis he-
 minis, aut paulo plus minusue moderata subtra-
 ctio circūscriberet: quippe cum ex commo-
 derata portione, adhibitis ad id & ætate hominū,
 & natura, & tempore anni, & regione, nos ipsi ma-
 ius minusue cuiq; quadrans inuenire possimus.
 Quare & Erasistratus certū nobis numerū sctio-
 nis tradit, quo etiam si ab exquisita illa mediocri-
 tate aberrauerimus, nullam tamē notabilem no-
 xam incurramus. Mēsuram autē de uenæ sctioe
 nullam planē protulit. Nam, sat scio, de uenis que
 incidi solent, nō pauca scripsisset, maximeq; cum
 & Hippocrates, tum eius que infra popliteam pro-
 pēq; talos est, tum illius que uel in frōte recta est,
 uel earū que sub lingua existunt, si equenter com-
 meminerit. Præterea hoc loco referre non est o-
 pus, quantum ad uenas circa cubitū attinet, quod
 neq; Erasistratus reticissēt, num illæ omnes in o-
 mnibus morbis secandæ sint, an quemadmodum
 Hippocrati placet, aliæ in alijs. Eius em̄ qui tam
 diligēter omnia scriberet, propriū officium fue-
 rat, si quid in hoc præsidio à germana mēsurā dis-
 creparet, ad certos terminos redigere, ac quā sen-
 tentiam in uenis explicandis haberet, id quod &
 alij medici factitarunt, adscribere. Quidam enim
 nihil interesse dicebant, quamcumq; uenam quis
 incidere uellet, utq; ex unaquaq; æqualis totius
 euacuatio fieret. Rursum alij ingentē uel in hac re
 diuersitatē cōtingere cēsebāt: nā aliquas ipsarum
 celerius, aliquas autē lōga tēporis mora affectam
 partē euacuare asserebāt. cū igit ille nihil tale scri-
 pserit, nec uenæ sctiois scopos declarauerit, cla-
 rē unicuiq; patet eū uniuersas has ratios ideo in-
 termisisse, quia præsidio hoc nunq; sit usus. Perin-
 de em̄ ut qui nunq; in egro to aliquo cataplasma-
 ta expertus est, is & differētias ipsorū, & cōficien-
 di modū, & occasionē rationemq; utēdi describe-
 re nequaq; potest (solū em̄ his qui illa quandoq;
 more Erasistrati administrauerunt, necessariō in-
 cūbit, de horū singularis differere) eodē pacto qui-
 cumq; uenæ sctiois penitus nō sunt usi, occasio-
 nem illius, modumq; utēdi & mēsuræ scopos tra-
 dere nequeūt. Verū qui illa utūtur, eos in primis
 & de his omnibus, & multo magis de uenarū dif-
 ferētia distinctim tractare operæ precū est, ac ad
 illa ut si nihil aliud, hoc tamen commune facere,
 quod nihil differat, si hæc uel illa fecerit, quia cum-

A
 ctæ inflāmatas partes ex æquo euacuare possint.
 Verū eiusmodi rerū nihil scribere, ac usum omnē
 auxilij de medio tollere, in eo præsertim affectu,
 qui illud omnium cōsensu præcipue requirebat,
 quis id manifesto argumēto esse nō diceret, q; E-
 rasistratus auxilio ipso nunq; sit usus: Quid enim
 difficultatis fuerat, cū in tractatu De febris hæc
 uerba faceret: (Igitur circa ægritudinū principia,
 ac inflammationū generationes omnis sorbitio-
 num ciborumq; adiectio prorsus subtrahēda est)
 si illic adscripsisset (utendū uerō uenæ sctioe)
 quo totius orationis series talis esset: Circa initia
 ægritudinum ac inflammationū generationes, o-
 mnis sorbitio ciborumq; adiectio prorsus sub-
 trahēda est, utēdum uerō uenæ sctioe. Inflan-
 mationes enim quæ febres faciunt, ut plurimum
 ex reptatione fiunt. Si ergo in huiusmodi tempo-
 ribus adiectiones offerantur, easq; concoctio ac
 distributio pro suarum actionum facultate uicif-
 sim reddant, & uasa nutrimento impleantur, ad-
 huc multo maiores ac uehementiores inflamma-
 tiones fieri tunc continget. Commodius itaq; fue-
 rit cibaria nō exhibere, sicutq; uenæ sctioe uti.
 Et talis quidem dictio esset, si ille ut inedijs, ita &
 uenæ sctioe uti uoluisset. Verum cum id nō ad-
 scripserit, quomodo quis uirum crediderit eius re-
 mediū usum laudasse? Cum uerō neq; in alio quo-
 piam opere medicinali hoc fecisse illum constet,
 aliquis etiam multo firmitus de illius sententiā pro-
 nunciare audebit. Quis em̄ arbitrari posset quod
 Erasistratus cum alio qui loquacitate quamproli-
 xissima gaudeat, grauatus fuerit uel semel suis cō-
 mentarijs quæ conscripsit, quatuor uel quinque
 syllabas addere? Ego itaq; etiam si nulla Erasistra-
 ti monumēta iam superessent omniaq; periissent,
 id quod & Chryssippi libris ferē imminet, tamē di-
 scipulis illius sententiā sui magistri profiten-
 tis credere magis adducere, quam qui Erasistra-
 tum neq; aliquando uiderunt, neq; ullos illius di-
 scipulos, aliōsue qui ad illos discendi gratia profi-
 ciscebantur, aut qui his rursum familiariter ute-
 rentur, conspiciati sunt: sed potius ea temere post
 tot annorum secula asserunt, quæ neq; ipsi cogno-
 uerunt, neq; ab aliquo qui id cognouerit, audiue-
 runt, neq; Erasistratum quatuor saltem uel quin-
 que syllabas de hac re scripsisse animaduertēt.
 Nam *τευναυ φλεβα*, hoc est uenam secare, quatuor
 syllabis exprimitur: *φλεβοτομία* uerō quinque
 syllabas usurpat. Proinde id quod superius uerbis
 Erasistrati per me adscriptum est, puta, utendum
 uerō uenæ sctioe, nouem syllabis græcè esset.
 Quiescant ergo illi iam, qui tum studiosi, tum æ-
 grotis ipsis artis cōmoda eripere conātur, dicētes
 Erasistratum quidem usum uenæ sctioe, uerum
 eius mentionem ob id non fecisse, quia illa, quam
 cataplasma tum olerumq; decoquendi ratio, mul-
 to euidentior esset.

11 Si enim artis studiosi eam ob rem uenas se-
 care in animum inducent, quia quemadmodum
 uenæ per inedijs, euacuatae inflammationes dis-
 cutiant, ita & uenæ sctio: omnes sanè deinceps
 illos

ceps illos quoq; Erasistratus in ediam sustinere iubet, uenæ sectione curabunt. Atqui uel hoc uile etiamnum, abiectumq; est. Cæterum si adulescentes qui neque de uenæ sectionis mensura, neque de uenarum secandarum ratione quicquam audiuerint, ad præsidium hoc sese accingant, id statim, ut dictum antea est, ab ipso quoq; initio maximum adferet nouementum. Præstiterit igitur illos neque penitus uenæ sectionem aggredi, quam citra respectum dictorum, auxilio manus admouere. Plures enim hac ratione perierunt, quam quibus non fuerat uena secta. Nam medici natu grandiores, uenas tunc temporis nunquam fecantes, alijs euacuatoijs auxilijs utebãtur, quæ idem quod & uenæ sectio, uerum longiore tempore efficere poterant, nisi si ob affectæ partis dominium uel plenitudinis excessum, mors ægrotum præoccuparet. Sed qui nostra tempestate febres cunctas in principio uenæ sectione indigere putant, non mediocri hercle noxa ægrotos afficiunt. Sic enim sibimet de huiusmodi auxilio persuaserunt, tanquam si ab Erasistrato ita scriptum esset, ut ego nõ multo antea additis ipsi orationi nouem syllabis significauit, quo sententia talis fieret (nam eius denuo meminisse consultius fuerit) Igitur circa ægritudinum principia & inflammationum generationes ab omni prorsus sorbitione ciborumq; adiectione abstinentidum est, utendum uerò uenæ sectione. Talem enim Erasistrati sententiã nostri temporis medici ægrotis minime cõsultentes esse uolunt, cum alia quidem tempora scopiq; ipsius in edia, alia item uenæ sectionis habeantur, quæ ego omnia presentim in commentario ordine idoneo explicabo. Nunc siquidem ueluti quum illi à senioribus persuasi, nouam auspicabantur palinodiam, sic mihi quoq; propositum meum omnino immutandum est, eaq; ratione inhibendum censeo, illis qui hæcenus uenas temere secarunt, ne eas in posterum penitus secet. Ut enim Plato ait: Minus aberrare eos cõsentaneum est, qui ea non aggrediuntur quæ non norit, q; qui illa tractat, quæ nunquam didicerunt: nam hoc idem & isti faciunt, sibipsis persuadentes, quod & quibus uenam secare expedit, & cætera id genus quæ à me recitata sunt, inuentu facilia existant: hincq; adeo in cuiusq; morbi initio in ediam unã cum uenæ sectione ex æquo usurpant, ac hoc ipso, si uera fatelicet, Erasistrati sententiã modis omnibus inuertunt. Nam & uenas secant, & extemplo à uenæ sectione nutriunt, cū ille cõtra uenas secare inhibeat, sineq; nutrimento degere studiosè consulat.

12 Quia uerò isti ueritatem multo magis, quam Erasistratum in honore habent, ostendere eis operæ precium est: quod sermo ille quem de sanguinis reiectione conscripsit, non proprie ad illum solum affectum pertinet, ut qui unicuique phlegmoni sit communis. Verba autem sic habent: Adhæret enim his tēporibus reiectionis aliud ex inflammatione periculū, in quo adijcere cibum nõ facile est. Cum uenæ uerò sectione in ediam longo tēpore toleranti, ne uirtus eius exol-

Galeni.

A uatur, periculum imminet. Sic ille de ijs qui sanguinem uomunt, uerba facit, & ea de causa eis uenam secare non prohibet. Verum quod ipse inflammationem subsequi suspicatus sit, dum ait: (Adjicere cibum non facile est, hoc est, dare cibaria: & Cum uenæ sectione in ediam longo tempore toleranti ne uirtus eius exoluatur, periculum imminet.) Neque enim illic ad sanguinis reiectionem quicquam proprie spectat, quod quis à uenæ sectione absterri possit: uerum utraq; hæc, hoc est, neque propter inflammationem cibos dare, atque id tempore uenæ sectionis facultatibus, periculum de resolutione utrius imminere, cum febrilibus quoq; communia sunt. Porro si diligentius animum aduerteris, reperies Erasistrati sermonem hunc uenæ sectionem in febricitantibus multo magis quam sanguinem spuentibus detrectare: a principio enim dum sanguis reijci, haud quam uas ruptum inflammatione corripitur: at febrim initia uel Erasistrato teste, necessarii inflammationis principio subsunt. Proinde si ad corroborandam rerum incertam fidem ijs quæ manifeste apparent, utendum est, uidi ego plurima uulnera quæ prius quam ægris uena secaretur coalescebãt. Fieri ergo nihilo fecius potest, quod uas ruptum nullo pacto inflammetur, dummodo nos cætera rite administrauerimus, sanguinisq; quantum nobis uisum fuerit, in tempore euacuauerimus. Præterea si Erasistratus dicit, quod necessarium sit tempore quo affectæ partes inflammatione corripiuntur, in edias sustinere, id èoque uirtutem uenæ sectione antea dissoluere ueretur, multo magis ab ipsa in febricitantibus, q; in sanguinem spuentibus, nobis cauendum est. His etenim si euacuati fuerint, uenam ruptã priusquam inflammetur, coalescere possibile est: febricitantibus autem partem aliquam iam inflammas necesse est. Cæterum quod possibile sit, uas quodcunque sine inflammatione conglutinari, id alicui etiam ex reliquis uulneribus credibile apparebit. Frequenter enim uidimus, cum quibusdam singulari certamine pugnantibus, integrum crurum brachiumq; abscissum esset, coaluisse tamen uulnus antequam inflammatio oboriret: quod quidem multo magis continget, si, ut Hippocrates ait, sanguis copiosus hlico fluxerit. Sæpius etiam foramen in cauas thoracis partes illatum, in tribus diebus conglutinatum conspeximus. Quintetiam nuper in palæstra aliquis insigni plaga accepta, extemplo uehementer tulsiendo, duas ferme sanguinis corylas reiecit: sed ille, quia ei statim uena secta esset, aliaq; quibus opus habebat, facta fuissent, neque omnino deinceps tulsit, & nunc quoque sanus incolumisq; degit. Ex his itaque dispicere licet, quod si quis uel adhuc Erasistrato obtemperare uelit, abstinere magis à uenæ sectione in his debeat, quæ iam inflammati in ceperint, quam quæ nondum inflammatione sunt correpta. Præterea ne illud quiddam minus clarum est, quod Erasistratus uenæ sectionem, neque cum in edijs, neq; ante ipsas in edias unquam

tom. 5

Z 3

urupa

usurpauit. Veruntamen nonnulli eò contentio-
 nis dementiaeque peruenerunt, ut quum sermones
 hos audierint, discutiendorum eorum nullam san-
 ne rationem inueniant, tanquam uerò nihil illis
 obiectum esset propriam sermonum farraginem
 auspicantur, unam illam sententiam in ore habentes,
 quam Erasistratus his uerbis asserit: Consequens
 etiam est, quòd circa inflammationis tempora
 uulneratis nihil sit offerendum: uenae enim
 euacuatae, sanguinem qui in arterias insilierit, fa-
 cilius suscipient: quod ubi contigerit, inflammations
 minus euenient. Et sic illi persuasi, quòd ipse
 uenae sectione usus sit, hinc aperte colligi posse
 aiunt. Quo enim loco ipsam inedia m ueluti euacuato-
 rium praesidium ille accersit, multo sanè magis,
 inquit, ad uenae sectionem se accinget. Aduersus
 quos si quis dicat, quòd per ea quae allegat,
 Erasistratum quidem uenae sectione ante inedia m
 esse non demonstrent, sed potius consequens esse
 ostendant, quòd ipse postea illam usurpauerit:
 isti hunc ridentes, tu tandè, aiunt, quid consequens
 sit, cognosce, Erasistratus autem non cognouit:
 quasi uerò ille ingenio exercitato non fuerit
 praedictus, tuque illo multo sis promptior, ac
 rationibus magis polleas. Si itaque uiueret, illi,
 ut te discendi causa frequentaret cõsuleremus,
 quòd scilicet quid ad quamque rem uel consequens
 uel pugnant sit, cognoscere assuescatur. Atque
 his uerbis habitis, illinc discendum: in posterum
 uerò ut collocutoribus aliquam contumeliam inurât,
 adiungunt sibi hominum perfrectae frontis cater-
 uam, ad eò copiosam, ut praesillorum clamoribus
 nemo loqui quicquam possit, eiusmodique finem
 congressuum faciunt. Sed nos in praesentiarum
 eum non quaerimus, qui conuicia spargenti uices
 referat, uerum in primis quidè num Erasistratus
 uenae sectione aliquando sit usus: secundo autè,
 quam hoc auxilium uires habeat, indagamus. At
 qui horum utriusque propriae habent demonstrationes.
 Quod em Erasistratus uenae sectione non sit
 usus, testantur & monumenta illius, & discipuli
 fide dignissimi, Chryssippique uniuersum auditorium.
 Caeterum de auxiliij huius facultatibus non eadem
 est ratio, nam de his enunciata quaedam quam
 uerissima, necnon & conclusiones selectae afferuntur.
 Praeterea si quis istis quoque posthabitis, solum
 rerum ordinè sequi uoluerit, uel sic scripta
 Erasistratum, quia nihil tale in his proditum sit,
 modis omnibus periclitabuntur.

13 Reputa igitur haec in animo, praesertim exor-
 ditio illinc sumpto, ubi ille in De reiectione sangui-
 nis Chryssippum laudibus extollens, quò loco uenae
 sectionis membra uinculis excipere cõsueuisset, haec
 ad uerbum scripsit: Hoc ipsum autè facere conantur
 ij qui sanguinem spuentis uenas secant. At Chry-
 sippus multo consultius agit, ut qui non solum id
 quod in stat praes oculis habeat, uerum & impendens
 tuis periculi curam gerat: adharet enim his tempo-
 re reiectionis aliud ex inflammatione periculum,
 in quo adijcere cibum non facile est: cum uenae autè
 sectione inedia longo tempore tolerant, ne uirtus illius

exoluat, periculum imminet. Atqui hic causam non
 adiecit, ob quam tempore inflammationis inedia m
 iniungat, utpote quae ab illo declarata est, quum
 in hanc sententiam scriberet: Consequens est his
 quòd circa inflammationis tempora nihil sit offer-
 rendum: uenae enim euacuatae sanguinem qui ar-
 terias insilierit, facilius suscipient: quod ubi conti-
 gerit, inflammationes minus continget. Quapropter
 ille inedia m tempore inflammationis ea causa
 laudat, quia illae uenas euacuet: uerum si ambas
 has sententias in unum redegeris, sermo integer ta-
 lis erit: Chryssippus sanè recte fecit, qui non seque-
 ritur uenam ipsam qui sanguinè exercebant, eò quòd
 illi paulo post euacuatorio auxilio, puta inedia m,
 indigebat. Praeterea idè iste sermo, si compedi-
 osius quoque dicatur, eiusmodi erit: sanguinè reijci-
 entes nequaquam sunt euacuandi, quia paulo post
 inflammationem ingruente, euacuatio opus habebunt.
 Etiam uerò clarius is hoc pacto explicatur,
 ante inflammationis tempus uenas euacuare non
 licet, ipsis quippe euacuatis inflammationes cessant.
 At sermo iste euidenter sibi ipsi repugnat, nisi si
 quis suppetias illi lateret, duo haec temere adijciat,
 quòd uidelicet satius sit, ut corpus per inflammationis
 tempus euacuetur, non ante, quòdque inedia m
 sit magis quam ipsa uenae sectione usurpada.
 Sed si haec dicat, non huc neque quod propositum
 fuerat, demonstrasse, neque sibi metè cõsentanea dixisse
 respõdebimus, in hocque has partes discrepare
 dicemus, quòd ordinem sermonum non obseruent.
 Omnibus em hominibus, qui praesertim tantum
 mentis possident, ut cõsideratione etiam par-
 xillum quid conse qui possint, perspicuum est, quò
 huic qui sanguinem in arterias transsilietem per
 euacuatione uenarum ad proprium locum reducere
 uelit, id primo quoque tempore sit faciendum.
 Manifestum etiã est, quò euacuatorio auxilio quam
 celerrime utendum sit, ut quo & breuissimo tempo-
 ris spatio, & sine ulla corporis perturbatione, euacu-
 uatione quamuis perficere possimus. Quantum enim
 inedia m persape laedant, superius demonstratum
 est. Proinde cum in hunc modum alicui dicere in-
 tegrum erit: Arbitror equidè ridèdes esse eos qui
 Erasistratum quandoque sanguinè reijciētibus uenam
 secuisse putat: quandoquidem ubi inedia m tanquam
 euacuatorio praesidium laudat, multo hercle magis
 ipsam uenae sectione laudaturus fuerit: ubi quoque
 inflammationis tempore euacuatio opus esse
 arbitrat, sub illius initium magis quam cum futura
 est, ipsam laudaturum fuisse in confesso est. Neque
 etenim Erasistratus rerum adeo imperitus erat,
 ut non multo citius sanguinè ex arterijs in uenas
 reduci putaret, cum neque circa insultus initium
 ille uehementer esset densatus, neque a calore
 febrili tantopere eliquatus, ut ob id crassiusculus
 efficeretur. Nam qui hoc ipsum assereret, semet
 potius deridendum, quam illos quos accusat,
 exhibebit: quandoquidè cum Erasistratus ipse
 scribat, uenae sectionis usum ea causa non esse
 usurpandum, quia inflammationis tempore longè
 melius sit ut assumptionem euitemus.

Desiderantur hoc loco non pauca. 14

Continere immedicabile, aut profecto non facile sanabile, qualia ipsis quoque hæmorrhoidibus accidunt. Porro cum nos membrorum deligaturas diceremus multitudinem absque uenę sectione trahere ad se posse, ille hoc ait impossibile in plethudinibus esse, ob quas Erasistratus brachia manusque ac tibias adimpleri dixit fierique id, quia uasa propter sanguinis multitudinem intendere. Quare ratione ergo in illa id quod in profundo est delatibus amplius poterit, cum sine illo ne ipsa rumpantur periclitari iam uidentur. Atqui iam declarauimus quod Erasistratus Chrysiptum laudauerit non apposita, ut ego nunc scribendo faciam, aliqua sermone distinctione, uerum absolute sententiam suam prodēs. Oratio namque sic habet: Deligationes uero laneis uinculis circa alas ipsas ac inguina faciendæ. Deligationes enim, inquit, faciendæ, neque interim utrum hoc auxilium plethoricis solis nihil comodi adferat, aliisque est diuerso emolumento sit futurum, sermone addidit, sed simpliciter pronunciauit quod de omnibus dictum istud intelligamus. At qui (aiebat ille) si de omnibus id intelligendum esset, ipsemet istud declarasset in hunc modum scribens: Deligationes in omnibus faciendæ: uerum simpliciter protulit, deligationes laneis uinculis circa alas inguinaque faciendæ, eo quod non ipsi suspicari possemus orationem hanc de illis tantum habitam esse, in quibus ad membra sanguine transferri possibile est: nam in quibus id fieri nequit, ne uincula quidem eorum membris sunt adhienda. Cur ergo, aiebamus nos, hoc quod nunc dicis, Erasistratus non scripsit? quod si quis adeo repletum sunt ut eis brachia, tibiaeque, ac cubiti adimplentur, sanguinem subtrahere necessarium sit, ceteris uero sola membrorum deligatio sufficiat. Quoniam, inquit, non hominibus uulgaribus scripsit, uerum istos qui ea quæ res ipsas necessario consequuntur, cognoscere atque operari possint, impossibiliâque nequaquam aggredi in animum inducant. Nonne ergo, inquit, inquit, si aliquando plethorica dispositio corpus occupauerit, etiam Erasistratus istud non scripserit, uenę sectione opus esse dicet. In confesso enim est quod hoc omnibus cognitum sit, ideoque ab Erasistrato non est descriptum: ceteros namque affectus quicumque sine repletionem sunt, Erasistratus seorsum mederi iussit. Verum cum ille ad hæc obstitere, primum quidem hortatus eum sum ut sententiam ex tertio De febribus descriptam audiret: deinde uero & eam quæ in priore De salutaribus commentario habetur. Nam quæ in tertio De febribus reperitur, hæc est: Igitur circa ægritudinum principia, ac inflammationum generationes omnis ciborum sorditionumque adiectione subtrahenda est: plerumque enim inflammationes quæ febres suscitant, ex repletionem sunt. Si ergo in huiusmodi temporibus adiectiones offerantur, & eas concoctio distributioque profuarum actionum facultate uicissim distribuant, uenæque alimento impleantur, adhuc longe maiores ac uehementiores inflammationes sæpe nune-

ro fieri accidit. His uerbis Erasistratus nomen repletionis aperte descripsit, modumque illius curandę tradens in edeque commeminuit, uenæ uero sectionem silentio plane præterijt. Quapropter ad Erasistratum illum me conuertens, quater, inquam, o amicitissime mentitus es, quando quidem Erasistratum repletionis medicandam rationem separatim scripsisse patet. Idem namque uel in priore Salutariu libro, præfatus, quomodo quis repletionem cognoscat, deincepsque medelas scribens, quorum uis potius quam uenę sectionis meminit. Dicitio autem sic habet: Summam in quibusdam sanitatis curam rationemque habere oportet, ideoque quæ uia quis eum qui in repletionem fieri consueuit affectum cognoscere atque obseruare possit, in primis colligendum est. Incipiente enim ea a discutiendis abstinendum quammaxime est. Si autem illa nondum adsit, antequam ægritudinis initium fiat, illis utitor: At qui plures modi extant quibus huiusmodi affectus discuti potest, neque ijdem cum ceteris quadrat. Sed de his iam ordine dicere constituimus. Qui ergo corpus laboribus exercere consueuerunt, his multo præstantissimum fuerit, ut illos paulo plures quam pro consuetudine ineanant, ipsisque affectum hunc discutere tentent. Ab exercitijs uero sudores in balneo proritent. Porro si quid supercalefactione exiccatum est, tum pluribus lauacris uti, hisque omnibus præactis in multa quiete longo tempore nullas ciborum adiectiones assumentem degere consuetum est. Illo enim tempore repletio summopere attenuatur, præsertimque si post exercitia & lauacra quis longo temporis spatio nulla adiectione utatur, quiescatque postea aliquandiu. Prædicti uero subtrahendum est, sed & cœna minor solito assumenda. Tum qui offeruntur cibi nutrimento serè careant, ueluti sunt olera plerumque, tam cruda quam cocta, & curbitæque ac cucumeres, peponesque teneri, & ficus recentes: legumina item cum oleis cocta. Panis quoque omni uitio careat. Nam sic uniuersa talia partim aluum lubricam reddent, partim nutrimenta quæ ex illis sunt, neque copiosa, neque fortia efficiunt. Verum ad carnibus piscibusque ac omnibus rebus cum lacte alicuius aut amylo elixatis, & ceteris id genus decoctionibus dicto tempore abstinendum, uel prolixius pauca utendum. Huius autem uictus rationi diligenter ob id insistentium, quod repletio iam consistens, secure suffollatur. Ceterum qui corpus laboribus exerceri non sunt assueti, his plura exercitia iniungere commo dum non est: quanquam hæc alioqui, prout plurima alia, euacuationes tutas faciant. Præterea uero qui eunque ad uomendum propensi sunt, ut a cœna uomitiones instituant, omnibus communiter utile est. Ne autem ad aliquod aliud minus idonei fiant, uomitus ab adiectione cibi non multum temporis intercedat: sic enim cibi adhuc in superioribus partibus existentes facilius euomentur: proindeque alimenta quæ ex ipsis cibis generantur, non multo ante uomitionem distributa sint. Ad hæc postero die lauacra, sudoresque prouocare oportet.

Quinetiam euacuato iam corpore, atq; repletione restaurationem naçta, paulo post ad consueta redeudum. His ergo uerbis Erasistratus clare per omnia indicauit, quod ad repletionis affectu medicandum alijs omnibus auxilijs usus sit, uenæ autem sectione nunquam adhibuerit: istudq; et in sequente operis parte innuit, dum in hunc modum loquitur: Hæc uero animo reuoluenda sunt, quod non omnes homines ad quosuis affectus æqualiter propensi sunt, sed ubi aliquando idem symptoma, ueluti repletio est, intra plurimos contingat, in omnibus ad quæ consueuit loca, impetu fertur, & in alijs quidem ad hepar, alijs rursus ad aluū. Nec defunt quib. illa uel comitalis affectus, uel articulorum dolores conciliet. Opus est ergo, ut uniusquisq; ea quæ illi contingere consueuerunt considerans, curam affectibus proueniētibus idoneam instituat. Non enim eadem ratione ad morbum comitalem inclinatio, qua sanguinem spuētī curatio exequenda. Verum illi perpetuo labore defatigari, huic autē à laboriosis exercitijs cauere operæpretiū est: uerendum namq; est ne ex defatigatione inītiū rptionis suboriat. Sed qui comitalibus affectibus obnoxius est, in labore continuo ac inedia & cibi paucitate se contineat, frequentiaq; lauacra, quæ uel uehementer permutationē adferunt, modis omnibus euitet. Præterea quos renales affectus plerunq; infestant, his cibi concoctu faciles offerendi, ac lauacra affatim iniungenda: potus autem nō prohibēdi, ne lotium acrius redditum loca per quæ excretio ipsa fertur ardat. Ad hæc exercitijs diu insistere, huiusmodi hominibus noxiū est. Quibus aut uel ad spem uel iecur fluxio ex consuetudine fertur, his à laboribus nimijs, frigidaq; ablutione abstinentiū, inedijsq; & paucitate potationum ac lauacris curatio in uniuersum procuranda.

15 In his rursus Erasistratus suam sententiam clare ostendit. Nam eos, quibus ex repletione uel sanguinis sputum, uel comitalis morbus imminet, neq; fortiter purgantibus medicamentis euacuare unquam, neq; frictione uti uoluit: quæ ipsa & si debilis sit, quam quæ huiusmodi morbis ad amussim opitulari possit, præstantior tamen non paulo una inedia existit. Frequenti enim frictione non paucos istorum euacuauimus, cum alijs præ animi ignauia, neq; purgans medicamentum assumere auderent, neq; uenæ sectionem sufferrent. Et sanè si auxiliū hoc in omnibus sufficeret, fortè quis ipso uenæ sectionis loco semper uti posset. Constat autem quod interdum multo minus debilijsq; reperiat, quam quale corporis repletio exigat, maximeq; quia illi qui frictionibus non assueuerunt, si plus æquo perfricti fuerint, lassitudinis affectionibus ilico corripantur. Non nulli econtrā densam duramq; cutim cum habent, etiam si plurimam subierint frictione, nihilominus quam paucissimam euacuationem experiuntur. At si quis medicus in artis operibus diligenter uerfabitur, ipsa experientia edoctus, quanto pere stomachi inanitio ad accersendum morbi

comitalis exacerbatione faciat, sine negotio cognosceret. Dissipiet etiā illos, qui ob solam stomachi læsam actione comitalis corripantur, ex inedia uehementer lædi: uelut & Diodoro grammatico usu uenit. Is enim si quādo in quadam studio rum uexatione famem diutius sustineret, ilico comitali correptus conuellebatur. Fluctuataq; præsentaneo remedio succurrebamus, iubētes ut circa tertiam aut quartam diei horam, panē ex uino tēperato assumeret, hocq; præsidio usus annis per multis sanus degebat: quippe qui huius solius rei curam gerebat, ut cibos in cœna assumptos quæ optime concoqueret. Aliquādo autem cum propter ciuilia quedam negotia in foro ad meridiem usq; sine cibo perdurare cogere, humi prostratus denuo conuulsus est. Ille igitur, ueluti indicauit, propter stomachi uitium epilepsia uexabatur. Manifestum etiam est quod stomachus læsus, si modo ad hoc idoneus fuerit, alias partes nō paucas unā secum exacerbet ac ad cōsensum trahat. Hoc loco autem aduertēdum est quod in huiusmodi affectibus, os uentris, stomachus à medicis appellatur. Ceterū uel multi ante nos fuerunt qui hos affectus iā peruerant, ideoq; de his plenius tractare alibi præstiterit: impræsentiarū uero huc usq; dictū de ipsis sit, quod obiter declaremus multis comitales ex solo stomacho longioribus inedijs perturbato, in exacerbationem incidere. Proponatur ergo homo aliquis qui adeo repletus sit, ut brachia, coxas, tibiasq; sibi adimpletas esse sentiat, tempus uero anni uel seculi adferat, (neq; em hoc ipsum exemplū perraro cōtingit, immo nos per id tēporis homines sepsissime hoc pacto affici cōspeximus.) Huic accedat, quæ is exercitorum ac frictionum sit penitus expertus, facileq; ab inedijs lædatur: nobis porro inuestigandum fuerit, qua ratione hunc euacuare debeamus. Nunquid ergo euacuationem instituemus lauacris frequentibus aut exercitijs, aut inedijs, uomitionibus uel cœna factis: nā præter hæc apud Erasistratū nulla alia repletionis remedia reperuntur. Atqui ipse exercitijs uti ijs qui id non consueuerunt, nequaquam concedit: à lauacris etiam illos, quia comitalibus affectibus obnoxij sunt, arcet: arebititē, mea quidem sentētia, eosdem à uomitionibus, ut quæ caput euidenter replere soleat. Cæterum in edia in his qui repleti sunt, ut ex illa tensio uehementis circa brachia, manusq; oritur: minime ad euacuandum satis uirium obtinet, quin potius si qui stomachum affici aptum habuerint, ijs insignem læsionem infert. Quomodo igitur ipsam euacuationem adornabimus; num frictionibus solis; uerum earum Erasistratus profusus non meminit. Præterea fieri non potest, ut illæ in insuetis tot tantæq; fiant quæ sufficenter euacuent: aut postremo illum lan eis uinculis excipiemus? At Erasistratus huius rei nullam hoc loco mentionem fecit, id remedium ad solam sanguinis reiectionem cohibendam referens. Detur autem ipsum eius mentionem fecisse, quo etiam de hoc ipso consideratio satis luculenta fiat, uerum tamen illis qui

ed repletionis uenerunt, ut & membra exteriora
 subaduri putent, auxilium hoc quam molestissi-
 mum ac nullius momenti esse antea dictum est.
 Neq; etiam credibile illud est, ab Erasistrato ibi-
 dem recitatum; quod scilicet reiectionis tempore
 aliud ex inflammatione periculum immineat, in
 quo ille expropter ægros sine cibis degere iubet,
 quoniam inedia imperata, uenæ sectione ampli-
 us uires dissoluere non liceat. Haudquaquam e-
 nim necesse est ut inflammatio repletionem inse-
 quatur, dum illam euacuare præoccupauerimus.
 Et quanquam id quoque, si quis eminus conside-
 ret, in rebus salubribus persuasibile magis quam
 uerum uideatur, Erasistratus tamē plenitudinem,
 quæ aut comitiale, aut reiectionem sanguinis
 effectura est, euacuare per uenæ sectionem nun-
 quam est ausus. Sic etenim in obseruandis Chry-
 sippi placitis pertinax est, ut neq; uenæ sectione,
 neque fortiter purgantibus medicamentis un-
 quam uti in animum induxerit, alioqui tum uenæ
 sectione, tum purgatione aliquæ, plenitudinem cō-
 modissime euacuare poterat, tamen ille de his ni-
 hil scripsit ibidem, quemadmodum neq; cum de
 paralyti, seu podagra ageret: illic enim etiam in re-
 pletionem causam reiecit: ac deinceps neq; uenæ
 sectione, neq; aliquo efficacium illorum & purgā-
 tium medicamentorum utitur.

16 Præterea opinione suram in libro De san-
 guinis reiectione longe clarius prodidit, idq; in il-
 la operis parte ubi homines quosdam ex consue-
 tæ excretionis retētionē, sanguinis reiectionis pe-
 riculo subesse asserit. Cum namq; inter alia reten-
 tionum genera, hæmorrhoidum quoque cohibi-
 tionem annumerat, non simpliciter has euacua-
 tione indigere ait: uerum prout in cæteris operi-
 bus consuevit, sic & ibi omnes quas ipse comper-
 tas habuerat, medelarum species, sola uenæ sectio
 ne excepta recensuit. Dicitio autem sic habet. Pre-
 sentibus igitur his quibus sanguinis superantia
 frequenter fieri consueuit, sudorum & lotij excre-
 tiones quadrant. Conuenit etiam subtractio cibo-
 rum qui offeruntur, ac deambulationes in locis
 planis, non celeriter peractæ. Verum in his rur-
 sum plenitudinem & sudoribus & lotio et inedijs
 inambulationibusq; euacuandam censens, usum
 uenæ sectionis non adhibuit. Præterea si neq; pri-
 us quam inflammatio fieret, neq; cum facta iam
 esset, neq; cum futura suspicaremur, uenæ sectio-
 nem usurpandam in hoc libro indicauit, superua-
 caneum sanè fuerat illum in alijs operibus de ea-

A dem mentionem facere, præcipueq; postquam cu-
 rationem inflammationis aut iam factæ, ueluti pri-
 mo De febris, aut futura, aut de qua suspicio
 esset, aut incipientis, ueluti in alijs libris, longe an-
 tea descripsit. Veruntamen hoc quidam ex Era-
 sistratis non animaduertentes, dicere contē-
 dunt illum euacuatorio auxilio, puta uenæ sectio-
 nē usum fuisse, cum tamen ipsemet Erasistratus
 manifeste contrarium asserat. Nam simulatq; cir-
 ca inflammationis tempus offerre cibos perdiffi-
 cile esse dixisset, ea de causa futura iam inflamma-
 tione uenæ sectionis usum explosisse se indicauit.
 Ista ergo oratione palam declaratur, quod qui-
 bus in ediam consulturi sumus eisdem a uenæ
 sectione modis omnibus interdicare debeamus.

B Non ergo consentaneum est, ut quis circa unum
 eundemq; ægrotum, utraq; auxilia, nempe inedia-
 m & uenæ sectionem usurpet. Hinc quoque per-
 spicue patet Erasistratum si quando in ediam æ-
 grotis iniungit, eo tempore uenæ sectione non
 esse usum, ac propterea illius in alijs operibus, ut
 & superius significatum est, nullam mentionem
 fecisse. In omnibus enim his, ueluti declarauimus,
 in ediam suadens, uenæ sectionem (perperam qui-
 dem istud ille faciens) è medio sane tollit, ut à no-
 bis alio quoq; prius in opere demonstratum est,
 minus uero peccans ijs, qui omnes illos qui inedia
 utuntur, statim & uenæ sectione opus habere
 existimant. Ego enim sequenti commentario ostē-
 tendere aperte conabor, quod non solum om-
 nes illi uenæ sectione non indigeant, uerum ne-
 pletorici quidem ipsi, nisi prius qualem illa pleni-
 tudo naturam obtineat, discernatur: huicq; acces-
 serit de habitudine ætateq; ægrotantis, ac de tem-
 pore & regione atq; constitutione consideratio:
 tum quæcunq; ante cesserunt, quæ uē ipsum ægro-
 tum etiamnum molestant symptomata. Ob singu-
 la enim hæc per multos uenæ sectionem nunquam
 citra noxam experiri posse ostendam. Præterea et
 alios plerosque tibi ob oculos ponam, qui absq;
 repletionem cum sint, uenæ sectione nihilominus
 opus habent. Posteaquam autem de his singilla-
 tum disseruero, tum & occasionem & mensuram
 uenæ sectionis ordine explicabo: addam etiam i-
 stis eam quæ in secundis uenis differentia est. De
 clarabitur quoq; semelne an pluries sit subtrahē-
 dum. Ad hæc uero non minore opera disquiretur,
 quibusnam, cū adhuc cōmoda ualitudine fruan-
 tur, uenis tempore, uel purgationem, uel uenæ
 sectionem usurpare conferat.

ARGUMENTA CAPITVM

Cap. 1. Quæ sint & quot priusquam uenam in-
 cidas consideranda. Epiphæresis. 2. Contra Eras-
 istratum & eius sectatores, phlebotomiam è numero au-
 xiliorū tollentes. Causa scribendi huius libri. 3. De
 usu uocabuli diathesis, id est affectio. Duo esse organa
 quamcunq; rem inuenienti, eamq; duplicem, uel ex cō-
 muni bus notionibus, uel ex inde demonstratis: hæc pe-
 ritis tantū, illā omnibus communē. (De ratione demō-
 stradi in geometria.) Se hoc in libro usurū rationib; ali-

LIBRI SEQVENTIS

bi demonstratis. Et quod liber de plenitudine antehūc le-
 gi debeat. 4. Qui & uales affectus euacuatione egeāt.
 De plenitudine seu multitudine duplici. 5. De uarijs
 sanguinis affectibus, in quib; uenæ incisio cōfert. Causæ
 quæ humores alterāt, febris, apoplexia, prima tumorū
 genera. 4. Rursus de plenitudine duplici. Quæcunq; hic
 dicuntur, in libris etiā de therapeutica methodo dicta
 esse. 6. De scopis præuidēdis uenæ incisuro. Tū quib;
 in affectibus hoc genus auxilij conueniat particulatim
 docet

docet. Plenitudinis utriusque signa. Virtutis robor. De plenitudine grauate. Hamopticoi, epileptici, apoplectici, peripleumtonici, pleuritici, synanchici, quibus hamorrhoides retinentur, plethorici morbi, initio ueris per phlebotomiam præferendi. Hi quibus oculi de biles sunt, scotomaici & podagrivi uel arthritici, initio ueris uel purgatione, uel uenæ sectione euacuandi. Sic omnes illi plurimum iuuabuntur, si modo aliqui modesti & sobrii fuerint. De intemperatibus & uino deditis.

7. Incisionem uenæ conferre inflammationi & fluxionibus, quarum causas & generationem obiter docet. Quod partes facilius fluxionibus infestentur. Fluxionum cura. Inflammatione ab icteru uel aliâ incipiente, purgandum, aut sanguis detrahendus. 8. Contra Menodorum, quod non in plethorica tantum syndrome conueniat phlebotomia: sed etiâ ante illam, cum futura expectatur, si ætas, regio, & uires respondeant. Et quod morbi magnitudo uel præsens uel expectata, & robor ægri, & ætas, tres præcipui ad phlebotomiam scopi sint. Et quod non sufficienter duo tantum, tanquam sub uirum robore puerorum & senum ætas excludatur, cum pueri etiâ robusti inueniantur, quibus tamen sanguis non sit mitendus. 9. De cæteris scopis, qui non ipsam phlebotomiam, sed modum eius, id est quantitatem indicant: qui quidem tum ex eisdem iam prædictis, tum alijs quibusdam sumitur, qualia sunt, plethorica syndroma, temperies aeris pro anni parte aut regione, qualitas aut quantitas uictus præcedentis, excretiones item & motiones factæ aut non factæ. Iterum de utraq; plenitudine: ne apparentibus eius signis etiam ante morbi initium detrahendum sit sanguis. Quibus morbis præueniendis, omnibus magnis, phlebotomiam consuluerit illis qui iam prius esse laborassent. Quod robor uirum & ætatem semper subaudire oporteat. His qui nullo prius morbo laborassent, si uictu intemperantes fuissent, uenam incidere: temperantibus uero, leuiora euacuanda genera imperari, ut frictions, balnea, exercitia, inunctiones: nisi sanguis crassus esset, qualis melancholicus prælungus est: raro autem ex crudis humoribus talis sit. Melancholicum sanguinem phlebotomia detrahet, uel cathartico: Crudos humores, ante morbi alicuius initium caute uacuabis: si febris iam inceptit, profusus non: Quæ illorum indicia sint. Illi quibus solita hæmorrhoides retinentur, audacter euacuetur: Itê mulieres, quibus menses retinentur: quibus tantu pro incide da uena sufficere potest scarificatio (ἀνοήραφαις) circa malleolos, quæ & ipsa menses ciet, ut poplitæ aut malleoli secta uena: Ex cubito autê minime duces, retraheres enim. Mulieres albes & carnosæ, tenuerit sanguinem colligunt, uenas ferè exiles habent, & satis iuuatur malleolorum cutis sectione: Nigrioribus uero & macris, cum sanguinem crassum habeant, præsertim si uenæ etiam maiores sint, uenam incide. 10. Phlebotomia reuelleret: & quomodo sanguis de naribus fluens, ea tempe stitue in cubito eiusdem adhibita, sistatur, iniectis simul in arius (ἀριος) fascijs, & cucurbitula hypochondrii eiusdem lateris. Cum igitur phlebotomia reuulsorium quoque remedium sit, non in plethorici solum euacuandi gratia adhibebitur. 11. Medicam artē maximè coniecturalem esse propter dosim seu quantitatem exhibitorum medicaminum aliam alij conuenienter: & quod in phlebotomia minus inder periculum sit, cū quantūcumque quis uoluerit detrahere possit: & partem secundo uel tercio detrahendam referare, ubi uirtus imbecillitas est, & maxime in crudis humoribus: in quibus pauco sanguine uacuato, mox syrupum aliquem attenuatē dari conuenit, dein de iterum uacuare, siue eodem die, siue postero. Quod si sanguinis copia fertu di fuerit, a cutis mam febrim incendens, ad animi defectum usque detrahendum, uiribus ægri consideratis: id est uel noctu inter dum (cum necessitas postulat) uel aliâ, præsertim cū cibi prius ingestis satis concocti fuerint, & aliquando etiâ

ad sex usque cotylas. Pulsam in omni phlebotomia tantum euacuandam esse: ne, quod quibusdam accidit dum nimium euacuatur, mors sequatur. Præstare, nisi necessitas urgeat, copiosas inanitiones uitare. Reuulsio per phlebotomiam eò melior, quo sæpius repetita fuerit. 12. De scopis considerandis ad quantitatem phlebotomiz: sunt autem ijdem qui phlebotomiz simpliciter, nisi quod secundum magis & minus considerantur: Vt magnitudo morbi, uirtus ægri, temperies & constitutio corporis, ætas, anni tempus, periculum futuri magni aut acuti morbi. Est autem modus primus & in prima sectione, circiter cotylam, id est ut plurimum, quod si uires robustæ maneant, dimidia insuper in secunda detractione auferretur. Semper autem pulsibus attendendum, qui si uehemētēs & æquales fuerint præsertim si etiâ magni, uirtutem sibi constare indicant. Modus etiam phlebotomiz cognoscitur, cū sanguinis color mutatur, ut in his quibus hæmorrhoides aut menses retinentur, maxime imminente phlegmone: aut cum tenor profuentis sanguinis remittit & subsidit: maxime uero ex pulsu. Coloris autem mutatio non semper expectanda est, sed uirtute tantum robusta expectari debet. In phlegmonis quoque, cū aut imbecillus est uirtus, aut phlegmonem magna ita ut impactum sanguinem habeat nihilque remittat, coloris mutatio non expectetur: Sin uirtus conficit, ætas uiget, maxime cum aer quoque temperatus est, coloris in sanguine mutatio, qui phlegmonem affectus detrahatur, expectanda. 13. Modus detrahendi sanguinis quantum uariet, & quod coniecturæ nati oporteat circa eum: quoniam nescimus exactè quæ sit ægræ natura, & qualis secutura aeris temperies. Minus detrahendum esse illis qui calore febrili & tenui uictu consumpti fuerint: item in temperatè calido & humido, quale puerorum est: in calida regione, æstate, sijs qui albas & teneras carnes habent, ut cæta: & quod nonnullis profuerint sex libra detraçta, alios una libra aut minus satis adiuuerit. Quod ex uenis in angulis oculorum, sub lingua, & in extremis membris, ut splenetica, per parum fluat. 14. Quod omnis reuulsio (κατ' ἴσιν, id est rectè) & ab eodem latere fieri debeat. Sic enim manifestam secuturam utilitatem: id est apparere in hæmorrhagijs etiam spontaneis, ut cum splen affectus, sinistra nare sua etiam sanatur, dextra minime, sed insuper forte soluta uirtute læditur. Similiter se res habet in cucurbitulis & incidendis uenis. Spleneticos uena ad quartum digitum manus sinistra, uel interiore cubiti secta iuuari: & libram aliquando detrahendam esse, præstare autem partiri in duos dies. Pleuritici eiusdem lateris detractione efficaciter iuuantur, alterius obscure uel post tertium. Item ophthalmici sæpe intra horam maximis doloribus leuantur, humerali seu cephalica eiusdem die uel post die in omnibus ubi non necesse est acuatim detrahere. 15. Cubiti uenas tres esse præcipuas, & quæ quibus affectis partibus seruiant: & quæ pro quibus non apparentibus secunda: media nempe pro altera, & pro interiore alia inferior aliquando. 16. Mirabile sæpe auxilium ex directa phlebotomia. Historia liberati ab imminente cæcitate cū magnis doloribus iuuenis sanguinei ophthalmici, cui primum sanguinis libras tres detraxit ex uena humerali, & horis post non uerum iterum phlebotomauit: in unxij collyrio hapalo & eo quod ex uino nominatur mixtis: tertio die iterum eodem, sed copiosius ad mixto collyrio ex uino: Bis balneum adhibuit. Acria, nisi toto corpore euacuato, ne uisus pentur. Cõcludit incidendam esse humeralem uenam in affectibus qui supra thoracem sunt. 17. Paribus infra thoracem, ut coxendicis, uelica, uero, & renibus, quæ uenæ incisæ cõueniant. Ratio optima promouendi menses. 18. Ichias à sanguinis abundantia curatur mixta uena, & magis in poplite quæ malleolis: apocharix autem (id est scarificatio & incisio cutis in curibus)

nihil manifeste eos tuat. Axioma, Ab initio in phlegmonis reuellēdo detrahēdus est sanguis, postea autem ab ipsis locis affectūs euacuāndus. Ad inflāmationes faucū & arterie. Vena in oculi angulo ad nasum. Vena frōtis. Ad capitis dolores. Axioma detrahēdi sanguinis. Reuellendum simul & euacuāndum esse incipientibus fluxionibus: ab ipsis autē locis affectūs aut uicinis, in phlegmonis iā quasi induratis uacuandum. 19. Quando nō referat quæ uena incidatur, quādo scilicet incidimus propter cōmūnem aliquem toti corpori morbum, ut febre præueniendā: ubi uero pars aliqua imbecillior magis infestatur, ab initio lōgius reuellerē oportet: Nisi quod in mensib. retētis melius est deorsum ducere: in hæmorrhoidibus non semper. Hæmorrhoides & menses ut si stātur uel promouētur, quæ uenæ secūda sint. 20. A nacephalæosis quæ dā prædictōrū. Quod non sint præscribēdi certū dies ab initio morbi, intra quos mittēdus sit sanguis, neq; tertius, neq; quartus: Neq; solū sanguine adhuc influēte, nō dum aut impāto, mittēdum esse. Phlebotomiā conuenire quocunq; die prædicti eius scōpi apparuerint: Et quod pleno adhuc uētriculo, uel corrupto, uel nō dum cōcocto in eo cibo, nō conueniat. Declinationē febris expectandā esse eo die quo detrahendus est sanguis: et si febris nō sit, cum magnitudo urget morbi aut inflāmationis, aut totius affectūs, quauis diei uel noctis hora. Si uero nihil urgeat, præstat mane incidī, hora una postq; surrexerit quis a lecto. Quosdam ante phlebotomiā lauare, alios deambulare prodest. Epaphræsis duobus etiā post primā sectionē diebus fieri potest. 21. De arteriarum sectione, Arterias temporum in oculorū fluxionib. calidis & flatuosis scindi: Et

arterias post aures in uertiginosis præcipue: itemq; forigis, calidis, & flatuosis capitis doloribus, & alijs quibusdā capitis affectibus. Et cur in capite tantum, nec usq; alibi, arterias secent medici: Propter periculum nē pe hæmorrhagia, quod non tam magnum est in capite, utpote minoribus. In magnis autem dissectis (ut aliquādo fit ab imperitis chirurgis dum uenam cubiti secant) magnum est periculum. nam si bene cedat res, aneurysma fit: Quidam statim moriuntur, gāgræna propter insectum uinculum ad sanguinem restringendum factū: alij postea in aneurysmato cura. Et quod in tali casu totam arteriam per transuersum discindere præstet. sic enim & aneurysma nō fieri, et hæmorrhagia periculum uitari. Appareat autē sic dissectam arteriam utrinq; & magis in se retrahi partes earū utrinq;, quā uenarum soleant. Imponendum esse sic dissectis arterijs remedium ex aloë & manna cum albumine ouī pilis leporinis exceptum. Quod in somnio admonitus arteriam inter indicem & pollicem secuerit, unde cum non libra fluxisset integra sanguis sponte substerit, & æger diuturno dolore, ubi iecur septo committitur, liberatus fit. Et quod alius quidam similiter arteria in manu secūda longum lateris dolorem euaserit, somnio etiam ipse monitus. Historia liberati diuturno coxendicis dolore, secūda foruito ex uulnere malleoli arteria. Generalis doctrina quando & in quibus secandæ sint arteriæ capitis aut manuum aut pedum: Scilicet ubi affectūs ex substantia calida & flatuosa natus, maxime circa membranas urget, unde dolor pungitius ab una semper parte tantum centro incipiens, extensionis sensum circumiacenti musculo communicat.

CL. GALENI DE CVRAN- DI RATIONE PER SANGVINIS MISSIONEM LIBER

THEODORICO GAUDANO INTERPRETE.



VI de sanguinis missione speculantur, unum sibi primumq; proponant oportet, nempe, ut quæ corporis affectiones euacuatione indigeant, considerent: ac deinde alterum, quæ ea quæ sanguinis fit de tractione. Nam multi

sunt affectus qui alia quam euacuatione quidem indigeant, sed non missione. Tertio post hæc disjucient, qui innoxie hanc ferre euacuationem possint, quippe cum sæpe fiat ut affectio uenæ sectionem desideret, cæterum laboras eam ferre nequeat, siue propter ætatē, siue propter anni uetustatem, siue propter regionis naturam, siue ob os uētriculi uinatum, quod per sæpe per abusum stomachum appellitant. Ac nos sanē etiam, compendij nimirum causa, hac appellatione toto hoc utemur libro. Sed et sunt qui tamen si uel maxime, quod ad morbum pertineat, sectione uenæ indigeant, ob totius tamen corporis habitum ferre ne

queant, quæ si quis etiā definire aggrediaur, temporis excipiet contemplatio, sicuti in alio quouis auxilio. Mox autem de uenis quæ ueniunt secandæ. Nam de istis quæsitum est multum, nihilne referat quam quis secare uenā uolet (omnes enim omnibus quæ affectibus prodesse) an, sicuti Hippocrati, ac propè medicorum clarissimo cuiq; uisum est, multum intersit, hanc an illam incidēris. Porro hæc quoq; speculatione absoluta, succedit de scopis siue intentionibus oratio, quibus uel delictet quis animum attendens, euacuationis modum coniectura queat assequi. Ad hæc omnia, in quibus semel auferre præstet, in quibus uero repetitā facere ablationem, quam ἐπαλείπει nominant, expedit. Tum in quibus inanire ad animi cōueniat deliquium, in quibus autem id tanquā summum malum uitandum.

2 Hæcigitur prospiciat necesse est qui probe hoc uti remedio uolet. Sanē de omnibus istis in medendi Methodo tractauimus, sicut & seorsum aduersus Erasistratum, quod perperā ab hoc abstinuit remedio. Deinde alium etiam librū cōscripsimus aduersus eos Erasistratos qui usum esse

esse hoc auxilio uirum afferunt. Itaque odio sanè dignissima est scelestorum sophistarum tum uersutia, qui cum mètiri se fiant, astu tamen contraria prae nouarum rerum studio adstruant, tum sapientiae uanae aucupium, qui rerum utilissimarum ignari, contraria tamen uerbis asseuerant. Horum alterum Chrylippo Cnidio accidit, qui uenae incisionem ex omni medicinalium praesidorum numero tollendam censuit. Secuti hunc sunt sui discipuli, & ipsi apud Graecos clari, Medius & Aristogenes. His etià magis Erasistratus ad summos euectus honores, Chrylippi seruuat sententiam. Post quem ipsius discipuli, principio quidem praecceptoris decreto insisterent, sed temporis successu eorum ex numero quidam ab his defecerunt, pudore affecti impudentissimo. Nam quid aliud in illos dicam qui asserent sustinent phlebotomiae auxilium recipere Erasistratum: tamen si nusquam in commentarijs ullo in morbo hoc consulere conspiciatur. Immo consentaneum est, inquit, qui inedia tanquam euacuatorium auxilium adhibeat, multo magis phlebotomiam admittere. At qui haec adferunt omnes ad ea tendendam esse uenam asunt, ad quae Erasistratus cibo abstinentiam praecipit. Cum ergo ille in opere De febris scribat adhibendam morborum principijs inedia, sequitur utiq; omnibus detrahendum esse sanguinem, id quod sanè isti etià arbitrantur, illo utiq; in tempore. Verum maximum id malum fuerit, si ita faciendum adolescentibus artem discuntibus persuadear, multoq; etià perniciosius, si nò alia quoq; quae discernere cõuenit, respiciant. Quo circa alio libro ea exponere necesse habui, quò ut delictet adolescentibus communstrarem, & Erasistratum uenae sectione haudquaquam usum (id enim praestat eos credere, quam omnibus uno ordine uenam incidere, quibus ille ciborum usu interdicit) & maximum laboratibus inde prouenire commodum, si quis recte utatur. Itaque aliud mihi denuo, mea quidem sententia, de phlebotomia scribendum nò fuit, cum nimirum remedijs huius usus quidem in medendi sit Methodo expositus simulq; in opere De tuenda ualitudine: in duobus autem libellis, quorū alter aduersus ipsum Erasistratum inscribitur, alter aduersus Romae agentes Erasistrataeos, prauas illius opiniones indicarim.

Cū tamen precibus me suis obtundere non cessarent complures amicorum, quos pigit, ut mihi uideretur, curandi librum perlegere, coactus tandem sum ad haec scribenda descendere, ne scilicet inuidere illis uidear, mox uero serie conuenienti omnia quae de hoc auxilio proferri possint, enarrare. Atque adeo iam tempus est orationem ordiri.

3 Affectionis uocabulū, uelut alibi diximus, ab afficiendo dictum, eque atq; illud, de multis efferitur rebus. Sed nunc recessus in statum nò naturalē, qualescūq; ij fuerint affectiones siue affectus, toto hoc libro nominabimus. Quæremus autem omnium primum, quot, qualesq; hae sint uacuationem poscetes: deinde quænam ex ijs uenam incidi possulent. Quoniam autem omnia quæ in quaestio-

nē ueniūt, duo inuentionis organa obtinent, nempe rationem, & experientiam, idq; cum in artibus omnibus, tum per omnē propè uitā, necesse esse arbitror, & nūc quoq; me aut ratione sola, aut sola experientia, aut iunctis ambobus, quæ proposita sunt scrutari. Porro quoniam ratio ipsa partim ex communibus tantum notionibus progrediens inuenit & demonstrat, partim uero etià ea quæ existis inuenta sunt, ad demonstrationem adhibet, utraq; ratione omnes uti artes demonstrauimus. Ac nos quoq; in praesentia, utra earum utilis reperiatur, eam rebus nostris accommodabimus. Sanè priori ratione omnes per totam uitam homines uti assolent, altera uero non omnes: nam proprie ad artifices attinet. Etenim geometria primum artis suae theorema per solam priorem rationem demonstrat: deinde secunda sola utitur, sed ad eius demonstrationem quod ex prima probatum est, unā adhibet. Quantum uero deinceps à primore cedit theoremate, tantum etià à prima ratione abscedit. Deniq; uero et paucissimis utitur, per ea quæ demonstrata sunt, alia demonstrans, & per illa rursus alia, et iterum per illa, alia, ut tandem demonstratio ad ea quæ plebi incredibilia sunt, pro cedat, nempe ad solis, lunæ, & terræ, non solum magnitudinum, sed & distatiorum cognitionem. Ex quibus tandem inuentis horologia cõstruunt & clepsydras, qui haec uidelicet uia incedunt. Lunæq; ac solis deliquia praedicunt. Sic nostra quoq; arte procedens oratio, multis utetur quæ in alijs operibus sunt demonstrata, puta quòd complures sunt facultates quæ animalia gubernant, quarum alias naturales, alias animales appellitant. Generationis autem principia in rebus omnibus pro materia quatuor habent elementa, quæ per selemutro tota misceri, inq; se uicissim agere sunt nata. Quapropter nulla hoc libro Asclepiadis fiet mentio, ut cuius elementa falsa ostendimus & in decimo tertio De demonstratione commentario, et in opere De Asclepiadis placitis, in quo quintus & sextus, elementorum eius consutationē continent. Demonstratum est etià & in commentario De elementis ex Hippocratis sententia conscripto, de qualitatibus effectricibus, quarum nomina sunt, Caliditas, Frigiditas, Humiditas, & Siccitas: & de humorum tum differentia, tum generatione. Porro de medicamentis humorem unum quemq; purgantibus pauca quaedam in libro De elementis, sed separatim in alio libro tractauimus. Nullis quoque in rem praesentem tractatio De temperamentis est, elementorum sequens tractationē. Verum omnium maxime liber De plenitudine, in quo ostensa est & ut ad uires plenitudo, & ut ad capacitatem in qua continetur. Atque haec plenitudo à medicis κατὰ τὸ γυναικα hoc est secundum humorem fusuram nuncupatur. Optimum ergo fuerit, ut qui ex arte uolet expendere quæ hoc uolumine dicenda ueniunt, De plenitudine libri primum perlegat. Quæ uero & ille ante perlecta requireret, ipse indicabit. Nec uero mirum cuiquam uideri debet, si tantis sit opus ut probe de uena secta

da contemplari liceat. Non enim ad huius modo auxilij inuentionem, sed & aliorum omnium, necessaria est eorum quæ modo recitauimus cognitio. Nam si citra illorū notitiam recte curare possemus, haud esset cur ea tanti faceremus. Sed hæc præfari necesse fuit.

4 Tempus autem nunc est orationem ordinarī, considerando quot sint affectiones uacuatione indigentes. Ergo si quis eas experientia collectas exponat, sola opus est ad explicationem memoria. At si uia rationali, commune & generale inueniat necesse est. Ex illius deinde in species differentiasque sectione usque ad species ultimas, affectuum numerus uacuationem indicantium, inuestigandus est. Sic enim constare uniuersa, quæ per rationalem uiam inuentionem sortiuntur, monstrabimus. Igitur cum artis medicæ officium sit, omnes partium corporis functiones, ubi eorum punctur quidem, recuperare: tueri autem, ubi saluæ fuerint, hæcque ad constitutionem sequantur naturale, necesse esse hanc, dum præsens est, seruari, interuentum uero recuperare. Cum ergo primarias actiones à similibus corporibus perfici ostensum sit, ab instrumentarijs uero secundarias, uidendum est tibi qui in corpore continentur humores, quam aut utilitatem aut noxam partibus eius afferat. Posteaquam igitur in libro De plenitudine demonstratum est bifariam & fieri & dici plenitudinem, nempe uno significato ut ad uires, altero ut ad continentium humores uasorum capacitatem, quod quidam uocant *κατὰ τὸ ἔγγυμα*, utriusque uacuatione est opus, siue in homine ualeatuario, siue ualente euenit. Sanè quemadmodum qui onus gestat, non protinus ubi grauatur ac fatigatur, iam cecidit et uictus ab eo est ad eundem modum cum uirtus à plenitudine grauatur, fieri potest, ut nondum homo ægrotet. Si quidem non nulli qui consueta etiam munia obeunt, sentire sese graues, pigros, segnes, atque ægre mobiles referunt, atque ea est ut ad uirtutem plenitudo; uelut ubi post exercitiam tendi uideantur, quemadmodum Erasistratus dixit. Implentur brachia & cubiti, non exigua est ea alterius plenitudinis nota, quam *κατὰ τὸ ἔγγυμα* uocari à quibusdam propositi, quandoquidem *κατὰ τὸ ἐγγύμα*, *κατὰ τὸ ἐγγύμα*, id est, infusus per uasa humoribus, consistit & intelligitur. Dicitum autem est in Sanitate uenda, ubi in toto corpore sensus prouenit ulcerosus, ac potissimum dum mouemur, talem affectum mali succi esse sobolem. Attamen id non paucis consuetas etiam dum res agentibus usu uenire conspicitur. Quandoque autem & in partibus quibusdam corporis, non in tota mole, indicia existunt affectionum illis in partibus consistentium, similibus ijs quas in toto corpore consistere propositum est. Nam caput aliquando solum grauari sentimus, aut ulcerosam quandam affectionem habere, aut musculos temporis, quos *νευροτρίχους* nuncupant, intendi, idque aut simpliciter, aut cum maiore quadam caliditate. Sic & in foenore, liene, uentre, colicis, septo transverso, gra-

Galen.

uitatem sæpenumero percipimus. Similiter in ore uentriculi aut grauitatem, aut morsum, aut nau seam, aut ciborum fastidium, aut absurdum appetitum sentiscimus. Ad hæc autem fixi in parte quam piam dolores, idque aut ob humorum copiam confertim ingruentium, aut propter spiritum flatuosum, uacuationem indicant, sicut qui ab acri humorum partem exedente rodentemque proueniunt. Sunt autem qui ab intemperie nascuntur, atque inter eos ipsos quidam ab ea sola citra humores, alij uero cum humoribus. In omnibus itaque istis modis propositis, infestantium tum humorum tum uaporum euacuationes à pathematis siue passio nibus hominem liberant. Non tamen uena secta prorsum est opus, sed sufficit purgatio, frictio, balneum, & inunctio cum digerente medicamine. Ergo qui uena incisa iuuentur affectus, deinceps dicamus.

5 Non solum nutrimentum animatis partibus ex sanguine est, sed calor quoque naturalis perseuerantiam ex sanguine obtinet: quemadmodum ex lignis ad arduum idoneis qui in foco est ignis, à quo ædes totas calefcere conspiciamus. Itaque quæ admodum ignis hic offenditur, interim quidem congestis in eum confertim lignis, interim uero tametsi non multis, tamen admodum madentibus, nonnunquam autem omnino non impositis, aut ualde exiguis: sic qui in corde est calor, interdum seipso minor efficitur aut propter sanguinis copiam, aut propter ingentem inopiam, aut propter qualitatem frigidam, interim uero maior aut propter calidam sanguinis qualitatem, aut propter pauculam inopiam. Quicquid autem cor in caliditate frigiditateque perperit, eius protinus & aliarum corporis partes participes fiunt. Euenit autem et una in parte per se præter naturam tum caliditas, tum frigiditas, sicuti sæpenumero in alijs communè tarijs demonstrauimus. Idque duplici ratione prouenit: interim ob humores calidos, aut frigidos, interim uero ob solam intemperiam. Cæterum quemembratim accidit caliditates aut frigiditates, eas quæ parti quidem affectus uicinae sunt, unà alterant, at in totum extēdi corpus priusquam commutent, nequeunt. Eundem in modum & cordis corpus duplici modo alterari ostēsum est, aut per intemperiam, aut propter humores calidos uel frigidos, aut ob alicuius horum inopiam. Porro humores calidos frigidosque fieri demonstrauimus pro cibi potusque modo, & ob pleniorē corporis animique tum motum, tum quietem. Cæterum quemadmodum in uentre frequenter prauæ sunt coctiones, ijs quæ assumpta fuerint, in pituitam aut bilem conuersis, aliamque præter naturam corruptionem perperis, aut crudis, & alterationis expertibus plurimo tempore manentibus, aut in flatum uersis, ita ubi sanguinis fraudamur generatione, humorum in arterijs uenisque affectiones proportionē respondebunt ijs quæ à frustrata in uentre concoctione proueniebant. Quoniam autē calida simul humidaque omnia facillime putrescere apparēt, & præcipue si in locis calidis sint, cōsequitur neces-

tom. 5

&

sario

fariò, quod ex ventre distribuitur nutrimentum, quando à natura nō superatur, inq̄ sanguinis boni generationē nō conuertitur, aliàs ualēs perpeti putredinē. Atqui cum quę ex materia calida putrescant, calidiora etiam euadant, calidior quoq̄ erit prōinde sanguis putrescēs. Hic autē ubi calidior fuerit, calidior quoq̄ sensibilior pars in qua putrescit, euadet. Porro aut quoniā à notabiliter calidis, unā quę uicina sunt, incalefcūt, unā quoq̄ cum sic affectis partibus, quę circum quāq̄ ulterius sunt, incalefcunt, idē calore acri ac mordaci. Eiusmodi enim est qui à putredine proficiscit. Ergo si pars quę hoc pacto incaluit, insignis sit, aut calorem suum in cor protendere ualeat, siue q̄ ut cina sit, siue q̄ ex principalibus, siue q̄ calida, unā & ipsum accēdet, ut quod natura calidissimū sit. Quòd si semel illud accēsum fuerit, facile totū iā corpus simul excalciet, quēadmodū ab ingenti in foco flāma quę illam continet domus. Vocant autem id pathema Græci quidē πυρεθου, Latini uero febrē. Sed & nōnunquam prius q̄ putrescat in gens sanguinis uis in partem impetu decumbens aut prorius eā extinxit, ut actio interiret, aut certē nō contemnēdam noxam infixit. Nam hoc pacto apoplexiā proueniūt, multo nimirum sanguine in principia animantis cōsertim incumbēte. Nam ubi in aliam partē præcepserit, tumore inibi præter naturā efficit. Ex hoc genere est phlegmone. At ubi crassior est, melacholiā q̄ magis naturam refert qui decubuit sanguis, scirrhosus tumor efficit, sicut in pituitosior sit fluxio, iaxus: in biliosus, erysipelas siue ignis sacer existit. Discriminata hæc ad unguē habes in ijs quę modo recēsumus operibus. Nunc autē ut dixi, quę sunt de monstrata hypothesi loco, hoc in libro assumēs, consentaneam illis fecēdā uenā rationē demonstrō. Igitur cum plenitudo duplex sit (optimū em̄ fuerit hinc auspicari) & ea quę ad uires refertur, facile in putredinē perueniat, atq̄ etiā interdum in partes quasdam ingruēs, inibi tumores præter naturā exciet, & altera quoq̄, quę ἰσχυρία appellatur, sæpe in partes decumbat, ac tumores creet, in dō & apoplexiā moliat, uenarūq̄ ruptio nes, eam celeriter euacuare tentandum, prius q̄ magnum aliquid malum in homine efficiat. Porro subtilissimè expositum est in Tuēdā ualetudinis uolumine, quo pacto utramq̄ affectionē & agnosere & sanare oporteat, sicut ubi febris aut sanguinis reiectio præ plenitudinē inualit, aut apoplecticarum infirmitatū aliqua, quomodo & illas curare oporteat, in curādi Methodo diximus. Quare de his plura conscribere superuacaneum censo. Nam si perinde ut in illis tractatibus scripsi, itā & hic scribam, bis eadem de re uerba facere cogar, ac propterea in lōgem etiam sermonem extendere. Sin in compendium librum hunc contraham, duorum alterum subibo periculum, aut ut ob breuitatē obscurus siam, aut distinctionem aliquam utillē præteream. Verum quoniam haud mea uolūtate hunc aggressus sum librum, si quod dictorum peccatum eueniat, ipsi culpam ferent

quorum autoritate hoc coactus sum onus suscipere: sicut si recte atq̄ ex sentētia accidat, utilisq̄ appareat, laudem illis omnem cedo.

6 Rursus ergo orationi sumas principū. Qui res cōsuetas adhuc facit, sed princeps illic pars aliqua aut totū corpus grauatur tēditur ue, ijs necessaria est euacuatio. Porro si ætate nec puerili sint, nec sensili, de secunda uena consiliū inito, præ oculis habēs principales hosce scopos, nēpe plenitudinis tum quantitatē, tum qualitatem, & uirtutum robur atq̄ infirmitatē: deinde naturalem totius corporis habitum, tempusq̄ & regionem, ut tamq̄ antea tam, tū an cibi potusq̄ copia, & præcipue affatim nutrimentum, qui sic affectus est, sit usus. Ad hæc consuetudinē & res præter consuetudinē actas, quosq̄ motus exercuerit, quas excretionēs habuerit, aut præter solitū compeuerit, ad omnia autē hæc num gracilior aut crassior euaserit. Sanē utriusq̄ plenitudinis quantitas ex priorum signorum magnitudine definietur. Quanto enim grauior sibi homo uidetur, tantum & plenitudinem quoad uires creuisse cōstat. Ad eundē modum quantū auctus fuerit tēlionis sensus, tantū & altera inauctā plenitudinē, quā à quibusdam ἰσχυρία uocari diximus. At utriusq̄ plenitudinis qualitatem partim ex coloribus agnosces, memor colorē humorum esse, si quidem modice à calore frigoreq̄ externo affectū corpus suerit, partim ex ijs quę humorū naturæ cōiuncta sunt. Et em̄ calidiores, calidior totius corporis sensus sequitur. Frigidiores uerò frigidior, tū eos qui in uenis quidem acruantur humores, tumor, uasorumq̄ distensio: qui uerò in carne, sensus in ea aut grauitatis, aut tensionis, sicut certe & caliditatis. Porro dispensantium nos facultatū infirmitatē ac robur proprijs indicari functionibus ostēdimus, arbitrarijs quidē in neruis & horū principio cerebro, pulsum autem in arterijs & corde. At a functione quę in bona editur nutritiōe, aut nutritione abolita, tum colore bono aut malo, tertia facultas, nempe nutrix, quam à iecore proficisci demonstrauimus, agnitionē sortita est. Vbi ergo ex tantibus plenitudinis signis ualētēs facultates fuerint, uenam incidēs uidelicet, si tensiua quidē sit affectio, nullo discrimine, magisq̄ etiā in phlegmonode. sin infesta sit degrauās plenitudo, haud semper sanguinis moliedā detractio est. Fieri em̄ potest, ut crudus per corpus collectus sit succus. In quo aduertendū diligētē est, quatenus ualeat robustaq̄ sit uirtus, & quatenus humor ipse progressus sit. Nam exoluta ab id genus affectibus, uirtus, adhibita sanguinis missione, in extremū malum recidere solet, ut nequaq̄ postea restitui possit. Quod ubi euenit, periculū nō leue consequit, potissimum si febris accedat, statū astiūo, stomachoq̄ male affecto, aut toto adeo corpore natura molli, & temperie humido. Eiusmodi enim hominibus multa accidit per halitū digestio, repentinūq̄ animi deliquium, etiam illi febris haud magna inuadat. Si uerò horū nihil sit, ceterum hyēs fuerit, regiōne natura frigida, tum natura quoq̄

hominis frigidior, ijs per sanguinis missionē et totum corpus grauius refrigeratur, & accidit nō nulla quæ ad grauius sequitur refrigerationem, symptomata. Quocirca qui sic affecti sunt, eos sanguinis missionē uacuare non cōuenit, sed frictionibus, mediocriterq; excalfaciētibus. unctioibus, cum potionibus humorum crassitudinem incidētibus, ac modice calfacientibus. Nam quæ ualenter calfaciunt, nimis subito uires deiciūt, ut in reliquam curationem non sufficiant, sæpe etiā febrem auxere. Itaq; & inde uisibus noxa obuenit. Quapropter humorum incidētes crassitudinem cum cibi, tū potus mediocrius sunt in excalfaciendo facultatis. Porro qui sanguine ex pectore reiecto in præsens quidē curati sunt, cæterum eā sortiti sunt corporis structuram in thoracis, pulmonisq; partibus, ut uel pauculo plus collecto sanguine protinus aut ualis alicuius osculū referēt, aut ipsū rumpatur: ijs etiā si nullum in corpore etiā dum symptoma extiterit, ineunte tamen uere sanguinē mittere oportet, similiter qui prope morbum comitalem, aut apoplexiam incurunt. Ad eundem modum, si aliorum morborum cuiuspiam obnoxium esse hominē cognorimus, puta peripneumonix, pleuritidi, anginx, committē dum nō est, ut expectemus dum aliquod euidentis plenitudinis symptoma appareat, sed ante uertēre sanguinis detractioe præstat. Eodē modo quibus hemorrhoides retentæ sunt, potissimum si natura sint atrabilia, quicq; quotannis estate plethoricis morbis corripī assolent, & hos quoq; ueris initio uacuare expedit. Eadem ratione & qui ipso etiā uere illiusmodi malis uexantur. Sunt autē quidam oculis imbecillioribus, aut scotomaticis quas uocāt, hoc est uertiginosis, obnoxij passionibus, qui & ipsi principio ueris inaniri poscunt. Sed illud prius uidentū, quid sit quod in illis acruetur. Si quidem nonnullis amaræ bilis succus plus ceteris colligitur, quibusdā bilis atræ, aut pituitæ, alijs ex æquo omnes, in quibus sanguis abundare dicitur. Hos ergo omnes uacuabis, sicuti etiā in podagricos & arthriticos ueris principio, exhibito uidelicet aut medicamēto purgāte, aut sanguinis diminutione. Equidem complures ipse sanauī, qui tribus quatuor uē annis per interualla pedū laborassent doloribus, exundāte humore ueris initio expurgato, aut sanguine diminuto. Cæterum id neminem latere puto, illos in omni deinceps uictus uitæq; ratione agere moderatos. Nam intemperātes, uinososq; ac uētri gulæq; deditos, neq; purgatioe, neq; sanguinis missionē magnopere adiuuaueris. Nam per uitæ intemperantiam, crudorum humorum copiam ocysime colligūt: uerum his ne manum quidem ad mouere tentā dum est. Eis uero qui præceptis salutaribus obsequētur, summo pere profueris, si principio ueris primū quidem euacuaris: deinde autē ad exercitia, uictusq; rationē salubrē deinceps perduxeris. Quæ de istis dixi, hæc tibi dicta putato, & de omnibus qui quibuslibet capi morbis sunt apti, ex ijs quos modo enūrabā, nepe aut comitalis, aut apoplexia, aut uerti-

Galen.

gine, aut sanguinis reiectione, aut melancholicis.
 7 Porro non solum ubi adest plenitudo, siue ea ut ad uires sit, siue ut *ἡσυχία*, mirifice prodēst uenę sectio: uerum etiā citra plenitudinem initio phlegmones, quæ aut propter ictū, aut propter dolorem, aut partium debilitatem prouenit quippe cum dolor sanguinem ad se trahat, & sæpe partium debilitas phlegmonem, abiq; hoc ut in corpore plenitudo sit, procreet. Ostēsum est enim in Virtutum naturalium commentarijs, infirmā naturā partem prompte grauari, si uel paulo modo plus acruetur in ea excrementi. Quinetiā quod pars quælibet uim possideat, sicut familiarium attracticem, ita quoq; alienorum excreticem: tum quod duplex sit alienum, alterum quantitate, alterū qualitate. Itaq; partem quamuis, quæ licet ab humoribus in se cōtentis non grauetur, tā men excrementa quædam habeat in qualitate præter naturam, ad eorū excretionem per uenas inibi sitas, tanquā per canales insurgere. Porro si quod propellit, prauus sit sanguis, siue alius qui uis succus, ad propinquā primum ueniat partem, necesse est. Vbi rursum duorum alterum eueniet, aut enim cōcoctus corruptusq; in aliam tertiam haud transfluet, aut si neutrum assequatur, denuo ex parte secunda in aliā labetur, atq; iterum ex illa in aliam, neq; cessabit, quoad in talem quāmpī illabatur, quæ amplius ex se propellere quod in ipsa redundat, nequeat. Accidit autē id illis partibus, quæ uim excreticem uicinis omnibus imbecilliorum obtinent: si quidē haud etiā in illas quæ præ uirium robore non admittāt, repellere quod molestum est ualent. Nam & hoc quoq; nobis in illis monstratum est commentarijs, quod non solum pars quælibet recrementum in uicinam protrudat, uerum quod & recipiat quidem, sed contrā, sæpe remittat, & contrā, repellat, in sese haud admittens, quo certamine uictoria potitur ualidior. Quapropter partes infirmiores omnium primæ excrementi ijs morbis corripuntur. Huiusmodi quāpiam ratione rheumaticos uocatos affectus prouenire scito, toto uidelicet corpori infirmo (quæ una est mali habitus species) principibus uero illius partibus, paulum licet inlit ipsi sanguinis, grauari tamen solitis, eumq; ad carnosas cutis partes protrudentibus, potissimumq; glandulas excipiēdis recrementis idoneas, tum ob substantiæ laxitatem, tum quia omnium partium minime robustas habeant naturales uirtutes, sicut & pinguedo. Nam cum quatuor eæ sint, ut ostēsum est, prima attractrix, secunda retētrix, tertia excretrix, & quarta alteratrix, alias quidem tres imbecillimas, glādulæ carnesq; obtinent: at unā alteratricē haud ita multo ceteris partibus minorem. Post glādulas sequit pulmo, fluxioni recipiendæ promptissimus. Nam & hic tres facultates infirmas possidet, & corpus ipsū laxum: deinde est lien. Porro cerebrum aut perinde ut illi, aut etiā plus excipiēdo fluxui est habile. Cæterū hoc illis potius est, quod constructioem habeat eijciēdis ijs quæ accipit promptissimā. Habet enim ingen-

tom. 5

& 2 tes

res uentriculos, qui pronis meatibus euacuatur. Quibus ergo carnoſo genere pulmo, lien, ac cerebrū, natura robuſtiora ſunt, in iſis ad glandulas & carnes fluxiones perueniunt, ubi totius nimirum corporis habitus infirmus fuerit, uelut in rheumaticis affectibus accidere ſolet. Merito ergo hiſ cu randis ſcopus eſt, non euacuatio, ſed corporis totius roboratio, quanq̄ tamen curationis initiū illis à miſſo oriatur ſanguine, ac ſi excremēta prauam etiam qualitatem habuerint, unā adhibeatur purgatio. In quibus maxime corporib. neutrius proprium expectandum plenitudinis ſymptomata eſt, puta grauitas quidem eius, quæ ut ad uires eſt, tēſio uero eius quæ ut *ἰσχυρία*. Eadem ratione in iſis quibus pars quæpiam grauius iſta eſt, aut utcumq̄ aliter incipientem habet phlegmonem, eam ſi magnā fore ſuſpicamur, curationē ab inaniſtione auſpicamur, aut purgatorio medicamine exhibito, aut uena incifa, prout nimirum alterum altero magis conuenire iudicamus.

8 Recte ergo admonemur in iſis quæ ad librū De ratione uictus acutorum adiecta ſunt, ſanguinem mittere, ſi magnus ſit morbus, & æger iuuenili uigeat ætate, roburq̄ adit. Perperāq̄ Menodotus in ſola ſyndrome plethorica ſeruari uenę ſectionem inquit. Cōtrā em̄ proſum ſanguinis mittendi ſcopi, primum in ſe plenitudinem non comprehendunt, ſed ſientis, ut ſic dicam, paſſionis ſuſpicionem. Nam ſi eam magnam fore apparet, omnino ſanguinē mittemus, etiam ſi nulla exiſtat plenitudinis nota, tantum inſpecta ætate, uiribus, & magnitudine morbi, quæ ſola in adiectis ad librum de ratione uictus recenſeri conſpiciuntur. Vigentem em̄ ætatem propter pueros et ſenes in diſtinctionem aſſumpſit. Cæterum primi principēq̄ mittēdi ſanguinis ſcopi ſunt, morbi magnitudo, & laborantis robur, & hæc eſt primam dicendum eſt ſyndromen, non plethoricam in qua ſeruata ſit ſanguinis miſſio, in illa enim & hæc cōprehenditur, ut quæ morbi magnitudinem adaugeat. Quippe nō ſolum ubi iam adit morbus grauis, ſanguinis detrahendū tempus eſt, ſed ubi futurum uerifiſimile eſt. Anteuertit enim Hippocratis doctrina, qua nos docet quæcūq̄ morbis præſentibus recte peraguntur, ea melius eſſe ut aut incipientibus, aut imminentiſus præmittamus. Quare et propoſitos ſcopos ad ſanos transferre liceat. Siquidem & hiſ ſanguinem mittere expedit, ubi nimirum magni aſcuius morbi metus imminet, ratione tamen habita & ætatis, & uirium. Nam ſi quis ut magnum incurrat morbum ſit habilis, licet nullū etiam in corpore ſymptomata acciderit, uenam tamen ſecandam cēſemus. Satis eſt enim ætatem et uires inſpexiſſe. Itaq̄ tria ſunt quæ agnitionem continēt, morbi magnitudo aut præſens, aut imminens, ætas florens, & uirium robur. Forte uero negligentius in adiectis ad librum De uictus ratione acutorum, expoſita uideri poſſit una ætatis particula. Nec enim florentem duntaxat dixiſſe recte habet, ſed addenda eſt & quæ illā præcedit, & quæ ſequitur, uti uidelicet due tantum di-

ſtinctioni eximātur, nempe puerorum, & ſenium. Verum ſenium ætas in uirium uocabo comprehenditur poteſt, nulli enim quæ ea ætate eſt, robur ineſt. Quibusdam uero medicis ne pueris quidem robur ineſſe uifum eſt, ſed perperam rem intelligentibus, ſicut alibi nos oſtendimus. Itaq̄ ſi magnam fore morbum expectamus, aut iam præſens eſt, aut incipit, uenam tandemus, uirium habita ratione, tantumq̄ ex oratione exemptis pueris, dicemusq̄ minus perfecte poſitam ætatis dignotionem ab eo qui conſcripſit ea quæ adiecta ſunt libro De uictus ratione acutorum. Satis enim ſunt ad incidendam uenam hi duntaxat ſcopi. Neq̄ enim ubi tanta crudorū humorum copia accumulata eſt, ut ſecandam uenam impediat, ratio redarguitur. nam iſtis uirium robur nō adeſt. Eſtq̄ hoc indicium eos uari poſſe ſanguinis miſſionē perferre, quādo unā cum colore corporis totius, qui tum uifitur ſanguinem abundantem indicante, pulſus adeſt inæqualis, in uehementia & magnitudine, et per inæqualitatem eius obſcurus ac paruus exuperat.

9 Definits itaq̄ tribus mittēdi ſanguinis ſcopis, nempe morbi magnitudine aut præſente, aut imminente, aut incipiente, ætate florente, uirium robore, extra puerorum ætatem, ad alia antedicta mittendi ſanguinis indicia, quæ non pauci adijcenda medici cenſuerunt, nunc accedamus. Inducant autem hæc detractōnis quantitatem, nō ipſam ſanguinis detractōnem. Itaq̄ ex morbo, ætate, & uiribus eminuendus eſſe ſanguis cognoscitur. At uacuationis quantitas non ex iſtis modo, ſed etiam ex alijs deprehenditur. Ea ſunt plethorica uocata ſyndrome, aeris nos ambientis temperies, in tempus & locum diuiſa, eaq̄ quæ in antea acta acciderūt uita circa comeforū tū quantitātē, tū qualitātē, excretōesq̄ ac motiones, aut factas, aut non factas. Sed quam ſit in hiſ diuerſitas, paulo poſt uiderimus, in præſenti autē de utriuſq̄ plenitudinis notis contemplantur, an ubi ex in homine ſolita negotia obeunte apparuerint, mittendū illi omnino ſanguis ſit, an id neceſſarium non ſit, ubi nulla magni adſuerit morbi expectatio. Porrò quid hæc de re ſentiā, neminē ueſtrum ambigere arbitror, ut qui ſape adſuerit ſanguinis miſſionē ſuadenti tum podagricis, tum arthriticis, tum morbo comitaliſ obnoxijs, ad hæc melancholicis, quiq̄ ſanguinē antea expuſſent, aut in thorace ſtructuram ſortiti eſſent ad id malū idoneam, præterea uertiginofis, quiq̄ aſiduo compiſolēt angina, peripneumonia, pleuritidibus, hepaticidibus, ophthalmijs uehementibus, aut, ut in ſumma dicam, magno quopiā morbo. Nam in illiſmodi omnibus neceſſarium eſſe remediū ſanguinis minutionem arbitror, cōfeſtim adhibita poſt habitam uirium atq̄ ætatis rationem. Hęc ſi forte aliquando nō dicant, intelligere oportet. At qui nihil eiufmodi unquā antea perpeſi fuerint, omniumq̄ corporis partium inculpatam ſortiti conſtructionem, geminam me uacuationis uiam proponere notis: per uacuationē quidem, ſi in uictu-

siue imtemperantes: circa hanc, si temperantes. Licet enim frictionibus multis, balneisq; & ambulacionibus, alijsq; motionibus, adhæc unctiõibus digerentibus celeriter plenitudinem exhaurire, si utiq; uidebitur non esse crassi sanguinis abundantia. Talis est, ut plurimum maximæq; melancholicus, raro uero crudorum, quos uocat humorum. Cæterum in redundantia humoris melancholici sanguinem mittere præstat, aut certe omnino medicamento uti atram bilem expurgante. At ubi crudi succi exuperant, antequam morbus inuaserit, caute uacuabis: sed ubi iam febris corripuerit, uti ante monui, nequaquam. Habebis uero eorum indicium tum colorem plumbeum, aut expallidum album, omniaq; potius quam rubrum, tum pulsum inæqualitatem. Si uero etiam admodum creuerit talis plenitudo, tum et corporis illis grauitas inest, atq; ad motus pigritia, tum mentis tarditas, & sensus hebetudo. Contrà uero, si quibus ex cõprensis hæmorrhoidibus cumulatius in corpore sanguis extiterit, audacter uenâ incidēs, etiã si antea grauem experti morbum non fuerint. Fieri enim potest, ut apti quidem ad eiusmodi aliquem fuerint, cæterum ob hæmorrhoidum inanitionem nondum perpessi. Porro si quæ illis partes prauam sortitæ structurâ appareant, ac potissimum in thorace, omnino eis ocysissime sanguinem detrahes. Idem me sentire nouissis, & de mulieribus quibus menstrua restitit purgatio.

Neque enim profecto proroganda in his euacuatio est, non tamen necesse est illis uenâ scindere: quippe cum malleolorum scarificationes sit perfluitati quandoq; euacuadæ satis esse queant, quanq; nec desit ipsis & aliud quippiã quod mensum motum ciere possit, sicut in malleolis ac poplitibus incisæ uenæ. Nã plenitudines à suppressis mensibus ortas, omnino per crura euacuabis, siue uenam secare oporteat, siue scarificare. Sectæ em̄ in cubito uenæ mulierum reuellere purgationem assolēt. Porro quæ ex mulieribus albidiores sunt, sanguinē acruare tenuem solent. Quo circa adhibitis malleolorum scarificationibus maxime iuuant. At quæ nigriores sunt, secta uena curato. Crassiores em̄ sanguinem, ac magis melancholici colligunt, magis uero etiã si magnas habere uenas appareant, quod illis accidit quæ graciliores sunt ac nigriores. Carnosis uero & cãdidis paruæ insunt uenæ, quibus malleolos scarificare q̄ uenâ secare præstiterit: quippe cum hæ paruas in cruribus uenas habeant, itaq; etiã si probe secentur, quod iustum tamen sit, non profluit.

10 Cæterum non contemnenda uenæ sectio est, tanq; non sit auxilium reuulsorium, cum me sæpe numero conspexeritis in ualida sanguinis è naribus eruptione eo usum repente fluxionem sedasse. Expediit autem, uti uidentis, non expectare, donec uires extremæ collabatur. Verum ubi iam moderatus sanguis è naribus euacuatus uidetur, & impetus lationis fortis permanet, uena in cubito secãda est: si ex dextra nare prorupat sanguis, in brachio dextro: si ex altera, in sinistro. Simul

Galen.

autem cum hoc agis, artubus uincula inñcito aut ex lana, aut ex fasciã, tum hypocondrio directè supposito cucurbitam admittito. Nam hæc nõs faciēdo, ut scitis, semper erumpentem ex naribus sanguinem compescimus, cum antea expertum: do quæ scribunt in nares, inserenda medicamenta, atq; in frontem illinenda, infirma omnia compererim. Itaq; ad ea quæ supra de sanguinis missione dicta sunt, & hoc quoq; Menodoti opinionē conuincit, qui putarit plethoricam uo caratã syndromen remedijs nos admonere. Nam quæ dicta est affectio, plethorica planè contraria est. Adhibemus autem ad eam sanguinis missionem, non ut euacuatorium, sed reuulsorium remedium.

11 Nihil æque artem medicã in agendõ coniecturalè efficit, uti cuiusq; remedijs quantitas. Etenim cū frequenter cõpertum habeamus tempus instare exhibendi aut cibi, aut potus, eiusq; aut calidi, aut frigidi, quantum tamen dandum sit, certo haud nouimus. Idem usuuenit in purgantibus medicinis. Nam quod laboranti præbendum sit medicamen, aut bilem, tum flauam, tum atram, aut pituitam, aut ferosum excrementũ euacuans, exacte nouimus: cæterum quantum præberi debeat, nescimus. Atqui talis exhibitio corrigi postea nequit. Nam quod semel in uentrem deuoratum est medicamentum, quo minus omne deuoratum sit, fieri non potest, neq; possibile est, ubi plus quam conueniat, iam purgetur homo, partem oblati auferre. At in sanguinis missione summũ id bonum est, euacuatiõem dum uoles posse sistere, ac rursum quo uideatur tempore, fluere sinere, quoad usq; rectè habere appareat. Quapropter præstat, nisi quid urgeat, priori missione minus detrahere, iterumq; eã repetere, immo si lubet, & tertio. Vbi ergo multa euacuatiõem est opus, uerũ uires sunt imbecilliores, in his euacuatiõem partiri expedit, uti nimirum & me fecisse uidentis in ijs quibus crudorum inerat humorũ copia. Nã pauculo sanguine detractõ, protinus aquã mulsam exhibeo probe cõctam cum attenuantiũ medicaminum quopiam, uelut hyssopo, origano, & interim etiã nepita, aut pulegio, aut certe cum aqua mulla, acetum mulsam, aut acetum mulsam dulce, ac sic rursum sanguinem minuo, uel ipso eodem nonnunquam die: interdũ die postero, in quo rursum exhibitõ propositorum medicamentorũ quopiam, iterum de sanguine quid aufero, ac rursum tertio die similiter bis. Cæterũ ubi feruescentis inest sanguinis plenitudo, acutissimam accendens febrẽ, aceruatiũ euacuare expedit, eamq; inanire tentãdum, uel ad animi deliquium usq; uirium modo inspecto robore. Itaq; memini quibusdam sex de tractas protinus corylas aut postridie, aut tertio quartõue, quibusdã primo etiam die, cum febris principio noctis cõpisset, aut medio, ac quæ pridie comederant, probe fuisse concocta. Nonnullis autem pridie inæqualitatem, aut sudorem, aut capitis alteriusue alicuius partis dolorem causantibus, ac proinde parce esitantibus, ubi febris præcedente inuasisset nocte, primo etiam diẽ me

tom. 3. & 3. sangui-

fanguinem detraxisse memini. Nam in quibus tibi sanguinis feruentis copia apparet, quamocyssi me eos uacuarie conator, priusquam in principē aliquam partem ingruat. Quamobrem nec per noctem sanguinem mittere uerearis. Siquidem ridiculum est quod quidam faciunt, à secunda diei hora ad quintam aut sextam solummodo sanguinem mittentes haud alio quouis tempore: quos si nō clysteres, cibum aliāq; exhibere remedia quocūq; tempore noctis uidissem, grauiter profecto in illos inueherer. Quoniam uerō omnia agunt haud præfinito uno horarum numero omnibus morbis communi, sed ut affectus moneat, in sola autem missione sanguinis dictum modo tempus semper obseruant, deprehensū facilis est illorum error. Sic itaq; affectis ægrotis, ut diximus, expedit ad usq; animi defectum sanguinē educere. No ui enim ex ijs quosdam necessariō ex animi deliquio refrigeratos, ac toto corpore exudantibus li quōtibus alio rupta celerrime morbo liberatos. Vtile est autē pulsuum diminutionibus animum aduertere, tangendo eos sanguine etiam nū fluitate, sicut in alijs omnibus dum sanguis mittitur, facere cōsueui, ne uidelicet nobis nec opinantibus pro animi deliquio mors occupet, quod sanē tribus euenisse medicis noui. Venā secabat eorum unus mulieri febricitante, aliorum uterq; uiro, sed ad tantum animi dulcere deliquium, ut uires reciperari non possent. Proinde fatius est tam copiosa uacuatione abstinere, nisi magna incumbat necessitas. Quin & reuulsionem, non leuē & ipsam auxiliū, quodq; sæpe secta adhibetur uena, quā tō maiorem in numerum particulares aueris de tractiones, tanto efficaciorē effeceris. Hec itaq; prænouisse præstabat.

12. Rursum autem à principio ad propositam reuerſi speculationem, exponamus quæ summe necessaria esse comperit habemus ijs, qui innoxie uenæ sectiones obire semper uolent. Primum omnium scire conuenit, dum propositi scopi huius præsidij augentur, maiorem indicari euacuationem: dum uero exoluuntur, tantum detrahendum de sanguinis missione, quāto illi minores euaserint. Morbi itaq; magnitudo cum uirium robore, primi erant mittēdi sanguinis scopi, ille quidem quæ faciendā sunt indicans, hic tanquam illum haud prohibens, id quod contra indicare futurorum medicorum quidam appellat. Nonnūquam enim affectio mittendum sanguinem comonet, cæterum uirium contra robur prohibet. Quibus scopis præsentibus constat, ut ante diximus, nullam esse crudorum humorum tantam talemq; plenitudinem, quæ hoc inhibere auxiliū possit. Deinde considerandum quæ sit naturalis hominis temperies. Nam quibus amplæ sunt uenæ, quicq; modice graciles sunt, nec candidi, neq; tenera carne præditi, copiosius euacuabisi: contra rios autem parcius: quippe qui exiguum habeat sanguinis, carnemq; facile transpirabilem. Hæc ratione nec pueris uenam tundes usq; ad quartumdecimum ætatis annum, post quem si multus con-

gestus sanguis appareat, sepuſq; anni uernū fuerit, regioq; natura temperata, & pueri natura bene sanguinea, sanguinem minues, multoq; magis si aut peripneumonie, aut angine, aut pleuritidis, aut alterius acuti, grauisq; morbi periculū incumbat. Detrahes autē primum, ut summum, ad conu. Jam usq;. Quod si postea perpēdenti uires, permanere ualide uideantur, dimidium eius adicies, reterata missione. Didicisti autem uehementi pulsui cum æquabilitate, tanquam minime fallaci uirium robustarum signo, fidem habere, ex abidanti autē & magno. Itaq; & septuagenarijs modo dicti ad sint pulsus, si affectus iubeat, uenam secabis. Sunt em̄ quidam & in hac ætate multi sanguinis, uiresq; habent robustas, sicut alij sicci, & pauci sanguinis, & facile nigrescētes quauis percussa parte. Itaq; non numero solummodo animum aduerteret, quōd quidam faciunt, sed et corporis habitui. Nam sunt qui sexagesimo ætatis anno uenæ sectionem non ferant, cum quidam qui septuaginta nati sunt annos, perferant. Veruntamen minus his utiq; detrahes, etiam si candē habere affectionem quam flōrens corpus appareant. Optimum autem fuerit, priusquā aperiat uena, hæc omnia præuidere, & maxime de hæmorrhoidibus suppressis, aut mullebrī purgatione. Nam ubi uenæ uena sanguinis effluit, mutationi eius, & maxime cum adest tam phlegmone, labascētiq; fluxionis robori, potissimum autem pulsuum mutationi, tanquam indicio haud quaquam mēdaci, animum diligenter attendendus est, continuoq; quiescendum pulsū alterascēte aut in magnitudine, aut in quauis in æquabilitate. Nam de mutatione in obscuritatem, quid attinet dicere? Didicisti enim in hac qualitate certam fieri discretionē firmarum, infirmarumq; uirium. In quibus autem iuxta lectam uenam phlegmone est ingens, optimum est sanguinis & in colore, & in consistētia mutationem expectare, sicut indicauit Hippocrates in libro De acutorum uictu, quādo de pleuritide uerba facit. Alius enim est qui in phlegmone est sanguis, quam qui secundum naturam, ut potius ex cælfactus. Nam si antea crudior erat, rubrius modo & stauor efficitur: sin eiusmodi prius fuerat, ad atredinem uergit adustione. Proinde Hippocrates De pleuriticis hunc in modum scripsit: Secunda uero in cubito uena interna, nec ueris multum detraxere, si rubrior stauiorq; multo fluat, aut pro puro, aut rubro liuidus, utiq; enim euenit. Siquidem signum constituit assumpti in se Gram uenā ex phlegmone sanguinis mutationē in eo apparere. Non tamen omni ex parte hæc expectanda est, uerū est ubi antea quam existat, cessare conueniat, idq; duplici nomine, ob infirmas uidelicet uires, aut phlegmones prauitatem. Interdum enim nihil ab ea emittitur, sed imbitertiter constrictus est. Si tamen uires exolui euacuatione nōdum uideantur (id quod ex pulsus scies, & si cui sanguis mittitur, ætate sit flōrens) expectanda est mutatio, potissimum si ambiens sit temperatus.

13 Duo enim hæc sunt ob quæ maxime conic-
 sturals efficiæ euacuationis in hoc auxilio quan-
 titas, laborantis natura qualis sit, quæ utiq; adamul-
 sim nouisse nõ liceat, & ambiētis tēperies qualis
 sit à misso sanguine futura. Nam cū febrilis calor
 multum sanguinis digerit, atq; abstinēter laboras
 uictat, nec cessariõ breuit illum nutrimentu ex san-
 guine destituit, interin q; uirtus exoluit. Absumit
 aut ob laborantis quidē temperiē si calida hu-
 midaq; sit, cuiusmodi est puerorū, ob ambiētē si
 regio sit calida, & tempus æstiuū. Proinde minus
 detrahimus, q̄ plenitudo cōmouet, quod ad aeta-
 tes quidē attinet, in pueris: quod ad corporis ha-
 bitus, in candidis, & quibus mollis teneraq; est ca-
 rō, quales Galli sunt: quod ad tēpus sub Cane. Si-
 milit̄ etiā in regionib, & constitutiõibus. Alia
 uerõ ratione, ut & antē propositiõ est, in cōtrarijs,
 hoc est in frigidis tum temporibus, tum locis, lar-
 gam euacuationem fugiatis, propter insequen-
 tem nimirum refrigeratiõē. Quapropter unum
 desinit in quoq; dictorum uacuationis modum
 scripto nõ licet. Memini enim quibusdam ad sex
 usq; libras sanguinē detractum fuisse, ita ut febris
 protinus extingueret, nec ulla sequeretur uirium
 afflictio: quibusdam uero sesquialibrā haud citra
 leue saltem uirium detrimentum, quibus si quis
 citius uacualet, extreme lassisset. Quapropter uti-
 liter quibusdam unā quoq; detraxi aliquādo, imò
 tero nõnunquam hac quoq; minus, id q; ex uena
 aut cubito, aut poplitis, aut tali. Nam ex uenis quæ
 ad magnos oculatorum angulos cōspiciuntur, aut
 sub lingua, quod certe mentione dignum sit, ef-
 fluere non solet: sicut nec si quis summa in manu
 aut pede uenam secet, quemadmodum putant
 qui liene curari aut à uenæ ad secundū paruū digi-
 tū sita sectiõē, de qua fufius deinceps disseret.

14 Quæcumq; igitur de hac speculatione à
 medicis dicta sunt, ea si scribere aggrediar, opus
 erit libro ijs sigillatim dicato, eoq; ingenti. Cate-
 rum quædam modum in alijs quæ hæcenus dese-
 nta sunt effeci, ut scilicet & mentem meam uo-
 bis exponerem, qui eam à rebus ipsis probari ut
 distis, idem nunc quoq; faciam, sumpto initio ab
 ijs quæ quotidie in laborantibus uidentur. Quæ
 quidem Hippocrates diligēter obseruata, memo-
 riæ prodidit. Est uerò eorum unum primarium q̄
 caput, hoc scilicet: Quibuscumq; *nar̄ isy* eruptio
 sanguinis accidit, summum id commodum labo-
 rantibus affert. (Hoc autem *nar̄ isy* quod in re-
 ctum intelligatur, omnibus confessum est, cū cla-
 rissime sæpenumero hac uoce *nar̄ isy* in hoc uita-
 tur significat.) Quibus uerò contra euenit, nihil
 tuat, aut etiam interdum nocet, quod uires scilicet
 cetera morbi leuamen desiciat atq; exoluat. Nõ
 enim in liene turgente ex dextra nare erumpens
 sanguis, nec in iecore ex sinistra ullam fert utilita-
 tem. Sed & reuulsio quibus in directum adhibe-
 tur, euidentem utilitatem celeriter ostendit: qui-
 bus contra, haud etiam. Dextra igitur nare san-
 guis erumpens, ad dextrum hypochondrium si-
 na cucurbitula, clarè celeriterq; lussitur: sicut ad

nisstrum, ex sinistra erumpens. Porro reuulsionis
 causa, si uenam feces, in directe quidem opposi-
 tis sanguinis eruptionibus, citissime cõspiciam
 uidebis utilitatem. At si contra feces, nihil profu-
 erit. Sic affecto liene, æquè adiuerit circa proxi-
 mum mediõ digitum sinistra manus incisa uenā,
 atque si internam cubiti secueris. Multum enim
 iuuat afflictum liencem sanguinis ex sinistra mā-
 nu detractio. Præstat autem non semel quantum
 conueniat extraxisse, sed in duos dies id partiri fa-
 tius est. Inuenire tamen neque, quam obrem me
 dici liencis sanguinem detrahere neglexerint: si
 quidem ego ingentem perpetuõ utilitatem pro-
 uenire conspexi, si uel libra una detracta foret.
 Vacuationis tamen mensura ex dictis scopis con-
 scienda est. Quin & pleuriticis, quæ è directo la-
 borantis lateris adhibita fuit sanguinis missio, cla-
 rissimam sæpe utilitatem attulit: quæ uerò ex ma-
 nu opposita, aut omnino obscurā, aut certè post
 temporis intervalum. Ad hæc, oculatorum persæ-
 pe doloris grauissimos è directo uenæ, quam hui-
 meralē nominant, sectio intra horæ unius spa-
 tium compescuit. Conari autem in omnibus af-
 fectibus præstat, post modicam sanguinis missio-
 nem iterato mittere: interim eodē die, si ita ex-
 pedire uideatur: interim post diē, nisi si quando,
 ut antē dictum est, ad animi deliquitum euacua-
 tionem ducere conueniat.

15 Itaq; dolentibus oculis humeralis uocata
 uena, quæq; ex ea deriuata est, in cubito incisa, lu-
 culentum celeriter comodum afferunt. Dolente
 uerò latere, aut pulmone, aut septo trāsuerso, aut
 liene, aut iecore, aut uentriculo, ea quæ per alas ad
 cubiti iuncturam pertingit. Hoc autem casu ma-
 ximè interior secanda uenit, quod si non, certè ea
 quæ ab ipsa diducta in iuncturæ apparet flexura.
 Nouissis sanè paulo antè ab humerali uenâ predi-
 ctam diduci, ipsam cõnectentē. Nam hi tres sunt
 loci mittendi ex cubito sanguinis, interior, exte-
 rior, medius. Igitur interior utilis est in ijs quibus
 inferiores collo partes patiuntur. Exterior uerò in
 ijs quibus quæ his superiores sunt, ut facies aut ca-
 put. Medius locus interdum utraq; habet didu-
 ctas uenas in ulteriore manus partem tenden-
 tes, ac deinde hic coeūtes: interim uerò celeriter
 in unum mutuo congregientes, in ipso uidelicet
 iuncturæ flexu, ac nõnunquam obscuram earum
 alteram, claram uerò alteram. Itaq; ubi uena quæ
 parti affectæ propria est obscurior fuerit, & ad me-
 diorū aliquam accedas, conare, quæ à propria di-
 ducitur, potius incidere. Est uerò ubi & quæ infe-
 riores sunt cubiti iunctura, eas quæ in ulna exi-
 stunt scilicet, nihil secare prohibeat, ubi nimirum
 quæ in cubito sunt, non appareant, sed eas certè
 quæ in rectum sunt affectæ. Porro tā perspicuum
 sæpe celereq; remediū, quæ è directo affectus par-
 tibus uenæ secantur afferunt, ut & qui partuntur,
 & familiares ipsorū sæpenumero obstupescant.

16 Itaq; ego olim rogatus sum à diuite quopiā
 in suburbijs Romanæ urbis, ut rerū suarum ceo-
 nomum inuiserē, cui cæcitas imminēbat persci-

lū, nā ita ille dicebat, certē magno dolore uexaba-
 tur, idq; dieb. iam uiginti. Diuitis aut illius familie
 præfectus erat medicus sectæ Erasistratæ, anxie
 semper uenę sectionē refugiēs. Vbi ergo laborā-
 te inspecto, iuuenē eū multi sanguinis cognouit-
 sem, ac oculos quidē nondū ulceratos habere: cæ-
 terū phlegmonē maximam, fluxionemq; tum in
 ambabus palpebris pilositatē, atq; in altera qual-
 dam etiam asperitates, à quib. oborta caligine æ-
 grotus magis magisq; dolebat, ac phlegmone flu-
 xioq; acerbabant: his in quā cōspēctis, cognitaq;
 omni ratione curationis qua medicus ille usus fu-
 erat, me quidem alsidue in suburbū uenire posse
 negabam, cæterū ex usu esse ut triduum ut mini-
 mū hominem paruis temporū interuallis inspicere.
 Permite igit̃ illum inquam mihi, si uideretur,
 tres hosce dies. Imò uero, inquit, ut facias obsecro
 gratiamq; habebo, quin iam hominem tecū ad æ-
 des tuas adduc. Venit aut̃ circit̃er horā quintam,
 ac prima protin⁹ detractionē tres sanguinis libras
 exhausti, deinde hora nona aliam. A quibus mirissi-
 ce oculis apertis: inunctus est postero die mollissū
 collyriorū quopiam, cui admixtū erat quod unū
 habet, sicut in eiusmodi facere cōsueuimus, illi u
 sub palpebris facto, specilli cuspide in summo me-
 dicamen impositum ferente. id primum quidem
 mane faciebam, deinde ad horam quartā, postea
 ad nonam, post quas inunctiones sub occasum so-
 lis in balneū ductus est. Postero deinde die, palpe-
 bris extra uersis, bis inunctus est, maiorē copia col-
 lyrii illius uinum recipientis, mollis illi collyrio ad-
 mixta, dein ad uesperā lotus est. Postridie uerò ma-
 ne obuius diuiti illi egressus, eò loci ubi ex uehi-
 culis descēdere solent, salutauit illum oculis aper-
 tis, phlegmonēq; ac fluxione planē liberis, qui an-
 te biduū illos ne aperire quidem præ fluxiōe atq;
 dolore potuerat. Itaq; res incantationi similis uisa
 est, adeo ut & ipse ille curationis celeritatem ad-
 miratus, exclamaret, unaq; qui cum eo erant, om-
 nes in clamorem prorumperēt, cum nos interim
 haud magnum quippiam fecissemus, nisi tantum
 ex medici illius cōparatione, qui summū malum
 attulerat uenę sectionis metu. Porro ex palpebris
 restabant extergēdæ laboranti tum pilositates il-
 læ, tum asperitates, cæterum id fieri nō poterat ci-
 tra medicamētum mordax. Atqui ferre illud ne
 rīquā potuisset, nisi prius expurgatus foret. Di-
 ctum enim sæpe à nobis demonstratumq; est, ac rīa
 omnia medicamenta parti cuius admota, nisi ua-
 cuum corpus omne fuerit, atq; adamussim excre-
 menti expers, fluxionem atrahere, phlegmo-
 nemq; efficere. Percontatus itaq; tunc dies quæ
 nam ea fuisset incātatio, resq; omni intellecta, ex-
 inde Erasistratæ illum medicum *εμφοβου*, qua-
 si dicas sanguifugum, nominabat. Hæc itaq; nar-
 ratio utriusq; indicationem continet, tum quod
 in affectionibus eiusmodi uenam secare oporteat,
 quod in præsentī oratione propositum nobis
 haud erat, tum quod è directo laborantium par-
 tium: præterea humerales uenas secandas, ubi su-
 periores pectore partes laborant.

17 Porro quemadmodum prædictæ omnes
 partes in cubito secta uena iuuant, ut dictum est,
 sic quæ his inferiores sunt, illis quæ per poplites
 & malleolos decurrunt. Sunt autem dictis inferi-
 ores coxendix, uterus, uesica. At renes cui parti
 adscribi debeant, ambigunt: si quidem inferiores
 sunt ijs, quas prius recensuimus: superiores uerò
 quàm eæ quas secundo loco. Itaq; misso ex cubi-
 to sanguini interdum auscultant, ubi uidelicet re-
 cens fuerit phlegmone, copiamq; sanguinis adue-
 rit. Quibus uerò affectio inest, quam proprie ne-
 phritum nomināt, eā quæ in poplite est, secare ex-
 pediat, aut certē quæ in malleolis sunt. Porro utri
 inflammationes magis etiam quàm renum à ue-
 nis in crure sectis iuuantur. Nam quæ ex cubito
 fiunt euacuatiōes, aliud etiam habent adiunctum
 malum: nempe quod purgationis menstruas cō-
 priment, sanguinemq; ad superiores corporis par-
 tes retrahant. Quæ uerò fiunt ex cruribus, tantum
 abest ut retrahant, ut etiam menses promoueat,
 ac ubi id facere uolueris, tempus consueta mulie-
 ri circuitus tribus quatuorue diebus anteuertas,
 aut uena incisa, aut scarificatis talis cruris unius
 pauculum euacuato: deinde postero die similiter
 facito in crure altero, ut tamen etiam illis diebus
 in quibus uacuas, & ante eos quatuor aut quinq;
 extenuantem uictū procures. Conscriptus est autem
 à nobis seorsum liber De uictu extenuante.
 Sed mulieribus menses abunde prouocant & ne-
 pita, & pullegium. Exhibebis ea in aqua mulla co-
 cta, sed antea contusa, arida, cribroq; subtili excre-
 ta, ac rursus trita usq; dum pollinem tenuiterat
 ferant, ita deniq; aquæ mullæ insperge. Porro cō-
 uenientissimum potū tempus est à balneo inuo-
 lutis adhuc linteo: atq; hæc quidem medicamen-
 ta mitia sunt. Valētiora sunt sauina & dictamnū;
 cæterum usus antē dictis similis. Datur autem &
 hoc tempore medicamentū, quod proprie Ama-
 rum appellat̃, centū habens aloes drachmas mi-
 llis aliorū medicaminū cuiusq; sex. Optimum au-
 tem est, ubi cinamomū acceperit. Sed hæc obiter
 sint dicta, quamq; nō à re ipsa aliena, quandoquid-
 em sanguinis ex utero fluxui auxiliātur, cū eua-
 cuatione ex cruribus, quæ fiat aut malleolis scarifi-
 catis, aut incisa in talo aut poplite uena.

18 Memini me ischiadas, siue coxēdices uno
 die facta ex crure euacuatiōe curasse, nimirū ubi
 nō ex frigore, sed inflammatione sanguinis quæ in coxa
 sunt uenis prouenissent. quare lecta in poplite ue-
 na, cōmodior ita affectis est, q̃ in malleolo. Scarifi-
 catio autem nihil perspicuo illis prodest. Porro
 ut summam dicam, incipientes phlegmonas re-
 uulsū euacuare oportet: quæ uerò inueteratas iam
 sunt, ex ipsis, si fieri potest, affectis partibus: q̃ si
 nequeat, saltem ex uicinis. Et eū in incipientibus
 auertere quod influit, expedit, in inueteratis aut̃,
 ipsū tantum quod affectæ parti infixum est, e-
 uacuare. Euacuabitur porro id optime per uenas
 diductas ab ijs quæ in partib. ipsis sunt sitæ. Huic
 ratioi experientia quoq; subscribit. Quocirca quæ
 in faucibus & arteria, graui torquetur inflamma-
 tione

tionem, in principio quidem aperta in cubito uena, post principium autem in ipsa lingua magnifice prodehinc, incisus uidelicet uenis quæ in ea sunt ambab. Sic indurata phlegmonarum in oculis reliquæ, secta quæ ad magnam decurrit angulum uena, mirifice iurant: sicut capitis grauitates, & in ueteratis in eo ex plenitudine dolores leuare manifeste solent. rufa in fronte uena, at incipientes, aut etiã uigentes, per cucurbitam in ceruicæ procurata retractio, in terram quidem solam, interim cum scarificatione. Cæterum præuacuatum esse corpus uniuersum oportet. Eadẽ ratione incipientes in occipitio dolores, aut etiã uigentes, incisa frontis uena iuuat: quippe reuulsionem cum euacuatione adhiberi magis debent in fluxionibus incipientibus: quæ uero sunt, ex ipsis partibus affectis, aut illis uicinis, in phlegmonis quæ uelut scirrhii naturam referunt.

19 In quibus autem corporibus, nulla dum particula affecta est, cæterum uacuatione uere ineunte anteuertimus: in his siquidem talis sit homo, qui quotannis æstiuo tempore febris, morbis obnoxius esse assolet, atque in eo exundantia euacuare studemus, æque pars quauis in sanguinis detractio accommodata est, sicut sanè etiã si arthriticus sit, omnibus articulis laboris. Quibus autem eximia pars quepiã, ubi prius euacuati non fuerint, infestæ, haud æque liceat ex quauis parte euacuatione moliri, uerum sicut in his qui patiamur occipiunt. Quamobrem podagricos ex cubito euacuato, comitialibus, uero morbis, uertiginibusque obnoxios potius ex cruribus. Cæterum si retentæ hæmorrhoides mittendi sanguinis occasio sint: siquidem cohibere eas uoles, quæ in brachio functioni prouocare, quæ in cruribus sunt, uenas secare cõuenit. At in his quibus repressi sunt menses, semper in cruribus. Non enim ut in hæmorrhoidibus, quidam eiusmodi liberari euacuati uolunt, quidam habere etiã gaudet, ita quoque se res habet in mensium purgatione. Quippe cum hæmorrhoidum euacuationem uereamur, ne in tantam euadat immoderationem, ut hominem uel protinus interfimat, uel aquæ inter cutem obnoxium, aut habitus mali reddat. At uteri purgationibus, ut quæ secundum naturam sunt, tale nihil euenit. Accidit tamen aliquando, ut ex utero per erosionem sanguis erumpat, in quibus non idem est curationis scopus: siquidem haud effluere sanguinem uolumus, uti ex mensibus, sed plane sistere cõsiliu est. Communis ergo in his omnibus, his qui uere ineunte ad sanguinis missionem accedunt, hæc ratio est: siquidem insigniter infirmam partem aliquam habeant, in quam quæ colligitur, plenitudo decumbat, per reuulsionem euacuare. at si tale nihil sit, quæ cuique magis placebit, excepta tamen aut hæmorrhoidis, aut mensium retentione, ut paulo antè desinimus.

20 Et de hac quidẽ res supra quoque dictum est. Verumtamen factus fuerit & hic quoque omnia percurrere, omnibus quæ antè dicta sunt in unum collectis, & si qua minus exacte distincta sunt, unã discretis. Igitur uniuersum hoc sciendum, in sanguinis missione dierum numero haud attendendum, sicut quidam scripsere, ac nonnulli admodum ridicule,

A post tertie diei circuitum, quando uidelicet, ut aiunt, dignotio quædam haberi, qualis sit in forma & moribus, atque adeo tota natura sua morbus. Alij præstantissimum terminum mittendi sanguinis desinunt in circuitu interuallis, electo quo libeat die. Alij detrahere festinant, quibus sanguinis detractio ex usu esse statuerint, transfuente etiam uero eo, ac ubi necdum firmiter in parte superfluitate recipiente inhaerit, unum modo considerantes, non corruptio aliqua cibi in uentre cõcoquendi sit facta, aut tarda cõcoctio, aut etiã cibi in eo cõtineant. Ergo quod maturandum sit, in quibus uacuatione ex usu est, nisi prius concoqui aut cibos, aut in primis uenis cõtentos semicoctos succos oporteat, relictissime præcipiunt, habendaque fides. Verum quoniam quintum sæpe diem, aut sextum ab initio expectant, priusquam nos ad curandum accersant, expediet nihil fecius quoque sanguinem detrahere, etiam si huius auxilij primu tempus sit omissum. Quocumque enim die mittendi sanguinis scopos in labore inuenieris, in eo auxillium illud adhibeto; etiam si uel uigessimus is ab initio extiterit. At quinam fuerint hi scopi: Morbus ingens, roburque uirtutis, excepta ætate puerilis, & aere non ambiente ualde calido. Porro autem quoniam exsoluitur temporis tractu in plerisque morbis uirtus, idcirco & mittendi sanguinis occasio dierum numero deperdit, non tanquam primario id dies efficiant, ac non re aliqua intercedente, nempe uirtutis dissolutione. Itaque si quando uel secundo a principio die uires exoluti uideantur, a uena secunda abstinemus. Sed enim quod in ipso rursum die in quo sanguinem mittimus, obseruanda sit febris declinatio, clarescatis arbitror, quanquam quibusdam id non factis sit notum, qui mane tantum tundendam esse uenam, aut ad summum in horam usque quintam aut sextam existimant. Verum si quis memoria teneat, quæ toto supra libro sunt dicta, nihil is delinquet sanguinem mittens, quauis diei noctisque hora, modo respiciat in febrilibus particularium circuituum declinationem. In quibus autem aut ob colorum lippitudinem, aut aliud simile citra febrem, hoc opus est auxilium, non declinationem omnino non presentis febris, sed magnitudinem aut doloris, aut phlegmones, aut totius affectus in quo secta opus est uena, inspicere conuenit. Cum autem nihil eiusmodi aut urgeat, aut prohibeat, præstat mane uenam incidere, haud protinus ex somno excitis, uerum circiter horam unã iam antea uigilantibus. Cæterum in quibus uere ineunte uenam incidere aggredimur, aut propter febris metum, aut alterius cuiuspiam affectus, scio me sanguinem misisse quibusdam etiam posteaque rerum solitarum quippe obissent, siue in ludo literario siue in officinis, siue in foro siue in ædibus. Iteratæ tamen de tractionis tempus, in quibus simpliciter quidem uacuare conamur, eodem die esto. At in quibus reuellere, si uel duobus deinceps diebus fiat, melius fuerit. Porro intento semper animo sit omnibus id genus in laborantibus uires esto, manu fugiter arterijs illius admota. Sunt etiam quidam tam

ad patiendum apti, ut cōfertam inanitionem non ferant: quo casu, reſecto primo die egrotō, iterare ſecundo detractionem expedit.

21 Quod aut̄ arterias antiqui uenas appellāt, & à nobis alibi demonstratū est, & ante nos alijs cōſeſſum extitit. ob id ipſum ergo, ac præterea doctrinā affinitatē, compendij gratia ſatiſ mihi uiſum eſt, haud alium conſcribere librū De arteria ſecunda, ſed orationi de ſecunda uena, annexere, atque id ipſum in hac parte in qua conſideramus, quas uenas ob quas partes affectas ſecare oportet. Sicut enim alias uenas ob alias affectas partes oſtendimus ſecandas, ſic quoq; & quæ in tēporibus ſunt arteriæ, & quæ poſt aures, incidere medicis mos eſt. In temporibus quidem, inſtantibus. oculos fluxioſibus tum calidis tum flatuoſis. Poſt aures uerò in uertiginioſis maxime, & qui diuturnis doloribus capitis calidis ac flatuoſis affliguntur: Jam uerò & ob alios quoq; affectus in capite conſiſtētes diutinos, ſunt qui arteriarū poſt aures utunt ſectiōne, nō tamē in alia ulla particula affecta eā adhibuerūt, tam eſi multæ ſint quibus hoc potius auxilio q̄ uenæ ſectiōne ſit opus. Vbi enī calidus flatuoſuſq; inſeſtat ſanguis in arterijs acer uatus, illic cōmunibus parti affectæ ſectis arterijs eſt opus. Verū propter difficilem fluxus arteriæ compreſſionē, arterias medici incidere metuunt, quippe cum ſi quis in ſecāda forte uena arteriam uulnerarit, ægre ſtatim ſanguinis eruptionē compeſcat, ac ubi res optime cadat, ad cicatricē perducta diuiſione, tamen aneurysma, hoc eſt arteriæ inciſæ dilatatio exiſtat.

22 Quin & interiſſe quosdam noui ab arteria interiori in cubito uenę ſubiecta, nō nullos quidē protinus ob uinculū imperite à medicis iniectū, adeò ut ſanguinis eruptio in gangrænā euaderet, alios poſtea in aneurysmate manu curādo deſunctos. Neceſſe enim hic eſt laqueo uascularum conſtringere. Itaq; maiuſculas arterias medici eas ob cauſas refugiūt, paruas autem tanq; haud ita multum profuturas. Quanquam & ipſæ quoq; non-

nunquam haud paruum attuliſſe commodum uiſæ ſunt, cum hoc quod citra aneurysma cicatrice claudant. Quin & ſi maior ſit arteria, & ipſa quoque citra aneurysma cicatrice includi poteſt, tota nimirum diſſecta, idq; ipſum ſæpenumero imminens ex ſanguinis profluuiō diſcrimen ſuſtulit. Clare enim apparet, cum tota tranſuerſim per ſe totam diſcinditur, reuulſis utriq; partibus ambabus, unam ſurſum, alterā deorſum cōcedere. Atq; id quidem & uenis uſuruenit, ſed arterijs ſemper plus quàm uenis. Sanè uerò quæ mihi occaſio extiterit ſecanda arteria, nunc iam ediſſeram. Momentis per quædam inſomnia, quorum duo perſpicuò mihi uifa ſunt, acceſſi ad dextræ manus arteriam, inter indicē & pollicē ſitam, ſiuiq; fluere donec ſponte ſanguis reſiſteret, nam ita ſomniū præceperat. Effluxit autem nō tota libra. Subito itaq; diuturnus extinctus dolor eſt, in illa maxime parte fixus, qua iecur ſepto tranſuerſo committitur. Mihi quidem hoc ætate iuuenili euenit. At miniſter dei Pergami, diutino lateris cruciatu laboras, liberatus eſt arteria in ſumma manu inciſa, aggreſſus & ipſe illud inſomnij monitū. Porro alteri cui ex uulnere in malleolo inſiſſio diſſecta arteria fuerat, ſanguinis quidē curſus haud quieuit, donec ego uocatus totam diſſecui, ac medicamento ex aloë & māna, & ouorū albumine cū piſis leporū molliuſculis impoſito fuiſſem uſus, citraq; aneurysma curatū eſt uulnus, obducta uidelicet arteriæ oſculo carne. Vir aut̄ ille quartū iam annum non exiguis temporum interuallis coxæ dolore uextus, exinde proſum ſanus extitit. Hæc itaq; mihi perſuaſerūt, ut ſubinde in ſummis artubus, immo et in capite arterias ſecare in omnibus doloribus, qui à calida flatuoſaq; ſubſtantia naſci uidebantur, & maxime in membranis, quarum dolor punctiō ſimilis eſt, ac ſenſim expanditur, pungente quidē ſenſu una in parte, tanquam in affectu loci cētro inſixo, tenſionis uerò ſenſum percipiente omni circumcirca ad centrum muſculo.

T O M I Q V I N T I F I N I S .

S E R I E S C H A R T A R V M .

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz. ABCD
EFGHIKLMNOPQRSTVXYZ&.

Omnes terniones.

BASILEAE APVD HIERONYMV M.

FROBENIV M ET NICOLAV M EPISCO.

PIVM MENSE MARTIO.

ANNO M D XLIX.



THE



1881

THE

