

古吳自了漢蔣示吉仲芳氏

錫山禪醉道人計廉能元議

弟 時行季芳氏

婿葉舒嵩明韓氏

中風 人覺大指次指麻木不仁或肌肉微掣自為中風先兆

西北地寒風浩蕩或中腑兮或中臟或中血脉或中經善行數

變難名狀外症卒倒仆地不知人痰壅喉間命欲喪東南地濕類中

風症候外症治須當腑中風邪着四肢惡寒拘急脉浮遲中臟

唇緩滯九竅鼻塞便閉不語時若中血脉口服歪又有中經亦

5764

要知六經無症。濁調和。口不能言。肢不持。古人曾作真氣。治三

家好論。亦須思東垣大率主氣虛。河開腎虛。兼火治丹溪主濕

內生痰。總是類中。分明註治之。先用開閉法。皂牙阜去皮。辛辛

藜各三俱為末。再加麝香吹鼻中。有嚏則生無難活。醒後殺之

三合湯。茯苓陳甘半。應相當星。藜歸桔芩連木竹。瀝薑汁。是共一

湯左癱屬血右屬氣。血虛加芍芎。生地。用姜汁炒。瘀血桃仁

與紅花。便黑或腹中塊痛。氣虛參芪也。同劑益汁遺尿亦如之

小便不利不可利。姜蠶全蠍閉塞加。鈎藤善治牙閉。閉肥人烏

附少以引經。烏頭附子氣寔人參亦要忌。右寸有力去參。恐風

盛自汗身體痛。防風羌活并薄桂。頭目不利或頭疼。芎正。莫利

萃菴無汗身疼加芷羌芎防蒼朮秦艽配心血虧欠神恍惚
扶神遠志賦貴菖蒲入或心動搖驚悸者酸棗竹茹辰砂益風痰熾
盛須膽星防積牙皂瓜蔓仁食傷麩非山查是便秘須三化
行大便結用三化湯厚朴大黃枳實
實是活等分每服一兩微利之

示吉日東南類中風者多故從火痰氣而治寔有神驗若果
係風邪外中六經形症具者原宜先服小續命湯解表便秘
者三化湯通滯之後方用本湯調理更爲切當至于治口眼
歪斜方法固多不如瀉夾車地倉二穴至左針右歪右針左
病可立愈

傷風

頭痛發熱鼻不通惡風自汗號傷風脈來浮緩兼無力參蘇飲
服自然鬆人參紫蘇及枳椇桔梗乾葛前胡同陳皮茯苓甘草
夏木香少許水姜攻已下咳嗽去參加皮仁桑杏去皮以內有痰熱
黃芩進痰唾如膠金沸草胸滿痰多貝順冬月自汗桂枝添
若還無汗麻黃令傷食厚朴麩麥芽中酒白寇烏梅信頭疼羌
膏不可無氣喘杏蘇亦莫剩

示吉日人之易于傷風者其故有二一因元氣虛乏氣不衛
外風乘虛入治宜參芪益氣而佐以散邪一因素有鬱熱在
內毛竅常開邪風易入治宜芩連清火而佐以疎風此皆氣
虛鬱熱為本風為標也治本則標自愈

中寒

中寒傷寒殊非一。傷寒科 在後傷則漸深中直入初起棉冷四肢寒

無熱不渴身戰慄脈來無力又沉得加味聖中湯有益參朮甘

草并乾姜加桂陳皮功妙極寒甚附子及吳萸監涉附 重便煮茯苓半

夏叶有力生姜煎就須冷服。供其所主先 其所因也無脈猪胆地麝香分

吃泄瀉不止加菘升姜汁三匙嘔吐入舌捲裏縮指甲青脈絕

蒸臍不可忽。

蒸臍法○用麝香半夏皂夾末一匙填臍中後用生姜片

貼于臍上放大艾火于姜片灸二十七壯灸關元氣海各二十七

壯熱通于中逼寒出外手足溫緩則生。一用硫黃麝香末

填臍中放葱餅于臍上以熨斗盛火于葱餅上熨之如餅爛再換一枚葱餅用葱頭一握切去葉留白根約寸許連縛四五餅應用。

暑病

暑天病熱名暑症腹痛吐瀉冒暑病頭痛身熱躁不寧身如蟻

刺傷暑應寒熱自汗出不止咳嗽倦怠為中暑脈虛身熱動而

得之病屬陽加味香薷湯可止香薷冬五時草皮厚扁麥味茯苓朝黃陳朴豆木瓜

第尋黃連燈心姜棗服氣虛參朮共芒靈寒熱柴苓為要藥嘔

加藿香夏半法為精瀉合澤五子猪真妙訣去香渴用知粉藥如神綿綿

腹痛傷水冷乾姜滑石法從心去退小水不利或短赤得瀉山

槐并滑石。摘搗加菴號。暑風胸滿。寒核消食。積自汗不止。用參

芪。水瀉木通澤有益。頭痛川芎并石羔。痰悶瓜蔓及枳。寔已上

治若居涼館。喜風涼。頭疼惡寒。頭項強。身形拘急。熱無汗。靜而

得之陰寒傷。此因暑。宜服羌活并蒼朮。厚朴乾葛及藿香。紫蘇

等分薑三片。水煎熱服。號升陽湯。兼食神麴。滑石妙。內傷冰冷

用炮姜。

宗吉日夏至一陰生。人內寒而外熱。若過食冰冷。及連薑益

元寒涼之劑。遂至寒積于中。而成內傷。寒症凡吐瀉而腹痛

無休歇。脉來遲緩者是也。治宜理中湯。合平胃散。溫之寒甚

加附子。如悞投香薷飲則危矣。

注夏

溫熱蒸人夏日長氣虛體弱熱因傷胸中氣促四肢倦心煩食

少不如常好卧口乾或泄瀉治用清暑益氣湯黃芪升麻與蒼

米各一錢人白皮參木陳麩澤瀉黃柏酒炒麥冬青皮及當歸乾葛三分各三

味九粒甘草水煎引姜棗盜汗還加浮小麥便赤滑石并山梔

渴甚天花烏梅食去蒼頭痛川芎石羔好噉加羔仁麻杏升蒼出木

香砂仁胸不寬瀉加肉寇茯苓去麥的

濕

東南之地恒多濕居民感受病非一或行涉水雨露蒸或過飲

冷因而得小便短赤身體重骨肉酸麻行不疾新中浮腫及身

黃燥土溼濕湯可識伏苓香附半陳皮厚朴澤瀉蒼白木引用
砂仁并姜棗臨服半匙鹽可入外濕寒熱身腫痛羌防木通加
有益內濕胸滿兼嘔吐喘脹腹膨用枳實黃連山查炒下子瀉
閃木通車前力濕熱發黃仗茵陳山梔車前換滑石

示吉日治濕大法在表在上者開鬼門用麻黃防風輩微汗
是也在裏在下者瀦淨府用五苓輩利小便是也丹溪云濕
得燥則豁然而收用蒼朮是也濕從風散用羌獨活類是也
濕久則生熱用黃連山梔是也從此而變通之真能活人
麻黃止可用二三分益汗多恐生寒症耳

火

相火命門君火心二火一水不相均強腎屬水經所謂五臟氣

并皆是火氣有餘便是火妄動須知燥至陰經所謂一水不勝二火古人謂治非

一法一從頭說與君心火亢極陽強病人吐氣寔感冷進瀉

狂便閉用硝黃利大大承氣湯朴硝大黃枳椇厚朴水煎服大便如常芩連黃連解毒亦黃

芩黃連黃栢山梔烏梅水煎服治大寔火可瀉從上方隨經調

治須臾定飲食勞倦身發熱元氣少分曰傷症補中益氣味甘

溫陽虛之火功偏勝補中益氣湯人參黃芪當歸自朮陳皮甘草升麻柴胡生姜大棗水煎服相火

熾盛以乘陰朝涼暮熱血虛成陰中之火耳寒降知栢四物法

通靈四物湯當丑生地芍藥川芎腎水受傷陰虛病面紅耳熱

好火盛左尺洪數無根火栢龜六味治如神六味地黃丸地黃

丹皮海狗蜜丸淡鹽湯送下補虛火 胃虛過食生冷傷抑遏陽氣

脾中央火鬱之症升散之升陽散火最為良升陽散火湯 心煩熱胃脘時疼

四肢乏力肌熱筋痺或骨髓中熱用升麻葛根羌活白芍人參各五分炙甘草生甘草柴胡各三分防風二分半水煎服忌

寒涼物去獨活及生甘草加葱即火鬱湯 命門火衰陽脫病面赤煩躁虛火盛足冷

脈沉陰極躁回陽救急醫中聖回陽救急湯 陰虛發熱火旺甚

脈數無力屬心腎內傷發熱乃陽虛脈大無力脾肺分氣從左

起肝之火陰火還從臍下生脚下熱來侵腹者斯入虛極藥

平熱從脚起先用附子未津調貼脚心中湧泉穴引火下行後服四物降火之劑

示言按積熱論曰治火之法始而涼和次而寒取寒取不愈

則因熱而從之從之不愈則技窮矣是從知治熱以寒而不

火症

知熱之不哀由乎真水之不足也。當壯水之主以制陽光。經
白寒之而熱者取之陰陰腎水也。求其屬也。此獨為積熱者
說。愚意治火除人壯氣寔者便秘者火微者從正治外俱當
道此為則。蓋火非水不降。未有腎水足而心火熾者也。益坎
勝離湯是為火症之總司。湯見芴療。

內傷

飲食勞倦是內傷。或因飢飽過行房風寒傷人。名外感。辨明謂

治病無妨。子力人迎緊盛。手背熱寒熱邪作無間歇。惡寒無汗。鼻不

通。此是外感。君須別內傷之症。氣口洪。右木手心有熱。微惡風寒熱

前作不知。未更散氣。語言情內傷惡寒得煖解。外感近火寒

仍以外感內傷相挾者。脈症並見。須辨通內傷不足急補之外。

感有餘瀉不同。或先補養或先散。先後之間無苟從。治內補中

益氣用芪參歸木升柴甘與陳引加姜棗水煎服。氣和微汗最。黃人當白麻胡草皮。

為精。校腎水虧酒炒栝入心養血紅三分升麻柴胡目汗去夜。黃。

間不睡加棗仁炒為末亦川芎蔓刺頭疼用日乾乾葛藥為靈。

巔頂痛時辛藁本甚者再加遠志神肉補子仁菖蒲食加麩芽。神麥。

查枳椇瀉添澤瀉芍白。茯苓黃連枳椇除胸悶有痰前半袂為君。見苓。

防己木瓜除脚弱龍骨牡蠣煨為末治遺精風活白川防羌正芎身熱用兼

寒頭疼者加虛火知母栝元參火炎上黃芩黃連精內熟菊花熟地。

醫眼疼

傷食

後天之本屬脾胃。納化飲食。滋榮衛。胃主納飲食。不為胃病。脾主化飲食。不消為脾病。

養生妙法。節飲食。脾胃受傷。飲食倍胸腹飽悶。并作酸。暖氣惡。

食腹痛。累或吐瀉。時下洩。屢種種。皆因傷食。例甚則發熱。與頭

疼。惟身不痛。傷寒異。有傷食類傷寒。條在傷寒科。左關平和。左關緊。香砂平

胃功有濟。蒼朮。陳皮。厚朴。平胃散只此四味。香附。砂仁。香理。氣川。芎

朮。愷并。藿香。朮。姜煎服。食須忌。消肉。查菓。消麵。卜。消糯米。食酒

藥。麩飯。食神。麩。及麥芽。生冷。瓜菓。姜青。遂。一加糯米。索粉。傷時加查

仁。西瓜。多吃。食鹽。促魚。傷橄欖。椒。紫蘇。稻。草。將來。消牛肉。麝香

能消。疏。莫。積。葛。梅。白。寇。酒。傷入。枳。壳。桔。梗。除。胸。滿。夾。氣。烏。法。寒

姜益傷飲須合四苓湯

飲茶湯涼水之類四苓茯苓澤瀉猪苓白朮

嘔吐臨服加姜

汗白朮茯苓治脾虛泄瀉車前寇白朮

已上消導之法

上部有脉下無

脉其人當吐不吐卒指物探吐是良方否則瓜蒂散有力

瓜蒂赤小

豈為未溫水調下一錢吐之

食積鬱久成濕熱黃黃連大黃不可缺再入白朮

并澤瀉去藿砂仁蒼朮訣胃中停滯生冷物心腹急痛人暴卒

大黃乾姜巴豆肉等分為末名備急蜜丸豆大服三丸或吐或

瀉痛自息

已上下良積法

按丹溪曰明知身受寒氣口吃寒物初得之宜溫散溫利稍

久則成鬱鬱久則成熟熱久則生火若仍用溫藥寧不助火

添病乎宜用辛涼以發表辛寒以理中邪易伏而病易退也

至東垣則有輕則損其穀。重則逐其滯之論。蓋少壯新病宜
推逐急去為美。如老人久病。又宜導化漸去為佳。此二公之
旨。真消導法中口訣。故特拈出。

調理脾胃

至哉坤元調脾胃。萬物資生無病累。胃陽納受是所司。脾陰滯
化精神。遂飲食。自倍脾胃傷。潔古枳朮丸為最。白朮八兩將土
炒。四兩枳殼炒皮為末。子苜蓿包米。煨飯丸。一補一瀉。方真好。
半夏陳皮消痰用。理氣香砂不可少。元氣素弱脾不磨。食多腹

內。卽不和加入木香炒。陳麴白芍人參亦用。多素有痰火鬱胸。

補虛後愛氣并酒貴。炒山黃白川。施連芍芎陳皮。砂仁木香。茯苓人參。

脾弱入好食後反飽難消尅黃連山梔甚石羔以參白芍甘
草及

按王節齋曰凡治諸病若見胸膈飽悶或噫氣噦酸腹痛泄
瀉惡食少食等症便問曾何飲食審明傷漬鄉先調理脾胃
消導飲食然後用本病之藥或于本病藥內佐以消導若不
審此藥雖對症而無效也葢藥先入于胃脾胃自傷不能運
化藥味以成功耳同志者審之

酒客病

病因于酒則歸酒氣味俱陽熱性有無形元氣受他傷上下分
消不可久宜微汗利便久則病深變症多先賢著論須尋究

一切不可用下法
脾胃

葛花解醒湯妙藥白寇如無花以乾葛根代之各五錢砂仁葛花着澤瀉炮姜

神麩白各一錢猪茯陳皮人參約五分水香青皮各五分共為末

調下三錢病可却

六鬱

滯而不通病名鬱濕火氣血痰與食六鬱之症發東垣五鬱之

旨出岐伯丹溪製成越鞠丸總解諸鬱有功續香附醋蒼木及

撫梔神麩山梔宜炒黑水丸荳大服百丸等分隨症加藥病如

失寒熱頭疼胸膈痛耳聾目暗脉沉瀦氣鬱木香烏藥加砂仁

青皮薄桂及濕鬱周身一節痛陰寒則發肢無力脉來沉細正

痰痞核散氣急為痰鬱手足麻木脉滑沉痰塊硬堅咯不出須

加瓜蒌結杏仁南星夏及海石火鬱口苦五心煩頭目惺惺

目昏黑小便赤澀脉沉數黃連青黛功奇特午後發熱為血鬱

小腹痛處移不得脉來沉澁或扎結上下失血桃紅入暖氣作

酸為食鬱遇食作痛不思食胸腹飽悶面色黃枳椇針砂散沉

緊脉右閉春加防風夏苦參秋冬吳萸用有益

氣

捍衛冲和之謂氣妄動變常火之例局方燥熱與辛香以火濟

火有何利冷生氣者出人作高陽高陽生冷生氣多是火丹溪意上

了調治辨虛寔虛者石手脉無力懶言氣短身倦怠胸中虛滿

不思食塞因塞用六君子人參白朮茯苓甘草補中益氣亦有

力滯氣寔者脉洪寔身怒忿怒因而得胸脇脹滿噎不通吐酸

惡心心鬱抑種種氣滯若何醫分心氣飲最相宜通半桂芍茯苓

各三錢半蘇梗二兩羌桑兩皮陳腹皮錢各五甘草木香引姜棗大二附青

梳胸滿奇脇痛芎柴為要藥痛居小腹用吳萸氣滯氣虛言補

劑六君兼用功誠異性急加柴熟用芩女人烏附原有利氣滯

腰痛梳木瓜翻胃沉香磨順氣

示言曰治氣補虛寔瀉正治也若虛寔相兼宜一補一瀉古

人亦有定法至虛中寔寔中虛切宜細察假如人老病久脉

虛人弱虛也倘投種藥而不效須察其胸腹之間有無痛處

及暖氣作酸否若有二經皆用此道之品重者及火更甚者

用酒製大黃一二錢微利之後用補藥無不驗另書之加藥
舊衣必須先洗其垢後加顏色也然乎

痰

百病怪病皆痰甚。脾胃虛弱濕不滲。濕熱相蒸遂生痰。遊行到

處皆成病。寔即燥濕是良方。胃痰生于脾胃也降火順氣能接命。痰隨氣切

善治痰者先治氣氣升古人總用二陳湯。隨病加減如神。應痰

芩半夏及陳皮。甘菰。白朮。生薑。進有火。梔芩。次第茶。不愈加降

氣蘇。橈子根。從容。順頭。痰鼻。塞是挾風。紫蘇。羌防。不可聽。面紅。瘰癧

咯不出。卒倒。痰涎。為癩。瘰。熱痰。因用。黛。冬。連。瓜。蔓。花。粉。功。奇。特

身重倦。忘名。坎濕。面目浮腫。氣喘急。脈來濡滑。為濕痰。燥濕。從

脾蒼白米吐咯不出痰硬極動則氣喘名夾鬱右脉沉滑左手

南瓜只香

平星二母附兼海石嘔吐惡心胸痞塞遇寒則甚滑遲脉乾姜

肉桂治寒痰再加二米從來的卒側仆地不知人角弓反張風

痰立南星白附及天麻姜蠶牙皂兼汁瀝惡心嘔吐口噤酸胸

姜竹

膈飽悶為夾食右關緊滑名食痰平胃相兼麩芽入氣虛須合

四君湯血虛四物姜汁益脇痰白芥子青皮痰滯經絡須澀汁

醋姜

示言曰濕痰寒痰飲痰涎二陳寔是主劑若久而不治兩

寸堅滑名老痰根深固結致肺胃二脉伏結者名結痰膠粘

固結消吐不盡六脉瀄滯名頑痰隨火上升為狂為癩名火

痰此四者非一二陳所司也宜節齋化痰丸青金丹火痰治法

速用天冬去心。黃芩酒炒。海粉。瓜蒌仁。橘江各一兩。桔梗香
附隨水炒。連翹各五錢。青黛。朴硝各三錢。為細末。煉蜜入姜
汁為丸。丸如龍眼大。或噙化。或白湯化下。或細丸如黍米大。
姜湯送下亦可。

咳嗽

咳嗽當分二症。奇有聲無痰。咳症。醫有痰無聲。名曰嗽。嗽屬脾

家痰濕。嗽為肺經邪氣盛。風寒火濕亦因虛。主治當宜用保

和杏粉。蘇枯及前胡。杏仁花紫梗 黃山 枳實等 梳半。茯苓消痰。甘橘多引用。

生薑同燈草。飲時食後起。沉疴風痰。再添星。瀝升肺寔。桑葚不

可無。右寸脈洪有力 或氣急喘甚 若還風嗽聲難轉。麻黃用三石羔 用一是

真途清晨嗽多肺火動天冬麥冬在所用上午嗽者胃火伏剋

母石羔病自中下午嗽多屬血虛宜補陰四物湯火浮于肺黃

昏重黃昏嗽多不宜涼藥宜人春嗽芍芎柴加入夏宜清火麥

冬得秋用桑防冬解表麻防桂半乾姜悉已主治有聲有嘔吐

痰涎無聲者二陳平胃治之則再合枳木功誠妙茯苓半夏陳

厚朴白姜汁臨服不可忽已上治有痰無聲者

乾咳人嗽用滋陰內熱無痰最害人四物湯將為主劑再添知

栝鹽酒及元參燈心甘草和諸藥桔梗天花火用黃子貝母白扶

苓清痰用二冬冬栝欬葉潤燥行血見再加沙丹苑肺傷因用菝菹

酸收訶味瀉桑椹辛散防姜問好音而紅止血火炎上音

不吉日治咳嗽大法新者大約屬痰食風寒宜瀉散久者

大抵屬勞火陰虛宜補宜收然新者易治久者難治子製陰

化丸治久嗽乾咳無出其右不敗自秘謹傳于世用川三母

花粉欵冬花陳香圓各二兩訶子薄荷葉各一兩爲極細末

再用天冬麥冬去心紫苑元參各二兩桔梗甘草各一兩五

味子烏梅肉各五錢柿餅四兩煎湯去渣再入梨汁蘿蔔汁

各一碗飴糖二兩元明粉五錢姜汁三錢煎成膏子爲丸九

如雞豆大每噙一丸化盡嚥下再噙便藥力不斷神效難述

喘

那主休高無寒室一有邪干傾喘急風寒痰火各不同

法辯虛是內因痰火外風寒六脉浮洪更有方是為寒症五虎

湯麻黃石膏甘草益細辛半夏及桑皮杏仁枳殼再加人引用

葱麥徐徐服隨症加減方為的若有痰升痰喘症痰附兩星正

相應在進者退名火喘蘇子煎食後作喘食積來麩

洋查槩腹皮進大便燥結不能通元明粉兼蘇子勝結甚加何

者為虛正氣虛遇勞則發似邪欺吸吸短氣脉無力補中益氣

法精荷黃芩山梔兼火用菴苓半夏挾痰宜交食山查腹皮槩

氣高而喘是良醫

陰症

喉中爲甚水雞聲哮症原來痰病侵若得吐痰并發散還離厚

味藥方靈白菓二十二分去麻黃蘇子各二分芩五分款冬生夏

錢各三且爲君桑皮杏仁皆錢半三碗水煎二碗存食後徐徐溫

嚥下更能定喘法如神

示吉日喘爲惡候哮爲癩疾自古難之然猶易明也更有日

症最爲利害不可不知蓋人喉間有二管一軟一硬軟者連

胃而無底通有形之水穀上入下出名曰食喉硬者連肺而

有底止通呼吸之氣元門謂之十二重樓名曰氣喉若有形

之物悞人氣喉惟其有底不能下出必從上嚥出而後止若

嚥有形中之無形者如酸醋鹽水之類尚有方法可治若陰

有形之易碎者如粥飯之類尤易噎出若噎有形中之堅硬者如瓜子生薑之類上不出下不降必死無疑也醋噎咳嗽用甘草二兩每段切一寸長兩半劈開用猪膽汁五枚浸三日火灸為末再丸茶清吞下二錢隨臥服。食鹽噎嗽方用白麵砂糖各一錢糶餅灰汁捻作餅子爐內燥熱剗出加輕粉四錢另炒將餅以爲四掙摻輕粉在內冷病者吃盡吐出病根。

噎

寒熱往來名曰瘧正氣與邪相擊搏風寒暑濕食與痰亦有陰

瘧疾氣易傷分曰瘧疾正氣經陰分深兮應間作在氣分平臨也

陽為熱，寒為陰。並則寒熱離，則止。行則病作，離則病止。

榮衛邪氣並相爭，邪不勝，正移時早。為正不勝邪，移晚行。病治

法要分有無汗。無汗散邪藥為君，有汗正氣藥為主。更看新久。

再評論新。吐瀉宜發散。久者補氣及滋陰。無痰無食不成瘧。

初起清脾飲。葶藶、桑葉、柴胡、枳實、厚朴、陳皮、半夏、黃芩、茯苓、白

朮、青皮、醋炒。平生姜并用。候陰陽水煎露一。夜侵晨溫服效。

知神白汗去。母黑知豆無汗加蒼乾、葛精多熱。芩知加倍用多。

寒薄桂定。痛羌活、正要藥。煩渴不眠，葛粉、親夏月香薷。

并扁豆、冬入無。麻黃、葶寒甚加桂枝自汗去此治新慮有餘。

症若還虛久再。既日久自汗精神倦，六脉微細更無神氣短。

懶言不思食。夜間盜汗。又來勤人。參黃芪用補氣。歸芍鱉用。酸
 好滋陰。除出菓核及厚朴。漿姜為引。定功成。若欲截兮藥如何。
 寔者常山。栝最多。青皮烏梅真妙藥。丁香少許酒煎過。或丹河
煎或酒水夜裏露時侵晨。饑是日絕食。去沉痾。瘧母恒居左脇。水各半
各半煎間。瘧後脇下牛令人多汗。脇疼連藥宜消導。何為好。鱉甲稜蓬。三木
香附四般醋煑。停勻加海粉。青桃麴芽與紅藍為末。糊丸。日三服。
 病當漸去。不為難。

霍亂

霍亂之症起倉卒。外有所感。內有積。胃中停蓄。難運。消吐瀉交
 作。腹痛極上焦。但吐而不利。不焦。但瀉無吐。逆中焦。吐瀉兩相

兼偏陽多熱偏陰寒吐利得盡陰陽順其間死者終稀焉治用

加減止氣散霍香紫蘇陳皮全厚朴茯苓并半夏桔梗腹皮蒼

朮先白芷甘草砂仁末牛姜大棗水來煎炮肉紅花木瓜轉筋用山

查芽麥神麩傷食兼腹痛須加炒芍藥寒痛加姜桂炮肉似仙枳香檳青皮

心下痞柴胡乾葛寒熱纏小便不利澤猪效中暑發熱連藟香傳

轉筋入腹痛欲死藜湯薰洗病可止千金方有外治法男挽其

陰女牽乳手足厥冷脉將絕鹽納臍中艾炷接火灸人醒後酌

方細看陰陽及寒熱又有一種乾霍亂腹痛欲死病勢悍不吐

不瀉疔音絞腸沙鹽水吐之神妙案三因吐法用鹽二兩放刀上

用鹽淬入水內煩飲炷赤將井河水各一斤和勻探吐之後用藥調理但得吐瀉病無妨熱湯米湯不可按煨食

湯則外治曲池刺青筋委中出血亦有幹

示古按古人之論霍亂多責于暑故此疾多生于夏秋卽冬
月有之亦原伏暑而然。是以脉雖虛小手足微冷不可輕用
薑桂熱藥。况霍亂之脉沉伏者多。理宜正氣散。合香薷飲之。
類治之。此言一出。活人不少。但夏月之病寒熱不同。投治大
異。苟不具婆心。審問鮮有不天人者。河則假如病人的條月
中勞役動而得之。其爲熱也無疑。若雖從日中得之。于時又
多食冰水冷物。或從冷水中浴來。是又冷熱間雜矣。倘不從
日中勞役。暑氣高微。肉衰與冰寒齊進。冷館兼大扇清涼。陽

氣退藏。陰氣集。真寒不用桂附。何以活人。故先哲升易易令香

飲于非無故而發也

泄瀉 水穀為瀉

泄瀉之原有六節虛濕寒痰食與熱五泄之名內經傳滑泄利

泄三虛之旨先賢說飲食傷脾脾虛不能運化色慾傷腎腎虛

脾利水是主方燥濕升提不可缺或用風藥或溫補或因虛滑

直收瀉總用健脾參濕方一朮快難車前茯苓厚朴猪苓與

未通澤瀉陳甘木香列煨姜三片少許鹽酒積白苧葛根截濕

泄泄水腹不痛小便不利賜鳴動倍二朮加食泄腹痛泄後減

噫酸臭腐食不用加山查香附枳椏破仁寒泄脉遲穀不化腹

痛悠悠無休罷加炮參火泄腸鳴下黃赤一陣痛來瀉可怖肌

泄瀉

門儀痛脉數急黃黃到汗山。極真好許桂。虛世虛滿不思食

水穀食時完不化脉來沉細久不痊。入參山藥砂仁掛。痰泄泄

痰浮水面。泄下河者是痰或多或少麻滑善半。夏南星法必深吐

出痰涎人更便。六症從容審問明更分新久。壽力驗新者宜瀉

宜消食。久者升提溫補。益泄久下陷用升提升麻柴胡更有力

虛甚人參芍山藥虛寒炮姜肉蓯吃腎虛送下四神丸胡細酒

兩吳黃炮炒一兩肉蓯變裏煨二兩五味子二兩為未生姜半

斤同大棗一百枚煮爛取棗肉為丸每服一錢五分鹽湯送下

防風羌活兼風入暑月蕪滑扁豆壽冬天炮生誠有得虛泄久

泄更有方一是黃土炒為臨服人

刺

痢疾原來下膿血裏急後重不可說合積氣帶總相兼積辨
黃赤曰黑純白而來氣必傷血受病必應是赤氣血俱傷赤白
來食積爲黃是真的純血來者亦如之黑者須知死血色白膿
稠粘是爲痰苑如豆汁方屬濕諸痢下迫皆屬火勿妄以白爲
寒測通因通用具經文食積爲濕和葛藤後重須教調氣除清
而便膿應白息通滯湯治法傳條甚厚朴姜炒入蘇梗檳榔
共木通胸中不寬皮快陳穀立熟用黃連姜汁寫木香後重將軍不
可忽小水不利加滑車臨服木香磨姜汁頭疼惡寒身體熱蒼
木防風羌葛按名風邪病惡心作酸胸滿闕椒槌山查薤芽哪名身積
丙傷痢疾小腹痛桃紅能治紫黑血腹中不痛身不熱大孔迫

甚黃水洩氣鬱為痢用升朮柴胡防風不可缺煩渴身熱腹痛

極外穀入胃即吐噦噤口痢疾胃熱甚倉米人參蓮肉悅酒積

痢因恣飲酒葛根白寇烏梅烈天行疫痢老幼傳令用敗毒無

他說夏月香薷扁豆增腸癖銀花血白竭隨症加減是良工再

看新久醫中傑新者宜下宜消尅久者宜升宜補益諸痢日久

減檳榔加入扁荳芍白木補脾山藥及茯苓下陷升麻柴胡得

日久氣虛參芪用紅久血虛歸芍力血痢不止用阿膠荆芥蒲

黃同炒黑姜灰從治加少許若還不止血餘頭髮燒益痢久不

止人虛極胸腹不痛無食積四君四物隨症添調子粟壳且行

面如石榴皮肉黃水...

治樂口痢米田變情州人履者一乃利爽中引下其藥內用
黃連一錢人參三分煎湯終日呷之一口下咽卽愈

毛公威傳痢病神驗方用真川連一兩五錢吳茱萸湯拌炒
白朮五錢半土抄蒼朮米泔水浸炒四錢五分白芍酒炒二
兩當歸二兩蓮肉炒四錢山查肉八錢本香不見火二兩肉
豆寇麴包煨五錢四分芡芽炒三錢五分神麴五錢五分枳
壳麩皮炒去麩二錢五分右其爲極細末每服一錢二分壯
實者一錢五分小兒三五七九分看人小大用白痢白湯下
赤痢蜜二三匙和白湯下赤白相兼燈心湯下水瀉清米湯
下俱空心服忌一切腥膻食椒酒煎炒生冷等物

痢病積聚

此方投之虛弱之人及痢久者甚為穩當若壯盛初起腹痛甚及積滯勝者秘方白九子奇效 用阜礬揀淨一兩八白蘿蔔汁一鍾銅杓內火上化開再入好真粉一兩五錢和勻取起晒乾為末用神麩打糊為丸每服五分壯實者七分赤痢澄心湯下白痢姜湯下白瀉米湯下服後瀉出黑積藥即行矣

積聚

痰瘕積聚皆有塊食積痰血成其類積為食積有成形忽聚忽散聚為貴榮衛失序七情傷脾不運化神憔悴五積為陰五藏生六聚為陽六腑贅主治總宜化堅易留歸白朮為前隊半裏

陳皮枳實兼山查香附砂仁對厚朴木香等分煎生薑一片功

方遂右脇有塊皮山木青稜蓬左脇有塊川仁蓬芎桂肉食成塊草菓連粉

麵食積神子下貴痰塊在中海石加瓜萸白茯苓榔碎壯健人加

板稜蓬瘦弱人參少許配瘡後柴胡鱉甲青皮如要丸時加阿魏

外治法有神功五仙消痞痞能潰

痞塊外治秘法用小蠶一個紅莧菜二兩管仲五錢阿魏二

錢葱蜜各一兩共搗為膏再入麝香二分貼在痞上外用青

布掩着內服消痞藥神效五仙膏用大黃服阜生姜生

葱大蒜各半斤共搗爛用水煎取汁去香再煎成膏黑色為

度攤絹帛上先用針刺忌處後貼膏藥

痞滿

從來痞滿無痛。塊胸滿虛。悶難通。泰肯由土弱失運行。濕熱

痰多作怪。半補半瀉。是奇方。白朮茯苓為主。枳實厚朴及甘

陳木香香附砂仁在。蘇梗枳榔炒下子。引用姜棗。功難載。厥泥

加入炮乾姜。脈數黃連。燒汁方有賴。傷酒須添葛。寇澤查。如麥

芽治食積。小便不利。加澤通大便。結時將軍入。按痞痛甚。用大

黃脈來無力。參芪益。大黃。

示吉。按仲景云。滿而不痛為痞滿。而痛為結。結責之。裏復為

積滯有餘。則宜下。宜消痞責之。虛虛為中氣不足。則宜和宜

積滯補之則積滯未消邪得補而愈甚消之則脾氣未健士
受傷而愈虛不得從易老講一補一瀉之法矣許學士云
邪之所湊其氣必虛留而不去其病則寔斯言信然

嘔吐

乾嘔有聲吐有物聲物俱有嘔之則吐輕嘔重乾嘔凶嘔乃漸
出吐頓出不嘔不吐為惡心總是胃虛不能食有寒有熱亦有
痰有因停水因食積或因氣滯或氣虛加減平胃病自息半夏
陳皮共霍香厚朴香附及蒼朮枳椇桔梗引通砂炒為末一匙姜
汗臨服入煩渴欲飲脉來數黃連竹茹山梔落去蒼木吐水冷涎
脉沉遲炮姜肉桂吳萸作嘔吐痰沫脉滑時南星白茯苓木索

嘔吐

水停心下。泪泪聲。茯苓澤瀉猪苓。藥龍悶作酸。惡食氣。右關氣
 盛傷食。例神麩麥芽并檳榔。草菓山查肉傷利。麩傷加久病之
 後不納食。豚來無力。又微細。參芪白朮并茯苓枳桔厚朴三味
 去胸膈抑鬱善噫氣。忿怒憂愁不快意。檳榔卜子大腹皮升散
 并麻防風具傷酒乾葛澤寇佳傷風紫蘇乾葛易

噎膈反胃

噎膈之症多因火薰蒸津液成痰阻七情妄動五藏傷陰血漸
 稿無生所咽喉痛塞不能食。病起賁門上焦膈中膈飲食得水
 行食不半日又吐出。下膈飲食如平人。朝食暮吐。渾無力。主治

未二藥易失苓半夏甘黃上黃連山豆行行

通結梗香附共砂仁臨服一匙加姜汁菲汁童便次集增

泥中焦須竹瀝合用四物姜汁炒血虛左脈來微瀉氣虛須白

四君湯右脈乳弱并無力痰飲寸關脈滑沉瓜萸貝母能開膈

脈來數盛是火炎萸炒黃連倍用的脈來乳瀉是血瘀桃仁歸

尾菲菜汁寸關沉瀉是氣結沉香木香檳榔入大便燥結不通

行酒蒸大黃合四物再加桃杏仁麻仁炒為末養血潤燥牛羊

乳寒痰泥膈吳萸覓脾不磨者蘇子瓜萸心之類潤之麩同七情鬱結成氣噎寸關

沉瀉七氣湯乾姜黃芩肉桂得半夏橘紅并熟地甘草芍藥各

兩桔梗吃兩枳椇五枚參一兩氣病投之噎自息

示吉曰噎膈重病也其原非忿怒抑鬱即憂愁思慮其來有

漸如則痞滿火嘈吞酸不知治療。既而逢食則噎。尤可少食。久則食下則吐。或粒不下咽。當此之時。三陽執結。精血枯槁。若欲求愈。須病者安心靜養。行仙家十六字法。一吸便提。氣歸臍。一提便嚥。水火相見。如此行之。再加以薄滋味。勤藥餌。愈病不難。仙家云。屋破修容易。藥枯生不難也。張雞峯曰。噎當是神思間病。惟內觀自養。可以治之。此言深中元旨。若欲速效。而投香燥之劑。其害不可言也。開膈下食方。惟元明粉三錢。礪砂三錢。為末。每服三錢。用火酒一盃。姜汁半盃。共八杓。內煎二三滾。取出澄清。用小酒盃徐徐服之。自覺臍

下溫熱。即得飲食。天然文力切劑。服後即覺大補。受之香泉。

稍善也
尿元生所傳

呃逆

俗名打呃名呃逆。纔發咽喉則據寂連續數聲。軋軋然短促不

長。難消息有痰有火有停水有寒有氣有食積。主治丁香柿蒂

湯。丁香柿蒂陳皮當本方四味。柿苦寒。治下焦之逆氣。丁香陳

飲食太過胸中滿。麴芽枳椇及枳。痰涎壅塞。脉來滑茯苓半

夏木香方水。停心下。汨汨聲。白木茯苓猪浮等發熱煩渴。脉來

數。柴胡半夏芍黃芩去丁滯氣盈兮。腹胸滿。砂仁木香半夏存

胃中虛冷。脉來遲乾姜桂附木相親。脉來虛甚。全無力。六君合

用始為精。六君子人參茯苓半夏白木甘草陳皮諸呃不止。用沉香姜汁磨成脂

音宗說約 卷一 呃逆

服行。若還病久呃逆作虛極從來症最惡。六君合用沉香。寒

甚還同姜桂落。抱海本湯去竹筴。古人嗅法有奇方。明門灸法亦當學。倘

然大便秘成行。須用將軍無推却。

嗅法用乳香硫黃艾各三錢為末。好酒一鍾煎數沸。乘熱使

病人鼻嗅之外。用搗姜渣擦胸前亦好。

灸期門法。婦人屈乳頭向下盡處。骨間動脈是穴。男女乳

小者以手一指為率。陷中動脈是穴。男左女右。灸三五壯。

噯氣

胃納水穀。脾運化榮衛周流。無驚詫緣何噯氣。氣上升胃中。

執痰食話丹溪主治星半湯。南星山。呃共。生夏。石。煎。煨。手。付。

茯苓甘草陳皮生姜助食積麩芽枳椇氣滯砂仁木香及日
渴煩悶姜炒連虛甚人參芍白朮若還寒氣脉微遲或傷生冷
并寒物除去山梔及石羔加入炮姜木香益益智茴香及厚朴
隨症加減病如失

吞酸吐酸

飲食入胃脾不運濕熱相蒸為酸病。如穀食在器藏熱而易為酸也吐出酸水

名吐酸吐咯不出吞酸應若還不治漸惡心翻胃噎膈須臾進

丹溪加味二陳湯令夏草皮茯苓半甘陳已前定黃連蒼朮及砂仁神麩香

附吳萸順吞酸冬月倍吳更夏月吐酸連倍甚人參白朮虛弱

增枳椇山查食傷認再戒怒氣以平肝滋味薄時胃清淨

饋雜

硬黃山人白香

心饋總是屬虛火。火動痰生因作楚。二陳湯共桔連梔參木附

朴白芍伍煨姜棗子一同煎竹筍姜汁加皆可。嘈甚不止加石

蒸熱多青黛亦得所鬱用砂仁并撫芎便寒火黃酒蒸能救若

驚悸怔忡左寸瀉血少將來合四物麥冬遠志酸棗仁竹筍烏

梅炒米入終歲火嘈必天年火能燻物真可惜

水腫

人之全生資水穀脾主穀兮腎水屬水旺土虛不勝水水氣泛

溢浮腫局手拔成窟舉手滿皮光如泡氣喘促寔脾燥濕是主

芳利水分清真可錄上腫必須兼風台服鬼疔時數千谷經日

龍自上干浦陽之分下腫必須深洋府小便利分通水谷分消

湯是秘人傳二朮茯苓厚朴全猪苓澤瀉大腹皮香附砂仁枳

椀兼陳皮木香磨水汁生姜燈草一同煎上腫麻用二分防方有

效下不采已葉如仙米仁炒須麩芽卜子消食積應桑皮治

氣急利水消石并木通羌熟黃連山梔入腹服卜子共槌榔氣

生升柴少許益虛甚人參亦可加痰多半夏原有力梔為茵陳

不發黃牽牛大黃治便寔柱白又有虛症更宜商朝寬暮急血

虛殃合把湯真寬朝急氣虛症四君合用且先嘗先喘後服加黃

麥去二木香先服後喘倍二朮諸服用藥忌甘溫麩麩醬監切

莫食

醫宗說約 卷一 火噴水腫

示吉日分消湯治脚虛水腫上炒白朮須用三錢是有神驗
但先喘後脹其病在肺非分消所司也麥冬飲治水出高原
其症四肢皆腫少腹不急初起便有喘滿用麥冬五十粒去
心姜汁炒糯米五十粒水煎不拘時服 又秘方防芪散火
肺葉脹腫益肺主皮毛風邪入肺不得宣通肺葉脹亦能作
腫其症先眼下臥贅紋起喘急用防風桔槓杏仁桑皮蘇子
貝母各一錢黃芪三分水姜煎服 又有血分症婦人先經

水斷絕而後四肢腫滿小便不通此血疔水道以通經爲主

宜小調經散白芷五錢沒藥官桂甘草各三錢赤芍細辛當

歸延胡各一錢一七馬所一錢麝香五分爲細末每服二錢

酒下已上三症病同治異可命者無效

鼓脹

水腫鼓脹其原一皆是脾虛不運冠鼓脹病重水腫輕水腫皮

浮如常食。四版皆腫飲食如常其病在外故輕名變鼓脹氣入于臟為鼓脹腹大身瘦

食不入。名單鼓脹病在內故重脾虛致病是總原亦有水血與食積有因

氣寒及氣虛上工隨症用消息寒上分清是妙方二木厚朴炒

枳椇陳皮香附縮砂仁猪苓赤茯苓澤瀉的木香腹皮引生薑水

煎氣急磨沉香飽悶枳榔炒卜子血鼓腫中注皮紅丹膏血鼓鳴滿少腹脹痛

身卜有腹有塊痛按不移大便黑不愈加蜜胎桃仁血為殃山稜蓮木桂枝

水鼓小便苦心肝病朋腹脹急水飲傷日合用五苓散秘方用大戟

兩大棗二百同煮一時

去載旋七合 食積鼓脹大便結小便赤澀胸悶絕牽牛卜子及

粵水利為度 檳榔山稜蓬木亦可設氣寔鼓脹因抑鬱留滯不散腹脹急大

腸虛秘或吐酸脇肋痛脹及面黑令用功心氣 氣虛脹滿多勞

役元氣虛乏真倦極短氣漉泄腹脹膨脈來微細不思食宜合

益氣 分條而治是良肺用 醫寔脾利水為君則順氣消食為佐使清

金制木從來得用黃芩麥冬之類 滋補腎水以制火用知母 肺得清化

斯有力却監味以防助邪斷妄想保母氣益費服利藥圖暫快

補益真元病自息

示吉口人脾氣素虛現停水積乃生鼓症治斯疾者正氣足

而世所風行甚為上二七

利而暫取快是速斃也。予渴斯症嘗早服補氣健脾之品。食後進勝金丹一錢。消積利水順氣。雖無速效。活人已多。傳以壽世。勝金丹用蒼朮炒二兩。厚朴姜汁炒。枳殼炒。桃仁去皮尖炒。丹皮。陳皮。檳榔。赤茯苓。梔。黑丑頭末。木香各一兩。甘草。川芎各六錢。爲細末。外用皂礬四兩五錢。先用蘿蔔汁化開。濾去泥土。黃乾。再入醋煑乾。爲末。與前末和勻。再用神麩三兩爲末。打糊爲丸。九如菜豆大。每服一錢。虛人老人五分。湯下。并治胸膈飽悶。泄瀉痢疾。瘀血內傷。功不盡述。

癆瘵

腎經虛損各癆瘵。朝涼暮熱。病無賴。五心煩熱。消瘦形乾。咳失

血真陰壞陰常不足彥修傳朱丹溪有陰常不足陽常有餘論益坎勝離湯自

在發熱面赤盜汗來消中便赤切難載脈來微數兼無力日輕

夜重又喘急若日重夜輕又皆四房慾喪陰精滋陰降火病漸

息歸生芎常地川白皮丹茯苓天麥門冬六心各炒知栢母黃陳皮甘

草同姜棗臨服童便竹瀝好銀明骨皮治骨蒸黃白芪朮棗仁炒為

自汗保咳嗽氣急貝主心為末菀桑有痰貝母蔓仁了見血阿膠犀

苑丹寒熱驚甲酸灸早脈弦加宋從治畧加炒姜灰泄瀉山藥

澤瀉找去知栢歸童便盜汗浮麥堪為在牡蠣黑豆功亦大金櫻蓮鬚

去滑精再加山藥牛膝車前淨火動亦白濁加蓮荻燈勞熱龜膠青

山與

桔增收斂五味詞子共瀉甚減去歸知栢麩芽查朴同消食
示吉曰。男女人之大欲存焉。母致過度。陰虛症多。故丹溪以
此立論。然病名虛損。亦有從陽氣不足者。若因彥修之法。槩
治虛損。能免癡人乎。故有反是說者。謂陽生陰長。只當以參
芪補之。滋陰之劑。無益也。吁。一症一藥。豈容偏僻。參芪補陽
東垣已製方。治內傷元氣矣。丹溪豈有悞哉。是不善用丹溪
者悞也。

失血

心生血兮。肝藏血。隨氣而行。無處缺。目視舌言耳能聞。手能握。
特足能攝。緣何錯經致妄行。勞傷火動從容說。嘔吐血出名吐。

血從胃而來是真訣。宜犀角血皆因出鼻中。痰內有血名咳。

血肺經有火二症來。衄為輕兮咳禍烈。血隨唾出名唾血。痰帶

血絲名咯血。腎經有火妄煎熬。勞瘵之症難逃越。痰涎有血血

從脾脾虛不攝被火欺。六症皆從上竅出。鮮血為新紫血瘵犀

角地黄能總治。犀角丹皮生地各一錢赤芍當歸連黃黃炒酒

錢谷一芽根擣汁磨墨奇吐血阿膠天冬用衄血麥冬梔子炒依

咯唾栢知并熟地麥冬山梔加亦宜紫黑血塊胸中塞酒蒸大

黃并韭汁藕節擣汁最行瘵。浮火上升童便入。咳嗽沙參天麥

冬痰多貝母天花力口渴知母味麥冬寒熱青蒿鱉甲立脾虛

常黃 草皮 山藥 甘肅 人參 從 山 石 學 加 少 天 量 用 童 便 入

若吃若還不此用蒲黃俱相那芥俱炒黑服來微緩更無利

不藏講虛之則阿膠加入八珍湯四君四黃芩連犀角不可食有

內執加童便半盞姜反少許諸證云乾咳出血若服星便百下一如血寒丹百不一生宜童使不物飲之小便尿血

為溺血心與本腸邪熱結情心蓮子見林合本湯莖中疼痛湯

澆雪倘然不痛是為虛養肝回榮加減載不止荆芥及蒲黃俱

里補中益氣升提絕

下血雖從大腸來其原不一費心裁有鮮有序有遠近糞前血

糞後血有因血熱有氣衰或為腸風下清血而色鮮或臟毒下血色濁者是下

陷風邪亦致垂治法新久辨鮮序鮮者所者本方奇合用川芎

并白芍御花荆芥及地榆三味側柏將來蓉水煮甘陳煎飲病

無餘發執龜膠柴胡効血虛熱地血餘醫酒客烏梅寇吃烏下

陷防風升柴驅府功跌躓傷加麻地皮鱉從治姜灰少許俱

紫黑血塊芎瘀血桃仁紅花店尾訣鱉甲丹皮及用芎節芍莖

胡不可缺荆芥蒲黃俱炒黑水煎服時陳酒入不止蘇器熟大

黃塊止前方加減吃

下血不止若何醫泄瀉胸痞脉又虛此屬脾虛不攝血補中血

氣最相宜加入炮姜并芍藥血餘阿膠功最希

上下失血太多氣息幾微命若何寒涼之劑休仍用獨參

味起沉疴是陽生陰長之法

示吉日治失血大法其始也執主流通用清熱滋陰之品左

加以順氣如蘇子破疔如藕汁降火如童便之類其既也以
致肝脾不能藏攝須用補肝益脾之品切不可仍用寒涼以
傷脾胃血上湧不止用大蒜搗如泥或津調附子末下敷臍
心湧泉穴引火炷原血自止經如倉一末便竟以熱湯浸二
足亦驗若血出下竅新者正治本湯中便血加檳榔便結者
再加元明粉。湧血合四芩此在下者引而竭之也稍久用升
提升麻柴胡之類不止合補肝益脾之藥無不效矣雖然亦
未嘗尽其變也予常用消食之品而治吐血便血其效若神
蓋人但知脾虛不能攝血而不知飲食傷脾亦不能攝血

其要切右關沉緊者是予嘗用清肺之劑而止便血人但知
腸風臟毒熱在下焦殊不知上焦肺熱亦傳于腑而便血也
其要切右寸浮洪或洪數及血在糞後來者是人皆以予傳
秘方吁予方豈秘哉予不過察三部之中獨大獨小獨遲獨
數者病也餘病寔可例推

古吳曰了漢蔣示吉仲芳氏述

錫山醉道入計廉能元讓氏

天池白刃下毛漢迎方來氏

弟時行季芳氏

瑒葉舒高明韓氏

汗症

克肖天地名曰人。天地有雨人汗生。久雨之時天地否久汗之

人病自成。上工治汗須分別。自汗盜汗有二說。寐時汗出竟來

止盜汗陰虛兼火揅。動則汗出名自汗陽虛有濕兼氣竭自汗

補陽并調衛盜汗滋陰降火絕參芪湯治自汗來人參黃芪白

朮截。茯苓。當歸。兼棗仁。白芍。熟地。牡蠣。屑各一錢。烏梅一個并甘草

陳浮麥大棗煎一貼盜汗當歸六黃湯生熟地黃黃芩當歸

連柏等分黃芩用黃芪倍用水煎方陰陽兩虛自盜汗二方合用又

何妨泄瀉虛滿食不思芩連黃栢定須除加入棗仁并自芍豈

豆桃奴亦可施汗出不止法如何五倍為未津調和塗入臍中

真妙法或山撲粉亦除疔龍骨牡蠣俱為末白朮糯米麩小研過

用身撲之汗自止莫將厚被蓋身多

示吉曰汗症有虛無實調治不難但冬傷風非桂枝不愈

至汗內傷自汗原須補中益氣湯蜜炒升柴少加製附子

小麥麻黃根治之調其中氣使脚上利身不

則君火亦不能自為汗也。

頭痛

頭痛即非真頭痛風寒痰火虛氣動古人卷活冲和湯加減服

之真有用羌活黃芩及防風蒼朮白芷細辛芎生地甘草引姜

麥葱頭發汗自然鬆太陽倍羌症惡風寒少陽柴劫症寒熱口陽

明石膏乾葛攻自汗發熱不眠頭太陰腹痛倍蒼朮或有痰身

少陰倍用細辛功症足冷氣逆脉來沉厥陰頭痛吐痰沫手足

厥冷吳萸通脉沉肥人頭痛多濕痰二陳合用水相同瘦人定

是火壅上酒炒黃芩病可冲脉來洪數實火升重劑須知石膏

芩脉來無乃是虛火牛膝車前引火行導龍人人參黃芪氣虛

用症懶言無力合血虛四物酒送風熱在上頭

痛者天麻黃荆酒黃共頂巔頭痛加藁本酒炒片芩用亦中大

便秘結酒入黃金底地薪功最重若還真痛指甲青日發夕死

誠危恐

按半片頭痛古法本方中左痛合四物右痛合四君固妙更

有秘方用白芷二錢川芎三錢為末黃牛腦子一個共入磁

器內加酒頓熟和酒食之隨量一醉酒醒痛失矣外用吹鼻

法一用楊花川芎等分為末一用火硝川芎等分為末俱

妙右痛吹左鼻在痛吹右鼻又隔鹽灸法用一厚紙為圈

約一分厚填鹽其中放八角穴上開艾火置鹽心多七炷
炆如黃豆大圈約錢大可也 凡服頭痛藥須乘熱先薰後
徐徐嚥下藥力始到 又秘方治半片頭痛以致目中生翳
者用白鳳仙一株搗爛用火酒一斤浸之露七夜去渣飲酒
食後服神效。

心痛

心痛雖分九樣論

食風熱冷悸蟲飲症去來痛

皆因胃脘當心疼痛則不通

多成鬱鬱久而作執蒸大實痛時不可按按之痛減作虛因

蛇蟲痛止偏能食

而上兼有自斑唇紅時作時止

脉瀉須知瘀血成

必平日喜食熱物

饋雜善飢是胃火口吃冷物屬寒

或身受寒氣

痰痛吐痰脉沉滑

惡心惡食食傷生加戒調中治諸痛山梔陳皮草寇共蒼朮枳

梗與檳榔烏藥香附枳椏用半夏姜汁磨木香秘法一匙滴酒

送火甚竹茹姜炒連炮姜肉桂虛寒中去山痰血歸桃五靈脂

痰飲瓜蒌南星弄食積砂仁山查菖葉蟲痛川椒烏梅動便結仍

加酒大黃通則不痛從來重一用元明粉三錢亦妙真心痛時指節清夕

占旦元誠可痛

示吉日痛無補法勿用參朮得寒則凝不可純用寒涼故古

人用山梔而佐以姜汁也此症大都因有形之物膈礙其氣

而然法宜吐瀉以行其氣宜三因吐法或鷺翎探吐之外科

貼眼上冬實為妙法用透明雄黃火硝等分為末加麝香少

在鄉僻。藥餌不便。竟用鞋底泥。化入并花水中。攪勻服。甚佳。
此症痛止。切不可飲食。食必復痛。外蟲痛欲死。用老葱根。
搗爛。以汁香油和服。立愈。諸心痛。用良姜香附等。分炒為
末。每服二錢。酒送下效。

腹痛

腹痛之因。有幾般。食痰瘀血熱蟲寒瀉後痛。減知食積。痰則脉

渴小便難。或腹中釣痛。時痛時止。是火痛。四肢手足心綿綿不

止作寒看。症面青白或瓜用。唇口皆青脉來遲。內有瘀血致腹痛。必有常處不移。

動小便利。大便黑。面白唇紅痛不當蟲痛。惡心食不用。腹中乾痛。夏

天吐瀉胃暑來身重腹痛因濕中

或兼浮腫

手按痛止軟為虛手不

可近是實痛主治戊巳調中湯

蒼朮陳皮香附光厚朴茯苓并

滑石川芎白芷神麩方木香山梔

須炒黑各一錢

甘草姜灰少許

入痰多半夏及南星食積檳榔共

枳實砂仁蘇梗調氣滯葛根

白濁

冠澤消酒積

飲酒人多酒積痛

熱甚黃連不可無寒多羌桂

原有方去山

梔赤芍歸尾及桃仁瘀血痛塊加有益肉食停滯查草菓卜子

麥芽消麵食胃暑香茹并麝香傷濕木通倍蒼朮手按痛甚便

不通大黃三錢一齊吃按之痛減脉無力白朮白芍補虛則烏

梅川椒治蟲痛川棟桂槓內槓同要用臍下大痛治最難人中黑時

病已重

止痛法一用炒鹽一升緝包乘熱熨痛處冷則再炒
用生姜斤許。搗爛去汁取查炒熟熨痛處冷則加汁再炒并
治結胸痞氣。一用麩皮炒熱熨痛處。示吉日鹽性善走力
能軟堅。姜熱味辛。辛能發散。麩皮性熱。熱主流通。故能定痛。
加之以炒者。借火力直達于中宮也。大痛時先用此法。痛稍
定。辨虛實寒熱用藥。更為切當。

毛公威曰。痛則不通。總宜行氣秘方。桃靈丹治諸痛如神。用
桃仁一兩半炒半生。青皮元胡廣皮靈脂各五錢。沉香圓木
香各三錢。乳香沒藥各三錢。共為末。九種心疼。淡醋湯下。絞
腸腹痛。淡鹽湯下。食積瘀血痛。酒下。

脇痛

胆無別竅肝盡陰。位居兩脇怒為神忿怒傷肝主脇痛。風邪痰

食血能成小柴胡湯加減治柴胡半夏及黃芩白芍甘草青皮

用川芎丹皮次第行引加姜棗水煎服青黛胆草熱可增右脇

疼痛痰流注右關脈滑或走注有聲南星白芥白朮芩左脇痛時合四物

按之有塊瘀血或痛處不移左關沉澹桃仁紅花宜加入痛甚乳香沒藥

尋右脇有塊兼飽悶吐酸噯氣傷食症右關脈盛麩芽厚朴及栝

櫛肉食山查草菓應脇痛口苦并寒熱耳聾嘔吐寒邪訣胆汗

三匙入本湯神功妙用無人說脇痛內熱大便難沉實有力是

熱結痛隨利減加大黃瘀血桃仁不可缺脈來改細又加可成

大無力內傷多本湯須借人參力補中益氣合除病

示吉日臨為肝胆之區禁用汗吐下三法司命者須知外治
法內外夾攻自能速效。一用白芥子水研敷痛處能消喘
痰又兼辛散。一用吳茱萸研細醋調敷熱主流通又從治
也。一用萆菜一握縛定約寸許切斷成餅放在痛處上用熨
斗火熨之使萆氣入內即愈餅爛再易一枚萆菜氣辛開鬱
結又能逐瘀用者擇焉。

腰痛

先天之本惟兩腎。位在腰間藏精應房勞過度兩腎虛邪氣客
之腰痛病腎虛為主有瘀血或濕或痰或鬱熱風寒挫閃總能

腎氣元力
卷之二
腰痛

疼益坎湯中加減說山藥山萸熟地黃香附烏藥續斷截杜仲

故紙鹽酒炒丹皮澤瀉砂仁接引用青鹽空心飲尋常腰痛自

然絕痛之不已習知母黃栢脉數添或手紅口乾屬熱炮姜肉桂

脉遲設症足冷無熱不海或濕屬寒寒濕時見熱能除加蒼朮白木天陰疼

痛知濕熱加黃栢蒼朮白木川芎白茯苓挫閃板疼難俛仰歸尾桃仁牛膝列

便結大黃并桂枝赤芍紅花治瘀血內有塊痛日輕夜重尺脈

浮時定是風天麻防風羌獨活脉來滑疾又名痰腰背重注走

串雜南星半夏白茯苓白芷撫芎二木奪腰痛雖虛禁參芪寒

涼之劑不宜過久痛須加官桂開痛甚不妨加乳香藥沒秘法引經

香腰子黃湯煎藥功奇特苦還大便秘不通西燕大黃下可

又有腎著若物纏腰重如帶五千錢體冷如冰小便不利

姜各四錢甘草白木各三錢煎每服四錢空心服

示吉日腰為腎府腎坎象也水火並焉水衰則相火旺而腎

熱火虛則陰翳襲而腎寒水火俱衰上乘邪干均令腰痛宜

青娥丸大茴杜仲故子鹽酒炒各一兩熟地二兩胡桃肉四

兩為末蜜丸空心酒下一用猪腰子一其剖開入青鹽

三錢杜仲末五錢濕紙包裏煨熟空心食之炒

吹鼻點眼治閃腰痛法一用木香一錢麝香三分為細末

右痛吹左鼻左痛吹右鼻令病人手上下和之一用西瓜

皮陰乾為細末點目內睛明穴立愈

臂痛

手臂因何作疼痛經絡血虛風濕中或寒或痰或有傷秘法酒

經湯有用蒼白二朮川當共南星防風羌活秦艽動半夏桂枝羌獨

活補血須用芎歸頌經寒斷艾桂枝漆或肝遲痰多白芥什美澀汁

送症麻木不仁或硬塊白色脉數臂熱酒炒苓屬溫熱身重酸疼蒼倍進屬濕若

因判閃定為傷桃仁紅花靈仙應氣滯香附及姜黃氣虛黃芪

人參幸右脉浮大無力服時食後引生姜臨服陳酒一盃定

止痛法 一用瓦晒熱熨痛處 一用真蕪艾四兩揉成綿

裏痛處三法均熱主流通通則不痛之法

七頁痛

背屬太陽筋脈經太陽氣壅痛不行逆氣防風湯可引其本

活獨活存各二錢防芎一錢及甘草各六錢生姜為引水煎成身重

腰沉加防已脉遲附子藥如神二陳合治脉來滑背心一點冷

如冰屬痰合二陳湯勞役過度常常痛十全大補定功成四君四物加芩桂姜棗水

煎服或用補中益氣湯

痛風 俗名白虎歷節風 古名痛痺

遍身走痛名痛風血虛氣滯風濕攻濕痰流注脉來滑麻痺不

仁經絡壅上盛為風脉浮數盛為濕脉濡同日間痛甚為氣

滯夜間痛甚血虛凶肥白少痰蒼瘦火從風羌活有神功羌

活蒼朮酒炒芩當歸白芍牛均茯苓香附甘陳胡木香磨汁

醫宗鏡約 卷二 背痛痛風

水姜增上痛防風白芷妙下
黃柏牛膝尋熱痰瓜萸并枳椇
竹瀝姜汁臨服入脉滴血虛
二地黃痛其原須加乳沒發熱柴
胡不可無臂痛桂枝加有益
小便短滴合四苓骨節疼痛靈仙
力

按走注疼痛古名痛痺究其故血虛不榮內血瘀不養筋寒
勝則凝滯濕痰則留結使榮衛滯塞而不通何怪乎其為痛
也但痛而走注非寒痰濕血之所能其惟風之善行者乎古
人定名良有以也秘方用桑枝一小升細切炒香水三升煎
一升一日不拘時飲桑枝性平不冷不熱可以常服并能止

救消食利便屢效

頭眩昏暈病何如。如立舟中氣喘時時暗生花身自轉耳聾昏

倒事無知氣少血虛痰作病風寒暑濕亦須知內經眩暈責肝

木風木主升溪痰火兩相持清暈化痰湯主劑陳皮半夏茯苓

施各一錢五分白朮川芎羌白芷各七防風枳實胆星支天麻黃芩

須酒炒水姜煎飲病當除勞役過度自汗重黃芪人參氣虛用

去羌芪防風或失血產後是血虛當歸生地芍藥中去羌芪防

歸用藷中益氣湯脈數黃連并山梔遲脈炮姜肉桂重痰多竹瀝及姜汁中濕

身重增蒼朮或吐逆頃強不仁風脈浮有汗桂枝白芍的筋攣

掣痛脈浮緊寒則無汗紫蘇入冬加麻黃夏天煩悶暑脈虛麥冬五

味香薷益

麻木

麻病如繩縛初放全無痛痒木之狀總是皮温痰死血木病成

氣虛麻症方來當開痰活血治水方川芎茯苓當歸陳皮生

地牛芍添夏葉各一錢白芥桃仁紅花望各八分甘草生姜一併煎竹瀝

姜汁臨服放臂上桂枝不可無牛膝靈仙下部蕩南星二末治

濕痰寒壅經絡川烏壯麻症治法又如何益氣行氣功最多補

中益氣湯為主參芪升木陳廿升柴木香香附川芎徒青皮桂枝加少許

棗姜煎服定除疴扶苓半夏有痰用脉來羌活秦艽夾風送浮脉

者身重脉濡蒼木增痰瘦人脉數苓連黃須痰火苓肥人付子脈

引經醫須制少許用

痺症

痺症有五原歸一。骨痺皮痺筋痺其原總屬風寒濕。風能走注寒

善痛濕多重著脉來澹。或浮或緊故有痛以致麻木皮不仁不

能行動但能食舒經湯用好姜黃四兩洗當歸赤芍共白朮各

甘草炙活各一海桐皮兩為末三錢生薑入盞半水來煎

八分去渣磨入沉香汁

痿症

四肢軟弱名痿症。但能飲食行難在五臟五痿出經書。痿痿筋

筋不舉氣痿肺鳴皮毛枯槁獨取陽明脾肺病。陽明脾皆由酒色

醫宗金匱

真氣傷清心補腎病自定參歸養榮湯用人參熟子當歸白朮

苓陳皮白朮兼芍藥栢知故紙酒炒行牛膝杜仲等分用

甘草減半水煎吞肥人有痰加葶半瘦人多火用梔等分用

瘀血脉瀆弱桃仁紅花宜所增食積妨礙亦成痿食積每中加

減論

示吉日痺痿俱能食而不能行症相同也但痺多實痿多虛

痺多寒痿多熱痺為濕痿為濕熱苟不明辨調治自差其要

在有痛無痛中分有痛為實痺也不痛為虛痿也此為要

者辨至于用藥又當隨其所挾看其所急臂之痿症雖虛若

二使必結燥腸胃能不用大黃以開之平正性實古

心痿以黃栢為君。黃芪等補藥為佐。而無一定之方。蓋欲學
者隨其所決而用藥也。

癩症

卒時暈倒。口流涎。身軟。口噤。咬牙。間出聲。齧齒。名癩症。五臟五

癩病。

自夏草皮

煩總因痰火塞心竅。

作音聲者。膺之。笛孔。開閉不同。祛

痛三腫。功不凡。茯苓。半甘。陳犀角。屑黃連。枳實。沉香。截。膽星。遠志。

及葛蒲。竹瀝。姜汁。臨服。設辰砂為末。好鎮心。開閉牙。早鈎藤。絕。

示云。口癩與瘧相似。但癩則身軟。時醒。瘧則身強。直反張。如

弓。發不時醒為異。仲景云。身熱足冷。頭項強急。惡寒時。頭熱。

面赤獨頭暈卒口噤肯反張者。瘧症也。方具傷寒科中。至于
雜症成瘧變症也。大抵屬痰屬血虛血虛參歸養榮湯見瘧
症加羌活防風黃芪桂枝痰用瓜蒌桂枝湯瓜蒌芍藥甘草
桂枝水姜煎服。瘧症多用桂者。以瘧爲肝病。肝木主筋。桂能
緩筋而伐肝。所謂木得桂而柔也。若陰症成瘧難治。回陽救
急湯加桂枝白朮方在傷寒科。

癲狂

肝實多怒名曰癲。錯亂妄爲不可言。心熱多喜狂呼叫。妄言妄
見是狂。然難經雖有陰陽別均爲熱症。河間說從來宜瀉補不
宜在上。吐之病自歇。病在下者微利之。王鳳樓將徐邴散祛癲

二味症甚有功。但得寧靜補心血。天王補心是妙方。其地溫
補病州絕飲食過度病復來。在咎醫家不先說清心寡慾并安
神。恬澹滋味善調。揖傷寒之病變發狂。節菴方法真奇訣。見傷寒
邪崇欺人。詈罵來承祖灸法第一節。

治火亢吐法。治心火亢甚。喜笑不休。用食鹽二兩。放刀頭上。
用火燒赤。研細。入半夏三錢。竹葉一兩。河水二大碗。煎三四
沸。去渣待溫。入竹瀝半盃。姜汁三匙。頓服。鷺翎搽吐熱痰。即
愈。下法治實熱。大便燥結發狂。用大黃四兩。酒浸一夜。水
三升。煎之分三服。能食脉沉實有力者立愈。

秦承祖灸鬼法。治一切驚狂。謔語踰垣上屋。罵詈不避親

疎等症以病者兩手大指用細麻繩扎縛定以大艾炷置于其中。兩介甲及兩指角肉四處著火一處不著即無效矣。七壯神妙。

治發狂秘方。用好生犀角四兩剉末。每用一兩加清水十碗入砂鍋內熬至一碗。濾淨再加水十碗熬至二酒盃。另以淡竹葉四兩水六碗煎至二碗去渣。加犀角汁同服。四劑立愈。婦人產後血迷心包亦令。願狂歌。唱無時。踰垣上屋。并加味逍遙散。用當歸白芍白朮茯苓柴胡生地遠志桃仁蘇木紅花甘草小姜煎服。此屬虛症宜瀉。故子皆出。

此方用辰砂末

驚悸怔忡

驚悸忽然心惕惕如人將捕時驚感跳動不已名怔忡寐寐神
魂多恍惚精神短少或多痰健忘之病因而得皆緣大恐與大
驚觸事喪志心神失志用四物安神湯當歸川芎芍地黃參神
梔子黃連酒炒木麥冬酸棗竹茹當烏梅炒米引姜棗隨服研入
辰炒好時跳時止定因痰二陳合用痛自了心下悸動是水停
猪苓澤瀉不可少

健忘

心氣不足事多忘有始無終作事忙發言首尾都忘却思慮勞
傷治病妨天王補心直妙藥川連酒炒酒洗二生地黃酒洗當歸麥

虛煩不寐

冬五味子。柏仁。棗仁。元參。當天冬。茯神。并桔梗。丹參。遠志。合成

方。各五錢。菖蒲一兩。其為末。蜜丸。送下定。驚恍。朱砂為衣。臨臥服。

引用燈草竹葉湯。每服二錢。肥人脈滑痰迷竅。胆星半。夏莫相忘。

虛煩不寐

虛煩不寐。是何緣。心熱。臆寒。病自兼。痰涎沃心。誠可怕。加味溫

膽病當痊。半夏竹茹。陳枳實。茯苓。甘草。棗仁。先遠志。人參。及五

味。熟地。姜。棗。一同煎。臨臥服。熱在陽明。不得睡。竹葉石羔。勝如仙。

傷寒條內。分明說口渴自汗症。相全。

示吉口健忘。驚悸怔忡。虛煩不寐。俱屬少陰。故多用安神養

心之品。然須察其所挾。挾水者。合四苓。挾痰者。合二陳。再察

所因如因勞役過度或病後而來宜補中益氣
心黃枯滋腎其病自退若因思慮過度勞傷心脾而來者宜
歸脾湯益思傷脾脾足則神寧意定也諸症總不宜涼劑重
瀉脾土瀉伐心火火微上衰則痰涎日甚而不可為矣

歸脾湯治脾經失血發熱盜汗或思慮傷脾不能攝血以致
妄行或健忘驚悸或心脾傷痛嗜寤少食血虛發熱虛煩不
寤等症用人參白朮黃芪茯苓當歸遠志棗仁龍眼肉各一
錢木香炙甘草各五分姜棗煎服

黃疸

疸雖分五實歸一

黃汗黃疸酒疸穀疸女勞疸丹溪目不益是
必分五種總是濕熱如會舊難相似

虛煩不寐

脾虛胃不實水穀濕熱相鬱蒸發黃腹滿溺黃汗有如會刃通

身黃。眼珠指甲俱金色。欲除濕熱利小便茵陳五苓湯有力茵

陳澤瀉猪茯苓山梔木通并白朮山查枳實共甘陳桂枝少許

兼滑石姜棗燈心河水煎厚朴檉柳消食積身熱柴胡乾葛增

腹脹腹皮卜子入傷酒白寇其葛根浮腫蒼朮應有益口渴腹

服大便難加入大黃去白朮名加未茵陳大黃湯小便自利大便黑按腹

則痛疼血慎桃仁承氣湯中惡心吐酸胸腹滿右閃緊盛

食從飲食條中治二者俱宜勝金丹見鼓食消血去黃自息腹中無病

能飲食二便如常不苦濟惟有身痛脈來大煩躁頭疼苦鼻塞

此因寒濕客頭中仄蒂搐鼻黃水出

秘方摘鼻瓜蒂散用瓜蒂二錢爲細末再入母丁香一錢黍米四十九粒赤小豆五分再研極細至夜令病人先含水一口將藥半字吹入鼻中待下或吐去水便睡至夜半或次日取下黃水則愈若病在遍身者內服茵陳湯

宗吉日疸症在上者吐之微汗以散之摘鼻以除之在下者引而竭之大便實者下之必使小便清白爲愈病之常治之經也外有瘀者逐之蟲積者消之寒者溫之病之交治之板也蟲積如吃泥上米炭發黃依蟲症條中治之陰症發黃四逆湯加茵陳詳傷寒條凡疸散成鼓者危黃入手足心渴而熱甚者難治

驗黃疸生死法。用二指重按胸前臆中穴。二指左右分開中間有血色者可治。秘方外治用生姜一斤搗爛入酸醋一斤和平胃末二兩調勻遍身塗之。少頃戰栗汗出內瀉黃水而愈。

斑疹

遍身紅點名曰斑。斑無頭粒疹生頭粒又多番。疹有頭粒浮小隨出隨沒先日

赤人昏憤脉來洪大更心煩熱傷血分乘虛出鮮紅稀射方。

吉紫黑稠蜜定傷生和解辛涼消毒力將出未出升麻湯升麻

葛根川芎立甘草棗姜水煎服。再者紅花亦有益已出之後去

升麻已下牛蒡元參

精義謂口渴身自汗竹葉石膏粉米煎

驗斑疹蚊跡法以紅紙燈焙病人面部胸背四肢有紅點

者斑疹也疹輕斑重先將姜汁噴于斑上隨輕重用藥若病

人安靜脉不洪大紅點惟在手足且先紅後黃是蚊跡也切

宜細察

濁症

小便去濁名濁症皆因濕熱為之病白者如米泔名白濁赤者

凝如膏湖經曰未赤屬血今白屬氣肥人濕痰膀胱滲清心蓮

子用石蓮去壳取肉人參黃芪赤茯苓淨地骨麥冬及車前黃芩甘草

功相應肥下人須合一陳湯二木升柴亦莫剋酒炒知柏脉

濁症

數添久而不止升柴進。瀉精金櫻并蓮髮山黃牡蠣真能任瘦
人血虛因而得赤色居多合四物暑天伏暑用清涼香薷扁豆
兼滑石白濁腎虛葶飲益智真蒲烏藥等四味等煎煎成人少
鹽空心一服功成穩

示吉日便濁則降火清痰分利精濁則益腎滋陰固脫關要
也。外有肥人多濕痰清痰是要瘦人多虛火降火爲先老人
因虛寒而致可求溫補夏月肉伏暑而然法用清涼是亦丹
溪之法傳于言外也

淋

小便淋瀝爲長是心火功去其人也三焦寒者及戊之本血石膏

赤澇不通痛不已欲去不去任又來淋瀝疼痛無人理清心分
 利是良方犀角黃連梔子擬消石木通共車前麥冬赤茯苓
 抵竹葉蓮心燈草煎還加青黛痛脫體弱出砂石名砂淋石葦
 瞿麥葵子行血淋尿血莖中痛栢葉藕節生地臨不痛老為尿血高濁
 賴數膏淋症茯苓白木半夏真勞倦則發是勞淋人參黃芪歸
 朮白尋常石餘瀝身又冷是氣淋黃母木香檳榔高湯皮歸澤青瘀血作淋脉來皆
 瀦牛膝煎膏病自平脉數栢知方有效下陷升柴更覺靈脉來
 無力參朮用白大便秘結大黃行

示古曰三濁五淋俱小便去濁也濁多虛淋多實益淋痛濁
 不痛為異耳濁淋俱屬熱症惟其不痛大約屬濕痰下陷及

小便不通

脫精所致。惟其有痛大約從淫慾火動強留敗精而然治之不可袞同。故男子女人五淋帶下初起小便痛者用白茯苓黃名一錢五分百草霜五共為末雞子清調蒸熟作丸。白湯下空心服尿白即愈。毛公威傳此方泄瀉者不可用。

小便不通

小便不通有二症。渴在上隸肺熱病不渴方屬少腸二膀胱實熱通閉。應渴者須投清肺湯。赤茯苓芩澤瀉當通草車前扁蓄妙木通瞿麥飲無妨。琥珀為末引燈草空心一服是仙方。若還不可渴小便秘通閉丸用知栢意各一兩俱酒炒肉桂為末用一錢熱水

為丸... 子... 刻... 心... 送... 下... 一... 百... 丸... 頂... 兩... 足... 時... 爽... 行... 易... 已... 上... 二... 定... 是...

大綱投之不利吐之愈皆因痰塞中上焦如然上竅塞而下竅
閉法煎二陳探吐之久不通時當提氣勿用巴豆及牽牛大便
秘結八正散濟若兼嘔吐名閉格老人鼓脹總不利皆死此

示吉日小便秘日久則水滿而死急症也外治法不可不講

一用皮硝一合連鬚葱一根同搗用青布攤似膏藥貼腹臍

上熱瓦熨之即通 一用炒鹽封臍腹 一用麝香半夏為

末填臍中上用葱白燥蝻二末搗成膏為餅封臍上用布帛

縛定下用皂角燒烟薰入陰中白通女人用早角煎湯洗陰

戶若在胎前名曰轉胞是胎壓腫尿泡不得小便也宜穩婆

托法詳女科 總之右寸關滑實者多煎二陳湯以吐其痰

因痰塞上竅以致下竅不通也。右寸閉細微無力或浮大無力是屬氣虛宜獨參湯補氣經云氣化則能出矣若左脉芤滑或小腹有痛塊是屬瘀血桃仁牛膝作丸服若大便黑者桃仁承氣湯一單方治小便閉脹急垂危者用自己瓜甲燒灰水調服只取通竅之意也。

大便不通

心肺清肅腎水節津液充足內不熱大便溫潤自調均若還秘結津液竭大腸無血致成災更兼邪熱因而結壯年氣盛可下之大小承氣真奇絕。湯見傷寒婦人產後及老人久病之後作虛說

若用巴豆并硝黃暫時取決過最烈千金問果是良方也

黃當歸 枳殼 厚朴 黃芩 刺苴 草燈

心共水煎秘甚還加大黃九次便通即去之腹痛極即水香

開氣虛人參郁李人女來痰火瓜瓞并竹瀝風閉菴活牙皂莢一加

本老人菟蓉參麥用蓮婦苦芍紅花該小便多時或自汗津液

之人參麥味用扶衰

示吉按丹溪曰西北人壯實開結為主東南人氣弱潤燥為

要然因其地而分不若隨其症而治蓋便秘因風寒熱病者

雖東南雌老弱非用硝黃不可仲景所謂急下法也便秘因

于病後失血產後者雖西北雌年少亦宜滋陰補養丹溪所

謂潤燥法也變通而治何病不克至于結在廣腸導法尤為

醫宗統鈔 卷二 大便不通

提要三注附後 一用猪胆二三個每個傾去少許仍入醋
在內用盧管相接縛定一頭套入穀道以手燃之令病人覺
氣如忍大便狀胆汁入內卽通蓋酸苦能益陰潤燥也 一
用香茱油或麻油入猪胆中如上導法 一蜜導法用白蜜
六七兩煉稠厚黃色滴水凝硬再加入一五分皂牙末五分
和勻急傾入冷水中捻如指大三四塊先將香油抹穀道中
後用蜜條放入卽通

二便閉

肝腎實熱二便閉大便秘行時小便利八正散中用大黃木通滑

石車前意藟藟明安并白梔甘草燈心水煎利少止

神老人虛弱藥所忌

外治法

用蝸牛三箇連壳研如泥加麝少許貼臍中以

手按之立通

一用白螺螄搗爛填臍中亦妙 一用香鼓

一十粒連鬚葱一根勿洗生姜一塊食鹽二匙同研爛捏餅

烘熱掩臍上以帛扎定良久氣透自通否則再易

秘方

用白蜜半鍾白湯泡開入元明粉三錢空心服血熱

便秘用當歸五錢煎湯調服元明粉三錢並

脫肛

肺與大腸為表裏肛門閉結肺熱理肺臟虛寒則脫肛瀉痢久

黃川

虛下陷起

老人虛弱小兒元氣不足產婦用力過度故有此症

氣湯中參與芪芎歸升

麻五味已姜棗水煎空心服外治好將熱尿洗鞋底烘熱捺進
去再點冰片亦得體冰片為末點臍上瀉泄脫臍去當歸補中益氣甚
有禮大便乾滿努力來是為熱脫清涼擬脈數尖其黃栢知母
四物湯枳壳黃芩病自已

收臍散用熊胆五分兒茶五分冰片二分為細末乳調抹臍
上熱汁下而臍收矣熱瀉脫臍者佳并治痔痛

三消

心熱移肺名上消多飲水漿二便調或舌上赤衄多飲少食宜清金降火火熱在

胃偏多食大便硬分小便赤名中消善食而瘦自汗治清胃理中下消腎熱渴飲

身事論長乾更水歷小便淋瀝如膏狀其能自三股異津液

乾枯血虛一天花解毒泊三消粉麥冬五味粗葛根生地及
川連人參當歸甘草吃竹葉蠶絲及燈心徐徐服下有神力山
梔桔梗治上消黃芩石羔中消人黃栢知母治下消姜椒辛辣
不可食烏梅蓮肉合煎膏合本方煎膏再加下幾味人乳牛乳藕梨汁再加
白蜜共煎成不拘時候徐徐吃此症皆從燥熱來能食須防發
毒物不能食者傳中滿鼓脹等病醫官識

示言按渴症有三總歸無水外有酒毒作渴非葛花不除暑
熱消渴非香薷不愈喜食炙煖甘肥令渴豆豉有效汗吐下
後胃液不足而渴惟人參有功青梅止渴胃乾暴渴宜加栢
木作湯熱中消中當飲北梨甘蔗性水味甘酒渴鹽傷俱解

病因不同。歌難盡載。從此消息。亦有補也。朽木土中水中者。良方寸者。三十枚煎湯飲。治肥甘炙煇嗜酒。就辛以致消渴者佳。喜飲酒。灼人真陰。愛海味。喪人真液。皆令消渴。蔗汁梨汁主之。

夢遺

夜精遺失。多因夢心火旺時。相火動。清心寡慾。是良方。黃連生地。當歸。頌石。蓮。遠志。蒸人參。甘草。灰。神酸。棗。用不愈。蓮鬚。金。櫻。膏。臨服。食鹽。少許。送。

滑精

無夢遺精。是胃清陰虛。火旺。人。難。字。音。同。男。人。中。初。不。果。有。

用自安寧芎歸芍地知栢炒黃連梔子牡蠣搗沙參麥冬井山
萸姜灰少許元精保不愈辰砂共靜骨爲末時調服好

一用固真湯治無夢而遺用蓮蓋石蓮茨實棗仁遠志茯神

天麥冬桔梗車前龍骨等分甘草減半燈心水煎調辰砂末

服 此症大法不可用涼藥不可純用澁藥

脚氣

寒熱嘔逆傷寒意脚膝酸軟疼爲異腫濕脚氣實因濕不腫執

痛乾脚氣麻者因風必無汗走注而脉浮痛者寒拘急腫爲濕氣身重例

筋弛防已飲子總能司木通防已蒼朮鹽炒計生地木瓜與檳榔

麻瀉黃芩犀角川芎黃栢酒炒味甘草稍頭用水煎內熟苳連倍生地先痛

遺精脚氣

後腫倍川芎氣傷先腫後痛犀倍結甚記大便秘結加桃仁大黃

小便澀時牛膝利有痰竹瀝并半夏風盛秦芫羌活易嘔吐喘

急最為凶脚氣臨心病所忌

示吉日脾氣虛弱胃氣下陷亦令足跗氣腫蓋脾具坤靜之

德而有乾健之運中氣中和則升清降濁而無病若勞役久

病脾氣致傷土不制水胃中水穀之氣下陷令人跗腫宜補

中益氣湯升舉其下陷之陽浮腫自愈若以牛膝木瓜之類

治之病日甚矣脚氣外治法最妙用附子末津調塗湯

泉穴一用川椒一兩葱一握生姜三兩打碎水十碗同煎

先脚寒濕脚氣疼痛不仁俱治一用木通二兩水煎服

治足膝腫痛一日後發疹則愈如夾用他藥不效

疝

小腹急痛連等九疝氣原來有七般寒水筋血氣總為房勞并孤賈七疝

辛苦履冰涉水又經寒表問以下皆寒治丹溪濕熱法方完煖

腎散中荔核核未炒為故紙杜仲青皮烏藥香附及檳榔木通

川芎炮姜益川棟肉桂并當歸川椒大茴砂仁入等分為末服

五錢空心酒下功難述

示吉按雲林集云腸中走氣作聲或痛者盤腸氣也少腹陰

囊手按作响聲痛者膀胱氣也臍旁一硬并上釣痛者小腸

氣也小腹下注上奔心腹急痛者腎氣也陰子偏大小者偏

墜也。陰子雖硬大而痛者，木腎氣也。俱因熱鬱于中寒，求于外宜神效湯。用大茴、延胡、益智、蒼朮、香附、當歸、山梔各二錢。木香、吳黃各七分。川烏五分。砂仁七分。甘草三分。姜燈心水煎。臨服加酒。脹悶而痛，加乳香、沒藥、瘀血、脹痛，加桃仁、紅花、川芎。腎氣上冲，加沉香、枳殼。此方亦穩。予一日治二疝。

一人升上作痛，一人墜下作痛，俱悶痛欲絕。求方于予。升上者，予定故紙三兩炒黑，丑一兩生硫黃七錢，俱爲末，鹽酒打麪糊爲丸，鹽酒送下。墜下者，予定補中益氣湯，加杜仲，故紙肉桂、炮姜、香付、川芎。二人駭曰：疝氣同也，何方之不同？若是

諸蟲

濕熱生蟲。占所云。皆因飲食不調。均牛羊菟蟹都生。積米泥茶炭等。山成面色痿黃。心腹痛。飲食少進。肉不生。椒梅湯治諸蟲症。嘔吐涎沫。腹痛甚。烏梅。川椒。及檳榔。枳實。木香。香附。應川。棟砂仁。與厚朴。肉桂。炮姜。甘草。順等分。生姜并水煎。先食蜜糖藥。後進十五已前。蟲向上服之。卽效。如律令。望後蟲頭向下行。先用蜜糖肉汁。滲引蟲頭向上然後用藥

按遇仙丹下蟲之藥也。小兒最多蟲症。急宜修合。用白黑丑頭末一兩。檳榔生半炒一兩。山稜蓬朮醋炒各五錢。牙皂三錢。爲細末。糖拌小兒一錢。大人二三錢。酌虛實用之。糖湯

送下。空心服。

耳病

耳為腎竅。病屬腎。腎虛耳聾。不能聽。少陽胆經絡繞入耳。感受

邪氣。耳鳴。應醇酒厚味。動胃火。亦致耳鳴。紅腫盛。右屬陽明。左

少陽。紅腫流膿。風熱。蔓荊散用蔓木通。桑皮蜜炒。赤芍。升麻。定

生地。前胡。赤茯苓。菊花。甘草。俱等分。養稟煎成。食後服。但草柴

芩。左痛。進右。聾須合。地黃丸。川歸芍藥。功成。峻風熱熾盛。脉浮

洪。荆芥。防芷。芎。柴。靖。

按腎虛耳鳴聾者。宜地黃丸。加川芎芍藥。當歸。黃柏。菖蒲。遠

志。肉。或煎。或丸。俱妙。告耳中紅腫。冬前。用葱。烏。十。商。入。即。愈。

若耳中流膿。予家秘方。白龍丹。枯白礬一兩。飛過東丹二錢。
。侮螺蛸一錢。龍骨一分半。射香水片各一分。為極細末。綿
紙降。擦盡膿水吹入。少許即愈。若耳後陷中。紅腫恐成天
疽。急用神山苦。煎飲。台小柴胡。消之。倘成膿。則難治。慎之。

目病

目疾主治有專科五輪

五臟所居少。

目精屬肺。日氣輪。烏味屬肝。日風輪。大小皆屬心。日

火輪。上下胞屬脾。日肉輪。瞳神屬腎。日水輪。

目得血養。方能視。肝經風熱。目生疳。暴

赤腫痛。眼稍爛。迎風出

淚。怕汗。遇羌活。飲子羌。防風。赤芍。白芷。

薄川芎。甘草。陳皮。兼枳

芩。柴胡。乾葛。亦相通。水煎。乘熱。先薰眼。

徐徐服下。有神功。山梔。與芩。內熱。用龍胆。連翹。肝火。攻酒。蒸大。

黃加錢計。釜底抽薪。妙不窮。不能久視。昏花暗。腎經真水虛弱。

案又宜明目。地黃丸。熟地。飲子金。不換熟地。當歸。麥門冬。枸杞。

芍藥。川芎。伴丹皮。羌活。與防風。菊花。燈草。真有幹相火旺時加。

知柏氣虛人。參黃芪入。熟甚黃連及黃芩。損者益之。自有方。

洗眼法。一用防風。荆芥。連翹。白芷。歸尾。甘草。朴硝。日礬。胆礬。

少許水煎去渣。乘熱洗。一用古青錢。三文黃連。三分杏仁。

三粒。艾一葉。承一盃。煎三分去渣。澄清。一夜次日頻頻洗之。

凡患風熱眼。眶腫爛者佳。

沿雀盲方。蒼朮炒為末。羊肝同食。即愈。用齋者。豆腐同食。凡。

晝明夜暗者佳。

鼻病

無形之氣通于鼻鼻塞声重風寒客傷寒傷風在本條胆移熱

腦鼻淵

俗名腦漏

辛夷散能治鼻淵白芷

兩辛夷蒼耳得

各二錢半薄

荷五分共為末每服二錢葱湯食

食後服上

喜飲熱酒肺熱傷赤鼻

名為酒查鼻秘方只用連翹仁四兩為末湯來吃

臨卧服二錢

鼻孔

生蒼氣不通香臭莫辨熄肉寒辛夷川芎與防風木通細辛藁

本的白芷甘草及升麻詩為末三錢茶調益外用冰片吹鼻中

內外兼治法有力

用狗頭骨燒灰加礬砂少許為細末搐鼻中噤肉自化

口舌病

口屬脾經舌屬心舌和五味目知音肝熱口酸食亦作酸心熱苦

亦口脾熱口甘疽亦生腎熱口鹹虛則淡寒亦口鹹肺熱口練目生

成口乾欲飲皆為熱喜墜停木胃寒侵內傷勞倦淡无味噉水

不噉屬寒陰蓄血症亦喜噉水不欲上焦鬱火口舌碎或腫无皮神憔悴

重舌木舌口乾焦二寸洪救熱芎藭元參飲子是神方元參牛

旁連翹貴甘草桔梗共黃芩黃連生地枳壳最白芍薄荷炒山

枝燈草同煎祛病累牙肉腫兼白虎湯炙竹葉母梗米口酸胆草柴

青類不愈牛膝及車前引火下降如神謂大便結時酒大黃加

酒半盃不可醉

示言口舌病屬熱者多按古人多用木然此世之民苦

其則虛虛則近于寒故屬寒者亦不少其症口舌生瘡脈來
無力微遲飲食少思大便不實足冷服涼藥不效者是也是
命門无火浮陽上升宜八味地黄丸或用官桂噙之總之口
舌症皆因勞役致病房慾无度或費心憂愁而來者須從各
症本條合元參飲細心加減用之矣熱口碎用元明粉煎湯
噙嗽甚妙外治法舌腫滿口不能出聲用蒲黃摻之即
效一用百草霜錢許即服入元故舌上出血仍有小數
炒槐花爲末摻之即愈二熱症多舌出有病愈而舌不入
者冰片一分沫舌上即收有舌腫出口外以草麻油蘸紙
作燃燒烟薰之隨即消縮

齒病

木生干上齒生床

床牙肉為骨

床本陽明齒腎在下床腎物太腸

屬手陽明動而不休

上床不動則經當

足陽明止而不動

厚味濕熱陽明病牙床

腫痛理所定竹葉石膏是主湯羔竹升麻知母順元參糯米及

山梔水煎服時痛自瘳吸風痛甚是為風羗防荆芷辛芎進齒

宜露動搖長腎元虛損地黃峻

虛熱六味丸虛寒入味丸

示吉曰牙痛多腫口穢臭屬火者多故本方用涼藥而換屬

者兼風治也外有蟲蛀痛寒痛俱宜外治法一用白芷批

細辛各五分肉桂麻黃草烏各三分真蟾酥分半為細末麩

糊九桐子大每用一丸咬痛牙下即愈一用防風川芥

花峰房各二錢川椒十粒細辛二分食鹽少許水醋各半

嗽口立愈二方風寒蟲痛俱治 一用葷揆咬定痛處 二

用川椒童水爲末放碗內上用一碗合蓋用紙糊口不使
氣下用稻柴火一握其藥卽升上矣取下擦痛處神效

咽喉症

咽喉之位司呼吸人身橐籥緊要極忽然腫痛語言難入

病水難入主治加味甘桔湯一切火起總皆息甘草桔梗共

梔連翹防風只壳益黃芩蒼生地并當歸薄荷白芷薄荷減半入

草縮茶共水煎山豆根末調服吻麥冬花粉咽乾用豨莶

亦有中痰甚射干萎竹歷牛旁元參生朮動熱極便

虛火泛上栢知重此藥總宜徐徐服吹藥外治能却痛

示吉日咽痛挾多寒少水湯十有九中若因飲食勞倦死

虛火上炎脉遲足冷者非甘桔所司也。焯口舌病浮冰上并

法治之吹藥外治法。一用明礬為末吹喉中吐出痰涎便

愈。一用吹硝一兩五錢明雄黃三錢硼砂五錢僵蠶一錢

灰片三分為細末。筆蘸藥捲痛處立效。一用胆礬白礬火

膏片腦山豆根辰砂雞內金等分為末用鷺毛管吹藥入喉

即愈。一用胆礬五分半枯半生熊胆木香各二分為細末

用番水驚磨并水調和以鷺翎蘸掃患處立消

針法。喉中紅星用鍼從旁針之血出則愈。旁針不犯正門

穴也。一針少商穴。穴在患人手大指外邊。指甲後一韭葉許。針之出血。男左女右。取之如危急。兩手俱針。神效。

醫宗說約卷之二終