

El anticonceptivo oral combinado con clormadinona que:

disminuye las molestias **FÍSICAS** y **EMOCIONALES** asociadas a la terapia anticonceptiva, desde el primer ciclo de tratamiento.^{6,7}



Reg. No. 105M2017 SSA IV

1 tableta al día
(cada 24 hrs.)
a la misma hora **por 21** días
consecutivos

Seguidos de 7 días de suspensión de la ingesta.
Tras este intervalo, deberá reanudar la dosificación.¹

Referencias: 1. Información para prescribir Liberfem; 2. Katzung B. Farmacología básica y clínica. 13 Ed.; 3. Orizaba-Chávez B. Farmacocinética de la progesterona. Rev Hosp Jua Mex 2013; 80(1): 59-66.; 4. Devoto E. Actualización de la terapia del hirsutismo. Rev Chil Obstet Ginecol. POIAO 6D; E7L1 (H6)I:R 4S2UST-4IS31MO; 5. Ferlini SM, et al. Revista Médica Sinergia. 2020. Disponible en: <https://revistamedicasinergia.com/index.php/rms/article/view/333/700>; 6. Num1; 6. Huber JC, et al. Clin Drug Invest 2008; 28 (12): 783-791.; 7. Zahradnik P, Hanjalik A, Redlich A. Beneficios no anticonceptivos de 0,02 mg de etinilestradiol/2 mg de acetato de clormadinona administrados en un régimen de 24+4 días. Rev Chil Obstet Ginecol. 2011; 76(5): 344 – 353.; 8. Vasquez A, Ospino A. Anticonceptivos orales combinados. Ginecol Obstet Mex. 2020;88(Supl 1):S13-S31



ASOFARMA

Para notificar una sospecha de Reacción Adversa a Medicamentos, escriba a farmacovigilancia@asofarma.com.mx

Por la
LIBRE
con responsabilidad



Usted ayuda
a su paciente a decidir
por la opción anticonceptiva
idónea para ella



ANTICONCEPCIÓN ORAL COMBINADA con efecto antiandrogénico.³⁻⁵

► El efecto antiandrogénico de la clormadinona más etinilestradiol va más allá de la anticoncepción.³⁻⁸

- Es un AOC con esquema monofásico de administración.⁸
- Dificulta la receptividad endometrial⁸

► Disminuye alteraciones dermatológicas como el hirsutismo³⁻⁵

► Menores síntomas como fatiga o irritabilidad debidos a fluctuaciones hormonales^{6,7}

AOC: anticonceptivo oral combinado

SOP: síndrome de ovario poliquístico.

Estos **BENEFICIOS ANTICONCEPTIVOS** y **ANTIANDROGÉNICOS** facilitan la adherencia a la terapia anticonceptiva.³⁻⁸

