

N. N. Plavilstshikov, Moscou:

DESCRIPTIONS DE LONGICORNES NOUVEAUX DE LA CHINE
(COLEOPTERA, CERAMBYCIDAE.).

Prionus sifanicus, sp. n.

♂ Subvalidiusculus, nigropiceus, supra parum, subtus satis nitidus. sterno abdomineque satis dense fulvescenti-griseo pupescentibus. Antennis dimidium elytrorum parum non attingentibus, 12-articulatis, articulis 3^o—11^o apice corniculatis, articulis 4^o—11^o angulo apicali externo modice, subacute producto; articulo 3^o scapo vix longiore, 4^o tertio fere duplo brevior, longitudinem insequentis paulo sed distincte superante, articulo 12^o brevi, apice subimpresso et subtruncato; articulis 1^o—3^o fortiter inaequaliterque, non dense punctatis, 4^o—5^o externe ruguloso-punctatis, 6^o—11^o dense longitudinaliter striolatis, opacis. Palpis articulo ultimo longitudinem praecedentis multo superante, apice subrotundato. Capite sat magno, subtus dense ruguloso-punctato, in vertice fortiter punctato, in fronte ruguloso-punctato et longitudinaliter sulcato, in epistomate dense ruguloso-punctato; temporibus sat longis, subparallelis, leviter postice, tantum subrotundatis; genis sat longis, infra modice deorsum productis, minus acuminatis; oculis subconvexis, ad inserendas antennis late et sat profunde excisis, distantia oculorum in vertice scutello distincte latiore, diametro transversali longitudinem temporum fere duplo brevior (pars superiora inferioris parum longior et fere non angustior). Mandibulis sat longis, latiusculis, externe in dimidio basali impressis et dense ruguloso-punctatis, apice acuminatis, supra nitidis, disperse punctatis. Pronoto breve, longitudine sua fere triplo latiore, dentibus lateralibus latis sed parum evolutis, antico breve, intermedio lato et acute terminato, postico subdistincto, late rotundato; disco subconvexo, minute punctato, nitido, lateraliter fortiter ruguloso-punctato, subopaco. Scutello lato, apice rotundato, nitido, fere impunctato, linea longitudinali abbreviata subdiviso. Elytris summâ pronoti latitudine spinis exclusis ad humeros sesqui latioribus, summâ latitudine suâ circiter 1,7 longioribus, lateribus fere parallelis, apice latis, late rotundatis, angulo suturali subrotundato, spinâ nulla armato, dorso satis convexis, basi distincte et satis dense longitudinaliter breve striolatis, coriaceo-punctatis, nervis dorsalibus nullis. Prosterno indistincte transverse striolatopunctato, processu intercoxali apice subclavato, retrorsum declivi, coxis multo superante; meso- et metasterno nitidis, dense subtiliter punctulatis; abdomine minus subtiliter et distincte densior punctato, segmenti primi processu intercoxali breve triangulari, coxas vix discernente. Pedibus fortiusculis; femoribus disperse punctatis, posticis sternitum abdominale 5^{um} operantibus; tibiis latis, compressis, externe late sed non profunde sulcatis, rude asperatis. Tarsis 4 anterioribus subdilatatis, planta tata tomentosa, articulo 3^o anticarum brevi, lobis satis latis, apice rotundatis, intermediorum minus latis, apice plus obtuse rotundatis; tarsis posticis plus angustis, planta utrinque tomentosa, articulis 1^o et 2^o longitudinaliter anguste divisa, articulo 3^o lobis subangustis, apice obtuse rotundatis, non acuminatis aut spinosis, articulis praecedentibus apice acuminatis et subproductis.

♀ Antennis 12-articulatis, dimidio elytrorum valde non attingentibus, articulo 3^o scapo parum brevior, 4^o tertium fere duplo brevior, 3^o—5^o apice modice nodulosis, 6^o—11^o subcorniculatis, depressis, angulo apicali externo subacute producto, 12^o breve, apice subacuminato; articulis 1^o—5^o disperse sed fortiter punctatis, 6^o—11^o grosse ruguloso-punctatis. Capite oculis minus adeo.

evolutis, in vertice latius inter se distantibus, distantia inter eos scutelli latiore, pars superiora plus angusta. Mandibulis brevibus sed latoribus. Pronoto disco latialiter subimpresso, disperse minutissime punctulato, nitido, lateribus ruguloso punctato, dentibus lateralibus similiter atque in ♂ formatis sed postico fere nullo. Scutello rotundato-triangulari, apice rotundato-acuminato, disperse, sed multo densior ut in ♂ punctato, linea longitudinali nulla. Elytris longis, atque in ♂ formatis; basi fortius et densius longitudinaliter striolatis, coriaceo-punctatis, *sculptura distincte longitudinaliter composita*. Sterno abdomineque omnino glabris, nitidis, sterno minute denseque, abdomine dispersior sed parum fortius punctatis. Metasterno inter coxas posticas sat late distantes subexciso. Abdomine processu intercoxali sterniti 1ⁱ brevi, apice rotundato triangulari. Prosterno processu intercoxali ut in ♂ formato, mesosterno processu intercoxali apice exciso. Tarsis omnibus vix angustioribus, plantâ tomentosâ, tarsis posticis articulo 1^o glabro, non tomentoso, 2^o lateraliter glabro. Femoribus disperse punctatis, tibiis fortius punctatis, fere non asperatis, mediocribus et posticis externe indistincte longitudinaliter sulcatis. Ceterum cum ♂ congruens.

Long. corp. ♂ — 21 mm., ♀ — 28 mm.; lat. ad. hum. ♂ 9 mm., ♀ — 12 mm.

Habitat: China occ.: Szechuan, Giufu Shan, 1500—2000 m (collector anonymus Emm. Reitteri). — ♂♀ in coll. Dr. Heyrovský.

Cette espèce est bien caractérisée par sa structure antennaire, par la sculpture élytrale de la femelle, par ses tibias largement sillonnés extérieurement. par son pronotum très large avec les dents larges et courtes, etc. Elle diffère de *P. gahani* Lam. par ses antennes plus longues avec le 3^{me} article plus long, par la sculpture de la tête et du pronotum, par la sculpture de la base des élytres, par les lobes du 3^{me} article des tarses postérieurs moins arrondis, par les tibias largement canaliculés chez le ♂. De *P. laminicornis* Frm., *potanini* Lam., *delavayi* Frm. oinsi que les autres espèces de l'Asie orientale *P. sifanicus* diffère par la structure des antennes, de *P. boppei* par le nombre les articles des antennes.

Asiodiphrum, g. n. (Callichromina).*)

Generis *Cataphrodisium* Auriv. et *Embrik-Strandia* Plav. proxime. Antennis apud ♂ corpore paulo longioribus, articulo 1^o apice parum prolongato, non dentato aut spinoso, articulo 3^o quarto in 1,3, quinto parum longiore, 2^o cum 3^o articulis 4^o cum 5^o multo brevioribus, 5^o quarto distincte longiore, 11^o appendiculato, decimo longiore; articulis 3^o—10^o apice distincte anguliformi productis. Prothorace lateraliter tuberculo conico, magno, ornato, antice indistincte, postice distincte constricto, disco utrinque tuberculato. Elytris nudis. Femoribus posticis apicem elytrorum vix sed distincte superantibus. Tarsis posticis sat longis, articulo 1^o forte lateraliter copresso, supra subcariniforme, articulis 2^o cum 3^o fere duplo longiore, articulis 2^o+3^o+4^o longitudine aequali; articulo 2^o lateraliter distincte copresso; articulo ultimo longissimo, articulis 2^o+3^o non brevior. Tarsis mediocribus articulo 1^o lato, non copresso, articulis 2^o+3^o longitudine aequali. Pronoto capiteque supra dense velutino-tomentoso, elytris bicoloribus.

Typus generis: **A. nigrofasciatum** m.

Ce nouveau genre appartient au groupe des Callichromines avec le 1^{er} article des tarses postérieurs déprimé latéralement. On peut le distinguer d'après la tablelle suivante:

*) Une permutation de lettres de l'Aphrodisium.

- 1 (6) 1. article des tarses postérieurs plus ou moins fortement déprimé latéralement, long. Elytres non métalliques, ordinairement au moins en partie veloutés, foncés avec les bandes ou macules claires, ou clairs avec les dessins foncés.
- 2 (3) 1. article des tarses postérieurs fortement déprimé, caréniforme en dessus; 2^{me} article fortement déprimé. **Cataphrodisium Auriv.**
- 3 (2) 1. article fortement déprimé. 2. article modérément déprimé, un peu plus étroit que le 3. 1. article des tarses intermédiaires large, non déprimé latéralement.
- 4 (5) Elytres finement veloutés. Prothorax plus large que long, sans tubercules discales distinctes. Antennes bicolores, articles 4.—11. fortement carénés longitudinalement, prismatiques. 1. article des tarses postérieurs courbé. **Embrik-Strandia Plav.**
- 5 (4) Elytres dénudés. Prothorax plus long que large à sa base, avec tubercules discales prébasales bien développées. Antennes unicolores, avec les articles subcylindriques, sans carènes. 1. article des tarses postérieurs rectiligne, non courbé. **Asiodiphrum m.**
- 6 (1) 1. article des tarses postérieurs non déprimé latéralement, large et plan. Dessus du corps ordinairement plus ou moins brillant, métallique (sauf le sous-genre *Opacaphrodisium*, offrant le dessus du corps velouté et les élytres ornés de fascies).

Aphrodisium J Thoms.

Asiodiphrum nigrofasciatum, sp. n.

Violaceo-cyanescens-niger, fere anthracinus, elytris aurantiacis, fascia latissima anthracino-nigra ornatis (aut nigris, basi apiceque aurantiacis); vertice pronotoque nigro, breve holosericeo velutinis; meso- et metathorace abdomineque nigro sericeo pubescentibus. Fronte indistincte ruguloso, inter antennis longitudinaliter sulcato, vertice sulcato et dense punctulato. Antennis corpore paulo superantibus (σ^7), articulis 1^o—3^o subnitidis. ceteris opacis; articulo 1^o apice fere non producto, dense punctulato, 2^o brevissimo, 3^o apice fere dentiformi producto, infra breve ciliato. Pronoto longitudinaliter sulcato, ante basin utrinque tuberculato, post apicem tuberculis indistinctes ornato, disco densissime punctulato, lateraliter irregulariter punctato, subcarioloso. Scutello oblongo-triangulari, longitudinaliter sulcato. Elytris minutissime punctulatis et in partibus aurantiacis minutissime breve aciculatis, opacis, apice singulariter late rotundatis. Abdominis segmento 5^o profunde exciso, ultimo late exciso.

Long. σ^7 31 mm., lat. ad hum. 7,8 mm.

Habitat: China occ.: Szechnan, Giufu-Shan, 1500—2000 m. (collector anonymus Emm. Reitteri). Specimen unicum in coll. Dr. Heyrovský.

Cette espèce rappelle par sa coloration *Cataphrodisium rubripenne* Hope *ab. latemaculata* Pic. Elle est caractérisée, ainsi que le genre, par la structure des tarses, d'après laquelle elle est plus voisine à *Embrik Strandia* en différant par plusieurs caractères. Je n'ai pas constaté la pubescence élytrale: les élytres sont dénudées, microscopiquement ponctués et aciculés sur ses parties claires, un peu plus fortement ponctués sur sa partie noire; la bande noire est très large en occupant deux tiers des élytres, la base et le sommet (environ la première et la postérieure $\frac{1}{6}$ des élytres) seulement sont claires, cette bande est plus sinuée antérieurement que postérieurement. Le dessus du corps est totalement mat, le dessous est un peu brillant. Prosternum densément et plus ou moins transversalement rugueux, avec la ponctuation irrégulière; meso- et métasternum densément, abdomen très densément punctulés. Fémurs antérieurs

et intermédiaires avec la ponctuation modérément dense et irrégulière, postérieurs finement et très densément ponctués; fémurs et tibias finement pubescents et densément ciliés.

***Chelidonium impressicolle*, sp. n.**

♀ Olivaceo-viridis, antennis opacis, nigro-violaceis, pedibus cyaneo-violaceis; sat nitidus. Fronte profunde longitudinaliter canaliculato, ante apicem transverse plicato, ante basin irregulariter punctato; epistomate disperse punctato, viridi-aeneo; mandibulis in dimidio basali longitudinaliter rugulosis, ante apicem minutissime punctulatis et cupreis; genis fere impunctatis; vertice longitudinaliter sulcato, irregulariter ruguloso punctato. Antennis apicem elytrorum parum non attingentibus, articulo 1^o apice breve sed distincte dentiformi producto, distincte depresso, dense punctato, 3^o quarto sesqui longiore, 11^o distincte appendiculato, decimo longiore; 3^o—10^o apice externo distincte anguloso productis. Prothorace tuberculo laterali postmediani instructo, ante apicem lateraliter non producto, ante basin et post apicem leviter constrictio; disco in dimidio apicali late longitudinaliter sulcato, in dimidio basali tuberculis transversalibus parum evolutis ornato, medio utrinque impresso, irregulariter sed distincte transversim ruguloso, lateraliter vermiculato, tuberculis lateralibus concentrico ruguloso-plicatis, apice glabris. Scutello triangulari, latissime excavato, minutissime punctato. Elytris densissime subtiliterque coriaceis, ad suturam minute rugulosis, costis tribus distinctis (interna abbreviata) ornatis, apice subangulato-rotundatis. Prosternum sat forte, medio transversim, ruguloso, meso- et metasterno densissime punctulatis. subtiliter argenteo-griseo pubescentibus.

Long. 28—30 mm., lat. ad hum. 7—7,2 mm.

Habitat: China: Szechuan, Giufu-Shan, 1500—2000 mm. (collector anonymus Emm. Reitteri, 1. spec. in coll. Dr. Heyrovský, Yunnan, Pe-Yen-Tsin (ex coll. J. Clermont, 1 spec. in coll. mea).

Chelidonium impressicolle est caractérisé par sa sculpture prothoracique qui est bien particulière.

D'un vert olivacé avec le dessous plus clair que le dessus, la tête ornée des reflets dorés et les antennes et les pattes violacés; modérément brillant. Front transversalement plissé dans sa partie apicale et irrégulièrement rugueux dans sa partie basale, l'épistome fortement, mais dispersément ponctué, mandibules finement ponctués près de l'extrémité et régulièrement rugueuses dans la partie basale; vertex irrégulièrement, rugueusement ponctué, sillonné longitudinalement, ce sillon étant prolongé jusqu'à l'épistome; tubercules antennaires densément ponctués, avec l'espace imponctué dans la partie antérieure. Antennes un peu plus courtes que les élytres, avec le 1. article court, un peu déprimé, prolongé sur son extrémité en un petit angle dentiforme, densément ponctué; 3. article long, un peu courbé, en 1,6 fois plus long que le 4. ou le 5. article, un peu plus que 2 fois plus long que le 1.; 4.—6. articles de la longueur égale, 7.—10. un peu plus court, 11. distinctement appendiculé, aussi long que le 4. ou 5. article; tous les articles densément et finement ponctués, très courtement et finement pubescents sauf le 1. qui est assez brillant. Pronotum un peu plus long que large dans la base, avec les constrictures indistinctes à cause de la sculpture assez dense; orné d'un tubercule latéral postmédian, bien développé mais émoncée au sommet, sans un tubercule latéral préapical; avec un large sillon dans la partie apicale du disque et deux impressions discales assez fortes; ces impressions sont limitées en arrière par tubercules discales, qui sont disposées transversalement et ne sont que tout

peu élevées; irrégulièrement mais distinctement transversalement rugueux sur le disque, près des tubercules latéraux cette sculpture est beaucoup plus régulière et distinctement concentrique, les tubercules mêmes lisses et glabres. Ecusson avec une ponctuation microscopique. Elytres finement et densément coriacés, distinctement rugueux, le long de la suture, ornés de trois nervures, dont l'interne est incomplète; ils semblent plus bleu le long de la suture et plus bronzés latéralement. Dessous du corps avec la fine pubescence d'un gris argenté sauf le prosternum, qui est glabre.

D'après la structure antennaire et la sculpture du pronotum *Ch. impressicollis* rentre dans le groupe des espèces voisines à *Ch. sinicum* White. Il diffère de *Ch. sinicum* par la sculpture de l'épistome, des mandibules, du vertex, du pronotum, des élytres. On peut distinguer cette espèce d'après la table suivante (cette table est composée d'après mes »Best.-Tabell. d. eur. Coleopt. 112, Cerambycidae, III. Teil, Callichromina. 1934):

- 4 (9) Pronotum distinctement tuberculé sur le disque.
 5 (6) Pronotum régulièrement plié transversalement sur le disque, au moins entre les tubercules discaux. **Ch. gibbicollis** White.
 6 (5) Pronotum irrégulièrement rugueux sur le disque, les tubercules discaux plus faibles.
 7 (8) Pronotum rudement rugueux, tubercules discaux petites, largement divisés au milieu du disque, non ou peu prolongés en avant latéralement.
 a (b) Elytres mats, finement et uniformément coriacés. L'épistome longitudinalement rugueux, ponctué seulement près le sommet. Vertex avec un sillon très indistinct. Mandibules irrégulièrement rugueux longitudinalement et ponctués dans la partie basale. Joues assez densément ponctués. Pronotum avec un sillon longitudinal dans la partie basale, plus finement et distinctement plus densément rugueux entre ce sillon et les tubercules latéraux, presque non impressionné sur le disque. **Ch. sinicum** White.
 b (a) Elytres brillants, coriacés, mais distinctement rugueux le long de la suture. L'épistome très dispersément ponctué, sans rugosités. Vertex avec un sillon bien distinct. Mandibules régulièrement striées longitudinalement et impunctuées dans la partie basale. Joues très dispersément ponctués. Pronotum avec un sillon large et une sculpture moins dense et plus grosse, orné de deux impressions discales, bien distinctes. Dessus du corps brillant. **Ch. impressicollis**, sp. n.
 8 (7) Pronotum densément et ruguleusement ponctué sur le disque, orné de deux tubercules discaux transversaux, indistinctement divisés entre eux au milieu du disque et distinctement prolongés en avant latéralement. **Ch. implicatum** (Pic) Flav.
 9 (4) Pronotum sans tubercules discaux ou ces étant très indistinctes, etc.
Ch. quadraticollis H. W. Bat., **Ch. zaitzevi** Flav.,
Ch. sinense Hope.

Cheilidonium sifanicum, sp. n.

♀: Capite obscure violaceo-cyaneo, pronoto cyaneo-violaceo, tuberculis lateralibus cyaneo-viridis, elytris opacis, disco obscure violaceis, lateribus obscure viridis; sterno nitido, cyanescens-viridi, abdomine polito, viride; antennis violaceis, in dimidio apicale nigricans-violaceis, opacis; pedibus obscure violaceis; sterno pilis brunnescentibus parce obsito, abdomine glabro. Fronte inaequali, ruguloso, in dimidio basali longitudinaliter sulcato, episto-

mate grosse punctato, vertice dense vermiculariter ruguloso. Antennis apicem elytrorum parum non attingentibus, articulo 1. apice vix producto, dense punctulato, 3. quarto fere duplo longiore, 5. quarto subaequali; articulis 6—10. angulo externo apicali vix producto. Prothorace tuberculo laterali sat evoluto; ante apicem lateraliter tuberculiformi producto, ante basin et post apicem distincte constricto; disco non tuberculato, longitudinaliter sulcato, utrinque plaga rotundata impressa instructo; densissime minuteque ruguloso-punctulato, fere opaco; ante basin longitudinaliter ruguloso, subnitido. Elytris densissime subtiliterque coriaceis, opacis, apice rotundatis. Scutello oblongo triangulari, excavato, lateribus ruguloso punctato, medio subglabro. Prosterno dense transversim ruguloso, meso- et metasterno densissime, abdomine parcius, minutissime punctulatis. Femoribus posticis apicem elytrorum parum non attingentibus, dense punctulatis.

Long. corp. 25 mm., lat. ad hum. 7,2 mm.

Habitat: China occ.: Szechuan, »Wassuland«, 1400 m. (collector anonymus Emm. Reitteri). — Specimen unicum in coll. mea.

Cette espèce est presque totalement mate en dessus et brillante en dessous. Tête d'un bleu violacé avec quelques reflets aussi que le pronotum, élytres d'un violacé très obscur sur le disque et d'un vert obscur latéralement; dessous du corps d'un vert métallique, plus obscur et un peu bleuâtre sur le sternum, qui est hérissé de quelques poils brunâtres. Front très inégal, avec une dépression qui limite la partie médiane, un peu élevée; orné de rugosités irrégulièrement disposées; l'épistome fortement mais non densément ponctué; mandibules avec une ponctuation forte mais pas dense, avec quelques reflets dorés; tubercules antennifères densément ponctués, divisés par un sillon longitudinal, qui se prolonge sur la base du front; vertex densément vermiculé. Antennes un peu plus courtes que les élytres; 1. article court (plus court que le 11.), très brièvement prolongé (presque non prolongé) sur son sommet, finement et très densément ponctué; 3. article très long, presque 2 fois plus long que le 4.; 4.—7. articles de la longueur presque égale, les suivants un peu plus courts; 6.—10. articles distinctement mais faiblement prolongés anguleusement sur le sommet. Pronotum avec un tubercule latéral, grand mais assez émoussé au sommet, courtement tuberculé latéralement près du sommet, sillonné longitudinalement sur le disque; ce sillon profond et régulier dans la partie apicale, plus large et assez mal défini dans la partie basale ou il est masqué par la sculpture; orné, de chaque côté du sillon d'une impression (arrondie postérieurement et atténuée antérieurement) très distincte; sans tubercules discaux; très densément et finement, rugueusement ponctué avec les tubercules vermiculés; la constriction apicale est moins large que la basale, ruguleuse, la basale très large et ornée de rugosités longitudinales et une côte transversale (au milieu seulement); pronotum mat, la partie apicale du sillon étant brillante. Ecusson long, triangulaire, acuminé au sommet, densément et rugueusement ponctué latéralement. Elytres mats, très densément et très finement coriacés, avec des traces très indistinctes, de nervures. Prosternum densément rugueux transversalement, meso- et metasternum finement et très densément ponctués, la ponctuation de l'abdomen moins dense et un peu plus forte. Premier article des tarses postérieurs distinctement plus long que le 2. et 3. articles réunis.

Ch. sifanicum est bien caractérisé par la sculpture prothoracique. D'après cette sculpture il est plus voisin de *Ch. sinense* Hope, en différant par les impressions et la longueur du pronotum (*sinense* Hope offre le pronotum très long; chez *sifanicum* il est plus large que long), ainsi que par la sculpture de cet organe, par l'abdomen glabre, par la sculpture du front et de l'écusson,

ainsi que par le habitus commun. On peut placer cette nouvelle espèce dans mes »Best. Tabellen, Cerambyc. III.« près du *Ch. sinense* Hope, dans le groupe des espèces sans tubercules discaux prothoraciques.

Pseudocallidium, g. n.

Antennae (♀) corpus paulo superantes, 11-articulatae, articulo ultimo non appendiculato, apice acuminato; articulis fere cylindricis, infra dense et satis longe ciliatis; articulus 3^o—4^o (5^o indistincte) apice paulo incrassatis et pilis brevibus dense obsitis, fere fasciculatis; articulo 3^o primo fere duplo longiore, 4^o tertium parum sed distincte brevior, 4^o—5^o subaequalibus, 6^o et sequentibus praecedenti paulo brevioribus. Mandibulae breves, modice latae. Palpi breves. Oculi mediocri, *totaliter divisi*, pars superiora minor. Fronte breve, subverticalis, epistomate brevissimo. Caput minor. Pronotum longitudine distincte latior, transversum, lateraliter rotundatum, inarmatum, medio subconvexum. Elytra satis lata, dorso depressa, apice rotundata, epileuris subnullis. Prosternum processu intercoxali angustissimo, apice acuminato, declivi; metasternum processu intercoxali obtuse triangulari, apice obtuse acuminato. Pedes modice longis; femoribus dilatatis sed non pedunculatis, posterioribus apicem elytrorum valde non attingentibus.

Typus generis Pseudocallidium violaceum m.

D'après son habitus commun ressemble un *Callidiide*, mais les yeux sont totalement divisés par les tubercules antennifères, les antennes sont assez densément ciliées avec le 3. et 4. articles presque fasciculés au sommet. Pronotum transversal, non cordiforme. Tête très petite, avec le front et l'épistome extraordinairement courts, les joues courts, presque aussi longs que le diamètre du lobe inférieur des yeux, les temps courts. Lobe supérieur des yeux petit, plus que deux fois plus petit que le lobe inférieur. Vertex très court, et c'est pourquoi les yeux sont fortement rapprochés au bord antérieur du pronotum. Tubercules antennifères grandes, arrondis, indistinctement séparés dans ses parties intérieures. Ecusson médiocre, subarrondi latéralement, presque acuminé au sommet. Hanches antérieures globuleuses, anguleuses en dehors, leurs cavités cotyloïdes ouverts en arrière, celles des intermédiaires ouvertes en dehors. Dernier sternite abdominal fortement allongé. Elytres avec les épipleures plus ou moins distincts, seulement dans son tiers basal; son bord latéral en forme presque semblable à celui de *Callidium violaceum*, mais la partie fléchise est moins longue et moins large, la partie infléchie est fortement et longuement arquée en haut.

D'après la structure des hanches ce genre nouveau peut rentrer dans le tribu *Callidiina* ou dans le tribu de *Rosalina*. La structure antennaire et prothoracique est plus semblable à celle des *Rosalina*, et c'est pourquoi je place provisoirement ce genre dans le dernier tribu.

Pseudocallidium violaceum, sp.n.

Violaceus, oculis brunneis, antennis nigricante-violaceis, nigro ciliatis, capite cyanescenti violaceo, tarsis nigricante violaceis; plus minusve metallico nitidus. Fronte disperse sed forte punctato, tuberculis antenniferis forte punctatis. Vertice late longitudinaliter impresso, impressione oculis fere attingente, indistincte et non dense punctato. Genis ruguloso punctatis, tempis longitudinaliter rugulosis. Mandibulis in dimidio basali indistincte longitudinaliter rugulosis et dispersissime punctatis, apice glabris, impunctatis. Antennis (♀) apice elytrorum paulo superantibus (articulis 10^o—11^o); articulo 1^o dense minuteque punctulato, 3^o multo densior et minutior, sequentibus microscopico

punctulatis; articulo 2° brevissimo, latitudinem suam apicalem parum longior. Pronoto apice submarginato, indistincte constricto, impressione transversali medio late interrupto; ante basin late constricto, basi duplo marginato; dispersissime minutissimeque indistincte punctulato, nitido, pilis nigris erectis (disco disperse, lateribus densior) obsito. Elytris dense ruguloso-punctatis, subdepressis, humeris forte prominulis, foveæ humerali non longa sed lata et profunda; pilis brevis nigris, semierectis, obsitis; apice rotundatis. Prosterno laevissime transverso striolato, meso- et metasterno punctulatis, argenteo-griseo pubescentibus; abdomine disperse punctulato, sparsim breveque nigro piloso. Femoribus minutissime punctulatis, nigro pilosis.

Long. corp. 18 mm, lat. ad hum. 4,6 mm.

Habitat: China occ.: Szechuan, »Wassuland«, 1400 m. (collector anonymous Emm. Reitteri). Specimen unicum in coll. Dr. Heyrovský.

Pronotum presque 1,5 plus large que long; marqué d'un sillon transversal après le sommet, ce sillon est largement interrompu au milieu; birebordé sur la base; irrégulièrement inégal sur le disque (toujours?). Elytres à fossette humérale courte, mais large et profonde, les angles huméraux prononcés en avant; rétrécis un peu après les épaules, puis graduellement un peu dilatés vers le sommet, arrondis à l'extrémité (plus large extérieurement et plus obtuse intérieurement), planiuscules; sans nervures distinctes mais avec des traces d'une ligne longitudinale, plus distinctes dans le tiers basal; la sculpture est presque uniforme, un peu affaiblie vers le sommet; ils sont faiblement brillants. Premier article des tarsi postérieurs distinctement plus long que les 2. et 3. articles réunis. Tibias postérieurs beaucoup plus longs que les fémurs, linéaires, garnis de courts poils obscurs ainsi que les fémurs. Dernier sternite abdominal largement arrondi à l'extrémité.

Cette espèce est très caractérisée par son corps violacé, par les antennes ciliées avec les 3. et 4. articles presque fasciculés au sommet (ces fascicules sont courtes, mais bien visibles) ainsi que par la forme et la sculpture du pronotum. Ce dernier présente un aspect assez original par sa forme et, en plus, par le double rebord basal et par un sillon transversal préapical largement interrompu au milieu.