

Associez **Medax[®] Top** à votre premier fongicide en escourgeon

La majorité des parcelles d'escourgeon ont déjà atteint le stade optimal (1^{er}-2^{ème} noeud) pour l'application du régulateur précoce.

En plus de son excellent effet régulateur qui rend la culture nettement plus résistante à la verse, **Medax[®] Top** est une solution très sélective et qui procure un effet positif sur le rendement.

Medax[®] Top peut être mélangé à la plupart des fongicides du marché.

Conseil d'utilisation entre le stade 1^{er} et 2^{ème} noeud :

Medax Top 0,8 – 1,2 l/ha + fongicide T1(*)

(*) Profitez de l'application de **Medax[®] Top** pour intervenir avec un **premier traitement fongicide** sachant que l'oïdium, la rouille naine, la rhynchosporiose ou l'helminthosporiose sont déjà présents dans de nombreuses parcelles.



Pour ce premier traitement, optez pour un fongicide à base de metconazole (**Simveris[®]** à 1 l/ha seul ou à 0,8 l/ha associé à **Flexity[®]** 0,4 l/ha en cas de présence d'oïdium) ou de prothioconazole afin de réserver votre solution à base de **Revysol[®]** pour le deuxième traitement au stade dernière feuille et lutter entre autres contre la ramulariose.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Bruno Burlet (0471/98.27.61) ou Yannick Blaise (0498/14.70.95), Crop Advisors.

Utilisez les produits phytopharmaceutiques avec précaution.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Medax[®] Top (9840P/B), contient 300 g/l chlorure de mépiquat + 50 g/l prohexadione-calcium ; **Simveris[®]** (10817P/B), contient 90 g/l metconazole ; **Flexity[®]** (9511P/B), contient 300 g/l métrafénone.