

MUNIBE (San Sebastián)

Sociedad de Ciencias Naturales **ARANZADI**
Año XVIII - Números 1/4 - 1.966 - Páginas 63-64

Nota acerca del craneo eneolítico de la cueva de Kobeaga (Ispaster-Vizcaya)

por José María Basabe

Se estudia una calvaria eneolítica. (Fot. 1.) Pertenece a una mujer de unos 60 años, a juzgar por la avanzada obliteración de las suturas.

Su norma superior es bursoide, con tendencia a esfenoides presentando las suturas, sinuosidades estrechas, sencillas y poco abundantes. Se distingue muy claramente en la región obélica, el agujero nutrido derecho, insinuándose también las protuberancias parietales.

El perfil de la norma posterior es algo bombiforme y presenta dos huesos wormianos, uno en el mismo centro lambdático y otro en la rama izquierda de la misma región.

La frente, en su perfil sagital, es recta con ángulo de inclinación frontal de 50 grados, describiendo la línea glabella-opistio una curva bastante continua, con apreciable aplanamiento en la región obelico-lambdática. Son también acusadas las eminencias frontales y asimismo la situación algo periférica que en la norma inferior ocupa el «foramen magnum», con respecto a la curvatura de la escama occipital.

Las órbitas en su porción frontal y en el contorno de nasal derecho que subsiste, no parecen ser muy rectangulares.

Debido a la pérdida de substancia y al número de huesos fragmentados que reconstruyen el hemicráneo derecho, tanto la altura auricular como la anchura máxima no son definitivas.

En estas condiciones, las medidas obtenidas son las siguientes:

Longitud máxima	183
Longitud de la base	
Anchura máxima	145
Anchura frontal mínima	101
Anchura blastérica	117
Alturabasiobregma	
Altura auricular	117
Circunferencia horizontal	533
Arco transversal	333
Arco sagital	380
Arco sagital frontal	135
Arco sagital parietal	120
Arco sagital occipital	125

Arco sagital de la escama	75
Cuerda sagital frontal	117
Cuerda sagital parietal	110
Cuerda sagital occipital	104
Cuerda sagital de la escama	71
Índice cefálico	79,2
Índice vertico-longitudinal	
Índice-vertico-transversal	
Índice auriculo-longitudinal	63,93
Índice auriculo-transversal	80,79
Índice transverso -frontal	80,16
Índice transverso-frontoparietal	69,65

Los valores bastante elevados del diámetro transversal respecto de la longitud máxima, dan un índice de 79,2 que coloca a esta calvaria en el límite entre la meso y la braquicránea. Y por la relación de su altura con los diámetros máximos del cráneo, es hipsicráneo, en el límite con los ortocráneos. Y metricráneo en el límite con los tapeinocráneos.

Su índice frontotemporal le sitúa en la clase de los eurimétopes, próximo a los metriometopes y su índice frontotransversal indica un moderado estrechamiento hacia delante.

La mujer de Kobeaga poseía, pues, un cráneo mesobraquicéfalo de frente amplia y algo divergente con una altura de bóveda más que mediana.


Con los datos arriba enunciados, intentaremos establecer siquiera con aproximación, la tipología de la calvaria que se estudia comparándola con otros cráneos neolíticos de las provincias vasco-navarras y con los valores métricos de cráneos actuales de la misma región.

La calvaria de Kobeaga se aproxima, por su índice cefálico, a los cráneos dolménicos del Aralar (78,93), alejándose notablemente de la población dolménica de la Llanada de Alava (Peciña: 72; Alto de la Huesera: 74) y acercándose bastante a los vascos actuales de Zarauz (77,1).


En cuanto a los índices frontoparietal y transverso, se acerca por el primero a los de los dolmenes de Alava en general y al cráneo de Santamiñe (Vizcaya) y por el segundo a los del

(2)


José María Basabe



Norma sagital



Norma frontal



Norma occipital



Norma vertical (Foto E. Nolte)

Fot. n.º 1

citado dolmen de Peciña (Alava) y a los vascos actuales.

Es chocante la coincidencia de la calvaria de Kobeaga con el vecino cráneo neolítico de Atxeta (Vizcaya), al superponer sus normas superior y sagital; pudiéndose, en esta última, explicar la menor longitud máxima de Kobeaga, por ser femenino.

Teniendo en cuenta la ausencia de la cara ósea y de la base del cráneo, partes tan decisivas en la caracterización del tipo pirenaico occidental, podemos sin embargo concluir que:

La calvaria eneolítica de Kobeaga, por el contorno de la bóveda, la anchura de las sienesy del diámetro transverso, la inclinación del occipital y el aplanamiento de su región obelisco-lambdática, no desentona entre los cráneos neolíticos del País Vasconavarro y está cercana a la mesocefalia de los vascos actuales. Dista bastante del tipo mediterráneo y hace pensar por alguna de sus medidas en los cráneos alpinos que aparecen a fines del Neolítico en ciertos puntos del Pirineo.