

Kit de parage

ÉLEVAGE



Bombe de spray désinfectant

Disque de parage



Meuleuse Bosch 600 W



Lunette de protection



Couteau de parage double affûtage

1^{er} passage avec la meuleuse pour aplanir les 2 ongles au même niveau



▶ **Idéal pour rectifier l'excès de corne sur un pied**

AVANTAGES

- ➕ Nécessaire pour éviter le boitement des bovins
- ➕ Permet de rééquilibrer les animaux sur de bons appuis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Désignation
03999900014	Kit de parage



2^{ème} passage avec le couteau de parage pour une finition parfaite entre les ongles



BEISER Environnement • Domaine de la Reidt
67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001

0,15 € TTC/min

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

0,15 € TTC/min

LA PRESSE EN PARLE

France Agricole n° 3436 du 18 mai 2012

Boiteries : levez le pied de vos vaches laitières !

Lorsque plusieurs animaux sont atteints, trois maladies sont en cause. Les identifier nécessite une observation attentive du pied.

Les boiteries sont le deuxième problème de santé en élevage laitier, après les mammites. Pourtant, leur incidence économique est souvent négligée. « Une épidémie de boiteries est particulièrement catastrophique avec un robot de traite, avertit Nathalie Bareille, de l'école vétérinaire de Nantes (Oniris). Si elles souffrent, les vaches préfèrent rester couchées qu'aller se faire traire. Les pertes de lait peuvent vite devenir très importantes. »

PRÉVENIR ET CIRCONSCRIRE

Quand plusieurs vaches du troupeau sont atteintes, trois maladies peuvent être soupçonnées : le fourchet, la fourbure ou la maladie de Mortellaro (lire l'encadré ci-dessous). Le diagnostic repose sur l'observation attentive des lésions. « Quand une vache boite, le premier geste à effectuer est de lui lever le pied, rappelle Nathalie Bareille. Trop d'éleveurs ne le font pas, par manque de temps mais aussi de pratique. Il n'est pas facile de reconnaître les lésions spécifiques de chaque pathologie. »

Les conduites d'élevage actuelles favorisent l'apparition des boiteries. Les sols bétonnés sont agressifs pour les pieds des vaches. Avec des logettes mal dimensionnées, peu

Les facteurs de risques favorisant la survenue des trois principales maladies

Source : Guide d'intervention pour la maîtrise des boiteries - Casdar Santé - Photo : Claudius Thinet



Liés à l'habitat

Diminution du temps de couchage
Traumatismes lors des déplacements
Humidité et défauts d'hygiène des aires de vie

Liés à l'alimentation

Acidose subaiguë du rumen
Déficit énergétique
Carences marquées en minéraux

Liés à la conduite alimentaire

Sous-détection des boiteries et méconnaissance des lésions
Mesures de prévention absentes ou inadaptées
Traitements absents ou inadaptés

	Fourbure	Fourchet	Mortellaro
Liés à l'habitat			
Diminution du temps de couchage	majeur	majeur	-
Traumatismes lors des déplacements	secondaire	secondaire	-
Humidité et défauts d'hygiène des aires de vie	-	majeur	majeur
Liés à l'alimentation			
Acidose subaiguë du rumen	majeur	-	-
Déficit énergétique	secondaire	secondaire	secondaire
Carences marquées en minéraux	secondaire	secondaire	secondaire
Liés à la conduite alimentaire			
Sous-détection des boiteries et méconnaissance des lésions	secondaire	secondaire	secondaire
Mesures de prévention absentes ou inadaptées	secondaire	majeur	majeur
Traitements absents ou inadaptés	majeur	majeur	majeur

confortables ou une aire paillée surchargée, les animaux préfèrent rester debout. La « surcharge du poids sur les pieds » induite favorise la fourbure et aggrave les lésions du fourchet. Quant aux hauts niveaux de production, « ils sont déterminants dans l'apparition de la fourbure subaiguë, et peuvent aggraver les lésions du fourchet et de Mortellaro ».

Une fois ces maladies présentes dans le troupeau, il est difficile de les éradiquer. « Il s'agira surtout de faire de la prévention et de circonscrire

la propagation », regrette Nathalie Bareille. Une méthode d'intervention en élevage laitier, mise au point en 2009 par Oniris, l'Institut de l'élevage, les GDS bretons, les groupements techniques vétérinaires et le centre de formation du Rheu, repose sur l'intervention coordonnée d'un pareur et d'un conseiller.

Le parage préventif est un passage obligé. « Il permet de prévenir l'apparition des lésions de complication de la fourbure subaiguë et du fourchet, par rééquilibrage des charges au sein de chaque onglon et entre onglons interne et externe », est-il expliqué dans la méthode. Il contribue à diminuer l'impact de Mortellaro par détection des lésions.

En curatif, le remède miracle n'existe pas. Pour Mortellaro, des traitements locaux peuvent suffire. S'il s'agit de fourchet ou de fourbure, un parage curatif est indispensable. « En cas de lésion du sabot, il faut rétablir l'équilibre du pied, rappelle Nathalie Bareille. Dans un élevage à problème, le pareur doit passer tous les mois jusqu'à guérison. »

Elsa Casalegno

COÛT

Pertes

- Production 1 à 2 kg de lait en moins par jour, ou 300 à 350 kg par lactation.
- Reproduction détection des chaleurs plus difficile.
- Réforme anticipée 8,4 fois plus élevée chez un animal boiteux, 2,5 à 5 % des vaches sont réformées pour cause de boiterie.

LES TROIS MALADIES EN CAUSE

Le fourchet (dermatite interdigitale) : affection inflammatoire d'origine infectieuse. Les symptômes sont l'inflammation de la peau interdigitale, puis l'apparition de fissures et l'érosion du talon, aboutissant à une boiterie. Les lésions peuvent aller jusqu'à l'ulcère.

La fourbure (pododermatite aseptique diffuse) : affection non infectieuse du pied. La

forme subaiguë entraîne une boiterie légère, avec des aplombs postérieurs anormaux et une sole colorée ou ulcéreuse. La forme chronique provoque une démarche sensible et une déformation des onglons. La forme aiguë, rare, entraîne une boiterie violente, avec des onglons chauds et douloureux.

La maladie de Mortellaro

(dermatite digitée) : inflammation de la peau de la couronne des onglons, d'origine infectieuse. Les symptômes sont des ulcérations superficielles caractéristiques, entraînant une boiterie sévère sans inflammation visible du pied. Les lésions sont discrètes mais très douloureuses. La vache marche sur la pointe de l'onglon, avec une usure en pince.