Floraisons observées dans les serres du Muséum pendant l'année 1937

(autres que celles signalées dans les listes précédentes) [1]

par A. Guillaumin et E. Manguin.

MONOCOTYLÉDONES

Acampe papillosa Lindl.
Æchmea mexicana Bak.
Agave Haynaldii Tod.
Alocasia × *van Houtteana* Hort. ex Gentil.
Aloe purpurascens Haw.
— *saponaria* Haw., var. *variegata* Hort.
Angraecum eburneum Thou.
— *gracilipes* Rolfe.
— *Scottianum* Reichb. f.
Anthurium velutinum Linden, var. *glaucum*.
Aponogetum crispum Thunb.
× *Brassocattleya André Maron* Maron (× *BrassoCattleya Mrs J. Leemann.* × *Cattleya Schrœderæ*) = [(*Brassavola Digbyana* × *Cattleya Dowiana*) × *Cattleya Schrœderæ*].
× *BrassoCattleya Idole* Vacherot (*BrassoCattleya M*me *Charles Maron* × *Cattleya Empress Frederich*).
× *BrassoCattleya Juliet* Lacroze (*BrassoCattleya Mrs J. Leemann* × *Cattleya chocoensis*, var. *alba*).
× *BrassoCattleya M*me *Bokanowski* Marcoz (? × ?).
× *BrassoCattleya M*me *Charles Maron*, var. *Marthe Gratiot*(*Cattleya Gigas*, var. *alba* × *Lælia Digbyana)*.
*BrassoCattleya M*me *Marie Ruffier* Guttin *(BrassoCattleya M*me *Charles Maron* × *Cattleya Percivaliana)* soit. [*(Brassavola Digbyana* × *Cattleya Warcewiczii)* × *Cattleya Percivaliana)*].
Calanthe × *Bryan* Cookson, var. *William Murray* Cookson *(vestita*, var. *rubro-oculata* × *Regneri*, var. *Williamsii)*.
Calathea Pavonii Kœrnicke = *C. tubispatha* Hook.
Carex Morrowii Boott, var. *marginata*.
Cattleya × *Alfred Fowler* Fowler = *C.* × *Jeanne Payet* Marcoz *(granulosa* × *labiata*, var. *Trianæ)*.

1. Voir pour les listes précédentes le *Bulletin du Muséum* à partir de 1920.

Cattleya × *Diadem* Sander *(H. S. Leon* × *labiata*, var. *Trianæ*, sub var. *Emperor)*.
— *Fabia* Veitch, var. *alba (Dowiana* × *labiata)*.
— × *Falco* Fowler *(Dowiana*, var. *aurea* × *Dupreana)*. soit [*(Dowiana* var. *aurea)* × *(Warneri* × *Warscewiczii)*].
Cattleya labiata Lindl., var. *Gaskelliana* Veitch, subvar. *alba*.
— × *Magpie* Sander *(Goodsoniæ* × *Maggie Raphael)*.
— × *Mantinii* Mantin *(Bowringiana* × *Dowiana)*.
— × *Mrs Myra Peeters* Peeters *(Gaskelliana*, var. *alba* × *Warneri*, var. *alba)*.
Cattleya Skinneri Batem.
— *Sphinx tenebrosa* × *Fabia*.
— × *Suzanne Hye* Hye *(Gaskelliana*, var. *alba* × *Mossiæ*, var. *Wageneri)*.
— × *Ville d'Annecy* Marcoz *(Dominiana* × *Warneri)*.
Cirrhopetalum (*pedatum* ? × *pulchrum* N. E. Br.).
Cœlia bella Reichb. f.
Cœlogyne ochracea Lindl. (*Janin* f. 14, 1937) [Guillaum. det.].
Curculigo latifolia Dryand.
Cyanotis somaliensis C. B. Clarke.
Cymbidium × *Architect* J. H. Hughes *(Cerès* × *Doris)*.
— × *Cerès* Smith *(I. Ansonii* × *insigne*, var. *Sanderi)*.
— × *Doris* Mac Bean *(insigne*, var. *Sanderi* × *Tracyanum)*.
— *insigne* Rolfe, var. *Sanderi*.
— × *Lilian Sander* Sander [*(grandiflorum* × *insigne*, var. *Sanderi* × *Lowianum)* × *(insigne* var. *Sanderi)*].
Cymbidium × *Lowgrinum* Measures *(Lowianum* × *tigrinum)*.
Cymbidium Lowianum Reichb. f. — Indo-Chine (*Delacour*, 29 mai 1934, *M*me *Gondron* f. 213, 1933) [Guillaum. det.].
Cymbopogon Martinii Stapf.
Cypripedium × *Alma Gevaert* Pauwels *(Lawrenceanum*, var. *Hyeanum* × *Mandiæ* soit [*(Lawrenceanum*, var. *Hyeanum)* × *(callosum* var. *Sanderæ* × *Lawrenceanum*, var. *Hyeanum)*.
Cypripedium × *Handburyanum* Handbury *(Maudiæ* × *Leeanum*, var. *Leoustonense)*.
— × *Helen II* Dallemagne, var. *Westonbert* Holford *(bellatulum* × *insigne*, var. *Harefield Hall)*.
Cypripedium Io Cookson, var. *grande* × *Niobé* Veitch, c'est-à-dire [*(Argus* × *Lawrenceanum)* × *(Fairrieanum* × *Spicerianum)*], obtention du Dr Marçais.
Cypripedium × *Jaffa* Handbury *(Leeanum*, var. *Leoustonense* × *Memoria Jerninghamiæ)*.
Cypripedium Lathamianum, var. *superbum* × *Kimball-Sanderæ*.
— *Lemannii Ducis* Lambeau *(Alcibiades*, var. *Illustrious* × *Curtmannii)*.
Cypripedium Maudiæ × *Acteus*.
— *nitens*, var. *Sallieri* × *Acteus*.
— × *Norab* Holford *(aurea*, var. *Œdippe* × *Monsieur de Curte)*.
— × *Porthos* Vacherot et Lecoufle *(Atlantis* × *Perseus)*.
Dendrobium Kingianum Bidwill.
Dyckia longipetala Baker = *Deuterocohnia longipetala* Mez.

Dieffenbachia Parlatorei Linden et André, var. *marmorata* Linden et André.
Epidendrum equitans Lindl.
Eria obesa Lindl.
Eulophia maculata Reichb. f. — Guinée-française (*Chouard*, f. 247, 1936, nº 9 et nº 6), [Guillaum. det.].
Gasteria fasciata Haw. — Afrique du Sud : district de Port Elisabeth (*Humbert*, f. 327, 1933) [Guillaum. det.].
Gasteria fasciata Haw. var. **minima** Hort. mss. = *G. minima* Hort [1].
× *Gasteraworthia Holtzei* Guillaum. = *Gasteria* × *Holtzei* Haw. (*Gasteria verrucosa*, var. *intermedia* × *Haworthia radula*).
Gasteria lingua Link, var. *minor*.
× *Gastrolea Lapaixii* A. Guillaum. (*Gasteria maculata* × *Aloe aristata*).
Guzmannia lingulata Mez, var. *cardinalis* Hort.
Hechtia Schottii Bak. × *glomerata* Zucc.
Lælia Eug. Boullet Maron (*harpophylla* × *glauca*) [Guillaum. det.].
× *LælioCattleya Bella* Veitch (*Lælia purpurata* × *Cattleya labiata*).
LæliaCattleya Britannia Sander, var. *alba* Vacherot et Lecoufle (*Cattlleya Warscewiczii* × *LælioCattleya Canhamiana*) c'est-à-dire [(*Cattleya Warscewiczii*) × (*Cattleya Mossiæ* × *Lælia purpurata*)].
× *Læliocattleya elegans* Rolfe (*Cattleya Leopoldii* × *Lælia purpurata*)
× — *flammea* × *Cattleya Fabia*.
× — *Gottoiana* Douglas (*Cattleya Warneri* × *Lælia tenebrosa*).
× — *Montréal* Sander (*exoniensis* × *luminosa*).
× — *Sunburst* Charlesworth (*Cattleya Dowiana*, var. *aurea* × *Læliocattleya Carmencita* = [(*Cattleya Dowiana*, var. *aurea*) × (*Cattleya Dowiana* × *Lælia tenebrosa*)].
× *LælioCattleya Val de l'Eau* Sander (× *Læliocattleya Cora*, var. *plumosa* × *Cattleya Schroderæ*).
× *LælioCattleya Welsiana* Sander (*Cattleya labiata*, var. *Trianæ* × *Lælia purpurata*).
Lycaste Skimmeri Lindl., var. *alba* Linden.
Masdevallia Veitchiana Reichb. f.
Maxillaria variabilis Batem.
Miltonia × *Saint André* Sander (*Bleuana*, var. *Sanderi* × *Roezlii*).
— *vexillaria* Benth., var. *gigantea*.
Musa Mannii Wendl.
Mystacidium Leonis Rolfe = *Angræcum Leonis* Nichols.
Octomeria alpina Rodrig.
× *Odontioda Borda* Charlesworth (*Cochlioda Nœzliana* × *Odontoglossum* × *Nathaniel*).
× *Odontioda Bradshawiae* Charlesworth (*Cochilioda Nœzliana* × *Odontoglossum crispum*).
× *Odontioda Clarissa* M. et H. (× *Odontioda Bradshawiæ* × *Odontoglossum* × *illustrissimum*) soit [(*Cochlioda Nœzliana* × *Odontoglossum crispum*) × (*Odontoglossum* × *ardentissimum* × *Lambauianum*)]

1. Plante restant de petite taille (ne dépassant pas 5 cm. de hauteur), feuilles, environ 12, ne dépassant 12 cm. de longueur.

c'est-à-dire [*(Cochlioda Nœzliana* × *Odontoglossum crispum)*] × [*(O. crispum* × *Pescatorei)* × *(crispum* × *Rolfæ)*].

× *Odontioda Corail* Vacherot Lecoufle *(Odontioda Brakenhurst* × *Odontoglossum Eximillus)* soit [*(Cochlioda Nœzliana* × *Odontoglossum Harryanum)* × *Odontoglossum eximium)*] × [*Odontoglossum eximium* × *illustrissimum*].

Odontoglossum Rossii Lindl., var. *majus* Warn.

Oncidium Kramerianum Reichb. f.

Ornithogalum caudatum Jacq. [1]

Odontoglossum × *Le Braz* Vacherot et Lecoufle *(Aphrodite* × *Thecla).*

Paphiopedilum amabile H. Hallier (1895) = *P. callosum* Kerch. var., *angustisepala* Guillaum. [2]

— *Argus* Pfitzer — Philippines (provenant de l'Exposition coloniale donné par M. le Gouv. Gén. *Olivier*, f. 380, 1931 [Guillaum. det.].

Paphiopedilum hirsutissimum Pfitzer = *Cypripedium hirsutissimum* Lindl.

Phajus maculatus Lindl. forme *à feuilles vertes* — Annam : près Djiring, 1100-1200 m., (*Poilane* nº 24664, f. 231, 1935,) [Gagnepain det.] Nouveau pour l'Indo-Chine.

Phalænopsis × **Jardin des Plantes** Guillaum. hybr. nov. *(Wiganiæ* × *Ariadne)* = [*(Schilleriana* × *Stuartiana)* × *(Aphrodite* × *Stuartiana)*].

Pitcairnia corallina Linden et André.

Pleurothallis tribuloides Lindl.

Prescottia stachyoides Lindl. — Guadeloupe (*Lami*, f. 102, 1936).

Saccolabium violaceum Lindl.

Sagittaria subulata Buch., var. *pusilla* Buch.

Scilla lanceæfolia Bak.

Scuticaria Steelii Lindl.

× *Sophrocattleya Dora* Dadvison *(Cattleya Dowiana* × *SophroCattleya Cleopatra)*, c'est-à-dire [*(Cattleya Dowiana)* × *(Cattleya Leopoldii* × *Sophronitis grandiflora)*].

Tillandsia Balbisiana Schult. f.

— *Bradeana* Mez et Tonduz — Costa-Rica *(Biolley*, donné par *Roland-Gosselin*, f. 260, 1925).

Tillandsia Ortgiesiana Bak. ? — *Coll. Roland-Gosselin*, f. 265, 1925, envoyé à Roland-Gosselin par Mez (nº 13) qui pensait que c'est une espèce très voisine de *T. Ortgiesiana* mais distincte.

Vanda × *Burgeffii* Jard. bot. de Munich *(Sanderiana* × *suavis).*

— *lamellata* Lindl.

Warscewiczella discolor Reichb. f. = *Zygopetalum discolor* Reichb. f.

Zamioculcas Loddigesii Schott.

1. C'est la plante trouvée au Maroc en 1912 par Mouret, que Jahandiez avait donnée au Muséum (f. 215, 1928) sous le nom d'*Urginea Mouretii* Batt. et Trab. et que j'avais identifiée à un *Ornithogalum*, identification confirmée par Jahandiez et Maire *(Catal. Pl. Maroc*, I, p. 127, 1931, comme *O. caudatum* Jacq., de l'Afrique du Sud. — A. G.

2. L'espèce réintroduite au Muséum par Delacour en 1924, y a fleuri pour la première fois en janvier 1925 et depuis chaque année. Le *P. amabile* a été cité par Desbois (*Cyprip.*, p. 45, 1898) et décrite par Pfitzer *(Pflanzenreich.* IV, 50, *Orchid. Pleonand.*, p. 80 (1903).

DICOTYLÉDONES

Acacia arabica Willd.
— *pentadenia* Lindl.
— *rupicola* F. Muell.
Achimenes hirsuta DC.
Æglopsis Chevalieri Swingle.
Æonium canariense Webb et Berth.
— *gorgoneum* J. A. Schmidt.
Astrophytum capricorne Britt. et Rose.
Begonia conchiæfolia A. Dietr.
— *Haageana* Hort. ex W. Watson.
Bryophyllum uniflorum Berger.
Callistemon salignus Sweet.
Clerodendron Thomsonæ Balf., var. *variegatum* Hort.
Columnea Oerstediana Klotsch, forme à feuilles et calice bronzés.
Crassula conjuncta N. E. Br.
— *falcata* Wendl.
— *obvallata* L.
— *tecta* L. f.
— *yunnanensis* Franch.
Delosperma algoensis L. Bolus.
Dicyrta Warcewicziana Regel.
Diospyros dodecandra Lour. [1]
Drosera capensis L.
Echeveria amœna L. De Smet.
— *nodulosa* Otto.
E. — *retusa* Lindl.
Euphorbia Leviana Croizat = *E. ceratiformis* Boiss., non L.
— *neglecta* N. E. Br.
— *obesa* Hook. f.
Faucaria Boscheana Schwant.
— *felina* Schwant.
Ficus aggregata Vahl.
— *pandurata* Hance.
— *quercifolia* Roxb.
Ficus trachyphylla Fenz.
— *triangularis* Warb.
Glottiphyllum cultratum N. E. Br. = *Mesembryanthemum longum*, var. *declive* Salm. (Jard. bot. de Gand f. 127, 1935) [Guillaum det.].
Gœthea Makoyana Hook. f.
Hymenocyclus luteolus Schwant.
Ionidium polygalæfolium Vent.
Ipomaea Horsfalliæ Hook.
Jacaranda ovalifolia R. Br.

1. Cette espèce signalée par Loureiro comme spontanée et cultivée en Annam (ce qu'il appelait Cochinchine) ne figure pas dans la *Flore de l'Indochine* III et le nom vulgaire *Cay thi tram* n'y est pas mentionné. — A. G.

Kalanchoe aromatica Perr. de la Bât.
— *Cassiopei* Damman.
— *Ena* Hort.
— *eriophylla* Hilsenb. et Bojer.
— *glaucescens* Britten.
— *laxiflora* Bak. = *K. crenata* Hamet, non Haw. — Madagascar *(François*, f. 326, 1935*)* [Guillaum det.]. [1]
Kalanchoe thyrsiflora Haw. — Afrique du sud, Port Elizabeth, provenant de Queenstown (*Humbert*, f. 115, 1934).
Limnobium stoloniferum Griseb. = *L. bogotense* Kunth.
Limnophila Griffithii Hook.
Lippia turbinata Griseb.
Lobivia andalgalensis Britt et Rose.
— *famatinensis* Werd.
Mamillaria coronaria Haw.
Manihot carthaginensis Müll.-Arg.
Muehlenbeckia platyclados Meissn.
Neomamillaria elongata Britt. et Rose.
Pachypodium bispinosum A. DC.
Pelargonium tomentosum Jacq.
Phyllobolus resurgens Schwant.
Pilea serphyllifolia Wedd.
Rebutia senilis Bckbg.
Rhipsalis dissimilis K. Schum.
Rhynchosia phaseoloides DC.
Ruellia Blumei Steud.
Sedum potosinum Rose.
Selenicereus pteranthus Britt. et Rose.
Senecio junceus Haw. ;
Stapelia hirsuta L. ;
Stapelia hirsuta var. *inguipetala* N. E. Br.
Stapelia variegata L., var. *bufonia* N. E. Br.
Streptocarpus Haygartii N. E. Br. ex C. B. Clarke
Tabebuia pallida Miers
Triolena scorpioides Naud.

1. A noter — ce que j'avais déjà remarqué sur d'autres espèces fleurissant en serre — que les corolles restent beaucoup plus courtes (ici à peine plus longues que le calice) et d'une teinte verdâtre (ici vert jaunâtre au lieu de jaune pâle) alors que les étamines conservent leur longueur relative et que la fleur ayant, dans son ensemble, un aspect normal, on pouvait croire avoir affaire à une autre espèce. — A. G.

Guillaumin, A and Manguin, E . 1938. "Floraisons observées dans les serres du Muséum pendant l'année 1937." *Bulletin du Muse´um national d'histoire naturelle* 10(1), 109–114.

View This Item Online: https://www.biodiversitylibrary.org/item/216893
Permalink: https://www.biodiversitylibrary.org/partpdf/215246

Holding Institution
Muséum national d'Histoire naturelle

Sponsored by
Muséum national d'Histoire naturelle

Copyright & Reuse
Copyright Status: In copyright. Digitized with the permission of the rights holder.
Rights Holder: Muséum national d'Histoire naturelle
License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Rights: https://biodiversitylibrary.org/permissions

This document was created from content at the **Biodiversity Heritage Library**, the world's largest open access digital library for biodiversity literature and archives. Visit BHL at https://www.biodiversitylibrary.org.

This file was generated 16 April 2022 at 16:49 UTC