

Guía de bolsillo para las aves de pastizal del Desierto Chihuahuense



Bird Conservancy
of the Rockies

Connecting People, Birds and Land

La misión del Bird Conservancy of the Rockies es conservar las aves y sus hábitats a través de la ciencia, la educación y el manejo sostenible. Nuestro trabajo abarca desde las Montañas Rocosas hasta las Grandes Planicies, el Desierto Chihuahuense, y más allá. Nuestros esfuerzos son impulsados por ciencia sólida, logrados a través del empoderamiento de las personas, realizados a través del manejo sostenible de las tierras, y mantenido con asociaciones y la colaboración. Juntos, estamos mejorando las poblaciones de aves nativas, la tierra y la vida de las personas.

Los hábitats y ecosistemas del Desierto Chihuahuense tienen una importancia global para las aves migratorias. En particular un 85% de las aves de pastizal que anidan en los pastizales de Canadá y Los Estados Unidos dependen de los pastizales del Desierto Chihuahuense para invernar. Sin embargo, las aves de pastizal han mostrado las disminuciones poblaciones más marcadas de otros tipos de aves. Estos pastizales también son sumamente importantes para aves residentes, como el Halcón Aplomado, Águila Real, Chorlo Llanero y varios mamíferos por ejemplo el berrendo y perrito de la pradera, y un gran diversidad de reptiles, e insectos. Además, las comunidades humanas que residen en estos ecosistemas, así como su economía regional, dependen de la salud, productividad y buen manejo de los pastizales desérticos. Por estas razones, el Desierto Chihuahuense es un enfoque natural de nuestros esfuerzos para conectar las aves, la gente y la tierra.

Nuestra intención con esta guía es elevar el conocimiento y apreciación hacia las aves de pastizal, las cuales se encuentran entre las especies más amenazadas de todo el continente. Esperamos que se use en el salón de clases o en el campo para identificar y conocer a las aves de pastizal.



Esta guía está dedicada a la memoria de José Luis García Loya, un querido amigo de los pastizales y la vida silvestre.



**Derechos de Autor© 2021 Bird Conservancy of the Rockies
Brighton, Colorado, USA**

Íconos de la Guía

Alimentación:



Ratones



Conejos y liebres



Perritos de la pradera



Reptiles



Serpientes



Aves



Murciélagos



Chapulines



Insectos aéreos



Insectos terrestres



Arañas



Orugas



Carroña




Semillas de pastos



Semillas de hierbas



Frutas y bayas



Huevos



Granos


Estatus Poblacional:



Creciente



Decreciente



Estable




Hembra



Macho

Mapa de Distribución de las Especies:



Tipos de Hábitat




Pastizal
Desértico



Pastizal Corto




Pastizal
Arbustivo




Matorral
Desértico



Tipos de Hábitat




Bosque



Acantilado



Campos
Agrícolas



Humedal /
Vegetación
Ribereña






Milano Cola Blanca (*Elanus leucurus*) White-tailed Kite

ID: Cabeza blanca con parches oscuros alrededor de los ojos; parte inferior del cuerpo blanca con las puntas de las alas negras; parte superior gris con el hombro oscuro y la cola blanca. Permanece suspendido en el aire por medio de un rápido aleteo (como el halcón cernícalo) antes de dejarse caer sobre su presa. Anida en árboles o arbustos.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve árboles solitarios y matorral alto para lugares de anidación; minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.




Gavilán Rastrero (*Circus hudsonius*) Northern Harrier

ID: En vuelo, el macho es gris en la parte superior y blanco en la inferior, alas con puntas negras; la hembra es café en la parte superior con rayas café en la inferior. Ambos tienen una cola larga con una banda blanca rectangular en la rabadilla. Vuela bajo sobre el suelo con su cabeza hacia abajo.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve pastizales abiertos. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.




Aguililla de Swainson (*Buteo swainsoni*) Swainson's Hawk

ID: El adulto típico tiene vientre y barbilla blancos, contrastando con la cabeza café y la pechera café rojizo. Alas blancas y café oscuro. Generalmente busca presas volando, pero en ocasiones caza chapulines y grillos parado en el suelo, por lo que se le conoce como "aguililla chapulinera". Construye un nido voluminoso de palos, usualmente en lo alto de un árbol o yuca.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Conserve pastizales abiertos; mantenga arbustos o solitarios para anidación. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



Aguililla Cola Roja (*Buteo jamaicensis*) Red-tailed Hawk

ID: El adulto típico tiene cola rojiza, banda café oscura a través del vientre blanco y coloración oscura en el extremo frontal de cada ala, cercano al cuerpo. Caza por observación desde una percha o mientras vuela.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Conserve áreas naturales con árboles grandes para anidación. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



Aguililla Real (*Buteo regalis*) Ferruginous Hawk

ID: En vuelo, los adultos típicos son casi completamente blancos en la parte inferior, resaltando las patas color óxido; dorso y partes superiores color teja u óxido. La cola carece de las bandas oscuras que presentan la mayoría de las aguilillas.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve pastizales abiertos y perritos de la pradera. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



© G. Levandoski

Águila Real (*Aquila chrysaetos*) Golden Eagle

ID: El adulto es café oscuro con plumas doradas en la cabeza y nuca; los inmaduros muestran zonas blancas hacia el final de cada ala y en la base de la cola. Notablemente más grande que aguilillas, auras y zopilotes. Construye voluminosos nidos de palos en acantilados, afloramientos rocosos o árboles. Caza principalmente volando.


Hábitat:




Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve pastizales abiertos y perritos de la pradera. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



Cernícalo Americano (*Falco sparverius*) American Kestrel

ID: Halcón pequeño con alas puntiagudas y cola larga. El macho tiene alas azul grisáceas y una espalda café rojiza; la hembra es café rojiza en general. Ambos sexos tienen dos líneas verticales negras en cada lado de la cabeza. A veces caza suspendido en el aire (cernirse) mediante un aleteo rápido; también caza desde perchas como árboles, cercas y postes.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve pastizales abiertos. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



Halcón Fajado (*Falco femoralis*) Aplomado Falcon

ID: Parte superior del cuerpo color gris azulado, patrón de bandas en blanco y negro en la cabeza; parte inferior tricolor, pecho color claro, vientre medio con una banda oscura y vientre bajo y parte inferior de la cola color canela. Caza en parejas de forma cooperativa.

Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve pastizales abiertos, mantenga árboles y yucas altas solitarias para anidación. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



Halcón Mexicano (*Falco mexicanus*) Prairie Falcon

ID: Alas puntiagudas típicas de los halcones. En vuelo, las alas y el cuerpo son pálidos, contrastando con el color café oscuro de las “axilas”. Delgadas bandas café oscuro se extienden verticalmente desde los ojos.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve pastizales abiertos. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



Halcón Esmerejón (*Falco columbarius*) Merlin

ID: Halcón pequeño pero robusto. Cola oscura con 3-4 bandas grises y una banda blanca en la parte final. La espalda del macho es azul grisáceo, en las hembras e inmaduros es gris rojizo. Pecho pálido con rayas oscuras. Caza con un vuelo rápido y bajo y capturan sus presas en el aire.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve pastizales abiertos. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.




Codorniz Escamosa (*Callipepla squamata*) Scaled Quail

ID: Gris con plumas de punta negra que dan una apariencia de escamas. Tiene una cresta con plumas claras en la parte terminal. Casi siempre anda en parvadas.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Evite el sobrepastoreo y mantenga hierbas que sirvan de cobertura y alimento.




Codorniz de Gambel (*Callipepla gambelii*) Gambel's Quail

ID: Los adultos tienen espalda y pecho gris azulado y una sobresaliente pluma negra curvada en la cabeza. El macho tiene garganta negra y corona rojiza, ambas delimitadas por líneas blancas. La hembra es menos colorida. Vive en grupos y caminan por el suelo.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Evite el sobrepastoreo y mantenga hierbas que sirvan de cobertura y alimento.




Chorlo Tildío (*Charadrius vociferus*) Killdeer

ID: Vientre, barbilla y pecho blancos, contrastando con dos bandas negras en el pecho, que ningún otro playero de Norteamérica posee. La rabadilla café rojiza resalta cuando vuela o al realizar su exhibición de ala rota para distraer a un depredador cerca del nido.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve colonias de perritos de la pradera. Minimice el uso de pesticidas.




Chorlo Llanero (*Charadrius montanus*) Mountain Plover

ID: Espalda y alas café pálido, vientre y pecho blancos, corona parcial negra, frente blanca y raya negra entre el ojo y el pico negro.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Conserve pastizales cortos con colonias de perritos de la pradera. Minimice el uso de pesticidas.




Zarapito Pico Largo (*Numenius americanus*)
Long-billed Curlew

ID: Ave playera muy grande de aproximadamente 60 cm de altura. Pico extremadamente largo y curvado hacia abajo. Cuerpo y alas de colores café y canela. El canto es un fuerte y ascendente “cur-lew” o “cur-lee”.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve pastizales abiertos y presones ganaderos. Evite el uso de pesticidas.




Grulla Gris (*Antigone canadensis*) Sandhill Crane

Identificación: Ave grande con alas anchas. En general gris con plumas color bronce en el cuerpo, garganta blanca y corona roja. Vuelan con el cuello estirado y los pies detrás.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Conserve humedales




Huilota Común (*Zenaida macroura*) Mourning Dove

ID: Café grisácea en general, con manchas negras en las alas y cola larga y puntiaguda. Su familiar canto suena similar a un arrullo triste, como un lamento.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Evite el uso de pesticidas. Mantenga a los gatos dentro de la casa.




Paloma de Collar Turca (*Streptopelia decaocto*) Eurasian Collared-Dove

ID: Paloma grande con una cabeza pequeña y un pico delgado y oscuro. Partes inferiores pálidas y cola cuadrada con una amplia banda blanca en la punta. Note el collar negro en la parte posterior del cuello.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Especie exótica e invasora. Evite el uso de pesticidas.



Lechuza de Campanario (*Tyto alba*) Barn Owl

ID: Cara, pecho y vientre blancos, cabeza, espalda y alas color gris y óxido, ojos oscuros. Anida en construcciones o en huecos de acantilados y paredes de ríos o terraplenes.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



Búho Cornudo (*Bubo virginianus*) Great Horned Owl

ID: Búho grande y grisáceo con la garganta blanca, ojos amarillos y dos prominentes orejas (“cuernos”) sobre postes y árboles, al anochecer o amanecer. Utiliza nidos de palos y ramas construidos por cuervos o rapaces para anidar en árboles o riscos.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



Tecolote Llanero (*Athene cunicularia*) Burrowing Owl

ID: Búho pequeño, de 20 a 25 cm, ojos amarillos, espalda y alas café con manchas blancas, pecho y abdomen café claro con bandas café oscuro. Depende de los perritos de la pradera para mantener las madrigueras que usa para anidar y descansar.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Deje las madrigueras inactivas y conserve los perritos de la pradera. Minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



Búho Sabanero (*Asio flammeus*) Short-eared Owl

ID: Búho mediano (aproximadamente 60 cm de altura) con áreas oscuras alrededor de los ojos, pecho con barrado café oscuro y vientre claro. "Orejas" cortas, difíciles de observar. Percha en el suelo entre pastos altos durante el día, aunque también se puede observar volando.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Conserve pastizales abiertos y minimice el uso de pesticidas, veneno para roedores y agroquímicos.



Búho Cara Canela (*Asio otus*) Long-eared Owl

ID: Búho mediano y delgado (aproximadamente 60 cm de altura) con áreas color anaranjado alrededor de los ojos, barrado café oscuro en pecho y vientre claro. "Orejas" largas y evidentes. Forman dormideros comunales en vegetación arbórea con follaje denso como encinos, juníperos y mezquites.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Conserve pastizales abiertos y árboles y matorrales altos para anidación. Minimice el uso de pesticidas.



Chotacabras Menor (*Chordeiles acutipennis*) Lesser Nighthawk

ID: Café grisáceo en general, alas puntiagudas y anguladas con una banda blanca hacia la punta. Observado comúnmente volando durante el crepúsculo; aleteo rígido y vuelo errático, similar al de un murciélago.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga a matorrales, pastizales y humedales. Minimice el uso de pesticidas.



Carpintero Mexicano (*Dryobates scalaris*) Ladder-backed Woodpecker

ID: Carpintero pequeño; partes superiores barradas en blanco y negro. El macho presenta corona y nuca rojas y las hembras en color negro.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantener zonas con chollas, mezquites y árboles muertos.




Papamoscas Llanero (*Sayornis saya*) Say's Phoebe

ID: Cabeza, espalda y alas grisáceas, pecho gris más claro, vientre canela y cola negra. Percha frecuentemente en las cercas, donde puede ser visto balanceando su cola. Anida en las repisas de casas y otros edificios, también debajo de puentes y en bancos de arena.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Minimice el uso de pesticidas.



T. verticalis

T. vociferans


Tirano Pálido (*Tyrannus verticalis*) Western Kingbird
Tirano Chibiú (*Tyrannus vociferans*) Cassin's Kingbird

ID: Especies casi idénticas; ambas con vientre amarillo y cola oscura; *T. verticalis* tiene cabeza y pecho gris claro y *T. vociferans* con cabeza y pecho gris oscuro, resaltando ligeramente la barbilla blanca. Canto áspero que suena como un casete reproducido a alta velocidad.

Hábitat:





Alimentación:



Estatus:



Conservación: Minimice el uso de pesticidas. Mantenga árboles maduros para perchas y anidación.






Verdugo Americano (*Lanius ludovicianus*) Loggerhead Shrike

ID: Cuerpo gris, alas negras, manchas blancas y antifaz negro.
Empala a sus presas en las espinas de arbustos y púas de alambres.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales abiertos con arbustos dispersos para su anidación. Minimice el uso de pesticidas y evite el uso de veneno para roedores.



Alondra Cornuda (*Eremophila alpestris*) Horned Lark

ID Espalda, alas y cola café, vientre y pecho blancos, cabeza café y amarillo pálido con marcas negras visibles, banda negra en pecho y pequeños "cuernos" negros usualmente difíciles de observar.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales abiertos y minimice el uso de pesticidas.



Golondrina Risquera (*Petrochelidon pyrrhonota*) Cliff Swallow

ID: Espalda, alas y cola, collar y rabadi-lla, corona negro azulada, cara café rojiza y vientre blanco. Frente blanca muy distinguible. Como en todas las golondrinas, el vuelo es rápido y acrobático. Construye nidos de barro en colonias en barrancas, riscos, debajo de puentes, pasos a desnivel de autopistas y en edificios.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Minimice el uso de pesticidas.




Golondrina Tijereta (*Hirundo rustica*) Barn Swallow

ID: Espalda, alas y cabeza negro azulado oscuro, garganta y frente color terracota pecho y vientre café. Distintiva cola larga y bifurcada.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Minimice el uso de pesticidas.



Cuervo Llanero (*Corvus cryptoleucus*) Chihuahuan Raven

ID: Negro, grande, con un pico pesado y voz profunda. Aunque al cuervo común (especie casi idéntica) también se le observa en el desierto Chihuahuense, es más común en zonas serranas; es de tamaño ligeramente mayor y con un pico un poco más grande que el cuervo llanero.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Evite el uso de veneno para roedores.




Saltapared de Rocas (*Salpinctes obsoletus*) Rock Wren

ID: Espalda, cabeza y alas cafés con finas marcas negras y blancas, pecho pálido con tenues rayas café y vientre café. Se mueve hacia arriba y hacia abajo como si hiciera sentadillas.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales en lomeríos y minimice el uso de pesticidas.




Matraca del Desierto (*Campylorhynchus brunneicapillus*) Cactus Wren

ID: Chivirín grande y robusto de pico grueso. Pecho con manchas negras, notable ceja blanca y larga cola redondeada. Construye nidos grandes con forma de balón de fútbol en cactus o arbustos espinosos.

Hábitat:




Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga matorrales desérticos con cactáceas grandes y yucas para anidar.




Azulejo Pálido (*Sialia currucoides*) Mountain Bluebird

ID: Ave canora de cuerpo pequeño, macho azul cielo con vientre blancuzco; hembra ligeramente café con alas y cola azules y vientre blanco.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales y matorrales y minimice el uso de pesticidas.



Cuitlacoche Pico Curvoo (*Toxostoma curvirostre*)
Curve-billed Thrasher

ID: Ave mediana color café grisáceo, con un pico negro, largo, delgado y curvo.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Mantenga matorrales desérticos nativos.



Bisbita Llanera (*Anthus spragueii*) Sprague's Pipit

ID: Parecida a un gorrión pero con un pico más delgado. Pardo arriba, pecho rayado y vientre blancuzco. Plumas exteriores de la cola blancas, muy vistosas cuando emprende el vuelo o aterriza. Los machos cantan mientras dan una vuelta en el aire. Durante la migración e invierno son solitarios aunque pueden encontrarse en pequeños grupos dispersos.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales abiertos.



Bisbita Norteamericana (*Anthus rubescens*) American Pipit

ID: Ave pequeña y delgada color café grisáceo en la parte superior y con rayado variable en la inferior. Note el pico corto y delgado, el anillo ocular blanco y la garganta sin marcas. Camina por el suelo y mueve la cola frecuentemente.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Proteja los cuerpos de agua en áreas abiertas y minimice el uso de pesticidas.




Rascador Viejita (*Melospiza fusca*) Canyon Towhee

ID: Gorrión grande color café, corona y parte inferior de la cola rojiza, pecho claro con marcas oscuras y una mancha oscura central. Generalmente se encuentra en el suelo o en las partes bajas de la vegetación.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Mantenga matorrales y pastizales y minimice el uso de pesticidas.




Rascador Cola Verde (*Pipilo chlorurus*) Green-tailed Towhee

ID: Gorrión grande con pico grueso y cola larga. En general grisáceo, con alas y cola verdes y una brillante gorra rojiza. Normalmente se encuentra en el suelo o cerca de él.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga matorrales desérticos y otras áreas arbustivas. Minimice el uso de pesticidas.



Zacatonero de Cassin (*Peucaea cassinii*) Cassin's Sparrow

ID: Gorrión gris claro, con finas marcas oscuras en la espalda generando un patrón escamoso. Cola larga y redondeada con plumas graduadas de puntas blancas, notables cuando vuela. En verano, el macho canta en vuelo como parte de su exhibición territorial, subiendo y bajando hacia una percha. En invierno es muy sigiloso.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales abiertos con arbustos dispersos.



Zacatonero Garganta Negra (*Amphispiza bilineata*)
Black-throated Sparrow

ID: Gorrión de pico grueso y llamativas marcas blanco y negro en la cabeza. Delgadas bandas blancas encima (ceja) y debajo del ojo (malar) y garganta y pecho negros. Note las plumas exteriores blancas de la cola.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga arbustos nativos y reduzca la urbanización.



Gorrion de Brewer (*Spizella breweri*) Brewer's Sparrow

ID: Gorrion pequeño de cola larga ligeramente bifurcada, café grisáceo con marcas negras en la espalda y alas, pecho y vientre gris sin marcas y ceja gris. Forma parvadas mixtas con otros *Spizella* y gorriones durante la migración e invierno.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga matorrales y pastizales desérticos. Evite el uso de pesticidas.




Gorrión Pálido (*Spizella pallida*) Clay-colored Sparrow

ID: Gorrión pequeño de cola larga ligeramente bifurcada, partes superiores cafés con un rayado oscuro, nuca gris, rostro con cejas y malar claras distintivas en el rostro y bordeadas por líneas oscuras. Pecho y vientre sin marcas. Forma parvadas mixtas con otros *Spizella* y gorriones durante la migración e invierno.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga matorrales y pastizales desérticos.




Gorrion Cejas Blancas (*Spizella passerina*) Chipping Sparrow

ID: Gorrion pequeño de cola larga ligeramente bifurcada, corona rojiza y partes superiores café y gris, pecho y vientre grises sin marcas. Note la línea negra que inicia desde el pico y continúa después del ojo. Forma parvadas hasta cientos de individuos, a menudo con otros gorriones.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga bosques de encino y matorrales.




Gorrión Altiplanero (*Spizella wortheni*) Worthen's Sparrow

ID: Gorrión pequeño de cola larga ligeramente bifurcada, rostro gris con un distintivo anillo ocular blanco, corona rojiza y partes superiores barradas en café. Alas sin bandas notables, pecho y vientre sin marcas. Durante el invierno forma parvadas con la misma especie y con otros gorriónes como *Amphispiza bilineata* y *Pooecetes gramineus*.

Hábitat:



Alimentación:



Estatus:

Peligro de extinción



Conservación: Mantenga pastizales y matorrales desérticos dentro de su distribución actual, especialmente donde haya perritos de la pradera.



Gorrión Cola Blanca (*Pooecetes gramineus*) Vesper Sparrow

ID: Gorrión mediano a grande, café grisáceo con marcas negras en la espalda y alas, finas rayas negras sobre el pecho y anillo ocular blanco. Plumas blancas en la parte exterior de la cola son notorias cuando el ave vuela. Hombro rojizo es observable a corta distancia. En el invierno se puede observar en pequeñas parvadas con otros gorriónes como *Passerculus sandwichensis* y *Spizella breweri*.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales desérticos con arbustos dispersos.




Gorrión Arlequín (*Chondestes grammacus*) Lark Sparrow

ID: Gorrión grande y distintivo, espalda y alas en colores gris, negro y café, pecho grisáceo con una mancha central negra, vientre blanco, y patrón único y distinguible de bandas negras, blancas, café rojizo y amarillo en la cabeza. Cola redondeada con notables esquinas blancas cuando vuela. Forma parvadas de varios individuos durante la migración en invierno, en ocasiones con otros gorriónes.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales con arbustos y árboles dispersos, especialmente en áreas del pie de montaña.



Gorrión Alas Blancas (*Calamospiza melanocorys*) Lark Bunting

ID: Gorrión grande con un grueso pico gris azulado. Durante el verano, el macho es casi completamente negro con gruesas bandas blancas en cada ala. El macho no reproductivo y la hembra son mayormente café grisáceo con un patrón barrado, pero mantienen la distintiva banda blanca en el ala. Son altamente gregarios y sociales durante la migración e invierno, forman parvadas desde algunos individuos hasta varios cientos.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales abiertos con arbustos dispersos. Minimice el uso de pesticidas.




Gorrión Sabanero (*Passerculus sandwichensis*) Savannah Sparrow

ID: Gorrión mediano de tonos cafés y cola corta, ceja generalmente amarilla, (puede ser clara), línea post-ocular y malar oscuras. Pecho claro con una mancha central y con rayas oscuras y gruesas. Las parvadas durante la migración e invernación pueden incluir otros gorriones.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales abiertos.





Gorrión de Baird (*Centronyx bairdii*) Baird's Sparrow

ID: Gorrión mediano de cola corta y cabeza plana, marcas negras y ante u ocre, ceja ante, corona con línea central ocre, pecho blanco con oscuras rayas cortas en la parte superior y lateral. Sigiloso, raramente vuela, prefiere caminar sobre el suelo. Migra solo o en pequeños grupos; en los sitios de invernación no forma parvadas.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Mantenga pastizales abiertos con un pastoreo ligero.




Gorrión Chapulín (*Ammodramus savannarum*) Grasshopper Sparrow

ID: Gorrión pequeño a mediano de cola corta y cabeza plana, patrón café, negro, gris y blanco en la espalda y alas, cabeza café con una línea central delgada, pecho y lados ocre, a menudo con una mancha amarillo anaranjado encima del ojo. Canta similar al zumbido de un insecto. Migra solo o en pequeños grupos; en los sitios de invernación no forma parvadas.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales abiertos con pastoreo ligero a moderado.



Gorrión Corona Blanca (*Zonotrichia leucophrys*) White-crowned Sparrow

ID: Gorrión mediano gris y espalda rayada con colores café. El adulto, presenta un patrón de bandas gruesas en blanco y negro en la cabeza. Los inmaduros son más cafés y las bandas de la cabeza son café rojizo en lugar de negro. Forma parvadas durante la migración en invernación de varios individuos, a menudo con otros gorriónes.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Mantenga pastizales con arbustos y matorrales y minimice el uso de pesticidas.



Escribano Pico Gueso (*Rhynchophanes mccownii*) Thick-billed Longspur

ID: El macho (izquierda) tiene: garganta blanca, parte superior del pecho negra, hombro rojo óxido, cabeza gris coronilla negra. La hembra (deracha) es color: café y negro, parte superior del pecho finamente marcada con negro y hombro castaño. Ambos sexos tienen una “T” negra invertida en la cola blanca que puede ser vista cuando vuelan. En el invierno, forma parvadas grandes hasta cientos de individuos, a veces con otras especies de escribanos, en particular escribano (*C.ornatus*).


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales cortos y abiertos con pastoreo intensivo.




Escribano de Collar Castaño (*Calcarius ornatus*) Chestnut-collared Longspur

ID: El macho tiene la espalda y alas color negro y gris, nuca castaña, corona negra, ceja blanca y pecho y parte superior del vientre negros. La hembra es café y negro todo el cuerpo. Ambos sexos tienen un triángulo negro en la cola blanca que puede ser visto cuando vuelan. En el invierno, forma parvadas grandes hasta cientos de individuos, a veces con otras especies de escribanos, en particular *R. mccownii*.”


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales abiertos. Minimice el uso de pesticidas.



S. magna



S. neglecta

Pradero Tortilla con Chile (*Sturnella magna*)
Pradero del Oeste (*Sturnella neglecta*)

ID: Aves rechonchas de cola corta, espalda y alas café con marcas oscuras, pecho y vientre amarillos y una distintiva marca negra en forma de "V" en el pecho. Ambas especies son muy similares y se distinguen más fácilmente por su canto; *S. neglecta* suena similar a una flauta y *S. magna* utiliza silbidos suaves. *S. magna* muestra un amarillo más intenso, rayas en el costado más gruesas y una banda (malar) desde la pico totalmente blanca, en comparación con *S. neglecta*. Ambas especies forman parvadas durante la migración e invernación; pueden ser mixtas.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Mantenga pastizales con arbustos dispersos y minimice el uso de pesticidas.




Tordo Ojos Amarillos (*Euphagus cyanocephalus*) Brewer's Blackbird

ID: El macho es negro brillante con ojos amarillos. La hembra es café con ojos café oscuros. Comparado con el Zanate Mayor, la cola es más corta y el pico más corto y recto.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Minimice el uso de pesticidas.




Tordo Cabeza Amarilla (*Xanthocephalus xanthocephalus*)
Yellow-headed Blackbird

ID: Tordo grande, de cuerpo robusto, cabeza grande y pico largo y cónico. Los machos tienen la cabeza y el pecho de color amarillo brillante y el cuerpo negro. Las hembras son color café con las marcas amarillas de la cabeza y pecho menos brillantes y menos extendidas. En vuelo, es visible una mancha blanca en las alas.



Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Minimice el uso de pesticidas.




Tordo Cabeza Café (*Molothrus ater*) Brown-headed Cowbird

ID: El macho tiene el cuerpo negro brillante con la cabeza café, la hembra es café grisácea con marcas oscuras indistintas, ambos tienen un pico negro cónico. El canto del macho suena como un “glug-glug-gee”.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Son comunes y representan un riesgo para algunas especies amenazadas.



Pinzón Mexicano (*Haemorhous mexicanus*) House Finch

ID: Gorrión café grisáceo, pecho y vientre con un rayado intenso. El macho presenta una coloración variable desde amarillo hasta rojo intenso en la corona, rostro, pecho, vientre y rabadilla.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:




Conservación: Minimice el uso de pesticidas y mantener a los gatos adentro.




Corrión Doméstico (*Passer domesticus*) House Sparrow

ID: El macho tiene la espalda y alas café y negras, corona gris, nuca castaña con mejillas blancas, pecho y barbilla negras, vientre blanco; la hembra tiene pecho café grisáceo, ceja ocre, espalda y alas café y gris.


Hábitat:



Alimentación:



Estatus:



Conservación: Especie exótica. Minimice el uso de pesticidas. Mantenga los gatos a dentro de casa.

Índice

Especies	página
Iconos de Guía	i
Tipos de Hábitat	ii - iii
Milano Cola Blanca (<i>Elanus leucurus</i>) White-tailed Kite	1
Gavilán Rastrero (<i>Circus cyaneus</i>) Northern Harrier	2
Aguililla de Swainson (<i>Buteo swainsoni</i>) Swainson's Hawk	3
Aguililla Cola Roja (<i>Buteo jamaicensis</i>) Red-tailed Hawk	4
Aguililla Real (<i>Buteo regalis</i>) Ferruginous Hawk	5
Águila Real (<i>Aquila chrysaetos</i>) Golden Eagle	6
Cernícalo Americano (<i>Falco sparverius</i>) American Kestrel	7
Halcón Fajado (<i>Falco femoralis</i>) Aplomado Falcon	8
Halcón Mexicano (<i>Falco mexicanus</i>) Prairie Falcon	9
Halcón Esmerejón (<i>Falco columbarius</i>) Merlin	10
Codorniz Escamosa (<i>Callipepla squamata</i>) Scaled Quail	11
Codorniz de Gambel (<i>Callipepla gambelii</i>) Gambel's Quail	12
Chorlo Tildío (<i>Charadrius vociferus</i>) Killdeer	13
Chorlo Llanero (<i>Charadrius montanus</i>) Mountain Plover	14
Zarapito Pico Largo (<i>Numenius americanus</i>) Long-billed Curlew	15
Grulla Gris (<i>Antigone canadensis</i>) Sandhill Crane	16
Huilota Común (<i>Zenaida macroura</i>) Mourning Dove	17
Paloma de Collar Turca (<i>Streptopelia decaocto</i>) Eurasian Collared-Dove	18
Lechuza de Campanario (<i>Tyto alba</i>) Barn Owl	19
Búho Cornudo (<i>Bubo virginianus</i>) Great Horned Owl	20
Tecolote Llanero (<i>Athene cunicularia</i>) Burrowing Owl	21
Búho Sabanero (<i>Asio flammeus</i>) Short-eared Owl	22
Búho Cara Canela (<i>Asio otus</i>) Long-eared Owl	23
Chotacabras Menor (<i>Chordeiles acutipennis</i>) Lesser Nighthawk	24
Carpintero Mexicano (<i>Picoides scalaris</i>) Ladder-backed Woodpecker	25
Papamoscas Llanero (<i>Sayornis saya</i>) Say's Phoebe	26
Tirano Pálido (<i>Tyrannus verticalis</i>) Western Kingbird	27
Tirano Chibiú (<i>Tyrannus vociferans</i>) Cassin's Kingbird	27
Verdugo Americano (<i>Lanius ludovicianus</i>) Loggerhead Shrike	28
Alondra Cornuda (<i>Eremophila alpestris</i>) Horned Lark	29
Golondrina Risquera (<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>) Cliff Swallow	30
Golondrina Tijereta (<i>Hirundo rustica</i>) Barn Swallow	31
Cuervo Llanero (<i>Corvus cryptoleucus</i>) Chihuahua Raven	32
Saltapared de Rocas (<i>Salpinctes obsoletus</i>) Rock Wren	33
Matraca del Desierto (<i>Campylorhynchus brunneicapillus</i>) Cactus Wren	34
Azulejo Pálido (<i>Sialia currucoides</i>) Mountain Bluebird	35
Cuitlacoche Pico Curvo (<i>Toxostoma curvirostre</i>) Curve-billed Thrasher	36
Bisbita Llanera (<i>Anthus spragueii</i>) Sprague's Pipit	37

Especies

página

Bisbita Americano (<i>Anthus rubescens</i>) American Pipit	38
Rascador Viejita (<i>Pipilo fuscus</i>) Canyon Towhee	39
Rascador Cola Verde (<i>Pipilo chlorurus</i>) Green-tailed Towhee	40
Zacatonero de Cassin (<i>Aimophila cassinii</i>) Cassin's Sparrow	41
Zacatonero Garganta Negra (<i>Amphispiza bilineata</i>) Black-throated Sparrow	42
Gorrión de Brewer (<i>Spizella breweri</i>) Brewer's Sparrow	43
Gorrión Pálido (<i>Spizella pallida</i>) Clay-colored Sparrow	44
Gorrión Cejas Blancas (<i>Spizella passerina</i>) Chipping Sparrow	45
Gorrión Altiplanero (<i>Spizella wortheni</i>) Worthen's Sparrow	46
Gorrión Cola Blanca (<i>Pooecetes gramineus</i>) Vesper Sparrow	47
Gorrión Arlequín (<i>Chondestes grammacus</i>) Lark Sparrow	48
Gorrión Alas Blancas (<i>Calamospiza melanocorys</i>) Lark Bunting	49
Gorrión Sabanero (<i>Passerculus sandwichensis</i>) Savannah Sparrow	50
Gorrión de Baird (<i>Centronyx bairdii</i>) Baird's Sparrow	51
Gorrión Chapulín (<i>Ammodramus savannarum</i>) Grasshopper Sparrow	52
Gorrión Corona Blanca (<i>Zonotrichia leucophrys</i>) White-crowned Sparrow	53
Escribano Pico Gueso (<i>Rhyncophanes mccownii</i>) Thick-billed Longspur	54
Escribano de Collar Castaño (<i>Calcarius ornatus</i>) Chestnut-collared Longspur	55
Pradero Tortilla con chile (<i>Sturnella magna</i>) Eastern Meadowlark	56
Pradero del Oeste (<i>Sturnella neglecta</i>) Western Meadowlark	56
Tordo Ojos Amarillos (<i>Euphagus cyanocephalus</i>) Brewer's Blackbird	57
Tordo Cabeza Amarilla (<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>) Yellow-headed Blackbird	58
Tordo Cabeza Café (<i>Molothrus ater</i>) Brown-headed Cowbird	59
Pinzón Mexicano (<i>Carpodacus mexicanus</i>) House Finch	60
Gorrión Doméstico (<i>Passer domesticus</i>) House Sparrow	61

Agradecimientos

Esta es la segunda edición de la guía y se basa en la primera versión en inglés de “Una guía de bolsillo para las aves de la pradera”, producida en 2003 por Scott Gillihan y Tammy VerCauteren del Observatorio de Aves de las Montañas Rocosas. La traducción original de esta guía fue realizada por el Dr. Mauricio Cotera Correa de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León - Linares. Esta edición fue actualizada por Erin Youngberg, Erin Strasser, Arvind Panjabi, con revisiones de Irene Ruvalcaba.

La producción de esta guía fue financiada por U.S.D.A. Forest Service International Program, Canadian Wildlife Service, ProNatura Noreste, Rio Grande Joint Venture, y US Fish and Wildlife Service.

Muchas de las fotografías en esta guía fueron donadas; apreciamos grandemente la generosidad de los fotógrafos: José Hugo Martínez Guerrero, Doug Backlund, Glen Walbek, Arvind Panjabi, Aaron Driscoll, Roberto Rodríguez, John Carr, Bob Camp, Greg Levandoski, Louis Moore, Erin Strasser, Ernesto Flores, Dawn Wilson, Julie Price, Denís Perez, Fernando Boza, Bill Schmoker, John Delorenzo, Deanna Butler, Alberto Macías Duarte y Mike Forsberg. *Spizella passerina* adulto por CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/jpg>. Foto del río San Pedro por BLM. Otras fotos se utilizan con permiso de las colecciones de Bird Conservancy of the Rockies.

*Frente: familia de Tecolotes Llaneros (Athene cunicularia) de Robert Martínez.
Atrás: Parvada de Escribanos de Cuello Castaño y Pico Grueso de José Hugo Martínez Guerrero*

Impresa por ColorPro Printing www.https://colorproprint.com/



Environment and
Climate Change Canada

Environnement et
Changement climatique Canada