

Fayodia gracilipes (Britzelm.) Bresinsky & Stangl
(≡ *Clitocybe gracilipes* (Britzelm.) Sacc.)



© Patricia Siljeström

Marasmius oreades (Bolton) Fr.



© José Cuesta y Miguel Ángel Ribes

Marasmius oreades (Bolton) Fr.



© Miguel Ángel Pérez-De Gregorio

| | Fayodia gracilipes | Marasmius oreades |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sombrero | Pequeño, menor de 2 cm, convexo desde el principio, margen levantado con la edad, superficie lisa, satinada, higrófono, de color gris a beige cuando está húmedo, blanco crema en seco | Color pardo avellana, crema con la edad |
| Láminas | Blanquecinas, crema, alguna vez con tonos asalmonados | Blancas, distantes, espaciadas |
| Carne | Blanca, gruesa en el centro, olor agradable, fúngico | Elástica, blanquecina, con olor a almendras amargas |
| Pie | Fibroso, frágil | Elástico, se retuerce sin romperse |
| Hábitat | En praderas alpinas y subalpinas | En praderas no alpinas, a menudo formando corros de brujas |
| Observaciones | <i>Fayodia gracilipes</i> se caracteriza por su hábitat alpino o subalpino, distinto de <i>Marasmius oreades</i> , de ambientes más templados, del que se puede diferenciar bien por el olor a almendras amargas y el pie elástico de este último. <i>Fayodia gracilipes</i> produce intoxicación de tipo sudoriano o muscarínico. | |

Senderuela, seta de carrerilla

© José Cuesta y Miguel Ángel Ribes