

Myriophyllum quitense Kunth

FAMILIA HALORAGACEAE



Etimología: Del griego: *myrio*= innumerable y *phyllum*= hoja.

quitense= que alude a su localización en Quito.

Nombre común: Loroma, Hierba del sapo

Origen: Nativa. Habita en el continente Americano.

Descripción: Hierba perenne, acuática, parcialmente sumergida, arraigada al sustrato. Tallos de hasta 3 m de largo, ramificado en los nudos. Hojas dimorfas, verticiladas, las sumergidas compuestas, anchamente ovadas, de 1,7-3,7 cm de largo, con segmentos laciniados; con emergencias en la base y el ápice de cada lacinia; hojas aéreas enteras, ovadas, de 0,5-1 cm de largo. Flores unisexuales o hermafroditas, las femeninas restringidas a la base de la espiga, con sépalos y pétalos rudimentarios; flores hermafroditas con sépalos de 0,8-1 mm de largo, soldados en la base, a veces finamente dentados; pétalos generalmente caducos, de 2-2,5 mm de largo; estambres 8, anteras linear-oblongas, de 1,7-2 mm de largo. Ovario con 4 carpelos. Fruto seco, dehiscente en 4 mericarpos uniseminados.

Distribución: En Chile se encuentra desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Magallanes.

Hábitat: Lagos, lagunas, charcas, embalses, arroyos y ríos de aguas limpias y tranquilas.

Observaciones: Es empleada por muchas especies de aves acuáticas para construir sus nidos. También es utilizada como planta de acuario.

