

Pteris semiadnata Phil.

PTERIDACEAE

Hierba perenne con rizoma erecto, casi negro, escamoso. Hojas de 90 a 140 cm de largo; pecíolos lisos, de 4 a 6 mm de diámetro, de cerca de la mitad del largo total de la hoja; lámina herbácea, bipinnada, a veces las pinnas basales tripinnatífidas, glabra, de contorno triangular, de color verde claro; pinnas alternas, inclinadas hacia el ápice formando ángulo agudo con el raquis; últimos segmentos grandes, de 5 a 10 cm de largo por 0,7 a 1,5 cm de ancho, con la base fuertemente decurrente en la base; margen ligeramente dentado, con los dientes notorios hacia el ápice. Soros sobre el nervio que recorre el borde de la lámina, formando cenosoros que ocupan hasta dos tercios del largo del segmento, sin indusio y protegidos por el margen revuelto membranoso, de 0,5 mm de ancho, generalmente continuo.

Caracteres relevantes: Hojas bipinnadas; últimos segmentos con la base fuertemente decurrente en la base. Soros formando cenosoros que ocupan hasta dos tercios del largo del segmento, sin indusio y protegidos por el margen revuelto membranoso.

Nativo de Chile y Argentina, también en el Archipiélago de Juan Fernández, desde la provincia de Concepción hasta la provincia Última Esperanza, desde cerca del nivel del mar hasta los 1.370 m de altitud. Prefiere para su desarrollo las orillas de esteros y arroyos, y las laderas de los cerros con bosques y matorrales, siempre que haya suficiente humedad.



