

# Calceolaria dentata

Ruiz & Pav.

Capachito, topa-topa

**Floración:** 

**Fructificación:** 

**Familia:** Calceolariáceas (antes Escrofulariáceas).

**Origen geográfico:** Endémica de Chile y Argentina.

**Distribución en Chile:** Regiones de O'Higgins a la de Los Lagos.

**Descripción:** Arbusto siempreverde, de hasta 70 cm de altura. Ramas poco leñosas, erectas y ramificadas desde la base, pubescentes. Hojas verde claro a verde oscuro, desde angostas hasta elípticas, dobladas hacia arriba a lo largo del nervio central, de márgenes doblemente dentados. Inflorescencia separada o no según la subespecie de la parte vegetativa. Cimas densas de hasta 20 flores color amarillo oro. Flores con el labio superior del mismo largo que el inferior ovalado e inflado, labio inferior inflado y junto al superior dejando sólo una pequeña rendija entre ambos. Florece en primavera. Fruto, una cápsula pilosa con numerosas semillas; madura a fines del verano.

En la Región existen dos subespecies: *C. dentata* ssp. *dentata*, con la inflorescencia con hasta 12 flores, separada de la parte vegetativa, hojas verde oscuro, no pegajosas y dobladas a lo largo, flores grandes y *C. dentata* ssp. *araucana* con la inflorescencia poco densa, separada de la parte vegetativa, hojas verde oscuras, dobladas, no pegajosas, flores grandes, infladas pero escasas.

**Hábitat:** Crece a pleno sol, en lugares abiertos, desde la cordillera de la Costa hasta la precordillera andina.

**Propagación:** Se propaga por semillas plantadas en almácigo normal en primavera o estratificado en otoño.

**Utilización:** Se planta en los jardines en medio de prados florales o en macetas, jardineras y balcones de exposición norte.



