

Leptocarpha rivularis

DC.

Palito negro

Floración:   **Fructificación:** 

Familia: Asteráceas (Compuestas).

Origen geográfico: Endémica de Chile.

Distribución en Chile: Regiones del Maule a la de Los Lagos.

Descripción: Arbusto siempreverde, de hasta 2 m de altura por similar diámetro. Ramas semileñosas, erectas, vellosas cuando nuevas, de corteza negra, estriada al envejecer. Hojas pecioladas, ásperas, aromáticas, verde oscuras por la haz y más claras por el envés, láminas grandes, de hasta 10 cm de longitud, ligeramente acuminadas y de márgenes aserrados. En invierno pierde parte de sus hojas. Flores en cabezuelas de 2 cm de diámetro, involucre con brácteas lanceoladas y vellosas, flores periféricas liguladas amarillas y generalmente estériles, las centrales tubulares y hermafroditas. Florece durante primavera y verano. Fruto, un aquenio negro con 2 a 4 púas cortas, desprovisto de vilano, madura en verano.

Hábitat: Crece en suelos húmedos y soleados o a orillas de cursos de agua. Se encuentra en los faldeos bajos de ambas cordilleras.

Propagación: Se propaga por semillas sembradas en otoño en un almáximo estratificado. De modo vegetativo se multiplica de preferencia en verano, en cama fría, mediante esquejes subapicales, a los que se les corta 2/3 de la hoja y se les aplica hormonas para que arraiguen.

Utilización: En jardines es un hermoso arbusto floral de semi-sombra. Se planta a orillas de caminos o cursos de agua, delante de cercos o rejas o en rocallas húmedas. En medicina alternativa se utiliza como infusión para afecciones gástricas y para ciertos tipos de cáncer.



