

# *Ovidia andina*

(Poepp. & Endl.) Meisn.

(Actualmente en la misma especie se incluye a *Ovidia pillo-pillo* (Gay) Meisn.)

## Traro-voqui, Iloime, pillo-pillo

**Floración:**



**Fructificación:**



**Familia:** Timeleáceas.

**Origen geográfico:** Endémica de Chile y Argentina.

**Distribución en Chile:** Regiones del Maule a la de Aysén.

**Descripción:** Arbusto siempreverde, de hasta 1,5 m de altura por el mismo diámetro. Ramas divididas casi siempre en dos, corteza café-rojiza o amarillenta, con cicatrices. Hojas sésiles, agrupadas hacia el extremo de las ramas, oval-lanceoladas, cuneadas y enteras. Especie ginodioica, es decir con flores hermafroditas en algunos ejemplares y flores femeninas en otros. Inflorescencia en pseudombelas que se ubican en el extremo de las ramillas. Flores perfumadas, cáliz con forma de embudo, con 4 sépalos blanco-amarillentos; pétalos ausentes; las hermafroditas con un androceo con 8 estambres desiguales y gineceo con ovario súpero y estigma veloso; las flores femeninas son semejantes, pero los estambres son pequeños y estériles. Florece en primavera. Fruto, una baya de color blanco hasta negro, con sólo una semilla en su interior. Fructifica durante el verano.

**Hábitat:** Crece en suelos con algo de humedad, a pleno sol. Se encuentra desde el litoral hasta la precordillera. Es parte de los bosques templados hasta el matorral subandino.

**Propagación:** Se propaga por semillas que se extraen por maceración desde los frutos; éstas se siembran de inmediato en almácigo estratificado.

**Utilización:** Se utiliza como arbusto aislado plantado a pleno sol o en semisombra, también cerca de reservorios de agua para crear efectos espejo. Será importante tomar nota de la procedencia de las semillas para utilizar los ejemplares mejor adaptados a las condiciones del sitio de plantación. En medicina alternativa se utiliza como purgante y antiguamente se machacaban los tallos y se arrojaban a los lagos para atontar a los peces.



