

Alstroemeria parvula

Phil.

» R.A. Philippi, Linnaea 33: 261. 1864. TIPO: Región Metropolitana, Provincia de Santiago, Las Arañas, I-1861, L. Landbeck (Lectotipo: SGO 38136, designado por Bayer 1987).

Descripción: Hierbas perennes, rizomatosas, pequeñas, de 6-12(-15) cm de alto. Hojas basales linear-lanceoladas u obovadas, de 5-7,5 cm de largo por 1-1,5 cm de ancho, glabras, los márgenes levemente ondulados y con escasas papilas; hojas tallinas linear-lanceoladas de 1,0-2,5(-6) cm de largo por 2-4(-5) mm de ancho. Inflorescencia pauciflora, con 3-7 rayos unifloros. Flores de color rosado pálido, a veces blancas; tépalos externos obovado-redondeados, con márgenes denticulados, de 2-2,5 cm de largo por 1,4 cm de ancho, con mucrón corto, grueso, oscuro; tépalos internos superiores de 2 cm de largo por 0,6 cm de ancho, linear-oblongos, más angostos que el resto, recurvos, con una franja amarillo-anaranjada en la zona media, con manchitas purpúreas, que se prolongan hacia la base; tépalo inferior interno más ancho, algo romboideo, sin manchas. Cápsula de 1,6-1,7 cm de largo por 0,9-1 cm de ancho, con costillas purpúreas. Semillas redondeadas, de color café, de 3 mm de diámetro, verrucosas.

Fenología: Florece entre diciembre y enero, fructifica a fines de enero y febrero (Muñoz-Schick *et al.* 2011).

Origen: Endémica de Chile.

Distribución geográfica y hábitat: Es una especie altoandina, que habita en las regiones de Valparaíso (32°51' S) y Metropolitana (33°06' S), entre los 2.200 y 2.600 m s.n.m., aproximadamente.

Estado de conservación: Crece en el Parque Andino Juncal (Muñoz-Schick *et al.* 2011).

