

Alstroemeria patagonica

Phil.

» R.A. Philippi, Anales de la Universidad de Chile 93: 160. 1896. TIPO: Ad lacum Santa Cruz invenit Decembri 1877 Henricus Ibar (Holotipo: SGO 47069).

Sinónimos: *Alstroemeria nana* Rendle, J. Bot. 42: 325. 1904; *Alstroemeria patagonica* Phil. fma. *biflora* Ravenna, Sellowia 19: 34. 1967.

Descripción: Hierbas perennes de 2-15 (-25) cm de alto. Hojas sésiles, linear a oblanceoladas, de 1-4 cm de largo por 0,1-0,5 cm de ancho, con el margen liso o crispado-ondulado. Flores solitarias, sésiles o brevemente pediceladas, amarillas a anaranjadas, actinomorfas; tépalos algo recurvados, con mucrón, de 1,5-4 cm de largo, todos más o menos de igual largo; tépalos externos obovados con ápice redondeado, de color uniforme, raramente con manchas purpúreas pequeñas; tépalos internos superiores oblanceolado-rómbicos, agudos, con manchas púrpuras desde la mitad hacia la base, ausentes hacia el ápice; tépalo inferior interno sin manchas o a veces con muy pocas. Anteras amarillas. Cápsula de 0,7-1,5 cm de largo, con 6 costillas prominentes y umbón de 0,5-2 cm de largo. Semillas de 2-3 mm de diámetro, de color café-rojizo (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz, 2003).

Fenología: Florece en diciembre y enero y fructifica en febrero y marzo (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Origen: Especie nativa, crece también en Argentina (Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego).

Distribución geográfica y hábitat: El tipo de *A. patagonica* proviene de Argentina, Lago Santa Cruz; el tipo de *A. nana* fue recolectado en Argentina, Cerro Frías, Lago Argentino. La fma. *biflora* descrita por Ravenna en 1967 se basó también en un ejemplar argentino, recolectado en el Parque Nacional Laguna Blanca (Neuquén). En Chile se distribuye desde Chile Chico (46°30'S) en la Región de Aisén hasta Última Esperanza (52°45'S) en la Región de Magallanes. Probablemente se encuentre más al sur. Crece en la estepa patagónica (Sanso 1996, Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003, Zuloaga *et al.* 2008).





Estado de conservación: Se encuentra protegida en la Reserva Nacional Jeinimeni, en la Región de Aisén, en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Región de Magallanes, probablemente en la RN Laguna Parrilar, también en la Región de Magallanes; también en los sitios prioritarios Fundo Las Brisas y Valle Chacabuco en la Región de Aisén y en Kampenaique en la Región de Magallanes (Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz 2003).

Observaciones: Muñoz-Schick & Moreira-Muñoz (2003) dan para esta especie los nombres comunes de "Lirio amarillo" para Argentina y "Amancay del desierto" en Chile (ver Sanso 1996). Sanso *et al.* (2014) en un estudio anatómico-foliar la relacionan con *A. pygmaea* Herb., con láminas equifaciales sin diferenciación de parénquima en empalizada y esponjoso.

