

www.e-rara.ch

**Flora Badensis Alsatica et confinium regionum Cis et Transrhenana plantas
a lacu Bodamico usque ad confluentem Mosellae et Rheni sponte
nascentes exhibens secundum systema sexuale cum iconibus ad ...**

Gmelin, Karl Christian

Carlsruhe, 1805-1826

ETH-Bibliothek Zürich

Shelf Mark: Rar 8613

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-38683>

Classis VI. Hexandia monogynia.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

SUPPLEMENTUM
AD
FLORAM BADENSEM

ALSATICAM ET CONFINIUM REGIONUM

CIS ET TRANSRHENANAM.

Tom. II.

CLASSIS VI.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

** *Fl. Spathacei s. Glumacei.*

pag. 1. post LEVCOJUM.

CLXV.* *GALANTHUS.* Cor. supera sextpetala :
petalis tribus interioribus bre-
vioribus emarginatis.

*** *Fl. nudi.*

pag. 1. ante CONVALLARIAM.

CLXXIV.* *HEMEROCALLIS.* Cor. infera sex-
partita. Stam. declinata.

pag. 4. post LILIUM.

CLXVIII.* *UVULARIA.* Cor. infera sextpetala
erecta, basi fovea nectarifera.
Filamenta brevissima.

CLASSIS VI.

M H E X A N D R I A

M O N O G Y N I A.

pag. 7. L E V C O J U M *vernus*.

Hab. In pratis montosis prope *Rothenfels* copiose, ubi legit meritissimus *Hartweg* hortorum magni *Ducis Badensis Inspector.* Ann. 1818. in Marggraviatu superiori prope *Oppingen* in pratis. Circa *Wertheim* in sylvis ad montem *Triesenstein t. D. Wibelio.*

pag. 7. post L E V C O J U M *vernus*.

CLXV.* G A L A N T H U S.

Linn. Gen. Pl. ed Schreb. n. 547.

Spatha oblonga, obtusa, compressa, latere plano dehiscens, marcescens. *Corolla Petala tria* oblonga, obtusa, concava, laxa, patula, æqualia. *Nectarium cylindraceum*, triphyllum, petalis dimidio brevius: *foliolis* petaloideis parallelis, emarginatis obtusis. *Antheræ* in setam desinentes, conniventes. *Capsula* ovali-globosa, obtuse trigona, trilocularis, trivalvis, *Semina plura*, globosa.

489.* G A L A N T H U S *nivalis* Linn. Sp.
pl. 1. p. 415. Roth. Fl. Germ. 2. p. 378.—
Hoffm. Fl. Germ. p. 114.

G. uniflorus, petalis alternis cordatis. *Hall.*
hist. n. 1254.

Levcojum bulbosum præcox, minus. *Clus.*
hist. p. 181 182.

Icon. Redouté liliac. 200. *Flor. Dan. tab.*
1741. *Jacqu. Fl. Austr. tab.* 330. — *Sow.*
Engl. Bot. tab. 19. — *Schkuhr. bot Handb.*
tab. 89.

Germ. Kleines Schneeglöckchen.

Gall. Galanthe.

Hab. In Brisgoviae montosis gramineis. Prope
St. Blasie infrequens, ubi legit *D. Stælzle*
med. studiosus. *Ann.* 1820. In montosis
gramineis retro *dem Wildbad*, non infre-
quens. In ditione Basilensi circa arcem *Vox-*
burg prope *Delmont et Lenzburg* copiose
t. D. Hagenbachio.

Flor. Primo vere. *Semina* Julio, Augusto
matura. ¼

Radix bulbosa, ovata. *Folia* 2 - 3, cari-
nata, obtusa. *Scapus* teretiusculus, subcarina-
tus, subuniflorus. *Corolla* nutans, nivea. *Peta-*
la tria exteriora elliptica, patentia, majora ;
tria interiora (seu *Nectaria Linn.*) erecta, du-
plo minora, supra medium macula cordiformi
viridi picta.

Plantula elegans, in hortis passim cum *Lev-*
cojo verno notissima, ad rariores Florae cives per-
tinet.

In hortis saepe floribus impletis.

pag. 8. *NARCISSUS poeticus.*

Icon. *Sow. Engl. bot. tab.* 275.

pag. 9. *NARCISSUS Pseudonarcissus.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 17.

pag. 10. *ALLIUM Ampeloprasum.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1657.

pag. 16. *ALLIUM Scorodoprasum.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 2441. *Flor. Dan.* tab. 1455.

pag. 17. *ALLIUM arenarium.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1558.

pag. 19. *ALLIUM carinatum.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1658.

pag. 22. *ALLIUM vineale.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1974.

pag. 23. *ALLIUM oleraceum.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 488. *Flor. Dan.* tab. 1456.

pag. 27. *ALLIUM ursinum.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 122.

pag. 31. ante *LILIUM bulbiferum.*

508.* *LILIUM candidum* foliis sparsis, corollis campanulatis: intus glabris.
Linn. Sp. pl. 1. p. 433. Hall. helv. n. 1231.

Lilium album flore erecto vulgare. *Bauhin. pin. 76.*

Lilium album. *Tabernæmont.* p. 1026. *Icon.*

Icon. *Redouté liliac.* t. 199. *Curtis Mugaz-*
tab. 298. *Blackw.* *tab.* 11.

Germ. *Weisse Lilien.*

Gall. *Lis blanc.*

Hab. In Palæstina, Syria. Hospitatur in mul-
tis hortis, præsertim rusticorum in convalli-
bus, rarius passim in vineis im *Bühlerthal*
et in Brisgovia am *Kaiserstuhl* prope
Breisach et Küchlinsbergen, ubi vidi
1812.

Flor. Junio, Julio. *Semina Augusto matura.* 24

Planta notissima. *Corollæ speciosæ, niveæ,*
suaveolentes, fragrantes.

Pharm. *LILII s. LILII ALBI Radix, Flo-*
res, Antheræ.

Radices recentes mucilaginosae, contusae aut
cum lacte coctae, externe a monticolis aliisque passim
ad tumores et ad maturandos abscessus, ambustaque
praecipue adhibentur.

Goderus Elisabethæ Reginae Chi-
rurgus, referente Gerardo et ex eodem Rajo, mul-
tos hydrope laborantes, sanavit radicis succo cum fa-
rina hordeacea mixto, pane scilicet ex istiusmodi
massa confecto, aëgro per mensem aut sex hebdoma-
das continuas exhibito, quo solo et non alio pane,
per totum id tempus vesceretur.

Ex floribus recentibus parant mulierculæ rusticae
aliaque infusionem in oleo nucum juglandium fri-
gide presso, aut in oleo olivarum, panaceam anody-
nam domesticam, contra ambusta, lentigines, jctus
insectorum. In Ischuria, regioni pubis inungitur sae-
pe maximo cum dolorum levamine, sed sit mite, non
rancidum! Aqua Liliorum alborum ex floribus de-

stillata, tanquam insigniter Cosmetica ad nitorem fasciei praesertim conciliandum usurpatum.

Pollen antherarum, seu *Crocus Lilio*rum alborum (das Gelbe von weissen Lilien) ad pellendum foetum et accelerandum partum, nec non ad menstrua cienda, commendabatur. Juxta Cratōnem Joelem tantae potentiae est in expellendis mensibus, ut citra abortus periculum, gravidis adhiberi non possit.

Obs. Oleum Liliorum alborum in officinis pharmaceuticis saepe quammaxime rancidum, removi.

pag. 35. ante TULIPAM.

CLXVIII. * U V U L A R I A.

Linn. Gen. Plant. ed. Schreb. n. 560.

Calyx nullus. *Corolla* Petala sex, oblongo-lanceolata, acuta, erecta, longissima. *Nectarium*: fovea oblonga basi singuli petali insculpta. *Stamina Filamenta* sex brevissima, latiuscula. *Antheræ* longæ erectæ, corolla dimidio breviores. *Germen* subrotundum. *Stylus* semitrifidus filiformis staminibus longior. *Stigmata* simplicia, reflexa. *Capsula* ovato-oblonga, triangularis, trilocularis, acuta. *Semina* plura, subrotunda, compressa.

510.* *Uvularia amplexifolia* foliis amplexicaulibus cauleque glabris. *Willd.*
Linn. Sp. pl. 2. p. 93. — Waldst. et Kitaibl. pl. hung. 2. p. 182.

Uvularia foliis amplexicaulibus. *Linn. Sp. pl.*

*pl. 1 p. 436. — Hall. hist. 2. n. 1234.
Hoffm. Fl. Germ. p. 118.*

Streptopus distortus glaber: foliis amplexicaulibus, pedicellis solitariis, medio distorto - geniculatis. *Mich. fl. Amer. 1. p. 200. — Pursh. fl. Amer. 1. p. 231.*

Streptopus amplexifolius. Decand. Fl. Franc. III. p. 174. Redouté liliac.

Smilax perfoliata ramosa, flore albo. Barr. Ic. rar. 58. tab. 720.

Polygonatum latifolium ramosum. Bauh. pin. 305.

Polygonatum latifolium quartum ramosum. Clus. hist. 1. p. 276. Ic.

Polygonatum tertium latifolium. Tabernæmont. p. 1137. Ic.

Icon. Redouté liliac. 259. Flor. Dan. tab. 1515. Sturm. Deutschl. Flor. 1. Fasc. 41. Waldst. et Kit. l. c. t. 107. Schkuhr. Bot. Handb. tab. 93.

Germ. Stengelumfassendes Zäpfchenkraut.

Gall. Uvulaire embrassante. Sceau de Salomon rameux. Laurier Alexandrin des alpes.

Hab. In Brisgoviae monte Feldberg am Seebug, ubi eam vidi Ann 1812. In Vogenesis nec non in montis Juræ subalpinis umbrosis passim. In vicinia Principatus superioris prope St. Gallen legi Ann. 1818.

Flor. Junio, Julio. Semina Augusto Septembri matura. 24

Radix ramoso - fibrosa. *Caulis* sesquipedalis, cubitalis, erectus, teres, glaber ramosus. *Folia* alterna, sessilia, amplexicaulia, distantia, integerrima, glabra, late viridia. *Flores* pedunculati, sub foliis producti. *Pedunculi* medio geniculati, infracti, uniflori, nudi. *Flos* pendulus. *Corolla* petala sex, ex lutescente - albida, interiora angustiora, exteriora basi gibba. *Capitula* (baccam referens) matura rubra, trilocularis, ovato - triquetra.

N o t a. Ad rariores Florae cives pertinet.

pag. 36. *TULIPA sylvestris.*

I c o n. Sow. Engl. bot. tab. 63. Redouté liliac. 163. Sturm. Deutschl. Fl. 1. Fasc. 29.

H a b. Prope Neckarbischoffsheim ubi eam vidi 1815 in palatinatu trans rhenum circa Heidesheim et prope Grünstadt copiose t. Zeyhero. In ditione basileensi in vicinis montis Muteti, circa Mœnchenstein et Wyl. t. Cl. Hagenbachio.

pag. 37. Sub *ORNITHOGALO luteo* nostro militant duæ diversæ species, nempe *O. luteum* et *sylvaticum*, quarum characteres hic stabiliendæ sunt.

512. *ORNITHOGALUM luteum* radice tribulbosa, scapo compresso tetragono nudo aut subunifolio, folio radicali sub solitario linearis-canaliculato; floralibus solitariis, binis, ternisve, pedunculis 1, 2, 3, simplicibus glabris subumbellatis, petalis lanceolatis obtusiusculis, glabris.

O. luteum folio radicali linearis solitario pla-

no, floralibus imis oppositis, pedunculis simplicibus subumbellatis, petalis obtusis glabris, bulbo aggregato. *Willd. Enum. p. 367.*

*O. luteum (pratense) Pers. Synops. p. 363.
Usteri ann. XI. p. 8. tab. 2. fig. 1.*

Germ. Gelbe Vogelmilch. Gelber Stern.

Gall. Ornithogale jaune.

Hab. In agris, arvis, vineis, sepibus, passim frequens. Circa *Carlsruhe, Mühlburg, Durlach, Grötzingen* et alibi. (Perraro in pratis seu gramineis.)

Flor. Martio, Aprili. *Semina* Majo, Junio matura. 2

Radix tribulbosa. *Bulbi* subrotundo ova-
ti, albidi. *Scapus* digitalis, palmaris et altior,
presso - tetragonus, glabriusculus, erectus,
nudus. *Folium* radicale saepissime unicum, li-
neare, canaliculatum, integrum, glabrum, lineam
ad duas lineas latum, scapum superans. *Folia*
floralia solitaria, saepe bina, ternave, inaequalia,
linearia, acuminata, apice subinflexa, e viridi-
flavescens, glabriuscula. *Flores* terminales,
umbellati. *Pedunculi* 1-2-3 perraro 4, erecti,
binas ad tres uncias longi, simplices, subtri-
quetri, glabri, uniflori. *Corollæ* patulæ, intus lu-
teæ, extus viridescentes, margine albidae. *Peta-
tala* sex, lanceolata, obtusiuscula, septem ad no-
vem lineas longa, lineam vix lata.

Nota. Bulbis nunquam solitariis, saepissime tri-
bus, perraro quatuor ad quinque facile distin-
guitur a sequente specie.

Obs. Plantulae juniores nondum florentes, ad bul-
bos tres, bulbulis numerosis pyramidatim aggre-
gatis, instructae sunt.

Flores ante meridiem ab hora undecima, usque ad quartam post meridiem apertos observavit meritissimus Mertinus.

512. * ORNITHOGALUM sylvaticum

bulbo solitario, scapo erecto, acutangulo, basi vaginato, folio radicali solitario, linearis-lanceolato, plano, glabro, floralibus binis ternisve, pedunculis 4-7-9, simplicibus umbellatis, petalis obtusis glabris.

O. *sylvaticum* folio radicali linearis-lanceolato solitario plano, floralibus imis oppositis, pedunculis simplicibus subumbellatis, petalis obtusis glabris, bulbo solitario. *Willd. Enum. p. 368.*

O. *luteum* (*sylvaticum*) *Pers. Synops. 1. p. 365.*

O. *luteum. Smith. Fl. Brit. 1. p. 362.*

O. *majus primum. Tabernæmont. p. 1021⁴ Icon.*

Bulbus sylvestris. *Fuchs. hist. p. 169. Icon bona.*

Icon. Sow. Engl. bot. tab. 21. (bona) (sub O. luteo.)

Germ. Gelbe Waldvogelmilch. Waldstern.

Gall. Ornithogale des bois.

Hab. In sepibus, pomariis, pratis, gramineis passim non infrequens. Circa *Carlsruhe*, *Durlach*, *Grötzingen*, *Berghausen* et alibi, rarius in *sylvis*, vix in *agris* et *vineis*.

Flor. Martio, Aprili. *Semina* Majo, Junio matura. 4

Species omnino à præcedenti distincta: *Bulbo* solitario majori. *Scapo* crassiori, firmiori, acutangulo. *Folio* radicali scapum sæpissime basi vaginante, latiori, 4-5 lineas lato, apice subcanaliculato. *Pedunculis* copiosioribus, 4 7 9. *Foliis* floralibus sæpissime duobus, margine sæpe villosis. *Flores* ut in præcedenti specie.

Obs. Flores die nocteque apertos vidit Mertinus.

Nota. Hanc speciem Linnaeus aliique sub *O. luteo* comprehendebant.

513. ORNITHOGALUM minimum radice bulbosa, bulbis binis, altero minimo, foliis radicalibus duobus rarius solitariis, linearibus angustis, laxis, scapo hirsuto longioribus, floralibus, 2-3-5 latioribus lanceolatis, pedunculis subramosis petalisque hirsutis, acutis.

- O. *villosum* foliis radicalibus geminis: floralibus imis oppositis, pedunculis ramosis corymbosis petalisque hirsutis. *Marsch. v. Bieberst. Fl. Taur. Caucas.* 1. p. 274.
- O. *minimum* (arvense) scapo angulato diphylo, pedunculis pubescentibus umbellatis ramosis. *Pers. Synops.* 1. p. 363.

Germ. Feinhaarige gelbe Vogelmilch.

Gall. Ornithogale hérissée.

Synonyma ulteriora ad O. *minimum*. *Flor. Badensis* allegata sunt.

Radix bulbosa, bulbulis binis albis ovatis,

altero minimo. *Scapus* uncialis, sesquiuncialis, digitalis et altior, angulatus, albide hirsutus. *Folia* radicalia s̄epissime bina, (rarius unicum) linearia, angusta, lineam dimidiā lata, scapo longiora, laxa, striata. *Floralia* 2-3-5 interdum plura, inaequalia, lanceolata, latiora, apice curvata, hirsuta. *Pedunculi* subumbellati, subtrigoni, albide-hirsuti, subramosi. *Corollæ* patentes, luteæ. *Petala* lanceolata, 5-6 lineas longa, ultra lineam dimidiā lata, acutiuscula hirsuta.

Variat. In locis minus sabulosis, arvis, scapo, foliis radicalibus et floralibus minus hirsutis quandoque glabriusculis.

Variat. Bulbulis numerosis e scapo prodeuntibus.

Obs. Flores die nocteque aperti. *Mertinus.*

Amat loca sterilia sabulosa, hortorumque areas, ubi saepe abundat.

pag. 41. *ORNITHOGALUM pyrenaicum.*

Icon. *Sow. Engl. Bot. tab. 499.* *Redouté liliac. 234.*

Hab. In Principatu superiori retro *Mæskirch* ad *Werrewag* in dumetis rarius, ubi vidi 1816.

pag. 42. *ORNITHOGALUM nutans.*

Icon. *Sow. Engl. Bot. tab. 1997.* *Redouté liliac. 253.*

pag. 44. *SCILLA bifolia.*

Hab. In Brisgoviae pratis prope *Gindlingen*

et Merchingen, prope *Heidelberg* circa *Schlierbach et Ziegelhausen t. D.* *Dierbachio.* In ditione Basileensi prope *Liestal* in prato, prope *Augustam*, inter *Sissach et Diegten. t. D. Hagenbachio.*

pag. 46. post *SCILLAM bifoliam.*

517.* *SCILLA verna* radice solida, corymbo hemisphaerico paucifloro, bracteis lanceolatis obtusis, foliis linearibus canaliculatis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 364. — *Huds. Fl. Engl.* 1. p. 142.

S. verna bulbo tunicato, racemo paucifloro bracteato, corollis campanulatis, foliis linearibus canaliculatis radicalibus pluribus. *Ait. Hort. Kew.* 1. p. 445. — *Willd. Sp. pl.* 2. p. 129.

Ornithogalum hispanicum minus. Clus. hist.
p. 188.

Icon. Propria. Sow. Engl. Bot. tab. 23.

Germ. Frühlings Hyacinth.

Gall. Scille printanniere.

Hab. In Principatu superiori prope *Kleinlau-fenborg* in agris arvisque sabulosis abunde, ubi eam detexit *Alexander Braun* 1820.

Flor. Martio, Aprili. *Semina Majo* matura. 2

Differet a *Scilla bifolia*. *Foliis* radicalibus numerosis, 5-7-8, angustioribus, linearibus, 5-8 uncias longis, lineam latis. *Corymbo* racemoso, pyramidali, 7-8-13 floro. *Corollis* minoribus. *Bracteis* longitudine pedicellorum. (*Corollæ* cœruleæ.)

Nota. Planta pulchella, pro Flora Germanica nova.

pag. 46. ante ANTERICUM *ramosum*.

518.* ANTERICUM *serotinum* foliis
planiusculis, scapo unifloro. Linn. Sp.
pl. 1. p. 444.

A. *serotinum* foliis semicylindricis, caulinis
basi dilatatis, caule subunifloro. Smith.
Fl. Brit. 1. p. 367.

Phalangium serotinum. Redouté *liliac.*

Phalangium foliis crassulis, scapo unifloro.
Hall. hist. n. 1209.

Bulbocodium alpinum juncifolium, flore
unico intus albo, extus squalide rubente.
Raj. 3. p. 374. tab. 17. fig. 1.

Pseudo - Narcissus gramineo folio. Bauh.
pin. 51. — Prodr. 27. — Rudb. Elys. 2.
p. 64. fig. 9.

Icon. Jacqu. Austr. 5. app. tab. 38. — Sow.
Engl. Bot. tab. 793. Redouté l. c. 270.

Germ. Späte Lilienzaunblume.

Gall. Antheric serotine.

Hab. In Principatu superiori retro Mæskirch
in rupibus præaltis calcareis prope Werre-
wag, a me observatum Ann. 1816. In vi-
cina helvetia, in agro Abbatiscellensi: auf
dem Hohen - Sentis, ubi eam vidi 1818. auf
dem Hohen - Mesmer et Sattel t. J. Ges-
nero.

Flor. Junio. Semina Septembri matura. 2

Bulbus oblongus. Scapus digitalis, palma-
ris, erectus, teres glaber, subuniflorus. Folia
radicalia scapo langiora, semicylindrica, fili-

formia, glabra. *Flos terminalis.* *Corollæ petala* elliptica, æqualia, basi attenuata, intus alba, extus rubicunda.

In alpinis continuo nivis defluxum sequitur.

pag. 49. post ANTHERICUM *Liliago.*

520.* ANTHERICUM *Liliastrum* foliis planis, scapo simplicissimo, corollis campanulatis, staminibus declinatis. *Linn.*
Sp. pl. 1. p. 445.

Hemerocallis *Liliastrum* scapo simplici, corollis hexapetalis campanulatis. *Linn.*
Hort. Cliff. 128.

Hemerocallis floribus patulis secundis. *Hall.*
hist. n. 1250.

Phalangium *Liliastrum.* *Redouté liliac.*

Phalangium magno flore. *Bauh. pin. 29.*

Icon. *Redouté liliac. 255.*

Germ. *Lilienartige Zaunblume.*

Gall. *Antheric à fleurs de Lise.*

Hab. In Principatus superioris vicina helvetia auf dem Hohen-Kasten t. *Hallero.*

Flor. Junio, Julio. *Semina* Septembri matura. 24

Scapus simplex, pedalis, sesquipedalis eretus. *Folia radicalia* linearia, glabra, læte viridia longa. *Flores* terminales, spicato-racemosi, subsecundi. *Corollæ* ultra unciales, niveæ, campanulatæ, patulæ, subodoratæ, speciosæ.

Planta speciosa, in horto culta, mutationem non passa est.

pag. 59. post CONVALLARIAM.

CLXXIV.* HEMEROCALLIS.

Linn. Gen. pl. ed. Schreb. n. 585.

Calyx nullus. *Corolla* sexpartita infundibuliformi - campanulata. *Tubus* brevis. *Limbus* patens superne magis reflexus. *Filamenta* declinata. *Germen* subrotundum, sulcatum superum. *Stylus* filiformis longitudine staminum. *Stigma* obtuse trigonum, assurgens. *Capsula* ovato - triloba, trigona, trilocularis, trivalvis. *Semina* plurima, subrotunda.

527.* *HEMEROCALLIS flava* corollis flavis, *Linn.* Sp. pl. 1. p. 462. *Hoffm.* Fl. Germ. p. 123.

H. *flava* foliis linearibus carinatis, petalis planis acutis, nervis petalorum indivisis. *Willd.* *Linn.* Sp. pl. 2. p. 197.

Asphodelus liliaceus luteus I. *Tabernæmont.* p. 1042. *Icon. (bona.)*

Lilio-Asphodelus luteo flore. *Clus. hist I.* p. 157.

Icon. *Jacqu. hort. Vind.* tab. 139. *Redouté Liliacées.* tab. 15. *Schkuhr. bot. Handb.* tab. 98. *Sturm Deutschl. Fl. Fasc. 7.*

Germ. *Gelbe Affodill-Lilie.*

Gall. *Hemerocallis à fleurs jaunes.*

Hab. In Siberiae et Hungariae pratis uidis. Colitur in hortis cum primis rusticorum, ex quibus passim in prata adjacentia et pomaria emigrat.

Flor. Junio, Julio. **Semina** Augusto Septembri matura. 24

Planta speciosa, floribus luteis facile dignoscenda, vix ullibi in germania et helvetia spontanea.

Pharm. *LILIO ASPHODELI Flores.*

Flores odorati.

Hodie exoleti. Olim ad emolientia, anodyna, resolventia, detergentia et aperitiva numerabantur.

527.** **HEMEROCALLIS fulva** corollis fulvis. *Linn. Sp. pl. 1. p. 462.*

H. fulva foliis linearibus carinatis, petalis tribus interioribus obtusis undulatis, nervisque petalorum exterioribus ramosis. *Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 197.*

Hemerocallis foliis ensiformibus, scapo paucifloro petalis lineatis undulatis. *Hall. helv. in addend. p. 188. (excluso Linnaei synon.)*

Lilio-Asphodelus puniceus. *Clus. hist. 1. p. 157.*

Asphodelus liliaceus rubens II. *Tabernæmont. p. 1042. Icon. (bona.)*

Icon. Redouté *Liliacées* 16. *Curtis Mag. 64.*

Germ. *Braunrothe Affodill-Lilie.*

Hab. In China. Hospitatur in hortis compri-

mis rusticorum ex quibus rarius in pomaria prataque adjacentia migrat.

Flor. Junio. *Semina* Julio, Augusto matura. 24

Planta speciosa, facile floribus fulvis dignoscenda. Vix ullibi in helvetia spontanea, sed ex hortis migrata.

Nota. Halleri synonymon, Cl. Willdenow ad H. flavam citat, sed omnino ad H. fulvam pertinet.

Planta in horto Carlsruhensi ex seminibus culta, constantissima.

pag. 62. *HYACINTHUS racemosus.*

Icon. Sow. Engl. bot. tab. 1391.

Hab. Prope *Weingarten* in vineis, rarius; in apricis gramineis ad Nicari ripas prope *Neuenheim et Neuburg* rarius t. *D. Dierbachio*. Prope *Wertheim* in pomariis vineisque t. *D. Wibelio*.

pag. 63.

529.* *HYACINTHUS botryoides* corollis globosis uniformibus foliis canaliculato-cylindricis strictis. *Linn. Mant.* p. 366. — *Hoffm. Fl. Germ.* p. 123. *Roth. Fl. Germ.* 2. p. 391.

Muscari botryoides corollis globosis uniformibus, inferioribus remotioribus, foliis strictis, linearibus basi angustatis, canaliculatis. *Willd. Enum.* p. 375.

Hyacinthus foliis gramineis, spica ovata, flo-

ribus globosis secundis. *Hall. hist. n. 1246.*

H. botryoides cœruleus amœnus. *Lob. Icon. 108.*

Icon. Curtis. Bot. Magaz. tab. 157.

Germ. Steifblättriger Trauben - Hyacinth.

Gall. Jacinthe à fêvilles étroits.

Hab. In Pineto prope *Schwetzingen*, ubi vi-di 1815. In Brisgoviae montosis gramineis prope *St. Blasie*; Prope *Wertheim* in pratis auf dem *Wirt t. D. Wibello*.

Flor. Aprili, Majo. *Semina Julio matura.* 2

Differit ab affini *H. racemoso*. *Foliis* non laxis, sed strictis, canaliculatis, latioribus, 3 linea-s latis. *Racemo* tenuiori. *Corollis* subminori-bus, globosis, subinodoris.

Ad rariores omnino Florae cives pertinet,

pag. 65. *IUNCUS conglomeratus.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 855.

pag. 66. *IUNCUS effusus.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 856. Flor. Dan. tab. 1096.

pag. 67. *IUNCUS glaucus.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 665.

pag. 69. *IUNCUS filiformis.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1175. Flor. Dan. tab. 1207.

pag. 70. IUNCUS trifidus.

Icon. *Flor. Dan. tab. 1691. Sow. Engl. Bot. tab. 1482.*

Hab. In vicinia Principatus superioris *auf dem Gamor et Kasten* ubi vidi 1818. et deleatur in Alsatia prope Argentinam.

pag. 71. IUNCUS squarrosus.

Icon. *Sow. Engl. bot. tab. 933.*

pag. 72. IUNCUS ericetorum.

Icon. *Sow. Engl. Bot. tab. 2174. (sub J. gracili.)*

Var. Petalis calycinis capsula duplo longioribus. Staminibus tribus.

Hab. Circa *Wertheim am Sporkert* in agris et fossis sabulosis t. *Mertino.*

pag. 74. IUNCUS articulatus.

Icon. *Sow. Engl. Bot. tab. 2144. (sub J. obtusifloro.)*

γ. Panicula supradecomposita, divaricata, bracteis albicantibus.

Iuncus divergens. *Koch et Ziz. Cat. Plant. Palat.*

Hab. γ. In Palatinatu prope *Niederingelsheim* t. *D. Kochio.*

Culmus bi-tripedalis, erectus. *Folia* teretia, subcompressa, articulato - nodosa. *Panicula* supradecomposita, divaricata, ante anthesis ob bracteas insigniter albicantes, colore suo albido primo intuitu ab affinibus dignoscenda.

Rami subumbellati, *ramuli* unibellarum partia-
lium angulo recto vel obtuso egredientes, valde
divaricati, saepius reflexi. *Petala* margine lato-
membranacea, albide cincta, aequalia, omnia ob-
tusa. *Capsula* ovata, trigona, acuminata. Sic
Cl. Kochius.

Not a. Vix pro peculiari specie, sed pro memo-
rabilis varietate *I. articulatis obtusiflori*
Ehrh. habenda.

pag. 76. *IUNCUS sylvaticus.*

Pro diverso loco natali udo, uliginoso
campestri, demissiori, montoso, plus
minusque aquoso, quammaxime variat.
Principales mihi varietates, sequentes
sunt.

α. foliis tereti - compressiusculis articulatis
foliolis calycinis lanceolatis acutis capsula
spadiceo - fusca acuminata brevioribus.

I. acutiflorus. Ehrh. Hoffm. Fl. Germ. Ha-
genb. Fl. Basil. 1. p. 329. Schlectend.
Fl. Berol. 1. p. 199.

I. spadiceus. Heller. Fl. Wirceb. suppl. 29.

Icon. Sow. Engl. bot. tab. 238. (sub *I. acu-*
tifloro. Flor. Dan. tab. 1097. (sub. *arti-*
culato.)

Not a. Hanc et sequentem varietatem sub *I. syl-*
vatico cum *Cl. Willdenowio* compre-
hendi.

β. foliis teretiusculis, articulatis paniculæ ra-
mis divaricatis brevioribus, foliolis caly-
cinis lanceolato - mucronatis, capsulam
acutam subsusciam subæquantibus.

I. *sylvaticus*. Roth. Fl. Germ. 2. p. 405.
Hagenb. Fl. Basil. 1. p. 528.

I. *nemorosus*. Sibth. oxon. 114.

I. *articulatus* ♂. Smith. Fl. Brit. 1. p. 379.

Hab. Promiscue cum var. α. in quam sæpe
abit.

γ. culmis adscendentibus foliis compressis arti-
culatis, panicula erecta, elongata, foliolis
calycinis lanceolatis acutis, capsula acuta
fusca subduplo brevioribus.

I. *lambocarpos*. Ehrh. gr. n. 126. Schlech-
tenthal. Fl. Berol. 1. p. 198.

I. *articulatus*, α Linn. Willd. Sp. pl. 2. p.
211. Smith. Fl. Brit. 1. p. 379. (excl.
Sow. Engl. bot. tab. 238.)

I. *compressus*. Relh. Fl. Cantabr. p. 142.
Huds. Fl. Angl. 1. p. 149.

I. *aquaticus*. Roth. Fl. Germ. II. p. 405?
videtur.

I. *adscendens*. Host. gram. III. p. 58.

I. *acutiflorus*. ♂. Gaud. Agrost. II. p. 225.

Icon. Sow. Engl. bot. tab. 2143. (bona sub
I. *lambocarpo*.)

Hab. Cum α et β in pratis udis paludosis in-
undatis cis et transrhenanis nec non ad la-
cum Bodamicum.

Sæpissime culmi basi decumbentes, adscendentes.

δ. Culmis erectis tenuibus, foliis articulatis
tereti - compressiusculis, panicula erecta,
foliolis calycinis ovali - oblongis acutis ca-
psula

psula oblonga obtusa mucronulata, fusco-
atra subbrevioribus.

I. *fusco ater*. Hagenb. *Fl. Basil.* 1. p. 277.
Heller. *Fl. Wirceb.* suppl. p. 29. Schlech-
tend. *Fl. Berol.* 1. p. 197.

I. *acutiflorus* &. Gaud. *Agrost.* II. p. 222.

Hab. Passim in iisdem cum præcedentibus locis,
minus frequens. Circa *Carlsruhe* prope
Neureuth in pratis uidis non infrequens.

Medium quasi tenet inter varietatem γ et *Iuncum articulatum* nostrum seu *obtusiflorum*. Ehrh.

ϵ . Culmis erectis, foliis teretiusculis articulatis,
calycinis foliolis oblongo-lanceolatis acumi-
natis fusco - nigricantibus, capsulam nigris-
cantem ovato - subtriquetram rostratam
superantibus.

I. *nigricans*. Schweigger et Körte. *Fl. Er-
lang.* 149.

Hab. In uliginosis pascuis pratisque inunda-
tis cis et transrhenanis cum δ . nec non ad
lacum Bodamicum.

Inter δ et ϵ varietas intermedia passim oc-
currit.

Nota. Vix ac ne vix pro peculiaribus speciebus
habenda sunt. Conveniunt Culmis omnibus
foliatis articulatis, panicula supradecomposita,
foliolis calycinis acutis, cum I. *sylvatico*.

pag. 77. *IUNCUS subverticillatus*.

I. *uliginosus* foliis setaceis subnodoso - arti-
culatis, capitulis trifloris subproliferis,

Suppl. ad *Flor. Bad. Tom II.*

Q

culmo bulboso - radicante. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 380.

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 801. (sub. *I. uliginoso.*)

β. Culmis fluitantibus.

I. fluitans. Lamarck Encycl. III. p. 270.

I. articulatus β. fluitans. Wahlenb. Fl. Lapp.

Icon. Fl. Dan. tab. 817.

γ. Culmis foliisque brevioribus erectis.

I. supinus culmo dichotomo, foliis canaliculatis filiformibus, capitulo triphylllo. Mænch. Hass. n. 296. tab. 5. Roth. Fl. Germ. 2. p. 409. Hoffm. Fl. Germ. p. 166.

I. affinis. Gaud. Agrost. II. p. 224.

Hab. Porro in palatinatu trans rhenum cum varietate γ. t. D. Kochio et Ziz. var. β. circa Wertheim prope der Carthause Gränau t. acutissimo Mertino. In Principatu superiori in aquosis turfosis circa Constanz et Bohlingen cum degeneratione floribus proliferis in foliorum fasciculos ex crescentibus, ubi vidi *Ann. 1816.*

Var. γ. Culmi plures ex una radice, cæspiticii, unciales, digitales, erecti, foliosi, subdichotomi. Folia radicalia cæspiticia, erecta, caulina breviora, omnia filiformia, canaliculata, subulata, subarticulata. Capitula lateralia, terminaliaque, e floribus, 2-3-5 sessilibus composita, Bracteis membranaceis, albidis, obtusis, obvallata. Calycina foliola lanceo-

*lata, acuta, Capsula ovata subtriquetra,
submucronata, subbreviora.*

Folia saepe 2-3-5 tenuissima, inaequalia, ex florum capitulis terminalibus conspicua.

Vix ac ne vix pro peculiari specie declaranda, dum varietates intermediae inter hanc et I. subverticillatum prostant.

Non confundenda cum I. capitato Weigel. qui ad varietatem I. ericotorum pertinet, ad quem Flor. Dan. tab. 1099 melius, quam ad I. supernum (Moenchii) ibi citatum quadrat.

pag. 78. IUNCUS *Tenageja*.

Icon. Flor. Dan. tab. 1160.

Hab. In locis uidis prope Michelfelden dit. Basileensis t. Lachenalio nec non in vicina helvetia inter Rorschach et St. Gallen, vidi 1816.

Nota. Planta annua, facillime capsula semper subglobosa dignoscenda. Variat passim in uno eodemque individuo: Floribus sessilibus et brevissime pedunculatis. Calycinis petalis capsulam aequantibus et capsula sublongioribus.

pag. 79. IUNCUS *bulbosus*.

Icon. Sow. Engl. bot. tab. 934.

β. capsula longitudine calycis, stylo germinis longitudine.

I. *consanguineus* culmo compresso indiviso, foliis linearibus, canaliculatis, corymbo terminali, calycis foliolis obtusis capsulam ovatam trigonam obtusissimam subaequantibus, stylo longitudine germinis.

Koch et Ziz. Cat. plant Palat.

Hab. In pascuis udis prope *Dirkheim t. D.*
Kochio et Ziz.

Calycis foliola castanea. *Stylus* longitudine germinis. *Stigmata* intense carnea. *Capsula* calycis longitudine vel parum tantum longior.

Nota. Vix pro peculiari specie, sed varietate levidensi *Iunci* bulbosi habenda. Individua hujus, mihi benevole missa, nimis affinia *Iuncu* bulboso. Characteres specifici specierum *Iunci* a colore floram stigmatumque et a longitudine quammaxime variabili styli desumpti, incerti sunt.

Non confundenda cum *I. Bottnico*. Wah.
len b. Fl. Lapp. p. 82. tab. 5. a quo dif-
fert Culmo non tereti sed compresso, Folio-
lis calycinis obtusis, nec acutis, Capsula ob-
tusissima, nec acuta.

pag. 81. *IUNCUS bufonius.*

Icon. Sow. Engl. bot. tab. 862.

pag. 83. *IUNCUS vernalis.*

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 736. (*sub I. pi-*
loso.)

pag. 83. post *IUNCUM vernalem.*

544.* *IUNCUS Forsteri* foliis planis pi-
losis, panicula cymosa erecta, floribus
solitariis in pedunculis erectis; capsulis
acutis.

I. Forsteri foliis planis pilosis panicula
cymosa erecta, floribus solitariis, capsu-
lis acutis. Smith. Fl. Brit. 3. p. 1595.

Luzula Forsteri. *Decand. Fl. Franc. VI.*
p. 304. — *Gaud. Agr. 2.* p. 238. *Ha-*
genb. Fl. Basil. p. 334.

Icon. *Sow. Engl. Bot. tab. 1293.* *Decand.*
Icon. Gall. rar. 1. tab. 2.

Germ. *Forstersche Binse.*

Gall. *Iunc de Mr. Forster.*

Hab. In montosis nemorosis. In vicina helve-
tia prope dem *Weisbad* in adscensu mon-
tis *Gamor et Kasten*, ubi eam vidi 1818,
nec non in *Iusasso* circa *Delmont t. D.*
Hagenbachio.

Flor. Aprili, Majo. *Semina Junio matura.* 2

Primo intuitu affinis *I. vernali*, a quo dif-
fert: *Foliis* duplo vel triplo angustioribus. *Pa-*
niculæ ramis omnibus erectis, subpatentibus, nun-
quam divaricatis vel refractis. *Calycinis* laciniis
longius acuminatis. *Capsula* ovata, aequa, mu-
cronulata, nec obtusa.

Species certe nova et distinctissima, in horto
immutata manet. Smith. l. c.

pag. 84. *IUNCUS latifolius.*

Icon. *Sow. Engl. Bot. tab. 737.* (*sub I. syl-*
vatico.)

pag. 85. post *IUNCUM latifolium.*

545.* *IUNCUS spadiceus* foliis pla-
nis glabris, vaginis pilosis, corymbo de-
composito divaricato, pedunculis subqua-
drifloris, calycinis foliolis mucronatis ca-
psula acuta brevioribus. *Willd.* *Linn.* *Sp.*

*pl. 2. p. 218. Allion. Fl. Pedem. n. 2083.
Villars. Fl. Delph. 2. 235. tab. 6.*

Iuncus pilosus β. *Linn. Sp. pl. 468.*

Iuncus foliis gramineis panicula laxa, petalis mollibus breviter aristatis. *Hall. helv. n. 1326.*

Luzula spadicea. Decand. Fl. Franc. 3. p. 159.

Gramen hirsutum nemorosum angustifolium alpinum paniculis obscure rufescentibus.
Scheuchz. Agrost. p. 312. Prodr. tab. VI. (bona.)

Icon. Host. Gram. III. tab. 96. (sub. I. intermedio.)

Germ. Braunblütige Bergbinse.

Gall. Ionc marron.

Hab. In subalpinis humidiusculis montis *Feldberg*, ubi vidi 1818. In Alsatiæ monte *Ballon* nuper legit *D. Griesselich.*

Flor. Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. ¼

Radix fibrosa, nigricans. *Culmus* sesquipedalis, bipedalis, erectus, teres, foliatus. *Folia* linearis-lanceolata, plana, duas lineas lata, glabra, late viridia. *Vaginæ* margine raris pilis instructæ. *Flores* paniculato-corymbosi. *Pedunculi* tenues, elongati, patente-divaricati, subtrichotomi. *Pedicelli* 3-4, uniflori. *Bracteæ* lanceolatae, fimbriatae, membranaceæ. *Calycina petala* lanceolata, setaceo-mucronata, fusco-spadicea, capsula acutiuscula subbreviora.

pag. 86. *IUNCUS angustifolius.*

ꝝ. *Panicula sessili radicata.*

Hab. Prope *Wertheim* in *sylva Spessart* ubi
legit *Mertinus.*

pag. 89. *IUNCUS campestris.*

ꝝ. *Spicis omnibus subsessilibus.*

Iuncus congestus. *Thuil. Fl. Paris.* 179.

Luzula congesta. *Decand. Fl. Franc. VI.*
p. 503.

Icon. *Flor. Dan. tab.* 1692.

ꝝ. *Foliis angustioribus longioribus minus pi-*
losis; Spicis omnibus pedunculatis ob-
longis albidis.

I. multiflorus. *Hoffm. Fl. Germ.* 1. p.
169.

I. intermedius. *Thuill. Fl. Paris.* p. 179.

Luzula multiflora. *Hagenb. Fl. Basil.* 1.
p. 357.

Icon. *Fl. Dan. tab.* 1333.

Amat montosa sylvatica paludosa, in monte
Blauen, Feldberg et passim alibi.

ꝝ. *Amat montosa pascua sicciora, et subal-*
pina, in monte Belehen et Feldberg,
nec non in demissioribus passim non in-
frequens. Spiculæ særissime tres, in-
terdum binæ, subpedunculatæ, congestæ,
atro-fuscæ.

Nota. Vix ac ne vix pro peculiaribus speciebus
habendae.

pag. 90.

548.* *IUNCUS spicatus* foliis planis,
spica racemosa nutante. *Linn Sp. pl. 1.*
p. 469. — Fl. Lapp. 125.

I. spicatus foliis planiusculis, spica racemosa
nutante, spiculis sessilibus bracteatis. *Wah-*
lenb. Fl. Lapp. p. 88.

I. spicatus foliis planis spica racemosa nu-
tante basi composita, capsulis acutis.
Smith. Fl. Brit. 1. p. 386.

Iuncus alpinus latifolius panicula racemosa
nigricante pendula. *Till. Pis. p. 91.*

Luzula spicata. *Decand. Fl. Franc. III.*
p. 161.

Icon. Flor. Dan. tab. 270. Linn. Fl. Lapp.
tab. 10. fig. 4. Sow. Engl. Bot. tab. 1176.

Germ. Aehrentragende Binse.

Galt. Ionc en épi.

Hab. In pascuis alpinis. In vicinia Principa-
tus superioris helvetia retro dem *Weisbad*
am Wildkirchlein, Gamor et Kasten,
ubi eam vidi 1818.

Flor. Majo, Junio, *Semina Julio matura.* 2

Radix fibrosa. Culmus pedalis, erectus,
tenuis, foliatus. *Folia radicalia linearia, plani-*
uscula, subrecurva, margine pilosula. Culmea
convoluta, minora, ad vaginæ apicem magis pi-
losa. Spica racemosa, terminalis, ovato-oblonga,
obtusa, nutans, nigro-ferruginea. Spiculæ pau-
cifloræ, subsessiles. Bracteæ sub spiculis insi-

mis, ciliato-laceræ. *Calycina* foliola lanceolata, acuminata. *Capsula* ovata, acuta, fusco nigra.

HEXANDRIA TRIGYNIA.

pag. 94. RUMEX *Patientia*. Linn.

R. *Patientia* floribus hermaphroditis, valvulis integerrimis, unica granifera, foliis ovato-late lanceolatis. Willd. Linn. Sp. pl. 2. p. 249.

pag. 96. RUMEX *sanguineus*. Linn.

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1553.

pag. 97. RUMEX *crispus*. Linn.

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1998.

pag. 99. RUMEX *maximus* (*mihi*.)

R. *Britannica*. Schkuhr. bot. Handb. 1.
p. 311. (*omnino*.)

Deleatur R. *palustris* (a me citatus.) Smith.
Fl. Brit. qui peculiarem speciem sistit.

Radix crassa, ramosa, fibrosa, extus e luteo-fusca, intus albide lutescens. *Caulis* 5-6-7 pedalis, erectus, firmus, crassiusculus, sulcatus, ramosus. *Folia* versus radicem maxima, cum petiolis 4-6 pedes longa, omnia lanceolata, utrinque acuta, 8-10 uncias lata. *Verticilli* foliaci. *Flores* hemaphrodoti. *Valvulae* integræ ovato-deltoideæ, graniferæ: *Granula* longiuscula, acuta.

Nota. Distinctissima omnino a R. *aquatico*.
Linn. foliis inferioribus non cordatis sed

semper exacte lanceolatis longioribus. Cl. Sowerby R. aquaticus in Engl. Bot. tab. 2104. ob folia lanceolata, non ad R. aquaticum Linn. sed ad nostrum R. maximum pertinet.

Secundum Cl. Hagenbachium in Fl. Basil. 1. p. 340. Lapathum aquaticum folio cubitali C. Bauhini. p. 116. quod Linnaeus aliquique ad R. aquaticum citant ad R. maximum pertinet.

pag. 100. *RUMEX maritimus*. Linn.

R. *maritimus* valvulis deltoideis setaceo-dentatis graniferis, foliis linearibus, verticillis confertis. Smith. Fl. Brit. 1. p. 393.

Deleatur *Icon. Curtisii. Fl. Lond.* allegata a Cl. Smithio ad R. *palustrem* citata.

Icon. Sow. Engl. bot. tab. 725.

Hab. Porro prope Gottsau, ubi nuper vidi.

pag. 101. post *RUMICEM maritimum*.

556.* *RUMEX palustris* valvulis lanceolatis graniferis basi dentatis, foliis linearibus lanceolatis, verticillis distantibus. Smith. Fl. Brit. 1. p. 394,

R. *maritimus*. Huds. Fl. Engl. 1. p. 155. β.

Hydrolapathum minus. Lob. Ic. p. 286. (*optima*.)

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1932. — Curt. Fl. Lond. tab. 163. (*sub R. maritimo*.)

Germ. Sumpf-Grindwurz.

Gall. Rumex des marais.

Ha b. In paludosis, fossis. Circa *Dachsland an der Federbach*. In ruderatis prope *Ebersteinburg* raro: ubi legit *A. Braun*. In *Palatinatu transrhenano* circa *Lautern t. D. Kochio*.

Flor. Junio, Julio. *Semina* Augusto Septembri matura. 2

Dissert ab affini *R. maritimo*. *Caulibus* brevioribus. *Foliis* radicalibus submajoribus. *Verticillis* magis remotis, non arcte confertis. *Valvulis* lanceolatis (nec deltoideis) basi utrinque tridentatis, dentibus setaceis multo brevioribus.

Secundum *Cl. Kochii* sententiam, sub *R. acuto* comprehendebat *Ill. Pollichius*.

Individua in ruderatis obvenientia, omnibus in partibus minora sunt.

pag. 102. *RUMEX acutus. Linn.*

R. acutus valvulis oblongis subdentatis omnibus graniferis, foliis cordato - oblongis acuminatis, racemis foliosis. *Smith. Fl. Brit.* 1. p. 391.

R. paludosus. With. p. 354. ex descriptione (secundum *Cl. Smith.*)

Lapathum acutum s. *Oxylapathum*. *Joh. Bauh. hist.* 2 p. 983. ab ipso *Linnæo* in ejus *Materia medica* ad *R. acutum* citatum. *Icon.*

Lapathum sylvestre sive *oxylapathum* s. Οξυλάθρητον, latinis *Rumex acutus in officinis Lapathum acutum. Dodon. Pempt. V. Libr.* 1. p. 657. *Icon.*

Oxylapathum officinis Lapathum acutum.
Fuchs. hist. 470. *Icon.*

Lapathum acutum. *Lobel. p. 284. Icon. Ray.*
Syn. 142.

Lapathum s. Rumex: Lapathum acutum offi-
cinis. *Camerar. Epit. p. 228. Icon.*

Icon. *Sow. Engl. Bot. tab. 724. (deleatur R.*
acutus. Curtis. Fl. Lond. Icon. qui ad *R.*
nemorosum pertinet.)

Valvulae lanceolato-oblongae, subinde den-
tatae, omnes granulo maximo gibboso rubro onu-
stae. *Semen* exiguum. *Smith. l. c.*

Maxime affiniis *R. Nemolapatho*, a quo
differt valvulis non integerrimis sed subinde den-
tatis.

Nota. Sub Rumice acuto in herbario Lin-
naei, a Smithio descriptam et à Sower-
beo depictam plantam conspicuam esse, affir-
mat Sowerby *l. c.*

Sub *Lapatho* acuto in officinis pharmacev-
ticis promiscue saepe Radices praecipue *Rumicis*
nemorosi, *R. Nemolapathi*, et *R. palu-*
stris, nec non *R. crispi* et *R. obtusifolii*:
foliis obtusis et acutiusculis prostant.

pag. 103.

557.* RUMEX nemorosus floribus her-
maphroditis, valvulis oblongis obtusius-
culis integerrimis, unica granifera, foliis
inferioribus petiolatis cordato-lanceolatis
acutis, superioribus sessilibus lanceolatis,
margin'e subundulatis.

R. nemorosus floribus hermaphroditis, val-

vulis oblongis obtusis integerrimis, unica granifera, foliis lanceolatis. Schrad. Cat. H. Gött. Willd. Enum. p. 397.

R. acutus. Curtis. Fl. Lond. (exclus. Linn. Synonymo.)

R. sanguineus. β. viridis. Smith. Fl. Brit. 1. p. 391.

Lapathum viride. Dill. in Ray. Syn. 141.

Icon. Curtis. l. c. tab. 181. (optima.)

German. Waldgrind-Wurz. Spitzblättrige Grindwurz.

Gall. Rumex des forets.

Hab. In sylvaticis et nemoribus humidis, inundatis præsertim rhenanis passim frequens. Circa Carlsruhe ad fossarum et viarum marginalia in sylva Auacker et alibi copiose.

Flor. Junio, Julio. Semina Augusto Septembri matura. ȝ

Radix ramosa, flavo-fusca, intus pallide flavida. Caulis 2-3 pedalis, erectus, superne flexuosus, teres, striatus, rubellus, crassitie pennæ anserinæ, ramosus. Rami alterni, erectiusculi, inferne foliosi. Folia inferiora petiolata, cordato-lanceolata, acuta, plana, 5-6 uncias longa, 2 circiter uncias lata, subtus venis minutis reticulata, lète viridia, superiora sessilia, ex ovato-lanceolata, margine undulata, acutiora et angustiora, suprema lanceolata. Flores semiverticillati, pedicellati, numerosi, penduli. Valvulae minutæ, oblongæ, obtusiusculæ, integerimæ, unica semper granifera, reliquis plerumque nudis.

Differt a R. Nemolapatho affini: Caulibus altioribus. Ramis magis erectis. Foliis inferioribus majoribus magis venuloso-reticulatis. Verticillis minus remotis. Valvulis demum minoribus, unica saltem granifera.

Obs. Planta ex seminibus in horto Carlsruhensi culta, constans, non pro varietate Rumicis sanguinei Linn. habenda.

Mulierculi rhizotomi, in regioribus rhenanis, saepissime hujus plantae radicem, sub radice Lapathi acuti colligunt. In praestantissima officina pharmaceutica Cl. Reinboldi Spielmanni, professoris et praceptoris in me amissimi, Argentorati, sub annis 1778 - 1782 radices ex hac specie vidi.

pag. 183. *RUMEX obtusifolius*.

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1999.

pag. 104. *RUMEX pulcher*.

Icon. Sow. Engl. bot. tab. 1576.

pag. 109. *RUMEX digynus*.

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 910.

Hab. In Principatu superiori retro Mœskirch im Donauthale in rupibus calcareis abunde, ubi vidi 1818.

pag. 110. *RUMEX alpinus*.

Hab. Porro retro dem Weisbad ad casas pastoritias montis Sentis et Kasten abunde, ubi vidi 1818.

Nota. Plantam in pyrenaeis, alpinis helvetiae et in monte patrio Feldberg, magna in abundantia et semper ad stabula alpina vidi.

Radix bene siccata, vera panacea domestica, in multifariis hominum et pecorum morbis, cumprimis in obstructionibus alvi, et contra vermes, apud alpicolas.

In officinis pharmaceuticis radicem certo efficiacem, pro dolor, persaepe vermibus corruptam, removi.

pag. 112. RUMEX *hispanica*.

Rumex *arifolius*. Allion. Fl. Pedemont. n. 2040. (omnino) non Linnæi filii.

Hab. Porro in Alsatiae monte *Ballon* ubi numerus legit D. Griesselich.

Nota. Sub. R. *hispanica* omnino comprehendit R. *arifolium* Allionii ut ex adjecto Halleri et Bocconi synonymo patet.

In hortis oleraceis praecipue varietatem maiorem Rumicis *Acetosae* passim, sub R. *hispanica* colunt.

pag. 116. SCHEUCHZERIA *palustris*.

Icon. Sow. Engl. Bot. tab. 1801.

Hab. In Brisgovia ad montem *Feldberg* infra dem *Feldbergsee* in udis copiose, ubi eam legi Ann. 1807.

HEXANDRIA POLYGYNIA.

pag. 125. ALISMA *Plantago*.

Nota. Pro diverso loco natali plus minusve aquoso, uido, et sicciori, quammaxime polymorpha. Folia subcordata, ovata, ovato-lanceolata, exacte lanceolata, majora et minora, longiora, et breviora, interdum natantia, magis elongata.

Varietatem minorem false cum Pollichio,
sub A. natante Linnaei allegavi. Alisma
natans Linn. ex Flora nostra delenda erit.

Alisma lanceolata, (With.) Koch et Ziz.
Cat. Plant. FI. Palat. neutiquam pro peculiari specie, sed pro varietate minori, foliis lanceolatis, A. *Plantaginis* habenda est.

pag. 126. post ALISMAM *Plantago*.

574.* *ALISMA graminea* foliis linearibus angustis praelongis erectis radicalibus, sessilibus, scapo teretiusculo glabro erecto nudo, superne verticillatim ramoso. (*mihi*.)

A. *Plantago* γ. Smith. Fl. Brit. 1. p. 401.

Plantago aquatica leptomacrophylllos. Loes. Fl. Pruss. p. 199.

Icon. Loes. l. c. tab. 62. (*bona*.)

Germ. *Grasblättriger Wasserweigerich*.

Gall. *Plantaine à sévilles de Gramen*.

Hab. Prope Dachsländ in medio stagno cùm *Schweikertia nymphoide*, *Ytnera minore* et *Marsilea quadrifolia* non infrequens.

Flor. Augusto. *Semina Septembri matura*. ¶

Radix fibrosa densa, extus nigra. *Scapus* erectus, sesquipedalis, cubitalis et altior, teretiusculus, glaber, nudus, superne verticillatim ramosus. *Folia* radicalia, numerosa, sessilia, omnia linearia, integra, glabra, læte viridia, erecta, scapo longiora, 2 - 3 pedalia, lineam ad sesquilineam lata. *Stipulae* *Pedunculi*. *Collae* et *Capsulae* ut in *A. Plantagine*.

Plantam

Plantam pro Flora nostra novam ex medio stagno indicato, in nostra, dilectissimi Maercklini et Hartwegii, magni Ducis hortorum inspectoris meritissimi praesentia, apportavit juvenis optimus, Alexander Braun, d. 8. Septembris 1820. In hortum Carlsruhensem omni cautela transplantata, periiit. An vera species, an demum varietas maxime memorabilis *A. Plantaginis?* cultura in horto docebit.