



# Cupania oblongifolia Mart.

## TAXONOMIA

Família Botânica: Sapindaceae

Gênero: Cupania

Nome popular: Camboatá-da-folha-grande



## ECOLOGIA

- *Estágio Sucessional*: Secundária Inicial
- *Síndrome de dispersão*: Zoocórica
- *Perenidade das folhas*: Perenifólia
- *Crescimento*: Moderado
- *Densidade de copa*: Média
- *Floração*: Março a Agosto
- *Solo e ambientação*: -

## UTILIDADES

- *Uso Madeireiro*: lenha.
- *Apícola*: flores melíferas.
- *Medicinal*.
- *Comercialização de sementes*.

## DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

- *Norte*: PA, AP
- *Nordeste*: BA, PI, AL, PE, PB, RN
- *Sudeste*: RJ, ES, SP, MG
- *Sul*: PR, SC, RS
- *Bioma*: Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado

Adaptado da Lista de Espécies da Flora do Brasil



## REFERÊNCIAS

CASSIANI, L. B. **Modelo de Sistemas Agroflorestais com fins Apícolas para o município de Pedreira-SP**. 2008. 72f. Dissertação (Mestrado em Agroecologia e Desenvolvimento rural). Universidade Federal de São Carlos - Araras-SP.

CARVALHO, F. A.; NASCIMENTO, M. T.; BRAGA, J. M. A.; Composição e riqueza florística do componente arbóreo da Floresta Atlântica submontana na região de Imbaú, Município de Silva Jardim, RJ. **Acta Botânica Brasílica**. n.20, v.3, p.727-740. 2006.

CREPALDI, M. O. S.; **Etnobotânica na Comunidade Quilombola Cachoeira do Retiro, Santa Leopoldina, Espírito Santo, Brasil**. 2007. 81f. Dissertação (Mestrado em botânica) – Escola Nacional de Botânica Tropical, do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.

PEREIRA, T. S.; COSTA, M. L. M. N. da; MOREAE, L. F. D.; LUCHIARI, C.; Fenologia de espécies arbóreas em Floresta Atlântica da Reserva Biológica de Poço das Antas, Rio de Janeiro, Brasil. **IHERINGIA, Série Botânica**, Porto Alegre, v. 63, n. 2, p. 329-339, jul./dez. 2008.