

POISSONS OSSEUX

Balistes vetula Linnaeus, 1758

BALISTIDAE


Noms FAO : An - Queen triggerfish; Es - Baliste royal; Fr - Baliste royal.

Taille max. : 50 cm environ, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, pièges, lignes.

Habitat : adultes près du fond surtout dans les récifs coralliens, zones sableuses et les herbiers.

Noms loc. :

***Canthidermis maculatus*** (Bloch, 1786)


Noms FAO : An - Rough triggerfish; Es - Calafate áspero; Fr - Baliste rude.

Taille max. : Plus de 50 cm.

Méth.capt. : chaluts.

Habitat : fréquente les eaux côtières, mais se rencontre souvent au large.

Noms loc. :

***Melichthys niger*** (Bloch, 1786)


Noms FAO : An - Black triggerfish; Es - Calafate negro; Fr - Baliste noir.

Taille max. : 60 cm, commune jusqu'à 30 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, pièges, lignes.

Habitat : fréquente les eaux côtières peu profondes jusqu'à environ 30 m.

Noms loc. :

***Batrachoides liberiensis*** (Steindachner, 1867)

BATRACHOIDIDAE

Synonymes : *Batrachus liberiensis* Steindachner, 1867; *Batrachoides beninensis* Regan, 1915.


Noms FAO : An - Hairy toadfish; Es - Sapo peludo; Fr - Crapaud poilu.

Taille max. : au moins 25 cm, peut-être même jusqu'à 46 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage et autres engins artisanaux.

Habitat : vivant sur le fond, surtout dans les zones littorales et les eaux côtières peu profondes jusqu'à 30 m environ; trouvée aussi en milieu saumâtre.

Noms toc. :



POISSONS OSSEUX

BATRACHOIDIDAE

Halobatrachus didactylus (Schneider, 1801)

Synonymes : *Batrachus didactyles* Schneider, 1801.


Noms FAO : An - Lusitanian toadfish; Es - Sapo lusitánico; Fr - Crapaud lusitanien.

Taille max.: 45 cm.

Méth.capt.: chaluts de fond, engins artisanaux.

Habitat : vivant sur le fond, surtout dans les eaux côtières jusqu'à une profondeur de 50 m environ.

Noms loc. :

***Perulibatrachus elminensis*** (Bleeker, 1861)

Synonymes : *Batrachus elminensis* Bleeker, 1863; *Parabatrachus elminensis* (Bleeker, 1863); *Batrachus budkeri* Roux, 1957.


Noms FAO.: An - Guinean toadfish; Es - Sapo guineano; Fr - Crapaud guinéen.

Taille max.: 35 cm, commune jusqu'à 20 cm.

Méth.capt.: engins de pêche artisanale, chaluts.

Habitat : vivant sur le fond dans les eaux côtières.

Noms soc.:

***Perulibatrachus rossignoli*** (Roux, 1957)

Synonymes : *Batrachus rossignols* Roux, 1957.


Noms FAO : An - Rossignol toadfish; Es - Sapo de Rossignol; Fr - Crapaud de Rossignol.

Taille max.: au moins 30 cm (peut-être 40 cm).

Méth.capt.: engins artisanaux, chaluts.

Habitat : vivant sur le fond du plateau continental

Noms loc. :

***Ablennes hians*** Valenciennes, 1846)

BELONIDAE


Noms FAO : An - Flat needlefish; Es - Agujón sable; Fr - Orphie plate.

Taille max.: environ 105 cm, commune jusqu'à 90 cm.

Méth.capt. : sennes coulissantes, lignes, filets calés.

Habitat : fréquente les eaux superficielles littorales, les eaux saumâtres des estuaires; se rencontre également dans les marigots.

Noms loc. :



POISSONS OSSEUX

BELONIDAE

Platybelone argalus annobonensis Collete & Parin, 1970


Noms FAO : **An** - Keeltail needlefish; **Es** - Agujón de quilla; **Fr** - Orphie carène.

Taille max.: longueur standard au moins jusqu'à 38,2 cm et longueur du corps sans le bec ni la caudale) 25,6 cm. Longueur standard commune jusqu'à 80 cm.

Méth.capt.: éperviers, traînes, trémails.

Habitat : espèce pélagique habitant les eaux de surface.

Noms loc. :

***Strongylura senegalensis*** (Valenciennes, 1846)

Synonymes : souvent appelée à tort *Strongylura marina* (Waldbaum, 1792).


Noms FAO : **An** - Senegal needlefish; **Es** - Agujón senegalés; **Fr** - Aiguillette sénégalaise.

Taille max. : environ 150 cm, commune jusqu'à 60 cm.

Méth.capt.: éperviers, traînes, sennes coulissantes, lignes.

Habitat : fréquente les zones côtières et saumâtres.

Noms loc. :

***Tylosurus acus rafale*** Colette & Parin, 1970


Noms FAO : **An** - Agujon needlefish; **Es** - Marao ojón; **Fr** - Aiguille voyeuse.

Taille max.: 140 cm.

Méth.capt.: données exactes non disponibles.

Habitat : espèce pélagique, fréquente les eaux du large, mais se trouve aussi dans les eaux côtières.

Noms loc. :

***Tylosurus crocodilus crocodilus*** (Peron & LeSueur, 1821)

Synonymes : *Tylosurus raphidoma* (Ranzani, 1842).


Noms FAO : **An** - Hound needlefish; **Es** - Marao lisero; **Fr** - Aiguille crocodile.

Taille max.: 100 cm

Méth.capt.: éperviers, traînes, sennes coulissantes, filets calés, lignes.

Habitat : fréquente les eaux superficielles côtières.


Noms loc. :






POISSONS OSSEUX

Arnoglossus capensis Boulenger, 1898**Synonyms** : *Arnoglossus entomorhynchus* Stauch, 1967?**Noms FAO** : **An** - Cape scaldfish; **Es** - Peludilla del Cabo; **Fr** - Arnoglosse du Cap.**Taille max.** : 20 cm.**Méth.capt.** : sennes de plage, chaluts.**Habitat** : peu de données disponibles; capturée entre 70 et 200 m de profondeur.**Noms loc.** :

côte oculé brunâtre; traces de marques plus sombres



BOTHIDAE

Arnoglossus imperialis (Rafinesque, 1810)**Synonymes** : *Arnoglossus blachei* Stauch, 1965.**Noms FAO** : **An** - Imperial scaldfish; **Es** - Serrandel imperial; **Fr** - Arnoglosse impérial.**Taille max.** : 25 cm.**Méth.capt.** : chaluts de fond et pélagiques.**Habitat** : sur des fonds vaseux, sableux, coquilliers et coralliens; capturée entre 40 et 200 m de profondeur**Noms loc.** :***Bothus guibei*** Stauch, 1966**Noms FAO** : **An** - Guinean flounder; **Es** - Lenguado de Guinea; **Fr** - Rombou de Guinée.**Taille max.** : 28 cm.**Méth.capt.** : chaluts de fond, sennes de plage, lignes, cannes à pêche tenues à la main.**Habitat** : sur le fond à des profondeurs de 15 à 40m.**Noms loc.** :***Bothus podas africanus*** Nielsen, 1961**Noms FAO** : **An** - Wide-eyed flounder; **Es** - Podas; **Fr** - Rombou podas.**Taille max.** : 45 cm.**Méth.capt.** : chaluts de fond, sennes de plage, épauettes, filets de fond calés, dragues.**Habitat** : fréquents les fonds de sable coquilliers, vaseux et coralliens de 15 à 200 m de profondeur.**Noms loc.** :

(voir planche 1, 4)

POISSONS OSSEUX

BOTHIDAE

Chascanopsetta lugubris Alcock, 1894


Noms FAO : An - Pelican flounder; Es - Lenguado pelicano; Fr - Perpeire pélican.

Taille max. : 30 cm, commune jusqu'à 25 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : fréquente le plateau continental de 120 à 600 m de profondeur.

Noms loc. :

***Citharichthys stampflii*** (Steindachner, 1894)


Noms FAO : An - Smooth flounder; Es - Lenguado liso; Fr - Perpeire lisse.

Taille max. : 15 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond, sennes de plage.

Habitat : fréquente les eaux côtières jusqu'à 50 m de profondeur; se rencontre également dans les estuaires, ainsi qu'en eaux douces.

Noms loc. :

***Monolene mertensi*** (Poll, 1959)

Synonymes : *Laeops mertensi* Poli, 1959


Noms FAO : An - Merten's moonflounder; Es - Monolena de Mertens; Fr - Monolène de Mertens.

Taille max. : 8 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : habite les fonds vaseux de 100 à 700 m de profondeur

Noms loc. :

***Monolene microstoma*** (Cadenat, 1937)

Noms FAO : An - Small mouth moonflounder; Es - Monolena bocachica; Fr - Monolène à petite bouche.

Taille max. : 20 cm.

Méth.capt. : chaluts de fond.

Habitat : habite les fonds vaseux à des profondeurs de 25 à 400 m.

Noms loc. :

