



## PESOS DE AVES SUBOSCINES DE ARGENTINA

Carlos Alderete<sup>1,2</sup> y Patricia Capllonch<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205 (4000) Tucumán. Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Correo electrónico: [cenaarg@yahoo.com.ar](mailto:cenaarg@yahoo.com.ar).

<sup>2</sup> Reserva de Horco Molle, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.

**RESUMEN:** Presentamos promedios de pesos de 2028 aves de 118 especies capturadas en Argentina como resultado de campañas de anillado de aves. Distinguimos en algunos casos los pesos de diferentes subespecies y diferencias entre sexos en los casos en que fueron notables.

**ABSTRACT: WEIGHT OF SUBOSCINES BIRDS OF ARGENTINA.** We report average weights of 2028 birds of 118 species caught in Argentina as a result of birds banding campaigns. Distinguish in some cases the weights of different subspecies and sex differences in the cases where they were remarkable.

### INTRODUCCIÓN

Todos los pesos que presentamos fueron obtenidos en las campañas de anillado de aves que lleva adelante el Centro Nacional de Anillado de Aves - CENAA - desde 1986. Los pesos se tomaron con balanzas Pesola de 100 g y 500 g aproximadamente, que normalmente se usan para anillado.

Separamos en algunos casos a las especies por provincias cuando los datos eran significativamente dis-

tintos y también en algunos casos los pesos de machos (M) y de hembras (H). También hemos discriminado en algunos casos subespecies ya que el anillado se ha realizado en diferentes provincias y ecorregiones de Argentina. Usamos para esto las listas de de la Peña (1999) y Olrog (1979). La biomasa puede ser de utilidad para muchos estudios por lo que queríamos comunicar estos datos.

En las siguientes páginas presentamos los resultados obtenidos.

**RESULTADOS**

DENDROCOLAPTIDAE				
Especie	Provincias de procedencia	Peso promedio en gramos	Rango en gramos	Número de ejemplares
<i>Campylorhamphus trochilrostris</i> Picapalo Colorado	Salta (Rivadavia y Dragones), Tucumán (Simoca), Santiago del Estero (Pozo Hondo), Formosa (Riacho Pilagá-Cmte. Fontana).	48,75	47-50	4
<i>Drymornis bridgesii</i> Chincheró Grande	Tucumán (Leales), Salta (Rosario de la Frontera), Santiago del Estero (Santo Domingo y Pozo Hondo), Córdoba (Icho Cruz), San Luis (Bajo de Vélez), Chaco (Taco Pozo) y Mendoza (Telteca).	85	80-98	5
<i>Lepidocolaptes a. angustirostris</i> Chincheró Chico	Formosa (PN Pilcomayo y Riacho Pilagá-Cmte. Fontana).	30,25	25-35	4
<i>Lepidocolaptes a. praedatus</i> Chincheró Chico	Entre Ríos (PN Predelta y PN El Palmar).	37,5	35-40	2
<i>Lepidocolaptes a. dabbenei</i> Chincheró Chico	Tucumán (Simoca, Leales, Trancas, Burruyacu y Tafí del Valle), Santiago del Estero (Pozo Hondo), Chaco (Taco Pozo) y Mendoza (Telteca y Nacuñán).	26,52	20-32	54
<i>Lepidocolaptes a. certhiolus</i> Chincheró Chico	Salta (Dique Itiyuro) y Jujuy (Laguna La Brea-Santa Bárbara).	33,5	30-37	2
<i>Dendrocolaptes picumnus</i> Trepador Colorado	Salta (Dique Itiyuro) y Jujuy (Laguna La Brea-Santa Bárbara).	69,5	67-72	2
<i>Xiphocolaptes major</i> Trepador Gigante	Salta (Potrerillo).	(M) 145, (H) 125		2
<i>Sittasomus g. griseicapillus</i> Tarefero	Tucumán (Horco Molle, Burruyacu, Chulcas, La Cocha, Río Chico, San Ignacio, Parque Biológico Sierra de San Javier, Reserva provincial La Florida y Santa Ana), Salta (PN El Rey, El Jardín, Copo Quile y Campo Durán), Jujuy (Laguna La Brea-Santa Bárbara, Ledesma y PN Calilegua), Santiago del Estero (PN Copo) y Formosa (PN Pilcomayo y Riacho Pilagá-Cmte. Fontana).	13,19	10-20	60
FURNARIIDAE				
Especie	Provincias de procedencia	Peso promedio en gramos	Rango en gramos	Número de ejemplares
<i>Geositta cunicularia</i> Caminera Común	Jujuy (Abra Pampa).	26		1
<i>Geositta punensis</i> Caminera Puneña	Jujuy (Abra Pampa).	27,5	25-35	6
<i>Upucerthia dumetaria</i> Bandurrita Común	Catamarca (Amanao), Mendoza (Telteca).	44,25	39.5-49	4
<i>Upucerthia certhioides luscini</i> Bandurrita Chaqueña	Mendoza (Telteca).	22,61	17-27	18
<i>Upucerthia certhioides certhioides</i> Bandurrita Chaqueña	Salta (Dragones) y Tucumán (Ticucho).	23,95	21-26	10
<i>Upucerthia andaecola</i> Bandurrita Cola Castaña	Jujuy (Yavi).	35,62	34-39	4
<i>Upucerthia validirostris</i> Bandurrita Andina (Capllonch y Ortiz 2006)	Tucumán (Tafí del Valle).	45		1
<i>Cinclodes a. atacamensis</i> Remolinera Castaña	Tucumán (La Angostura y Tafí del Valle) y Salta (San Antonio de los Cobres)	47,33	42-51	6
<i>Cinclodes fuscus tucumanus</i> Remolinera Común	Tucumán (La Ciénaga, Reserva La Florida, Chulcas y Parque Biológico Sierra de San Javier).	26,10	23-30	28

CONTINÚA FURNARIIDAE

<i>Cinclodes f. albiventris</i> Remolinera Común	Salta (San Antonio de los Cobres) y Jujuy (La Quiaca).	28,8	25-32	5
<i>Furnarius rufus commersoni</i> Hornero	Salta (Dragones) y Jujuy (Volcán).	40,62	36.5-45	4
<i>Furnarius rufus paraguayae</i> Hornero	Tucumán (Simoca, Horco Molle, Leales, Burreyacu, Trancas, Cruz Alta, Tafí Viejo y Tafí del Valle), Santiago del Estero (Pozo Hondo y Santo Domingo).	23,16	22-26	15
<i>Furnarius r. rufus</i> Hornero	Formosa (PN Río Pilcomayo), Mendoza (Ñacuñán), Córdoba (Icho Cruz) y San Luis (Bajo de Véliz).	46,65	39-60	35
<i>Furnarius cristatus</i> Hornerito Copetón	Chaco (Gral. Guemes – Río Teuco), Salta (Sta. Victoria Este y Dragones) y Santiago del Estero (Pozo Hondo y Bañado de Figueroa).	23,68	22-29	11
<i>Coryphistera alaudina</i> Crestudo	Chaco (Taco Pozo), Formosa (Pilagá), Salta (Sta. Victoria Este) y Santiago del Estero (Jiménez y Pozo Hondo).	27,84	22-32	23
<i>Anumbius annumbi</i> Leñatero	Santiago del Estero (San Pedro de Guasayán).	31		1
<i>Certhiaxis pyrrhophia</i> Curutié Blanco	Jujuy (Volcán y Laguna La Brea), Tucumán (Ticucho, Monteagudo, Aguas Saladas y Colalao del Valle), Catamarca (Andalgalá), Santiago del Estero (Pozo Hondo), Chaco (El Solar y Taco Pozo), Formosa (Cmte. Fontana) y Mendoza (Telteca y Ñacuñán).	11,41	9.5-14	28
<i>Certhiaxis cinnamomea</i> Curutié Colorado	Formosa (Cmte. Fontana) y Corrientes (Sto. Tomé).	14,33	14-15	3
<i>Aphrastura spinicauda</i> Rayadito	Neuquén (San Martín de los Andes).	11		1
<i>Asthenes b. baeri</i> Canastero Chaqueño	Chaco (Taco Pozo), Salta (Campo Quijano, Cachi y Dragones), Santiago del Estero (Pozo Hondo y Santo Domingo - Río Salado) y Tucumán (Ticucho y Los Puestos).	13,46	12-15	26
<i>Asthenes b. baeri</i> Canastero Chaqueño	Mendoza (Nacuñán, Telteca).	17,38	16-20.5	40
<i>Asthenes pyrrholeuca</i> Canastero Coludo	San Juan (Jáchal) y Mendoza (Telteca).	12,28	11-14	7
<i>Asthenes pyrrholeuca</i> Canastero Coludo	Tucumán (Monteagudo y Arroyo Mista).	12	9-16	5
<i>Asthenes pyrrholeuca</i> Canastero Coludo	Tucumán (El Bañado, Amaicha del Valle).	18,5	18-19	2
<i>Asthenes steinbachi</i> Canastero Castaño	Mendoza (Telteca).	20,5		1
<i>Asthenes dorbignyi</i> Canastero Rojizo	Jujuy (Laguna Pozuelos, Tilcara y Patacal), Tucumán (Ticucho, El Infiernillo, Amaicha del Valle), Salta (San Antonio de los Cobres) y Catamarca (Amanao).	17,18	14.5-22	19
<i>Asthenes m. modesta</i> Canastero Pálido	Jujuy (Laguna Pozuelos, Abra Pampa, Tumbaya y Tres Cruces) y Salta (San Antonio de los Cobres).	15,53	14-20	14
<i>Asthenes sclateri</i> Espartillero Serrano	Tucumán (La Ciénaga Grande) y San Juan (Posta El Balde).	16,25	16-16.5	2
<i>Schoeniophylax phryganophila</i> Chotoy	Formosa (Riacho Pilagá).	15		1
<i>Synallaxis ruficapilla</i> Pijui Corona Rojiza	Formosa (PN Río Pilcomayo).	10		1

CONTINÚA FURNARIIDAE

<i>Synallaxis ruficapilla</i> Pijui Corona Rojiza	Formosa (PN Río Pilcomayo).	10		1
<i>Synallaxis scutata</i> Pijui Canela	Jujuy (Laguna La Brea) y Salta (Dique Itiyuro y Piquirenda Viejo).	13,35	12-15	7
<i>Synallaxis frontalis</i> Pijui Frente Gris	Salta (Rosario de la Frontera, PN El Rey, Santa Victoria Este y Campo Durán), Jujuy (Volcán, Laguna La Brea y Arroyo Yuto), Tucumán (Horco Molle, El Sunchal, Monteagudo, Arroyo Mista, Columbres, Taficillo y varios sitios del Parque Biológico Sierra de San Javier), Santiago del Estero (Pozo Hondo), Catamarca (Paclín - Quebrada del Durazno y Capayán), Entre Ríos (PN Predelta) y Formosa (PN Río Pilcomayo y Riacho Pilagá-Cmte. Fontana).	12,81	9.5-17	48
<i>Synallaxis albescens</i> Pijui Cola Parda	Jujuy (Dique La Ciénaga, Vinalito y San Juan de Dios), Salta (El Oculto), Santiago del Estero (PN Copo y San Pedro de Guasayán) y Mendoza (Nacuñán y Telteca).	12,5	10-14.5	24
<i>Synallaxis azarae</i> Pijui Ceja Canela	Salta (PN El Rey y El Oculto), Tucumán (Parque Biológico Sierra de San Javier, Cochuna, El Indio, Piedras Coloradas, Playa Larga, Taficillo, Horco Molle, Piedra Tendida, La Florida, Chulcas, Las Tipas y El Sunchal) y Catamarca (Paclín - Quebrada del Durazno).	12,13	11-15	37
<i>Pseudoseisura lophotes</i> Cacholote Castaño	Salta (Santa Victoria Este), Santiago del Estero (Santo Domingo y El Bañado de Figueroa), Catamarca (Amanao), Chaco (El Solar), Córdoba (Icho Cruz) y Mendoza (Telteca y Nacuñán).	68,77	60-79	11
<i>Leptasthenura fuliginiceps</i> Coludito Canela	Jujuy (Volcán) y Tucumán (Taficillo y La Ciénaga).	10,8	10-11.5	5
<i>Leptasthenura aegithaloides</i> Coludito Cola Negra	Jujuy (Tilcara y Patacal).	8,75	7.5-10	6
<i>Leptasthenura platensis</i> Coludito Copetón	Salta (Campo Durán), San Juan (Posta El Balde), Mendoza (Nacuñán, Telteca y El Carmen), Entre Ríos (Gualeguay) y Catamarca (Amanao).	9,51	7.5-13	46
<i>Phacellodomus ruber</i> Espinero Grande	Formosa (Riacho Pilagá-Cmte. Fontana).	35		1
<i>Phacellodomus rufifrons sincipitalis</i> Espinero Frente Rojiza (Capllonch y Ortiz 2006)	Tucumán (Piedra Tendida y Arroyo Mista), Santiago del Estero (San Pedro de Guasayán).	25,22	24-27	9
<i>Phacellodomus striaticeps</i> Espinero Andino	Jujuy (Laguna Pozuelos), Salta (San Antonio de los Cobres) y Tucumán (El Infiernillo).	30,85	27-35	7
<i>Phacellodomus sibilatrix</i> Espinero Chico	Salta (Dragones) y Santiago del Estero (Pozo Hondo y PN Copo).	14,58	12-17	6
<i>Phacellodomus maculipectus</i> Espinero Serrano	Catamarca (Capayán).	20		1
<i>Syndactyla rufosuperciliata oleaginea</i> Ticotico Común	Jujuy (Laguna La Brea, PN Calilegua y Arroyo Yuto), Salta (PN El Rey y Copo Quile), Tucumán (Ticucho, Piedras Coloradas, Horco Molle, Playa Larga, Cochuna, Parque Biológico Sierra de San Javier, Reservas Provinciales Santa Ana, Aguas Chiquitas y La Florida, San Ignacio, El Indio, Taficillo, El Cadillal y Cuesta de Chasquivil).	26,42	23-36	75

THAMNOPHILIDAE				
Especie	Provincias de procedencia	Peso promedio en gramos	Rango en gramos	Número de ejemplares
<i>Batara cinerea argentina</i> Batará Gigante	Jujuy (PN Calilegua), Salta (PN El Rey).	118	108-136	7
<i>Thamnophilus doliatus</i> Choca Listada	Salta (Santa Victoria Este).	27		2
<i>Thamnophilus ruficapillus</i> Choca Corona Rojiza	Tucumán (Las Juntas – Trancas)	20		1
<i>Thamnophilus caerulescens dinelii</i> Choca Común	Salta (Piquirenda Viejo y Valle Morado), Santiago del Estero (Pozo Hondo) y Formosa (Riacho Pilagá-Cmte. Fontana)	(H) 19,33	16-21	6
<i>Thamnophilus caerulescens dinelii</i> Choca Común	Jujuy (Laguna La Brea), Salta (Piquirenda Viejo, Los Colorados y Dragones), Tucumán (El Chañar) y Formosa (Riacho Pilagá-Cmte. Fontana)	(M) 22	18-28	9
<i>Taraba major</i> Chororó	Jujuy (Laguna La Brea), Tucumán (Agua Saladas, Ticucho y Colombres), Santiago del Estero (San Pedro de Guasayán), Entre Ríos (PN Predelta) y Formosa (Riacho Pilagá-Cmte. Fontana)	56,13	50-65	11
<i>Dysithamnus mentalis</i> (Foto 1) Choca amarilla	Corrientes (Santo Tomé)	12		2
<i>Myrmorchilus strigilatus</i> Batará estriado	Salta (Campo Durán) y Santiago del Estero (Pozo Hondo)	25,5	23-28	2
CONOPOPHAGIDAE				
Especie	Provincias de procedencia	Peso promedio en gramos	Rango en gramos	Número de ejemplares
<i>Conopophaga lineata vulgaris</i> (Foto 2) Chupadientes	Corrientes (Santo Tomé)	20		1
RHINOCRYPTIDAE				
Especie	Provincias de procedencia	Peso promedio en gramos	Rango en gramos	Número de ejemplares
<i>Rhynocrypta lanceolata</i> Gallito Copetón	Mendoza (Nacuñán, Telteca y Cuenca Piloto Pilar).	52,5	46-56,5	6
<i>Teledromas fuscus</i> Gallito Arena	San Juan (Posta El Balde).	34		1
<i>Scytalopus s. superciliaris</i> Churrín Ceja Blanca	Tucumán (La Ciénaga).	18		1
TYRANNIDAE				
Especie	Provincias de procedencia	Peso promedio en gramos	Rango en gramos	Número de ejemplares
<i>Pachyramphus validus</i> Anambé Grande	Tucumán (Reserva Provincial Aguas Chiquitas y Cuesta de Chasquivil).	38,75	37-40	4
<i>Pachyramphus polychopterus</i> Anambé Común	Tucumán (El Sunchal) y Santiago del Estero (Pozo Hondo).	22		2
<i>Agriornis microptera</i> Gaucho Común	Mendoza (Telteca y Nacuñán).	52	42-66	7
<i>Agriornis m. montana</i> (Fotos 3 y 4) Gaucho Serrano	Jujuy (Yavi).	46,5	46-47	2
<i>Agriornis murina</i> Gaucho Chico	Tucumán (Ticucho, Bañados de Amaicha), Santiago del Estero (Pozo Hondo) y Mendoza (Nacuñán y Telteca).	32,43	26-50	8
<i>Xolmis coronata</i> Monjita Coronada	Tucumán (Aguas Saladas) y Mendoza (Nacuñán y Telteca)	44,38	40-53	9
<i>Xolmis irupero</i> Monjita Blanca	Jujuy (Volcan), Tucumán (Los Puestos), Catamarca (Amanao) y Mendoza (Telteca).	24	21-28,5	4

CONTINÚA TYRANNIDAE

<i>Muscisaxicola maculirostris</i> Dormilona Chica	Tucumán (El Indio), San Juan (Posta El Balde) y Mendoza (Ñacuñán).	13,4	11-15	5
<i>Lessonia rufa</i> Sobrepuesto Común	Tucumán (El Cadillal).	15,66	13-22	6
<i>Ochthoeca leucophrys</i> Pitajo Gris	Tucumán (Parque Biológico Sierra de San Javier, La Ciénaga, La Ciénaga Grande, El Indio y El Infiernillo).	13,91	11-15	9
<i>Sayornis nigricans</i> Viudita de Río	Salta (Piquirenda Viejo, PN El Rey y Pampa Grande) y Tucumán (Reservas Provinciales Aguas Chiquitas y Santa Ana, El Indio, Chulcas, Piedra Tendida, San Ignacio, Playa Larga y Horco Molle).	21,09	17-26	31
<i>Knipolegus aterrimus</i> Viudita Común	Jujuy (Volcán y Fraile Pintado), Tucumán (Las Juntas, Ticucho y Bañados de Amaicha, La Banderita), Catamarca (Amanao), Mendoza (Ñacuñán y Cuenca Piloto El Pilar) y San Juan (Posta El Balde).	20,13	18-22	22
<i>Knipolegus signatus</i> Viudita Plumiza	Jujuy (PN Calilegua), Salta (PN El Rey), Tucumán (El Indio, Playa Larga, Cochuna, Parque Biológico Sierra de San Javier, Cuesta de Chasquivil, Sierra del Cajón), Catamarca (La Banderita).	18,76	15-21	26
<i>Knipolegus striaticeps</i> Viudita Chaqueña	Salta (Cachi, Dragones), Formosa (Riachos Pilagá y Monte Lindo-Crnte. Fontana), Tucumán (Ticucho, Puente del Río Tapia en la Ruta 9, Monteagudo), Santiago del Estero (Quimilí, PN Copo, Pozo Hondo, Santo Domingo sobre río Salado).	11,68	10-13,5	11
<i>Knipolegus cyanirostris</i> Viudita Pico Celeste	Corrientes (Ea. La Blanca, Santo Tomé).	16	16	1
<i>Empidonomus varius</i> Tuquito Rayado	Tucumán (El Sunchal).	18,5	18-19	2
<i>Myiodynastes maculatus</i> Benteveo Rayado	Tucumán (El Sunchal), Formosa (PN Río Pilcomayo), Catamarca (Quebrada del Durazno, Paclín).	44,85	40-51	7
<i>Machetornis rixosus</i> Picabuey	Formosa (PN Río Pilcomayo).	33,2	31-40	5
<i>Satrapa i. icterophrys</i> Suirirí Amarillo	Jujuy (Volcán y Dique la Ciénaga), Tucumán (Dique La Angostura, El Sunchal y La Ciénaga), Buenos Aires (Cabo San Antonio).	19,63	16,5-25	19
<i>Stigmatura budytoides</i> Calandrita	Salta (Dragones), Tucumán (Aguas Saladas, Los Puestos, Cochuna, Monteagudo, Ticucho, Amaicha del Valle), Catamarca (Amanao), Chaco (Taco Pozo), Formosa (Riacho Pilagá-Crnte. Fontana), La Pampa (PN Lihué Calel), Mendoza (Ñacuñán, El Carmen, Cuenca Piloto El Pilar), San Juan (Jáchal), San Luis (Bajo de Véliz), Santiago del Estero (Pozo Hondo, PN Copo, Santo Domingo).	9,85	8-14	124
<i>Pitangus sulphuratus bolivianus</i> Benteveo Común	Jujuy (Volcán), Salta (Campo Quijano), Tucumán (Ticucho, Amaicha del Valle, Tafí del Valle, El Sunchal, Monteagudo), Formosa (PN Río Pilcomayo).	58,66	40-69	17
<i>Tyrannus melancholicus</i> Suirirí Real	Tucumán (Colombres, El Sunchal), Mendoza (Telteca), Formosa (PN Río Pilcomayo).	42,35	37,5-52	10

CONTINÚA TYRANNIDAE

<i>Tyrannus savana</i> Tijereta	Santiago del Estero (San Pedro de Guasayán).	31	31	1
<i>Griseotyrannus aurantioatrocristatus</i> Tuquito Gris	Tucumán (El Sunchal), Santiago del Estero (PN Copo), Mendoza (Nacuñán y Telteca).	25,6	22-29	7
<i>Casiornis rufa</i> Burlisto Castaño	Jujuy (Arroyo Yuto).	25,5	25,5	1
<i>Myiarchus tyrannulus</i> Burlisto Cola Castaña	Salta (Orán, Copo Quile y Santa Victoria Este), Tucumán (Reserva La Florida), Santiago del Estero (PN Copo), Corrientes (Ea. La Blanca, Santo Tomé), Formosa (Riacho Monte Lindo-Cmte. Fontana), Mendoza (Telteca).	27,86	25,5-33	29
<i>Myiarchus tuberculifer</i> Burlisto Corona Negra	Jujuy (Tiraxi), Salta (Piquirenda Viejo), Tucumán (El Indio, Parque Biológico Sierra de San Javier, Cuesta de Chasquivil y Cochuna), Catamarca (La Banderita).	22,88	20-28	9
<i>Myiarchus swainsoni</i> Burlisto Pico Canela	Catamarca (Quebrada del Durazno, Paclín), Córdoba (Icho Cruz), Mendoza (Nacuñán y Telteca).	31,02	29-34	25
<i>Contopus cinereus</i> (Foto 5) Burlisto Chico	Salta (El Potrerillo, ruta 6 camino a Pampa Grande).	10		2
<i>Lathrotriccus euleri argentinus</i> (Foto 6) Mosqueta Parda (Capllonch y Zelaya 2006)	Salta (El Potrerillo; Copo Quile), Jujuy (Laguna La Brea, Dique La Ciénaga), Tucumán (Reservas Horco Molle, Santa Ana, La Florida, Cochuna y Aguas Chiquitas, Parque Biológico Sierra de San Javier, El Indio, Río Chico, Monteagudo), Catamarca (Quebrada del Durazno, Concepción de Capayán).	10,79	9-13	91
<i>Sublegatus modestus</i> Suirirí Pico Corto	Salta (Cachi, Santa Victoria Este), Jujuy (Volcán, San Juan de Dios, Finca La Reserva), San Juan (Posta El Balde, Jáchal), Santiago del Estero (PN Copo, Pozo Hondo), Mendoza (Nacuñán y Telteca).	11,77	10-12	33
<i>Suiriri suiriri</i> Suirirí Común	Salta (Campo Grande, Los Colorados, Santa Victoria Este), Santiago del Estero (Pozo Hondo), Chaco (Machagai).	12	10-13,5	11
<i>Myiotheretes striaticollis</i> Birro Grande	Tucumán (La Ciénaga).	45		1
<i>Pyrrhomyias cinnamomea</i> Birro Chico	Tucumán (El Indio, Cuesta de Chasquivil).	11	11	4
<i>Tolmomyias sulphurescens grisescens</i> Picochato Grande	Formosa (Riacho Monte Lindo-Cmte. Fontana).	15	15	2
<i>Tolmomyias sulphurescens pallescens</i> Picochato Grande	Jujuy (Laguna La Brea y PN Calilegua), Salta (Piquirenda Viejo) y Tucumán (San Ignacio, Ticucho, Reserva La Florida, Taficillo y Parque Biológico Sierra de San Javier).	17,70	15-19	17
<i>Tolmomyias sulphurescens sulphurescens</i> Picochato Grande	Corrientes (Ea. La Blanca – Santo Tomé).	10		1
<i>Myiophobus fasciatus</i> Mosqueta Estriada	Jujuy (Volcán, Dique La Ciénaga), Salta (Copo Quile y Santa Victoria Este), Tucumán (Horco Molle, Colombres, Monteagudo y El Sunchal), Santiago del Estero (Pozo Hondo, San Pedro de Guasayan).	10,54	9-13	24
<i>Pseudocolopteryx acutipennis</i> Doradito Oliváceo	Jujuy (La Quiaca) y Tucumán (Dique La Angostura).	6,33	7-10	6
<i>Pseudocolopteryx flaviventris</i> Doradito Común	Salta (Santa Victoria Este).	10		1

CONTINÚA TYRANNIDAE

<i>Todirostrum plumbeiceps viridiceps</i> Mosqueta Cabeza Canela	Jujuy (Laguna La Brea, PN Calilegua), Salta (Piquirenda Vieja, PN El Rey, El Oculto) y Tucumán (El Sunchal).	5,76	4-6,5	13
<i>Todirostrum plumbeiceps plumbeiceps</i> Mosqueta Cabeza Canela	Corrientes (Ea. La Blanca-Santo Tomé)	6		1
<i>Hemitricus margaritaceiventer</i> Mosqueta Ojo Dorado	Formosa (Riacho Pilagá-Cmte. Fontana).	13,66	13-15	3
<i>Hemitricus m. margaritaceiventer</i> Mosqueta Ojo Dorado	Tucumán (Parque Biológico Sierra de San Javier, Piedras Coloradas, Ticucho, Aguas Saladas, Horco Molle, Piedra Tendida, Chulcas, Puente de la Ruta 9 y Río Tapia y El Sunchal).	7,62	5-10	30
<i>Phylloscartes ventralis tucumanus</i> Mosqueta Común	Jujuy (PN Calilegua), Salta (Piquirenda Viejo, Copo Quile y PN El Rey), Tucumán (Piedras Coloradas, Playa Larga, Las Juntas, El Indio, Cochuna, Parque Biológico Sierra de San Javier, Piedra Tendida, El Sunchal, Reservas La Florida, Aguas Chiquitas y Horco Molle, Taficillo, Chulcas y Dique Escaba) y Catamarca (Quebrada del Durazno-Paclín).	8,00	6-11	137
<i>Euscarthmus meloryphus</i> Barullero	Santiago del Estero (San Pedro de Guasayán).	8,5	7-10	2
<i>Pyrocephalus rubinus</i> Churrinche	Jujuy (Volcán), Tucumán (Aguas Saladas), Santiago del Estero (Pozo Hondo) y Mendoza (Ñacuñán y Telteca).	12,64	11-15	14
<i>Serpophaga nigricans</i> Piojito Gris	Salta (Potrerillo), Tucumán (Parque Biológico Sierra de San Javier, Ticucho, Chulcas, San Ignacio, Arroyo Mista y Puente Río Tapia y Ruta 9).	6,92	5-9	14
<i>Inezia inornata</i> Piojito Picudo	Jujuy (Dique La Ciénaga).	11		1
<i>Anairetes flavirostris</i> Cachudito Pico Amarillo	Jujuy (Volcán, Patacal y Fraile Pintado), Tucumán (El Pichao, El Remate-Amaicha del Valle, El Bañado-Amaicha), Catamarca (Amanao), Mendoza (Cuenca Aluvional Piloto, Nacuñán) y San Juan (Posta El Balde-Jáchal).	5,91	5-7	31
<i>Anairetes parulus patagonicus</i> Cachudito Pico Negro	Tucumán (Bañados de Amaicha del Valle y El Infiernillo) y Mendoza (Telteca y Cuenca Aluvional Piloto).	6,41	5-9	6
<i>Serpophaga subcristata munda</i> Piojito Común	Jujuy (Volcán), Tucumán (Chulcas, El Sunchal, San Ignacio y El Bañado-Amaicha) y San Juan (Posta El Balde-Jáchal).	6,27	5-9	18
<i>Serpophaga nigricans</i> Piojito Gris	Salta (Potrerillo), Tucumán (Parque Biológico Sierra de San Javier, Reserva La Florida, Ticucho, Puente ruta 9 y Río Tapia, Chulcas, San Ignacio y Arroyo Mista).	6,85	5-8,5	14
<i>Serpophaga griseicapilla</i> Piojito Trinador	Tucumán (Reserva La Florida) y Salta (Santa Victoria Este).	6,4	6-7	5
<i>Mecocerculus leucophrys</i> Piojito Gargantilla	Salta (Piquirenda Viejo, PN El Rey, El Oculto y Potrerillos), Tucumán (Cochuna, Taficillo, Horco Molle, El Indio, Parque Biológico Sierra de San Javier, Chulcas, La Ciénaga y Cuesta de Chasquivil) y Catamarca (Concepción de Capayán y Las Estancias).	9,61	8-12	87

CONTINÚA TYRANNIDAE



<i>Mecocerculus hellmayri</i> Piojito de los Pinos	Tucumán (Pinar Velárdez-Parque Biológico Sierra de San Javier).	8,37	8-9	4
<i>Elaenia obscura</i> Fiofio Oscuro	Jujuy (Vinalito), Salta (Valle Morado), Tucumán (Playa Larga, Parque Biológico Sierra de San Javier, Piedras Coloradas, Cochuna, El Indio y Reserva La Florida) y Catamarca (La Banderita).	24,66	18-29	44
<i>Elaenia chiriquensis</i> Fiofio Belicoso	Corrientes (Ea. La Blanca-Santo Tomé).	15		1
<i>Elaenia parvirostris</i> Fiofio Pico Corto	Jujuy (Río Ledesma), Salta (Potrerillo y Campo Durán), Tucumán (Reservas La Florida y Horco Molle, San Ignacio, Los Puestos, Parque Biológico Sierra de San Javier, Monteagudo, Ticucho, Columbres y El Sunchal), Catamarca (Quebrada del Durazno-Paclín) y Santiago del Estero (PN Copo, Pozo Hondo y San Pedro de Guasayán).	14,69	12-18	93
<i>Elaenia albiceps albiceps</i> Fiofio Silbón	Jujuy (Volcán), Tucumán (Reservas Horco Molle y Santa Ana, Monteagudo, Parque Biológico Sierra de San Javier, Taficillo, Ticucho y Cuesta de Chasquivil), Santiago del Estero (PN Copo) y Catamarca (La Banderita).	15,66	13-21	24
<i>Elaenia albiceps chilensis</i> Fiofio Silbón	Mendoza (Telteca y Nacuñán), San Juan (Posta El Balde-Jáchal) y Neuquén (San Martín de los Andes).	15,42	11-20	58
<i>Elaenia strepera</i> Fiofio Plomizo	Tucumán (Playa Larga, Piedras Coloradas, Piedras Tendidas, Cuesta de Chasquivil).	19,37	17-21	8
<i>Elaenia spectabilis</i> Fiofio Grande	Formosa (PN Río Pilcomayo) y Corrientes (Ea. La Blanca-Santo Tomé).	29,99	25-35	8
<i>Leptopogon amaurocephalus</i> Mosqueta Corona Parda	Tucumán (Reserva La Florida) y Corrientes (Ea. La Blanca- Santo Tomé).	12	10-14	3
<i>Camptostoma obsoletum bolivianum</i> Piojito Silbón	Salta (Santa Victoria Este), Tucumán (Monteagudo, Ticucho, El Bañado-Amaicha y Reserva Aguas Chiquitas)	8,05	6-9,5	10
<i>Camptostoma obsoletum obsoletum</i> Piojito Silbón	Mendoza (Telteca) y Córdoba (Icho Cruz)	7,5	6-9	2
<i>Phyllomyias burmeisteri</i> Mosqueta Pico Curvo	Tucumán (Parque Biológico Sierra de San Javier)	12,5	12-13	2
<i>Phyllomyias sclateri</i> Mosqueta Corona Gris	Salta (PN El Rey) y Tucumán (Reservas Horco Molle y La Florida, Parque Biológico Sierra de San Javier, Piedra Tendida, Cuesta de Chasquivil y Playa Larga).	11,20	9-15	12



**Foto 1.** Choca amarilla *Dysithamnus mentalis*, hembra a la izquierda y macho a la derecha. Estancia La Blanca, Santo Tomé, Corrientes, 17 de abril de 2004 (Capllonch et al., 2005). Foto Patricia Capllonch.



**Foto 2.** Chupadientes *Conopophaga lineada*. Estancia La Blanca, Santo Tomé, Corrientes, 18 de abril de 2004 (Capllonch et al., 2005). Foto Patricia Capllonch.



**Foto 3.** Gaucho Serrano *Agriornis m. montana* de Tafí del Valle, Tucumán, 25 de mayo de 2009. Foto Rodrigo Aráoz.





**Foto 4.** Gaucho Serrano *Agriornis m. montana* de Tafí del Valle, Tucumán, 25 de mayo de 2009. Foto Rodrigo Aráoz.



**Foto 5.** Burlisto Chico *Contopus cinereus* de El Jardín, Salta, 22 de diciembre de 2005. Foto Patricia Capllonch.



**Foto 6.** Mosqueta Parda *Lathrotriccus euleri argentinus* de la Reserva Provincial Aguas Chiquitas, Tucumán, 12 de noviembre de 1992. Foto Patricia Capllonch.

### AGRADECIMIENTOS

A Rodrigo Aráoz por sus fotos. A los numerosos anilladores y ayudantes de campo que contribuyeron. A los miembros del CENAA que trabajaron en el banco de datos. A Liliana Ciuffo por invitarnos a Bajo de Vélez, San Luis.

### BIBLIOGRAFÍA

- CAPLLONCH, P, LOBO, R, ORTIZ, D y OVEJERO, R. 2005. La avifauna de la selva de galería en el noreste de Corrientes, Argentina: biodiversidad, patrones de distribución y migración. *Insugeo, Miscelánea*, 14:483-498.
- CAPLLONCH, P y ORTIZ, D. 2006. Los Furnaroides de Tucumán, su hábitat y su distribución. *Acta zoológica lilloana* 50 (1-2): 85-96.
- CAPLLONCH, P. y ZELAYA, P. 2006. Sobre la distribución y migración de la Mosqueta parda (*Lathrotriccus euleri argentinus*) en Sudamérica. *Ornitología Neotropical*. 17: 501–513.
- DE LA PEÑA, M. 1999. *Aves Argentinas lista y distribución*. L.O.L.A., Buenos Aires
- OLROG, C. 1979. *Nueva lista de la avifauna Argentina*. *Opera Lilloana*, 28: 324.