

## PORTARIA IBAMA Nº 1.522, DE 19 DE DEZEMBRO 1989

(Já retificada pela Portaria IBAMA nº 221/90)

**Dispõe sobre a Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção.**

**O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, publicada no Diário Oficial da União, de 23 de fevereiro de 1989,

### RESOLVE:

Art. 1º . Como Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção, a seguinte relação:

#### 1.0 - MAMMALIA

##### 1.1 - PRIMATES

\* *Alouatta belzebul belzebul* (Linnaeus, 1766). Família CEBIDAE. Nome popular: guariba.

\* *Alouatta fusca* (E. Geoffroy, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: barbado, guariba.

\* *Ateles belzebuth* (E. Geoffroy, 1806). Família CEBIDAE. Nome popular: macaco-aranha.

\* *Ateles paniscus* (Linnaeus, 1758). Família CEBIDAE. Nome popular: macaco-aranha.

\* *Brachyteles arachnoides* (E. Geoffroy, 1806). Família CEBIDAE. Nome popular: muriqui, mono-carvoeiro.

\* *Cacajao calvus* (L. Geoffroy, 1847). Família CEBIDAE. Nome popular: uacari.

\* *Cacajao melanocephalus* (Humboldt, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: uacari-preto.

- \* *Callicebus personatus* (E. Geoffroy, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: guigó, sauá.
  
- \* *Callimico goeldii* (Thomas, 1904). Família CALLIMICONIDAE. Nome popular: calimico.
  
- \* *Callithrix argentata leucippe* (Thomas, 1922). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui.
  
  
- \* *Callithrix aurita* (Hulboldt, 1812). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui-de-serra-escuro.
  
- \* *Callithrix flaviceps* (Thomas, 1903). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui-da-serra.
  
- \* *Callithrix humeralifer* (E. Geoffroy, 1812). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui.
  
- \* *Cebus apella xanthosternos* (Wied, 1820). Família CEBIDAE. Nome popular: macaco-prego-do-peito-amarelo.
  
- \* *Chiropotes albinasus* (I. Geoffroy & Daville, 1848). Família CEBIDAE. Nome popular: cuxiu-de-nariz-branco.
  
- \* *Chiropotes satanas utahicki* (Herskovitz, 1985). Família CEBIDAE. Nome popular: cuxiu.
  
- \* *Chiropotes satanas satanas* (Hoffmannesegg, 1807). Família CEBIDAE. Nome popular: cuxiu.
  
- \* *Lagothrix lagotricha* (Humboldt, 1812). Família CEBIDAE. Nome popular: barrigudo.
  
- \* *Leontopithecus chrysomelas* (Kubl, 1620). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: mico-leão-de-cara-dourada.
  
- \* *Leontopithecus chrysopygus* (Myan, 1823). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: mico-leão-preto.
  
- \* *Leontopithecus rosalia* (Linnaeus, 1766). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: mico-leão-dourado, sagui-piranga.

\* *Pithecia albicans* (Gray, 1860). Família CEBIDAE. Nome popular: parauacú-branco.

\* *Saguinus bicolor* (Spix, 1823). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: soim-de-coleira.

\* *Saguinus imperator* (Goeldi, 1907). Família CALLITRICHIDAE. Nome popular: sagui-bigodeiro.

\* *Saimiri vanzolinii* (Ayres, 1985). Família CEBIDAE. Nome popular: mico-de-cheiro.

## 1.2 - CARNIVORA

\* *Atelicynus microtis* (Sclater, 1883). Família CANIDAE. Nome popular: cachorro-do-mato-de-orelha-curta.

\* *Chrysocyon brachyurus* (Illiger, 1815). Família CANIDAE. Nome popular: lobo-guará, lobo-vermelho.

\* *Felis colocolo* (Molina, 1810). Família FELIDAE. Nome popular: gato-palheiro.

\* *Felis concolor* (Linnaeus, 1771). Família FELIDAE. Nome popular: sussuarana, onça-parda.

\* *Felis geoffroyi* (d'Orbigny & Gervais, 1844). Família FELIDAE. Nome popular: gato-do-mato.

\* *Felis pardalis* (Linnaeus, 1758). Família FELIDAE. Nome popular: jaguatirica.

\* *Felis tigrina* (Schreber, 1775). Família FELIDAE. Nome popular: gato-do-

mato.

\* *Felis wiedii* (Schinz, 1921). Família FELIDAE. Nome popular: gato-do-mato, maracajá.

\* *Grammogale africana* (Demarest, 1818). Família MUSTELIDAE. Nome popular: doninha-amazônica.

\* *Lutra longicaudis* (Olfers, 1818). Família MUSTELIDAE. Nome popular: lontra.

\* *Panthera onça* (Linnaeus, 1758). Família FELIDAE. Nome popular: onça-pintada, pintada, canguçu, onça-canguçu, jaguar-canguçu.

\* *Pteronura brasiliensis* (Gmelin, 1788). Família MUSTELIDAE. Nome popular: ariranha.

\* *Speothos venaticus* (Lund, 1842). Família CANIDAE. Nome popular: cachorro-do-mato-vinagre.

### **1. 3 - XENARTHRA**

\* *Bradypus torquatus* (Desmarest, 1816). Família BRADYPODIDAE. Nome popular: preguiça-de-coleira.

\* *Mymercophaga tridactyla* (Linnaeus, 1758). Família MYMERCOPHAGIDAE. Nome popular: tamanduá-bandeira.

\* *Priodontes maximus* (Kerr, 1792). Família DASYPODIDAE. Nome popular: tatu-canastra, tatuçu.

\* *Tolypeutes tricinctus* (Linnaeus, 1758). Família DASYPODIDAE. Nome popular: tatu-bola, tatuapara.

### **1. 4 - SIRENIA**

\* *Trichechus inunguis* (Natterer, 1883). Família TRICHECHIDAE. Nome popular: peixe-boi, guarabá.

\* *Trichechus manatus* (Linnaeus, 1758). Família TRICHECHIDAE. Nome popular: peixe-boi, peixe-boi-marinho, manati.

### **1. 5 - CEATACEA**

\* *Eubalena australis* (Desmoulins, 1822). Família BALAENIDAE. Nome popular: baleia-franca, baleia-franca-austral.

\* *Megaptera novaeangliae* (Borowaki, 1781). Família BALAENOPTERIDAE. Nome popular: jubarte.

\* *Potonporia blainvillei* (Gervais & d'Orbigny, 1844). Família PONTOPORIDAE. Nome popular: toninho, boto-cachimbo.

## 1. 6 - RODENTIA

\* *Abrawayaomys ruschii* (Cunha & Cruz, 1979). Família CRICETIDAE.

\* *Chaetomys subspinosus* (Olfers, 1818). Família ERETHIZONTIDAE. Nome popular: ouriço-preto.

\* *Juscelinomys candango* (Moojen, 1965). Família CRICETIDAE.

\* *Kunsia tomentosus* (Lichtenstein, 1830). Família CRICETIDAE.

\* *Phaenomys ferrugineus* (Thomas, 1894). Família CRICETIDAE. Nome popular:

rato-do-mato-ferrugíneo.

\* *Rhagomys rufescens* (Thomas, 1886). Família CRICETIDAE. Nome popular: rato-do-mato-laranja.

## 1. 7. ARTIODACTYLA

\* *Blastocerus dichotomus* (Illiger, 1815). Família CERVIDAE. Nome popular: cervo-do-pantanal.

\* *Odocoileus virginianus* (Zimmermann, 1780). Família CERVIDAE. Nome popular: caribau.

\* *Ozotocerus bezoarticus* (Linnaeus, 1758). Família CERVIDAE. Nome popular: veado-campeiro.

## 2. 0 - AVES

### 2. 1 - TINAMIFORMES

\* *Crypturellus noctivagus* (Wied, 1820). Família TINAMIDAE. Nome popular: jão-do-sul, zabelê, juó.

\* *Nothura minor* (Spix, 1825). Família TINAMIDAE. Nome popular: codorna-mineira, codorna-buraqueira, buraqueira.

\* *Taoniscus nanus* (Tomminck, 1815). Família TINAMIDAE. Nome popular: codorna-buraqueira, perdigão, inhambú-carapé.

\* *Tinamus solitarius* (Vieillot, 1819). Família TINAMIDAE. Nome popular: macuco, macuca.

## **2. 2 - CICONIIFORMES**

\* *Eudocimus ruber* (Linnaeus, 1758). Família THRESKIORNITHIDAE. Nome popular: guará.

\* *Tigrisoma fasciatum fasciatum* (Such, 1825). Família ARDEIDAE. Nome popular: socó-boi.

## **2.3 - PHOENICOPTERIFORMES**

\* *Phoenicopterus ruber* (Linnaeus, 1758). Família PHOENICOPTERIDAE. Nome popular: ganso-do-norte, ganso-cor-de-rosa, maranhão, flamingo.

## **2. 4 - ANSERIFORMES**

\* *Mergus octosetaceus* (Vieillot, 1817). Família ANATIDAE. Nome popular: mergulhão, patão, pato-mergulhão.

## **2. 5 - FALCONIFORMES**

\* *Accipiter poliogaster* (Temminck, 1824). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: tauató-pintado, gavião-pombo-grande.

\* *Falco deiroleucus* (Temminck, 1825). Família FALCONIDAE. Nome popular: falcão-de-peito-vermelho.

\* *Harpia harpyja* (Linnaeus, 1758). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-real, gavião-de-penacho, uiraçu-verdadeiro, cutucurim, harpia.

\* *Harpyhaliaetus coronatus* (Vieillot, 1817). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: águia-cinzenta.

\* *Leucopternis lacemulata* (Temminck, 1827). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-pomba.

\* *Leucopternis polionota* (Kaup, 1847). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-pomba.

\* *Morphnus guianensis* (Daudin, 1800). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-de-penacho, uiraçu-falso.

\* *Spizastur melanoleucus* (Vieillot, 1816). Família ACCIPITRIDAE. Nome popular: gavião-preto, apacamim, gavião-pato.

## 2. 6 - GALLIFORMES

\* *Crax blumberbachii* (Spix, 1825). Família CRACIDAE. Nome popular: mutum-do-sudeste.

\* *Crax fasciolata pinima* (Pelzein, 1870). Família CRACIDAE. Nome popular: Mutum-de-penacho, mutum-pinima.

\* *Mitu mitu mitu* (Linnaeus, 1766). Família CRACIDAE. Nome popular: mutum-cavalo, mutum-êê, mutum-da-várzea, mutum-piry, mutum-do-nordeste.

\* *Penelope jacucaca* (Spix, 1825). Família CRACIDAE. Nome popular: jacucaca.

\* *Penelope obscura bronzina* (Hellmayr, 1914). Família CRACIDAE. Nome popular: jacoguossu, jacuaçu.

\* *Penelope ochrogaster* (Pelzein, 1870). Família CRACIDAE. Nome popular: jacu-de-barriga-castanha.

\* *Pepile jacutinga* (Spix, 1825). Família CRACIDAE. Nome popular: jacutinga.

## 2. 7 - CHARADRIIFORMES

\* *Numenius borealis* (Forator, 1772). Família SCOLOPACIDAE. Nome popular: maçarico-esquimó.

## 2. 8 - COLUMBIFORMES

\* *Claravis godefrida* (Temminck, 1811). Família COLUMBIDAE. Nome popular: pararu, pomba-de-espelho.

\* *Columbina cyanopis* (Pelzeln, 1870). Família COLUMBIDAE. Nome popular: rolinha-de-planalto, rolinha-do-Brasil-central.

## 2. 9 - PSITTACIFORMES

\* *Amazona brasiliensis* (Linnaeus, 1758). Família PSITTACIDAE. Nome popular: papagaio-de-cara-roxa, chauá.

\* *Amazona pretrei* (Temminck, 1830). Família PSITTACIDAE. Nome popular: chorão, charão, papagaio-da-serra, serrano.

\* *Amazona rhodocorytha* (Salvatori, 1890). Família PSITTACIDAE. Nome popular: chauá-verdadeiro, jauá, acumatanga, camutanga.

\* *Amazona vinacea* (Kuhl, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: papagaio-de-peito-roxo, papagaio-caboclo, papagaio-curraleiro, jurueba.

\* *Anodorhynchus glaucus*(\*) (Vieillot, 1816). Família PSITTACIDAE. Nome popular: arara-azul-pequena.

\* *Anodorhynchus hyacinthinus* (Lalham, 1720). Família PSITTACIDAE. Nome popular: arara-azul-de-lear-grande, araraúna.

\* *Anodorhynchus leari* (Bonaparte, 1857). Família PSITTACIDAE. Nome popular: arara-azul-de-lear.

\* *Aratinga guarouba* (Gmelin, 1877). Família PSITTACIDAE. Nome popular: guaruba, ararajuba.



\* *Cyanopsitta spixii* (Wagler, 1832). Família PSITTACIDAE. Nome popular: ararinha-azul.

\* *Pyrihura cruentata* (Wied, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: tiriba, fura-mato, cara-suja.

\* *Pyrihura leucotis* (Kuhl, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: fura-pato, tiriba-de-orelha-branca.

\* *Touit melanonota* (Wied, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: apuim-de-cauda-vermelha.

\* *Touit surda* (Kuhl, 1820). Família PSITTACIDAE. Nome popular: apuim-de-cauda-amarela.

\* *Trichlaria malachitacea* (Spix, 1824). Família PSITTACIDAE. Nome popular: sabiá-cica, araquaiava.

## 2. 10. CUCULIFORME

\* *Neomorphus geoffroyi dulcis* (Snethlage, 1927). Família CUCULIDAE. Nome popular: aracuão, jacu-molambo, jucu-porco, jacu-verde, jacu-taquara.

\* *Neomorphus geoffroyi geoffroyi* (Temminck, 1820). Família CUCULIDAE. Nome popular: jacu-estalo.

## 2. 11 - CAPRIMULGIFORMES

\* *Caprimulgos candicans* (Pelzeln, 1867). Família CAPRIMULGIDAE. Nome popular: bacurau, rato-branco.

\* *Eleothreptus anomalus* (Gould, 1837). Família CAPRIMULGIDAE. Nome popular: curiangu-do-banhado.

\* *Macropsalis creagra* (Bonaparte, 1850). Família CAPRIMULGIDAE. Nome popular: bacurau, tesoura-gigante.

\* *Nyctibius leucopterus* (Wied, 1821). Família NYCTIBIIDAE. Nome popular: mãe-da-lua.

## 2. 12 - APODIFORMES

\* *Phaethomis superciliosus margaretae* (Ruschi, 1972). Família TROCHILIDAE. Nome popular: besourão-de-rabo-branco.

\* *Ranphodon dohrnii* (Boucier & Mulsant, 1852). Família TROCHILIDAE. Nome popular: balança-rabo-canela, beila-flor-de-Dohm, besourão.

## 2. 13 - PICIFORMES

\* *Campephylus robustus* (Lichtenstein, 1819). Família PICIDAE. Nome popular: pica-pau-rei.

\* *Celeus torquatus tinnunculus* (Wagler, 1829). Família PICIDAE. Nome popular: pica-pau-de-coleira.

\* *Dryocopus galeatus* (Temminck, 1822). Família PICIDAE. Nome popular: pica-pau-de-cara-amarela.

\* *Jacamaralcyon tridactyla* (Vieillot, 1817). Família GALBULIDAE. Nome popular: cuitelão, bicudo, violeiro.

## 2. 14 - PASSERIFORMES

\* *Amaurospiza moesta* (Hartlaub, 1853). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: negrinho-do-mato.

\* *Alecrituros risoria* (Vieillot, 1824). Família TYRANNIDAE. Nome popular: galito, tesoura-de-campo, bandeira-do-campo.

\* *Anthus nattereri* (Sclater, 1878). Família MOTTACILLIDAE. Nome popular: caminheiro-grande.

\* *Calyptura cristata*(\*) (Vieillot, 1818). Família CONTINGIDAE. Nome popular: tietê-de-coroa.

\* *Carduelis yarrellii* (Audubon, 1839). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: coroinha, pintassilgo-do-nordeste.

\* *Carpornis melanocephalus* (Wied, 1820). Família CONTINGIDAE. Nome popular: sabiá-pimenta.

\* *Cercomacra carbonaria* (Sclater & Salvin, 1873). Família FORMICARLIDAE.

\* *Clibanornis dendrocolaptoides* (Pelzeln, 1859). Família FURNARIIDAE.

\* *Conothraupis mesoleuca* (Berlioz, 1939). Família ENERIZIDAE.

\* *Cotinga maculata* (Müller, 1776). Família COTINGIDAE. Nome popular: crejoá, quiruá, catingá.

\* *Culioivora caudacuta* (Vieillot, 1818). Família TYRANNIDAE. Nome popular: papa-moscas-do-campo.

\* *Curaeus forbesi* (Sclater, 1886). Família ICTERIDAE. Nome popular: anumará.

\* *Daonis nigripes* (Pelzeln, 1856). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: saí-de-pernas-pretas.

\* *Formicivora erythronotos* (Hartlaub, 1852). Família FORMICARIIDAE.

\* *Formicivora iheringi* (Hellmayr, 1909). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: papa-formiga.

\* *Gubernatrix cristata* (Vieillot, 1817). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: cardeal-amarelo.

\* *Hemitriccus aenigma* (Zimmer, 1940). Família TYRANNIDAE.

\* *Hemitriccus furcatus* (Lafresnaye, 1846). Família TYRANNIDAE. Nome popular: papa-moscas-estrela.

\* *Hemitriccus kaempferi* (Zimmer, 1953). Família TYRANNIDAE.

\* *Herpsilochmus pectoralis* (Sclater, 1857). Família FORMICARIIDAE.

\* *Lodopleuta pipra* (Lesson, 1831). Família COTINGIDAE. Nome popular: anambezinho.

\* *Lipaugus lanioides* (Lesson, 1844). Família COTINGIDAE. Nome popular: sabiá-da-mata-virgem, sabiá-do-mato-grosso, sabiá-da-serra, virussu, tropeiro-da-serra.

\* *Megaxenops parnaguae* (Reiser, 1905). Família FURNARIIDAE. Nome popular: bico-virão-de-catinga.

\* *Merulaxis stresemanni* (Sick, 1960). Família RHINOCHYPTIDAE.

\* *Myadestes leucogenys* (Cabanis, 1851). Família TURDIDAE. Nome popular: sabiá-castanho.

\* *Mirmeciza ruficauda* (Wied, 1831). Família FORMICARIIDAE.

\* *Mirmeciza stictothorax* (Todd, 1927). Família FORMICARIIDAE.

\* *Mymotherula minor* (Salvatoti, 1867). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: choquinha.

\* *Neimosia rourei* (Cabanis, 1870). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: saira-apunhalada.

\* *Oryzorobus maximiliani* (Cabanis, 1851). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: bicudo, bicudo-verdadeiro, bicudo-preto.

\* *Phibaiura flavirostris* (Vieillot, 1816). Família COTINGIDAE. Nome popular: tesourinha.

\* *Phylloscartes ceciliae* (Teixeira, 1987). Família TYRANNIDAE.

\* *Phylloscartes roquettei* (Shethiage, 1928). Família TYRANNIDAE.

\* *Philydor novaesi* (Teixeira & Gonzaga, 1983). Família FURNARIIDAE.

\* *Piprites pileatus* (Temminck, 1822). Família COTINGIDAE. Nome popular: cameleirinho-de-chapéu-preto.

\* *Platyrinchus leucoryphus* (Wied, 1831). Família TYRANNIDAE. Nome popular: patinho-gigante.

\* *Poecilurus kollari* (Pelzein, 1856). Família FURNARIIDAE.

\* *Poospiza cinerea* (Bonaparte, 1850). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: andorinha-do-oco-do-pau, capacetinho-do-oco-do-pau.

\* *Procnias averano averano* (Illermann, 1783). Família COTINGIDAE. Nome popular: araponga-do-nordeste, guiraponga.

\* *Pyriglena atra* (Swainson, 1625). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: papa-formigas.

\* *Pyroderus scutatus scutatus* (Shaw, 1792). Família COTINGIDAE. Nome popular: pavoá, pavão, pavó, pavão-do-mato.

\* *Rhopornis ardesiaca* (Wied, 1831). Família FORMICARIIDAE. Nome popular: papa-formigas-de-gravatá.

\* *Scytalopus novacapitalis* (Sick, 1958). Família RHINOCRYPTIDAE.

\* *Sporophila falcirostris* (Temminck, 1820). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: papa-capim, cigarra-verdadeira.

\* *Sporophila frontalis* (Verreaux, 1869). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: pichochó, papa-arroz.

\* *Sporophila palustris* (Barrows, 1883). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: caboclinho-de-papo-branco.

\* *Sturnella defilipii* (Bonaparte, 1851). Família ICTERIDAE. Nome popular: peito-vermelho-grande.

\* *Synallaxis infusata* (Pinto, 1950). Família FURNARIIDAE.

\* *Tangara fastuosa* (Lesson 1831). Família EMBERIZIDAE. Nome popular: pintor-verdadeiro.

\* *Terenura sicki* (Teixeira & Gonzaga, 1983). Família FORMICARIIDAE.

\* *Thamnomanes lumbeus* (Wied, 1831). Família FORMICARIIDAE.

\* *Thripophaga macroura* (Wied, 1821). Família FURNARIIDAE. Nome popular: rabo-amarelo.

\* *Xanthopsar flavus* (Gmelin, 1788). Família ICTERIDAE. Nome popular: pássaro-preto-de-haste-amarela.

\* *Xiphocolaptes falcirostris* (Spix, 1824). Família DENDROCOLAPTIDAE. Nome popular: arapaçu-do-nordeste.

\* *Xiphocolaptes franciscanus* (Sneethlage, 1927). Família DENDROCOLAPTIDAE. Nome popular: arapaçu.

\* *Xipholena atropurpurea* (Wied, 1820). Família COTINGIDAE. Nome popular: anambé-de-asa-branca, cotinga, ferrugem.

### 3. 0 - REPTILIA

#### 3. 1 - CHELONIA

\* *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758). Família CHELONIDAE. Nome popular: cabeçuda, tartaruga-meio-pente.

\* *Chelonia mydas* (Linnaeus, 1758). Família CHELONIDAE. Nome popular: tartaruga-verde.

\* *Dermochelys coriacea* (Linnaeus, 1758). Família DERMOCHELYDAE. Nome popular: tartaruga-de-couro, tartaruga-gigante, tartaruga-de-pele.

\* *Eretmochelys imbricata* (Linnaeus, 1766). Família CHELONIDAE. Nome popular: tartaruga-de-pente.

\* *Lepidochelys olivacea* (Enscholtz, 1829). Família CHELONIDAE.

\* *Phrynops hoguei* (Mertens, 1957). Família CHELONIDAE.

#### 3. 2 - SQUAMATA

\* *Lachesis muta rhombeata* (Wied, 1825). Família VIPERIDAE. Nome popular: surucu-pico-do-jaca, surucucu. (((verificar nome correto)))

### 3. 3 - CROCODILIA

\* *Caiman latirostris* (Daudin, 1802). Família CROCODILIDAE. Nome popular: jacaré-de-papo-amarelo.

\* *Melanosuchus niger* (Spix, 1825). Família CROCODILIDAE. Nome popular: jacaré-áçu.

### 4. 0 - AMPHIBIA

\* *Paratelmatobius gaiageae* (Cochran, 1938). Família LEPTODACTYLIDAE.

### 5. 0 - INSECTA

#### 5. 1 - LEPIDOPTERA - Borboleta

\* *Dasyophthalma vertebralis*(\*) (Butler, 1969). Família NYMPHALIDAE.

\* *Eresia orysice*(\*) (Geyer, 1832). Família NYMPHALIDAE.

\* *Eurytides iphitas*(\*) (Hubner, 1821). Família PAPILIONIDAE.

\* *Eurytides lysithous harrisianus* (Swainson, 1822). Família NYMPHALIDAE.

\* *Eutresis hypereia imeriensis* (Brown, 1977). Família NYMPHALIDAE.

\* *Heliconius nattereei* (Felder&Felder, 1865). Família NYMPHALIDAE.

\* *Hyalyris fiammctta*(\*) (Hewitson, 1852). Família NYMPHALIDAE.

\* *Hyalyris leptalina leptalina*(\*) (Felder & Felder, 1865). Família NYMPHALIDAE.

\* *Hypoleria fallens* (Haensch, 1905). Família NYMPHALIDAE.

\* *Hypoleria mulviana* (D'Almeida, 1958). Família NYMPHALIDAE.

- \* *Hypothesis mayl* (D'Almeida, 1945). Família NYMPHALIDAE.
- \* *Joiceya praeclara* (Talbot, 1928). Família LICAENIDAE.
- \* *Mechanitis bipuncta* (Forbes, 1948). Família NYMPHALIDAE.
- \* *Melinaea mnasias* (Hewitson, 1855). Família NYMPHALIDAE.
- \* *Huschoneura methymna* (Godart, 1819). Família PIERIDAE.
- \* *Napeogenes cyrianassa xanthone* (Bates, 1862). Família NYMPHALIDAE.
- \* *Orobrossolis orhamentalis* (Stichel, 1906). Família NYMPHALIDAE.
- \* *Papilio himeros himeros* (Hopffer, 1866). Família PAPILIONIDAE.
- \* *Papilio himeros baia* (Rothschild & Jordan, 1906). Família PAPILIONIDAE.
- \* *Papilio zagreus zagreus* (Doubleday, 1847). Família PAPILIONIDAE.
- \* *Papilio zagreus neyi* (Niepelt, 1909). Família PAPILIONIDAE.
- \* *Papilio zagreus bedoci* (LeCerf, 1925). Família PAPILIONIDAE.
- \* *Parides asceanius* (Cramer, 1775). Família PAPILIONIDAE.
- \* *Parides lysander mattogrossensis* (Talbot, 1928). Família PAPILIONIDAE.
- \* *Perrhybris flava* (Oberthur, 1895). Família PIERIDAE.
- \* *Scada Karschina delicata* (Talbot, 1932). Família NYMPHALIDAE.

## 5. 2 - ODONATA - Libélula



\* *Leptagrion dardanoi* (Santos, 1968). Família COENAGRIONIDAE.

\* *Leptagrion siqueirai* (Santos, 1968). Família COENAGRIONIDAE.

\* *Mecistogaster asticta* (Selys, 1860). Família PSEUDOSTIGMATIDAE.

\* *Mecistogaster pronoti*(\*) (Sjoestedl, 1918). Família PSEUDOSTIGMATIDAE.

## **6. 0 - ONYCHOPHORA**

\* *Peripatus acacioi* (Marcus & Marcus, 1955). Família PERIPATIDAE.

## **7. 0 - CNIDARIA**

\* *Millepora nitidae* (Verreill, 1868). Família MILLEPORIDAE. Nome popular: coral-de-fogo.

### **(\*) Espécies provavelmente extintas.**

Art. 2º . Os animais constantes desta relação ficam protegidos de modo integral, de acordo com o estabelecido na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967.

Art. 3º . A não observância da presente portaria constitui infração sujeitas as penalidades previstas na Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967 e na Lei nº 7.653 de 12 de fevereiro de 1988, sem prejuízo dos dispositivos previstos no Código Penal e demais leis vigentes, com as penalidades nelas consideradas.

Art. 4º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e revoga a Portaria IBDF nº 3.481, de 31 de maio de 1973, e todas as disposições em contrário.