






















# Vegetación de Lanzarote

## Vegetación actual

-  Restos de la vegetación potencial
-  Cinturón halófilo costero de roca árido: matorral de tomillo marino y uva de mar. Frankenio ericifoliae-Zygophylletum fontanesii
-  Comunidad de aguas salobres. Enteromorpha intestinalis-Ruppium maritimum
-  Saladares. Sarcocornium perennans; Zygochloa-Arthrocnemum macrostachyum; Frankenio capitatae-Suaeda verae; Comunidad de Zygochloa fontanesii y Suaeda mollis
-  Comunidades sabulícolas. Traganum moquinii sigmetum
-  Tabaibal dulce árido. Odontospermum intermedium-Euphorbia balsamifera
-  Ahulagar en lapillis. Comunidad de Launaea arborescens
-  Tabaibal dulce semiárido. Odontospermum intermedium-Euphorbia balsamifera aeniosum lancerottensis
-  Acebuchal. Convolvulus lopezocasi-Olea cerasiformis
-  Comunidades de cerrajas y berules infra-termomediterráneas. Aeniosum lancerottensis; Reichardia-Helichrysum gossypini
-  Complejos de vegetación y comunidades liquénicas de malpaíses recientes. Aeniosum lancerottensis, Cheilanthes pulchellae, líquenes, etc. Vegetación de sustitución: matorrales
-  Tabaibal amargo. Euphorbia regis-jubae s.l.
-  Matorral de romerillo y rama cría. Sparganium fimbriatae-Helianthemum canariense

-  Matorral de algoera y matabrusca, y matorral de algoera y brusquilla. Chenoleoideo-Salsolium vermiculatae; Chenoleoideo-Suaeda mollis
-  Matorral nitrófilo desértico: ahulagar con gramillos. Cenchro ciliaris-Launaeum arborescens
-  Matorral nitrófilo xérico: matorral de tojio y vinagrero. Lavandula pinnatae-Asteriscetum intermedium
-  Piteral y tuneral. Plantaciones de Agave spp. y Opuntia spp.
-  Cañaveral, juncal, etc. Comunidad de Arundo donax; Scirpus globiferi-Juncetum acuti \* Alternativamente potencial
-  Comunidad de venenarios. Polycarpo-Nicotianum glaucae
-  Vegetación de sustitución: herbazales
-  Cerrillal-panascal. Cenchro ciliaris-Hyparrhenium sinaicae
-  Herbazal efímero de costa. Reseda lanceolatae-Moricandion
-  Herbazales. Sisymbrium officinalis
-  Hinojal y altabacal. Bromo-Piptatherion miliacei
-  Herbazal nitrófilo. Chenopodium murale
-  Plantaciones forestales
-  Plantaciones de Pinus canariensis
-  Plantaciones de Pinus halepensis
-  Plantaciones mixtas de Pinus spp.
-  Plantaciones variadas

-  Palmeral antrópico
-  Medio urbano, rural (cultivos y caseríos), industrial, áreas de servicio y áreas sin vegetación aparente
-  Medio urbano, rural, industrial y áreas de servicio
-  Desprovisto de vegetación

## Vegetación potencial

-  Cinturón halófilo costero de roca árido. Frankenio ericifoliae-Zygochloa fontanesii geomicrosigmetum
-  Saladares: Sarcocornium perennans geomicrosigmetum y Zygochloa fontanesii-Arthrocnemum macrostachyum geomicrosigmetum. Comunidad de aguas salobres: Enteromorpha intestinalis-Ruppium maritimum
-  Comunidades sabulícolas. Traganum moquinii sigmetum
-  Mosaico de rocas y arenas. Dimelaenion radiatae y Traganum moquinii sigmetum
-  Tabaibal dulce árido. Odontospermum intermedium-Euphorbia balsamifera sigmetum typicum
-  Ahulagar en lapillis. Comunidad de Launaea arborescens
-  Tabaibal dulce semiárido. Odontospermum-Euphorbia balsamifera sigmetum aeniosum lancerottensis
-  Acebuchal. Convolvulus lopezocasi-Olea cerasiformis sigmetum
-  Vegetación hidrofítica (juncal). Scirpus globiferi-Juncetum acuti
-  Complejo de vegetación rupícola sobre malpaíses. Sonchus-Aeniosum, Cheilanthes pulchellae, líquenes, etc.
-  Vegetación escasa o nula