

*Université de Mons-Hainaut*  
*Laboratoire de zoologie*  
*Rapport d'étude dans le cadre du DEA de Biologie*

Liste Systématique  
des  
Hyménoptères Symphytes  
de France

par Thierry NOBLECOURT



*Office National des Forêts*  
*Cellule d'Etudes Entomologiques*  
*2 rue Charles Péguy*  
*F-11500 Quillan*  
*Tel : 00 (33) 4 68 20 06 75*  
*Fax : 00 (33) 4 68 20 92 21*  
*Thierry.Noblecourt@onf.fr*

Mai 2004 (mis à jour le 18 avril 2007)

Avant propos :

Nous proposons ci-après la liste des Hyménoptères Symphytes de France classés par ordre systématique. Ce travail est inédit car aucune liste des Symphytes de France n'a jamais été publiée.

Nous avons appliqué pour ce travail les travaux les plus récents, notamment ceux de notre collègue français Jean LACOURT qui a fortement fait évoluer la classification des Tenthredinidae.

Dans cette liste, nous avons éliminé les espèces anciennement citées (avant 1950) sans localités ni dates précises et qui n'ont pas été retrouvées dans les collections des différents musées français mais nous avons inclus les espèces nouvelles pour la France ou pour la science, dont les publications sont en cours ou sous presse.

Enfin, nous dressons en fin du document la liste des travaux sur lesquels nous nous sommes appuyés pour la réalisation de ce travail.

Référence à utiliser pour ce document :

**Noblecourt T., 2004.** *Liste systématique des Hyménoptères Symphytes de France.* Rapport d'étude dans le cadre du DEA de Biologie de l'Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie. Quillan: Office National des Forêts, Cellule d'études entomologiques. Mai 2004, 80 p



# Liste systématique et synonymique des Hyménoptères Symphytes de France

## CEPHOIDEA

### CEPHIDAE

#### Cephinae

##### *Calameuta* sp. Konow, 1896

=*Ephemerocephus* sp. Zhelochovtsev, 1968

=*Haplocephus* sp. Benson, 1935

=*Monoplopus* sp. Konow, 1896

##### *Calameuta filiformis* (Eversmann, 1847)

=*Calameuta amurensis* Gussakovskij, 1935

=*Calameuta rugosa* Dovnar-Zapolskij, 1931

=*Cephus analis* Stephens, 1835

=*Cephus arundinis* Giraud, 1963

=*Cephus elongata* Snellen van Vollenhoven, 1858

=*Cephus filiformis* Eversmann, 1847

=*Cephus grombczewskii* Jakovlev, 1892

=*Cephus grombtschewskii* Konow

=*Cephus infernalis* Dovnar-Zapolskij, 1926

=*Cephus marginatus* Kawall, 1864

=*Cephus quadricinctus* Dahlbom, 1835

=*Cephus turanicus* Dovnar-Zapolskij, 1931

=*Cephus vagabundus* Mocsary, 1886

##### *Calameuta haemorrhoidalis* (Fabricius, 1781)

=*Astatus analis* Klug, 1803

=*Astatus floralis* Klug, 1803

=*Astatus punctatus* Klug, 1803

=*Astatus variabilis* Mocsary, 1886

=*Astatus variabilis* var. *signifer* Konow, 1896

=*Calameuta festiva* Benson, 1954

=*Cephus atripes* Stephens, 1835

=*Cephus diversipes* Ghigi, 1915

=*Cephus gracilicornis* Konow, 1896

=*Cephus quadriguttatus* Costa, 1882

=*Cephus quadriguttulatus* Dalla Torre, 1894

=*Cephus speudotabidus* Kokujev, 1910

=*Tenthredo haemorrhoidalis* Fabricius, 1781

=*Trachelus pravei* Dovnar-Zapolskij, 1931

=*Trachelus syriacus* Pic, 1917

##### *Calameuta idolon* (Rossi, 1794)

=*Cephus bellieri* Sichel, 1860

=*Cephus mittrei* Guérin-Ménéville, 1844

=*Cephus variegatus* Stein, 1876

=*Ichneumon idolon* Rossi, 1794

=*Monoplopus apicicornis* Pic, 1916

##### *Calameuta pallipes* (Klug, 1803)

=*Astatus pallipes* Klug, 1803

=*Cephus cultrarius* Hartig, 1837

=*Cephus immaculatus* Stephens, 1835

=*Cephus pallidipes* Dalla Torre, 1894

- =*Cephus phthisicus* Fabricius, 1805
- =*Cephus pusillus* Stephens, 1935
- =*Tenthredo pygmaeus* Blanchard, 1849

#### *Calameuta pygmaea* (Poda, 1761)

- =*Cephus abdominalis* Latreille, 1816
- =*Cephus flaviventris* Guérin-Ménéville, 1844
- =*Cephus nigripennis* Sichel, 1860
- =*Cephus nigripennis* var. *aegyptiacus* Pic, 1918
- =*Cephus nigripennis* var. *delagrandei* Pic, 1920
- =*Cephus nigripennis* var.? *nigromaculatus* Pic, 1917
- =*Ichneumon pygmaea* Poda, 1761
- =*Tenthredo saltuum* Fabricius, 1775

#### *Cephus* sp. Latreille, 1802

- =*Peronistilomorphus* sp. Pic, 1916
- =*Peronistilus* sp. Ghigi, 1903
- =*Pseudocephus* sp. Dovnar-Zapolskij, 1931

#### *Cephus brachycercus* Thomson, 1871

- =*Cephus pallipes* Eversmann, 1847
- =*Cephus punctulatus* Konow, 1896
- =*Cephus punctulatus* var. *tibialis* Dovnar-Zapolskij, 1926

#### *Cephus infuscatus* Thomson, 1871

- =*Cephus andreae* Kirby, 1882

#### *Cephus lateralis* Konow, 1894

#### *Cephus pygmaeus* (Linné, 1767)

- =*Banchus viridator* Fabricius, 1805
- =*Banchus spinipes* Panzer, 1801
- =*Cephus clypealis* Costa, 1894
- =*Cephus clypealis* var. *flavisternum* Costa, 1882
- =*Cephus clypealis* var. *palaestinus* Pic, 1918
- =*Cephus leskii* Le Peletier, 1823
- =*Cephus notatus* Kokujev, 1910
- =*Cephus subcylindricus* Gravenhorst, 1807
- =*Cephus tanaiticus* Dovnar-Zapolskij, 1926
- =*Sirex pygmaeus* Linné, 1767
- =*Tenthredo longicornis* Fourcroy, 1785
- =*Tenthredo polygona* Gmelin, 1790

#### *Cephus spinipes* (Panzer, 1800)

- =*Banchus spinipes* (Panzer, 1800)
- =*Cephus cultratus* Eversmann, 1947
- =*Cephus affinis* Kokujev, 1910
- =*Cephus exilis* Kokujev, 1910
- =*Cephus floralis* Stephens, 1835
- =*Cephus pumilus* André, 1881
- =*Cephus similis* Mocsary, 1886
- =*Cephus pilosulus* Thomson, 1871

#### *Hartigia* sp. Schiödte, 1838

- =*Adirus* sp. Konow, 1899
- =*Cephosoma* sp. Gradl, 1881
- =*Cerobactrus* sp. Costa, 1860
- =*Copiosoma* sp. Kirby, 1882
- =*Macrocephus* sp. Schlechtendal, 1878
- =*Paradirus* sp. Dovnar-Zapolskij, 1931

#### *Hartigia helleri* (Taschenberg, 1871)

- =*Cephus albo-maculatus* Stein, 1876
- =*Cephus helleri* Taschenberg, 1871
- =*Hartigia albomaculata* Stein, 1876

=*Macrocephus fumipennis* var. *picticeps* Strand, 1910  
=*Phyllaecus rubi* Perris, 1873

*Hartigia linearis* (Schrank, 1781)

=*Cephus faunus* Thomson, 1871  
=*Cephus quinquefasciatus* Stephens, 1835  
=*Cephus viator* Smith, 1874  
=*Hartigia linearis* var. *flavia* Enslin  
=*Hartigia viatrix* Gussakovskij, 1935  
=*Macrocephus agrimoniae* Goury, 1912  
=*Macrocephus japonicus* Ghigi, 1915  
=*Tenthredo linearis* Schrank, 1781

*Hartigia nigra* (Harris, 1776)

=*Astatus satyrus* Panzer, 1804  
=*Cephusoma syringiae* Gradl, 1881  
=*Cephus brachypterus* Damianitsch, 1866  
=*Cephus glabellifer* Thomson, 1871  
=*Phylloecus cruciata* Costa, 1894  
=*Sirex nigra* Harris, 1776

*Hartigia xanthostoma* (Eversmann, 1847)

=*Cephus major* Eversmann, 1847  
=*Cephus xanthostoma* Eversmann, 1847  
=*Cerobractus facialis* Costa, 1864  
=*Hartigia semenovi* Dovnar-Zapolskij, 1931  
=*Hartigia jakovlevi* Dovnar-Zapolskij, 1931  
=*Macrocephus ulmariae* Schlechtendal, 1878  
=*Phyllaeus girandi sensu* Schlechtendal, 1879  
=*Phylloecus major sensu* Costa, 1894

*Janus* sp. Stephens, 1835

=*Ephippionotus* sp. Costa, 1860  
=*Phylloecus* sp. Newman, 1838

*Janus compressus* (Fabricius, 1793)

=*Cephus balearicus* Kriechbaumer, 1894  
=*Cephus flaviventris* Förster, 1844  
=*Cephus foersteri* André, 1881  
=*Cephus foersteri* var. *ulmi* Pic, 1918  
=*Ephippionotus lureiventris* André, 1881  
=*Sirex compressus* Fabricius, 1793

*Janus femoratus* (Curtis, 1830)

=*Cephus femoratus* Curtis, 1830  
=*Cephus melanarius* Mocsary, 1891  
=*Ephippionotus cephalotes* Costa, 1860  
=*Janus cynobasti* Konow, 1896  
=*Janus niger* Brischke, 1892  
=*Phylloecus faunus* Newman, 1838

*Janus luteipes* (Lepeletier, 1823)

=*Cephus connectens* Stephens, 1875  
=*Cephus emichii* Mocsary, 1886  
=*Cephus luteipes* Le Peletier, 1823  
=*Janus luteipes* var. *diversipes* Pic, 1918

*Trachelus* sp. Jurine, 1807

=*Astatus* sp. Panzer, 1801  
=*Ateuchopus* sp. Konow, 1896  
=*Cepha* sp. Billberg, 1820  
=*Eumetabolus* sp. Schultz, 1906  
=*Microcephus* sp. Benson, 1935  
=*Neateuchopus* sp. Benson, 1935

=*Trachelastatus* sp. Morice & Durant, 1914

*Trachelus tabidus* (Fabricius, 1775)

- =*Calameuta johnsoni* Ashmead, 1900
- =*Cephus erberi* Damianitsch, 1866
- =*Cephus mandibularis* Le Peletier, 1823
- =*Cephus nigrinus* Le Peletier, 1823
- =*Cephus vittatus* Costa, 1875
- =*Cephus vittatus* var. *atriventris* Pic, 1920
- =*Sirex tabidus* Fabricius, 1775
- =*Sirex tabidus* var. *macilentus* Fabricius, 1793
- =*Tenthredo haemorrhoidalis* Jurine, 1807
- =*Tenthredo longicollis* Fourcroy, 1885

*Trachelus troglodyta* (Fabricius, 1787)

- =*Astatus niger* Konow, 1896
- =*Astatus tenuicornis* Konow, 1902
- =*Cephus mocsaryi* Kirby, 1882
- =*Sirex troglodyta* Fabricius, 1787

## MEGALODONTESOIDEA

### MEGALODONTESIDAE

*Megalodontes* sp. Latreille, 1803

- =*Megalodontes (Forficulotarpa)* sp. Pic, 1918
- =*Megalodontes (Rhipidioceros)* sp. Konow, 1897
- =*Melanopus* sp. Konow, 1897
- =*Tarpa* sp. Fabricius, 1804
- =*Tristactoides* sp. Chevin, 1985
- =*Tristactus* sp. Konow, 1897

*Megalodontes capitalatus* Konow, 1904

*Megalodontes cephalotes* (Fabricius, 1781)

- =*Megalodontes klugi* Leach, 1817
- =*Tarpa klugii* Leach, 1817
- =*Tarpa spissicornis* Klug, 1824
- =*Tenthredo cephalotes* Fabricius, 1781

*Megalodontes panzeri* (Leach, 1817)

- =*Tarpa panzeri* Leach, 1817

*Megalodontes parvus* Dönnar-Zapolskij, 1930

*Megalodontes plagiocephalus* (Fabricius, 1804)

- =*Tarpa plagiocephalus* Fabricius, 1804

*Megalodontes thor* Taeger, 2002

### PAMPILIIDAE

#### Cephalciinae

*Acantholyda* sp. Costa, 1894

- =*Acanthocnema* sp. Costa, 1859
- =*Itycorsia* sp. Konow, 1897

*Acantholyda erythrocephala* (Linné, 1758)

- =*Acantholyda erythrocephala* var. *vittata* Enslin, 1918
- =*Pamphilius lucidus* Rohwer, 1910
- =*Tenthredo erythrocephala* Linné, 1758

*Acantholyda hieroglyphica* (Christ, 1791)

- =*Lyda bimaculata* Taschenberg, 1861
- =*Tenthredo campestris* Fabricius, 1793
- =*Tenthredo hieroglyphica* Christ, 1791

*Acantholyda laricis* (Giraud, 1861)

- =*Acantholyda parvula* Zirngiebl, 1937
- =*Lyda laricis* Giraud, 1861

*Acantholyda posticalis* Matsumura, 1912

- =*Lyda nemoralis sensu* Thomson, 1871 *nec* Linné, 1758
- =*Tenthredo stellata* Christ, 1791, *nec* Fourcroy, 1785

*Acantholyda posticalis pinivora* Enslin, 1917

*Acantholyda posticalis posticalis* Matsumura, 1912

*Caenolyda* sp. Konow, 1897

*Caenolyda reticulata* (Linné, 1758)

- =*Cephalcia klarki* Jurine, 1807
- =*Tenthredo reticulata* Linné, 1758

*Cephalcia* sp. Panzer, 1805

- =*Cephalia* sp. Nielsen & Henriksen, 1915
- =*Cephalcia* sp. Jurine, 1801
- =*Cephaleia* sp. Jurine, 1807
- =*Cephalia* sp. Semenov Tian-Shanskij, 1934
- =*Liolyda* sp. Ashmead, 1898

*Cephalcia abietis* (Linné, 1758)

- =*Cephaleia abietis* Klima, 1937
- =*Cephaleia testacea* Gimmerthal, 1836
- =*Lyda alpina* Klug, 1808
- =*Lyda hypotrophica* Hartig, 1834
- =*Lyda klugi* Schummel, 1836
- =*Lyda scutellaris* Thomson, 1871
- =*Tenthredo affinis* Schrank, 1837

*Cephalcia alpina* (Klug, 1808)

*Cephalcia arvensis* Panzer, 1805

- =*Lyda adusta* Dietrich, 1868
- =*Lyda campestris* Fallén, 1808
- =*Lyda frava* Fallén, 1808, *nec* Linné, 1767
- =*Lyda irrorata* Dahlbom, 1835
- =*Lyda saxicola* Hartig, 1837
- =*Tenthredo signata* Fabricius, 1781, *nec* Scopoli, 1763

*Cephalcia erythrogaster* (Hartig, 1837)

- =*Cephaleia erythrogastra* auct.

*Cephalcia fallenii* (Dalman, 1823)

- =*Cephalcia falleni* Benes, 1976
- =*Cephaleia alpina* var. *luctuosa* Enslin, 1917
- =*Cephaleia arvensis* var. *hilaris* Enslin, 1917
- =*Cephaleia arvensis* var. *pseudalpina* Enslin, 1917
- =*Lyda abietina* Hartig, 1837
- =*Lyda alpina* auct., *nec* Klug, 1808
- =*Lyda annulata* Hartig, 1837

*Cephalcia hartigii* (Bremer-Wolf, 1849)

- =*Cephaleia hartigi* Klima, 1937

*Cephalcia lariciphila* (Wachtl, 1898)

- =*Cephaleia abietis* var. *intermedia* Hellén, 1848
- =*Cephaleia alpina* auct. p. p., *nec* Klug, 1808

## *Pamphiliinae*

### *Neurotoma* sp. Konow, 1897

=*Congylocorsia* sp. Konow, 1897

#### *Neurotoma fausta* (Klug, 1808)

=*Lyda fausta* Klug, 1808

#### *Neurotoma mandibularis* (Zaddach, 1865)

=*Lyda parisiensis* Giraud, 1870

#### *Neurotoma nemoralis* (Linné, 1758)

=*Lyda drupacearum* Nördlinger, 1855

=*Lyda lucorum* Fallén, 1808

=*Lyda maculifrons* Snellen van Vollenhoven, 1858

=*Psen caprofolii* Schrank, 1802

=*Tenthredo punctata* Fabricius, 1798

#### *Neurotoma saltuum* (Linné, 1758)

=*Lyda albifrons* Fallén, 1808

=*Lyda clypeata* Klug, 1808

=*Lyda fasciata* Curtis, 1831

=*Lyda fasciatipennis* Costa, 1864

=*Neurotoma flaviventris* Retzius, 1783

=*Pamphilius dimidiata* Latreille, 1812

=*Psen pyri* Schrank, 1802

=*Tenthredo flaviventris* Retzius, 1783

=*Tenthredo lutescens* Panzer, 1809

### *Onycholyda* sp. Takeuchi, 1938

#### *Onycholyda kervillei* (Konow, 1903)

### *Pamphilius* sp. Latreille, 1802

=*Anoplolyda* sp. Costa, 1894

=*Bactroceros* sp. Konow, 1897

=*Lyda* sp. Fabricius, 1804

#### *Pamphilius alternans* (Costa, 1859)

=*Lyda inanis* Klug, 1808

=*Lyda alternans* O. G. Costa, 1859

=*Lyda alternans* A. Costa, 1860

=*Lyda semicincta* Zaddach, 1866 [not 1865]

=*Pamphilius hypocinctus* W. F. Kirby, 1882

=*Pamphilius sertatus* Konow, 1903

=*Pamphilius theresae* Pic, 1941

=*Pamphilius alternans* var. *theresae* Pic, 1941

#### *Pamphilius aurantiacus* (Giraud, 1857)

=*Lyda aurantiaca* Giraud, 1857

=*Lyda neglecta* Zaddach, 1866

=*Pamphilius neglectus* (Zaddach, 1866)

#### *Pamphilius betulae* (Linné, 1758)

=*Lyda aurita* Klug, 1808

=*Tenthredo fulva* Retzius, 1783

=*Tenthredo fulva* Retzius, 1783

### *Pamphilius festivus* Pesarini & Pesarini, 1984

#### *Pamphilius fumipennis* (Curtis, 1831)

=*Lyda carpini* Bischke, 1892

=*Lyda stigma* Stephens, 1829

- =*Lyda stigma* Stephens, 1835
- =*Cephalcia nemorum* Panzer, 1804
- =*Lyda nemorum* Fabricius, 1804
- =*Lyda fumipennis* Curtis, 1831
- =*Pamphilius sylvaticus* var. *fumipennis* (Curtis, 1831)
- Pamphilius gyllenhali* (Dahlbom, 1835)
- =*Lyda latifrons* Fallén, 1808
- Pamphilius histrio* (Latreille, 1811)
- =*Lyda flaviventris sensu* Stephens, 1835, *nec* Retzius, 1783
- =*Lyda vafra* Fallén, 1808
- Pamphilius hortorum* (Klug, 1808)
- =*Pamphilius hortorum bicinctus* Benson, 1945
- Pamphilius ignymontiensis* Lacourt, 1973
- Pamphilius inanitus* (DeVillers, 1789)
- =*Lyda fallax* Le Peletier, 1823
- =*Tenthredo agrestis* Panzer, 1865
- Pamphilius latifrons* (Fallén, 1808)
- =*Lyda maculosa* Zaddach, 1865
- Pamphilius lethierryi* (Konow, 1887)
- Pamphilius marginatus* (Lepeletier, 1823)
- =*Lyda bicolor* Herrich-Schäffer, 1833
- =*Tenthredo ratzeburgi* Ratzeburg, 1844
- Pamphilius nemorum* (Gmelin, 1788)
- =*Lyda arbuti* Zaddach, 1865
- =*Lyda juncunda* Eversmann, 1847
- =*Tenthredo arbustorum* Fabricius, 1763 *nec* Cameron, 1885
- Pamphilius norimbergensis norimbergensis* Enslin, 1917
- Pamphilius pallipes* (Zetterstedt, 1838)
- =*Lyda flavipes* Zetterstedt, 1838
- =*Lyda variegata* Zaddach, 1865
- =*Pamphilius archiducalis* Konow, 1897
- =*Pamphilius pallidipes* Dalla Torre, 1894
- Pamphilius stramineipes* (Hartig, 1837)
- =*Lyda facetus* Konow, 1898
- Pamphilius sylvarum* (Stephens, 1835)
- =*Lyda fulvipennis* Zaddach, 1865
- =*Pamphilius sylvarum auct. p. p.*
- Pamphilius sylvaticus* (Linné, 1758)
- =*Pamphilius silvaticus auct. p. p.*
- =*Tenthredo fulvipes* Retzius, 1783
- Pamphilius thorwaldi* Kontuniemi, 1946
- Pamphilius vafer* (Linné, 1767)
- =*Psenalni* Schrank, 1802
- =*Tenthredo depressa* Schrank, 1781
- Pamphilius varius* (Lepeletier, 1823)
- =*Anoplolyda engelhardti* Dovnar-Zapolskij, 1930
- =*Lyda infida* Zaddach, 1865
- =*Lyda konowi* Jakovlev, 1891
- =*Pamphilius vafer auct. p. p.*
- =*Pamphilius flavifrons* Kirby, 1882

## **ORUSSOIDEA**

## ORUSSIDAE

### Orussinae

*Orussus* sp. Latreille, 1797

=*Oryssus* sp. Latreille, 1796

=*Oryssus* sp. Fabricius, 1798

*Orussus abietinus* (Scopoli, 1763)

=*Sphex abietina* Scopoli, 1763

=*Tenthredo degener* Christ, 1791

=*Oryssus vespertilio* (Fabricius, 1793)

=*Sirex vespertilio* Fabricius, 1793

=*Oryssus coronatus* Fabricius, 1798

=*Oryssus albo-punctatus* Gimmerthal, 1836

=*Oryssus albopunctatus* Gimmerthal, 1836

*Orussus taorminensis* Trautmann, 1922

*Orussus unicolor* Latreille, 1812

=*Orussus unicolor frontalis* Enslin, 1917

=*Oryssus unicolor* var. *frontalis* Enslin, 1918

## SIRICOIDEA

### SIRICIDAE

#### Siricinae

*Sirex* sp. Linné, 1761

=*Neuropachys* sp. Heer, 1858

=*Urocerites* sp. Heer, 1867

=*Paururus* sp. Konow, 1896

*Sirex cyaneus* Fabricius, 1781

=*Sirex nigricornis* Newman, 1833

=*Urocerus cyaneus* Norton, 1869

*Sirex juvencus* (Linné, 1758)

=*Urocerus* vi Schaeffer, 1799

=*Urocerus feisthameli* Brullé, 1832

*Sirex juvencus juvencus* (Linné, 1758)

=*Ichneumon juvencus* Linné, 1758

=*Paururus juvencus* (Linné, 1758)

=*Urocerus juvencus* (Linné, 1758)

=*Urocerus* VII Schaeffer, 1779

=*Sirex nigricornis* Acerbi, 1802

=*Urocerus caerulescens* Latreille, 1804

=*Urocerus coerulescens* Latreille, 1804

=*Sirex australis* W. F. Kirby, 1882

=*Sirex dubia* W. F. Kirby, 1882

=*Sirex dubius* W. F. Kirby, 1882

=*Paururus australis* (W. F. Kirby, 1883)

=*Sirex leseleuci* Tournier

=*Paururus juvencus* var. *virago* Enslin, 1918

- =*Paururus juvencus* ab. *maculata* Hellén, 1935
- =*Paururus maculatus* Hellén, 1935
- =*Paururus succineiceps* Koorneef, 1935
- =*Paururus sucineiceps* Koorneef, 1935
- =*Sirex sucineiceps* (Koorneef, 1935)
- =*Sirex atricornis* Kjellander, 1945
- =*Sirex juvencus* var. *atricornis* Kjellander, 1945

### *Sirex noctilio* Fabricius, 1773

- =*Sirex nigricornis* Ludwig, nec Fabricius
- =*Urocerus melanoceros* Thomson, 1871
- =*Sirex melanocerus* C. G. Thomson, 1871
- =*Paururus atlantidis* Ghigi, 1909
- =*Sirex juvencus* Klug, 1803
- =*Urocerus feisthameli* Brullé, 1833

### *Urocerus* sp. Geoffroy, 1762

#### *Urocerus augur* (Klug, 1803)

- =*Sirex cedrorum* Smith, 1860

#### *Urocerus fantoma* (Fabricius, 1781)

- =*Sirex tardigradus* Cederhjelm
- =*Urocerus phantoma* auct.

#### *Urocerus gigas* (Linné, 1758)

- =*Sirex faustus* Costa
- =*Sirex grandis* Blanchard
- =*Sirex hungaricus* Christ
- =*Sirex mariscus* Linné
- =*Sirex psyllius* Fabricius
- =*Urocerus lefebvrei* Guérin

### *Xeris* sp. Costa, 1894

#### *Xeris spectrum* (Linné, 1758)

- =*Sirex emarginatus* Fabricius
- =*Sirex nanus* Muller
- =*Xeris caudata* Cresson, 1865
- =*Sirex caudatus* Cresson, 1865

## **Tremicinae**

### *Tremex* sp. Jurine, 1807

- =*Xyloterus* sp. Hartig, 1837
- =*Xyloecematium* sp. Heyden, 1868

#### *Tremex fuscicornis* (Fabricius, 1787)

- =*Sirex camelogigas* Christ
- =*Sirex strutiocamelus* Villers
- =*Tremex simulacrum* Semenov, 1921

#### *Tremex magus* (Fabricius, 1787)

- =*Sirex magus* Fabricius, 1787
- =*Urocerus magus* (Fabricius, 1787)
- =*Xyloecematium magus* (Fabricius, 1787)
- =*Xyloterus magus* (Fabricius, 1787)
- =*Sirex nigrita* Fabricius, 1787

## XIPHYDRIIDAE

### Xiphydriinae

#### *Xiphydria sp.* Latreille, 1803

- = *Urocerus sp.* Jurine, 1801
- = *Hybonotus sp.* Klug, 1803
- = *Xiphydra sp.* Panzer, 1806
- = *Xiphiura sp.* Fallén, 1813
- = *Xiphidria sp.* Lamarck, 1817
- = *Hyponotus sp.* Billberg, 1820
- = *Xyphidria sp.* Lepeletier, 1823
- = *Xyphidria sp.* Norton, 1869
- = *Xiphidion sp.* Provancher, 1875

#### *Xiphydria camelus* (Linné, 1758)

- = *Xiphydria eborata* Konow, 1899
- = *Xiphydria buyssoni* Matsumura, 1911
- = *Xiphydria camelus* ab. *nigerrima* Hellén, 1955
- = *Xiphydria jozana* Matsumura, 1927
- = *Xiphydria kawakamii* Matsumura, 1927
- = *Xiphydria kuccharonis* Matsumura, 1927

#### *Xiphydria longicollis* (Geoffroy, 1785)

- = *Sirex camelus* Rossi, 1790
- = *Urocerus annulatus* Latreille, 1805
- = *Urocerus annulatus* Jurine, 1807

#### *Xiphydria picta* Konow, 1897

#### *Xiphydria prolongata* (Geoffroy, 1785)

- = *Sirex dromedarius* Fabricius, 1787
- = *Xiphydria fasciata* Lepeletier, 1823
- = *Xyphidria camelus* Lepeletier & Serville, 1828

## TENTHREDINOIDEA

## ARGIDAE

### Arginae

#### *Arge sp.* Schrank, 1802

- = *Hylotoma sp.* Latreille, 1803
- = *Cryptus sp.* Jurine, 1801
- = *Corynia sp.* Imhof & Labram, 1836
- = *Acanthoptenos sp.* Ashmead, 1898
- = *Bathyblepta sp.* Konow, 1906
- = *Didocha sp.* Konow, 1907
- = *Miocephala sp.* Konow, 1907
- = *Rhopalospiria sp.* Enderlein, 1919
- = *Rhopalospira sp.* Enderlein, 1920
- = *Triarge sp.* Forsius, 1931

#### *Arge berberidis* Schrank, 1802

#### *Arge ciliaris* (Linné, 1767)

- = *Arge ciliaris* var. *corrusca* Zaddach, 1859
- = *Arge ciliaris* var. *pacifica* Malaise, 1931
- = *Arge corrusca* Zaddach, 1859
- = *Hylotoma coerulea* Klug, 1814

- =*Hylotoma corrusca* Zaddach, 1859
- Arge cyanocrocea* (Förster, 1771)
  - =*Arge bicolor* (Schrank, 1776)
  - =*Arge cyaneocrocea* (err., )
  - =*Arge cyaneocrocea* var. *syriaca* Mocsáry, 1880
  - =*Arge syriaca* Mocsáry, 1880
  - =*Hylotoma cyaneocrocea* var. *messanensis* Destefani, 1885
  - =*Hylotoma syriaca* var. *damascena* Magretti, 1890
  - =*Tenthredo bicolor* Villers,
  - =*Tenthredo coerulescens* Fabricius, 1775
- Arge dimidiata* (Fallén, 1808)
  - =*Arge dimidiata aeneoviridescens* Bischoff, 1925
  - =*Arge kongauensis* Rohwer, 1925
  - =*Hylotoma aenescens* Förster, 1854
  - =*Hylotoma confusa* Dietrich, 1868
  - =*Hylotoma fasciata* Lepeletier, 1823
  - =*Hylotoma fasciata* Serville, 1823
  - =*Hylotoma mediata* Fallén, 1829
  - =*Hylotoma rufescens* Drapiez, 1819
- Arge enodis* (Linné, 1767)
  - =*Arge coeruleipennis* Retzius, 1783
  - =*Arge ciliaris* Schrank,
  - =*Arge hartigi* Konow, 1885
  - =*Hylotoma caeruleopennis* Retzius, 1783
  - =*Hylotoma amethystina* Klug, 1814
  - =*Hylotoma atrata* Klug, 1814
  - =*Hylotoma angelica* Leach, 1817
  - =*Hylotoma vulgaris* Klug, 1834
  - =*Tenthredo enodis* Fabricius, 1781
  - =*Tenthredo ustulata* Göze, 1779
- Arge fuscipes* (Fallén, 1808)
  - =*Arge fuscipes* var. *bleusei* Pic, 1917
- Arge gracilicornis* (Klug, 1814)
  - =*Arge coerulescens* (Geoffroy, 1785)
  - =*Arge gracilicorne* Klug, 1814
  - =*Hylotoma cyanella* Klug, 1834
  - =*Hylotoma crassa* Konow, 1884
  - =*Hylotoma pilicornis* Leach, 1817
- Arge melanochra* (Gmelin, 1790)
  - =*Arge melanochroa* (Gmelin, 1790)
  - =*Arge fuliginata* Konow, 1907
  - =*Arge melanochroa nigratarsis* Klug, 1834
  - =*Arge melanochroa* var. *fuliginata* Konow, 1907
  - =*Arge nigratarsis* Klug, 1834
  - =*Hylotoma bicolor* Gimmerthal, 1846
  - =*Hylotoma coerulescens bicolor* Gimmerthal, 1848
  - =*Hylotoma dimidiata* Lepeletier, 1823
  - =*Hylotoma dimidiata* Serville, 1823
  - =*Hylotoma femorale* Klug, 1814
  - =*Hylotoma femoralis* Klug, 1814
  - =*Hylotoma similis* Rudow, 1871
- Arge metallica* (Klug, 1834)
  - =*Hylotoma metallicum* Klug, 1824
- Arge nigripes* (Retzius, 1783)
- Arge nigripes nigripes* (Retzius, 1783)
- Arge nigripes alpina* (Konow, 1884)
  - =*Arge alpina* Konow, 1884

*Arge ochropus* (Gmelin, 1790)

- =*Arge modesta* Konow, 1905
- =*Arge pyrenaica* André, 1879
- =*Arge pyrenaica luteola* Muche, 1977
- =*Arge pyrenaica mauretana* Schulz, 1906
- =*Arge pyrenaica* var. *nigripes* Konow, 1895
- =*Arge rosae* Linné, 1758
- =*Arge rosicola* Schrank, 1802
- =*Arge soror* Konow, 1890
- =*Corynia rosarum* Imhof & Labram, 1836
- =*Hylotoma diversicolor* Pic, 1917
- =*Hylotoma rosarum* Klug, 1814
- =*Hylotoma rosae* var. *diversicolor* Pic, 1917
- =*Tenthredo caprea* Preyssler, 1793
- =*Tenthredo cuprea* Preyssler, 1793

*Arge pagana* (Panzer, 1798)

- =*Hylotoma paganum* Panzer, 1798

*Arge pullata* (Zaddach, 1859)

- =*Hylotoma ventricosa* Zaddach, 1863
- =*Hylotoma ventriosa* Zaddach, 1864

*Arge rustica* (Linné, 1758)

- =*Arge atrata* (Forster, 1771)
- =*Arge segmentaria* (Panzer, 1804)
- =*Arge segmentaria* var. *rufiventris* Konow, 1899
- =*Arge thomsoni* Konow, 1884
- =*Hylotoma albicurris* Brullé, 1832
- =*Hylotoma atrata* Cameron, 1885
- =*Hylotoma discus* O. G. Costa, 1858
- =*Hylotoma discusa* O. G. Costa, 1858
- =*Hylotoma klugi* Leach, 1817
- =*Hylotoma leachii* Stephens, 1829
- =*Hylotoma leachi* Stephens, 1835
- =*Hylotoma saliceti* Rudow, 1871
- =*Hylotoma segmentaria* C. G. Thomson, 1871
- =*Hylotoma segmentarium* Panzer, 1805

*Arge shawi* Liston, 1992

*Arge thoracica* (Spinola, 1808)

- =*Arge aetolica* Konow, 1887
- =*Hylotoma enodis* var. *luridipes* A. Costa, 1890
- =*Tenthredo americana* Villers, 1798

*Arge ustulata* (Linné, 1758)

- =*Arge anceps* Radoszkowsky, 1889
- =*Arge monostega* Konow, 1886
- =*Arge ustulata* var. *stigmatica* Pic, 1927
- =*Hylotoma claripennis* Rudow, 1871
- =*Hylotoma distinguenda* Konow, 1884
- =*Hylotoma pubicornis* Illiger, 1807
- =*Hylotoma ustulata* var. *distinguenda* Konow, 1884
- =*Hylotoma ustulata* var. *monostega* Konow, 1886
- =*Tenthredo crocipennis* Christ, 1791
- =*Tenthredo flavipes* Retzius, 1783
- =*Tenthredo nitens* Degeer, 1771
- =*Tenthredo ochroptera* Geoffroy, 1785
- =*Tenthredo pilicornis* Preyssler, 1793

## *Sterictiphorinae*

### *Aprostheminae*

=*Lyrola* sp. Ross, 1937

=*Copidoceros* sp. Forsius, 1921

=*Copidocerus* sp. Forsius, 1921

#### *Aprosthemina fusicornis* (Thomson, 1871)

=*Schizocera fusicornis* Thomson, 1871

#### *Aprosthemina instratum* (Zaddach, 1859)

=*Aprosthemina instrata* Zaddach, 1859

#### *Aprosthemina melanurum* (Klug, 1814)

=*Aprosthemina alfkeni* Konow, 1895

=*Aprosthemina friesei* Konow, 1895

=*Aprosthemina melanura friesei* Konow, 1892

=*Schizocera cylindricornis* Thomson, 1871

#### *Aprosthemina peletieri* (Villaret, 1832)

=*Schizocerus peletieri* Villaret, 1832

#### *Aprosthemina tardum* (Klug, 1814)

=*Aprosthemina carpentieri* Konow, 1902

=*Aprosthemina cylindricorne* C. G. Thomson, 1871

### *Sterictiphora* sp. Billberg, 1820

=*Schizoceros* sp. Lepeletier, 1825

=*Schizocerus* sp. Berthold, 1827

=*Schizocerus* sp. Lepeletier & Serville, 1828

=*Schizocera* sp. Latreille, 1829

=*Schizocera* sp. Perty, 1833

=*Cyphona* sp. Dahlbom, 1835

=*Schizoceros* sp. Konow, 1899

=*Sterictiphora* sp. Benson, 1951

#### *Sterictiphora angelicae* (Panzer, 1799)

=*Cryptus villersi* Leach, 1817

=*Tenthredo taraxaci* Panzer, 1806

=*Schizoceros furcatus* var. *melanocephalus* Panzer, 1799

=*Schizoceros henschi* Konow, 1907

#### *Sterictiphora furcata* (Villers, 1789)

=*Aprosthemina furcatum* Villers, 1789

=*Aprosthemina terebralis* var. *flavipes* Enslin, 1917

=*Schizocera inaequalis* Bremsi-Wolf, 1849

=*Tenthredo rubi* Rossi, 1790

=*Tenthredo rubiidaei* Rossi, 1790

#### *Sterictiphora gastrica* (Klug, 1814)

=*Aprosthemina terebralis* Enslin, 1917

=*Schizoceros gastricus* Klug, 1814

#### *Sterictiphora geminata* (Gmelin, 1790)

=*Hylotoma costata* Fallén, 1808

=*Cyphona geminata* var. *alpina* Strobl, 1895

=*Schizocerus geminatus* Gmelin, 1790

=*Schizocera pallipes* Leach, 1817

#### *Sterictiphora longicornis* Chevin, 1982

## BLASTICOTOMIDAE

*Blasticotoma* sp. Klug, 1834

*Blasticotoma filiceti* Klug, 1834

## CIMBICIDAE

### Abiinae

*Abia* sp. Leach, 1817

=*Parabia* sp. Semenov, 1891

=*Zaraea* sp. Leach, 1817

=*Aenoabia* sp. Kangas, 1946

=*Auroabia* sp. Kangas, 1946

*Abia aenea* (Klug, 1829)

=*Abia bifida* Thomson, 1871

=*Abia bigens* Kangas, 1946

=*Abia lonicerae* auct.,

=*Cimbex aenea* Klug, 1829

*Abia aurulenta* Sichel, 1856

=*Abia cuprea* Aichinger, 1870

=*Cimbex fasciata* Jurine,

=*Tenthredo sericea* Christ,

*Abia candens* Konow, 1887

=*Abia symballophthalma* Semenov, 1891

*Abia fasciata* (Linné, 1758)

*Abia fulgens* Zaddach, 1863

=*Abia aurulenta* Zaddach, 1863

=*Abia plana* Benson, 1954

=*Abia fulgens* var. *unicoloricornis* Pic, 1933

*Abia lonicerae* (Linné, 1758)

=*Abia nigricornis* Leach, 1817

=*Tenthredo nitens* Christ,

*Abia mutica* Thomson, 1871

*Abia sericea* (Linné, 1758)

=*Abia dorsalis* O. G. Costa, 1859

=*Abia dorsalis* A. Costa, 1859

=*Cimbex nitens* Fallén, 1808

=*Tenthredo nitens* Schrank, 1802

### Cimbicinae

*Cimbex* sp. Olivier, 1791

=*Crabro* sp. Geoffroy, 1762

=*Clavellarius* sp. Olivier, 1789

=*Clavellaria* sp. Lamarck, 1801

=*Palaeocimbex* sp. Semenov, 1935

=*Neocimbex* sp. Malaise, 1937

=*Allocimbex* sp. Zirngiebl, 1953

*Cimbex connatus* (Schrank, 1776)

=*Cimbex alni* Zaddach, 1863

- = *Cimbex luteola* Lepeletier, 1823
- = *Cimbex luteola* Serville, 1823
- = *Cimbex maculata* Olivier, 1790
- = *Cimbex nigriviolacea* Eversmann, 1847
- = *Cimbex ornata* Le Peletier, 1823
- = *Cimbex ornata* Serville, 1823
- = *Cimbex variabilis alni* Zaddach, 1863
- = *Cimbex violascens* Thomson, 1871
- = *Crabo maculatus* Geoffroy, 1785
- = *Tenthredo albivaga* Bechstein, 1805
- = *Tenthredo connata* Schrank, 1776
- = *Tenthredo femorata* Goeze,
- = *Tenthredo humboldti* Ratzeburg, 1844
- = *Tenthredo montana* Panzer, 1801
- = *Tenthredo lutea* Blanchard, 1849

*Cimbex fagi* Zaddach, 1863

- = *Cimbex femorata* Drewsen,

*Cimbex femoratus* (Linné, 1758)

- = *Cimbex betulae* Zaddach, 1863
- = *Cimbex betulae* var. *flavomaculata* Zaddach, 1863
- = *Cimbex betulae* var. *feminae flavo-maculata* Zaddach, 1863
- = *Cimbex betulae* var. *feminae lutescens* Zaddach, 1863
- = *Cimbex betulae* var. *lutescens* Zaddach, 1863
- = *Cimbex betulae* var. *nigra* Zaddach, 1863
- = *Cimbex betulae* var. *pulla* Zaddach, 1863
- = *Cimbex biguetina* Lepeletier, 1833
- = *Cimbex europaea* Leach, 1817
- = *Cimbex fagi* Konow, 1897
- = *Cimbex femorata uchidai* Takeuchi, 1931
- = *Cimbex femorata* var. *biguetina* Lepeletier, 1833
- = *Cimbex femorata* var. *pallida* Stephens, 1835
- = *Cimbex femorata* var. *silvarum* Fabricius, 1793
- = *Cimbex femorata* var. *silvarum* Linné, 1758
- = *Cimbex femorata* var. *ornata* Uchida, 1928
- = *Cimbex femorata* var. *uchidai* Takeuchi, 1931
- = *Cimbex femorata* var. *unicolor* Enslin, 1917
- = *Cimbex femoratus* var. *varians* Takeuchi, 1931
- = *Cimbex flavomaculata* var. *silvarum* Fabricius, 1793
- = *Cimbex flavomaculata* var. *flavomaculata* Zaddach, 1863
- = *Cimbex flavomaculata* var. *lutescens* Zaddach, 1863
- = *Cimbex flavomaculata* var. *pulla* Zaddach, 1863
- = *Cimbex pallens* Lepeletier, 1823
- = *Cimbex pallens* Serville, 1823
- = *Cimbex pallida* Stephens, 1835
- = *Cimbex pallidus* Stephens, 1829
- = *Cimbex quadrimaculata* var. *sachalinensis* Uchida, 1928
- = *Cimbex schaefferi* Lepeletier, 1823
- = *Cimbex schaefferi* Serville, 1823
- = *Cimbex sibirica* W. F. Kirby, 1882
- = *Cimbex taukushi* Marlatt, 1898
- = *Cimbex tonnaichana* Matsumura, 1911
- = *Cimbex uchidai* Takeuchi, 1931
- = *Cimbex variabilis* Klug, 1829
- = *Cimbex variabilis* var. *russa* Eversmann, 1847
- = *Cimbex venusta* Perty, 1833
- = *Crabo annulatus* Geoffroy, 1785
- = *Crabo lunulatus* Geoffroy, 1785
- = *Tenthredo femorata* Linné, 1758
- = *Tenthredo femorata* Christ, 1791
- = *Tenthredo silvarum* Fabricius, 1793

= *Tenthredo tristis* Fabricius, 1781

*Cimbex luteus* (Linné, 1758)

= *Cimbex annulata* Leach, 1817

= *Cimbex brevispinna* Thomson, 1871

= *Cimbex capreae* Konow, 1897

= *Cimbex femorata* auct.

= *Cimbex femorata silvarum* Linné, 1758

= *Cimbex femorata* var. *coreana* Uchida, 1928

= *Cimbex femorata* var. *Griffini* Leach, 1817

= *Cimbex femorata* var. *schaefferi* Lepeletier, 1823

= *Cimbex femorata* var. *silvarum* Linné, 1758

= *Cimbex griffinii* Leach, 1817

= *Cimbex lutea* var. *pallens* Lepeletier, 1829

= *Cimbex saliceti* Zaddach, 1863

= *Cimbex saliceti maris et feminae testacea* Zaddach, 1863

= *Cimbex taikushi* Marlatt, 1898

= *Cimbex variabilis lutea* Klug, 1829

= *Cimbex variabilis salicis* Zaddach, 1863

= *Cimbex variabilis salicis capreae* Zaddach, 1863

= *Tenthredo lutea* Linné, 1758

= *Tenthredo montana* Fallén, 1807

*Cimbex quadrimaculatus* (Müller, 1766)

= *Cimbex axillaris* Jurine, 1807

= *Cimbex axillaris* Panzer, 1801

= *Cimbex humeralis* Geoffroy, 1785

= *Cimbex humeralis* var. *scapularis* Stein, 1876

= *Cimbex quadrimacula* var. *humeralis* Geoffroy, 1785

= *Cimbex scapularis* Stein, 1876

= *Tenthredo connata* Villers, 1789

= *Tenthredo quadrimaculata* Müller, 1766

*Praia* sp. Wancowicz, 1880

*Praia taczanowskii* Wancowicz, 1880

*Pseudoclavellaria* sp. Schultz, 1906

*Pseudoclavellaria amerinae* (Linné, 1758)

= *Clavellaria nitobei* Matsumura, 1912

= *Cimbex saliceti* Sasaki, 1902

= *Pseudoclavellaria albopilosa* Matsumura, 1912

= *Tenthredo marginata* Linné, 1767

= *Tenthredo quadrifasciata* Degeer, 1773

= *Tenthredo rufa* Retzius, 1783

= *Trichiosoma albopilosum* Matsumura, 1912

*Trichiosoma* sp. Leach, 1817

*Trichiosoma lucorum* (Linné, 1758)

= *Cimbex betuleti* Klug, 1834

= *Trichiosoma betuleti* Klug, 1834

= *Trichiosoma lucorum* var. *betuleti* Klug, 1834

*Trichiosoma sorbi* (Hartig, 1837)

= *Trichiosoma scalesii* Leach, 1817

= *Trichiosoma scalesii* Cameron, 1890

*Trichiosoma tibiale* (Stephens, 1835)

= *Cimbex betuleti* Snellen van Vollenhoven,

= *Cimbex crataegi* Zaddach, 1863

= *Trichiosoma betuleti* Cameron, 1885

= *Trichiosoma lucorum* Leach, 1817

- = *Trichiosoma tibiale* Stephens, 1829
- = *Trichiosoma tibiale* var. *decipiens* Enslin, 1917

*Trichiosoma vitellina* (Linné, 1761)

- = *Cimbex trichiosoma* Lepeletier, 1823
- = *Cimbex vitellinae* Linné, 1761
- = *Cimbex villosus* Motschulskij
- = *Tenthredo betulae* Ström, 1762
- = *Tenthredo rufa* Retzius,
- = *Trichiosoma boreale* Gussakovskij, 1947
- = *Trichiosoma laterale* Leach,
- = *Trichiosoma marginalis* Leach, 1817
- = *Trichiosoma opacum* Konow, 1906
- = *Trichiosoma pubescens* Jakovlev,
- = *Trichiosoma silvaticum* Leach, 1817
- = *Trichiosoma sylvaticum* Leach, 1817
- = *Trichiosoma vitellinae* err.
- = *Trichiosoma vitellinae* var. *marginale* Leach, 1817

**Coryninae**

*Corynis* sp. Thünberg, 1789

- = *Amasis* sp. Leach, 1817

*Corynis crassicornis* (Rossi, 1790)

- = *Amasis crassicornis* var. *gallica* Pic, 1918
- = *Amasis crassicornis* var. *nigriventris* Soldanski, 1916
- = *Amasis laeta* Fabricius, 1798
- = *Cimbex jurinae* Lepeletier, 1823
- = *Cimbex jurinae* Serville, 1823
- = *Cimbex olivieri* Lepeletier, 1823
- = *Cimbex silvatica* Olivier, 1790

*Corynis italica* (Lepeletier, 1823)

- = *Amasis meridionalis* Konow, 1886

*Corynis lateralis* (Brullé, 1832)

- = *Amasis lateralis* Brullé, 1832
- = *Amasis amoena* Klug, 1834
- = *Amasis lateralis siberica* Kuznetzov-Ugamskij, 1925
- = *Corynis dominiquei* Chevin, 1988

*Corynis obscura* (Fabricius, 1770)

- = *Amasis helvetica* Konow, 1886
- = *Amasis obscura* var. *helvetica* Konow, 1886
- = *Amasis valkanovi* Vassilev, 1969

**DIPRIONIDAE**

**Diprioninae**

*Diprion* sp. Schrank, 1802

- = *Pteronus* sp. Jurine, 1801
- = *Lophyrus* sp. Latreille, 1803
- = *Nycteridium* sp. Fischer von Waldheim, 1806
- = *Pteronus* sp. Panzer, 1806
- = *Anachoreta* sp. Gistel, 1848
- = *Cristiger* sp. Gistel, 1848

*Diprion pini* (Linné, 1758)

=*Diprion butovitschi* Hedqvist, 1967  
=*Diprion pini* var. *klugi* Enslin, 1916  
=*Diprion pini* var. *nigristernis* Enslin, 1916  
=*Diprion pini* var. *nigroscutellatum* Enslin, 1916  
=*Hylotoma nemorum* Fallén, 1807  
=*Lophyrus pini* Linné, 1758  
=*Tenthredo dorsata* Fabricius, 1781  
=*Tenthredo eques* Schrank, 1782  
=*Tenthredo pectinata major* Retzius, 1783

*Diprion similis* (Hartig, 1836)

=*Diprion simile* Hartig, 1837  
=*Diprion simile* var. *atroscutellatum* Enslin, 1916  
=*Diprion simile* var. *claristernis* Enslin, 1916  
=*Lophyrus eremita* C. G. Thomson, 1871

*Gilpinia* sp. Benson, 1939

*Gilpinia frutetorum* (Fabricius, 1793)

=*Diprion frutetorum* var. *luteolum* Enslin, 1916  
=*Diprion frutetorum* var. *lutescens* Enslin, 1916  
=*Hylotoma dorsata* Fallén, 1807  
=*Hylotoma pini* Fallén, 1807  
=*Lophyrus anachoreta* A. Costa, 1894

*Gilpinia hercyniae* (Hartig, 1837)

=*Lophyrus hercyniae* Hartig, 1837  
=*Gilpinia polytoma* (Hartig, 1834)  
=*Lophyrus polytomus* Hartig, 1834

*Gilpinia laricis* (Jurine, 1807)

=*Diprion laricis* var. *fenestratum* Enslin, 1916  
=*Diprion laricis* var. *flavomarginatum* Enslin, 1916  
=*Diprion laricis* var. *lugens* Enslin, 1916  
=*Lophyrus laricis* Klug, 1812

*Gilpinia pallida* (Klug, 1812)

=*Tenthredo pectinata minor* Retzius, 1783  
=*Tenthredo pini minor* Villers, 1789  
=*Tenthredo pini-minor* Villers, 1789  
=*Tenthredo dorsata* Panzer, 1799  
=*Tenthredo pinastri* Scharfenberg, 1805  
=*Diprion pallida* (Klug, 1812)  
=*Diprion pallidum* (Klug, 1812)  
=*Lophyrus pallidus* Klug, 1812  
=*Lophyrus minor* Lepeletier, 1823  
=*Lophyrus minor* Serville, 1823

*Gilpinia polytoma* (Hartig, 1834)

=*Diprion polytomum* var. *pseudopallidum* Enslin, 1916

*Gilpinia socia* (Klug, 1812)

=*Diprion socia* (Klug, 1812)  
=*Lophyrus socius* Klug, 1812  
=*Lophyrus pineti* Hartig, 1837

*Gilpinia variegata* (Hartig, 1834)

=*Diprion variegata* (Hartig, 1834)  
=*Lophyrus variegatus* Hartig, 1834  
=*Lophyrus variegatus* C. G. Thomson, 1871  
=*Lophyrus thomsoni* Konow, 1884  
=*Lophyrus thomsonii* Konow, 1884

*Gilpinia virens* (Klug, 1812)

=*Tenthredo pini-minor* Villers, 1789  
=*Diprion virens* (Klug, 1812)  
=*Lophyrus virens* Klug, 1812

=*Diprion virens* var. *atramentarium* Enslin, 1916

*Macrodiprion* sp. Enslin, 1916

*Macrodiprion nemoralis* Enslin, 1917

- =*Diprion nemorum* (Fabricius, 1793)
- =*Lophyrus nemorum* (Fabricius, 1793)
- =*Macrodiprion nemorum* (Fabricius, 1793)
- =*Lophyrus nemoralis* Enslin, 1917

*Microdiprion* sp. Enslin, 1917

*Microdiprion pallipes* (Fallén, 1808)

- =*Lophyrus dorsatus* sensu Konow,
- =*Hylotoma difformis* Fallén, 1808
- =*Lophyrus pallidipes* Fallén, 1808
- =*Diprion pallipes* (Fallén, 1808)
- =*Hylotoma pallipes* Fallén, 1808
- =*Lophyrus pallipes* (Fallén, 1808)
- =*Lophyrus elongatulus* Klug, 1812
- =*Diprion pallipes* politum (Klug, 1812)
- =*Lophyrus politus* Klug, 1812
- =*Lophyrus dorsatus* var. *politus* Klug, 1812
- =*Lophyrus pulchricornis* Bremi-Wolf, 1849
- =*Lophyrus pallidipes* Dalla Torre, 1894
- =*Diprion pallipes* var. *aterrimum* Enslin, 1916

*Neodiprion* sp. Rohwer, 1918

*Neodiprion sertifer* (Geoffroy, 1785)

- =*Tenthredo pectinata rufa* Retzius, 1783
- =*Tenthredo pectinatarufa* Retzius, 1783
- =*Diprion sertifer* (Geoffroy, 1785)
- =*Lophyrus sertifer* (Geoffroy, 1785)
- =*Tenthredo sertifer* Geoffroy, 1785
- =*Diprion sertifera* (Geoffroy, 1785)
- =*Tenthredo pini-rufa* Villers, 1789
- =*Tenthredo pinirufa* Villers, 1789
- =*Tenthredo pini rufa* Villers, 1789
- =*Tenthredo juniperi* Christ, 1791
- =*Hylotoma rufa* Fallén, 1807
- =*Tenthredo rufa* Latreille, 1807
- =*Diprion rufus* Latreille, 1807
- =*Lophyrus rufus* Latreille, 1807
- =*Neodiprion rufus* Latreille, 1807
- =*Lophyrus piceae* Lepeletier, 1823
- =*Lophyrus piceae* Serville, 1823
- =*Lophyrus juniperi* Gimmerthal, 1836
- =*Lophyrus basalis* Matsumura, 1915

**Monocteninae**

*Monoctenus* sp. Dahlbom, 1835

*Monoctenus juniperi* (Linné, 1758)

- =*Tenthredo juniperi* Linné, 1758
- =*Tenthredo pterophorus* Sulzer, 1761
- =*Monoctenus andrei* Mocsáry, 1880

*Monoctenus obscuratus* (Hartig, 1837)

- =*Tenthredo hirsuta* Poda, 1761
- =*Lophyrus obscuratus* Hartig, 1837

=*Monoctenus hirsutus* W. F. Kirby, 1882

## TENTHREDINIDAE

### Athaliinae

#### Athaliini

*Athalia* sp. Leach, 1817

=*Dentathalia* sp. Benson, 1931

*Athalia ancilla* Audinet-Serville, 1823

=*Athalia glabricollis* Thomson, 1870

=*Athalia glabricollis* var. *bulgarica* Gregor, 1932

*Athalia bicolor* Audinet-Serville, 1823

=*Athalia bicolor* var. *nigritegulis* Enslin, 1918

=*Athalia richardi* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo annulata* Fabricius, 1787, nec Geoffroy, 1785

=*Tenthredo rosae* auct., nec Linné, 1758, p. p.

*Athalia chevini* Lacourt, 1985

*Athalia circularis* (Klug, 1815)

=*Athalia alpina* Chevin, 1969

=*Athalia bolivari* Dusmet, 1896

=*Athalia lineolata* Audinet-Serville, 1823

=*Athalia lineolata cordatoides* Priesner, 1928

=*Athalia lineolata libertoides* Priesner, 1928

=*Athalia longifoliae* Kontuniemi, 1951

=*Tenthredo rosae* auct., nec Linné, 1758, p. p.

*Athalia cordata* Audinet-Serville, 1823

=*Athalia blanchardi* Brullé in Le Peletier, 1846

=*Athalia lineolata* var. *analisis* Enslin, 1913

=*Athalia lineolata* var. *cordata* Enslin, 1913

=*Athalia rosae* var. *obscura* Konow, 1884

=*Athalia suessionensis* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo rosae* auct., nec Linné, 1758, p. p.

*Athalia cornubiae* Benson, 1931

*Athalia liberta* (Klug, 1815)

=*Athalia rosae* var. *immaculata* Konow, 1884

=*Tenthredo rosae* auct., nec Linné, 1758, p. p.

=*Tenthredo rosae* var. *liberta* Klug, 1815

*Athalia lugens* (Klug, 1815)

=*Athalia colibri* var. *kuroiwa* Matsumura & Uchida, 1926

=*Athalia lugens* var. *camtschatica* Forsius, 1928

=*Athalia lugens* var. *flavoscutellata* Enslin, 1918

=*Athalia lugens* var. *tristis* Forsius, 1934

=*Athalia proxima* var. *funebri* Forsius, 1925

=*Athalia spinarum* var. *orientalis* Cameron, 1877

=*Athalia tibialis* Cameron, 1876

=*Phyllotoma infumata* Marlatt, 1898

=*Tenthredo (Allantus) proxima* Klug, 1815

*Athalia nevadensis* Lacourt, 1978

*Athalia paradoxa* Konow, 1886

*Athalia rosae* (Linné, 1758)

- = *Tenthredo centifoliae* Panzer, 1798
- = *Tenthredo colibri* Christ, 1791
- = *Tenthredo salicis* Schrank, 1781, *nec* Linné, 1758
- = *Tenthredo spinarum* Fabricius, 1775

*Athalia rufoscutellata* Mocsary, 1879

- = *Athalia maculata* Mocsary, 1879
- = *Athalia maritima* Kirby, 1884
- = *Athalia rufoscutellata* var. *mocsaryi* Konow, 1891
- = *Athalia rufoscutellata* var. *nigroscutellata* Konow, 1891
- = *Athalia rufoscutellata* var. *obscurata* Konow, 1904
- = *Athalia rufoscutellata* var. *pleuralis* Konow, 1898

*Athalia scutellariae* Cameron, 1880

- = *Athalia galericulatae* Kontuniemi, 1951
- = *Athalia lineolata* Enslin, 1913, *nec* Audinet-Serville, 1823, *p. p.*

***Blennocampinae* Konow, 1890**

***Blennocampini* Rohwer, 1911**

*Ardis* sp. Konow, 1886

- = *Valco* sp. Ross, 1937

*Ardis pallipes* Audinet-Serville, 1823

- = *Aphanisus odoratus* MacGillivray, 1908
- = *Aphanisus parallelus* MacGillivray, 1923
- = *Ardis brunniventris* Hartig, 1837
- = *Ardis brunneiventris* Hartig, 1837
- = *Monophadnus dissimilis* Costa, 1859
- = *Selandria irrogata* Cresson, 1880
- = *Tenthredo* (*Monophadnus*) *brunniventris* Hartig, 1837
- = *Tenthredo bipunctata* Klug, 1817, *nec* Gmelin, 1790

*Blennocampa* sp. Hartig, 1837

*Blennocampa phyllocolpa* Viitasaari & Vikberg, 1985

- = *Blennocampa pusilla* Klug, 1816
- = *Tenthredo pusilla* Klug, 1816, *nec* Müller, 1776

*Cladardis* sp. Benson, 1952

*Cladardis elongatula* (Klug, 1817)

*Claremontia* sp. Rohwer, 1909

- = *Pseudoblennocampa* sp. Malaise, 1935

*Claremontia alternipes* (Klug, 1816)

- = *Blennocampa divisa* Konow, 1884
- = *Blennocampa finitima* Konow, 1900
- = *Blennocampa intermedia* Kriechbaumer, 1885, *nec* Cameron, 1883
- = *Blennocampa tergestina* Kriechbaumer, 1888
- = *Tenthredo cinereipes* auct., *nec* Klug, 1816, *p. p.*
- = *Tenthredo maura* Schrank, 1801, *nec* Fabricius, 1793

*Claremontia brevicornis* (Brischke, 1883)

- = *Blennocampa confusa* Konow, 1886
- = *Blennocampa mixta* Malaise, 1920
- = *Claremontia confusa* Konow, 1886
- = *Selandria geniculata* auct., *nec* Stephens, 1835
- = *Tenthredo alternipes* Thomson, 1870, *nec* Klug, 1816
- = *Tenthredo cinereipes* auct., *nec* Klug, 1816, *p. p.*

*Claremontia puncticeps* (Konow, 1886)

*Claremontia tenuicornis* (Klug, 1814)

=*Blennocampa spireae* Brischke, 1883

=*Phyllotoma conformis* Fallén, 1829

=*Selandria tibialis* Stephens, 1835

*Claremontia uncta* (Klug, 1816)

=*Blennocampa alchemillae* Cameron, 1876

=*Blennocampa lioparea* Konow, 1884

=*Blennocampa tenuicornis* var. *humeralis* auct.

=*Selandria humeralis* Snellen van Vollenhoven, 1869

*Claremontia waldheimii* (Gimmerthal, 1847)

=*Blennocampa subcana* var. *angularis* Konow, 1895

=*Blennocampa subserrata* Thomson, 1870

=*Monophadnus albipes* auct., nec Gmelin, 1799, p. p.

=*Selandria subcana* Zaddach, 1859

*Monardis* sp. Enslin, 1914

*Monardis plana* (Klug, 1817)

=*Blennocampa rosarum* Brischke, 1883

=*Tenthredo* (*Monophadnus*) *sericans* Hartig, 1837

*Monophadnoides* sp. Ashmead, 1898

=*Pseudomonophadnus* sp. Malaise, 1935

*Monophadnoides rubi* (Harris, 1845)

=*Aphanisus lenis* Rohwer, 1909

=*Aphanisus nigrinus* MacGillivray, 1908

=*Blennocampa gilletei* Weldon, 1907

=*Monophadnoides cirytus* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides collaris* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides concessus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides consobrinus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides consonus* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides conspercus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides conspicuus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides constitutus* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides coracinus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides costalis* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides crassus* MacGillivray, 1908

=*Monophadnoides curiosus* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides geniculata* Hartig, 1837

=*Monophadnoides kindcaidi* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides obversus* MacGillivray, 1923

=*Monophadnoides shawi* MacGillivray, 1923

=*Monophadnus atricornis* MacGillivray, 1893

=*Monophadnus geniculata* auct.

=*Monophadnus hudsonicus* Kirby, 1882

=*Selandria nigella* Cresson, 1880

=*Tenthredo geniculata* Hartig, 1837, nec Geoffroy, 1785

=*Tenthredo longicornis* Hartig, 1837, nec Geoffroy, 1785

*Monophadnoides ruficruris* (Brullé, 1832)

*Pareophora* sp. Konow, 1886

*Pareophora collaris* Chevin, 1983

*Pareophora pruni* (Linné, 1758)

=*Tenthredo luridiventris* Klug, 1816

=*Tenthredo nigripes* Klug, 1816

*Periclista* sp. Konow, 1886

=*Apericlista* sp. Enslin, 1914  
=*Aphanisus* sp. MacGillivray, 1908  
=*Cornaria* sp. Malaise, 1964  
=*Isodyctium* sp. Ashmead, 1898  
=*Mogerus* sp. MacGillivray, 1895  
=*Neocharactus* sp. MacGillivray, 1908  
=*Neoclista* sp. Malaise, 1964

*Neocharactus* sp. MacGillivray, 1908

*Periclista (Neocharactus) albipennis* (Zaddach, 1859)

*Periclista* sp. Konow, 1886

*Periclista (Periclista) albida* (Klug, 1816)

=*Monophadnus inquilinus* Förster, 1844

=*Selandria fulvicollis* Stephens, 1835

=*Selandria melanosterna* Blanchard, 1840

=*Selandria versicolor* Newman, 1837

=*Tenthredo (Selandria) testacea* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo melanocephala* Fabricius, 1798, *nec* Geoffroy, 1785

*Periclista (Periclista) andrei* Konow, 1936

=*Periclista balcana* Enslin, 1814

*Periclista (Periclista) lineolata* (Klug, 1816)

=*Monophadnus tenuicingulatus* Costa, 1859

*Periclista (Periclista) pilosa* Chevin, 1971

*Periclista (Periclista) pubescens* (Zaddach, 1859)

=*Periclista pubescens* var. *analis* Konow, 1886

*Periclista (Periclista) vernalis* Lacourt, 1985

### ***Eriocampini* Rohwer, 1911**

*Eriocampa* sp. Hartig, 1837

*Eriocampa ovata* (Linné, 1761)

=*Eriocampa ovata nitens* Benson, 1968

=*Tenthredo glossypina* Retzius, 1783

=*Tenthredo leucogona* Schrank, 1802

=*Tenthredo vernalis* Geoffroy, 1785

*Eriocampa umbratica* (Klug, 1816)

=*Phyllotoma nigrita* Fallén, 1829

### ***Harpiphorini* Lacourt, 1999**

*Harpiphorus* sp. Hartig, 1837

=*Asticta* sp. Newman, 1838

*Harpiphorus lepidus* (Klug, 1818)

=*Asticta janthe* Newman, 1837

=*Fenusa janthe* Newman, 1837

### ***Phymatocerini* Rohwer, 1911**

*Chevinia* sp. Lacourt, 2003

*Chevinia mediterranea* Lacourt, 2003

*Eurhadinoceraea* sp. Enslin, 1920

=*Sterigmos* sp. Zombori, 1977

*Eurhadinoceraea athalioides* (Jakovlev, 1892)

=*Rhadoniceraea singularis* Konow, 1897

=*Sterigmos athalioides* Jakovlev, 1892

*Eurhadinoceraea ventralis* (Panzer, 1799)

=*Blennocampa coronata* André, 1881

=*Monophadnus lugubripennis* Costa, 1894

=*Monophadnus rufoniger* Tischbein, 1852

=*Sterigmos ventralis* Panzer, 1799

*Eutomostethus* sp. Enslin, 1914

=*Atomostethus* sp. Enslin, 1913

=*Forsia* sp. Malaise, 1931

=*Tomostethopsis* sp. Sato, 1928

*Eutomostethus ephippium* (Panzer, 1798)

=*Tenthredo dubia* Gmelin, 1790, nec Ström, 1768

=*Tenthredo inhabilis* Harris, 1835

=*Tenthredo ovata* Schrank, 1781, nec Linné, 1761

*Eutomostethus gagathinus* (Klug, 1816)

=*Eutomostethus gagathinus meridionalis* Benson, 1954

*Eutomostethus luteiventris* (Klug, 1816)

=*Hylotoma assimilis* Fallén, 1807, p. p.

=*Tenthredo (Selandria) fiscipennis* Audinet-Serville, 1823

*Eutomostethus punctatus* (Konow, 1887)

*Monophadnus* sp. Hartig, 1837

=*Doderia* sp. Malaise, 1935

*Monophadnus alpicola* Benson, 1954

*Monophadnus latus* A. Costa, 1894

=*Monophadnus monticola sensu auct. gallica* nec Hartig, 1837

*Monophadnus pallescens* (Gmelin, 1790)

=*Blennocampa emarginata* Thomson, 1871

=*Monophadnus bipunctuatus* MacGillivray, 1908, nec Klug, 1817

=*Monophadnus furvus* Benson, 1930, nec Konow, 1898

=*Monophadnus rosarum* Konow, 1886, nec Brischke, 1883

=*Selandria tiliae* Norton, 1861

=*Tenthredo albipes* Gmelin, 1790, nec Geoffroy, 1785

=*Tenthredo morio* Rossi, 1790, nec Fabricius, 1781

*Monophadnus spinolae* (Klug, 1816)

=*Blennocampa scutellaris* André, 1881

=*Hylotoma ventralis* Spinola, 1806, nec Panzer, 1899

=*Monophadnus gastricus* Costa, 1859

=*Monophadnus pleuriticus* Costa, 1859

=*Monophadnus spinolae* var. *pectoralis* Konow, 1886

=*Monophadnus spinolae* var. *ruberrima* Enslin, 1914

=*Monophadnus spinolae* var. *rufipectus* Enslin, 1914

=*Monophadnus ventralis* Costa, 1859

=*Periclista nigricarpa* Costa, 1894

=*Tenthredo (Allantus) bipartita* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo croceiventris* Klug, 1816

*Paracharactus* sp. MacGillivray, 1908

*Dicrostema* sp. Benson, 1952

*Paracharactus (Dicrostema) gracilicornis* (Zaddazch, 1859)

*Paracharactus* sp. MacGillivray, 1908

*Paracharactus (Paracharactus) hyalinus* (Konow, 1886)

*Phymatocera* sp. Dahlbom, 1835

*Phymatocera aterrima* (Klug, 1816)

- = *Selandria robinsonii* Curtis, 1850
- = *Tenthredo (Allantus) trichocera* Audinet-Serville, 1823
- = *Tenthredo fuliginosa auct., nec* Schrank, 1781

*Rhadinoceraea* sp. Konow, 1886

= *Veratra* sp. Smith, 1969

*Rhadinoceraea bensoni* Benes, 1961

*Rhadinoceraea micans* (Klug, 1814)

= *Monophadnus iridis* Kaltenbach, 1862

= *Tenthredo (Allantus) nigrita* Fabricius, 1804 *sensu* Audinet-Serville, 1823

*Rhadinoceraea nodicornis* Konow, 1886

= *Rhadinoceraea heydeni* Konow, 1887

*Stethomostus* sp. Benson, 1939

*Stethomostus fuliginosus* (Schrank, 1781)

= *Blennocampa aethiops* Brischke, 1883

= *Blennocampa croceipes* Costa, 1864

= *Monophadnus fukaii* Rohwer, 1910

= *Selandria geniculata* Stephens, 1835

= *Tenthredo (Selandria) fusca* Audinet-Serville, 1823

*Stethomostus funereus* (Klug, 1816)

***Tomostethini* Benson, 1938**

*Tomostethus* sp. Konow, 1886

*Tomostethus nigritus* (Fabricius, 1804)

= *Tenthredo (Allantus) brevicornis* Klug, 1816

= *Tenthredo (Allantus) nigerrima* Klug, 1816

= *Tenthredo (Selandria) fraxini* Audinet-Serville, 1823

***Waldheimiini* Smith, 1969**

*Halidamia* sp. Benson, 1939

*Halidamia affinis* (Fallén, 1808)

= *Blennocampa affinis* var. *pleuritica* Enslin, 1914

= *Blennocampa assimilis* Thomson, 1870

= *Blennocampa formosella* Costa, 1882

= *Tenthredo hyalina* Klug, 1816

***Caliroinae* Lacourt, 1998**

***Caliroini* Benson, 1938**

*Caliroa* sp. A. Costa, 1859

= *Eriocampoides* sp. Konow, 1890

= *Periclistoptera* sp. Ashmead, 1898

*Caliroa annulipes* (Klug, 1816)

= *Eriocampa myrtilli* Brischke, 1889

= *Selandria atra* Stephens, 1835

*Caliroa cerasi* (Linné, 1758)

= *Caliroa lacinata* MacGillivray, 1909

= *Caliroa laudata* MacGillivray, 1909

= *Monostegia antipoda* Kirby, 1881

- = *Tenthredo adumbrata* Klug, 1816
- = *Tenthredo aethiops* auct., nec Fabricius, 1781
- = *Tenthredo limacina* Retzius, 1783

*Caliroa cinxia* (Klug, 1816)

*Caliroa cothurnata* (Audinet-Serville, 1823)

- = *Caliroa cinxia sensu* Chevin, 1974
- = *Caliroa cinxia* auct., nec Klug, 1816, p. p.
- = *Caliroa sebetia* Costa, 1859

*Caliroa tremulae* Chevin, 1974

*Caliroa varipes* (Klug, 1816)

- = *Eriocampa crassicornis* Tischbein, 1846

*Endelomyia* sp. Ashmead, 1898

*Endelomyia aethiops* (Gmelin, 1790)

*Endelomyia filipendulae* Lacourt, 1998

**Cladiinae Ashmead, 1898**

**Cladiini Rohwer, 1911**

*Cladius* sp. Illiger, 1807

*Cladius pectinicornis* (Geoffroy, 1785)

- = *Cladius comari* Stein, 1886
- = *Cladius difformis* Panzer, 1799
- = *Cladius geoffroyi* Audinet-Serville, 1823
- = *Cladius gracilicornis* Konow, 1884
- = *Cladius hyalinipterus* Konow, 1886
- = *Cladius isomerus* Norton, 1861
- = *Cladius major* Cobelli, 1892
- = *Cladius morio* Audinet-Serville, 1823
- = *Cladius ordubadensis* Konow, 1892
- = *Cladius orientalis* Cameron, 1902
- = *Cladius palmicornis* Konow, 1892
- = *Cladius ramicornis* André, 1880
- = *Cladius rufipes* Blanchard, 1840
- = *Cladius tibialatus* Konow, 1906
- = *Nematus crassicornis* Stephens, 1835
- = *Tenthredo alces* Thünberg, 1789

*Priophorus* sp. Dahlbom, 1835

- = *Stevenia* sp. Brullé, 1946

*Priophorus brullei* Dahlbom, 1835

- = *Cladius parvus* Zaddach in Brischke, 1883
- = *Cladius tener* Zaddach, 1859
- = *Cladius tristis* Zaddach, 1859
- = *Priophorus montanus* Rohwer, 1922
- = *Priophorus rubi* Rohwer, 1922
- = *Priophorus rubivorus* Rohwer, 1922

*Priophorus pallipes* (Audinet-Serville, 1823)

- = *Cladius aequalis* Norton, 1872
- = *Cladius immunis* Stephens, 1835
- = *Cladius solitarius* Dyar, 1895
- = *Nematus melanostigma* Stephens, 1835
- = *Priophorus crataegi* Rohwer, 1922
- = *Priophorus discor* Konow, 1894
- = *Priophorus modestius* MacGillivray, 1921

=*Priophorus munditus* MacGillivray, 1921  
= *Priophorus padi* var. *collaris* Enslin, 1915  
= *Priophorus padi* var. *pallidistigma* Lindqvist, 1941  
= *Priophorus plesius* Rohwer, 1922  
= *Priophorus pruni* Rohwer, 1922  
= *Priophorus virginianus* Rohwer, 1922  
= *Tenthredo albipes* Fallén, 1808, *nec* Gmelin, 1790, *nec* Geoffroy, 1785  
= *Tenthredo padi* auct., *nec* Linné, 1758

*Priophorus pilicornis* (Curtis, 1833)

= *Cladius derwseni* Thomson, 1871  
= *Cladius eradiatus* Hartig, 1837  
= *Priophorus distinguendus* Enslin, 1915

*Priophorus rufipes* (Audinet-Serville, 1823)

= *Cladius discrepans* Costa, 1859  
= *Priophorus phaenopterus* Costa, 1894  
= *Tenthredo ulmi* auct., *nec* Linné, 1758  
= *Trichiocampus garbigliettii* Costa, 1862  
= *Trichiocampus uncinnata* Hartig, 1837

*Priophorus ulmi* (Linné, 1758)

= *Priophorus laevifrons* Benson, 1936

*Trichiocampus* sp. Hartig, 1837

= *Cladius* sp. auct., p. p.

*Trichiocampus grandis* (Audinet-Serville, 1823)

= *Aulacomerus lutescens* Lintner, 1888  
= *Cladius eucera* Bouché, 1834  
= *Cladius luteicornis* Stephens, 1835  
= *Cladius luteiventris* Dahlbom, 1836  
= *Platycampus victoria* MacGillivray, 1920  
= *Tenthredo viminalis* Fallén, 1808, *nec* Schrank, 1796  
= *Trichiocampus viminalis* Fallén, 1808

***Emphytinae* MacGillivray, 1906**

***Allantini* Rohwer, 1911**

*Allantus* sp. Panzer, 1801

= *Allantus* sp. auct., p. p.  
= *Anemphytus* sp. Dovnar-Zapolskij, 1930  
= *Emphytus* sp. auct., p. p.  
= *Synemphytus* sp. Malaise, 1945

*Allantus togatus* (Panzer, 1801)

= *Emphytus succinctus* var. *steini* Schmiedeknecht, 1881  
= *Emphytus togatus* var. *succinctus* auct.  
= *Tenthredo succincta* Klug, 1817

*Allantus viennensis* (Schrank, 1781)

= *Allantus viennensis* var. *uberior* Enslin, 1914  
= *Emphytus viennensis* var. *medinae* Konow, 1894  
= *Emphytus viennensis* var. *nigricoxis* De Stefani, 1883

*Apethymus* sp. Benson, 1939

= *Kjellia* sp. Malaise, 1947

*Apethymus apicalis* (Klug, 1818)

= *Apethymus serotinus* auct., *nec* Müller, 1776  
= *Emphytus filiformis* auct., *nec* Klug, 1818, p. p.

=*Emphytus klugii* Thomson, 1871

*Apethymus filiformis* (Klug, 1818)

=*Apethymus abdominalis* auct., p. p.

=*Dolerus abdominalis* Audinet-Serville, 1823

=*Emphytus autumnalis* Forsius, 1933

=*Emphytus serotinus* var. *melanopus* Ulbricht, 1913

=*Emphytus temesiensis* Mocsary, 1879

=*Tenthredo* (*Emphytus*) *serotina* Klug, 1818, nec Müller, 1776

=*Tenthredo melas* Rudow, 1871

=*Tenthredo tarsata* Zetterstedt, 1819, nec Fabricius, 1804

*Apethymus serotinus* (Müller, 1776)

=*Apethymus braccatus* Gmelin, 1790

=*Emphytus caligatus* Eversmann, 1847

=*Tenthredo braccata* Gmelin, 1790

=*Tenthredo tibialis* Panzer, 1799, nec Villers, 1789

=*Tenthredo varicornis* Gmelin, 1790

*Emphytus* sp. Klug, 1818

=*Allantus* sp. auct., p. p.

*Emphytus basalis* (Klug, 1818)

=*Emphytus basalis caledonicus* (Benson, 1945)

=*Emphytus togatus* Stephens, 1835, nec Panzer, 1801, p. p.

*Emphytus calceatus* (Klug, 1818)

=*Dolerus vicinus* Audinet-Serville, 1823

=*Emphytus dissimilis* Dietrich, 1868, p. p.

=*Hylotoma vitis* Vallot, 1843

*Emphytus cinctus* (Linné, 1758)

=*Dolerus cingulatus* Audinet-Serville, 1823

=*Dolerus varipes* Audinet-Serville, 1823

=*Emphytus cinctipes* Norton, 1867

=*Emphytus neglectus* Zaddach, 1859

=*Tenthredo cordigera* Geoffroy, 1785

=*Tenthredo togata* Zetterstedt, 1840, nec Panzer, 1801

*Emphytus cingillum* (Klug, 1818)

*Emphytus cingulatus* (Scopoli, 1763)

=*Allantus cingulatus* var. *muliebris* Enslin, 1914

=*Dolerus cingulatus* Le Peletier, 1823

=*Emphytus cinctus* auct., p. p.

=*Emphytus cingulatus* var. *masculus* Dovnar-Zapolskij, 1930

=*Emphytus elegans* Costa, 1859

=*Tenthredo tenuis* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo togata* Fabricius, 1804, nec Panzer, 1801

*Emphytus didymus* (Klug, 1818)

=*Dolerus testaceipes* Audinet-Serville, 1823

=*Emphytus didymus* var. *niger* Konow, 1904

=*Emphytus fumatus* André, 1880

=*Emphytus nigritarsis* Brullé, 1832

=*Emphytus proximus* Costa, 1859

=*Emphytus ruficus* Mocsary, 1880

=*Emphytus tegulatus* André, 1881

*Emphytus laticinctus* (Audinet-Serville, 1823)

=*Emphytus balteatus* Klug, 1818

=*Emphytus balteatus* var. *albimaculatus* Zirngiebl, 1937

=*Emphytus balteatus* var. *marginalis* Zirngiebl, 1954

=*Emphytus balteatus* var. *nigripes* Konow, 1897

=*Emphytus balteatus* var. *nigrolinearis* Zirngiebl, 1937

=*Emphytus bucculentus* Tischbein, 1846

=*Emphytus fulvocinctus* Rudow, 1872

=*Tenthredo balteata* Klug, 1818 p. 287, *nec* Klug, 1817

*Emphytus melanarius* (Klug, 1818)

=*Emphytus tricoloripes* Costa, 1859

*Emphytus rufocinctus* (Retzius, 1783)

=*Dolerus fasciatus* Audinet-Serville, 1823

=*Taxonus ruralis* Dahlbom, 1835

=*Tenthredo cingulum* Spinola, 1806

=*Tenthredo pavidata* Fabricius, 1804

*Emphytus truncatus* (Klug, 1818)

=*Emphytus cchoenherrri* Dahlbom, 1835

=*Emphytus cingillum* Thomson, 1871, *nec* Klug, 1818

=*Tenthredo angustata* Zetterstedt, 1840

=*Tenthredo fulvipes* Fallén, 1829, *nec* Fallén, 1808, *nec* Scopoli, 1763

*Emphytus xanthopygus* (Klug, 1818)

*Eopsis* sp. Benson, 1959

*Eopsis beaumonti* Benson, 1959

=*Monosoma mosquense* Zhelochovtsev, 1981

*Taxonus* sp. Hartig, 1837

=*Allomorpha* sp. Cameron, 1876

=*Ermilia* sp. Costa, 1859

=*Hypotaxonus* sp. Ashmead, 1898

=*Parasiobla* sp. Ashmead, 1898

=*Strongylogastroidea* sp. Ashmead, 1898

*Taxonus agrorum* (Fallén, 1808)

=*Ermilia pulchella* Costa, 1859

=*Perineura dualis* Förster, 1844

=*Strongylogaster rubrofasciatus* palma, 1861

=*Taxonus creperus* Konow, 1900

=*Tenthredo anomala* Eversmann, 1847

=*Tenthredo nitidia* Klug, 1817

=*Tenthredo subjecta* Eversmann, 1847

*Empriini* Rohwer, 1911

*Ametastegia* sp. A. Costa, 1882

=*Allantus* sp. auct., p. p.

=*Aomodyctium* sp. Ashmead, 1898

=*Emphytina* sp. Rohwer, 1911

=*Emphytus* sp. auct., p. p.

=*Protemphytus* sp. Rohwer, 1909

=*Simplemphytus* sp. MacGillivray, 1914

=*Taxonus* sp. auct., p. p.

=*Unitaxonus* sp. MacGillivray, 1921

*Ametastegia* sp. Costa, 1882

*Ametastegia (Ametastegia) albipes* (Thomson, 1871)

=*Emphytus nigricans* Stephens, 1835, *nec* Klug, 1818

=*Eriocampa alabastripes* Costa, 1890

=*Taxonus albipes* Thomson, 1871

*Ametastegia (Ametastegia) equiseti* (Fallén, 1808)

=*Ametastegia equiseti* var. *coxalis* Hartig, 1837

=*Ametastegia equiseti* var. *stitia* Zirngiebl, 1954

=*Hemitaxonus dedititius* MacGillivray, 1923

=*Macrophyta angustula* Kawall, 1864

=*Strongylogastroidea depressata* MacGillivray, 1921

- =*Strongylogastroidea rufocinctella* MacGillivray, 1923
- =*Taxonus coxalis* Hartig, 1837
- =*Taxonus innominatus* MacGillivray, 1901
- =*Taxonus minutus* Costa, 1859
- =*Tenthredo (Allantus) gracilis* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo bicolor* Klug, 1817
- =*Tenthredo bizonata* Zetterstedt, 1838
- =*Unitaxonus repentinus* MacGillivray, 1921
- =*Unitaxonus rumicis* MacGillivray, 1921

*Ametastegia (Ametastegia) glabrata* (Fallén, 1808)

- =*Ametastegia fulvipes* Costa, 1882
- =*Strongylogaster abnormis* Provancher, 1885
- =*Strongylogastroidea potulenta* MacGillivray, 1923
- =*Taxonus nigrisoma* Norton, 1862
- =*Tenthredo (Allantus) rufipes* Audinet-Serville, 1823, *nec* Klug, 1817, *nec* Gmelin, 1790, *nec* Linné, 1758
- =*Tenthredo agilis* Klug, 1817

*Protemphytus* sp. Rohwer, 1909

*Ametastegia (Protemphytus) carpini* (Hartig, 1837)

- =*Allantus carpini* var. *decipiens* Enslin, 1914
- =*Emphytus arcticus* Neren, 1892
- =*Emphytus patellatus* Stephens, 1835, *nec* Klug, 1818
- =*Emphytus perla* var. *obscurus* Zirngiebl, 1954

*Ametastegia (Protemphytus) pallipes* (Spinola, 1808)

- =*Dolerus leucopodus* Audinet-Serville, 1823
- =*Emphytus canadense* Kirby, 1882
- =*Emphytus halesus* MacGillivray, 1923
- =*Emphytus heroicus* MacGillivray, 1923
- =*Emphytus hiatus* MacGillivray, 1923
- =*Emphytus hospitus* MacGillivray, 1923
- =*Emphytus hyacinthus* MacGillivray, 1923
- =*Emphytus pallidipes* Dalla Torre, 1894
- =*Empria cavata* MacGillivray, 1911
- =*Empria cetaria* MacGillivray, 1921
- =*Tenthredo grossulariae* Klug, 1818
- =*Tenthredo lapponica* Zetterstedt, 1838
- =*Tenthredo pallipes* Provancher, 1878, *nec* Spinola, 1808

*Ametastegia (Protemphytus) perla* (Klug, 1814)

- =*Emphytus bohemanni* Dahlbom, 1835

*Ametastegia (Protemphytus) tenera* (Fallén, 1808)

- =*Dolerus luctuosus* Audinet-Serville, 1823
- =*Dolerus nigrinus* Audinet-Serville, 1823
- =*Emphytina vanduzeei* Rohwer, 1915
- =*Emphytus haustus* MacGillivray, 1923
- =*Emphytus patellatus* Klug, 1818
- =*Empria columna* MacGillivray, 1923
- =*Empria haliartus* MacGillivray, 1923
- =*Simplemphytus pacificus* MacGillivray, 1914
- =*Taxonus gottianus* Cameron, 1874

*Empria* sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828

- =*Leucempria* sp. Enslin, 1913
- =*Parataxonus* sp. MacGillivray, 1908
- =*Poecilostoma* sp. Thomson, 1870, *nec* Huebner, 1819
- =*Poecilostoma* sp. Dahlbom, 1835
- =*Poecilostomidea* sp. Ashmead, 1898
- =*Prosecris* sp. Gistel, 1848
- =*Tetraneura* sp. Konow, 1905
- =*Tetratneura* sp. Ashmead, 1898

=*Triempria* sp. Enslin, 1914

*Empria alector* Benson, 1938

*Empria alpina* Benson, 1938

*Empria candidata* (Fallén, 1807)

=*Eriocampa repanda* auct.,

=*Leucempria candidata* auct.,

=*Parataxonus candidatus* auct.

=*Poecilosoma candidata* auct.,

=*Tenthredo repanda* Klug, 1816

*Empria excisa* (Thomson, 1871)

=*Empria africana* Forsius, 1919

*Empria granatensis* Lacourt, 1988

*Empria hungarica* (Konow, 1895)

=*Empria zacharovi* Dovnar-Zapolskij, 1929

*Empria immersa* (Klug, 1818)

=*Emphytus fenestratus* Eversmann, 1847

=*Emphytus majalis* Snellen van Vollenhoven, 1869

=*Harpiphorus immersus* auct.

=*Harpiphorus majalis* auct.

=*Tenthredo hybrida* Erichson, 1851, *nec* Eversmann, 1847

=*Tenthredo opacomaculata* Eversmann, 1847

*Empria liturata* (Gmelin, 1790)

=*Emphytus vernalis* Dietrich, 1868

=*Harpiphorus calderoni* Medina, 1888

=*Poecilosoma guttata* auct., p. p.

=*Poecilosoma submutica* Thomson, 1871

=*Poecilosoma undulata* Konow, 1885

=*Tenthredo guttata* Fallén, 1807

=*Tenthredo impressa* Klug, 1816

*Empria longicornis* (Thomson, 1871)

=*Empria rubi* Kontuniemi, 1951

*Empria pallimacula* (Audinet-Serville, 1823)

=*Empria baltica* Conde, 1940

=*Poecilosoma excisa* auct., *nec* Thomson, 1871

*Empria parvula* (Konow, 1892)

=*Empria kuznetzovi* Dovnar-Zapolskij, 1929

=*Empria pseudoklugi* Dovnar-Zapolskij, 1929

*Empria persephone* Benson, 1954

*Empria pumila* (Konow, 1896)

*Empria sexpunctata* (Audinet-Serville, 1823)

=*Empria klugii* auct.

=*Empria waldstaetterense* Liston, 1980

=*Poecilosoma carbonaria* Konow, 1884

=*Poecilosoma guttata* auct., p. p.

=*Selandria klugi* Stephens, 1835

=*Tenthredo guttata* auct., *nec* Fallén, 1807

=*Tenthredo morio* Schrank, 1782, *nec* Fabricius, 1781

*Empria tridens* (Konow, 1896)

*Monostegia* sp. Costa, 1859

=*Nematoceros* sp. Konow, 1896

=*Poecilosoma* sp. Thomson, 1870 p. p.

*Monostegia abdominalis* (Fabricius, 1798)

=*Athalia abdominalis* Audinet-Serville, 1823

=*Empria abdominalis* var. *rufinotis* Enslin, 1914

=*Eriocampa luteola* (Klug, 1816)

=*Monostegia martini* MacGillivray, 1908

- =*Monostegia nearctica* Rohwer, 1912
- =*Poecilosoma luteola* (Klug, 1816)
- =*Tenthredo luteola* Klug, 1816

*Monsoma* sp. MacGillivray, 1908

*Monsoma pulveratum* (Retzius, 1783)

- =*Harpiphorus taeniatus* Costa, 1869
- =*Poecilosoma pulverata* Retzius, 1783
- =*Poecilostoma pulverata* Retzius, 1783
- =*Selandria pulchella* Stephens, 1835
- =*Tenthredo leucozonius* Hartig, 1837
- =*Tenthredo limbata* Gmelin, 1790
- =*Tenthredo liturata* André, 1882, *nec* Gmelin, 1790
- =*Tenthredo obesa* Klug, 1817
- =*Tenthredo segmentata* Zetterstedt, 1838

*Fenusinae* MacGillivray, 1906

*Fenusini* MacGillivray, 1906

*Fenella* sp. Westwood, 1840

*Fenella minuta* (Dahlbom, 1835)

- =*Fenella voighti* Hering, 1932

*Fenella nigrita* Westwood, 1840

- =*Fenusa agrimoniae* Brischke, 1888
- =*Fenusa pygmaea* Healy, 1869, *nec* Klug, 1816
- =*Melinia minutissima* Costa, 1859
- =*Phyllotoma tormentilliae* Healy, 1868
- =*Tenthredo intercus* Villers, 1789, *nec* Linné, 1761

*Fenusa* sp. Leach, 1817

- =*Aphadnurus* sp. Costa, 1859
- =*Kaliosysphinga* sp. Konow, 1905
- =*Kaliosysphinga* sp. Tischbein, 1846
- =*Lithoryssus* sp. Brues, 1906
- =*Phaenusa* sp. Cameron, 1875, *p. p.*
- =*Phoenusa* sp. André, 1880

*Fenusa dohrnii* (Tischbein, 1846)

- =*Fenella westwoodi* Cameron, 1882
- =*Fenusa curtus* Norton, 1862
- =*Fenusa nigricans* Thomson, 1870
- =*Fenusa pumila* Klug, 1816, *sensu* Brischke, 1883
- =*Kaliosysphinga dohrnii* Tischbein, 1846
- =*Phaenusa melanopoda* Cameron, 1876

*Fenusa pumila* Leach, 1817

- =*Aphadnurus tantillus* Costa, 1859
- =*Fenusa betulae* Zaddach, 1859
- =*Fenusa fuliginosa* Healy, 1869
- =*Fenusa minima* Brischke, 1883
- =*Tenthredo (Emphytus) pumila* Klug, 1818 p. 277, *nec* Klug, 1816 p. 72
- =*Tenthredo pygmaea* Zetterstedt, 1838, *nec* Klug, 1818

*Fenusella* sp. Enslin, 1912

- =*Melanobates* sp. MacGillivray, 1916
- =*Messa* sp. *auct.*, *nec* Leach, 1817

*Fenusella glaucopis* (Konow, 1907)

=*Messa glaucopis* Konow, 1907

*Fenusella hortulana* (Klug, 1818)

=*Fenusa ticinensis* Magretti, 1886

=*Messa hortulana* Klug, 1818

=*Phaenusa doederleini* De Stefani, 1883

*Fenusella nana* (Klug, 1818)

=*Fenusa quercus* Cameron, 1885

=*Messa nana* Klug, 1818

=*Scolioneura laeta* Enslin, 1917

*Hinatara* sp. Benson, 1936

=*Fenusella* sp. Enslin, 1914, p. p.

*Hinatara recta* (Thomson, 1871)

*Kaliofenusa* sp. Viereck, 1910

*Kaliofenusa pusilla* (Audinet-Serville, 1823)

=*Fenusa altenhoferi* Liston, 1993

=*Fenusa intermedia* Thomson, 1871

=*Fenusa pusilla* Le Peletier, 1823

=*Fenusa ulmi* Sundevall, 1847

=*Kaliofenusa altenhoferi* Liston, 1993

=*Kaliofenusa carpiniifoliae* Liston, 1993

=*Kaliofenusa pusilla laevinota* Benson, 1968

=*Messa alsia* MacGillivray, 1923

*Metallus* sp. Forbes, 1885

=*Entodecta* sp. Konow, 1886

=*Phaenusa* sp. Cameron, 1875, p. p.

=*Polybates* sp. MacGillivray, 1909

*Metallus lanceolatus* (Thomson, 1870)

=*Entodecta decolor* Konow, 1886

=*Metallus bensoni* Smith, 1971

=*Metallus gei* Brischke, 1883

=*Metallus gei* var. *egregius* Zirngiebl, 1963

*Metallus pumilus* (Klug, 1816)

=*Emphytus (Fenusa) pumilio* Hartig, 1837

=*Fenusa rubi* Boie, 1848

*Parna* sp. Benson, 1936

*Parna reseri* Liston, 1993

=*Parna kamijoi* Togashi, 1980 *sensu* Chevin, 1983

=*Parna tenella* auct., nec Klug, 1816, p. p.

*Parna tenella* (Klug, 1816)

=*Blennocampa albida* Thomson, 1870

=*Blennocampa apicalis* Brischke, 1888

=*Blennocampa tiliae* Kaltenbach, 1874

=*Tenthredo tenuicornis* auct., nec Klug, 1816

*Profenusa* sp. MacGillivray, 1914

=*Gunneana* sp. Malaise, 1964

=*Parafenusa* sp. Zhelochovtsev, 1976

*Profenusa pygmaea* (Klug, 1816)

*Profenusa thomsoni* (Konow, 1886)

=*Fenusa pumilio* Thomson, 1871, nec Hartig, 1837

=*Profenusa alumna* auct., nec MacGillivray, 1923

*Scolioneura* sp. Konow, 1890

*Scolioneura betuleti* (Klug, 1816)

=*Fenusa betulae* auct., nec Zaddach, 1859

=*Phyllotoma melitta* Newman, 1870

=*Tenthredo nigricans*(?) Klug, 1818, nec Christ, 1791

*Silliana* sp. Malaise, 1949

=*Syringophilus* sp. Hering, 1934, nec Heller, 1880

*Silliana Ihommei* (Hering, 1934)

## **Heterarthrinae Ross, 1951**

### **Heterarthrini Ross, 1951**

*Heterarthrus* sp. Stephens, 1835

*Heterarthrus aceris* (Kaltenbach, 1856)

=*Heterarthrus fumipennis* Cameron, 1888

*Heterarthrus microcephalus* (Klug, 1818)

=*Phyllotoma melanopyga* Healy, 1868, nec Klug, 1818

*Heterarthrus nemoratus* (Fallén, 1808)

=*Fenusa parviceps* Newman, 1837

=*Phlebotrophia mathewsoni* MacGillivray, 1909

=*Phyllotoma nemoralis* Fallén, 1829

=*Phyllotoma tenella* Zaddach, 1859

*Heterarthrus ochropoda* (Klug, 1818)

=*Decatria fuscipennis* Stephens, 1835

=*Phyllotoma maxima* Strobl, 1896

=*Phyllotoma pinguis* Snellen van Vollenhoven, 1869

*Heterarthrus vagans* (Fallén, 1808)

=*Heterarthrus vagans anatolicus* Mucche, 1983

=*Phyllotoma leucopoda* Dahlbom, 1835

=*Phyllotoma kamtchatica* Malaise, 1932

=*Tenthredo amaura* Klug, 1818

=*Tenthredo melanopyga* Klug, 1818

## **Hoplocampinae Konow, 1890**

### **Hoplocampini Rohwer, 1911**

*Hoplocampa* sp. Hartig, 1837

*Hoplocampa alpina* (Zetterstedt, 1838)

=*Hoplocampa pallida* auct., nec Audinet-Serville, 1823

*Hoplocampa ariae* Benson, 1933

*Hoplocampa brevis* (Klug, 1816)

=*Tenthredo (Selandria) fallax* Audinet-Serville, 1823

*Hoplocampa cantoti* Chevin, 1986

*Hoplocampa chrysorrhoea* (Klug, 1816)

=*Hoplocampa chrysorrhoea* var. *nigrita* Enslin, 1914

=*Tenthredo crispinae* (?) Vallot, 1848

*Hoplocampa crataegi* (Klug, 1816)

=*Hoplocampa plagiata* Cameron, 1885, nec Klug, 1816

=*Tenthredo (Selandria) luteola* Audinet-Serville, 1823

*Hoplocampa flava* (Linné, 1746)

=*Hoplocampa apicaris* Kirby, 1882

=*Hoplocampa minuta* auct. angl., nec Christ, 1791  
=*Hylotoma ferruginea* Fabricius, 1804  
=*Hylotoma simplex* Fallén, 1807  
=*Tenthredo (Selandria) pallida* Audinet-Serville, 1823  
=*Tenthredo (Selandria) verticata* Audinet-Serville, 1823  
=*Tenthredo brunnea* Klug, 1816  
=*Tenthredo glaucopsis* Rossi, 1790  
=*Tenthredo pruni* Linné, 1758  
=*Tenthredo ruficapilla* Gmelin, 1790

*Hoplocampa fulvicornis* (Panzer, 1801)

=*Hoplocampa prunicola* Benson, 1968  
=*Hoplocampa rutilicornis* Klug, 1816  
=*Tenthredo (Allantus) rutilicornis* Klug, 1816  
=*Tenthredo (Selandria) haemorrhoidalis* Audinet-Serville, 1823

*Hoplocampa minuta* (Christ, 1791)

=*Tenthredo (Selandria) hylotomoides* Audinet-Serville, 1823  
=*Tenthredo (Selandria) parvula* Audinet-Serville, 1823  
=*Tenthredo fulvicornis* Fabricius, 1804  
=*Tenthredo turcarum* Vallot, 1848

*Hoplocampa pectoralis* Thomson, 1871

=*Holocampa oertzeni* Konow, 1888  
=*Hoplocampa ephipiata* Konow, 1897  
=*Hoplocampa gallicola* Cameron, 1878

*Hoplocampa plagiata* (Klug, 1816)

*Hoplocampa testudinea* (Klug, 1816)

*Nematinae* Thomson, 1871

*Hemichroini* Rohwer, 1911

*Dineura* sp. Dahlbom, 1835

*Dineura stilata* (Klug, 1816)

=*Dineura flaveola* Eversmann, 1847  
=*Dineura melanoxantha* Zaddach, 1883 in Brischke, 1883  
=*Dineura nigroflava* Magretti, 1886  
=*Dineura stillata* var. *virilis* Enslin, 1917  
=*Dineura sulcata* Konow, 1890  
=*Dineura sulcifrons* Konow, 1885  
=*Nematus apicalis* Stephens, 1835  
=*Nematus bicolor* Stephens, 1835, nec Audinet-Serville, 1823  
=*Nematus confusus* Förster, 1854  
=*Nematus danicus* Dahlbom, 1835  
=*Nematus posticus* Förster, 1854  
=*Nematus scapularis* Stephens, 1835  
=*Nematus xanthoceros* Hartig, 1840  
=*Nematus xanthopus* Zaddach, 1876  
=*Pristiphora oblita* Costa, 1894  
=*Tenthredo mediocris* Le Peletier, 1828

*Dineura testaceipes* (Klug, 1816)

=*Dineura nigra* Zaddach in Brischke, 1883  
=*Dineura stilata* Klug, 1816 sensu Zaddach in Brischke, 1883  
=*Dineura testaceipes* var. *nigriventris* Enslin, 1915  
=*Dineura ventralis* Zaddach, 1859

*Dineura virididorsata* (Retzius, 1783)

=*Dineura hartigi* Gimmerthal, 1844  
=*Dineura virididorsata* var. *dorsalis* Enslin, 1915  
=*Nematus varius* Audinet-Serville, 1823

- = *Tenthredo degeeri* Dahlbom, 1835
- = *Tenthredo geeri* Klug, 1816
- = *Tenthredo nigricans* Christ, 1791
- = *Tenthredo ulmi* Fallén, 1808, *nec* Linné, 1758

### *Hemichroa* sp. Stephens, 1835

- = *Engages* sp. Gistel, 1848
- = *Leptocerca* sp. Hartig, 1837
- = *Leptocercus* sp. Thomson p. p.
- = *Varna* sp. Ross, 1937

### *Hemichroa australis* (Audinet-Serville, 1823)

- = *Tenthredo alni* Linné, 1767, *nec* Linné, 1758

### *Hemichroa crocea* (Geoffroy, 1785)

- = *Dineura americana* Provancher, 1882
- = *Dineura pallida* Ashmead, 1890
- = *Dineura unicolor* Rudow, 1872
- = *Hemichroa dyari* Rohwer, 1918
- = *Hemichroa orientalis* Rohwer, 1921
- = *Hemichroa stigma* Stephens, 1835
- = *Hemichroa washingtonia* Rohwer & Middleton, 1932
- = *Leptocercus nigriceps* Thomson, 1871
- = *Nematus ardens* Zaddach in Brischke, 1883
- = *Tenthredo rufa* Panzer, 1799

### *Nematinus* sp. Rohwer, 1911

- = *Nematus* sp. Konow, *nec* Panzer, 1801

### *Nematinus acuminatus* (Thomson, 1871)

- = *Nematinus acuminatus* var. *thomsoni* Enslin, 1915
- = *Nematus nebulosus* Stein, 1881

### *Nematinus fuscipennis* (Panzer, 1805)

- = *Nematinus abdominalis* Panzer, 1799
- = *Nematus gravenhorsti* Gimmerthal, 1836
- = *Nematus ventralis* Hartig, 1837, *nec* Say, 1824
- = *Tenthredo abdominalis* Panzer, 1799, *nec* Fabricius, 1798
- = *Tenthredo rufa* Schrank, 1802 *nec* Panzer, 1799

### *Nematinus luteus* (Panzer, 1805)

- = *Nematinus willigkiae* Stein, 1926
- = *Nematus willigkiae pilosus* Benson, 1958
- = *Tenthredo lutea* Fabricius, 1804, *nec* Linné, 1758

### *Nematinus steini* Blank in Taeger & Blank, 1998

- = *Nematus antennatus* Cameron, 1877
- = *Nematus bilineatus* Cameron, 1877, *nec* Klug, 1819
- = *Nematus ruficapillus* Cameron, 1885 *nec* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo alneti* Bechstein & Scharfenberg, 1805, *nec* Schrank, 1781

### *Platycampus* sp. Schiödte, 1839

- = *Camponiscus* sp. Newman, 1869, p. p.
- = *Erasmus* sp. Gistel, 1848
- = *Leptocercus* sp. Thomson, 1871, p. p.
- = *Leptopus* sp. Hartig, 1837 *nec* Latreille, 1809

### *Platycampus luridiventris* (Fallén, 1808)

- = *Camponiscus healaei* Newman, 1869
- = *Leptopus hypogastricus* Hartig, 1837
- = *Leptopus rufipes* Förster, 1854
- = *Nematus alnicola* Zaddach in Brischke, 1883
- = *Nematus cellularis* Brischke, 1884

- =*Nematus fennicus* André, 1880
- =*Nematus niger* Stephens, 1835
- =*Nematus protensus* Förster, 1854
- =*Nematus rufipes* Tischbein, 1846
- =*Nematus tischbeini* André, 1880
- =*Platycampus luridiventris* var. *pleuritica* Enslin, 1915

### **Mesoneurini Zombori, 1982**

#### *Mesoneura* sp. Hartig, 1837

##### *Mesoneura opaca* (Fabricius, 1775)

- =*Dineura dorsalis* Förster, 1844
- =*Dineura pallipes* Hartig, 1837
- =*Dineura selandriiformis* Cameron, 1875
- =*Mesoneura opaca* var. *lucida* Enslin, 1914
- =*Mesoneura opaca* var. *nigerrima* Enslin, 1914
- =*Mesoneura opaca* var. *obscuriventris* Enslin, 1914
- =*Selandria biloba* Stephens, 1835
- =*Tenthredo* (*Selandria*) *punctigera* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo verna* Klug, 1816

### **Nematini Rohwer, 1911**

#### *Alpinematus* sp. Lacourt, 1996

##### *Alpinematus elongatulus* Lacourt, 1996

#### *Amauronematus* sp. Konow, 1890

##### *Amauronematus aeger* Konow, 1895

- =*Amauronematus dalecarlicus* Malaise, 1921

##### *Amauronematus alpicola* Konow, 1895

##### *Amauronematus amplus* Konow, 1895

##### *Amauronematus enslini* Lindqvist, 1959

##### *Amauronematus fasciatus* Konow, 1897

- =*Amauronematus perkinsi* Benson, 1933
- =*Amauronematus variabilis* auct., nec Malaise, 1932

##### *Amauronematus godmani* Benson, 1955

##### *Amauronematus hartigi* Saarinen, 1950

##### *Amauronematus hedstroemi* Malaise, 1931

- =*Amauronematus rex* Benson, 1948
- =*Amauronematus tillbergi* auct., nec Malaise, 1920

##### *Amauronematus histrio* (Audinet-Serville, 1823)

- =*Amauronematus histrio* var. *fallaciosus* Enslin, 1918
- =*Amauronematus histrio* var. *nigrescens* Enslin, 1915
- =*Amauronematus histrio* var. *rubens* Enslin, 1915
- =*Nematus glenelgensis* Cameron, 1882
- =*Nematus luteotergum* Norton, 1861
- =*Nematus rufescens* Hartig, 1837

##### *Amauronematus lateralis* Konow, 1895

- =*Amauronematus cameroni* Perkins, 1929
- =*Amauronematus piliserra* Lindqvist, 1943
- =*Amauronematus piliserra* var. *pallescens* Lindqvist, 1942
- =*Amauronematus piliserra* var. *thoracicus* Lindqvist, 1942
- =*Amauronematus trautmanni* Enslin, 1919

##### *Amauronematus longiserra* (Thomson, 1862)

- =*Nematus leucodous* Zaddach in Brischke, 1884

*Amauronematus mundus* Konow, 1895

*Amauronematus opacipleuris* Konow, 1895

*Amauronematus puniceus* (Christ, 1791)

=*Amauronematus excellens* Forsius, 1919

=*Amauronematus nigradorsis* Jakovlev, 1892

=*Nematus melanosternus* (?) Audinet-Serville, 1823

=*Nematus prototypus* (?) Förster, 1854

=*Tenthredo crocea* Fabricius, 1804, *nec* Geoffroy, 1785

=*Tenthredo nigrata* Retzius, 1783, *nec* Müller, 1776

*Amauronematus sagmarius* Konow, 1895

*Amauronematus schlueteri* Enslin, 1915

=*Amauronematus lundbohmi* Malaise, 1920

=*Amauronematus squamosus* Lindqvist, 1959

=*Amauronematus uliginosae* Malaise, 1920

*Amauronematus tillbergi* Malaise, 1920

*Amauronematus toeniatus* (Audinet-Serville, 1823)

=*Amauronematus aemulus* Konow, 1895

=*Amauronematus alpicola* auct., *nec* Konow, 1895

=*Amauronematus alpicola* auct., *nec* Konow, 1895

=*Amauronematus taeniatus* Le Peletier, 1823

=*Amauronematus taeniatus* var. *brunneipleura* Lindqvist, 1941

=*Amauronematus toeniatus* var. *brunneipleura* Lindqvist, 1941

=*Amauronematus zetterstedti* Malaise, 1920

=*Nematus taeniatus* Le Peletier, 1823

=*Tenthredo humeralis* Zetterstedt, 1838, *nec* Audinet-Serville, 1823

*Amauronematus variator* (Ruthe, 1859)

=*Amauronematus longidens* Lindqvist, 1962

=*Amauronematus opacipleuris* auct., *nec* Konow, 1895

=*Amauronematus sjoebloimi* auct., *nec* Malaise, 1931

*Amauronematus vittatus* (Audinet-Serville, 1823)

=*Amauronematus bergmanni* auct., *nec* Malaise, 1932

=*Amauronematus crispus* Benson, 1948

=*Amauronematus vittatus* var. *sternalis* Enslin, 1915

=*Nematus continuus* Eversmann, 1847

=*Nematus exoletus* Eversmann, 1847

=*Nematus melanoleucus* Hartig, 1840

=*Nematus notatus* (?) Förster, 1854

=*Nematus scabrivalvis* Thomson, 1871

*Brachycoluma* sp. Strand, 1929

=*Brachycolus* sp. Konow, 1895, *nec* Buckton, 1879

=*Decanematus* sp. Malaise, 1932

=groupe *Amauronematus viduatus* auct.,

*Brachycoluma erecta* (Lindqvist, 1945)

=*Amauronematus erectus* Lindqvist, 1945

=*Amauronematus (Brachycoluma) erectus* Lindqvist, 1945

=*Amauronematus (Decanematus) erectus* Lindqvist, 1945

=*Brachycoluma erectus* (Lindqvist, 1945)

=*Decanematus erectus* (Lindqvist, 1945)

=*Nematus (Amauronematus) erectus* (Lindqvist, 1945)

*Brachycoluma leucolena* (Zaddach in Brischke, 1883)

=*Amauronematus leucolaenus* auct., err. typ.

=*Pontania unga* Kincaid, 1900

*Brachycoluma malaisei* Hellén, 1970

=*Brachycoluma longiserra* (Malaise, 1932)

*Brachycoluma viduata* (Zetterstedt, 1838)

=*Amauronematus orbitalis* Marlatt, 1896

- =*Amauronematus viduatus* Zetterstedt, 1838
- =*Amauronematus viduatus* var. *laetus* Enslin, 1915
- =*Amauronematus viduatus* var. *lugens* Enslin, 1915
- =*Nematus brachyotus* Förster, 1854
- =*Nematus lepidotus* Hartig, 1840
- =*Nematus luctuosus* Förster, 1854
- =*Nematus vagus* Zaddach in Brischke, 1883

*Craesus* sp. Leach, 1817

=*Craesus* sp. Curtis, 1824

*Craesus alniastri* (Scharfenberg, 1805)

- =*Craesus varus* Villaret, 1832
- =*Craesus varus* var. *hermanni* Zirngiebl, 1954
- =*Nematus varus* Villaret, 1832

*Craesus brischkei* (Zaddach, 1876)

- =*Craesus brischkii* typ. err.
- =*Craesus brischkei* Zaddach, 1876

*Craesus latipes* (Villaret, 1832)

- =*Craesus laticrus* Eversmann, 1847, *nec* Villaret, 1832
- =*Craesus latipes* Villaret, 1832
- =*Nematus betularius* Tischbein, 1852, *nec* Hartig, 1837

*Craesus septentrionalis* (Linné, 1758)

- =*Nematus laticrus* Villaret, 1832
- =*Nematus stephensii* Newman, 1837
- =*Tenthredo alni* Linné, 1758
- =*Tenthredo largipes* Retzius, 1783

*Epicenematus* sp. Lacourt, 1998

*Epicenematus montanus* (Zaddach in Brischke, 1883)

- =*Nematus jemilleri* Stein, 1894

*Epicenematus pallescens* (Hartig, 1837)

- =*Nematus olivaceus* Thomson, 1871
- =*Nematus ruficeps* Zaddach in Brischke, 1883
- =*Pachynematus pallescens* var. *infuscatus* Lindqvist, 1943

*Euura* sp. Newman, 1837

=*Cryptocampus* sp. Hartig, 1837

*Euura* sp. Newman, 1837

*Euura (Euura) amerinae* (Linné, 1758)

- =*Cryptocampus inquilinus* Kaltenbach, 1864
- =*Cynips salicis-amerinae* Linné, 1767
- =*Euura gallae* Newman, 1837
- =*Nematus (Cryptocampus) medullarius* Hartig, 1837
- =*Nematus (Cryptocampus) buccatus* Thomson, 1862
- =*Nematus (Cryptocampus) populi* Hartig, 1837
- =*Nematus medullaris* Rudow, 1875
- =*Nematus pentandrae* Dahlbom, 1835
- =*Tenthredo salicis* Fallén, 1808
- =*Tenthredo salicis-pentandrae* Retzius, 1783

*Euura (Euura) cinereae* Kopelke, 1996

- =*Euura atra* auct., *nec* Jurine, 1807, *p. p.*

*Euura (Euura) elaeagnos* Kopelke, 1996

*Euura (Euura) purpureae* Kopelke, 1996

- =*Euura atra* auct., *nec* Jurine, 1807, *p. p.*

*Euura (Euura) testaceipes* Brischke, 1883

*Euura (Euura) venusta* (Brischke, 1883)

=*Cryptocampus brevicornis* Zaddach in Brischke, 1883  
=*Cryptocampus pullulus* Brischke, 1883

*Gemmura* sp. E. L. Smith, 1968

*Euura (Gemmura) laeta* Brischke, 1883

=*Nematus populi* Herrich-Schäffer, 1838, nec Hartig, 1837

*Euura (Gemmura) mucronata* (Hartig, 1837)

=*Cryptocampus gemmarum* Brischke, 1883  
=*Cryptocampus pictus* Zaddach in Brischke, 1883  
=*Cryptocampus pygmaeus* Brischke, 1883  
=*Euura lappo* var. *hastatae* (?) Malaise, 1920  
=*Euura nigritarsis* Cameron, 1885  
=*Tenthredo saliceti* auct., nec Fallén, 1808

*Hypolaepus* sp. Kirby, 1882

=*Holcocneme* sp. Konow, 1890  
=*Nematus* sp. auct., p. p.  
=*Paranematus* sp. Zinovjev, 1978, comme sous genre  
=*Pteronidea* sp. Rohwer, 1911 comme sous genre

*Hypolaepus* sp.

*Hypolaepus (Hypolaepus) caeruleocarpus* (Hartig, 1837)

=*Nematus brachyacanthus* Thomson, 1862  
=*Nematus brevispinis* Förster, 1854  
=*Nematus caeruleocarpus* Hartig, 1837  
=*Nematus insubricus* Cobelli, 1892  
=*Nematus sulcipes* Hartig, 1837

*Hypolaepus (Hypolaepus) princeps* (Zaddach, 1876)

*Hypolaepus (Hypolaepus) vicinus* (Audinet-Serville, 1823)

=*Hypolaepus longispinis* (Kriechbaumer, 1885)  
=*Holcocneme flavipes* Matsumura, 1912  
=*Hypolaepus (Hypolaepus) longispinis* Kriechbaumer, 1885  
=*Nematus crassus* Fallén, 1808  
=*Nematus sulcipes* auct., nec Hartig, 1837  
=*Tenthredo crassa sensu* Fallén, 1808, nec Schrank, 1781, nec Scopoli, 1763

*Paranematus* sp. Zinovjev, 1978

*Hypolaepus (Paranematus) wahlbergi* (Thomson, 1871)

=*Lygaeonematus glaphyropus* auct. p. p.  
=*Nematus sardiniensis* Costa, 1886  
=*Nematus tavastiensis* Vikberg, 1972

*Pteronidea* sp. Rohwer, 1911

=*Nematus* sp. auct., p. p.  
=*Pteronus* sp. auct., nec Panzer, 1806

*Hypolaepus (Pteronidea) bergmanni* (Dahlbom, 1835)

=*Amauronematus longicornis* Konow, 1897  
=*Lygaeonematus pallens* Enslin, 1916  
=*Nematus anthophilus* Zaddach in Brischke, 1884  
=*Nematus curtispina* Thomson, 1871  
=*Nematus pallicarpus* Hartig, 1840  
=*Nematus pallidicarpus* Hartig apud Dalla Torre, 1894  
=*Nematus varipictus* Holmgren, 1883  
=*Nematus virescens* auct., nec Hartig, 1837 p. p.  
=*Pteronidea bergmanni* var. *verna* Lindqvist, 1957  
=*Pteronidea curtispina* var. *luctuosa* Enslin, 1916  
=*Pteronidea vernalis* Lindqvist, 1937

*Hypolaepus (Pteronidea) bipartitus* (Audinet-Serville, 1823)

=*Nematus aurantiacus* Hartig, 1837  
=*Nematus ochropus* Thomson, 1862

- =*Nematus xanthogaster* Förster, 1854
- Hypolaepus (Pteronidea) dispar* (Zaddach, 1876)
- Hypolaepus (Pteronidea) dorsatus* (Cameron, 1875)
- Hypolaepus (Pteronidea) fagi* (Zaddach, 1876)  
= *Nematus mimus* auct., nec Konow, 1904 p. p.
- Hypolaepus (Pteronidea) fahraei* (Thomson, 1862)  
= *Amauronematus fahraei* Thomson, 1862  
= *Nematus melanodus* Zaddach in Brischke, 1884
- Hypolaepus (Pteronidea) ferrugineus* (Förster, 1854)  
= *Nematus glottianus* Cameron, 1882  
= *Pteronidea ferruginea* var. *plagiata* Enslin, 1916
- Hypolaepus (Pteronidea) flavescens* (Stephens, 1835)  
= *Nematus dilutus* Brischke, 1882  
= *Nematus varius* Audinet-Serville, 1823 sensu Zaddach, 1876
- Hypolaepus (Pteronidea) frenalisi* (Thomson, 1888)  
= *Pteronus fastosus* Konow, 1904
- Hypolaepus (Pteronidea) fumosus* (Lacourt, 1991)
- Hypolaepus (Pteronidea) fuscomaculatus* (Förster, 1854)  
= *Nematus strongylogaster* Cameron, 1878  
= *Pteronus dossuarius* Konow, 1904
- Hypolaepus (Pteronidea) hypoxanthus* (Förster, 1854)  
= *Nematus orbitalis* Cameron, 1884  
= *Nematus palliatus* Thomson, 1862  
= *Pteronidea nigronota* Lindqvist, 1957
- Hypolaepus (Pteronidea) majusculus* (Lacourt, 1991)
- Hypolaepus (Pteronidea) melanaspis* (Hartig, 1840)  
= *Nematus brunnicornis* Zaddach in Brischke, 1883  
= *Nematus citreus* André, 1880  
= *Nematus lacteus* Thomson, 1871  
= *Nematus maculiger* Cameron, 1882  
= *Nematus sulphureus* Zaddach, 1876  
= *Pteronidea sveae* Lindqvist, 1957
- Hypolaepus (Pteronidea) melanocephalus* (Hartig, 1837)  
= *Nematus betulae* Kaltenbach, 1858, nec Retzius, 1783  
= *Nematus dimidiatus* Konow, 1903, nec Audinet-Serville, 1823  
= *Nematus perspicillaris* Hartig, 1840  
= *Nematus pyrthonotus* Zaddach in Brischke, 1883  
= *Nematus salicis* Thomson, 1871, nec Linné, 1758  
= *Pteronidea melanocephala* var. *mesothoracica* Enslin, 1916  
= *Tenthredo salicis* Retzius, 1783, nec Schrank, 1781, nec Linné, 1758
- Hypolaepus (Pteronidea) miliaris* (Panzer, 1797)  
= *Nematus basalis* Costa, 1859  
= *Nematus dorsalis* Audinet-Serville, 1823  
= *Nematus flavus* Gimmerthal, 1844, nec Jurine, 1807  
= *Nematus fulvus* Hartig, 1837  
= *Nematus pallicercus* (?) Thomson, 1871, nec Hartig, 1837  
= *Nematus purus* Förster, 1854  
= *Nematus solitarius* Zaddach in Brischke, 1883  
= *Nematus trimaculatus* Snellen van Vollenhoven, 1862, nec Audinet-Serville, 1823  
= *Nematus validicornis* Förster, 1854  
= *Pteronidea miliaris* var. *nigronotata* Enslin, 1916  
= *Tenthredo crocea* Fallén, 1808, nec Geoffroy, 1785, nec Fabricius, 1804
- Hypolaepus (Pteronidea) myosotidis* (Fabricius, 1804)  
= *Nematus ambiguus* Förster, 1854

- =*Nematus interruptus* Audinet-Serville, 1823
- =*Nematus myosotidis* Fabricius, 1804
- =*Nematus papillosus* Thomson, 1871 *nec* Retzius, 1783
- =*Nematus segmentarius* Förster, 1854
- =*Pteronidea Myosotidis* var. *pseudopavida* Enslin, 1916
- =*Pteronidea segmentaria* Förster, 1854
- =*Pteronus fallaciosus* Konow, 1903
- Hypolaepus (Pteronidea) nigricornis* (Audinet-Serville, 1823)
- =*Nematus biannulatus* Costa, 1890
- =*Nematus miniatus* Hartig, 1837
- =*Nematus sibiricus* Jakovlev, 1888
- =*Nematus zetterstedti* Dahlbom, 1835
- Hypolaepus (Pteronidea) oligospilus* (Förster, 1854)
- =*Nematus capreae auct., nec* Linné, 1758
- =*Nematus mendicus* Walsh, 1866
- =*Nematus microcercus* Thomson, 1871
- =*Nematus miliaris auct., nec* Panzer, 1797
- =*Nematus salicivorus* Cameron, 1882
- Hypolaepus (Pteronidea) pavidus* (Audinet-Serville, 1823)
- =*Cryptocampus quadrum* Costa, 1859
- =*Nematus aurantiacus* Thomson, 1871, *nec* Hartig, 1837
- =*Nematus ochraceus* Hartig, 1837
- =*Nematus semiorbitalis* Förster, 1854
- =*Nematus wittewaalli* Snellen van Vollenhoven, 1862
- =*Pteronidea pavida* var. *notanda* Enslin, 1916
- Hypolaepus (Pteronidea) poecilonotus* (Zaddach, 1876)
- =*Nematus virescens auct., nec* Hartig, 1837 *p. p.*
- =*Nematus viridescens* Cameron, 1885
- =*Pteronidea subnitens* Lindqvist, 1957
- =*Pteronidea viridescens* Cameron, 1885
- Hypolaepus (Pteronidea) putoni* (Konow, 1903)
- Hypolaepus (Pteronidea) salicis* (Linné, 1758)
- =*Nematus dimidiatus* Stephens, 1835, *nec* Audinet-Serville, 1823
- =*Nematus immaculatus* Snellen van Vollenhoven, 1869
- =*Nematus inflatus* Thomson, 1871
- =*Nematus klugi* Dahlbom, 1835
- =*Nematus nassatus* Gimmerthal, 1836
- =*Pteronidea salicis* var. *obscurior* Enslin, 1916
- =*Tenthredo capreae* Linné, 1758
- =*Tenthredo notata* Müller, 1776
- Hypolaepus (Pteronidea) scotonotus* (Förster, 1854)
- =*Nematus polygoni* Benson, 1961
- =*Pteronidea fuscodorsata* Lindqvist, 1949
- Hypolaepus (Pteronidea) spireae* (Zaddach in Brischke, 1883)
- Hypolaepus (Pteronidea) tibialis* (Newman, 1837)
- =*Nematus catachloris* Snellen van Vollenhoven, 1869
- =*Nematus hortensis* Hartig, 1837
- =*Nematus robiniae* Forbes, 1885
- =*Nematus similis* Norton, 1880
- =*Nematus trilineatus* Norton, 1867
- =*Nematus xanthobaptus* Förster, 1854
- Hypolaepus (Pteronidea) togatus* (Zaddach, 1876)
- Hypolaepus (Pteronidea) umbratus* (Thomson, 1871)
- =*Nematus collinus* Cameron, 1882
- =*Pteronidea similis* Forsius, 1911
- =*Pteronidea similis* var. *lucens* Enslin, 1917
- =*Pteronidea verrucosae* Kontuniemi, 1966
- Hypolaepus (Pteronidea) viridis* (Stephens, 1835)

- =*Nematus bergmanni* auct., nec Dahlbom, 1835
- =*Nematus polyspilus* Förster, 1854
- =*Nematus prasinus* Hartig, 1837
- =*Nematus virescens* Hartig, 1837
- =*Pteronidea polyspila* Förster, 1854

*Kontuniemiana* sp. Lacourt, 1998

*Kontuniemiana leuchotrocha* (Hartig, 1837)

- =*Nematus approximatus* Förster, 1854
- =*Nematus consobrinus* Snellen van Vollenhoven, 1871
- =*Nematus cylindricus* Hartig, 1840
- =*Nematus maculiventris* Hartig, 1840
- =*Nematus multiplex* Zaddach in Brischke, 1883
- =*Nematus sauterianus* Zaddach in Brischke, 1883
- =*Nematus umbrinus* Zaddach, 1876
- =*Pteronidea cognata* Lindqvist, 1957
- =*Pteronidea leuchotrocha* Hartig, 1837

*Kontuniemiana ribesii* (Scopoli, 1763)

- =*Nematus depressus* Hartig, 1840
- =*Nematus dimidiatus* Audinet-Serville, 1823
- =*Nematus grossulariae* Moore, 1831
- =*Nematus hortensis* Thomson, 1871, nec Hartig, 1837
- =*Nematus macrocerus* Hartig, 1840
- =*Nematus ribis* Dufour, 1847
- =*Nematus trimaculatus* Audinet-Serville, 1823
- =*Nematus xanthophorus* Hartig, 1840
- =*Pteronidea aceris* Rohwer, 1915
- =*Pteronidea equatia* MacGillivray, 1923
- =*Pteronidea ribesii* Scopoli, 1763
- =*Pteronidea ribesii* var. *feminina* Enslin, 1916
- =*Pteronidea ribesii* var. *konowi* Enslin, 1916, nec Jakovlev, 1891
- =*Pteronus arapahonum* Cockerell, 1906
- =*Pteronus longicornis* Marlatt, 1896
- =*Tenthredo salicis* Fallén, 1808, nec Retzius, 1783, nec Linné, 1758
- =*Tenthredo ventricosa* Latreille, 1805

*Kontuniemiana similator* (Förster, 1854)

- =*Nematus eurysternus* Zaddach in Brischke, 1883
- =*Nematus similator* Förster, 1854
- =*Pteronidea leuchotrocha* var. *loisellei* Enslin, 1916
- =*Pteronus eurysternus* var. *struvei* Zirngiebl, 1939

*Larinematus* sp. Zhelochovtsev, 1988

*Larinematus imperfectus* (Zaddach, 1876)

*Lindqvistia* sp. Lacourt, 1998

*Lindqvistia polaris* (Holmgren, 1883)

- =*Nematus morionellus* Holmgren, 1883
- =*Pontania islandica* Kincaid, 1900
- =*Pteronidea shumagensis* Kincaid, 1900

*Lindqvistia reticulata* (Holmgren, 1883)

- =*Amauronematus alsius* Benson, 1935
- =*Amauronematus arcticola* Enslin, 1915
- =*Nematus arcticola* Dalla Torre, 1894
- =*Nematus arcticus* Thomson, 1871, nec Holmgren, 1869
- =*Pontania forsiusi* Enslin, 1915
- =*Pontania glinka* Kincaid, 1900
- =*Pontania popofiana* Kincaid, 1900

*Nematus* sp. Panzer, 1806

*Nematus lucidus* (Panzer, 1801)

=*Nematus cinctus* Audinet-Serville, 1823

=*Nematus villareti* Dahlbom, 1835

*Pachynematus* sp. Konow, 1890

=*Epitactus* sp. Förster, 1854

=*Pacynematus* sp. Takeuchi, 1952

*Pachynematus calcicola* Benson, 1948

*Pachynematus clitellatus* (Audinet-Serville, 1823)

=*Epitactus praecox* Förster, 1854

=*Nematus affinis* Marlatt, 1896

=*Nematus aureopctus* Norton, 1867

=*Nematus diaphanus* Eversmann, 1847

=*Nematus einersbergensis* Hartig, 1840

=*Nematus extensicornis* Norton, 1861

=*Nematus flaviventris* Hartig, 1840, *nec* Gmelin, 1790

=*Nematus griseus* Eversmann, 1847

=*Nematus Kirbyi* Dahlbom, 1835

=*Nematus leucocarpus* Hartig, 1840

=*Nematus marylandicus* Norton, 1864

=*Nematus mocrops* Förster, 1854

=*Nematus nyblaei* Dahlbom, 1835, *nomen nudum*

=*Nematus palliceps* Hartig, 1840

=*Nematus pallidiceps* Dalla Torre, 1894

=*Nematus pectoralis* Snellen van Vollenhoven, 1867, *nec* Audinet-Serville, 1823

=*Nematus seticornis* Dahlbom, 1835, *nomen nudum*

=*Nematus suadus* Cresson, 1880

=*Nematus tener* Zaddach in Brischke, 1884

=*Nematus trisignatus* Förster, 1854

=*Nematus tritici* Marlatt, 1896

=*Nematus turgidus* Zaddach, 1876

=*Nematus umbripennis* Eversmann, 1847

=*Nematus valesiacus* Kirby, 1882

=*Nematus venticulosus* Dahlbom, 1835, *nomen nudum*

=*Pachynematus clitellatus* var. *trangisens* Enslin, 1916

=*Pachynematus foveolatus* Konow, 1903

=*Pachynematus glesipennis* Konow, 1903

=*Pachynematus kirbyi* Dahlbom, 1835

=*Pachynematus laevigatus* var. *flavissimus* Enslin, 1916

=*Pachynematus lentus* Konow, 1903

=*Pachynematus truncatus* Benson, 1948

=*Pachynematus zaddachi* Konow, 1903

=*Tenthredo bimaculata* Gmelin, 1790, *nec* Geoffroy, 1785

=*Tenthredo capreae* Panzer, 1799, *nec* Linné, 1758, *nec* Fabricius, 1767

=*Tenthredo leskii* (?) Le Peletier, 1823

*Pachynematus declinatus* (Förster, 1854)

=*Pachynematus inopinatus sensu* Benson, 1955, *nec* Lindqvist, 1949

=*Pteronus capito* Konow, 1903

*Pachynematus fallax* (Audinet-Serville, 1823)

=*Nematus brachycercus* Hartig, 1840

=*Nematus circumscriptus* Förster, 1854

=*Nematus emarginatus* Förster, 1854

=*Nematus erythropareus* Zaddach in Brischke, 1884

=*Nematus eupodius* Hartig, 1840

=*Nematus eversmanni* Förster, 1854

- =*Nematus melanocerus* Hartig, 1840
- =*Nematus schmidtii* Gimmerthal, 1844
- =*Nematus xanthocarpus* Hartig, 1840
- =*Pachynematus chambersi* Benson, 1948
- =*Pachynematus chymersi* err. typ. Mucho, 1974
- =*Pachynematus sulcatus* Benson, 1948
- =*Pachynematus xanthocarpus* Hartig, 1840

*Pachynematus lichtwardti* Konow, 1904

- =*Nematus apicalis* Hartig, 1837, *nec* Stephens, 1835
- =*Pachynematus apicalis* Hartig, 1837
- =*Pachynematus kubesi* Konow, 1905

*Pachynematus moerens* (Förster, 1854)

- =*Nematus pleuralis* Thomson, 1862
- =*Nematus pygostolus* Förster, 1854
- =*Pachynematus falonus* Ross, 1945
- =*Pachynematus pullus* Konow, 1904
- =*Pachynematus torridonensis* Liston, 1980

*Pachynematus obductus* (Hartig, 1837)

- =*Nematus conductus* Ruthe, 1859
- =*Nematus graminis* Cameron, 1874
- =*Nematus pallidiventralis* Dalla Torre, 1894
- =*Nematus palliventris* Cresson, 1880
- =*Pachynematus boulderensis* Rohwer, 1920

*Pachynematus omega* Benson, 1955

*Pachynematus smithae* Ross, 1945

- =*Pachynematus angustatus* Lindqvist, 1949
- =*Pachynematus smithiae* *auct.*

*Pachynematus vagus* (Fabricius, 1781)

- =*Nematus haemorrhoidalis* Hartig, 1840 *nec* Spinola, 1808
- =*Nematus hypoleucus* Förster, 1854
- =*Nematus inconspicuus* Kirby, 1882
- =*Nematus leucogaster* Hartig, 1840
- =*Nematus meridionalis* André, 1880
- =*Nematus micraulius* Förster, 1854
- =*Nematus punctipleuris* Thomson, 1862
- =*Nematus punctulatus* Thomson, 1862
- =*Pachynematus corticosus* MacGillivray, 1901
- =*Pachynematus roscidus* MacGillivray, 1921
- =*Tenthredo flaviventris* Gmelin, 1790

*Pikonema* sp. Ross, 1937

*Pikonema scutellatum* (Hartig, 1837)

- =*Nematus immundus* Thomson, 1862

*Polynematus* sp. Zhelochovtsev, 1988

*Polynematus annulatus* (Gimmerthal, 1834)

- =*Nematus arcticus* Cameron, 1878, *nec* Holmgren, 1869, *nec* Thomson, 1871
- =*Nematus capreae* Hartig, 1837 *nec* Linné, 1758, *nec* Fabricius, 1767
- =*Nematus filicornis* Costa, 1890, *nec* Thomson, 1862
- =*Nematus flavipennis* Cameron, 1876
- =*Nematus picticollis* Holmgren, 1883
- =*Nematus xanthopterus* Dahlbom, 1835
- =*Pachynematus freyi* Lindqvist, 1949
- =*Pachynematus lacteipennis* Benson, 1963
- =*Pachynematus ravidus sensu* Benson, 1960, *nec* Konow, 1903
- =*Pachynematus rumicis* *auct.*

- =*Pachynematus rumicis* var. *lucens* Enslin, 1916  
 =*Tenthredo rumicis* Linné, 1758 *sensu* Fallén, 1808
- Polynematus gehrsi* (Konow, 1903)  
 =*Pachynematus gehrsi* (Konow, 1903)  
 =*Pachynematus subaequalis* auct., *nec* Förster, 1854
- Polynematus infirmus* (Förster, 1854)  
 =*Nematus subaequalis* (Förster, 1854)
- Polynematus taegeri* Lacourt, 1996
- Pontania* sp. Costa, 1852
- Eupontania* sp. Zinovjev, 1985
- Pontania (Eupontania) collectanea* (Förster, 1854)  
 =*Nematus deficiens* Förster, 1854  
 =*Pontania collectanea* ssp. *relicta* Weiffenbach, 1962
- Pontania (Eupontania) gallarum* (Hartig, 1837)
- Pontania (Eupontania) hastatae* Vikberg, 1970
- Pontania (Eupontania) pedunculi* (Hartig, 1837)  
 =*Nematus baccharum* Cameron, 1876  
 =*Nematus congruens* Förster, 1854  
 =*Pontania carpentier?* Konow, 1907
- Pontania (Eupontania) reticulatae* Malaise, 1920  
 =*Pontania arctica* auct., *nec* MacGillivray, 1919  
 =*Pontania crassipes* auct., *nec* Thomson, 1871, p. p.
- Pontania (Eupontania) retusae* Benson, 1960
- Pontania (Eupontania) samolad* Malaise, 1920  
 =*Pontania viminalis* auct., *nec* Linné, 1758, p. p.
- Pontania (Eupontania) vesicator* (Bremer, 1849)  
 =*Nematus betulinus* Brischke, 1850  
 =*Nematus helycinus* Brischke, 1850  
 =*Nematus lugdunensis* Snellen van Vollenhoven, 1871  
 =*Nematus togatus* Cameron, 1885  
 =*Nematus vesicator* var. *minor* Zaddach *in* Brischke, 1883
- Pontania (Eupontania) viminalis* (Linné, 1758)  
 =*Cynips salicis viminalis* Linné, 1767  
 =*Nematus crassipes* Thomson, 1871  
 =*Nematus saliceti* Förster, 1854  
 =*Nematus vollenhoveni* Cameron, 1874  
 =*Pontania ciccum* Konow, 1901  
 =*Pontania hungarica* Enslin, 1917  
 =*Pontania viminalis* var. *lugubris* Enslin, 1917  
 =*Pontania viminalis* var. *xanthaspis* Enslin, 1915
- Phyllocolpa* sp. Benson, 1960
- Pontania (Phyllocolpa) excavata* Marlatt, 1896  
 =*Pontania apicifrons* Malaise, 1932  
 =*Pontania carinifrons* Benson, 1940  
 =*Pontania destricta* MacGillivray, 1923  
 =*Pontania megacephala* Rohwer, 1908
- Pontania (Phyllocolpa) kopelkei* Lacourt, 1996
- Pontania (Phyllocolpa) leucapsis* (Tischbein, 1846)  
 =*Nematus alienatus* Förster, 1854  
 =*Nematus commixtus* Zaddach *in* Brischke, 1884  
 =*Nematus ischnocerus* Thomson, 1962  
 =*Nematus leucostigmus* Cameron, 1875  
 =*Nematus politus* Zaddach *in* Brischke, 1883  
 =*Nematus prussicus* Zaddach *in* Brischke, 1883  
 =*Nematus sieboldii* Zaddach *in* Brischke, 1884  
 =*Pontania ischnoceros* var. *nigrifrons* Konow, 1897  
 =*Pontania leucaspis* var. *connata* Enslin, 1915

*Pontania (Phyllocolpa) leucosticta* (Hartig, 1837)

=*Nematus crassulus* Thomson, 1862

=*Nematus sharpi* Cameron, 1876

=*Pontania auberti* Zirngiebl, 1957

*Pontania (Phyllocolpa) oblita* (Audinet-Serville, 1823)

=*Nematus elegans* Zaddach in Brischke, 1884

=*Nematus puellus* Thomson, 1871

*Pontania (Phyllocolpa) purpureae* (Cameron, 1884)

*Pontania (Phyllocolpa) tuberculata* (Benson, 1958)

*Pontania* sp. Costa, 1852

*Pontania (Pontania) bridgmanii* (Cameron, 1883)

=*Cynips capreae* auct., nec Linné, 1761, p. p.

=*Pontania kirchneri* Zirngiebl, 1959

*Pontania (Pontania) dolichura* (Thomson, 1871)

=*Nematus femoralis* Zaddach sensu Cameron, 1875

=*Nematus ischnocerus* Cameron, 1885, nec Thomson, 1862

=*Pontania robbinsi* Benson, 1935

*Pontania (Pontania) fibulata*(?) Konow, 1901

*Pontania (Pontania) glaucae* Kopelke, 1994

*Pontania (Pontania) proxima* (Audinet-Serville, 1823)

=*Cynips capreae* auct., nec Linné, 1761, p. p.

=*Euura flavipes* Cameron, 1885

=*Messa Hyalina* Norton, 1864

=*Nematus festivus* Zaddach in Brischke, 1884

=*Nematus gallicola* Stephens, 1835

=*Nematus vallisnerii* Hartig, 1837

*Pontania (Pontania) virilis* Zirngiebl, 1955

=*Nematus ischnocerus* Thomson, 1862 sensu Zaddach in Brischke, 1883

=*Pontania dolichura* auct., nec Thomson, 1871

=*Pontania femoralis* Berland, 1947, nec Cameron, 1875

=*Pontania rifana* Lacourt, 1973

=*Pontania robbinsi* Lorenz & Kraus, 1957 nec Benson, 1935

*Pontoprastia* sp. Malaise, 1921

*Pontoprastia amentorum* (Förster, 1854)

=*Amauronematus amentorum* Förster, 1854

=*Nematus laevigatus* Zaddach in Brischke, 1883

=*Nematus suavis* Ruthe, 1859

=*Pontania atra* Marlatt, 1896

=*Pontania maura* Rohwer, 1908

=*Pontoprastia kamtchatica* Malaise, 1932

=*Pristiphora amentorum* var. *nigripleuris* Enslin, 1916

*Pontoprastia boreoalpina* Lindqvist, 1961

=*Amauronematus latissera* auct., nec Malaise, 1921

***Nescianeurini* sp. Lacourt, 2005**

*Nescianeura* sp. Lacourt, 2005

*Nescianeura noblecourti* Lacourt, 2005

***Pristiphorini* Lacourt, 1998**

*Anoplonyx* sp. Marlatt, 1896

=*Camponiscus* sp. Newman, 1869, p. p.  
=*Leptocercus* sp. Thomson, 1871, p. p.  
=*Marlatia* sp. Ashmead, 1898  
=*Platycampus* sp. Schiodte, 1839, p. p.

*Anoplonyx apicalis* (Brischke, 1883)

=*Anoplonyx duplex* auct.  
=*Camponiscus braunsii* Konow, 1884  
=*Camponiscus carinthiacus*(?) Dalla Torre, 1894  
=*Camponiscus tscheki* Kohl, 1885  
=*Leptopus carinthicus* (?) Zaddach in Brischke, 1883

*Anoplonyx destructor* Benson, 1952

*Anoplonyx ovatus* (Zaddach, 1883)

*Anoplonyx pineti* (Hartig, 1837)

=*Anoplonyx pectoralis* auct.  
=*Camponiscus luridus* Konow, 1884  
=*Nematus lariciphagus* Zaddach in Brischke, 1883  
=*Platycampus pectoralis* var. *obscurus* Enslin, 1915

*Dinematus* sp. Lacourt, 2005

*Dinematus krausi* Lacourt, 2005

*Gymnonychus* sp. Marlatt, 1896

*Gymnonychus abbreviatus* (Hartig, 1837)

=*Gymnonychus californicus* Marlatt, 1896  
=*Pristiphora abbreviata* Hartig, 1837

*Gymnonychus biscalis* (Förster, 1854)

=*Nematus conspersus* Zaddach in Brischke, 1883  
=*Nematus lateralis* Brischke, 1885  
=*Nematus lativentris* Cameron, 1875  
=*Nematus pruni* (?) Brischke, 1883  
=*Pristiphora biscalis* Förster, 1854

*Gymnonychus maestus* (Zaddach, 1876)

=*Nematus brevicornis* Thomson, 1862, nec Förster, 1854  
=*Nematus parvicornis* Kirby, 1882  
=*Pristiphora moesta*, auct.,

*Gymnonychus retusus* (Thomson, 1871)

*Lygaeonematus* sp. Konow, 1980

*Lygaeonematus abietinus* (Christ, 1791)

=*Nematus truncatus* Hartig, 1837  
=*Pristiphora abietina* Christ, 1791  
=*Tenthredo abietum* Hartig, 1834  
=*Tenthredo pini* Retzius, 1783, nec Linné, 1758

*Lygaeonematus compressus* (Hartig, 1837)

=*Pristiphora compressa* Hartig, 1837

*Lygaeonematus decipiens* Enslin, 1916

=*Pristiphora saxesenii sensu* Wong, 1975, p. p. : mâle

*Lygaeonematus leucopodius* (Hartig, 1837)

=*Lygaeonematus leucopodius* var. *flavipes* Lindqvist, 1941  
=*Nematus placidus* Cameron, 1878  
=*Pachynematus sagulatus* Konow, 1904

*Lygaeonematus saxesenii* (Hartig, 1837)

=*Pristiphora saxesenii* Hartig, 1837  
=*Pristiphora thalendorsti* Wong, 1975

*Lygaeonematus subarcticus* Forsslund, 1936

=*Pristiphora pseudosaxesenii* Lindqvist, 1968

*Lygaonematus tenuiserra* (Lindqvist, 1958)  
*Lygaonematus wesmaeli* (Tischbein, 1853)  
=*Nematus solea* Snellen van Vollenhoven, 1870

*Micronematus* sp. Konow, 1890

*Micronematus monogyniae* (Hartig, 1840)  
=*Nematus catulus* Zaddach in Brischke, 1884  
=*Nematus crassispinus* Cameron, 1885, nec Thomson, 1871  
=*Nematus filicornis* Thomson, 1862  
=*Nematus hibernicus* Cameron, 1878  
=*Nematus ludens* Costa, 1894  
=*Nematus nanus* Zaddach in Brischke, 1884  
=*Nematus pullus* Förster, 1854  
=*Nematus serotinus* Zaddach in Brischke, 1884  
=*Pristiphora monogyniae* Hartig, 1840

*Oligonematus* sp. Zhelochovtsev, 1988

*Oligonematus funerulus* (Costa, 1859)  
=*Lygaonematus friesei* Konow, 1904  
=*Pristiphora friesei* Konow, 1904

*Oligonematus laricis* (Hartig, 1837)  
=*Lygaonematus paedidus* Konow, 1904  
=*Nematus laricivorus* Brischke, 1883  
=*Nematus leucocnemis* Förster, 1854  
=*Nematus oblongus* Cameron, 1882  
=*Nematus ruficollis* Hartig, 1840  
=*Nematus rusticanus* Brischke, 1884  
=*Pachynematus ravidus* Konow, 1903  
=*Pristiphora laricis* Hartig, 1837  
=*Pristiphora paedida* Konow, 1904

*Pristiphora* sp. Latreille, 1810

=*Diphadnus* sp. Hartig, 1837  
=*Neotomostethus* sp. MacGillivray, 1908  
=*Sala* sp. Ross, 1937

*Lygaeotus* sp. Hellén, 1975

*Pristiphora (Lygaeotus) borea* (Konow, 1904)  
=*Pachynematus lapponicus* Enslin, 1916

*Pristiphora (Lygaeotus) breadalbanensis* (Cameron, 1882)  
=*Lygaonematus arcticola* Enslin, 1916  
=*Lygaonematus corpulentus* Konow, 1904  
=*Lygaonematus tronsöensis* Kiaer, 1898

*Pristiphora (Lygaeotus) coactula* (Ruthe, 1859)  
=*Lygaonematus pachyvalvis* Konow, 1904  
=*Lygaonematus winnipegensis* Konow, 1905  
=*Nematus winnipeg* Norton, 1867  
=*Pristiphora dazwsoni* Rohwer, 1908

*Pristiphora (Lygaeotus) lativentris* (Thomson, 1871)  
=*Lygaonematus alpicola* Konow, 1904  
=*Lygaonematus pallipes* var. *femoralis* Zirngiebl, 1953  
=*Nematus extremus* Holmgren, 1883  
=*Nematus scoticus* Cameron, 1881  
=*Pristiphora bucoda* Kincaid, 1900

*Pristiphora (Lygaeotus) mollis* (Hartig, 1837)  
=*Lygaonematus mollis* var. *rufonotata* Lindqvist, 1943  
=*Nematus whitei* Cameron, 1878

- =*Pachynematus kontkaneni* Lindqvist, 1960
- Pristiphora (Lygaeotus) pseudocoactulus* (Lindqvist, 1952)
- Pristiphora* sp. Latreille, 1810
- Pristiphora (Pristiphora) aphantoneura* (Förster, 1854)
- =*Pristiphora fulvipes* Fallén, 1808
- =*Pristiphora vicina* auct., nec Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo fulvipes* Fallén, 1808 nec Scopoli, 1763
- Pristiphora (Pristiphora) appendiculata* (Hartig, 1837)
- =*Diphadnus fuscicornis* Hartig, 1837
- =*Nematus cathoraticus* Förster, 1854
- =*Nematus ghiliani* Costa, 1894
- =*Nematus hypobalius* Zaddach in Brischke, 1884
- =*Nematus pallicornis* Norton, 1861
- =*Nematus pallipes* Audinet-Serville, 1823, nec Fallén, 1808
- =*Nematus peletieri* André, 1880
- =*Nematus pumilus* Zaddach in Brischke, 1884
- =*Nematus vitreipennis* Kawall, 1864
- =*Pristiphora grossulariae* Walsh & Riley, 1869
- =*Pristiphora pallipes* Audinet-Serville, 1823
- =*Pristiphora rufipes* auct., nec Audinet-Serville, 1823
- Pristiphora (Pristiphora) armata* (Thomson, 1862)
- =*Nematus crassicornis* Hartig, 1837, nec Stephens, 1835
- =*Nematus crataegi* Brischke, 1883
- =*Nematus ensicornis* Jacobs, 1884
- =*Nematus fletcheri* Cameron, 1884
- =*Nematus melanostomus* Zaddach in Brischke, 1884
- =*Nematus nigricollis* Cameron, 1885
- =*Pristiphora crassicornis* Hartig, 1837
- Pristiphora (Pristiphora) bensoni* Lindqvist, 1953
- Pristiphora (Pristiphora) bifida* Hellén, 1948
- Pristiphora (Pristiphora) brevis* (Hartig, 1837)
- =*Nematus fumipennis* Thomson, 1871, nec Stephens, 1835
- =*Pristiphora fuscata* Benson, 1943
- =*Pristiphora thalictri* auct.
- Pristiphora (Pristiphora) bufo* (Brischke, 1883)
- =*Pachynematus crassicauda* Lindqvist, 1964
- =*Pristiphora laricicola* Verzhutskii, 1966
- =*Pristiphora pallidula* Konow, 1902
- Pristiphora (Pristiphora) carpentieri* Konow, 1902
- Pristiphora (Pristiphora) cincta* Newman, 1837
- =*Nematus quercus* Hartig, 1837
- =*Pristiphora idiota* Norton, 1867
- =*Pristiphora seorsa* Konow, 1897
- =*Tenthredo borealis* Zetterstedt, 1838
- Pristiphora (Pristiphora) confusa* Lindqvist, 1955
- Pristiphora (Pristiphora) coniceps* Lindqvist, 1955
- =*Nematus ruficornis* var. *integer*(?) Hellén, 1848, nec Say, 1836
- Pristiphora (Pristiphora) conjugata* (Dahlbom, 1835)
- =*Nematus aurantiacus* Snellen van Vollenhoven, 1863, nec Hartig, 1837
- =*Nematus discoidalis* Thomson, 1888
- =*Nematus gonymelas* Stephens, 1835
- =*Pristiphora conjugata* var. *ulbrichti* Enslin, 1916
- =*Tenthredo myosotidis* Panzer, 1806, nec Fabricius, 1804
- Pristiphora (Pristiphora) fausta* (Hartig, 1837)
- Pristiphora (Pristiphora) geniculata* (Hartig, 1840)
- =*Nematus cheilon* Zaddach, 1876

- Pristiphora (Pristiphora) kamtchatica* Malaise, 1932  
 =*Pristiphora luteiventris* Koch, 1989  
 =*Pristiphora paedida* auct., nec Konow, 1904
- Pristiphora (Pristiphora) leucopus* Hellén, 1947
- Pristiphora (Pristiphora) listoni* Lacourt, 1998  
 =*Pristiphora leucopus* Hellén *sensu* Lacourt, 1994
- Pristiphora (Pristiphora) melanocarpa* (Hartig, 1840)  
 =*Nematus puncticeps* Thomson, 1862 *sensu* Zaddach *in* Brischke, 1883  
 =*Nematus wuestneii* Stein, 1885
- Pristiphora (Pristiphora) pallidiventris* (Fallén, 1808)  
 =*Nematus braviusculus* Eversmann, 1847  
 =*Nematus caudalis* Eversmann, 1847  
 =*Nematus cirrhostomus* Zaddach *in* Brischke, 1883  
 =*Nematus ephippiger* Hartig, 1840  
 =*Nematus flavicomus* Tischbein, 1846  
 =*Nematus gemellus* Förster, 1854  
 =*Nematus marshallii* Cameron, 1875  
 =*Nematus nigricans* Eversmann, 1847  
 =*Pristiphora denudata* Konow, 1902  
 =*Pristiphora myosotidis* Stephens, 1835  
 =*Pristiphora pallidiventris* var. *haemorrhoidalis* Enslin, 1916  
 =*Pristiphora pallidiventris* var. *stigmatica* Enslin, 1916
- Pristiphora (Pristiphora) punctifrons* (Thomson, 1871)  
 =*Nematus platyceros* Zaddach *in* Brischke, 1884  
 =*Pristiphora aericeps* Lindqvist, 1960  
 =*Pristiphora viridana* Konow, 1902
- Pristiphora (Pristiphora) ruficornis* (Olivier, 1811)  
 =*Nematus fraxini* Hartig, 1837  
 =*Nematus proximus* Stephens, 1835  
 =*Nematus robustellus* Dahlbom, 1835  
 =*Pristiphora testaceicornis* Audinet-Serville, 1823
- Pristiphora (Pristiphora) rufipes* Audinet-Serville, 1823  
 =*Nematus alnivorus* auct., nec Hartig, 1840  
 =*Nematus aquilegiae* Snellen van Vollenhoven, 1866  
 =*Nematus selandrioides* Costa, 1859  
 =*Nematus suessionensis* Audinet-Serville, 1823  
 =*Pristiphora aquilegiae* Snellen van Vollenhoven, 1866  
 =*Pristiphora fusca* Audinet-Serville, 1823
- Pristiphora (Pristiphora) staudingeri* (Ruthe, 1859)  
 =*Pristiphora asperlatus* Benson, 1935
- Pristiphora (Pristiphora) subbifida* (Thomson, 1871)
- Pristiphora (Pristiphora) testacea* (Jurine, 1807)  
 =*Nematus betularius* Hartig, 1837  
 =*Nematus brevicornis* Cameron, 1880, nec Thomson, 1862, nec Förster, 1854  
 =*Nematus erythrogaster* Thomson, 1871, nec Norton, 1864  
 =*Nematus hartigii* Kirby, 1882  
 =*Nematus luteogaster* Kirby, 1882  
 =*Nematus melaneurus* Hartig, 1840  
 =*Nematus parvicornis* Cameron, 1885, nec Kirby, 1882  
 =*Tenthredo betulae* Retzius, 1783, nec Linné, 1758
- Pristiphora (Pristiphora) tetrica* (Zaddach *in* Brischke, 1883)  
 =*Nematus velatus* Zaddach, 1883
- Pristiphora (Pristiphora) thalictri* (Kriechbaumer, 1884)  
 =*Diphadnus thalictri* Takeuchi, 1922  
 =*Pristiphora henschi* Konow, 1902

*Sharliphora* sp. Wong, 1969

*Sharliphora amphibola* (Förster, 1854)

=*Nematus fraternus* Cameron, 1885

=*Nematus laetus* Cameron, 1883

*Sharliphora nigella* (Förster, 1854)

=*Nematus furvescens* Cameron, 1875

=*Nematus obscurior* Dalla Torre, 1894

=*Nematus obscurus* Zaddach in Brischke, 1884, *nec* Norton, 1861

=*Nematus occultus* Förster, 1854

=*Nematus xanthomus* Zaddach in Brischke, 1884

=*Pristiphora ambigua* Fallén, 1808

=*Tenthredo ambiguus* Fallén, 1808, *nec* Müller, 1776

*Pseudodineurini* Benson, 1938

*Pseudodineura* sp. Konow, 1885

=*Pelmatopus* sp. Hartig, 1837, *nec* Fischer de Waldheim, 1824

=*Phyllopaïs* sp. Hering, 1934

*Pseudodineura enslini* (Hering, 1923)

*Pseudodineura fuscula* (Klug, 1816)

=*Dineura despecta* Hartig, 1837

=*Dineura simulans* Cameron, 1878

=*Dolerus (Pelmatopus) minutus* Hartig, 1837

*Pseudodineura mentiens* (Thomson, 1871)

=*Pelmatopus mentiens* var. *konowi* Enslin, 1921

=*Pseudodineura hepaticae* Brischke, 1883

*Stauronematini* Lacourt, 1998

*Stauronematus* sp. Benson, 1953

=*Stauronema* sp. Benson, 1948, *nec* Sollas, 1877

*Stauronematus compressicornis* (Fabricius, 1804)

=*Nematus callicerus* Thomson, 1862

=*Nematus cebrionicornis* Costa, 1859

=*Nematus platycerus* Hartig, 1840

=*Nematus vallator* Snellen van Vollenhoven, 1858

*Selandriinae* Thomson, 1871

*Aneugmenini* Takeuchi, 1941

*Aneugmenus* sp. Hartig, 1837

=*Atoposelandria* sp. Enslin, 1913

=*Colposelandria* sp. Enslin, 1912

=*Polyselandria* sp. MacGillivray, 1914

=*Selandropha* sp. Zirngiebl, 1956

*Aneugmenus coronatus* (Klug, 1818)

=*Selandria analis* Thomson, 1871

=*Selandria bimaculata* Cobelli, 1892

=*Selandria cereipes* Snellen van Vollenhoven, 1873

*Aneugmenus fuerstenbergensis* (Konow, 1885)

*Aneugmenus padi* (Linné, 1758)

=*Allantus laticinctus* Brullé, 1832  
=*Selandria rufitarsis* Brullé, 1832  
=*Selandria urbis* Ross, 1930  
=*Selandria vollenhoveni* Gribodo, 1880  
=*Tenthredo (Selandria) albipes* Audinet-Serville, 1823, *nec*  
Geoffroy, 1785  
=*Tenthredo stramineipes* Klug, 1818

*Aneugmenus temporalis* (Thomson, 1871)

*Birka* sp. Malaise, 1944

*Birka alpina* Lacourt, 1990

*Birka cinereipes* (Klug, 1814)

=*Selandria aperta* Hartig, 1837  
=*Selandria foveifrons* Thomson, 1870  
=*Tenthredo alternipes* Eversmann, 1847

*Dolerini* Thomson, 1871

*Dolerus* sp. Panzer, 1801

*Achaetoprion* sp. Goulet, 1986

=*Juncilerus* sp. Zhelochovtsev, 1988

*Dolerus (Achaetoprion) ferrugatus* Audinet-Serville, 1823

=*Dolerus anticus* auct., *nec* Klug, 1818  
=*Dolerus thomsoni* Konow, 1884  
=*Dolerus thomsoni* var. *miricolor* Konow, 1887  
=*Dolerus thoracicus* André, 1880, *nec* Fallén, 1808

*Dolerus (Achaetoprion) madidus* (Klug, 1814)

=*Dolerus chappelli* Cameron, 1878  
=*Dolerus lamprechti* Konow, 1884  
=*Dolerus madidus* var. *monozonus* Enslin, 1913  
=*Tenthredo lateritia* Klug, 1818

*Dolerus (Achaetoprion) pachycerus* Hartig, 1837

=*Dolerus mocsaryi* Konow, 1895  
=*Dolerus taeniatus* Zaddach, 1859  
=*Dolerus tinctipennis* Cameron, 1881

*Dolerus (Achaetoprion) schulthessi* Konow, 1887

=*Dolerus anticus* Morice, 1913, *nec* Klug, 1818

*Dolerus (Achaetoprion) triplicatus* (Klug, 1818)

=*Dolerus dimidiatus* Audinet-Serville, 1823  
=*Dolerus lugubris* Gimmerthal, 1834  
=*Dolerus trimaculatus* Audinet-Serville, 1823  
=*Dolerus triplicatus* var. *aemula* Konow, 1902  
=*Tenthredo tremula* Klug, 1818

*Dolerus (Achaetoprion) uliginosus* (Klug, 1818)

=*Dolerus madidus* Konow, 1884, *nec* Klug, 1818

*Cyperolerus* sp. Zhelochovtsev, 1988

*Dolerus (Cyperolerus) anticus* (Klug, 1818)

=*Dolerus germanicus* Audinet-Serville, *nec* Fabricius, 1775  
=*Dolerus klugii* Scholtz, 1847

*Dolerus* sp. Panzer, 1801

=*Dosytheus* sp. Leach, 1817  
=*Equidolerus* sp. Taeger & Blank, 1996

*Dolerus (Dolerus) bajulus* Audinet-Serville, 1823

=*Dolerus aeneus* var. *guttatus* Zirngiebl, 1954  
=*Dolerus aericeps* Thomson, 1871  
=*Dolerus aericeps* var. *erythropus* Enslin, 1913

- =*Dolerus aericeps* var. *nigricollis* Lindqvist, 1943
- =*Dolerus aericeps* var. *triangularis* Lindqvist, 1943
- =*Dolerus mandibularis* Konow, 1884
- =*Dolerus quadricinctus* Kiaer, 1898
- =*Dolerus rufipes* Konow, 1888 *nec* Audinet-Serville, 1823
- Dolerus (Dolerus) bimaculatus* (Geoffroy, 1785)
- =*Dolerus saxatilis* Hartig, 1837
- =*Tenthredo abietis* Fallén, 1808, *nec* Linné, 1758
- =*Tenthredo tristis* Fabricius, 1804
- Dolerus (Dolerus) cothurnatus* Audinet-Serville, 1823
- =*Dolerus busaei* Snellen van Vollenhoven, 1858
- =*Dolerus cothurnatus* var. *pallidistigma* Lindqvist, 1969
- =*Dosytheus junci* Stephens, 1835
- =*Tenthredo palustris* Klug, 1818, *nec* Klug, 1817
- Dolerus (Dolerus) germanicus* (Fabricius, 1775)
- Dolerus (Dolerus) germanicus etruscus* (Klug, 1818)
- =*Dolerus geniculatus* Audinet-Serville, 1823
- =*Dolerus pratensis* var. *testaceus* De Stefani, 1883
- =*Tenthredo (Dolerus) etruscus* Klug, 1818
- =*Tenthredo erythrogonia* Spinola, 1808, *nec* Schrank, 1781
- Dolerus (Dolerus) germanicus germanicus* (Fabricius, 1775)
- =*Dolerus fennicus* André, 1880
- =*Dolerus pratensis* var. *laterater* Enslin, 1913
- =*Dolerus pratensis* var. *major* Zirngiebl, 1954
- =*Dolerus pratensis* var. *mediater* Enslin, 1913
- =*Dolerus pratensis* var. *nigripes* Konow, 1884
- =*Dolerus pratensis* var. *terminater* Enslin, 1913
- =*Dolerus pratensis* auct., *nec* Linné, 1758
- =*Dosytheus xanthopus* Stephens, 1835
- =*Tenthredo abietis* Linné, 1761, *nec* Linné, 1758
- =*Tenthredo analis* Fabricius, 1793
- =*Tenthredo eglanteriae* Klug, 1818
- =*Tenthredo melanocephala* Geoffroy, 1785
- =*Tenthredo pedestris* Panzer, 1801
- =*Tenthredo quadricincta* Zetterstedt, 1835
- =*Tenthredo subfusca* (?) Le Peletier, 1823
- Dolerus (Dolerus) gessneri* André, 1880
- =*Dolerus kamtchaticus* Malaise, 1932
- =*Dolerus labiosus* Konow, 1897
- Dolerus (Dolerus) pratensis* (Linné, 1758)
- =*Dolerus dubius* var. *atratus* Enslin, 1913
- =*Dolerus dubius* var. *desertus* Klug, 1818
- =*Dolerus dubius* var. *niger* Enslin, 1909, *nec* Linné, 1767
- =*Dolerus dubius* var. *timidus* Klug, 1818
- =*Dolerus pratensis* var. *camtschatkalis* Enslin, 1927
- =*Dolerus tristis* Fabricius, 1804, *sensu* Audinet-Serville, 1823
- =*Dolerus variator* Enslin, 1927
- =*Dolerus variator* var. *mesopleuralis* Enslin, 1927
- =*Tenthredo abietis* Linné, 1758
- =*Tenthredo dubia* Klug, 1818
- =*Tenthredo hyalinalis* Stephens, 1835
- Dolerus (Dolerus) yukonensis* Norton, 1872
- =*Dolerus arcticola* Kiaer, 1898
- =*Dolerus lateralis* Konow, 1895
- =*Dolerus nundinus* MacGillivray, 1923
- =*Dolerus nuntius* MacGillivray, 1923
- =*Dolerus palustris* var. *saxatilis* Berland, 1947, *nec* Hartig, 1837
- =*Dolerus saxatilis* auct., *nec* Hartig, 1837
- =*Dolerus scoticus* Cameron, 1881

- =*Dolerus similis* var. *yukonensis* Norton, 1872  
*Dolerus (Dolerus) zhelochovtsevi* Heidema, 2001  
 =*Dolerus gibbosus* auct., nec Hartig, 1837  
*Poodolerus* sp. *Zhelochovtsev*, 1988  
*Dolerus (Poodolerus) aeneus* Hartig, 1837  
 =*Dolerus elongatus* Thomson, 1871  
 =*Dolerus incertus* Zaddach, 1859  
 =*Dolerus longicornis* Zaddach, 1859  
 =*Dolerus zaddachi* Konow, 1886, nec Kirby, 1882  
*Dolerus (Poodolerus) alpinus* Benson, 1947  
*Dolerus (Poodolerus) altivolus* Lacourt, 1988  
*Dolerus (Poodolerus) bensoni* Müller, 1985  
*Dolerus (Poodolerus) blanki* Liston, 1995  
 =*Dolerus pachycerus* auct., nec Hartig, 1837  
 =*Tenthredo thoracica* Fallén, 1808, nec Geoffroy, 1785  
*Dolerus (Poodolerus) chevini* Lacourt, 1988  
 =*Dolerus frigidus* Benson, 1965 *sensu* Chevin, 1973  
 =*Dolerus hibernicus* Lacourt, 1988 *sensu* Chevin, 1993  
*Dolerus (Poodolerus) frigidus* Benson, 1965  
*Dolerus (Poodolerus) fumosus* Stephens, 1835  
 =*Dolerus aeneus* Thomson, 1871, nec Hartig, 1837  
 =*Dolerus brachygaster* Hartig, 1837  
 =*Dolerus brevis* Zaddach, 1859  
 =*Dolerus gracilis* Zaddach, 1859  
 =*Dolerus ravus* Zaddach, 1859  
*Dolerus (Poodolerus) gonager* (Fabricius, 1781)  
 =*Dolerus femoratus* Eversmann, 1847  
 =*Dolerus lucidus* Zirngiebl, 1930, nec Freymuth, 1870  
 =*Dolerus magnicornis* Eversmann, 1847  
 =*Tenthredo erythrogonia* Schrank, 1781  
 =*Tenthredo geniculata* Geoffroy, 1785  
 =*Tenthredo nigrata* Christ, 1791, nec Müller, 1776  
*Dolerus (Poodolerus) haematodes* (Schrank, 1781)  
 =*Dolerus coerulescens* Hartig, 1837  
 =*Dolerus haematodes* var. *muliebris* Enslin, 1909  
 =*Dolerus haematodes* var. *rufatus* Enslin, 1913  
 =*Dolerus micans* Zaddach, 1859  
 =*Dolerus planatus* auct., nec Hartig, 1837  
 =*Dolerus rufotorquatus* Costa, 1864 *sensu* Zombori, 1978, 1979, 1984  
 =*Tenthredo collaris* Donovan, 1808  
 =*Tenthredo opaca* Panzer, 1792, nec Fabricius, 1775  
*Dolerus (Poodolerus) harwoodi* Benson, 1947  
*Dolerus (Poodolerus) hibernicus* Lacourt, 1988  
 =*Dolerus nubilus* Müller, 1988  
 =*Dolerus nubilus guttalensis* Müller, 1996  
*Dolerus (Poodolerus) liogaster* Thomson, 1871  
*Dolerus (Poodolerus) liogaster liogaster* Thomson, 1871  
 =*Dolerus liogaster* var. *grayi* Liston, 1981  
 =*Dolerus liogaster* var. *rufonotatus* Enslin, 1913  
 =*Dolerus rugosus* Konow, 1884, nec Freymuth, 1870  
 =*Dolerus rugulosus* Dalla Torre, 1894  
 =*Dolerus schmidti* Konow, 1884  
*Dolerus (Poodolerus) megapteroides* Muche, 1964  
*Dolerus (Poodolerus) montjoiensis* Lacourt, 1994  
*Dolerus (Poodolerus) niger* (Linné, 1767)  
 =*Dolerus ephippiatus* Smith, 1874

= *Tenthredo angusta* Gmelin, 1790

*Dolerus (Poodolerus) nigratus* (Müller, 1776)

= *Dolerus analis* Konow, 1890

= *Dolerus cenchrus* Hartig, 1837

= *Dolerus fissus* Hartig, 1837

= *Dolerus hartigi* Scholtz, 1847

= *Dolerus leucobasis* Hartig, 1837

= *Tenthredo canescens* Gmelin, 1790

*Dolerus (Poodolerus) nitens* Zaddach, 1859

= *Dolerus anthracinus* Thomson, 1871, *nec* Klug, 1818

= *Dolerus coracinus* Lindqvist, 1969, *nec* Klug, 1818

= *Dolerus coracinus* Stephens, 1835, *nec* Klug, 1818

= *Dolerus coruscans* Konow, 1890

= *Dolerus varispinus* Konow, 1884, *nec* Hartig, 1837

= *Dolerus wanda* Ross, 1935

*Dolerus (Poodolerus) noblecourti* Lacourt, 2004

*Dolerus (Poodolerus) phalipi* Chevin, 1988

*Dolerus (Poodolerus) picipes* (Klug, 1818)

= *Dolerus brevitarsus* Hartig, 1837

= *Dolerus intermedius* Cameron, 1881

= *Dolerus leucopterus* Zaddach, 1859

= *Dolerus ochroneurus* Förster, 1860

= *Dolerus raddatzi* Konow, 1884

= *Dolerus sulcatus* Konow, 1884

= *Dolerus varispinus* Thomson, 1871, *nec* Hartig, 1837

*Dolerus (Poodolerus) planatus* Hartig, 1837

= *Dolerus asper* Zaddach, 1859

= *Dolerus brevicornis*(?) Zaddach, 1859

= *Dolerus carbonarius* Zaddach, 1859

= *Dolerus fumosus* Zaddach, 1859, *nec* Stephens, 1835

= *Dolerus oblongus* Cameron, 1882

= *Dolerus tectus* MacGillivray, 1914

= *Dolerus zaddachi* Kirby, 1882

*Dolerus (Poodolerus) pseudoaeneus* Lacourt, 1988

*Dolerus (Poodolerus) puncticollis* Thomson, 1871

= *Dolerus croaticus* Konow, 1890

*Dolerus (Poodolerus) sanguinicollis* (Klug, 1818)

= *Dolerus lucens*(?) André, 1880

= *Dolerus sanguinicollis* var. *confusus*(?) Enslin, 1913

= *Dolerus sanguinicollis* var. *reicherti*(?) Konow, 1894

= *Dolerus schneideri*(?) *auct.*, *nec* Kiaer, 1896

*Dolerus (Poodolerus) stygius* Förster, 1860

= *Dolerus megapterus* Cameron, 1881

*Dolerus (Poodolerus) truncatus* Lacourt, 1988

*Dolerus (Poodolerus) varispinus* Hartig, 1837

= *Dolerus brevitarsus auct.* *nec* Hartig, 1837

= *Dolerus liogaster auct.*, *nec* Thomson, 1871

*Loderus sp.* Konow, 1890

= *Dicrodolerus sp.* Goulet, 1986

*Loderus gilvipes* (Klug, 1818)

= *Dolerus ornatulus* Konow, 1897

= *Dolerus tenebrosus* Eversmann, 1847

*Loderus vestigialis* (Klug, 1818)

= *Dolerus rufipes* Audinet-Serville, 1823

= *Loderus vestigialis* var. *ruficollis* Enslin, 1913

= *Tenthredo vestigialis* var. *plaga* Klug, 1818

*Oncodolerus* sp. Goulet, 1986

*Oncodolerus eversmanni* (Kirby, 1882)

- =*Dolerus fumosus* Eversmann, 1847, nec Stephens, 1835
- =*Dolerus trigeminus* Konow, 1884
- =*Loderus eversmanni* Kirby, 1882
- =*Tenthredo palmatus* auct., nec Klug, 1818

*Dulophanini* Lacourt, 1998

*Dulophanes* sp. Konow, 1907

- =*Anapeptamena* sp. auct., nec Konow, 1898
- =*Corugia* sp. Malaise, 1944
- =*Dulophanella* sp. Forsius, 1934
- =*Melisandra* sp. Benson, 1939, p. p.
- =*Neobusarbia* sp. Takeuchi, 1928
- =*Nesoselandria* sp. Rohwer, 1910
- =*Phanodules* sp. Pasteels, 1949

*Dulophanes morio* (Fabricius, 1781)

- =*Emphytus infuscatus* Eversmann, 1847
- =*Nesoselandria morio* Fabricius, 1781
- =*Selandria fabricii* Konow, 1885
- =*Tenthredo tristis* Audinet-Serville, 1823, nec Fabricius, 1804
- =*Tenthredo ulmi* Schrank, 1802, nec Linné, 1758

*Heptamelini* Benson, 1938

*Heptamelus* sp. Haliday, 1855

- =*Caenoneura* sp. Thomson, 1870
- =*Melicerta* sp. Stephens, 1835, nec Schrank, 1803

*Heptamelus ochroleucus* (Stephens, 1835)

- =*Caenoneura dahlbomi* Thomson, 1870

*Selandriini* Rohwer, 1911

*Brachytops* sp. Haliday, 1839

- =*Coryna* sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828, nec Bosc, 1802
- =*Paraselandria* sp. Ashmead, 1898
- =*Pseudoselandria* sp. MacGillivray, 1914
- =*Selandridea* sp. Rohwer, 1911

*Brachytops flavens* (Klug, 1816)

- =*Phyllotoma puella* Fallén, 1829
- =*Pseudoselandria oxalata* MacGillivray, 1914
- =*Selandria decolorata* Cresson, 1880
- =*Selandria flavens* var. *antennalis* Zirngiebl, 1954
- =*Selandria flavens* var. *flavissima* Zirngiebl, 1961
- =*Selandria flavescens* Thomson, 1870
- =*Selandridea vanduzeei* Rohwer, 1911
- =*Tenthredo* (*Coryna*) *scapularis* Le Peletier, 1828

*Brachytops wuestneii* (Konow, 1885)

- =*Brachytops flavistigma* Grönblom, 1939

*Lonnea* sp. Lacourt, 2003

*Lonnea perplexa* (Zombori, 1976)

- =*Pseudostromboceros perplexus* (Zombori, 1976)
- =*Birka perplexa* (Zombori, 1976)

*Selandria* sp. Leach, 1817

*Selandria melanosterna* (Audinet-Serville, 1823)

=*Selandria dorsalis* Kirby, 1882 nec Stephens, 1835

=*Selandria grandis* Zaddach, 1859

=*Selandria interstitialis* Thomson, 1871

=*Selandria sixii* Snellen van Vollenhoven, 1858

*Selandria serva* (Fabricius, 1793)

=*Selandria dorsalis* Stephens, 1835

=*Selandria excisa* Konow, 1885

=*Selandria serva fuscitarsis* Benson, 1954

=*Selandria serva* var. *interstitialis* Konow, 1885, nec Thomson, 1871

=*Selandria serva* var. *punctatus* Zirngiebl, 1956

=*Tenthredo* (*Allantus*) *lepida* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo serva* var. *mascula* Fallén, 1807

=*Tenthredo serva* var. *mediocris* Le Peletier, 1823

=*Tenthredo socia* Klug, 1816

### ***Strongylogasterini* Rohwer, 1911**

*Hemitaxonus* sp. Ashmead, 1898

=*Canonarea* sp. Malaise, 1947

=*Epitaxonus* sp. MacGillivray, 1908

=*Sahlbergia* sp. Forsius, 1910

=*Trearea* sp. Malaise, 1947

*Hemitaxonus contiguus* (Konow, 1885)

=*Sahlbergia struthiopteridis* Forsius, 1910

=*Strongylogaster mixta* Klug, *sensu* Thomson, 1871

*Stromboceros* sp. Konow, 1885

=*Arbusia* sp. Malaise, 1944

=*Strombocerina* sp. Malaise, 1942

*Stromboceros delicatula* (Fallén, 1808)

=*Allantus melanocephalus* Stephens, 1835

=*Selandria phthisica* Snellen van Vollenhoven, 1869

=*Strongylogaster viridis* Smedeknecht, 1881

=*Synairema alpina* Brems, 1849

=*Tenthredo eborina* Klug, 1817

*Strongylogaster* sp. Dahlbom, 1835

=*Polystichophagus* sp. Ashmead, 1898

=*Prototaxonus* sp. Rohwer, 1910

=*Pseudotaxonus* sp. Costa, 1894

=*Thrinax* sp. Konow, 1885

*Pseudotaxonus* sp. Costa, 1894

*Strongylogaster (Pseudotaxonus) filicis* (Klug, 1817)

=*Sciapteryx apicalis* Matsumura, 1912

=*Tenthredo atricornis* Stephens, 1835

=*Tenthredo carinata* Klug, 1817

*Strongylogaster* sp. Dahlbom, 1835

*Strongylogaster (Strongylogaster) macula* (Klug, 1817)

=*Thrinax intermedia* Konow, 1885

*Strongylogaster (Strongylogaster) mixta* (Klug, 1817)

=*Selandria japonica* Matsumura, 1912

=*Strongylogaster femoralis* Cameron, 1874

*Strongylogaster (Strongylogaster) multifasciata* (Geoffroy, 1785)

- =*Strongylogaster annularis* Matsumura, 1912
- =*Strongylogaster cretensis* Konow, 1887
- =*Strongylogaster desbrochersi* Konow, 1891
- =*Strongylogaster desbrochersi* var. *lepticus* Konow, 1902
- =*Strongylogaster iridipennis* Smith, 1874
- =*Strongylogaster lineata* Christ, 1791
- =*Tenthredo (Allantus) alternans* Audinet-Serville, 1823
- =*Tenthredo cingulata* Fabricius, 1793 *nec* Scopoli, 1763
- =*Tenthredo linearis* Klug, 1817 *nec* Schrank, 1781
- =*Tenthredo lineata* Christ, 1791

*Strongylogaster (Strongylogaster) multifasciata multifasciata* (Geoffroy, 1785)

*Strongylogaster (Strongylogaster) xanthocera* (Stephens, 1835)

- =*Strongylogaster geniculata* Thomson, 1871

*Sioblinae Lacourt, 1997*

*Siobliini Takeuchi, 1952*

*Siobla* sp. Cameron, 1877

- =*Encarsioneura* sp. Konow, 1890
- =*Megasiobla* sp. Dovnar-Zapolskij, 1930

*Siobla sturmii* (Klug, 1817)

- =*Macrophya pacifica*(?) Smith, 1874
- =*Siobla sturmii plesia* Malaise, 1945

*Tenthredininae Newman, 1834*

*Cephaledinini Lacourt, 1997*

*Cephaledo* sp. Zhelochovstev, 1988

*Cephaledo bifasciata* (Müller, 1766)

*Cephaledo bifasciata bifasciata* (Müller, 1766)

- =*Allantus bifasciatus* var. *ater* Enslin, 1910
- =*Allantus bifasciatus* var. *nigritibiis* Enslin, 1910
- =*Allantus bifasciatus* var. *unicingulatus* Enslin, 1910
- =*Allantus rossii* Jurine, 1807, *nec* Panzer, 1805
- =*Allantus viduus* var. *unifasciatus* De Stefani, 1883, *nec* Mocsary, 1877
- =*Tenthredo bifasciata* (Müller, 1766)
- =*Tenthredo bifasciata* var. *catax* Enslin, 1912
- =*Tenthredo rossii* croatica Weiffenbach, 1956
- =*Tenthredo vidua* Rossi, 1790

*Cephaledo bifasciata rossii* (Panzer, 1805)

- =*Allantus rossii* var. *unifasciatus* Mocsary, sensu Konow, 1888
- =*Tenthredo bifasciata rossii* Panzer, 1805
- =*Tenthredo bifasciata* Klug, 1817, *nec* Müller, 1766
- =*Tenthredo cincta* Linné, sensu *Fabricius*, 1793
- =*Tenthredo rossica* var. *laeviceps* Hellén, 1955
- =*Tenthredo scissa* Klug, 1819
- =*Tenthredo tenula* Scopoli, sensu Audinet-Serville, 1823, *et auct.*
- =*Tenthredo zonata* Christ, sensu Fallén, 1808

*Cephaledo caucasica* (Eversmann, 1847)

*Cephaledo caucasica cinctaria* (Enslin, 1912)

=*Allantus causicus* var. *carpathica* Gregor, 1927

=*Allantus unifasciatus* Mocsary, 1877 *nec* Geoffroy, 1785

*Cephaledo meridiana* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo meridiana* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo meridiana* var. *flavonotata* Enslin, 1912

*Cephaledo neobesa* (Zombori, 1980)

=*Allantus obesus* Mocsary, 1880 *nec* Norton, 1860

=*Tenthredo pseudorossii* Taeger, 1985

=*Tenthredo rossii* auct., *nec* Panzer, 1805, p. p.

*Cephaledo segmentaria* Fabricius, 1798

=*Allantus obesus* Mocsary *sensu* Costa, 1894

=*Allantus steckii* Konow, 1888

=*Tenthredo stecki* Konow, 1888

## *Macrophyini* Benson, 1946

*Macrophya* sp. Dahlbom, 1835

=*Beldonea* sp. Enderlein, 1919 *nec* Cameron, 1899

=*Paramacrophya* sp. Forsius, 1918

=*Zalagium* sp. Rohwer, 1912

*Macrophya* sp. Dahlbom, 1835

*Macrophya (Macrophya) albicincta* (Schrank, 1776)

=*Macrophya albicincta* var. *candidata* Enslin, 1917

=*Macrophya albicincta* var. *decipiens* Konow, 1884

=*Macrophya leucopoda* Palma, 1861

=*Macrophya melasoma* Rodow, 1871

=*Perineura crippae* De Stefani, 1885

=*Tenthredo (Allantus) luctuosa* Audinet-Serville, 1823, *nec* Schrank, 1802

=*Tenthredo (Allantus) lugubris* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo albipes* Geoffroy, 1785

=*Tenthredo fera* Fallén, 1808, *nec* Scopoli, 1786

*Macrophya (Macrophya) albipuncta* (Fallén, 1808)

=*Macrophya friesei* Konow, 1884, p. p.

=*Macrophya nivosa* Costa, 1894

=*Tenthredo (Macrophya) liciata* Eversmann, 1847

*Macrophya (Macrophya) alboannulata* Costa, 1859

=*Macrophya tibialis* Mocsary, 1881

=*Tenthredo (Allantus) discolor* Audinet-Serville, 1823, *nec* Klug, 1817

*Macrophya (Macrophya) annulata* (Geoffroy, 1785)

=*Macrophya annulata* var. *nigra* Konow, 1894

=*Tenthredo (Allantus) abietis* Audinet-Serville, 1823, *nec* Linné, 1758

=*Tenthredo (Allantus) neglecta* Klug, 1817

=*Tenthredo ligata* Müller, 1776, p. p.

=*Tenthredo similis* Spinola, 1808

*Macrophya (Macrophya) blanda* (Fabricius, 1775)

=*Macrophya blanda* var. *brevicornis* Gradl, 1878

=*Tenthredo (Allantus) lacrymosa* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo cognata* Fallén, 1829

=*Tenthredo cylindrica* Fabricius, 1804

=*Tenthredo ligustrina* Geoffroy, 1785

=*Tenthredo nyctea* Fischer de Waldheim, 1843

- = *Tenthredo solitaria* Schrank, 1781, *nec* Scopoli, 1763
- Macrophya (Macrophya) carinthiaca* (Klug, 1817)
- Macrophya (Macrophya) crassula* (Klug, 1817)
- = *Macrophya cora* Kirby, 1886
- = *Macrophya klugii* Snellen van Vollenhoven, 1869
- = *Tenthredo (Allantus) maculosa* Audinet-Serville, 1823
- Macrophya (Macrophya) diversipes* (Schrank, 1782)
- = *Macrophya caucasica* André, 1881
- = *Macrophya dalmatina* Gasparini, 1891
- = *Macrophya diversipes* var. *feminina* Enslin, 1913
- = *Macrophya diversipes* var. *masculina* Enslin, 1913
- = *Macrophya diversipes* var. *nigritarsis* Enslin, 1913
- = *Macrophya eximia* Mocsary, 1877
- = *Macrophya flavipes* Tischbein, 1852
- = *Macrophya haematopus* var. *immaculiventris* Costa, 1866
- = *Macrophya rubripes* André, 1881
- = *Macrophya sanguinipes* Mocsary, 1891
- = *Macrophya saundersi* Kirby, 1886
- = *Tenthredo (Macrophya) corallipes* Eversmann, 1847
- = *Tenthredo haematopus* Villers, 1789
- = *Tenthredo halensis* Aichinger, 1870
- = *Tenthredo ochreata* Panzer, 1804
- Macrophya (Macrophya) duodecimpunctata* (Linné, 1758)
- = *Macrophya duodecimpunctata* var. *nigrina* Konow, 1898
- = *Macrophya luridicarpa* Costa, 1894
- = *Macrophya novemguttata* Costa, 1859
- = *Pachyprotasis dolens* André, 1881
- = *Tenthredo (Allantus) albamacula* (?) Audinet-Serville, 1823
- = *Tenthredo curvipes* Gimmerthal, 1847
- = *Tenthredo dolens* Eversmann, 1847
- = *Tenthredo fera* Scopoli, 1786
- = *Tenthredo idriensis* Le Peletier, 1823
- = *Tenthredo melanoleuca* Gmelin, 1789
- = *Tenthredo signata* Scopoli, 1763
- Macrophya (Macrophya) erythrocnema* Costa, 1859
- = *Tenthredo (Macrophya) femoralis* Kawall, 1864, *nec* Stephens, 1835
- Macrophya (Macrophya) erythrogastra* (Spinola, 1843)
- Macrophya (Macrophya) militaris* (Klug, 1817)
- = *Macrophya lepeletieri* Costa, 1859
- = *Macrophya militaris* var. *cabreræ* Konow, 1896
- = *Macrophya militaris* var. *nigriscutis* Enslin, 1913
- = *Tenthredo (Allantus) schaefferi* Audinet-Serville, 1823, *nec* Klug, 1817
- = *Tenthredo analis* Spinola, 1808, *nec* Fabricius, 1793
- Macrophya (Macrophya) montana* (Scopoli, 1763)
- = *Macrophya rustica* var. *pleuralis* Enslin, 1913
- = *Macrophya rustica* var. *scutellaris* Enslin, 1913
- = *Tenthredo (Allantus) albimana* Audinet-Serville, 1823
- = *Tenthredo (Allantus) laserpitii* (?) Le Peletier, 1823
- = *Tenthredo melanochoa* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo notata* Panzer, 1799, *nec* Müller, 1776
- = *Tenthredo rustica* auct., *nec* Linné, 1758
- = *Tenthredo sulphurata* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo tricincta* Christ, 1791
- = *Tenthredo trifasciata* Geoffroy, 1785
- Macrophya (Macrophya) recognata* Zombori, 1979
- = *Macrophya cognata* Mocsary, 1881, *nec* Fallén, 1829
- = *Macrophya pallidilabris* auct., *nec* Costa, 1890

*Macrophya (Macrophya) ribis* (Schrank, 1781)

- = *Macrophya bertolinii* Cobelli, 1890
- = *Macrophya ribesii* Kaltenbach, 1869
- = *Tenthredo exalbida* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo leucopus* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo salicis* Ström, 1788, nec Schrank, 1781, nec Linné, 1758

*Macrophya (Macrophya) rufipes* (Linné, 1758)

- = *Macrophya rufipes* var. *castiliensis* Enslin, 1914
- = *Macrophya rufipes* var. *muliebris* Enslin, 1913
- = *Tenthredo (Allantus) citreipes* Audinet-Serville, 1823
- = *Tenthredo dumetorum* Geoffroy, 1785
- = *Tenthredo pavidata* Fabricius, 1775
- = *Tenthredo strigosa* Fabricius, 1798

*Macrophya (Macrophya) sanguinolenta* (Gmelin, 1790)

- = *Macrophya quadrimaculata* var. *albitarsis* Konow, 1890
- = *Macrophya quadrimaculata* var. *nigra* Jakovlev, 1888
- = *Macrophya sanguinolenta* var. *albitarsis* Enslin, 1917, nec Konow, 1890
- = *Macrophya sanguinolenta* var. *borealis* Forsius, 1918
- = *Macrophya trochanterica* Costa, 1859
- = *Tenthredo comma* Fallén, 1808
- = *Tenthredo poecilopus* Aichinger, 1870
- = *Tenthredo quadrimaculata* Fabricius, 1787, nec Müller, 1766
- = *Tenthredo sambuci* Latreille, 1805
- = *Tenthredo tarsata* Panzer, 1809, nec Fabricius, 1804

*Macrophya (Macrophya) tenella* Mocsary, 1881

- = *Macrophya friesei* Konow, 1884, p. p.

*Macrophya (Macrophya) teutona* (Panzer, 1799)

- = *Macrophya klugi* Konow, 1894, nec Snellen van Vollenhoven, 1869
- = *Macrophya marginata* Mocsary, 1881
- = *Tenthredo aureatensis* Schrank, 1802

*Pseudomacrophya* sp. Enslin, 1913

*Macrophya (Pseudomacrophya) punctum-album* (Linné, 1767)

- = *Macrophya parvula sensu* Liston, 1987, nec Konow, 1884
- = *Tenthredo erythropus* Schrank, 1776
- = *Tenthredo punctum* Fabricius, 1781
- = *Tenthredo stellata* Geoffroy, 1785

*Pachyprotasis* sp. Hartig, 1837

- = *Lithracia* sp. Cameron, 1902

*Pachyprotasis antennata* (Klug, 1817)

- = *Pachyprotasis antennata* var. *extensa* Lindqvist, 1955
- = *Tenthredo scripta* Gmelin, 1790 sensu Le Peletier, 1823
- = *Tenthredo scripta* Gmelin, 1790 sensu Audinet-Serville, 1823

*Pachyprotasis rapae* (Linné, 1767)

- = *Macrophya (Pachyprotasis) omega* Norton, 1867
- = *Macrophya obnata* MacGillivray, 1923
- = *Rhogogaster sayi* Rohwer, 1908
- = *Tenthredo (Allantus) duplex* Audinet-Serville, 1823
- = *Tenthredo floricola* Gravenhorst, 1807
- = *Tenthredo luctuosa* Schrank, 1802
- = *Tenthredo nigrofasciata* Eschscholtz, 1822
- = *Tenthredo scripta* Gmelin, 1790

*Pachyprotasis simulans* (Klug, 1817)

- = *Pachyprotasis laevicollis* Thomson, 1871
- = *Pachyprotasis tenuis* Rudow, 1871

*Pachyprotasis variegata* (Fallén, 1808)

## **Perineurini Rohwer, 1911**

*Perineura* sp. Hartig, 1837

*Perineura rubi* (Panzer, 1805)

= *Tenthredo* (*Synairema*) *delicatula* Hartig, 1837, *nec* Fallén, 1808

= *Tenthredo elegantula* Fallén, 1808

= *Tenthredo lividiventris* Fallén, 1808

## **Rhogogasterini Lacourt, 1997**

*Cytisogaster* sp. Lacourt, 1997

= *Rhogogaster* Konow, 1884 *p. p.* (groupe *picta*) Lacourt, 1997

*Cytisogaster chambersi* (Benson, 1947)

= *Rhogogaster chambersi* Benson, 1947

*Cytisogaster genistae* (Benson, 1949)

= *Rhogogaster genistae* Benson, 1949

= *Rhogogaster genistae genistae* Benson, 1949

= *Rhogogaster genistae viridifrons* Muche, 1973

*Cytisogaster picta* (Klug, 1814)

= *Rhogogaster picta* Klug, 1814

= *Sciapteryx andreina* (?) Magretti, 1886

= *Selandria albomarginata* Rudow, 1871, *nec* Snellen van Vollenhoven, 1858

= *Tenthredo sesana* Rudow, 1871

*Rhogogaster* sp. Konow, 1884

*Rhogogaster californica* (Norton, 1862)

= *Rhogogaster polaris* Lindqvist, 1964

= *Tenthredo ripula* MacGillivray, 1923

= *Tenthredopsis evansii* Harrington, 1889

*Rhogogaster chlorosoma* Benson, 1943

= *Rhogogaster chlorosoma podkumokensis* Muche, 1973

= *Rhogogaster scalaris* Klug, 1817, *sensu* Zhelochovtsev, 1988

*Rhogogaster dryas* Benson, 1943

*Rhogogaster punctulata* (Klug, 1817)

= *Perineura idriensis* André, 1881

*Rhogogaster viridis* (Linné, 1758)

= *Rhogogaster respectus* MacGillivray, 1923

= *Rhogogaster ruga* MacGillivray, 1923

= *Rhogogaster similis* Lindqvist, 1958

= *Rhogogaster viridis* var. *lapponica* Enslin, 1917

= *Rhogogaster viridis* var. *melanonota* Enslin, 1912

= *Rhogogaster viridis* var. *nigroscutellata* Forsius, 1918

= *Rhogogaster viridis* var. *sibirica* Enslin, 1912

= *Tenthredo* (*Allantus*) *scalaris* Klug, 1817

= *Tenthredo annulicornis* Gmelin, 1790

= *Tenthredo chloros* Rudow, 1871

= *Tenthredo interrupta* Fabricius, 1804

= *Tenthredo straminea* Schrank, 1781

## **Sciapterygini Benson, 1946**

*Blankia* sp. Lacourt, 1998

=*Cuneala* sp. auct., nec Zirngiebl, 1956 p. p.

*Blankia koehleri* (Klug, 1817)

=*Cuneala koehleri* (Klug, 1817)

*Elinora* sp. Benson, 1946

=*Cuneala* sp. Zirngiebl, 1956

*Elinora baetica* (Spinola, 1843)

*Elinora baetica dominiquei* (Konow, 1894)

*Elinora confusa* (Audinet-Serville, 1823)

*Elinora flaveola* (Gmelin, 1790)

=*Allantus flaveola* var. *flavago* Dovnar-Zapolskij, 1930

=*Allantus orientalis* Kriechbaumer, 1869

=*Allantus rufocingulatus* Tischbein, 1852

=*Tenthredo* (*Allantus*) *dispar* Klug, 1817

=*Tenthredo* (*Allantus*) *grata* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo flavipes* Geoffroy, 1785, nec Retzius, 1783, nec Müller, 1776

=*Tenthredo rubiginosa* Gmelin, 1790

*Paratenthredo* sp. Taeger, 1991

*Paratenthredo frauenfeldii* (Giraud, 1857)

=*Allantus frauenfeldii* var. *montanus* De Stefani, 1883

=*Allantus helveticus* Konow, 1898

=*Paratenthredo dilleri* Taeger, 1991

=*Tenthredo frauenfeldii* Giraud, 1857

*Sciapteryx* sp. Stephens, 1835

=*Eniscia* sp. Thomson, 1870

=*Sciapterina* sp. Ushinskij, 1940

*Sciapteryx consobrina* (Klug, 1816)

=*Allantus consobrinus* var. *zwickaviensis* Schlechtendal, 1873

=*Sciapteryx consobrina* var. *mediana* Dovnar-Zapolskij, 1930

*Sciapteryx costalis* (Fabricius, 1775)

=*Selandria albomarginata* Snellen van Vollenhoven, 1858

=*Tenthredo fulvivenia* Schrank, 1781

*Sciapteryx costalis costalis* (Fabricius, 1775)

*Sciapteryx costalis soror* Konow, 1890

*Zonuledo* sp. Zhelochovtsev, 1988

*Zonuledo amoena* (Gravenhorst, 1807)

=*Allantus bicinctus* auct., nec Linné, 1767

=*Allantus inversus* Costa, 1894

=*Allantus quinquecinctus* Gimmerthal, 1834

=*Tenthredo amoena* Gravenhorst, 1807

=*Tenthredo cingulum* Klug, 1817, nec Spinola, 1806

*Zonuledo bizonula* (Enslin, 1910)

=*Allantus fasciatus* var. *antigae* Konow, 1903, nec Konow, 1895

=*Tenthredo bizonula* Enslin, 1910

*Zonuledo distinguenda* (Stein, 1885)

=*Tenthredo distinguenda* Stein, 1885

*Zonuledo distinguenda distinguenda* (Stein, 1885)

=*Allantus distinguendus* var. *borrei* Stein, 1886

=*Tenthredo* (*Allantus*) *luteiventris* Audinet-Serville, 1823, nec

Klug, 1818

*Zonuledo zonula* (Klug, 1817)

- = *Allantus calcaratus* André, 1881
- = *Allantus scutellaris* Konow, 1898
- = *Allantus similis* Mocsary, 1880
- = *Tenthredo bicinctaflava* Christ, 1791
- = *Tenthredo bifasciata* Geoffroy, 1785, *nec* Müller, 1766
- = *Tenthredo fasciata* Scopoli, 1763, *nec* Linné, 1758
- = *Tenthredo zonula* Klug, 1817

***Tenthredinini Rohwer, 1911***

*Tenthredella* sp. Rohwer, 1910

*Tenthredella asperrima* (Lacourt, 1980)

*Tenthredella atra* (Linné, 1758)

- = *Tenthredella atra* var. *orbitalis* Forsius, 1918
- = *Tenthredella atra* var. *pseudomandibularis* Enslin, 1917
- = *Tenthredella atra* var. *pseudoscotica* Enslin, 1917
- = *Tenthredella atra* var. *schirmeri* Enslin, 1917
- = *Tenthredo atra* var. *nobilis* Konow, 1904
- = *Tenthredo atra* var. *obscurata* Jakovlev, 1888
- = *Tenthredo atra* var. *transigens* Enslin, 1920
- = *Tenthredo crassa* Schrank, 1781, *nec* Scopoli, 1763
- = *Tenthredo dispar* Klug, 1817 p. 206, *nec* Klug, 1817 p. 141
- = *Tenthredo fuscipes* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo obscura* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo pavidata* Fallén, 1808, *nec* Fabricius, 1804
- = *Tenthredo plebeja* Klug, 1817
- = *Tenthredo rejecta* Dalla Torre, 1882
- = *Tenthredo relictata* Le Peletier, 1823
- = *Tenthredo rufipes* Poda, 1761, *nec* Linné, 1758
- = *Tenthredo scopoli* Le Peletier, 1823
- = *Tenthredo scotica* Cameron, 1882

*Tenthredella bipunctula* (Klug, 1817)

*Tenthredella colon* (Klug, 1817)

- = *Tenthredella colon* var. *nigriventris* Enslin, 1912
- = *Tenthredo colon* var. *malaisei* Forsius, 1929
- = *Tenthredo jocosa* Provancher, 1882
- = *Tenthredo livida* Linné *sensu* Ross, 1951, *nec* Linné, 1758
- = *Tenthredo nigricollis* Kirby, 1882, *nec* Cameron, 1881
- = *Tenthredo obscura* Panzer, 1805, *nec* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo punctulata* Konow, 1887
- = *Tenthredo rudowi* André, 1881

*Tenthredella cunyi* (Konow, 1886)

- = *Tenthredella cunyi* var. *alboplagiata* Enslin, 1912
- = *Tenthredella cunyi* var. *pleuritica* Enslin, 1912
- = *Tenthredo chyzeri* Mocsary, 1891

*Tenthredella fagi* (Panzer, 1798)

- = *Tenthredella fagi* var. *melanaspis* Enslin, 1912
- = *Tenthredella fagi* var. *nigerrima* Forsius, 1918
- = *Tenthredo (Allantus) pellucida* Klug, 1817, *nec* Müller, 1776
- = *Tenthredo facigera* Konow, 1899
- = *Tenthredo maura* André, 1881, *nec* Fabricius, 1793
- = *Tenthredo solitaria* Cameron, 1882, *nec* Schrank, 1781, *nec* Scopoli, 1763

*Tenthredella ignobilis* (Klug, 1817)

- = *Tenthredo ibrida* Eversmann, 1847

*Tenthredella livida* (Linné, 1758)

- = *Allantus aterrimus* Stephens, 1835

- = *Tenthredella livida* var. *clara* Enslin, 1912
- = *Tenthredella livida* var. *pronotalis* Enslin, 1917
- = *Tenthredella livida* var. *rubeola* Forsius, 1918
- = *Tenthredella livida* var. *rubripes* Forsius, 1918
- = *Tenthredo albicornis* Geoffroy, 1785, *nec* Fabricius, 1781
- = *Tenthredo annularis* Schrank, 1776
- = *Tenthredo bipunctata* Müller, 1776
- = *Tenthredo carpini* Panzer, 1799
- = *Tenthredo dubia* Ström, 1768
- = *Tenthredo lurida* Müller, 1775
- = *Tenthredo maura* Fabricius, 1793
- = *Tenthredo pellucida* Müller, 1776

***Tenthredella mandibularis* (Fabricius, 1804)**

- = *Tenthredo rufipes* Gmelin, 1790, *nec* Poda, 1761, *nec* Linné, 1758

***Tenthredella moniliata* (Klug, 1817)**

- = *Tenthredella moniliata* var. *flavoscutellata* Forsius, 1918
- = *Tenthredo (Macrophyta) flavilabris* Gimmerthal, 1847
- = *Tenthredo crenata* Enslin, 1912
- = *Tenthredo forsii* Konow, 1908
- = *Tenthredo fuscicornis* Eschscholtz, 1822
- = *Tenthredo fuscicornis* var. *nigricornis* Malaise, 1932
- = *Tenthredo fuscicornis* var. *ruficornis* Mocsary, 1909
- = *Tenthredo lachlaniana* Cameron, 1878
- = *Tenthredo lachlaniana* var. *immaculata* Jakovlev, 1888
- = *Tenthredo lachlaniana* var. *rubripes* Jakovlev, 1888
- = *Tenthredo moniliata* var. *immaculosa* Enslin, 1920
- = *Tenthredo moniliata* var. *paria* Enslin, 1920
- = *Tenthredo poecila* Eversmann, 1847
- = *Tenthredo poecilopus* Mocsary, 1880, *nec* Aichinger, 1870
- = *Tenthredo ruthena* Jakovlev, 1892
- = *Tenthredo scita* Erichson, 1851

***Tenthredella procera* (Klug, 1817)**

- = *Tenthredo gribodoi* Costa, 1894

***Tenthredella rubricoxis* Enslin, 1912**

- = *Tenthredo (Allantus) rufipes* Klug, 1817, *nec* Gmelin, 1790, *nec* Poda, 1761, *nec* Linné, 1758

***Tenthredella silensis* (Costa, 1859)**

- = *Tenthredo (Allantus) limbata* Klug, 1817, *nec* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo oraria* Zombori, 1973
- = *Tenthredo quadridens* Strobl, 1896

***Tenthredella solitaria* (Scopoli, 1763)**

- = *Tenthredella solitaria* var. *rufoterminata* Enslin, 1912
- = *Tenthredo coryli* Panzer, 1799
- = *Tenthredo intermedia* Klug, 1817
- = *Tenthredo saxonica* Muche, 1968
- = *Tenthredo solitaria* var. *seeboldi* Konow, 1897

***Tenthredella velox* (Fabricius, 1798)**

- = *Tenthredella velox* var. *colonoides* Forsius, 1918
- = *Tenthredo alpicola* Stein, 1884
- = *Tenthredo biguttata* Hartig, 1837
- = *Tenthredo gracilentata* Mocsary, 1879
- = *Tenthredo velox* var. *alpina* Zirngiebl, 1937
- = *Tenthredo velox* var. *bisignata* Konow, 1908
- = *Tenthredo velox* var. *nigripleuris* Zirngiebl, 1937
- = *Tenthredo velox* var. *nigrolineata* Cameron, 1877
- = *Tenthredo velox* var. *sibirica* Konow, 1903
- = *Tenthredo velox* var. *simplex* Dalla Tore, 1882

*Tenthredo* sp. Linné, 1758

=*Clydostomus* sp. Konow, 1908  
=*Labidia* sp. Provancher, 1886  
=*Parastatis* sp. Kirby, 1881  
=*Tenthredina* sp. Rohwer, 1910  
=*Zamacrophya* sp. Rohwer, 1912

*Endotethryx* sp. Lacourt, 1997

*Tenthredo* (*Endotethryx*) *campestris* Linné, 1758

=*Tenthredella flavicornis* var. *pallior* Forsius, 1918  
=*Tenthredo flava* Poda, 1761, *nec* Linné, 1761  
=*Tenthredo flavicornis* Fabricius, 1781  
=*Tenthredo flavicornis* var. *temporalis* Enslin, 1912  
=*Tenthredo luteicornis* Fabricius, 1787  
=*Tenthredo poecilochroa* Schrank, 1781  
=*Tenthredo umbellatarum* Panzer, 1806

*Tenthredo* (*Endotethryx*) *crassa* Scopoli, 1763

=*Tenthredo* (*Allantus*) *nebulosa* Audinet-Serville, 1823  
=*Tenthredo albicornis* Fabricius, 1781  
=*Tenthredo dealbata* Gmelin, 1790  
=*Tenthredo impura* Scopoli, 1763

*Maculedo* sp. Zhelochovtsev, 1988

*Tenthredo* (*Maculedo*) *diana* Benson, 1968

=*Tenthredo maculata* var. *coloris* Zirngiebl, 1940

*Tenthredo* (*Maculedo*) *maculata* Geoffroy, 1785

=*Tenthredella maculata* var. *atricollaris* Enslin, 1912  
=*Tenthredo* (*Allantus*) *latizona* Audinet-Serville, 1823  
=*Tenthredo andrei* Mocsary, 1883  
=*Tenthredo equestris* Panzer, 1809  
=*Tenthredo maculata* var. *collaris* Zirngiebl, 1940  
=*Tenthredo maculata* var. *wagneri* Zirngiebl, 1940  
=*Tenthredo unifasciata* Geoffroy, 1785  
=*Tenthredo zonata* Christ, 1791

*Tenthredo* (*Maculedo*) *trabeata* Klug, 1817

=*Perineura fulvitaris* André, 1881  
=*Tenthredo* (*Allantus*) *palustris* Klug, 1917  
=*Tenthredo marinovi* Vassilev, 1978

*Tenthredo* (*Maculedo*) *vespiformis* Schrank, 1781

=*Tenthredo* (*Allantus*) *bella* Audinet-Serville, 1823  
=*Tenthredo* (*Allantus*) *vespoides* Audinet-Serville, 1823  
=*Tenthredo pallicornis* Fabricius, 1798

*Olivacedo* sp. Zhelochovtsev, 1988

*Tenthredo* (*Olivacedo*) *olivacea* Klug, 1817

=*Rhogogastera respersus* MacGillivray, 1923  
=*Tenthredella olivacea* var. *nigrovittata* Enslin, 1912  
=*Tenthredo dissimulans* Kincaid, 1900

*Temuledo* sp. Zhelochovtsev, 1988

*Tenthredo* (*Temuledo*) *temula* Scopoli, 1763

=*Tenthredo temula uberior* Enslin, 1912

*Tenthredo* (*Temuledo*) *temula temula* Scopoli, 1763

=*Allantus irkutensis* Jakovlev, 1888  
=*Allantus temulus* var. *scutellatus* Mocsary, 1909  
=*Tenthredella temula* var. *pauperior* Enslin, 1914  
=*Tenthredella temula* var. *uberior* Enslin, 1912  
=*Tenthredo* (*Allantus*) *cincta* Audinet-Serville, 1823, *nec* Linné, 1758  
=*Tenthredo bicincta* Linné, 1767

*Tenthredo* sp. Linné, 1758

*Tenthredo (Tenthredo) algoviensis* Enslin, 1912

*Tenthredo (Tenthredo) arcuata* Förster, 1771

*Tenthredo (Tenthredo) arcuata arcuata* Förster, 1771

=*Allantus arcuatus* var. *similans* Zirngiebl, 1949

=*Allantus clypealis* Konow, 1888

=*Allantus dispar* Rudow, 1872, *nec* Klug, 1817

=*Allantus melanotus* Rudow, 1872

=*Allantus sulphuripes* var. *selectus* Zirngiebl, 1961

=*Allantus sulphuripes* var. *tegularis* Zirngiebl, 1949

=*Tenthredo arcuata* var. *atroscutellata* Enslin, 1917

=*Tenthredo arcuata* var. *melanoxyston* Enslin, 1912

=*Tenthredo labiata* Geoffroy, 1785

=*Tenthredo marginella* Panzer, 1804, *nec* Fabricius, 1793, p. p.

=*Tenthredo viminalis* Schrank, 1796

=*Tenthredo virgata* Geoffroy, 1785

*Tenthredo (Tenthredo) arcuata korabica* Csiki, 1923

=*Allantus brevicornis* auct., *nec* Konow, 1886

=*Tenthredo aegra* auct., *nec* Enslin, 1912

*Tenthredo ( ?Tenthredo) balteata* (Klug, 1817)

=*Allantus obscurus* Jurine, 1807, *nec* Gmelin, 1790, *nec* Panzer, 1805

=*Tenthredella balteata* var. *albimaculata* Enslin, 1912

=*Tenthredo soror* Zetterstedt, 1838

*Tenthredo (Tenthredo) brevicornis* (Konow, 1886)

=*Allantus arcuatus* var. *atricereus* Zirngiebl, 1937

=*Allantus arcuatus* var. *luteipes* Zirngiebl, 1961

=*Allantus arcuatus* var. *nitidior* Konow, 1888

=*Allantus sulphuripes* var. *schneidi* Zirngiebl, 1949

=*Tenthredo acerrima* Benson, 1952

=*Tenthredo aegra* Enslin, 1912

=*Tenthredo marginella* Panzer, 1804 *nec* Fabricius, 1793, p. p.

*Tenthredo ( ?Tenthredo) ferruginea* (Schrank, 1776)

=*Allantus laticinctus* Stephens, 1835, *nec* Brullé, 1832

=*Tenthredella ferruginea* var. *leucaspis* Enslin, 1912

=*Tenthredo (Allantus) conspicua* Klug, 1817

=*Tenthredo ferruginea* var. *rufisternis* Enslin, 1920

=*Tenthredo gynandromorpha* Rudow, 1871

=*Tenthredo prospera* Erichson, 1881

=*Tenthredo rubecula* Eversmann, 1847

=*Tenthredo rufipennis* Fabricius, 1793

=*Tenthredo rufiventris* Panzer, 1799

=*Tenthredo schrankii* Le Peletier, 1823

*Tenthredo (Tenthredo) largiflava* (Enslin, 1910)

*Tenthredo (Tenthredo) marginella* Fabricius, 1793

=*Allantus decipiens* Förster, 1844

=*Allantus heraclei* Rudow, 1872

=*Allantus marginellus* var. *melanomerus* Zirngiebl, 1942

=*Allantus marginellus* var. *nigroscutellatus* Zirngiebl, 1942

=*Allantus omissoides* Jakovlev, 1891

=*Tenthredo (Allantus) succincta* Audinet-Serville, 1823, *nec* Klug, 1818

=*Tenthredo stigma* Schrank, 1802

*Tenthredo (Tenthredo) marginella marginella* Fabricius, 1793

*Tenthredo (Tenthredo) mesomela* Linné, 1758

=*Tenthredella mesomelas* var. *atramentaria* Enslin, 1912

=*Tenthredella mesomelas* var. *mesopleuralis* Enslin, 1912

=*Tenthredo (Allantus) viridis* Klug, 1817, *nec* Linné, 1758

=*Tenthredo bernardi* Konow, 1888

- = *Tenthredo mesomelaena* Konow, 1905
- = *Tenthredo mesomelas* auct.,
- = *Tenthredo mesomelas montana* Pasteels, 1946

*Tenthredo (Tenthredo) mioceras* (Enslin, 1912)

*Tenthredo (Tenthredo) nigripleuris* (Enslin, 1910)

- = *Tenthredo nivalis* Lacourt, 1985

*Tenthredo notha* Klug, 1817

- = *Allantus arcuatus* var. *media* Zirngiebl, 1949
- = *Allantus arcuatus* var. *niger* Zirngiebl, 1937
- = *Allantus perkinsi* Morice, 1919
- = *Allantus sulphuripes* var. *fasciatus* Zirngiebl, 1949
- = *Allantus sulphuripes* var. *fulvus* Zirngiebl, 1949
- = *Tenthredo marginella* Panzer, 1804, *nec* Fabricius, 1793 *p. p.*
- = *Tenthredo schaefferi perkinsi* Morice, 1919

*Tenthredo (Tenthredo) obsoleta* Klug, 1817

- = *Tenthredo arctica* Thomson, 1871

*Tenthredo (Tenthredo) omissa* (Förster, 1844)

- = *Tenthredo marginella* Fabricius *sensu* Thomson, 1871
- = *Tenthredo omissa* var. *melanoceraea* Enslin, 1912
- = *Tenthredo omissa* var. *melanomerus* Enslin, 1912
- = *Tenthredo omissa* var. *schimeri* Enslin, 1917
- = *Tenthredo viennensis* Schrank *sensu* Panzer, 1799

*Tenthredo (Tenthredo) pyrenaea* Taeger & Schmidt, 1992

*Tenthredo (Tenthredo) schaefferi* Klug, 1817

- = *Allantus costalis* Costa, 1858, *nec* Fabricius, 1775

*Tenthredo (Tenthredo) scrophulariae* Linné, 1758

*Tenthredo (Tenthredo) sulphuripes* (Kriechbaumer, 1869)

- = *Allantus arcuatus* var. *nigrosulphureus* Zirngiebl, 1937
- = *Allantus arcuatus* var. *suplureoides* Zirngiebl, 1949
- = *Allantus sulphuripes* var. *maculatus* Zirngiebl, 1949
- = *Tenthredo beaumonti* Benson, 1950

*Tenthredo (Tenthredo) thompsoni* (Curtis, 1839)

- = *Allantus semifasciatus* Rudow, 1872
- = *Tenthredo marginella* var. *basanalis* Enslin, 1912
- = *Tenthredo marginella* Fabricius *sensu* Chevin, 1983

*Tenthredo (Tenthredo) vespa* Retzius, 1783

- = *Allantus multicinctus* Rudow, 1872
- = *Allantus nigrilabris* Frivaldsky, 1877
- = *Allantus vespa* var. *niger* Zirngiebl, 1954
- = *Tenthredo (Allantus) vespiformis* Audinet-Serville, 1823, *nec* Schrank, 1781
- = *Tenthredo multifasciata* Geoffroy, 1785
- = *Tenthredo quadricincta* Fallén, 1808
- = *Tenthredo sexannulata* Schrank, 1802
- = *Tenthredo tricincta* Fabricius, 1804, *nec* Christ, 1791
- = *Tenthredo vespa* var. *omnicincta* Enslin, 1912
- = *Tenthredo vespa* var. *stigmatica* Enslin, 1912

*Tenthredo (Tenthredo) zona* Klug, 1817

- = *Allantus apicimaculata* Costa, 1859
- = *Allantus quadricinctus* Thomson, 1871, *nec* Fallén, 1808
- = *Tenthredo (Allantus) captiva* Audinet-Serville, 1823

***Tenthredopsini* Benson, 1946**

*Aglaostigma* sp. Kirby, 1882

- = *Allantus* sp. Panzer, 1805, *nec*, 1801

=*Astochus* sp. MacGillivray, 1914  
=*Homoeoneura* sp. Ashmead, 1898  
=*Kinkaidia* sp. MacGillivray, 1914  
=*Laurentia* sp. Costa, 1890, nec Ragonot, 1888  
=*Neopus* sp. Viereck, 1910  
=*Neurosiobla* sp. (?) Conde, 1935  
=*Parallomma* sp. Malaise, 1933

*Aglaostigma* sp. Kirby, 1882

*Aglaostigma (Aglaostigma) alboplagiatum* Lacourt, 1998

*Aglaostigma (Aglaostigma) discolor* (Klug, 1817)

=*Rhogogaster discolor* var. *albomaculata* Enslin, 1912

=*Tenthredo (Allantus) insignis* Klug, 1817

*Aglaostigma (Aglaostigma) lichtwardti* (Konow, 1892)

=*Tenthredo idriensis* Giraud, 1857, nec Le Peletier, 1823

*Aglaostigma (Aglaostigma) pingue* (Klug, 1817)

*Astochus* sp. MacGillivray, 1914

*Aglaostigma (Astochus) aucupariae* (Klug, 1817)

=*Aglaostigma aucupariae* ssp. *lacteore* Benson, 1968

=*Allantus collaris* Dietrich, 1868

=*Laurentia craverii* Costa, 1890

=*Macrophya laticarpus* Kriechbaumer, 1891

=*Perineura gibbosa* Fallén, 1808, sensu Thomson, 1870

=*Tenthredo juvenilis* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo solitaria* Fallén, 1808, nec Schrank, 1781, nec Scopoli, 1763

*Aglaostigma (Astochus) fulvipes* (Scopoli, 1763)

=*Tenthredo lateralis* Fabricius, 1779

*Aglaostigma (Astochus) subalpinum* Benson, 1946

*Bivena* sp. MacGillivray, 1894

*Aglaostigma (Bivena) langei* (Konow, 1894)

=*Aglaostigma langei eichleri* Muche, 1975

*Tenthredopsis* sp. Costa, 1859

=*Ebolia* sp. Costa, 1859

=*Eutenthredopsis* sp. Enslin, 1913

=*Thomsonia* sp. Konow, 1884

*Tenthredopsis coquebertii* (Klug, 1817)

=*Perineura lusitanica* André, 1881

=*Tenthredo (Allantus) labiata* Audinet-Serville, 1823, nec Geoffroy, 1785

=*Tenthredo conjugens* Kriechbaumer, 1884

=*Tenthredo nigricollis* Cameron, 1881

=*Tenthredopsis coquebertii* var. *brunnescens* Enslin, 1917

=*Tenthredopsis cordatus* Cameron, 1881

=*Tenthredopsis ignobilis* Cameron, 1881

=*Tenthredopsis limbilabris* Kriechbaumer, 1884

=*Tenthredopsis opulenta* Konow, 1887

=*Thomsonia braunsi* Konow, 1884

*Tenthredopsis litterata* (Geoffroy, 1785)

=*Perineura nassata* Thomson, 1870

=*Tenthredo (Allantus) microcephala* Audinet-Serville, 1823

=*Tenthredo analis* Stephens, 1835, nec Spinola, 1808, nec Fabricius, 1793

=*Tenthredo caliginosa* Stephens, 1835

=*Tenthredo carbonaria* Linné, 1767, nec Scopoli, 1763

=*Tenthredo cordata* Geoffroy, 1785

=*Tenthredo dimidiata* Fabricius, 1804

- = *Tenthredo femoralis* Stephens, 1835
- = *Tenthredo flavipes* Christ, 1791, *nec* Retzius, 1783, *nec* Müller, 1776
- = *Tenthredo orbitalis* Dietrich, 1868
- = *Tenthredo rubiginosa* Drapiez, 1819, *nec* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo thoracica* Geoffroy, 1785
- = *Tenthredo varia* Gmelin, 1790
- = *Tenthredopsis litterata* var. *bicolor* Enslin, 1913
- = *Tenthredopsis litterata* var. *melaena* Enslin, 1917
- = *Tenthredopsis litterata* var. *variana* Enslin, 1917
- = *Tenthredopsis nigriceps* (?) Cameron, 1881
- = *Tenthredopsis pallida* Konow, 1896
- = *Tenthredopsis thomsoni* var. *concolor* Konow, 1887
- = *Tenthredopsis thomsoni* var. *nigripes* Konow, 1890
- = *Thomsonia thomsoni* Konow, 1884

#### *Tenthredopsis nassata* (Linné, 1767)

- = *Tenthredo (Allantus) melanorrhoea* Gmelin, 1790
- = *Tenthredo alneti* Schrank, 1781
- = *Tenthredo apicaris* Geoffroy, 1785
- = *Tenthredo palmata* (?) Geoffroy, 1785
- = *Tenthredo pavioda auct.*, *nec* Fabricius, 1775
- = *Tenthredo perlata* (?) Geoffroy, 1785
- = *Tenthredo subulata* (?) Gmelin, 1790
- = *Tenthredo tiliae* Panzer, 1805
- = *Tenthredopsis albomaculatus* Cameron, 1881
- = *Tenthredopsis arrogans* Konow, 1990
- = *Tenthredopsis arrogans* var. *erythrocoele* Enslin, 1913
- = *Tenthredopsis coquebertii ulanbatorensi* (?) Mucbe, 1965
- = *Tenthredopsis dorsivittatus* Cameron, 1881
- = *Tenthredopsis fenestrata* Konow, 1890
- = *Tenthredopsis flavomaculata* var. *centronigrata* Enslin, 1913
- = *Tenthredopsis friesei* Konow, 1884
- = *Tenthredopsis konowi* Strobl, 1895, *nec* Lethierry, 1886
- = *Tenthredopsis korlevici* Konow, 1887
- = *Tenthredopsis lividiventris* Cameron, 1881
- = *Tenthredopsis nassata* var. *metapleuris* Enslin, 1913
- = *Tenthredopsis nassata* var. *pleurosternalis* Enslin, 1913
- = *Tenthredopsis nassata* var. *rufata* Konow, 1890
- = *Tenthredopsis nassata* var. *trichroma* Enslin, 1913
- = *Tenthredopsis raddatzi* var. *dorsata* Konow, 1890
- = *Tenthredopsis raddatzi* var. *indocilis* Konow, 1890
- = *Tenthredopsis raddatzi* var. *inornata* Konow, 1890
- = *Tenthredopsis raddatzi* var. *maura* Konow, 1890
- = *Tenthredopsis raddatzi* var. *sagmaria* Konow, 1980
- = *Tenthredopsis raddatzi* var. *vittata* Konow, 1890
- = *Tenthredopsis virgineus* Mucbe, 1965
- = *Thomsonia friesei* Konow, 1884
- = *Thomsonia laticeps* Konow, 1884
- = *Thomsonia raddatzi* Konow, 1884

#### *Tenthredopsis ornata* (Audinet-Serville, 1823)

- = *Perineura excisa* Thomson, 1870
- = *Tenthredo (Allantus) neglecta* Audinet-Serville, 1823, *nec* Klug, 1817
- = *Tenthredopsis excisa* Thomson, 1870
- = *Tenthredopsis excisa* var. *atriscutis* Enslin, 1917
- = *Thomsonia excisa* var. *binotata* Konow, 1884

#### *Tenthredopsis scutellaris* (Fabricius, 1804)

- = *Perineura brevispina* Thomson, 1870
- = *Perineura scutellaris* var. *flavoguttata* Magretti, 1882

= *Tenthredo (Allantus) ambigua* Klug, 1817  
 = *Tenthredo (Allantus) dorsalis* Audinet-Serville, 1823, *nec* Spinola, 1808  
 = *Tenthredo (Allantus) spreta* (?) Audinet-Serville, 1823  
 = *Tenthredo fulvipes* Stephens, 1835  
 = *Tenthredo gibberosa* Konow, 1887  
 = *Tenthredo instabilis* var. *scutellaris* Klug, 1817  
 = *Tenthredo sigma* Zetterstedt, 1838, *nec* Schrank, 1802  
 = *Tenthredo tristis* Stephens, 1835, *nec* Fabricius, 1804  
 = *Tenthredopsis austriaca* Konow, 1890  
 = *Tenthredopsis austriaca* var. *albata* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis austriaca* var. *candida* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis austriaca* var. *obscurata* Konow, 1890  
 = *Tenthredopsis austriaca* var. *rufofemorata* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis campestris* auct., *nec* Linné, 1758  
 = *Tenthredopsis dorsalis* var. *biguttata* Konow, 1890  
 = *Tenthredopsis dorsalis* var. *diluta* Konow, 1890  
 = *Tenthredopsis dorsalis* var. *tirolensis* Konow, 1892  
 = *Tenthredopsis dubia* Konow, 1890  
 = *Tenthredopsis elegans* var. *nigronotata* Konow, 1890  
 = *Tenthredopsis flavomaculatus* Cameron, 1881  
 = *Tenthredopsis franki* Konow, 1890  
 = *Tenthredopsis inornata* Cameron, 1881  
 = *Tenthredopsis intermedia* Hellén, 1943  
 = *Tenthredopsis nigronotata* Cameron, 1881  
 = *Tenthredopsis parvula* Konow, 1890  
 = *Tenthredopsis parvula* var. *atramentaria* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis parvula* var. *atrifemoribus* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis parvula* var. *atrilobis* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis parvula* var. *atripleuris* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis parvula* var. *rubriventris* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis picticeps* Cameron, 1881  
 = *Tenthredopsis puncticollis* Konow, 1890  
 = *Tenthredopsis puncticollis* var. *mediatra* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis saundersi* Cameron, 1881  
 = *Tenthredopsis thornleyi* Konow, 1899  
 = *Thomsonia albipleuris* Konow, 1886  
 = *Thomsonia elegans* Konow, 1884  
 = *Thomsonia josephi* Konow, 1884, p. p;  
 = *Thomsonia obscura* Konow, 1884

*Tenthredopsis sordida* (Klug, 1817)

*Tenthredopsis stigma* (Fabricius, 1798)

= *Tenthredo (Allantus) histrio* Klug, 1817  
 = *Tenthredo dorsalis* Spinola, 1808  
 = *Tenthredopsis churchvillei* Konow, 1897  
 = *Tenthredopsis stigma* var. *genualis* Konow, 1890

*Tenthredopsis tarsata* (Fabricius, 1804)

= *Tenthredopsis opacipleuris* Stein, 1884  
 = *Tenthredopsis wuestneii* Stein, 1884  
 = *Thomsonia hilleckeri* Konow, 1884

*Tenthredopsis tessellata* (Klug, 1817)

= *Perineura cylindrica* Rudow, 1871  
 = *Tenthredo ischiadica* Eversmann, 1847  
 = *Tenthredo islandica* André, 1881  
 = *Tenthredopsis tessellata* var. *alboplagiata* Konow, 1890  
 = *Tenthredopsis tessellata* var. *nigratilobis* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis tessellata* var. *nigratileuris* Enslin, 1913  
 = *Tenthredopsis tessellata* var. *nigratiscutis* Enslin, 1913

*Tenthredopsis tischbeinii* (Frivaldsky, 1877)

- =*Perineura gynandromorpha* André, 1881, nec Rudow, 1871
- =*Perineura konowi* Lethierry, 1888
- =*Tenthredo hungarica* Tischbein, 1852, nec Klug, 1817
- =*Tenthredopsis andrei* Konow, 1898

## **XYLEOIDEA**

### **XYELIDAE**

#### ***Xyelinae***

*Pleroneura* sp. Konow, 1897

*Pleroneura coniferarum* (Hartig, 1837)

=*Pinicola coniferarum* André, 1881

=*Xyela coniferarum* Hartig, 1837

*Xyela* sp. Dalman, 1819

*Xyela curva* Benson, 1938

*Xyela graeca* Stein, 1876

=*Pinicola graeca* André, 1881

*Xyela julii* (Brébisson, 1818)

=*Pinicola julii* Brébisson, 1818

=*Pinicola julii* André, 1881

=*Xyela henschi* Mocsary, 1912

=*Xyela pusilla* Dalman, 1819

*Xyela obscura* (Strobl, 1895)

=*Pinicola julii* var. *obscura* Strobl, 1895

=*Xyela japonica* Rohwer, 1910

=*Xyela pini* Rohwer, 1913

*Xyela uncinatae* Blank, à paraître

*Xyelatana* sp. Benson, 1938

*Xyelatana longula* (Dalman, 1819)

=*Pinicola longula* André, 1881

=*Xyela longula* Dalman, 1819

=*Xyela longula* Konow, 1897

=*Xyela longula* Hartig, 1837

*Xyelatana lugdunensis* Berland, 1943

## ***Bibliographie utilisée :***

- \_ALLEMAND R., H. CHEVIN *et al.*, (1996). Des pièges à insectes de grande envergure : les piscines. L'Entomologiste, **52**(1): 33-46.
- \_BERGERARD J. & H. CHEVIN, (1995). Inventaire des Hyménoptères Symphytes récoltés dans les environs de Trégastel (Côtes d'Armor). Bulletin des Naturalistes des Yvelines, **22**(2): 39-49.
- \_BERLAND, L. (1947). "Faune de France. 47. Hyménoptères Tenthredoïdes. \_\_Lechevalier édit. Paris; 496p."
- \_CAVRO E. (1951). Catalogue des Hyménoptères du département du Nord et régions limitrophes. II. Tenthredoïdes. Bulletin de la Société entomologique du nord de la France, **58**.
- \_CHARLES P. J. & H. CHEVIN, (1971). Première liste des captures d'Hyménoptères Symphytes en forêt de Fontainebleau. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, **47**: 27-28.
- \_CHARLES P. J. & H. CHEVIN, (1971). Seconde liste d'Hyménoptères Symphytes récoltés en forêt de Fontainebleau. Bulletin de l'Association des Naturalistes de la Vallée du Loing, **47**: 100.
- \_CHEVIN, H. (1972). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 3.Espèces rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **41**(1): 4-5.
- \_CHEVIN, H. (1973). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, La parthénogénèse chez les Symphytes; espèces rares ou nouvelles pour la France; *Aneugmenus padi*, L. et *A. coronatus*, Klug." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **42**(9): 229-235.
- \_CHEVIN, H. (1975). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 12 Espèces rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **44**(8): 274-276.
- \_CHEVIN, H. (1977). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 15. Tenthredes rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **46**(10): 368-373.
- \_CHEVIN, H. (1979). "Hyménoptères Tenthredoïdes, Symphytes du département de la Manche." Mém. Soc. Nat. Sc. nt. math. Cherbourg; **56 1973-1974**: 89-100.
- \_CHEVIN, H. (1980). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **49**(7): 453-456.
- \_CHEVIN, H. (1981). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département des Yvelines." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **8**: 41-62.
- \_CHEVIN, H. (1982). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département des Hautes-Alpes. Deuxième contribution." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **37 (1981)**: 69-74.
- \_CHEVIN, H. (1982). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **51**(3): 78-80.
- \_CHEVIN, H. (1983). "Les Hyménoptères Symphytes de Corse." Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de Corse **101 (1982)**(643): 129-134.
- \_CHEVIN, H. (1983). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes. 9. Deux espèces nouvelles pour la France: *Parna kamijoi* Togashi et *Pareophora collaris* n. sp." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **52**(2): 62-64.
- \_CHEVIN, H. (1984). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, X.22. Quelques espèces rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **53**(4): 157-159.
- \_CHEVIN, H. (1985). "Présence en France de *Macrophya tenella* Mocsary 1881, Hym. Tenthredinidae et description du mâle." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **41**: 19-20.
- \_CHEVIN, H. (1986). "Additions et corrections à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes des Yvelines." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **13**: 73-78.
- \_CHEVIN, H. (1986). "Contribution à l'inventaire faunistique de Tremaouezan: les Tenthredes." Pennar **121**: 72-74.

- \_CHEVIN, H. (1986). "Les Tenthredès du marais de la Fontaine Saint-Pierre, Parc de Versailles." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **13**: 25-33.
- \_CHEVIN, H. (1986). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, XII 26\_Tenthredès rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **55**(10): 336-345.
- \_CHEVIN, H. (1987). "Hyménoptères Symphytes in Contribution à l'inventaire des Arthropodes de la réserve naturelle du "Pinail", Vouneuil-sur-Vienne; 86." Cahiers de Liaison de l'O.P.I.E. **21**(2): 20-22.
- \_CHEVIN, H. (1987). "Hyménoptères Symphytes nouveaux pour le département de la Côte d'Or." Bulletin Scientifique de Bourgogne **40**: 21-24.
- \_CHEVIN, H. (1987). "Un symphyte nouveau de France: *Dolerus phalipi* n. sp. (Hymenoptera Tenthredinidae)." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **43**(4): 103-104.
- \_CHEVIN, H. (1988). "Hyménoptères Tenthredoïdes, Symphytes du département de la Manche. Deuxième liste." Mém. Soc. nat. Sc. nat. math. Cherbourg; **59** **1981-1985**: 23-31.
- \_CHEVIN, H. (1988). "*Pamphilius festivus* C. Pesarini et F. Pesarini; espèce nouvelle pour la France, Hym. Pamphiliidae." Bulletin de la Société entomologique de France **93**: 12.
- \_CHEVIN, H. (1988). "Un nouveau Cimbicidae de France, *Corynis dominiquei* n. sp. (Hym.)." Bulletin de la Société entomologique de France **93**(1-2): 39-42.
- \_CHEVIN, H. (1989). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Yonne." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **16**(2): 27-31.
- \_CHEVIN, H. (1989). "Les Hyménoptères Symphytes récoltés par le Dr Hubert Cleu. Contribution à l'Inventaire du département de l'Ardèche." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **58**(3): 98-110.
- \_CHEVIN, H. (1990). "Les Hyménoptères Symphytes du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, Collection J. Dominique et G. Broquet. Contribution à l'inventaire du département de Loire-Atlantique." Bulletin de la Société de Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (N.S.) **12**(1): 15-36.
- \_CHEVIN, H. (1990). "*Tenthredo meridiana* Lepeletier 1823: espèce peu commune de l'ouest méditerranéen. (Hymenoptera, Tenthredinidae)." L'Entomologiste **46**(4): 153-158.
- \_CHEVIN, H. (1993). "*Hartigia albomaculata* (Stein), espèce souvent confondue avec *Hartigia linearis* (Harris) (Hymenoptera, cephidae)." L'Entomologiste **49**(6): 273-276.
- \_CHEVIN, H. (1993). "Note sur les Hyménoptères tenthredoïdes, XIII. 27.-Tenthredès rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **62**(8): 297-304.
- \_CHEVIN, H. (1995). "Biologie de *Macrophya punctumalbum* (Linné) (Hymenoptera : Symphyta, Tenthredinidae)." L'Entomologiste **51**(6): 279-285.
- \_CHEVIN, H. (1997). "Note sur les Hyménoptères Tenthredoïdes, XIV. 28. Tenthredès rares ou nouvelles pour la France." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **66**(8): 216-224.
- \_CHEVIN, H. (1999). "Les Hyménoptères Symphytes de Corse." L'Entomologiste **55**(3): 123-129.
- \_CHEVIN, H. & J. BARBIER (1978). "Liste des Hyménoptères Symphytes du département de la Côte d'Or." Bulletin Scientifique de Bourgogne **30** (**1975-1977**): 115-138.
- \_CHEVIN, H. & J. BARBIER (1980). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du Département de la Côte d'Or." Bulletin de la Société entomologique de France **85**: 274-276.
- \_CHEVIN, H. & C. BRUNEL (1985). "Les Hyménoptères Symphytes de la Chaussée-Tirancourt, Somme." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **41**: 21-29.
- \_CHEVIN, H., P. CANTOT, *et al.* (1999). "Les Hyménoptères Symphytes de Centre-ouest de la France." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **53**(1): 1-17.
- \_CHEVIN, H., S. CHEVIN, *et al.* (1995). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Isère." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **64**(6): 254-258; 291-308.

- \_CHEVIN, H., C. COCQUEMPOT, *et al.* (1986). "Inventaire de Hyménoptères Symphytes du département d'Indre-et-Loire." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **42**: 35-49.
- \_CHEVIN, H. & F. DE FLAUGERGUE (2002). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes de la "Drôme des collines"." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **71**(8): 295-308.
- \_CHEVIN, H. & R. DESMIER DE CHENON (1982). "Contribution à la faune des Hyménoptères Symphytes de Turquie." Bulletin de la Société entomologique de France **87**: 43-47.
- \_CHEVIN, H. & L. FAILLIE (2001). "Inventaire provisoire des Hyménoptères Symphytes (Tenthredes) du département de la sarthe." Bulletin de l'Entomologie tourangelle **22**(2).
- \_CHEVIN, H., J. L. GUMEZ, *et al.* (1984). "Hyménoptères Symphytes récoltés au moyen de pièges colorés dans des pépinières de peuplier du département de l'Aisne." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **11**: 64-69.
- \_CHEVIN, H., J. LACOURT, *et al.* (2002). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de l'Orne (France) (Hymenoptera, Symphyta)." Bulletin de la Société linnéenne de Normandie **118**: 43-53.
- \_CHEVIN, H., J. M. MALDES, *et al.* (1987). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes des départements du Gard et de l'Hérault." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **43**: 21-38.
- \_CHEVIN, H., M. MARTINEZ, *et al.* (1985). "Hyménoptères Symphytes du Lot-et-Garonne. Deuxième liste." Bull. Liaison Sco. Sc. bot. agr. Agenais **14**: 27-29.
- \_CHEVIN, H. & M. PROST (2000). "Nouvelles additions à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département de la Côte d'Or." L'Entomologiste **56**(3): 97-103.
- \_CHEVIN, H. & H. SAVINA (1989). "Contribution à l'inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Morbihan." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **16**(3): 75-80.
- \_CHEVIN, H. & R. SILVESTRE DE SACY (1981). "Hyménoptères Tenthredoïdes récoltés dans la région de Paimpol, Côtes-du-Nord. Deuxième liste." Bulletin de la Société de Sciences Naturelles de l'Ouest de la France (N.S.) **3**(4): 157-159.
- \_CHEVIN, H. & J. C. TEULOU (1990). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Lot-et-Garonne." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **46**: 19-28.
- \_CHEVIN, H. & G. TIBERGHEN (1987). "Les collections entomologiques du Service Régional de la Protection des Végétaux à Rennes, Ministère de l'agriculture. Catalogue raisonné et commenté. I.Hymenoptera Symphyta, Collection F. Barbotin." Bull. Soc. Sci. Bretagne **58** (1986)(1-4): 59-95.
- \_CHEVIN, H. & G. TIBERGHEN (1989). "Les collections entomologiques du Service Régional de la Protection des Végétaux à Rennes, Ministère de l'Agriculture. Catalogue raisonné et commenté. III Hym. Symphyta; 2, Collections F. Barbotin; compléments." Bull. Soc. Sci. Bretagne **60**(1-4): 173-178.
- \_CHEVIN, H. & G. TIBERGHEN (1998). "Les collections entomologiques de la faculté des sciences de Rennes-Beaulieu. Catalogue raisonné et commenté." Bulletin de la Société de Sciences Naturelles de l'Ouest de la France **20**(4): 129-140.
- \_CHEVIN, H. & H. TUSSAC (1983). "Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département du Lot." Cahiers des Naturalistes, Bulletin des Naturalistes Parisiens (N.S.) **39**: 51-60.
- \_COCQUEMPOT, C. (1982). Les Tenthèdes de la commune de Chambray-lès-Tours. Bull. Municipal de Chambray, **16**: 18.
- \_COCQUEMPOT, C. (1986). Les Hyménoptères Symphytes de Montbazou. Bull. Soc. Sc. Nat. Touraine: 18-24.

- \_COCQUEMPOT C. (1989). Inventaire des Hyménoptères Symphytes du département d'Indre-et-Loire: bilan à l'issue de 1988, Hym. Symphyta. Bull. Ent. Tourangelle; **10**, 4: 38-42.
- \_DE FLAUGERGUES F. (2000). *Macrophya (Macrophya) erythrogastra* (Spinola, 1843) Andre, 1881: seconde capture pour la France. Bulletin Romand d'entomologie, **18**(1): 34-40.
- \_LACOURT, J. (1967). "Hyménoptères Tenthredoïdes de Seine-et-Oise. Captures intéressantes et notes de chasse." L'Entomologiste **23**(5-6): 117-127.
- \_LACOURT, J. (1973). "Note sur le genre *Pamphilius* Latreille avec description d'une nouvelle espèce." Annales de la Société entomologique de France NS; **9**(3): 693-702.
- \_LACOURT, J. (1974). "Tenthredes rares ou nouvelles pour la France." L'Entomologiste **30**(3): 116-120.
- \_LACOURT, J. (1976). "Notes sur les Hyménoptères Tenthredoïdes." L'Entomologiste **32**(4-5): 188-196.
- \_LACOURT, J. (1977). "Hyménoptères Tenthredoïdes du Val d'Oise." L'Entomologiste **33**(3): 123-128.
- \_LACOURT, J. (1978). "Revision des *Athalia* européens du groupe *rosae*, avec description d'une nouvelle espèce (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **83**(1-2): 50-52.
- \_LACOURT, J. (1980). "Notes sur le groupe *atra* du genre *Tenthredo* (Hym. Tenthredinidae) avec description de deux nouveaux taxa." Nouvelle Revue d'Entomologie **10**(2): 189-199.
- \_LACOURT, J. (1985). "Nematinae rares ou nouveaux pour la France, 4<sup>o</sup> note, Hymen. Symphyta; Tenthredinidae." Entomologica Gallica **1**(4): 332-339.
- \_LACOURT, J. (1985). "Notes sur les hyménoptères tenthredoïdes : espèces rares ou nouvelles pour la France, 3<sup>o</sup> note." Entomologica Gallica **1**(4): 307-312.
- \_LACOURT, J. (1985). "Une nouvelle espèce d'*Athalia* Leach des Alpes françaises." Bulletin de la Société entomologique de France **90**: 13-16.
- \_LACOURT, J. (1985). "Une nouvelle espèce de *Periclista* du Bassin Parisien." L'Entomologiste **41**(2): 79-81.
- \_LACOURT, J. (1985). "Une nouvelle espèce de *Tenthredo* des Alpes françaises. Groupe *arcuata-schaefferi*." Revue française d'Entomologie (N.S.) **7**(2): 76-78.
- \_LACOURT, J. (1988). "Description de cinq nouvelles espèces de *Dolerus* des Alpes françaises et du Massif Central, et remarques sur deux autres espèces. (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **92**(7-8): 231-239.
- \_LACOURT, J. (1989). "Une nouvelle espèce de *Birka* Malaise des Alpes françaises (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **94**(7-8): 221-222.
- \_LACOURT, J. (1991). "Deux nouvelles espèces de *Nematus* Panzer des Alpes françaises (Hym. Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **96**(1): 69-71.
- \_LACOURT, J. (1992). "Identification des mâles de *Tenthredo asperrima* Lacourt et de *Tenthredo ignobilis* Klug (Hymenoptera Tenthredinidae)." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **61**(4): 89-92.
- \_LACOURT, J. (1993). "Description d'une nouvelle espèce du genre *Dolerus* Jurine des Alpes françaises (Hym., Tenthredinidae)." Entomologica Gallica **4**(4).
- \_LACOURT, J. (1994). "Description du mâle de *Birka alpina* Lacourt (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Nouvelle Revue D'Entomologie **11**(4).
- \_LACOURT, J. (1994). "*Monophadnus longicornis* Hartig et *Monophadnus monticola* Hartig, deux espèces de Blennocampinae inféodées au genre *Helleborus* (Tourn.) L. (Hymenoptera, Tenthredinidae)." L'Entomologiste **50**(6): 335-336.
- \_LACOURT, J. (1994). "Note sur quelques espèces de tenthredes rares ou nouvelles pour la France, Hym. Symphyta." Ent. Gall. **4**: 127-133.

- \_LACOURT, J. (1995). "Nouvelles plantes-hôtes d'hyménoptères Symphytes." L'Entomologiste **51**(1): 33-36.
- \_LACOURT, J. (1996). "*Alpinematus elongatulus* n. gen.; n. sp. des Alpes françaises, Hym. tenthr." Bulletin de la Société entomologique de France **101**(3): 269-271.
- \_LACOURT, J. (1996). "Description de *Polynematus taegeri* n. sp. des Alpes françaises (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **18**(1): 13-15.
- \_LACOURT, J. (1996). "Description de *Pontania (Phyllocolpa) kopelkei* n. sp. de l'étage alpin des Hautes-Alpes, Hym. Tenthr." Bulletin de la Société entomologique de France **101**(3): 269-270.
- \_LACOURT, J. (1996). "Symphytes rares ou nouveaux pour la France (Hymenoptera)." L'Entomologiste **52**(2): 55-62.
- \_LACOURT, J. (1998). "*Aglaostigma alboplagiatum* nouvelle espèce des Alpes et du Massif central, Hym. Tenthr." Bulletin de la Société entomologique de France **103**(2): 187-190.
- \_LACOURT, J. (1998). "Description de la femelle d'*Empria persephone* Benson (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Bulletin de la Société entomologique de France **103**(2): 190-191.
- \_LACOURT, J. (1998). "Discussion du genre *Dulophanes* Konow; 1907 définissant la nouvelle tribu des Dulophanini, Hym. Tenthr." Revue française d'Entomologie (N.S.) **20**(1-2): 45-50.
- \_LACOURT, J. (1998). "*Endelomyia filipendulae*, nouvelle espèce du sud de la France, Hym. Tenthredinidae." Bulletin de la Société entomologique de France **103**(4): 393-394.
- \_LACOURT, J. (1998). "Hyménoptères Symphytes capturés sur névé dans le massif des Aiguilles Rouges (Haute-Savoie)." Bulletin mensuel de la Société linnéenne de Lyon **67**(1): 48-56.
- \_LACOURT, J. (1998). "Le genre *Blankia*, gen. n., créé pour deux espèces placées auparavant dans le genre *Cuneala* Zirngiebl, 1956." Annales de la Société entomologique de France **33**(4): 487.
- \_LACOURT, J. (1998). "Note sur *Dolerus (Poodolerus) sanguinicornis* (Klug, 1818) Hartig, 1837, Hym. tenthr." L'Entomologiste **54**(3): 129-133.
- LACOURT, J. (1998). "*Pristiphora listoni*, nouvelle espèce des Alpes françaises, Hym. Tenthr." Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.) **15**(2): 129-130.
- \_LACOURT, J. (1999). "Catalogue des Tenthredinidae Ouest-Paléarctiques (Hymenoptera, Symphyta).]" Memoires de la Société entomologique de France **3**: 1-432.
- \_LACOURT, J. (1999). "Remarques sur les groupes *aeneus* et *alpinus* du genre *Dolerus* Panzer (Hymenoptera : Tenthredinidae)." Annales de la Société entomologique de France **35**(2): 173-181.
- \_LACOURT, J. (2001). "Remarques concernant les plantes-hôtes de quelques Hyménoptères Symphytes." L'Entomologiste **57**(5): 205-210.
- \_LACOURT, J. (2002). "Revision des *Caliroa* Costa Ouest-paléarctiques (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **24**(3): 125-131.
- \_LACOURT, J. (2003). "*Lonnea*, Genre nouveau, pour *Birka perplexa* Zombori, 1976 et comparaison avec *Pseustromboceros akeuchi*, 1941 (Hymenoptera, *Arge fuscipes* (Fallen, 1808) Tenthredininae, Selandriinae)." Revue française d'Entomologie (N.S.) **25**(4): 165-169.
- \_LACOURT, J. (2004). *Paraneura noblecourtii* n. sp. et *Dinematus krausi* n. sp., deux Nematinae nouveau des Vosges (France) (Hymenoptera ; Symphyta :Tenthredinidae) (sous presse).
- \_LACOURT, J. (2004). *Dolerus (Poodolerus) noblecourtii* n. sp. (Hymenoptera ; Symphyta : Tenthredinidae ; Selandriinae) (sous presse).
- \_LACOURT, J. & H. CHEVIN (1987). "Les Hyménoptères Symphytes, Tenthredines du Parc Régional de la Haute Vallée de Chevreuse." Bulletin de la Société Versaillaise de Sciences Naturelles, Sér. 4 **14**: 65-82.
- \_NOBLECOURT, T. (1996). "Données faunistiques sur quelques Hyménoptères Symphytes peu communs en France." L'Entomologiste.

- \_NOBLECOURT, T. (1998). "Note sur *Paratenthredo frauenfeldii* (Giraud, 1857) = *P. dilleri* Taeger, 1991, nov. syn. (Hymenoptera, Tenthredinidae)." Bulletin de la Societe entomologique de France **103**(4): 397-400.
- \_NOBLECOURT, T. (2006). Note sur les Hyménoptères Symphytes : espèces rares ou nouvelles pour la France (sous presse).
- \_PROST M. & H. CHEVIN, (1995). La Combe aux Mille Papillons. Entomologie au fil des saisons à la Combe Saint-Joseph (2ème partie : les Tenthredes). Bulletin Scientifique de Bourgogne, **47**: 21-25.

## Notes

## Sommaire

<b>CEPHOIDEA</b> .....	<b>3</b>
CEPHIDAE.....	3
<i>Cephinae</i> .....	3
Calameuta sp. Konow, 1896 .....	3
Cephus sp. Latreille, 1802 .....	4
Hartigia sp. Schiödte, 1838 .....	4
Janus sp. Stephens, 1835.....	5
Trachelus sp. Jurine, 1807 .....	5
<b>MEGALODONTESOIDEA</b> .....	<b>6</b>
MEGALODONTESIDAE .....	6
Megalodontes sp. Latreille, 1803.....	6
PAMPHILIIDAE .....	6
<i>Cephalciinae</i> .....	6
Acantholyda sp. Costa, 1894 .....	6
Caenolyda sp. Konow, 1897 .....	7
Cephalcia sp. Panzer, 1805 .....	7
<i>Pamphiliinae</i> .....	8
Neurotoma sp. Konow, 1897 .....	8
Onycholyda sp. Takeuchi, 1938.....	8
Pamphilius sp. Latreille, 1802 .....	8
<b>ORUSSOIDEA</b> .....	<b>9</b>
ORUSSIDAE .....	10
<i>Orussinae</i> .....	10
Orussus sp. Latreille, 1796.....	10
<b>SIRICOIDEA</b> .....	<b>10</b>
SIRICIDAE.....	10
<i>Siricinae</i> .....	10
Sirex sp. Linné, 1761 .....	10
Urocerus sp. Geoffroy, 1762.....	11
Xeris sp. Costa, 1894 .....	11
<i>Tremicinae</i> .....	11
Tremex sp. Jurine, 1807.....	11
XIPHYDRIIDAE.....	12
<i>Xiphydriinae</i> .....	12
Xiphydria sp. Latreille, 1802 .....	12
<b>TENTHREDINOIDEA</b> .....	<b>12</b>
ARGIDAE.....	12
<i>Arginae</i> .....	12
Arge sp. Schrank, 1802 .....	12
<i>Sterictiphorinae</i> .....	15
Aprosthemata sp. Konow, 1899.....	15
Sterictiphora sp. Billberg, 1820 .....	15
BLASTICOTOMIDAE.....	16
Blasticotoma sp. Klug, 1834.....	16
CIMBICIDAE.....	16

<i>Abiinae</i> .....	16
<i>Abia</i> sp. Leach, 1817 .....	16
<i>Cimbicinae</i> .....	16
<i>Cimbex</i> sp. Olivier, 1791 .....	16
<i>Praia</i> sp. André, 1881.....	18
<i>Pseudoclacellaria</i> sp. Schultz, 1906.....	18
<i>Trichiosoma</i> sp. Leach, 1817 .....	18
<i>Coryninae</i> .....	19
<i>Corynis</i> sp. Thünberg, 1789.....	19
DIPRIONIDAE.....	19
<i>Diprioninae</i> .....	19
<i>Diprion</i> sp. Schrank, 1802 .....	19
<i>Gilpinia</i> sp. Benson, 1939.....	20
<i>Macrodipteron</i> sp. Enslin, 1916.....	21
<i>Microdipteron</i> sp. Enslin, 1917 .....	21
<i>Neodiprion</i> sp. Rohwer, 1918 .....	21
<i>Monocteninae</i> .....	21
<i>Monoctenus</i> sp. Dahlbom, 1835 .....	21
TENTHREDINIDAE.....	22
<i>Athaliinae</i> .....	22
Athaliini .....	22
<i>Athalia</i> sp. Leach, 1817 .....	22
<i>Blennocampinae</i> Konow, 1890.....	23
Blennocampini Rohwer, 1911.....	23
<i>Ardis</i> sp. Konow, 1886 .....	23
<i>Blennocampa</i> sp. Hartig, 1837.....	23
<i>Cladardis</i> sp. Benson, 1952.....	23
<i>Claremontia</i> sp. Rohwer, 1909.....	23
<i>Monardis</i> sp. Enslin, 1914 .....	24
<i>Monophadnoides</i> sp. Ashmead, 1898 .....	24
<i>Pareophora</i> sp. Konow, 1886 .....	24
<i>Periclista</i> sp. Konow, 1886 .....	24
Eriocampini Rohwer, 1911 .....	25
<i>Eriocampa</i> sp. Hartig, 1837 .....	25
Harpiphorini Lacourt, 1999 .....	25
<i>Harpiphorus</i> sp. Hartig, 1837.....	25
Phymatocerini Rohwer, 1911.....	25
<i>Chevinia</i> sp. Lacourt, 2003 .....	25
<i>Eurhadinoceraea</i> sp. Enslin, 1920.....	25
<i>Eutomostethus</i> sp. Enslin, 1914 .....	26
<i>Monophadnus</i> sp. Hartig, 1837 .....	26
<i>Paracharactus</i> sp. MacGillivray, 1908 .....	26
<i>Phymatocera</i> sp. Dahlbom, 1835 .....	26
<i>Rhadinoceraea</i> sp. Konow, 1886.....	27
<i>Stethomostus</i> sp. Benson, 1939 .....	27
Tomostethini Benson, 1938 .....	27
<i>Tomostethus</i> sp. Konow, 1886.....	27
Waldheimiini Smith, 1969 .....	27
<i>Halidamia</i> sp. Benson, 1939 .....	27
<i>Caliroinae</i> Lacourt, 1998 .....	27

Caliroini Benson, 1938 .....	27
Caliroa sp. A. Costa, 1859 .....	27
Endelomyia sp. Ashmead, 1898.....	28
<i>Cladiinae</i> Ashmead, 1898.....	28
Cladiini Rohwer, 1911 .....	28
Cladius sp. Illiger,1807 .....	28
Priophorus sp. Dahlbom, 1835.....	28
Trichiocampus sp. Hartig, 1837.....	29
<i>Emphytinae</i> MacGillivray, 1906.....	29
Allantini Rohwer, 1911.....	29
Allantus sp. Panzer, 1801.....	29
Apethymus sp. Benson, 1939.....	29
Emphytus sp. Klug, 1818.....	30
Eopsis sp. Benson, 1959 .....	31
Taxonus sp. Hartig, 1837 .....	31
Empriini Rohwer, 1911.....	31
Ametastegia sp. A. Costa, 1882 .....	31
Empria sp. Le Peletier & Audinet-Serville, 1828 .....	32
Monostegia sp. Costa, 1859 .....	33
Monsoma sp. MacGillivray, 1908 .....	34
<i>Fenusinae</i> MacGillivray, 1906.....	34
Fenusini MacGillivray, 1906 .....	34
Fenella sp. Westwood, 1840 .....	34
Fenusa sp. Leach, 1817 .....	34
Fenusella sp. Enslin, 1912 .....	34
Hinataria sp. Benson, 1936 .....	35
Kaliofenusa sp. Viereck, 1910 .....	35
Metallus sp. Forbes, 1885 .....	35
Parna sp. Benson, 1936.....	35
Profenusa sp. MacGillivray, 1914 .....	35
Scolioneura sp. Konow, 1890 .....	36
Silliana sp. Malaise, 1949 .....	36
<i>Heterarthrinae</i> Ross, 1951.....	36
Heterarthrini Ross, 1951 .....	36
Heterarthrus sp. Stephens, 1835.....	36
<i>Hoplocampinae</i> Konow, 1890.....	36
Hoplocampini Rohwer, 1911 .....	36
Hoplocampa sp. Hartig, 1837 .....	36
<i>Nematinae</i> Thomson, 1871 .....	37
Hemichroini Rohwer, 1911.....	37
Dineura sp. Dahlbom, 1835 .....	37
Hemichroa sp. Stephens, 1835.....	38
Nematinus sp. Rohwer, 1911 .....	38
Platycampus sp. Schiödte, 1839.....	38
Mesoneurini Zombori, 1982 .....	39
Mesoneura sp. Hartig, 1837 .....	39
Nematini Rohwer, 1911 .....	39
Alpinematus sp. Lacourt, 1996 .....	39
Amauronematus sp. Konow, 1890.....	39
Brachycoluma sp. Strand, 1929 .....	40

Craesus sp. Leach, 1817.....	41
Epicenematus sp. Lacourt, 1998.....	41
Euura sp. Newman, 1837.....	41
Hypolaepus sp. Kirby, 1882.....	42
Kontuniemiana sp. Lacourt, 1998.....	45
Larinematus sp. Zhelochovtsev, 1988.....	45
Lindqvistia sp. Lacourt, 1998.....	45
Nematus sp. Panzer, 1806.....	46
Pachynematus sp. Konow, 1890.....	46
Pikonema sp. Ross, 1937.....	47
Polynematus sp. Zhelochovtsev, 1988.....	47
Pontoprístia sp. Malaise, 1921.....	49
Paraneurini sp. Lacourt, 2004.....	49
Paraneura sp. Lacourt, 2004.....	49
Pristiphorini Lacourt, 1998.....	49
Anoplonyx sp. Marlatt, 1896.....	49
Dinematus sp. Lacourt, 2004.....	50
Gymnonychus sp. Marlatt, 1896.....	50
Lygaeonematus sp. Konow, 1980.....	50
Micronematus sp. Konow, 1890.....	51
Oligonematus sp. Zhelochovtsev, 1988.....	51
Pristiphora sp. Latreille, 1810.....	51
Sharliphora sp. Wong, 1969.....	54
Pseudodineurini Benson, 1938.....	54
Pseudodineura sp. Konow, 1885.....	54
Stauronematini Lacourt, 1998.....	54
Stauronematus sp. Benson, 1953.....	54
<i>Selandriinae Thomson, 1871.....</i>	<i>54</i>
Aneugmenini Takeuchi, 1941.....	54
Aneugmenus sp. Hartig, 1837.....	54
Birka sp. Malaise, 1944.....	55
Dolerini Thomson, 1871.....	55
Dolerus sp. Panzer, 1801.....	55
Loderus sp. Konow, 1890.....	58
Oncodolerus sp. Goulet, 1986.....	59
Dulophanini Lacourt, 1998.....	59
Heptamelini Benson, 1938.....	59
Heptamelus sp. Haliday, 1855.....	59
Selandriini Rohwer, 1911.....	59
Brachytops sp. Haliday, 1839.....	59
Lonnea sp. Lacourt, 2003.....	59
Selandria sp. Leach, 1817.....	60
Strongylogasterini Rohwer, 1911.....	60
Hemitaxonus sp. Ashmead, 1898.....	60
Stromboceros sp. Konow, 1885.....	60
Strongylogaster sp. Dahlbom, 1835.....	60
<i>Siobliinae Lacourt, 1997.....</i>	<i>61</i>
Siobliini Takeuchi, 1952.....	61
Siobla sp. Cameron, 1877.....	61
<i>Tenthredininae Newman, 1834.....</i>	<i>61</i>

Cephaledinini Lacourt, 1997.....	61
Cephaledo sp. Zhelochovstev, 1988 .....	61
Macrophyini Benson, 1946.....	62
Macrophya sp. Dahlbom, 1835 .....	62
Pachyprotasis sp. Hartig, 1837.....	64
Perineurini Rohwer, 1911 .....	65
Perineura sp. Hartig, 1837 .....	65
Rhogogasterini Lacourt, 1997.....	65
Cytisogaster sp. Lacourt, 1997.....	65
Rhogogaster sp. Konow, 1884 .....	65
Sciapterygini Benson, 1946 .....	65
Blankia sp. Lacourt, 1998 .....	65
Elinora sp. Benson, 1946 .....	66
Paratenthredo sp. Taeger, 1991.....	66
Sciapteryx sp. Stephens, 1835 .....	66
Zonuledo sp. Zhelochovtsev, 1988 .....	66
Tenthredinini Rohwer, 1911 .....	67
Tenthredella sp. Rohwer, 1910 .....	67
Tenthredo sp. Linné, 1758 .....	68
Tenthredopsini Benson, 1946 .....	71
Aglaostigma sp. Kirby, 1882 .....	71
Tenthredopsis sp. Costa, 1859 .....	72
<b>XYLEOIDEA.....</b>	<b>75</b>
XYELIDAE .....	75
<i>Xyelinae</i> .....	75
Pleroneura sp. Konow, 1897.....	75
Xyela sp. Dalman, 1819.....	75
Xyelatana sp. Benson, 1938.....	75
<b>BIBLIOGRAPHIE UTILISÉE : .....</b>	<b>76</b>