

## 西藏堇菜属新分类群\*

陈善雍

(四川省中药研究所)

## NEW TAXA OF VIOLA FROM XIZANG (TIBET)

CHEN SAN-YUNG

(Sichuan Institute of Chinese Materia Medica)

## 米林堇菜 新种 图1




图1 米林堇菜 *Viola mainlingensis* S. Y. Chen, sp. nov. 1. 植株; 2. 雌蕊放大。

*Viola mainlingensis* S. Y. Chen, sp. nov. Sect. *Dischidium* Ging.

Affinis *V. szetchwanensi* W. Beck et De Boiss var. *nudicauli* W. Beck, sed caulibus 2—4-nodibus inferne ramosis, foliis basilaribus nodo primo multo longioribus differt. Etiam *V. delarayi* Franch. affinis, a qua stigmatе haud obliquo, stylo longiore, foliis basilaribus pluribus recedit.

Planta 11—25 cm alta. Rhizoma crassiusculum subverticale articulatum, in parte superiore squamis triangulari-ovatis, 2 mm longis, praeditum. Caules plerumque 2—4, ramosi in parte inferiore, 4—6 nodes. Folia basilaria 2—4, ovato-cordata, circ. 2.5 cm longa, basi profunde cordata vel cordata, supra margine hispida, subtus subglabra, stipulis foliaceis oblongis vel lanceolatis 5—8 mm longis, petiolis longioribus quam internodiis basilaribus, 6—10 cm, longis, caulina minora triangulari-ovata 1—2 cm longa, apice acuta vel obtusa, margine repanda vel repando-subcrenata, basi subtruncatula vel cordata, petiolis brevibus. Flores axillares, flavidi, cum calcaribus circ. 1.2 cm longi; pedunculi folia superantes, supra medium bibracteolati; sepala anguste linearia, circ. 6 mm longa, apice obtusa, margine membranacea, appendicibus brevioribus truncatis vel rotundatis; petala lateralia superioraque oblongo-ovata, infimum subabbreviatum; calcar sepala superans 2 mm longum; ovarium ellipsoideum subglabrum, stylo elongato, stigmatе inaequaliter bilobo. Capsula ellipsoidealis, circ. 8 mm longa,

\* 本文承中国科学院植物研究所王文采先生热情帮助谨致谢意。

**sparse hispidula.**

本种与裸茎四川堇菜 *V. szetchwanensis* W. Beck. et De Boiss. var. *nudicaulis* W. Beck. 极相近, 但本种茎 2—4, 具 4—6 节, 下部多分枝, 基生叶柄远较第一节长, 可以区别。本种也与灰叶堇菜 *V. delavayi* Franch. 相近, 但本种柱头不歪斜, 花柱较长, 基生叶数目较多可以区别。

产西藏 (Xizang); 米林 (Mainling), 海拔 3450 米, 1972 年 7 月 13 日, 西藏中草药普查队 (Exped. Pl. Med. Xizang) 3761 (Typus H1); 波密 (Bomi), 卡达 (Kada) 132 号。

**短梗块茎堇菜 新变种*****Viola tuberifera* Franch. var. *brevipedicellata***

S. Y. Chen, var. nov.

A var. *tuberifera* pedicello folio multum brevior, longitudine  $1/4$  folii partem aequante, 1.3—2 cm tantum longo; seminibus albis vel cineraceis, ovatis differt.

本变种与原变种的区别在于花梗远较叶短, 长约为叶的  $1/4$ , 长仅 1.3—2 厘米, 种子白色或灰色, 卵形。

产西藏 (Xizang): 加查 (Gyaca) 海拔 3700 米, 1972 年 8 月 19 日, 西藏中草药普查队 (Exped. pl. Med. Xizang) 4272 (Typusf HP); 江达 (Jomda) 钟补求 5516。