





ANESTESIOLOGÍA



INOTROPISA®

Dopamina

PRESENTACIONES:

INOTROPISA INY.AMP.5 ML C/5

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Afecciones cardíacas, cardiovasculares y/o hemodinámicas.



NITODAL®

Nimodipino

PRESENTACIONES:

NIMODIPINO 10MG/50ML CJA C/1FCO
AMP SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Afecciones cardíacas, cardiovasculares y/o hemodinámicas.



ANTADONA®

Flumazenil

PRESENTACIONES:

ANTADONA 0.5MG/5ML C/1 AMP.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Antadona está indicado y se utiliza como antagonista de las benzodiazepinas, para revertir los efectos de éstas, en los procesos quirúrgicos y para tratar las intoxicaciones de las mismas.





ATROPISA®

Atropina

PRESENTACIONES:

ATROPISA 1.0 MG 1 ML C/50 AMP
ATROPISA S.I. 1 MG/1 ML C/10

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Atropina es útil en la medicación preanestésica para reducir la salivación y las secreciones bronquiales. También como antiespasmódico en afecciones del tracto gastrointestinal, cólico ureteral o biliar. En envenenamientos por insecticidas, picadura de alacranes etc.



BENSITRAK®

Besilato de cisa tra curio

PRESENTACIONES:

BENSITRAK 2MG/ML S.I C/1AMP C/10ML
BENSITRAK 2MG/ML S.I C/1AMP C/2.5ML
BENSITRAK 2MG/ML CJA C/1AMP 5ML SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Coadyuvante en el inicio y mantenimiento de la anestesia general total intravenosa o balanceada. Relajación muscular para la intubación endotraqueal. Relajación muscular durante cirugías. Relajación muscular durante ventilación mecánica. Relajación muscular en estados convulsivos (refractarios, estatus epilepticus, intoxicaciones, tétanos y terapia).



BROMUREX®

Pancuronio

PRESENTACIONES:

BROMUREX 2 ML C/50 AMPL.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Es un relajante neuromuscular muy potente de larga duración, útil en la relajación muscular TOTAL necesaria en la cirugía general, la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica.





BUVACAINA®

Bupivacaina

PRESENTACIONES:

BUVACAINA 0.75% SOL.INY. 30 ML
BUVACAINA 0.50% INY. 1 AMP. 10 ML
BUVACAINA C/EPINEFRINA 30 ML
BUVACAINA PESADA 3 ML C/5 AMP.
BUVACAINA SOL INY 30 ML PI
BUVACAÍNA PESADA 15 MG/165 MG
C/5 AMP 2 ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Anestésico local o regional por infiltración (inyección). Es más potente que la lidocaína y dura más pero requiere más cautela para aplicarlo.



CLONIXINATO®

Clonixinato de lisina

PRESENTACIONES:

CLONIXINATO LISINA 100 MG/2 ML
C/5 AMPO SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Está indicado como analgésico y antiinflamatorio en pacientes que cursan con dolor agudo o crónico. Afecciones de tejidos blandos, cefalea, otalgias, sinusitis y herpes zoster. Dolor e intervenciones ginecológicas, ortopédicas, urológicas y de cirugía general.



HESTAR®

Almidon al 6%

PRESENTACIONES:

HESTAR 10 G/100 ML FLEXOVAL 500 ML
HESTAR 6 G/100 ML FLEXOVAL 500 ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Indicada para corregir o evitar la insuficiencia circulatoria debida a deshidratación o pérdida abundante de sangre.





ENDATAL®

Etomidato

PRESENTACIONES:

ENDATAL 20 MG/10 ML SIC/5 AMP
PISA

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Es un hipnótico sedante intravenoso de corta duración de acción que disminuye la actividad del sistema reticular ascendente sin acción analgésica y está indicado para la inducción de la anestesia general en los procesos quirúrgicos y en los procedimientos diagnósticos de corta duración o en pacientes ambulatorios.



FLOVES®

Sevoflurano

PRESENTACIONES:

FLOVES LÍQUIDO FCO.250 ML 1X1
SEVOFLURANO 100% FCO C/250 ML
SOL P/INH

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El Sevoflurano es un anestésico general inhalado. Se utiliza en caso de inducción y mantenimiento de anestesia general en cirugías en niños y adultos.



GELAFUNDIN®

Poligelina

PRESENTACIONES:

GELAFUNDIN 4 SOL.INY. FLEX 500 ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Indicada para corregir o evitar la insuficiencia circulatoria debida a deshidratación o pérdida abundante de sangre.





DOBUJET®

Dobutamina

PRESENTACIONES:

DOBUJET 250 MG INY 5 ML C/5
DOBUTAMINA 250 MG/20 ML CJA C/1
FCO AMP SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Debe utilizarse como soporte inotrópico a corto plazo de la insuficiencia cardíaca en pacientes con un gasto cardíaco insuficiente y una presión de llenado ventricular izquierda elevada con una presión sanguínea relativamente bien conservada.



LIBERAXIM®

Hidromorfona

PRESENTACIONES:

LIBERAXIM 4 MG FCO C/100 TAB

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La hidromorfona está indicada para el control del dolor de moderado a severo que se presenta en condiciones tales como el período postquirúrgico de cirugía mayor, cáncer, quemaduras, cólico renoureteral y biliar, infarto agudo al miocardio y en pacientes politraumatizados.



NODESCRON®

Vecuronio

PRESENTACIONES:

NODESCRON 4 MG/MLC/50SI
NODESCRON SI4 MG/MLC/50 EXP

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Es un relajante neuromuscular muy potente de mediana duración, útil en la relajación muscular TOTAL necesaria en la cirugía general, particularmente de la pared abdominal, la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica.





PINADRINA®

Epinefrina

PRESENTACIONES:

PINADRINA S.I. 1 MG/ ML
CAJA C/50 AMP

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Se indica su empleo en procedimientos de reanimación cardiovascular, para el broncoespasmo durante la anestesia, reacciones alérgicas por medicamentos, reacciones de urticaria debidas a transfusiones sanguíneas, en reacciones alérgicas severas, etc. Mezclado con anestésicos locales logra aumentar el tiempo de duración.



PISACAÍNA®

Lidocaína (con y sin epinefrina) Solución Inyectable

PRESENTACIONES:

PISACAÍNA 1% INY.FCO.AMP.50 ML
PISACAÍNA 2% 10 ML AMP.PLA.C/10
PISACAÍNA 2% C/EPINEFRINA 50 ML
PISACAÍNA 2% INY.FCO.AMP.50 ML
PISACAÍNA SPRAY 10 G/100 ML FCO C/115 ML
LIDOCAÍNA 2% CJA C/5 FCO AMP SI
LIDOCAÍNA Y EPINEFRINA C/5FCOAMP 50 ML SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Anestésico local o regional por infiltración (inyección).



RELACUM®

Midazolam

PRESENTACIONES:

RELACUM 15 MG/3 ML CJA C/5 AMPO SI
RELACUM 50 MG/10 ML SOL.INY. C/5 AMP.
RELACUM 5 MG/5 ML CJA C/5 AMPO
SI NVO

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Tiene efecto sedante, hipnótico, anticonvulsivante, relajante muscular y amnésico de corta duración. Previo a cirugías, es un sedante-hipnótico útil para la realización de procedimientos diagnósticos, endoscópicos o quirúrgicos de corta duración.





RECOFOL®

Propofol

PRESENTACIONES:

RECOFOL 10 MG/ML FCO. 100 ML
RECOFOL 20 MG/ML FCO 50 ML
RECOFOL 20 ML EMUL.INY. C/5 AMP

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Es un anestésico intravenoso de acción corta, se usa para inducir la anestesia, mantenerla y también para la sedación total en terapia Intensiva. Deberá ser administrado únicamente por especialistas en anestesiología o bajo su supervisión.



RELATRAC®

Besilato de atracurio

PRESENTACIONES:

RELATRAC 25MG/2.5ML S.IAMP C/1
RELATRAC 50 MG/5 ML S.I AMP C/1
RELATRAC MLD 100MG SOL.INY10 ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El atracurio es un relajante neuromuscular muy potente de media duración, útil en la relajación muscular TOTAL necesaria en la cirugía general, la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica.



RELAZEPAM®

Diazepam

PRESENTACIONES:

RELAZEPAM 10 MG/2 ML CJA C/6 AMPO
SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Tiene efecto sedante, hipnótico, anticonvulsivante, relajante muscular y amnésico de duración intermedia. Previo a cirugías, es un sedante-hipnótico útil para la realización de procedimientos diagnósticos, endoscópicos o quirúrgicos.



RHEOMACRODEX®

Dextran

PRESENTACIONES:

RHEOMACRODEX 10% GLUC 500 ML
RHEOMACRODEX 10% SAL INY.500 ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Indicada para corregir o evitar la insuficiencia circulatoria debida a deshidratación o pérdida abundante de sangre.





ROPICONEST®

Ropivacaina

PRESENTACIONES:

ROPICONEST S.I. 2 MG/ML 5 AMP PLAS20 ML
ROPICONEST S.I. 7.5 MG/ML 5 AMP PLAS20 ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Ropivacaína es un anestésico local moderno con aplicaciones en el campo de la anestesia y/o analgesia con diversas técnicas en diferentes escenarios clínicos.



SET ESPICAT®

PRESENTACIONES:

SET ESPICAT BÁSICO 16G M-FC
SET ESPICAT BÁSICO 17G M-FC
SET ESPICAT BÁSICO 18G M-FC

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

"Aguja modelo tuohy calibre 16,17 o 18g. Catéter epidural calibre 18, 19 o 20 g respectivamente. Sujetador para catéter y filtro. Jeringa para técnica perdida de la resistencia. Cinta adhesiva para sujetar el catéter"

SET ESPICAT INTERMEDIO 16G M-FC
SET ESPICAT INTERMEDIO 17G M-FC
SET ESPICAT INTERMEDIO 18G M-FC

"Aguja modelo tuohy calibre 16,17 o 18g. Catéter epidural calibre 18, 19 o 20 g respectivamente. Sujetador para catéter y filtro. Jeringa para técnica perdida de la resistencia. Cinta adhesiva para sujetar el catéter. Agujas hipodérmicas 18 x 39 mm, 25g x 16 mm. Jeringas de 3 y 20 ml."

SET ESPICAT PLUS 16G M-FC
SET ESPICAT PLUS 17G M-FC
SET ESPICAT PLUS 18G M-FC

"Aguja modelo tuohy calibre 16,17 o 18g. Catéter epidural calibre 18, 19 o 20g respectivamente. Sujetador para catéter y filtro. Jeringa para técnica perdida de la resistencia. Cinta adhesiva para sujetar el catéter. Antiséptico (solución de iodopovidona 40ml) charola antiséptica 3 aplicadores 1 campo quirúrgico hendido 1 campo quirúrgico jeringas de 3 y 20 ml. Gasas"





SODIPENTAL®

Tiopental sodico

PRESENTACIONES:
SODIPENTAL 500 MG 20 ML C/DIL.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Como inductor de anestesia antes de la administración de otros anestésicos.



SOFLORAN®

Isoflurano líquido

PRESENTACIONES:
SOFLORAN LIQUIDO 100 ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Está indicado como anestésico por inhalación, tanto para inducción como para mantenimiento de la anestesia general para cirugías, particularmente en pacientes de alto riesgo, neurocirugía, cirugía cardíaca, anestesias repetidas, cirugía de transplante de órganos, en ginecología, obstetricia y pediatría.



TENDRIN®

Efedrina

PRESENTACIONES:
TENDRIN 50 MG/2 ML C/10 AMP.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Está indicado en el tratamiento del broncoespasmo agudo durante la anestesia. También se indica para contrarrestar los efectos hipotensores de algunos procedimientos anestésicos o para tratar la hipotensión causada por bloqueadores ganglionares, antiadrenérgicos u otros productos hipotensores.





UXICOLIN®

Cloruro de suxametonio

PRESENTACIONES:
UXICOLIN 2 ML C/5 AMP

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Es un relajante neuromuscular muy potente de acción muy corta, útil en la relajación muscular TOTAL necesaria en la intubación endotraqueal particularmente.



BROSPINA®

Buprenorfina

PRESENTACIONES:
BROSPINA 0.3 MG/ML C/6 AMP PI
BROSPINA SL 0.2 MG C/10 TAB. SUBLING

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Control del dolor de moderado a severo que se presenta en el período postquirúrgico en el dolor secundario a cáncer avanzado y en pacientes con infarto agudo al miocardio. Además, es útil como adyuvante anestésico para proporcionar analgesia en procedimientos anestésicos generales o locales.



BUFIGEN®

Nalbupina

PRESENTACIONES:
BUFIGEN 10 ML SOL. INY.
BUFIGEN 1 ML SOL. INY. C/5 AMP L

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Se indica para tratar el dolor de moderado a severo incluyendo el dolor asociado al infarto agudo del miocardio.





EPLICODINA®

Clonidina

PRESENTACIONES:

EPLICODINA 0.15 MG/ML AMP.1 ML C/5

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Es un coadyuvante en la anestesia regional y está indicada como analgésico peridural para el control del dolor postoperatorio, como coadyuvante de la terapia con opiáceos (morfina) en el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer avanzado y en el dolor postoperatorio.



FENODID®

Fentanilo

PRESENTACIONES:

FENODID 0.25 MG/5 ML C/6 AMP SI
FENODID 0.5 MG/10 ML C/6 AMP PI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Agente analgésico opioide complementario en anestesia general, regional o local. Fenodid® se utiliza en combinación con agentes neurolépticos como el droperidol para suministrar neuroleptoanalgesia y con óxido nitroso para suministrar neuroleptoanestesia. Fenodid® también se utiliza en combinación con agentes bloqueadores neuromusculares.



GRATEN®

Morfina

PRESENTACIONES:

GRATEN 10 MG/10 ML S. INY.C/5 AMP
GRATEN 2.5 MG/2.5 ML SI C/5 AMPO
GRATEN HP 50 MG/2 ML S.I.C/1 AMPO
GRATEN LC 15 MG C/100 TAB. LIB. PRO
GRATEN LC 30 MG C/100 TAB. LIB. PRO
GRATEN LI 30 MG C/100 TABLETAS
GRATEN LI 30 MG C/20 TABLETAS
GRATEN SOL ORAL 30 MG/5 ML FCO. C/50 ML.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Graten® es sulfato de morfina de liberación rápida o inmediata que está indicada para el control del dolor en sus diferentes modalidades de presentación: por su intensidad : dolor moderado y severo por su evolución: agudo o crónico. Por su etiología: nociceptivo somático o visceral.





LIBERAXIM®

Hidromorfona

PRESENTACIONES:

LIBERAXIM 2 MG FCO C/100 TAB

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La hidromorfona está indicada para el control del dolor de moderado a severo que se presenta en condiciones tales como el período postquirúrgico de cirugía mayor, cáncer, quemaduras, cólico renoureteral y biliar, infarto agudo al miocardio y en pacientes politraumatizados.



ONEMER (SL)®

Ketorolaco

PRESENTACIONES:

ONEMER 30 MG/ML 1 ML C/3 AMP
 KETOROLACO 30 MG/ML CJA C/3AMPO 1ML SI
 ONEMER - CS 30 MG/50ML SOL INY MINIOVAL
 ONEMER 10 MG C/10 TAB
 ONEMER SL 30 MG C/6 TAB SUBLING
 MED KETOROLACO 30 MG CJAC/6 TAB SUBLI
 MED KETOROLACO 10 MG CJA C/10 TAB

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

El ketorolaco está indicado en el tratamiento a corto plazo del dolor agudo de moderado a severo.



RUBIDEXOL®

Metadona

PRESENTACIONES:

RUBIDEXOL 10 MG/ML CON. ORAL 1LT
 RUBIDEXOL TABLETAS 10 MG C/100
 RUBIDEXOL TABLETAS 5 MG C/100

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Se indica para el alivio del dolor severo. También está indicado para el manejo del síndrome de abstinencia a los opioides y como terapia de mantenimiento temporal en farmacodependientes.





ZUFTIL®

Sufentanilo

PRESENTACIONES:

ZUFTIL 0.1 MG/2 ML SOL. INY.1X5
ZUFTIL 0.25 MG/5 ML SOL. INY.1X5

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Es un potente analgésico opioide, cuando se utiliza en balance con anestesia general. El sufentanilo ha reportado ser 10 veces más potente que el fentanil. El sufentanilo se utiliza intravenosamente como anestésico primario con 100% de oxígeno, en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos mayores.



PRIDAM®

Norepinefrina

PRESENTACIONES:

PRIDAM SOL.INY 4 MG/4 ML C/10

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La Norepinefrina está indicada en la restauración de la presión arterial en ciertos casos de hipotensión arterial aguda, como la que se presenta en algunos casos después de una feocromocitomectomía o después de un infarto al miocardio



DICLOPISA®

Diclofenaco sódico

PRESENTACIONES:

DICLOPISA 75 MG/3 ML SOL.INY. 3 MLC/2

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Indicado para aliviar el dolor y la inflamación en diversos procesos: trastornos osteomusculares y articulares, como la artritis reumatoide, la artrosis y la espondilitis anquilosante, ETC.



PLEXICODIM®

Oxicodona y Acetaminofen

PRESENTACIONES:

PLEXICODIM 5 MG/325 MG C/FCO. C/100 TAB.

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Está indicado para el alivio de dolor moderado o severo que no cede con los analgésicos comunes.





ROLOD®

Oxicodona

PRESENTACIONES:
ROLOD 5 MG C/100 CAP

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Indicada para el alivio de dolor moderado a severo que no cede con los analgésicos comunes.



ARTERINA®

Vasopresina

PRESENTACIONES:
ARTERINA 20 UI/ML SOL.INY C/1 FCO

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Enuresis nocturna. Hemorragia por várices esofágicas. Reanimación cardiopulmonar avanzada. Shock. Sepsis. Lesiones del sistema nervioso central con alteraciones de la HAD. Alteraciones peristálticas. Pruebas diagnósticas relacionadas a la HA.



ANGIOPHIL®

Trinitrato de glicérido

PRESENTACIONES:
ANGIOPHIL 1 MG/ML SOL.INY. FCO.AMP C/50ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Angina de pecho grave: inestable y vasospástica (preinfarto o infarto en evolución). Infarto agudo del miocardio (IAM). Edema pulmonar agudo asociado a Infarto Agudo del Miocardio (IAM), ETC.



ALNEX®

Metamizol

PRESENTACIONES:
ALNEX 1G/2ML CJA C/3 AMPO SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Es un analgésico antipirético con efectos antiespasmódicos y antiflogísticos. Así, resulta útil para tratar dolores de leves a moderadamente intensos, agudos o crónicos.





LUFUREN®

Bromuro de Rocuronio

PRESENTACIONES:

LUFUREN 50 MG/5ML S.I.C/12

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Bloqueador neuromuscular no despolarizante (BNMND). Coadyuvante en el inicio y mantenimiento de la anestesia general total intravenosa o balanceada.



ANTIVON®

Ondansetrón

PRESENTACIONES:

ANTIVON 4 MG/2 ML SOL. INY. C/1 AMP

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Antivon está indicado para el tratamiento y la prevención de la náusea y el vómito inducidos por la quimioterapia antineoplásica, la radioterapia y para la prevención y tratamiento de la náusea y vómito postoperatorio.



LEFEBRE®

Naloxona

PRESENTACIONES:

LEFEBRE 0.4 MG CAJA C/10 AMP 1 ML

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La Naloxona es un antagonista opiode, que actua competitivamente sobre los receptores mu, kappa y sigma del SNC, tiene gran afinidad por los receptores mu.





KRUNAMINA®

Dexmedetomidina

PRESENTACIONES:

KRUNAMINA S.I 200MCG/2ML C/5FCO

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La Dexmedetomidina es un agente terapéutico agonista, alfa-2 adrenergico, selectivo con aplicaciones clínicas como ansiolítico, sedante, analgésico, y ayudante anestésico.



GONET®

Digoxina

PRESENTACIONES:

DIGOXINA 500MCG/2ML CJA C/6 AMPO SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La digoxina es un glucósido cardiotónico, usado como agente antiarrítmico en la insuficiencia cardíaca y otros trastornos cardíacos. Actúa, como efecto directo.



UNOKAVI®

Fitomenadiona

PRESENTACIONES:

UNOKAVI 10 MG/1 ML CJA C/5 AMPO SI
UNOKAVI 2 MG/0.2 ML CJA C/5 AMPO SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

La fitomenadiona (vitamina K) se usa para prevenir las hemorragias en personas con problemas de coagulación o con muy poca vitamina K en el cuerpo.



PISDENO®

Adenosina

PRESENTACIONES:

ADENOSINA 6 MG/2 ML CJA C/6 FCO
AMP 2ML SI
PISDENO 6 MG/2 ML CJA C/6 FCO
AMP 2ML SI

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Adenosina, solución inyectable, antiarrítmico indicado en el tratamiento de taquicardias, aleteo auricular, fibrilación auricular.

