

luppo di questo tipo di vegetazione fino alla Conca di Prazzo, la quale, scavata nei calcescisti, e ampiamente esposta a S., vi offre le migliori condizioni ambientali; ma si può dire che una fascia continua (più o meno modificata in un *facies* rupestre) presenti questo carattere nel tratto che da Acceglio va fino ad Alma e Lottulo, e per un'altezza tra i 1000 e i 1600 m.

Nella Conca di Prazzo i pendii rocciosi ospitano: *Juniperus communis*, *Bromus erectus*, *Stipa pinnata*, *Phalangium Liliago*, *Thesium linophyllum*, *Dianthus virgineus*, *Alyssum calycinum*, *Reseda luteola*, *Helianthemum Fumana*, *H. italicum*, *H. polyfolium*, *Silene Otites*, *Gypsophila Saxifraga*, *Sempervivum tectorum*, *S. arachnoideum*, *Sedum rupestre*, *S. acre*, *Hypericum perforatum*, *Ononis Natrix*, *O. spinosa*, *Astragalus monspessulanus*, *Coronilla varia*, *Eryngium campestre*, *Calamintha Acinos*, *C. parviflora*, *Teucrium montanum*, *Satureja montana*, *Thymus pannonicus*, *Euphrasia Rostkowiana*, *Echium vulgare*, *Globularia vulgaris*, *Plantago Cynops*, *Scabiosa arvensis*, *Asperula cynanchica*, *Carlina vulgaris*, *Inula montana*, *Artemisia camphorata*, *A. campestris*, *Lactuca perennis*, *Hieracium Pilosella*; oppure: *Briza media*, *Stipa capillata*, *Koeleria brevifolia*, *Allium sphaerocephalum*, *Helianthemum polifolium*, *Linum tenuifolium*, *Silene Vallesia*, *Potentilla cinerea*, *Ononis Columnae*, *Anthyllis vulneraria*, *Genista cinerea* (in alcune stazioni dominante) *Eryngium campestre*, *Lavandula Spica*, *Calamintha Nepeta*, *Satureja montana*, *Orobanche Eryngii*, *O. alba*, *Scabiosa holosericea*, *Asperula cynanchica*, *Artemisia camphorata*, *Carlina acanthifolia*, *Hieracium lanatum*.

Nè sono rare le specie arbustacee, come *Ribes Grossularia*, *Berberis vulgaris*, *Prunus spinosa*, che formano grossi cespugli.

Più a valle verso Lottulo e Alma, e specialmente intorno ad Alma, dove il rado *Pinus sylvester* lascia ampie superfici scoperte sopra calcari pulverulenti, gli aggruppamenti constano di: *Juniperus communis*, *Bromus patulus*, *B. erectus*, *Sesleria caerulea*, *Stipa pinnata*, *Calamagrostis littorea*, *Phalangium Liliago*, *Thesium linophyllum*, *Iberis saxatilis*, *I. sempervirens*, *Erysimum lanceolatum*, *Biscutella laevigata*, *Aethionema saxatile*, *Hypericum perforatum*, *Helianthemum polifolium*, *H. italicum*, *Viola pinnata*, *Linum salsoloides*, *Sanguisorba officinalis*, *Saponaria ocymoides*, *Silene Saxifraga*, *Potentilla caulescens*, *P. cinerea*, *Amelanchier vulgaris*, *Anthyllis vulneraria*, *A. montana*, *Hippocrepis comosa*, *Vicia onobrychioides*, *Lotus corniculatus*, *Argyrolobium Linneanum*, *Genista cinerea*, *Trinia dioica*, *Euphorbia Valliniana*, *Plantago Cynops*, *Echium vulgare*, *Onosma echioides*, *Ajuga Chamaeopytis*,