



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pyronemataceae*

## *Pseudoaleuria fibrillosa* (Currey) Moravec

Synonymes : *Tricharina fibrillosa*, *Cheilymenia fibrillosa*, *Peziza fibrillosa*

Au sol. Apothécies jusqu'à 3 cm. Hyménium orange. Face externe finement velue concolore à blanchâtre. Spores lisses, non guttulées, 15-17 x 8-9 µm. Paraphyses à sommet nettement clavé. Poils de deux sortes : ceux de la marge brunâtres, obtus et cloisonnés et ceux de la face externe hyalins, plus fins et plus longs. Confusion possible avec *Aleuria aurantia* et *Neottiella rutilans*, en cas de doute la microscopie est totalement différente.

Présenter cette espèce aujourd'hui, avec une littérature accessible et des moyens de communications rapides, est chose aisée. Nous pouvons ici remercier nos prédécesseurs qui ont beaucoup travaillé et réussi à la déterminer. En effet, elle est connue depuis de nombreuses années dans la région, notamment sur le littoral où elle semble assez peu fréquente. Nos récoltes personnelles proviennent de l'île de Ré, l'île d'Oléron, St Laurent de la Prée et Cadeuil (commune du Gua), ainsi que des départements de la Charente et des Deux-Sèvres. Nos récoltes s'étalent entre les mois de novembre et février.

Biblio : Discomycètes de France Grelet p. 262 - Ascomiceti d'Italia G. Medardi - Moravec J. 2003, Taxonomic revision of the genus *Cheilymenia*.

*Fiche réalisée en avril 2017 par Patrice TANCHAUD*



