


Leg. Yvonne  
Mauget  
Bédenac  
mars 2016



Leg. Robert Lagarde  
Angeac-Charente, nov. 2012



Ronce les bains, déc. 2012

Ordre : Tricholomatales

Famille : Tricholomataceae

## *Arrhenia latispora* (J. Favre) Bon & Courtec.

Au sol parmi les mousses, parfois sur débris de plantes ou bois pourri mais souvent moussus. Chapeau grisâtre blanchâtre, en forme de spatule. Lames bien formées, grises. Stipe plus ou moins court, latéral. Spores 6,5-8,5 x 5-6,5  $\mu\text{m}$ , subglobuleuses.

A comparer avec :

- *A. acerosa* : même écologie, spores plus elliptiques, 6-10 x 3-5,5  $\mu\text{m}$  ;
- *A. subglobispora* : parmi les mousses sur murs, pierres ou troncs, stipe excentré, spores 3,5-6 x 3,5-4,5  $\mu\text{m}$  ;
- *A. subglobisemen* : sur mousses humides, spores 5,7-7 x 5-5,6  $\mu\text{m}$ .

Espèce peu fréquente dont nous signalons plusieurs récoltes personnelles ou en compagnie de quelques collègues.

Biblio : GEPR.

Fiche réalisée en mars 2018 par Patrice TANCHAUD



*La Palmyre, déc. 2017*

