



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pezizaceae*

## *Peziza saccardoana* Cooke

Egalement connu sous le nom de *P. saccardiana* (orthographe contraire au code, car venant de M. Saccardo).

Sur le sol ou les lieux brûlés. Apothécies jusqu'à 8 cm. Hyménium brun rougeâtre parfois teinté d'olive. Face externe subconcolore, furfuracée. Spores (13)14-17(18) x 9-10 µm, avec une grosse guttule centrale, présentant des verrues tronquées ou arrondies.

A comparer surtout avec :

- *P. badiofusca* : présence d'un latex bleu opalescent (souvent discret), spores plus ou moins similaires ;
- *P. depressa* : spores ornées d'épines rondes et régulières ;
- *Iodowynnea auriformis* : spores plus petites, brunâtres à maturité, comportant deux petites guttules et surtout ornées de trois ou quatre rangées de verrues coalescentes.

Cette espèce est visible à différents moments de l'année. Nous la rencontrons tous les ans, sur les bords de chemins en forêt ou sur lieux brûlés, aussi bien à l'intérieur des terres que sur le littoral.

Biblio : Ascomiceti d'Italia G. Medardi - Clé des discomycètes carbonicoles par René Dougoud - Clé sur le genre *Peziza* de Hohmeyer et Häffner.







