



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pezizaceae*

***Adelphella babingtonii*** (Berk. & Broome) Pfister, Matočec & I. Kušan

Synonyme : *Pachyella babingtonii*

Sur bois mort humide ou sur débris végétaux. Apothécies jusqu'à 2 cm, pulviniées, brillantes à l'état humide, ocre brun clair à rouge-brun. Spores 19-22 x 12-13 µm, avec deux grosses guttules, microguttulées et lisses. Asques à paroi faiblement amyloïde (pour une meilleure observation : prétraiter au KOH, laver à l'eau et tout de suite appliquer IKI ou Melzer). Cellules de l'excipulum globuleuses, prolongées par un élément plus fin.

A comparer avec *Psilopezia nummularia* (asques non amyloïdes) et les espèces du genre *Pachyella* (cf. tableau page 4 de la fiche de *P. violaceonigra*).

Nous rencontrons cet ascomycète chaque année, entre les mois d'avril et d'octobre, sur différents secteurs, comme par exemple à La Chapelle des Pots, Fontcouverte, St Bris des bois, St Savinien ..., plus particulièrement dans les zones humides, souvent sur bois pourrissant parfois au sol. A noter malgré tout quelques récoltes sur bords de chemins en forêt, ainsi que la couleur des jeunes apothécies qui peuvent être verdâtres, parfois très pâles.

Biblio : BK1 n° 56 - Pézizales du Rhône-Alpes, FMBDS, 1<sup>ère</sup> partie.





