

Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinopsis gonophylla (Quélet) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Synonyme : *Coprinus gonophyllus*




Nom français : Coprin à spores subsphériques



Généralement sur places à feu. Chapeau 1-2 cm, globuleux puis ovoïde, recouvert dans la jeunesse d'un voile blanc. Lames noires à maturité. Stipe blanc. Spores 6-8,5 x 5-8 µm, subglobuleuses. Voile constitué d'hyphes diverticulées (Sous-section *Alachuani*).

A comparer par exemple avec deux espèces à spores légèrement ressemblantes, de la Sous-section *Lanatulii* (voile filamenteux) : *C. jonesii* (même écologie) et *C. spelaiophila* (sur bois).

Espèce peu fréquente, visible à toutes périodes de l'année, rencontrée en différents points de la région, sur places à feu ou autres lieux incendiés. A noter page 3 une récolte réalisée sur un parking en forêt de St Augustin.

Biblio : Studies in Coprinus d'Uljé - E. Ludwig, Pilzk. Band 2 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin) - BK4 278.





voile