



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Dermolomataceae*

***Hodophilus cf. anatinus*** Dima, Adamčík & Jančovičová

Au sol sous feuillus. Chapeau 8-20 mm, brun grisâtre à gris orangé en séchant. Lames décurrentes, pâles à subconcolores. Stipe jaune, puis grisonnant et brunissant sur toute la longueur. Odeur et saveur sans particularité. Spores 4,8-5,5 x 3,8-4,4 µm. Epicutis hyméniforme.

A comparer avec :

- *H. micaceus* et *H. praecox* : espèces caractérisées par le stipe jaune très vif ;
- *H. phaeoxanthus* : chapeau brun jaunâtre à brun orangé grisâtre, stipe jaune à brun orangé au sommet et brun en bas ;

Les espèces de ce genre sont peu fréquentes et les distinguer avec certitude n'est pas chose aisée, notamment au vu des études récentes (cf. ci-dessous) ; nous ne manquerons pas d'ailleurs de surveiller les publications à venir, particulièrement celles traitant de ces espèces à stipe plus ou moins jaune...

Nos récoltes ont été réalisées dans les secteurs de St Sornin, Saintes et La Chapelle des Pots, souvent dans des milieux frais ; nous les baptisons *H. micaceus*, mais ce binôme ne peut plus correspondre aujourd'hui, *H. anatinus* (voire *H. phaeoxanthus*) pourrait être plus approprié vu le jaune peu intense des stipes...

Biblio : DM HS n° 5 p. 137 - Mycologia 108 (5) : 867 (2016) - Mycological Progress (2018) 17 : 1097-1111 - Errotari 2018.

*Fiche réalisée en septembre 2019 par Patrice TANCHAUD*



