



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Entoloma pseudofavrei Noordel. & Vila

Parmi les mousses en forêt ou clairière. Chapeau jusqu'à 15 mm, conique à conico-convexe, hygrophane, longuement strié, brun à brun ocre avec le centre plus sombre, puis ochracé à maturité. Lames crème rosâtre. Stipe brun-gris, plus ou moins couvert de fibrilles blanchâtre argenté. Odeur fortement farineuse rance, saveur farineuse. Spores 9,5-11 x 6-7,2 µm. Basides avec boucle à la base. Cheilocystides sinueuses à sommet élargi ou capité. Boucles présentes dans tous les tissus, mais rares dans le pileipellis.

A comparer avec :

- *E. favrei* : absence d'odeur spécifique et de cheilocystides, spores 7,2-9 µm de largeur ;
- *E. tibiicystidium* : chapeau brun pâle, odeur nulle.

Notre récolte a été réalisée en janvier 2019, dans la mousse sous *Cupressus* sur la commune de La Chapelle des pots. Le chapeau atteignait 13mm, l'odeur très puissante malgré la petitesse du spécimen nous a surpris, pouvant rappeler celle de *Macrocystidia cucumis* et son odeur de mastic de vitrier. Les spores contrôlées mesuraient 9-11 x 6-7,8 µm. A noter que les cheilocystides présentaient à leur sommet une masse gélatineuse, comme celles de *E. tibiicystidium*, taxon impossible à retenir vu les différences résumées ci-dessus.

Biblio : Fungi non delineati 66 (2013).