



Ordre : Tricholomatales

Famille : Mycenaceae

Mycenella bryophila (Vogolino) Singer

Nom français : Mycène des mousses


Au sol, parmi les mousses, parfois près de souches ou de troncs. Chapeau brun à beige grisâtre, marge plus pâle. Lames blanches à blanc grisâtre. Stipe gris-brun, entièrement pruineux, plus ou moins radicant. Odeur et saveur sans particularité. Spores 6-7,5 μm , bossues et fortement apiculées. Cheilocystides lagéniformes avec un long col cylindrique à sommet arrondi parfois couvertes de mucus.

A comparer avec les espèces du genre *Mycena* dont très peu d'espèces ont le stipe pruineux, ainsi que celles du même genre ayant des spores bossues :

- *M. trachyspora* (syn. *M. rubropunctata*) : lames et stipe souvent ponctués de brun-rouge à maturité, cheilocystides fusiformes à sommet plus ou moins pointu et parfois mucroné ;
- *M. lasiosperma* : cystides hyméniales à sommet ramifié-diverticulé.

Une certaine confusion semble régner dans ce genre avec les espèces à spores bossues. Il ne fait guère de doute que des études à venir bouleverseront probablement ce petit groupe. Cette espèce n'est pas très fréquente, mais nous l'observons malgré tout chaque automne ou début d'hiver, sur le littoral (souvent sur l'île de Ré) et à l'intérieur des terres.



Biblio : littérature courante - Pilzk. 1 - Funga nordica - Champignons d'Europe tempérée, Læssøe & H. Petersen.



pleuros



caulos



cheilos



