



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Tubariaceae*

## *Tubaria minutalis* Romagn.

Synonyme : *Tubaria minima*

Dans les stations humides, les lieux ombragés, sur le sol parmi les débris de bois. Chapeau 2-5 mm, roux à roussâtre ochracé. Lames crème ochracé, espacées. Stipe subconcolore au chapeau. Spores 4,5-7 x 3-4,5 µm. Cheilocystides clavées à utriformes.

Avec une écologie similaire, à comparer avec *Flammulaster speireoides* qui possède un chapeau couvert d'un léger voile floconneux (typique du genre sous le microscope, composé d'éléments elliptiques à subglobuleux), un stipe roussissant dans les 2/3 inférieurs avec l'âge, et d'un point de vue microscopique des cheilocystides cylindroclavées à lagéniformes.

Cette petite espèce peut passer inaperçue, elle semble néanmoins rare. Nous l'observons occasionnellement sur la commune de Fontcouverte, dans un sous-bois frais avec majorité de charmes, où nous pouvons l'observer entre les mois de mai et de juillet lorsque les conditions sont favorables. Nous l'avons également récoltée lors d'une sortie en Charente sur la commune d'Ecuras.

Biblio : Cetto n° 1323 - DM 84 Galero-naucorioïdes - Pilzk. 1 Erhard Ludwig.

