

ENUMERATIO TESSARATOMINORUM.

Fam. Cimicina STAL.

Subf. Tessaratomina STAL.

Haec subfamilia est dividenda in sectiones quinque:

- a. Tarsis triarticulatis.
- b. Margine apicali corii plus minus distincte sinuato, rarissime rotundato; membrana areolis basalibus destituta, vena transversa basali, venas longitudinales emittente, instructa; scutello longiore quam latiore, parte pone frena sita longa; venis alarum primaria et subtensa valde appropinquatis vel contiguis, apicem versus divergentibus, hamo nullo. — *Oncomerina* STAL.
- bb. Margine apicali corii recto vel subrotundato; membrana basi areolis pluribus, venas longitudinales emittentibus, instructa; antennis quadriarticulatis; venis alarum primaria et subtensa totis distantibus; hamo saepissime distincto.
- c. Abdominis segmentis simplicibus; articulo secundo antennarum articulis duobus apicalibus ad unum brevioribus.
- d. Metasterno valde elevato et antrorsum libere producto; scutello pone frena distincte producto, parte producta triangulari vel spatulata; thorace basi medio ante scutellum retrorsum plus minus producto. — *Tessaratomina* STAL.
- dd. Metasterno simplici vel elevato, nunquam antrorsum libere producto; scutello aequilatero, apice pone frena anguste leviterque producto, apice rotundato vel truncato; thorace postice haud producto. — *Eusthenina* STAL.
- ec. Segmentis abdominis utrimque dilatatis et acute bilobis; articulo secundo antennarum articulis duobus apicalibus ad unum longitudine subaequali; capite ante oculos spina valida armato; thorace basi late rotundato; scutello aequilatero, apice leviter angustateque producto. — *Prionogastrina* STAL.
- aa. Tarsis biarticulatis; thorace basi medio haud vel levissime producto; membrana areolis basalibus destituta, vena transversa basali obsoleta, venas longitudinales numerosas emittente, instructa; margine apicali fere toto recto, haud sinuato; alarum venas primaria et subtensa totis distantibus; hamo praesente. — *Cyclogastrina* STAL.

Div. *Oncomerina* STAL.

ONCOSELIS WESTW.

WESTW., Trans. ent. soc. II. p. 19. (1837); STAL, Hem. afr. I. p. 223. (1864).

1. *O. Australasiae* WESTW.*Oncoscelis Australasiae* WESTW., Trans. ent. soc. II. p. 20. pl. 2. fig. 5. (1837); DALL., List of Hem. I. p. 346. I. (1851).

Patria: Australia.

2. *O. sulciventris* STAL.*Oncoscelis sulciventris* STAL., Trans. ent. soc. Ser. 3. I. p. 598. I. (1863).
Patria: Australia, Moreton Bay. (Mus. Holm.)

STILIDA STAL.

Trans. ent. soc. Ser. 3. I. p. 599. (1863); Hem. afr. I. p. 223. (1864).

1. *S. indecora* STAL.*Stilida indecora* STAL., Trans. ent. soc. Ser. 3. I. p. 599. I. (1863).
Patria: Australia, Moreton Bay. (Mus. Holm.)

Segmentum anale maris apice profunde sinuatum, in medio sinus incisum, lobis apicalibus apice obtusis, haud vel levissime sinuatis, angulis apicalibus rotundatis. Articulus primus antennarum ubique aequo crassus.

2. *S. sinuata* STAL.

Sordide ferruginea, supra punctulata, thorace scutelloque transversim subrugosis; antennarum articulis primo et secundo nec non basi articuli tertii, marginibus lateralibus imis thoracis et abdominis, lateribus femorum sulcisque tibiaram nigricantibus; apice scutelli margineque imo apicali corii sordide flavescens; membrana aenescens-fusca; alis obscure vinaceis. ♂. Long. 23, Lat. 13 mill.

♂. Segmento anali apice sinuato, in medio sinus acute emarginato, lobis apicalibus apice distincte sinuatis, angulis apicalibus loborum distinctis.

Patria: Australia, Cap York. (Mus. Holm.)

S. indecora maxime affinis et simillima, differt tantum articulo primo antennarum basi paulo incrassato lobisque segmenti analis maris apice distincte sinuatis et angulis apicalibus acutiusculis instructis.

AXONA STAL.

Hem. afr. I. p. 224. (1864).

Erga WALK., Cat. Hem. Het. III. p. 485. (1868).1. *A. longitudinalis* WESTW.*Rhaphigaster longitudinalis* WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 31. (1837).*Erga roseoflua* WALK., Cat. Hem. Het. II. p. 486. I. (1868).

Patria: Australia, Moreton Bay, Cap York. (Mus. Holm.)

LYRAMORPHA WESTW.

HOPE, Cat. of Hem. I. p. 27. (1837); STAL, Hem. afr. I. p. 224. (1864).

1. *L. rosea* WESTW.*Lyramorpha rosea* WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 28. (1837); DALL., List of Hem. I. p. 346. I. (1851).*Lyramorpha pallida* WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 28. (1837).

Patria: Australia.

2. *L. diluta* STÅL.

Lyramorpha diluta STÅL, Trans. ent. soc. Ser. 3. I. p. 598. 1. (1863); VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 36. 2. (1868).

Patria: Insulae Aru.

3. *L. Vollenhovii* STÅL.

Lyramorpha Vollenhovii STÅL, Tijdschr. voor Ent. Ser. 2. II. p. 124. (1867); VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 35. pl. 4. fig. 3. (1868).

Patria: Nova Guinea et insulae adjacentes. (Mus. Holm.)

AGAPOPHYTA LAP.

LAP., Ess. Hém. p. 63. (1832); BOISD., Voy. de l'Astrol. Entom. II. p. 626. (1835); GUÉR., Voy. la Coq. Ins. p. 168. (1838); STÅL, Hem. afr. I. p. 224. (1864).

1. *A. bipunctata* BOISD.

Agapophyta bipunctata BOISD., Voy. de l'Astrol. Ent. II. p. 626. pl. 11. fig. 5. (1835); GUÉR., Voy. la Coq. Ins. p. 168. pl. 11. fig. 15. (1838); BLANCH., Hist. nat. ins. p. 143. 1. (1840); A. et S., Hist. des Hém. p. 163. 1. (1843); VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 20. 1. (1868).

Patria: Nova Guinea, Woodlark. (Mus. Holm.); Insulae Buru et Salawatti.

ONCOMERIS LAP.

LAP., Ess. Hém. p. 60. (1832); STÅL, Hem. afr. I. p. 223. (1864).

Oncomerus BURM., Handb. II. 1. p. 352. (1835).

1. *O. flavicornis* BURM.

Oncomerus flavicornis BURM., Handb. II. 1. p. 353. 2. (1835); A. et S., Hist. des Hém. p. 169. 1. (1843); H. S., Wanz. Ins. VII. p. 123. (1844); VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 30. 1. (1868).

Tessarotoma flavicorne BOISD., Voy. de l'Astr. Entom. II. p. 631. 1. pl. 11. fig. 10. (1835).

Tessarotoma flavicornis GUÉR., Voy. la Coq. Ins. p. 171. pl. 12. fig. 2. (1838).

Oncomeris flavicornis BLANCH., Hist. nat. ins. p. 142. 2. (1840); DALL., List of Hem. I. p. 346. 1. (1851).

Patria: Nova Guinea. (Mus. Holm.); Insulae Aru et Bouru.

2. *O. ostracipterus* MONTR.

Tessarotoma ostracipterum MONTR., Ann. Scienc. phys. Sér. 2. VII. 1. p. 99. (1845).

Oncomeris socius STÅL, Freg. Eug. resa. Ins. p. 232. 30. (1859).

Patria: Insula Woodlark. (Mus. Holm.)

3. *O. Bernsteinii* VOLL.

Oncomerus Bernsteinii VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 30. 2. pl. 4. fig. 1. (1868).

Patria: Insulae Halmheira et Morotai. (Mus. Holm.)

PLISTHENES STÅL.

Merocoris BURM. in SILB., Rev. ent. II. p. 19. (1834).

Plisthenes STÅL, Hem. afr. I. p. 224. (1864).

1. *P. Merianae* FABR.

Cimex Meriani FABR., Syst. ent. p. 707. 53. (1775); GOEZE, Ent. Beytr. II. p. 240. 21. (1778).

Cimex Merianae FABR., Spec. ins. II. p. 350. 75. (1781); Mant. ins. II. p. 287. 90. (1787); GMEL., Syst. nat. I. 4. p. 2138. 201. (1788).

Lygus Merianae FABR., Ent. Syst. IV. p. 134. 3. (1794).

Edessa Merianae FABR., Syst. Rhyng. p. 149. 15. (1803).

Oncomerus Merianae BURM., Handb. II. 1. p. 353. 1. (1835); H. S., Wanz. Ins. IV. p. 81. fig. 411. (1839); VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 31. 3. (1868).

Oncomeris Merianae BLANCH., Hist. des ins. p. 142. 1. (1840).

Tessarotoma dilatatum MONTR., Ann. scienc. phys. Sér. 2. VII. 1. p. 100. (1855).

Oncomerus dilatatus VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 32. 4. (1868).

STOLL, Pnn. fig. 141.

Patria: Insulae Morotai, Mysol et Woodlark; Australia, Cap York. (Mus. Holm.)

Exemplum australicum antennarum articulis duobus ultimis luteis, basi articuli tertii nigra, gaudet.

PIEZOSTERNUM A. et S.

A. et S., Hist. des Hém. p. 161. (1813); STÅL, Hem. afr. I. p. 224 et 227. (1864).

Salica WALK., Cat. Hem. Het. III. p. 469. (1868).

a. *Marginibus lateralibus anticis thoracis nigris; scutello apice minus acuto; connexivo maculis nigris destituto.*

1. *P. calidum* FABR.

Cimex papillosus FABR., Ent. syst. IV. p. 106. 103. (1794). excl. syn.

Cimex calidus FABR., Mant. ins. II. p. 292. 128. (1787); Ent. syst. IV. p. 110. 117. (1794); Syst. Rhyng. p. 168. 67. (1803); GMEL., Syst. nat. I. 4. p. 2153. 314. (1788).

Pentatoma tenebraria P. B., Ins. p. 46. Hém. pl. 6. fig. 3 et 4. (1805); A. et S., Hist. des Hém. p. 162. (1843).

Edessa vicina WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 29. (1837).

Piezosternum mucronatum DALL., List of Hem. I. p. 338. 1. (1851). excl. syn. PAL. BEAUV. et AM. et SERV.

Piezosternum calidum STÅL, Hem. afr. I. p. 228. 1. (1864); Hem. Fabr. I. p. 40. 1. (1868).

Patria: Guinea, Calabar. (Mus. Holm.); Sierra Leona, Congo.

aa. *Marginibus lateralibus anticis thoracis concoloribus; scutello apice acutissimo, producto; connexivo nigro-picto.*

✓ 2. *P. subulatum* THUNB.

Cimex subulatus THUNB., Nov. ins. spec. II. p. 41. tab. 2. fig. 55. (1783); GMEL., Syst. nat. I. 4. p. 2146. 266. (1788).

Cimex vacca FABR., Ent. syst. IV. p. 92. 51. (1794); COQ., Ill. ins. II. p. 81. tab. 19. fig. 2. (1801).

Cimex gazella FABR., Ent. syst. IV. p. 92. 52. (1794).

Edessa gazella FABR., Syst. Rhyng. p. 147. 5. (1803).

Edessa vacca FABR., Syst. Rhyng. p. 147. 6. (1803).

Pentatoma mucronata P. B., Ins. p. 46. Hém. pl. 6. fig. 5 et 6. (1805); ST. FARG. et SERV., Enc. méth. X. p. 55. 12. (1825).

Piezosternum mucronatum A. et S., Hist. des Hém. p. 162. 1. (1843).

Piezosternum subulatum DALL., List of Hem. I. p. 338. 2. (1851); STÅL, Hem. Fabr. I. p. 40. 2. (1868).

Patria: Insulae Indiae occidentalis; Cuba; Mexico, Vera Cruz. (Mus. Holm.)

3. *P. excellens* WALK.

Salica excellens WALK., Cat. Hem. Het. III. p. 469. 1. (1868).

STOLL, Pub. fig. 117.

Patria: Brasilia borealis; Nova Granada. (Mus. Holm.)

Angulis lateralibus thoracis acutis et magis prominulis a precedente divergit; vix specificè distinctum.

✓ 4. *P. Thunbergi* STÅL.

Piezosternum Thunbergi STÅL, Rio Jan. Hem. I. p. 28. 1. (1860).

Patria: Brasilia, Rio Janeiro. (Mus. Holm.)

✓ PANTOCHLORA STÅL. — *Edessinae*

Corpus obovatum. Caput maxime nutans, parvum, triangulare, apice rotundatum, marginibus lateralibus pone medium leviter sinuatis, obtusiusculis, jugis tylo longioribus et ante hume contiguis; bucculis maxime elevatis. Ocelli inter se quam ab oculis plus duplo longius remoti. Rostrum vix pone medium mesosterni extensum. Antennae graciles, corpore dimidio breviores, articulo primo apicem capituli subsuperante, articulo secundo primo dimidio longiore, tertio secundo fere plus dimidio longiore, quarto et quinto aequae longis, secundo et tertio simul sumptis longitudine subaequalibus. Thorax transversim leviter convexus, ante medium valde declivis, posterius haud productus, marginibus lateralibus anticis obtusis, subcallosis, margine postico late

sinuato, marginibus lateralibus posticis prope angulos posticos productos leviter sinuatis. Scutellum ad partem tertiam apicalem dorsi abdominis extensum, per partes duas tertias posticas obtusissime subcarinatum, lateribus ante medium levissime sinuatis, frenis paullo ante medium scutelli abbreviatis, parte pone frena jacente lata, primum sensim leviter, dein apice magis angustata, in angulum subacutum terminata. Corium margine apicali rotundato. Prosternum longitrossum excavatum. Metasternum elevatum, postice sinuatum, antrorsum longissime productum, parte producta fere ultra apicem prosterni extensa, sensim compressa et apicem versus altiore, antice rotundata, in mesosterno et prosterno quiescente. Ostia odorifera extus in sulcum longum, sensim angustatum, extensa. Abdomen angulis apicalibus segmentorum acutis, prominulis; ventre medio obtuse carinato, carina basi processum brevem, in sinu metasterni receptum, formante. Pedes mediocres, inermes, graciliusculi; tibiis cylindricis, sulco destitutis.

Piezosterno affine genus, articulo primo antennarum breviori, thorace postice haud producto, scutello posteriori lato, margine apicali corii rotundato, tibiis cylindricis, sulco destitutis, processuque metasterni multo longiore distinctissimum.

✓ 1. *P. vivida* STÅL.

Dilute subolivaceo-virescens, nitida, thorace, scutello hemelytrisque punctulatis; capite, apice limboque laterali thoracis lavibus, scutello anterieus remotius punctato; membrana alisque vitreis; disco ventris in sanguineum vergente; apice imo angulorum apicalium segmentorum abdominis et valvularum genitalium feminae nigris. ♀. Long. 17, Lat. 9 mill.

Patria: Campêche. (Mus. Holm.)

Thorax ad marginem apicalem impressione transversa abbreviata et prope margines laterales anticos impressione lineari instructus, his marginibus extra illam impressionem subcallosis, angulis lateralibus subcaetis, nonnulli prominulis, apice imo leviter rotundatis. Prostethium pone medium punctulatum; mesostethium et metastethium macula communi magna opaca instructa, ante et pone hanc maculam remote punctulata. Dorsum abdominis dense punctulatum. Venter levis.

Div. Tessaratomina STÅL.

MUCANUM A. et S.

A. et S., Hist. des Hém. p. 163. (1843); STÅL, Hem. afr. I. p. 224. (1864).

1. *M. canaliculatum* ST. FARG. et SERV.

Tessaratomia canaliculata ST. FARG. et SERV., Enc. méth. X. p. 590. 1. (1825).

Mucanum canaliculatum A. et S., Hist. des Hém. p. 164. 1. (1843); DALL., List of Hem. I. p. 338. 1. (1851); VOLL., Faun. ind. néerl. III. p. 21. 1. (1868).

Patria: Java.

2. *M. patibulum* VOLL.

Mucanum patibulum VOLL., Faun. ind. néerl. III. p. 22. 2. pl. 3. fig. 1. (1868).

Patria: Java. (Mus. Holm.); Sumatra.

3. *M. maculigerum* STAL.

Micramum maculigerum STAL., Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1858. p. 438. 1; Trans. ent. soc. Ser. 3. I. p. 594. (1863); VOLL., Faun. ind. néerl. III. p. 22. 3. (1868).

Patria: Java, Manilla. (Mus. Holm.)

Quoad picturam pectoris, ventris et pedum hæc species ad *M. patibulum* appropinquat.

✓EMBOLOSTERNA STAL.

Corpus magnum, obovatum. Caput perpendiculare, parvum, triangulare, apice angustum, subacutum, marginibus lateralibus subrectis, jugis tylo brevi multo longioribus et ante hunc contiguis; bucculis valde elevatis. Oculi magni, transversi. Ocelli ad oculos valde appropinquati. Antennæ breves, graciliusculæ, articulo primo apicem capitis æquante, articulo secundo tertio paullo longiore et quarto nonnihil brevioribus. Thorax ante medium valde declivis, posterius amplius et retrorsum productus, angulis lateralibus in cornu depressum extrorsum productis, marginibus lateralibus anticis rectis, anteriora versus obtusis, nec explanatis, marginibus lateralibus posticis sinuatis. Scutellum subæquilaterum, parte apicali pone frena sita lata, subæquilatera, leviter concava. Corium margine apicali recto, versus angulum apicalem anteriorem rotundato. Alæ hamo instructæ. Prosternum sulcatum, marginibus sulci nonnihil ampliatis. Mesosternum carina altiuscula, inter coxas anticæ prominula, instructum. Metasternum elevatum, antice in processum, sensim compresso-angustatum, antrorsum sensim altitudine crescentem, apice rotundato-truncatum, inter coxas anticæ abbreviatum, productum, basi obtusissime sinuatum. Anguli apicales segmentorum abdominis acuti, prominuli. Pedes breves, validiusculi, femoribus apice subtus bispinosi; tibiis superne sulcatis.

Tessaratomæ affine genus, capite acutiore, perpendiculari, oculis majoribus, ocellis ad oculos magis appropinquatis, thoracis angulis lateralibus cornutis, marginibus lateralibus anticis haud explanatis, parteque apicali scutelli latiore differt.

1. *E. taurus* WESTW.

Tessaratomæ taurus WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 27. (1837).

Tessaratomæ? cornuta DALL., List of Hem. I. p. 342. 5. (1851).

Patria: Malacca, Ligor. (Mus. Holm.)

TESSARATOMA ST. FARG. et SERV.

Tessaratomæ ST. FARG. et SERV., Enc. méth. X. p. 590. (1825); STAL., Hem. afr. I. p. 224 et 229. (1864).

Tessaratomæ LATR., Règn. an. V. p. 195. (1829); BURM., Handb. II. I. p. 350. (1835).

a. *Femoribus apice subtus bispinosis.*

b. *Segmento anali maris apice truncato, angulis apicalibus rotundatis.*

1. *T. longicornis* DOHRN.

Tessaratomæ longicornis DOHRN., Ent. Zeit. XXIV. p. 349. 5. (1863).

Patria: Insula Philippinæ. (Mus. Holm.)

In exemplo Musei Holmiensis alæ sunt maximam ad partem subviolaceo-fuscæ, tantum basin versus fulvescentes. Anguli antici thoracis obtusi, nec in dentem prominuli.

2. *T. nigripes* DALL.

Tessaratomæ nigripes DALL., List of Hem. I. p. 341. 3. (1851).

Patria ignota.

3. *T. malaya* STAL.

Ochracea; antennis, margine imo capitis, rostro, parte saltem dimidia apicali partis scutelli pone frena sita, pectoris maculis ad coxas maculaque magna transversa laterali, nec non pedibus nigris vel fusco-piceis; dorso abdominis subsanguineo; alis fulvescentibus. ♀. Long. 35. Lat. 19 mill.

Patria: Malacca, Ligor. (Mus. Holm.)

Quoad staturam et magnitudinem hæc species *T. javanicæ* multo superat, differt præsertim processu metasterni antrorsum sensim altiore, antice libere prominulo, nec in sternum quiescente, parte thoracis laterali explanata valde et sensim rotundata, tota subreflexa. Valvæ anales femine uti in *T. javanicæ*. Mas mihi ignotus.

✓4. *T. javanica* THUNB.

Cimex javanicus THUNB., Nov. ins. spec. II. p. 45. (1783); GMEL., Syst. nat. I. 4. p. 2158. 332. (1788).

Tessaratomæ proxima WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 27. (1837).

Tessaratomæ javana BURM., Handb. II. I. p. 350. 1. (1835).

Tessaratomæ papillosa BLANCH., Hist. des ins. p. 142. I. Hem. pl. 6. fig. 2. (1840).

Tessaratomæ javanica A. et S., Hist. des Hém. p. 16. 1. (1843); VOLL., Faun. ind. néerl. III. p. 25. 1. (1868).

Tessaratomæ angularis DOHRN., Ent. Zeit. XXIV. p. 349. 6. (1863).

STOLL, Pun. fig. 2 et (larva) fig. 271.

Patria: Java, Malacca. (Mus. Holm.); Borneo, Sumatra, Timor.

5. *T. conspersa* STAL.

Tessaratomæ conspersa STAL., Trans. ent. soc. Sér. 3. I. p. 595. 1. (1863).

Patria: Celebes. (Mus. Holm.)

An varietas *T. javanicæ* punctura fortiore thoracis et scutelli nec non parte laterali ampliata thoracis fortiuscule subrugoso-punctata divergit.

bb. *Segmento anali maris apice sinuato, angulis apicalibus acutis.*

6. *T. papillosa* DRURY.

Cimex papillosus DRURY, Ill. nat. hist. I. p. 96. tab. 43. fig. 2. (1770); WOLFF, Ic. Cim. I. p. 12. fig. 12. (1800).

Cimex chinensis THUNB., Nov. ins. spec. II. p. 45. tab. 2. fig. 59. (1783).

Cimex sinensis GMEL., Syst. nat. I. 4. p. 2158. 333. (1788).

Tessaratomæ Somervati ST. FARG. et SERV., Enc. méth. X. p. 590. 2. (1825).

Tessaratomæ papillosa HAHN, Wanz. Ins. II. p. 123. fig. 204. (1834).

Tesseratoma Somnerati GUÉR., Icon. Ins. pl. 55. fig. 4. (1838).

Tesseratoma Somnerati BLANCH., Hist. des ins. p. 142. 2. (1840).

Tesseratoma papillosa A. et S., Hist. des Hémi. p. 16. 2. (1843).

Tesseratoma chinensis DALL., List of Hem. I. p. 340. 1. (1851).

Larva.

Tesseratoma ossa cruenta GRAY in GRIFF., An. kingd. XV. p. 239. pl. 93. fig. 1. (1832).

Patria: China. (Mus. Holm.)

Valvulae anales laterales femine apice distinctius et quam in *T. javanica* minus oblique sinuatae, angulo apicali interiore acuto, dentiformi.

aa. *Femoribus inermibus.*

✓ 7. *T. Afzelii* STÅL.

Ectessa papillosa FABR., Syst. Rhyng. p. 150. 19. (1803). excl. syn.

Tesseratoma papillosa BURM., Handb. II. 1. p. 350. 2. (1835).

Tesseratoma Afzelii STÅL., Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1854. p. 233; et l. c. 1856. p. 63.

Tesseratoma Afzelii STÅL., Hem. afr. I. p. 229. 1. (1864).

Patria: Sierra Leona. (Mus. Holm.)

SIPHNUS STÅL.

Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 597. (1863); Hem. afr. I. p. 225. (1864).

✓ 1. *S. Alcides* STÅL.

Siphnus Alcides STÅL., Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 597. 1. (1863).

Patria: Cambodja. (Mus. Holm.)

✓ 2. *S. Hector* STÅL.

Siphnus Hector STÅL., Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 597. 2. (1863).

Patria: Malacca, Ligor. (Mus. Holm.)

Dorsum abdominis in specibus antibus obscure testaceum, disco maximo interminato subviolaceo-rufeo

HYPENCHA A. et S.

A. et S., Hist. des Hémi. p. 166. (1843); STÅL., Hem. afr. I. p. 225. (1864).

a. *Femoribus posterioribus apice subtus bispinosi, spina exteriori femorum intermedium minque.*

✓ 1. *H. apicalis* ST. FARG. et SERV.

Tessarotoma apicalis ST. FARG. et SERV., Enc. méth. X. p. 591. 3. (1825).

Tessarotoma apicalis BURM., Handb. II. 1. p. 351. 3. (1835); VOLL., Faun. ind. néerl. III. p. 26. 2. (1868).

Hypencha apicalis A. et S., Hist. des Hémi. p. 166. 1. (1843).

Tessarotoma picea DALL., List of Hem. I. p. 341. 4. (1851).

Hypencha Reriki ELLENR., Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. XXIV. p. 160. fig. 30. (1862).

Patria: Java, Sumatra, Borneo.

2. *H. luctuosa* STÅL.

Hypencha luctuosa STÅL., Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 596. 1. (1863).

Patria: Birma.

aa. *Femoribus anticis inermibus, intermediis apice intus spinula, posticis spinis duabus armatis.*

3. *H. ophthalmica* STÅL.

Hypencha ophthalmica STÅL., Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 596. 2. (1863).

Patria: Malacca, Ligor. (Mus. Holm.)

PYGOPLATYS DALL.

DALL., List of Hem. I. p. 338. (1851); STÅL., Hem. afr. I. p. 225. (1864).

1. *P. validus* DALL.

Pygoplatys validus DALL., List of Hem. I. p. 339. 1. pl. 11. fig. 1. (1851).

Patria ignota.

2. *P. acutus* DALL.

Pygoplatys acutus DALL., List of Hem. I. p. 340. 2. (1851).

Pygoplatys roseus VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 24. not. (1868).

Patria: Malacca. (Mus. Holm.)

3. *P. zonatus* STÅL.

Pygoplatys zonatus STÅL., Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 595. 1. (1863).

Patria: Borneo.

4. *P. minax* VOLL.

Pygoplatys minax VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 23. 2. pl. 3. fig. 3. (1868).

Patria: Borneo.

✓ 5. *P. Ralandii* ELLENR.

Mucanum Ralandii ELLENR., Natuurk. Tijdschr. Nederl. Ind. XXIV. p. 159. pl. 5. fig. 29. (1862).

Pygoplatys Ralandii VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 24. 3. (1868).

Patria: Sumatra.

6. *P. subrugosus* VOLL.

Pygoplatys subrugosus VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 23. pl. 3. fig. 2. (1868).

Patria: Ambon, Buru.

C. STAL,

7. *P. Thoreyi* DOHRN.

Pygopletys? Thoreyi DOHRN, Ent. Zeit. XXIV. p. 350. 7. (1863).
Patria: Insula Philippina. (Mus. Holm.)

AMISSUS STAL.

Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 595. (1863).

1. *A. Atlas* STAL.

Amissus Atlas STAL, Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 596. 1. (1863).
Patria: Singapor.

Div. *Eusthenina* STAL.

Conspicuum generum.

- 1(4). Femoribus posticis marium valde incrassatis, subtus basin versus spina valida armatis; articulo quarto antennarum articulo secundo longiore.
- 2(3). Metasterno valde elevato, antice posticeque nonnihil producto. — *Eusthenes* LAP.
- 3(2). Metasterno haud elevato. — *Eurostus* DALL.
- 4(1). Femoribus posticis marium nec nisi leviter incrassatis, nec basin versus subtus spina armatis.
- 5(10). Metasterno elevato, tumido.
- 6(7). Segmento secundo ventris medio elevato et basin metasterni tangente; ruga longitudinali mesosterni anteriori depresso et sulcato, posteriori latiore et elevato; angulis apicalibus segmenti sexti abdominis apud mares obtusiusculis vel subrotundatis, apud feminas acutis. — *Mattiphus* A. et S.
- 7(6). Segmento secundo ventris basin metasterni haud tangente.
- 8(9). Segmento primo ventris medio valde elevato, tuberculato et basin metasterni tangente; jugis apice extus rotundatis; angulis apicalibus segmenti sexti abdominis apud marem (femina mihi ignota) acutis. — *Asiarcha* STAL.
- 9(8). Segmentis basalibus ventris medio haud elevatis, segmento primo medio segmento secundo multo humiliore; jugis hiscentibus, sensim acuminatis; metasterno antice posticeque sensim compresso-angustato, disco impresso; ruga mesosterni percurrente, haud sulcata, posteriori vix altiore; angulis apicalibus segmenti sexti ventris apud feminam obtusis, haud rotundatis, nec prominulis. — *Eurypleura* A. et S.
- 10(5). Metasterno haud elevato, interdum leviter convexo; ruga mesosterni sulco percurrente instructa.
- 11(16). Capite angustiusculo vel minus lato, marginibus lateralibus rectis vel levissime sinuatis.
- 12(13). Tibiis posticis curvatis, femoribus brevioribus; femoribus posticis leviter incrassatis. — *Carpona* DOHRN.
- 13(12). Tibiis posticis rectis; femoribus posticis haud incrassatis.

- 14(15). Abdomine retrorsum sensim angustato, angulis apicalibus segmenti sexti subrectis vel acutiusculis. — *Pycanum* A. et S.
- 15(14). Abdomine retrorsum sensim ampliato, angulis apicalibus segmenti sexti acutissimis, retrorsum et extrorsum longissime productis. — *Oxylobus* STAL.
- 16(11). Capite lato, parte anteoculari transversa, marginibus lateralibus profunde sinuatis; tibiis posticis femoribus cum coxis longitudine subaequalibus.
- 17(18). Abdomine longe pone medium latissimo, ibidem utrumque angulum formante, segmento quarto omnium latissimo. — *Dalcanthia* A. et S.
- 18(17). Abdomine medio latissimo, lateribus rotundatis. — *Candace* STAL.

EUSTHENES LAP.

LAP., Ess. p. 64. (1832); A. et S., Hist. des Hémi. p. 167. (1843); STAL, Hem. afr. I. p. 225. (1864).

a. *Antennarum articulo quarto toto nigro; femoribus anticis subtus prope apicem incrimibus vel utrinque spinula parva armatis; femoribus intermediis subtus prope apicem utrimque spina distincta mediani armatis; ruga mesosterni postice magis elevata; metasterno anteriori angustato, haud tamen compresso, basin ruga mesosterni tangente; segmento secundo ventris medio valde elevato, basin metasterni tangente.*

b. *Pedibus nigro-piceis vel nigris, tarsis castaneis; apice scutelli concolore vel in obscure castaneum vergente; alis fusciscentibus, saepe leviter violaceo-tinctis.*

1. *E. cupreus* WESTW.

Tessarotoma cuprea WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 27. (1837).

Eusthenes cupreus DALL., List of Hem. I. p. 342. 1. (1851).

Patria: India orientalis. (Mus. Holm.); Nepalia.

Tibiae posticae rectae.

2. *E. robustus* ST. FARG. et SERV.

Tessarotoma robusta ST. FARG. et SERV., Enc. méth. X. p. 591. 4. (1825).

Oncomeris robustus BLANCH., Hist. des ins. p. 142. 3. (1840).

Eusthenes robustus A. et S., Hist. des Hémi. p. 167. 1. (1843); DALL., List of Hem. I. 342. 2. (1851); VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 27. 1. (1868).

Eusthenes Elephas DOHRN, Ent. Zeit. XXIV. p. 351. 8. (1863).

Patria: India orientalis. (Mus. Holm.); Java.

3. *E. scutellaris* H. S.

Tessarotoma scutellaris H. S., Wanz. Ins. IV. p. 81. fig. 410. (1839).

Eusthenes scutellaris VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 28. 2. pl. 3. fig. 6. (1868).

Eusthenes minor VOLL., Faun. ent. ind. néerl. III. p. 29. 3. (1868).

Patria: India orientalis. (Mus. Holm.); Java, Sumatra.

A precedente vix differt.

bb. Apice scutelli, pedibus et magna parte articuli primi antennarum castaneis; femoribus posticis interdum fusco-castaneis; alis sordide flavo-testaceis vel fulvescentibus.

4. *E. Polyphemus* STÅL.

Eusthenes Polyphemus STÅL, Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 598. 2. (1863).

Patria: India orientalis. (Mus. Holm.)

Apud feminam metasternum est postice multo latius quam apud marem. Tibiæ posticæ maris levissime curvatae.

aa. Antennarum articulo quarto basi flavo-testaceo; alis dorsoque abdominis nigro-violaceis; femoribus anticis subtus prope apicem in latere anteriore spina validiuscula armatis, in latere posteriore inermibus vel spinula minutissima praeditis; femoribus internodiis prope apicem utriusque spinæ sat magna armatis; metasterno antice posticeque sensim compresso-angustato; segmento secundo ventris medio haud elevato, segmento primo haud altiore; angulis apicalibus segmentorum abdominis multo minus prominulis quam in divisione a.

5. *E. sævus* STÅL.

Eusthenes sævus STÅL, Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 597. 1. (1863).

Patria: India orientalis. (Mus. Holm.); China.

EUROSTUS DALL.

DALL., List of Hem. I. p. 342. (1851); STÅL, Hem. afr. I. p. 225. (1864).

1. *E. validus* DALL.

Eurostus validus DALL., List of Hem. I. p. 343. 1. pl. 11. fig. 2. (1851).

Patria: China.

2. *E. grossipes* DALL.

Eurostus grossipes DALL., List of Hem. I. p. 343. 2. (1851).

Patria: India orientalis. (Mus. Holm.); Assam.

MATTIPHUS A. et S.

A. et S., Hist. des Hém. p. 168. (1843); STÅL, Hem. afr. I. p. 225. (1864).

1. *M. laticollis* WESTW.

Eusthenes laticollis WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 27. (1837).

Mattiphus Carrenoi A. et S., Hist. des Hém. p. 168. 1. (1843).

Mattiphus laticollis DALL., List of Hem. I. p. 344. 2. (1851).

Patria: Malacca. (Mus. Holm.)

2. *M. aurifer* STÅL.

Supra viridi-aeneus, subferrugineo-pellucens, subtus cum dorso abdominis, rostro pedibusque flavo-testaceus, pectore ventrique praesertim latera versus aureo-nitidis;

antennis parteque dimidia postica segmentorum connexivi nigris, illarum articulo primo ultra medium, apice articuli tertii et basi quarti flavo-testaceis; membrana alisque fulvescentibus, c. ♀. Long. 30, Lat. 15 mill.

Patria: Insulae Philippinae. (Mus. Holm.)

Statura fera *Pycni cubensis*, sed latior. Ovatus. Caput sensim subrotundato-angustatum, fortiter strigatum, jugis apice imo biscentibus, apice rotundatis. Antennae articulo quarto tertio vix longiore. Thorax remote, latera versus paullo densius punctulatus, transversim subrugosus, anterius viridi-aeneus, marginibus lateralibus anticis sensim leviter rotundatis, late subdepressis, ante medium subflexis, angulis lateralibus rotundatis, vix prominulis. Scutellum transversim subrugosum, impunctatum, apice testaceum, lateribus viridi-aureis. Helytra dense punctulata. Segmenta connexivi pone medium remote punctulata. Subtus nitidior, pectore irregulariter subrugoso; ventre disco strigoso, lateribus subtiliter punctulatis.

3. *M. oblongus* DALL.

Mattiphus oblongus DALL., List of Hem. I. p. 344. 1. (1851).

Patria: India orientalis borealis.

4. *M. reflexus* DALL.

Mattiphus reflexus DALL., List of Hem. I. p. 344. 3. (1851).

Patria: Insulae Philippinae.

5. *M. æruginosus* STÅL.

Mattiphus æruginosus STÅL, Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 600. 2. (1863).

Patria: Ceylon.

ASIARCHIA STÅL.

Corpus ovale. Caput breviusculum, inter oculos aequè longum ac latum, jugis contiguis, apice rotundatis, marginibus lateralibus rectis. Ocelli ab oculis quam inter se vix duplo longius remoti. Rostrum coxas intermedias attingens. Antennae articulo secundo tertio longiore, quarto 2. Thorax lateribus dilatatis. Abdomen retrorsum sensim leviter angustatum, angulis apicalibus segmentorum acutis, paullo prominulis, angulis segmenti sexti retrorsum admodum prominulis, apud marem acutis. Prosternum sulcatum. Mesosternum riga longitudinali sulcata instructum. Metasternum elevatum, antice posticeque angustatum, basi mesosterni altius. Segmentum primum ventris medio in tuberculum elevatum, basin metasterni tangens. Pedes mediocres, femoribus subtus biseriatis minutissime denticulatis, posticis prope apicem infus spina majuscula armatis. Tibiæ posticæ subrectae, femoribus longitudine aequales.

Mattipho affine genus, capite breviorè, obtusiorè, structura sternorum, angulis segmenti ultimi abdominis apud marem acutis, productis, segmentoque primo ventris medio elevato divergens.

1. *A. nigradorsis* STÅL.

Mattiphus nigradorsis STÅL, Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 600. 1. (1863).

Patria: India orientalis. (Mus. Holm.); Punjab.

EURYPLEURA A. et S.

Hist. des Hém. p. 169. 130. (1843).

1. *E. bicornis* ST. FARG. et SERV.*Tessaratoma bicornis* ST. FARG. et SERV., Enc. méth. X. p. 592. 7. (1825).*Eurypleura bicornis* A. et S., Hist. des Hém. p. 170. 1. (1843); DALL., List. of Hem. I. p. 345. 1. (1851); VOLL., Faun. ind. néerl. III. p. 34. 1. (1868).

Patria: Java.

CARPONA DOHRN.

Carpona DOHRN, Ent. Zeit. XXIV. p. 351. (1863).*Virbius* STAL, Hem. afr. I. p. 225. (1864).a. *Femoribus anticis subtus prope apicem in latere posteriore spinula parva armatis.*1. *C. imperialis* DOHRN.*Pycnanum? imperiale* DOHRN, Ent. Zeit. XXIV. p. 352. 10. (1863).

Patria: Insulae Philippinae. (Mus. Holm.)

a. *Femoribus anticis subtus utrinque prope apicem spina majuscula armatis.*2. *C. angulata* STAL.*Pycnanum angulatum* STAL, Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 601. 2. (1863).*Pycnanum smaragdiferum* WALK., Cat. Hem. Het. III. p. 472. 13. (1868).

Patria: Siam. (Mus. Holm.)

3. *C. funesta* DOHRN.*Carpona funesta* DOHRN, Ent. Zeit. XXIV. p. 351. 9. (1863).

Patria: Cambodja.

C. angulata similissima et vix specificè diversa, distinguitur thorace magis opaco, parte dilatata subtilius et densius rugulosa, pectore multo subtilius et densius ruguloso, ventre densius et subtilius punctulato, thoracis angulis apicalibus, qui ad oculos in dentem sunt prominuli, apice ochraceis, margine antico dilatate thoracis recto, ad angulos anticos tantum, nec totis sensim sinuatis, jugis apicem versus minus angustatis, ibidem extus magis rotundatis.4. *C. amplicollis* STAL.*Pycnanum amplicolle* STAL, Trans. ent. Soc. Sér. 3. I. p. 600. 1. (1863).

Patria: India orientalis borealis.

5. *C. Amyoti* VOLL.*Pycnanum Amyoti* VOLL., Tijdschr. voor Entom. Ser. 2. I. p. 219. pl. 11. fig. 7. (1866); Faun. ind. néerl. III. p. 34. 3. pl. 3. fig. 8. (1868).

Patria: India orientalis?; Sumatra?

A precedente vix diversa. Anguli partis lateralis dilatata thoracis multo magis antorsum producti quam in *C. angulata*, secundum figuras duas VOLLEHOVENII inter se sat dissimiles.

PYCANUM A. et S.

A. et S., Hist. des Hém. p. 171. (1843); STAL, Hem. afr. I. p. 225. (1864).

1. *P. rubens* FABR.*Cimex rubens* FABR., Ent. syst. IV. p. 107. 104. (1794).*Cimex amethystinus* WEBER, Obs. ent. p. 115. 1. (1801).*Edessa amethystina* FABR., Syst. Rhyng. p. 150. 20. (1803).*Edessa rubens* FABR., Syst. Rhyng. p. 151. 22. (1803).*Tessaratoma alternata* ST. FARG. et SERV., Enc. méth. X. p. 591. 5. (1825).*Aspongopus amethystinus* BURM., Handb. II. 1. p. 351. 2. (1835); H. S., Wanz. Ins. IV. p. 86. fig. 417. (1839); BLANCH., Hist. des ins. p. 143. 1. (1840).*Pycnanum amethystinum* A. et S., Hist. des Hém. p. 172. 1. (1843); DALL., List. of Hem. I. p. 345. 1. (1851).*Dinidor amethystinus* H. S., Wanz. Ins. VII. p. 76. (1844).*Pycnanum rubens* VOLL., Faun. ind. néerl. III. p. 32. 1. (1868); STAL, Hem. Fabr. I. p. 40. 1. (1868).

STOLL, Pm. fig. 25 et 29.

Patria: Java. (Mus. Holm.); Sumatra, Banca.

2. *P. pretiosum* STAL.*Pycnanum pretiosum* STAL, Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1854. p. 234. 2; et l. c. 1856. p. 64. 2. pl. 1. a. fig. 2.

Patria: Pulo Penang. (Mus. Holm.)

3. *P. ponderosum* STAL.*Pycnanum ponderosum* STAL, Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1854. p. 234. 1; et l. c. 1856. p. 63. 1. pl. 1. a. fig. 1.*Dalcantha Sancti Fargavii* VOLL., Tijdschr. voor Ent. Ser. 2. I. p. 218. 2. pl. 11. fig. 6. (1866).

Patria: Assam. (Mus. Holm.)

4. *P. jaspideum* H. S.*Pycnanum jaspideum* H. S., Wanz. Ins. IX. p. 308. fig. 1009. (1853).

Patria: Assam.

Colore pedum et pictura antennarum hæc species magis ad *Mattiphum* quam ad *Pycnanum* appropinquat. sed femoribus, secundum figuram SCHIFFERTI, spinosis gaudet.5. *OXYLOBUS* STAL.

Corpus ovatum. Caput parvum, ante oculos sensim subsinuato-angustatum, jugis contiguis, apice rotundatis. Ocelli ab oculis quam inter se duplo longius remoti. Rostrum

medii mesosterni attingens. Antennae quadriarticulatae, articulo quarto secundo longiore. Thorax lateribus dilatatis. Prosternum longitrossum sulcatum. Mesosternum ruga percurrente depressa, per totam longitudinem sulcata, instructum. Metasternum haud elevatum. Abdomen retrorsum sensim ampliatum, angulis segmentorum acutis, levissime prominulis, segmento sexto latissimo, angulis apicalibus acutis, longe productis; segmentis basalibus ventris medio haud elevatis. Pedes mediocres, tibiis rectis, posticis femoribus longitudine subaequalibus.

Pycnon affine genus, forma singulari abdominis diversum.

✓ 1. *O. nigro-marginatus* STAL.

Pycnon nigro-marginatum STAL, Trans. ent. Soc. Ser. 3. I. p. 601. 3. (1863).

Dalcantara Serrillei VOLL., Tijdschr. voor Ent. Ser. 2. I. p. 220. 5. pl. 11. fig. 9. (1866).

Patria: Malacca. (Mus. Pohn.)

Femora intermedia et postica subtus prope apicem in latere posteriore spina distincta armata.

* * *

✓ 2. *O. Westwoodii* VOLL.

Dalcantara Westwoodii VOLL., Tijdschr. voor Ent. Ser. 2. I. p. 217. 1. pl. 11. fig. 5. (1866); Faun. ind. néerl. III. p. 33. pl. 3. fig. 7. (1868).

Patria: Sumatra.

DALCANTHIA A. et S.

A. et S., Hist. des Hém. p. 170. (1843); STAL, Hem. Fabr. I. p. 225. (1864).

1. *D. dilatata* A. et S.

Dalcantara dilatata A. et S., Hist. des Hém. p. 171. 1. (1843); DALL., List of Hem. I. p. 345. (1853).

Patria: India orientalis, Silhet.

✓ 2. *D. Stalii* VOLL.

Dalcantara Stalii VOLL., Tijdschr. voor Ent. Ser. 2. I. p. 220. 4. pl. 11. fig. 8. (1866).

Dalcantara regia WALK., Cat. Hem. Het. III. p. 474. 3. (1868).

Patria: Silhet. (Mus. Holm.)

3. *D. incrimipes* STAL.

Dalcantara incrimipes STAL, Trans. ent. Soc. Ser. 3. I. p. 599. 1. (1863).

Patria: Punjab.

✓ CANDACE STAL.

Corpus ovatum. Caput subtransversum, breve, ante oculos substylatos subito profunde sinuatum, jugis anterioribus contiguis, apice obtusis. Ocelli inter se quam ab

oculis paullo longius remoti. Rostrum fere ad coxas intermedias extensum. Thorax dilatatus, marginibus lateralibus ad angulos apicales acute prominulos sinuatis. Margo costalis hemelytrorum prope basin distincte obtuse angulatus. Prosternum impressum. Mesosternum ruga lata, sulcata, instructum. Metasternum haud elevatum, anterius bisulcum. Abdomen ante medium latissimum, utrinque rotundatum, pone medium angustatum, segmentorum angulis apicalibus subrectis, sensim sublobato-prominulis; basi ventris medio leviter elevata. Pedes mediocres; tibiis posticis femoribus paullo longioribus.

Dalcantara proximum genus.

✓ 1. *C. platygastra* WESTW.

Pentatoma platygaster WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 43. (1837).

Dalcantara platygastra STAL, Hem. afr. I. 230. 1. (1864).

Patria: Guinea. (Mus. Holm.); Sierra Leona.

Div. *Prionogastrina* STAL.

PRIONOGASTER STAL.

Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1853. p. 224; Hem. afr. I. p. 225 et 231. (1864).

1. *P. serratus* GERM.

Amuvus serratus GERM. in SILB., Rev. ent. V. p. 158. 81. (1837); H. S., Wanz. Ins. VII. p. 75. fig. 7-18. (1844).

Prionogaster Westwoodi STAL, Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1853. p. 224. 1.

Prionogaster serratus STAL, Hem. afr. I. p. 231. 1. (1864).

Patria: Caffraria. (Mus. Holm.)

Div. *Cyclogastrina* STAL.

CYCLOGASTER WESTW.

WESTW., Trans. ent. Soc. II. p. 20. (1837); STAL, Hem. afr. I. p. 226 et 233. (1864).

Natalicola SPIN., Gen. d'ins. Artröid. p. 110. (1852).

Gonielytrum STAL, Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1853. p. 223.

1. *C. pallidus* WESTW.

Cyclogaster pallidus WESTW., Trans. ent. Soc. II. p. 20. pl. 2. fig. 6. (1837); DALL., List of Hem. I. p. 346. 1. (1851); STAL, Hem. afr. I. 233. 1. (1864).

Natalicola Degeyruvi SPIN., Gen. d'ins. artröid. p. 110. (1852).

Gonielytrum circumventre STAL, Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1853. p. 223. 1.

Patria: Caffraria. (Mus. Holm.); Gambia, Gabon.

HAPLOSTERNA STAL.

Aplosterna WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 26. (1837).

Encosternum SPIN., Gen. d'ins. artroid. p. 107. (1852).

Lanus STAL., Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1853. p. 222.

Haplosterna STAL., Hem. afr. I. p. 232. (1864).

1. *H. virescens* WESTW.

Aplosterna virescens WESTW. in HOPE, Cat. of Hem. I. p. 27. (1837); DALL., List of Hem. I. p. 338. 1. (1851).

Patria: Gambia.

2. *H. Delegorguei* SPIN.

Encosternum Delegorguei SPIN., Gen. d'ins. artroid. p. 109. (1852).

Lanus Dallasi STAL., Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1853. p. 222. 1.

Haplosterna Delegorguei STAL., Hem. afr. I. p. 232. 1. (1864).

Patria: Caffraria. (Mus. Holm.)

ENUMERATIO DINIDORINORUM.

Fam. Cimicina STAL.

✓ Subf. Dinidorina STAL.

✓ DINIDOR LATR. *)

Dinidor LATR., Règn. an. V. p. 195. (1829).

Dictyocoris MAYR, Verh. zool. bot. Ges. Wien. XIV. p. 913. (1864).

Cyclopelta STAL., Öfv. Vet.-Ak. Förh. 1867. p. 532.

✓ 1. *D. mactans* FABR.

Cimex mactans FABR., Ent. syst. Suppl. p. 534. 136—7. (1798).

Edessa mactans FABR., Syst. Rhyng. p. 153. 33. (1803).

Dinidor mactabilis PERTY, Del. an. p. 168. (*D. mutabilis*) tab. 33. fig. 12. (1830).

Aspongopus mactans BURM., Handb. II. 1. p. 351. 3. (1835); H. S., Wanz. Ins. III. p. 65. fig. 278. (1835); BLANCH., Hist. des ins. p. 143. 2. (1840).

Dinidor mactans H. S., Wanz. Ins. VII. p. 76. (1844).

Cyclopelta mactans DALL., List of Hem. I. p. 347. 5. (1851).

STOLL, Pun. fig. 194.

Patria: Brasilia borealis. (Mus. Holm.)

✓ 2. *C. rufo-cinctus* STAL.

D. mactanti similimus et maxime affinis, differt tantum jugis apice contiguis, apice haud reflexis, marginibus lateralibus anticis thoracis distinctius reflexis, hemiclytris nonnihil longioribus, apicem abdominis superantibus, thorace vitta rubra destituta, antice macula rubra parva tantum notata. ♀. Long. 20, Lat. 10 mill.

Patria: Bogota Novæ Granadæ. (Mus. Holm.)

✓ 3. *D. saucius* STAL.

Præcedentibus duabus affinis, minor; differt a *D. mactante* jugis apice contiguis, haud reflexis, antennis brevioribus, marginibus lateralibus anticis thoracis vix reflexis, parte apicali scutelli late rufo-limbato, acetabulis rufo-maculatis angulisque apicalibus segmentorum abdominis paullo magis et acutius prominulis; membrana in ochraceum vergente. ♂. Long. 15, Lat. 9 mill.

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Holm.)

*) Tibiæ posticæ feminarum *Cyclopelta* et *Dinidoris* simplices, vel apud *Cyclopeltam* subtus subdilatare.