


MANEJO DE LA ARTRITIS SÉPTICA

La artritis séptica (o artritis infecciosa) es una infección bacteriana dentro de la articulación. Usualmente la infección sólo afecta una articulación a la vez. Cualquier persona puede padecer una infección en la articulación, pero es más común en los niños menores de 3 años y en los adultos mayores de 80.



El tratamiento es un proceso de tres pasos. En el primero se usan antibióticos; los cuales son dados usualmente a través de la vena por 2 semanas y después en pastillas por otras 2 a 4 semanas adicionales.



Articulaciones que pueden verse afectadas



El segundo paso es drenar el fluido de la articulación afectada. En la mayoría de los casos, el doctor insertará una aguja en la articulación para sacar el fluido. Si la articulación es difícil de drenar de esta manera, es posible que se necesite una cirugía.



El último paso es la terapia física para recobrar el movimiento normal de la articulación. No continúe un programa de ejercicios que causa dolor. El dolor significa que el programa debe ser cambiado.

Las causas usuales son cambios en las articulaciones debidos a otro tipo de artritis, un sistema inmunológico débil, y una articulación artificial (reemplazo de la articulación). La articulación se hincha rápidamente y es muy dolorosa y difícil de doblar.



El doctor puede sospechar artritis séptica después de hacer un examen físico. El diagnóstico es confirmado por medio de la toma de una muestra de fluido de la articulación usando una aguja, y examinándolo en el laboratorio.



Llame al doctor si la hinchazón o el dolor empeoran o si presenta fiebre, escalofríos, o efectos secundarios a la medicina.

