

MANEJO DE LA NEURALGIA DEL TRIGÉMINO

La neuralgia del trigémino es un trastorno raro y doloroso del nervio trigémino, el nervio principal de la cara. El dolor puede comenzar después de la extracción de un diente, de la lesión del nervio facial, de la infección por el virus del herpes, o por la compresión del nervio por un vaso sanguíneo o un tumor. Ésta es más común en mujeres que en hombres.



Zona oftálmica


Zona maxilar

Puntos desencadenantes comunes

Zona mandibular



Nervio trigémino y sus ramas



Lo más importante es evitar lo que pueda desencadenar el dolor. Muchas personas aprenden cuáles son los puntos desencadenantes y la forma de evitar la estimulación de estas áreas. Además, se administran medicinas para el dolor. Puede realizarse una cirugía si un tumor o los vasos sanguíneos están comprimiendo el nervio o si otros tratamientos no ayudan.



Consuma alimentos que no necesiten mucha masticación. Reporte al doctor todas las medicinas que toma, y hable con el doctor si está en embarazo o planea quedar en embarazo.



El síntoma más común es dolor intenso, penetrante, y similar a un choque eléctrico en partes de la cara inervadas por el nervio y sus ramas.



El doctor hace el diagnóstico a partir de los síntomas, de la historia médica, y del examen físico. Una CT (mostrada en la figura) o MRI pueden ser necesarias para determinar si otra condición médica está causando el dolor.



No se de por vencido. Existen muchos tratamientos nuevos y grupos de apoyo.



Informe al doctor si presenta síntomas nuevos, como visión doble, debilidad facial, o cambios en la audición o el equilibrio.