

NINA Norsk institutt for naturforskning

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl Resultater fra hekkesesongen 2001

S-H. Lorentsen

NINA Oppdragsmelding 726



NINA • NIKU
STIFTELSEN FOR NATURFORSKNING
OG KULTURMINNEFORSKNING

NINA Norsk institutt for naturforskning

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl

Resultater fra hekkesesongen 2001

Svein-Håkon Lorentsen

NINA•NIKUs publikasjoner

NINA•NIKU utgir følgende faste publikasjoner:

NINA Fagrapport NIKU Fagrapport

Her publiseres resultater av NINA og NIKUs eget forskningsarbeid, problemoversikter, kartlegging av kunnskapsnivået innen et emne, og litteraturstudier. Rapporter utgis også som et alternativ eller et supplement til internasjonal publisering, der tidsaspekt, materialets art, målgruppe m.m. gjør dette nødvendig.

Opplag: Normalt 300-500

NINA Oppdragsmelding NIKU Oppdragsmelding

Dette er det minimum av rapportering som NINA og NIKU gir til oppdragsgiver etter fullført forsknings- eller utredningsprosjekt. I tillegg til de emner som dekkes av fagrapportene, vil oppdragsmeldingene også omfatte befaringsrapporter, seminar- og konferanseforedrag, års-rapporter fra overvåkningsprogrammer, o.a.

Opplaget er begrenset. (Normalt 50-100)

NINA•NIKU Project Report

Serien presenterer resultater fra begge instituttenes prosjekter når resultatene må gjøres tilgjengelig på engelsk. Serien omfatter original egenforskning, litteraturstudier, analyser av spesielle problemer eller tema, etc.

Opplaget varierer avhengig av behov og målgrupper

Temahefter

Disse behandler spesielle tema og utarbeides etter behov bl.a. for å informere om viktige problemstillinger i samfunnet. Målgruppen er "allmennheten" eller særskilte grupper, f.eks. landbruket, fylkesmennenes miljøvern-avdelinger, turist- og friluftlivskretser o.l. De gis derfor en mer populærfaglig form og med mer bruk av illustrasjoner enn ovennevnte publikasjoner.

Opplag: Varierer

Fakta-ark

Hensikten med disse er å gjøre de viktigste resultatene av NINA og NIKUs faglige virksomhet, og som er publisert andre steder, tilgjengelig for et større publikum (presse, ideelle organisasjoner, naturforvaltningen på ulike nivåer, politikere og interesserte enkeltpersoner).

Opplag: 1200-1800

I tillegg publiserer NINA- og NIKU-ansatte sine forskningsresultater i internasjonale vitenskapelige journaler, gjennom populærfaglige tidsskrifter og aviser.

Lorentsen, S.-H. 2001. Det nasjonale overvåkningsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2001. - NINA Oppdragsmelding 726: 1-36.

Trondheim, november 2001

ISSN 0802-4103

ISBN 82-426-1284-6

Forvaltningsområde:

Naturovervåking

Management area:

Environmental monitoring

Rettighetshaver ©:

NINA•NIKU

Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning

Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse

Redaksjon:

Kjetil Bevanger og Lill Lorck Olden

Design og layout:

Lill Lorck Olden

Sats: NINA•NIKU

Kopiering: Norservice

Opplag: 200

Kontaktadresse:

NINA•NIKU

Tungasletta 2

N-7485 Trondheim

Telefon: 73 80 14 00

Telefax: 73 80 14 01

Tilgjengelighet: Åpen

Prosjekt nr.: 12411

Ansvarlig signatur:



Oppdragsgiver:

Direktoratet for naturforvaltning (DN)

Referat

Lorentsen, S.-H. 2001. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2001. - NINA Oppdragsmelding 726: 1-36.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl fikk sin spede begynnelse i 1976. De første årene dekket programmet bare overvintrende sjøfugl. Fra 1988 ble det utvidet til også å innbefatte hekkende sjøfugl og denne delen av programmet har nå pågått i fjorten feltsesonger. Denne rapporten er den trettende i rekken av årsrapporter fra hekkedelen, og presenterer resultatene pr. 2001. For en rekke arter finnes imidlertid dataserier fra før 1988, og en har derfor nå en rimelig god oversikt over bestandsutviklingen for noen utvalgte sjøfuglarter. For å bedre kunne forstå de trendene som påvises er det imidlertid på tide å utvide overvåkingen av voksenoverlevelse, reproduksjon og næring på utvalgte nøkkellokaliteter. Overvåkingen er basert på internasjonalt anbefalt metodikk. Resultatene er viktige både for en helhetlig forvaltning av våre sjøfuglbestander og for norsk og internasjonal sjøfuglforskning. Resultatene fra 2001-sesongen viser rekordlave antall for mange arter. Tilstanden er svært kritisk for enkelte bestander, spesielt for den nordnorske lomvibestanden og den nordnorske underarten av sildemåke *Larus fuscus fuscus*. Disse bør vies spesiell oppmerksomhet i årene som kommer.

Emneord: Overvåking - sjøfugl - bestandsutvikling - Norge.

Svein-Håkon Lorentsen, Norsk institutt for naturforskning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim.

Abstract

Lorentsen, S.-H. 2001. The national monitoring programme for seabirds. Results including the breeding season 2001. NINA Oppdragsmelding 726: 1-36.

The national monitoring programme for seabirds began in 1976. From 1988 monitoring of breeding seabirds was included in the programme, and this part has now lasted for fourteen field seasons. This report is the thirteenth report from the monitoring of breeding seabirds and presents the results up to and including 2001. Because longer data series exist for a number of species, we now have a reasonable insight into the population development of some selected seabird species. However, to better understand the trends detected it is timely to expand the monitoring of adult survival, reproduction and chick diet at a number of key localities. The monitoring is based on internationally recommended methods. The results represent an important basis for the management of Norwegian seabirds as well as national and international research. The results from 2001 show record low breeding numbers for a number of species. The situation is still critical for the North-Norwegian population of Common Guillemot and the northern subspecies of the Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus fuscus*. There is an urgent need to uncover the main factors affecting these threatened populations.

Key words: Monitoring - seabirds - population development - Norway.

Svein-Håkon Lorentsen, Norwegian Institute for Nature Research, Tungasletta 2, NO-7485 Trondheim, Norway.

Forord

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl finansieres av Direktoratet for naturforvaltning (DN). NINA står for den faglige og praktiske organisering og innsamling, lagring og rapportering av data. Prosjektet ledes av en styringsgruppe bestående av Tycho Anker-Nilssen og Svein-Håkon Lorentsen.

Overvåkingen av hekkende sjøfugl innenfor Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl ble evaluert i 1996. Overvåkingsbegrepet ble i denne sammenheng utvidet til også å gjelde overvåking av demografi (voksendødelighet) og reproduksjon i en del nøkkelområder. På Røst, Grindøy (Troms) og Hornøy har overvåking av voksendødelighet gått parallelt med den tradisjonelle bestandsovervåkingen siden begynnelsen av 1990-tallet (e.g. Erikstad et al. 1994, Anker-Nilssen & Aarvak 2000).

Den tradisjonelle bestandsovervåkingen for norskekysten i 2001 fulgte mønsteret fra de tre siste feltsesongene, og anbefalingene fra evalueringen av prosjektet (Anker-Nilssen et al. 1996, Anker-Nilssen & Lorentsen 1997). For en fullstendig oversikt over resultatene fra evalueringen henvises således til årsrapporten fra 1997 (Lorentsen 1997). Gjennom evalueringsprosessen ble det lagt opp til at fylkesmennene i større grad enn tidligere skulle ta ansvar for overvåking av ærfugl og måkefugler. Dette er i svært liten grad gjennomført. Fra og med feltsesongen 2000 ble ærfugl inkludert i det nasjonale overvåkingsprogrammet, med finansiering fra DN. Bakgrunnen for dette var alarmerende signaler om bestandsnedgang, spesielt i Midt-Norge. For å få en tidlig indikasjon på hvordan hekkebestanden av ærfugl utvikler seg ble det derfor, så langt det lot seg gjøre, etablert overvåking i områder der man hadde sammenlignbare data fra før. Det ble også lagt vekt på at de nye overvåkingslokalitetene for ærfugl skulle være landsdekkende.

En rekke personer har vært involvert i feltarbeidet, og herved benyttes anledningen til å takke alle som har bidratt med innsamling av data. Ingen nevnt, ingen glemt.

Navn og adresse på personer og institusjoner som er ansvarlige for overvåkingen på enkeltlokaliteter, er gitt i **vedlegg 1**.

Trondheim november 2001

Svein-Håkon Lorentsen

Innhold

Referat	3
Abstract.....	3
Forord	4
Innhold.....	4
1 Innledning.....	5
2 Metoder og materiale.....	5
3 Resultater og diskusjon.....	6
3.1 Havhest <i>Fulmarus glacialis</i>	6
3.2 Havsule <i>Morus bassanus</i>	8
3.3 Storskarv <i>Phalacrocorax carbo</i>	8
3.4 Toppskarv <i>Phalacrocorax aristotelis</i>	11
3.5 Ærfugl <i>Somateria mollissima</i>	11
3.6 Storjo <i>Catharacta skua</i>	14
3.7 Fiskemåke <i>Larus canus</i>	14
3.8 Sildemåke <i>Larus fuscus</i>	14
3.9 Gråmåke <i>Larus argentatus</i>	18
3.10 Svartbak <i>Larus marinus</i>	18
3.11 Krykkje <i>Rissa tridactyla</i>	18
3.12 Makrellterne <i>Sterna hirundo</i>	20
3.13 Rødnebbterne <i>Sterna paradisaea</i>	21
3.14 Alke <i>Alca torda</i>	22
3.15 Lomvi <i>Uria aalge</i>	22
3.16 Polarlomvi <i>Uria lomvia</i>	24
3.17 Lunde <i>Fratercula arctica</i>	24
4 Sammendrag	25
5 Summary	27
6 Litteratur.....	28
Vedlegg 1	31
Vedlegg 2	33

1 Innledning

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl ble startet i 1988. Programmet tok utgangspunkt i et forslag fra en arbeidsgruppe med representanter fra det norske sjøfuglforskermiljøet (DN/Vilforskningen, Norsk Polarinstitut og Tromsø museum), naturforvaltningen (DN og fylkesmennenes miljøvern-avdelinger) og interesseorganisasjonene (primært Norsk ornitologisk forening) (Anon. 1988, Lorentsen 1990). Bakgrunnen for prosjektet var bl.a. de alarmerende signalene om den sterke bestandsnedgangen i nordnorske fuglefjell, og av den grunn ble det valgt å satse spesielt på de fiskespisende, kolonihekkende artene. Samtidig ønsket man å sikre en videreføring av den overvåkingen som ble igangsatt og utført i regi av det nasjonale sjøfuglprosjektet i 1979-83 (Røv 1984). De økonomiske rammene for programmet er stramme, og innsatsen er derfor redusert i forhold til de opprinnelige planene (Anon. 1988). Fra 1995 ble overvåkingen av hekkende og overvintrende sjøfugl slått sammen i ett program; Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl.

Resultatene fra tidligere år er rapportert av Lorentsen (1990, 1991a, 1991b, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000) og Østnes (1993). Denne rapporten følger malen fra foregående år. Resultatene og metodikken som benyttes er evaluert av Anker-Nilssen et al. (1996).

2 Metoder og materiale

I **tabell 1** er det gitt en oversikt over hvilke arter som overvåkes i hvert enkelt fylke eller region. Lokalitetsnummer og navn på de enkelte overvåkingslokalitetene med UTM-, kommune- og fylkesangivelse er gjengitt i **vedlegg 2**. Alle artene er taksert i henhold til internasjonalt anbefalt metodikk (Walsh et al. 1995). Beskrivelser av de mest brukte metodene er oversatt til norsk og oppsummert av Lorentsen (1989). I rapporten defineres en hekkebestand som den delen av populasjonen som går til hekking hvert enkelt år. Dette betyr at individer som av forskjellige grunner står over hekking, eller er for unge til å hekke, ikke omfattes av definisjonen.

Til evalueringen av resultatene fra overvåkingsprogrammet (Anker-Nilssen et al. 1996, Anker-Nilssen & Lorentsen 1997) ble det utviklet et program som utfører Monte Carlo-simuleringer. Programmet beregner den statistiske signifikansen for utviklingstrender, og fungerer slik at det først regner ut en stigningskoeffisient for de reelle dataene i den angitte tidsserien. Deretter plukkes de reelle dataene i tilfeldig rekkefølge, slik at en simulerer den samme tidsserien bestående av en tilfeldig rekke av de reelle dataene. Dette gjentas 10000 ganger, og for hver nye "tidsserie" som lages, regnes stigningskoeffisienten ut. Til slutt sorteres alle de tilfeldige stigningskoeffisientene i stigende rekkefølge, og plasseringen av stigningskoeffisienten for det reelle datasettet sjekkes. Denne plasseringen vil gi et mål for signifi

Tabell 1. Arter overvåket (O) i det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl i 2001 fordelt på de respektive fylkene/regionene. - Species monitored (O) through the national monitoring programme for breeding seabirds in counties/regions along the Norwegian coast in 2001.

Lokalitet/Locality	Havhest Northern Fulmar	Havsule Northern Gannet	Storskarv Great Cormorant	Toppskarv Eurasian Shag	Ærfugl Common Eider	Storjo Great Skua	Måker/ Terner Gulls/ Terns	Krykkje Black- legged Kittiwake	Alke Razor- bill	Lomvi C. Guille- mot	Polar Lomvi B. Guille- mot	Lunde Atlantic Puffin
Østfold	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Telemark	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-
Vest-Agder	O	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-
Rogaland	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-
Runde	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O	-	O
Møre	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Sklinna	-	-	O	O	-	-	-	O	-	-	-	O
Froan – Helgeland	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Helgeland	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-
Røst	O	-	-	O	O	-	-	O	O	O	-	O
Vesterålen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bleiksjø	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sortland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Troms	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Hjelmsøya	-	-	-	-	-	O	-	O	O	O	O	O
Vest-Finnmark	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kongsfjord	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Varangerfjorden	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-
Hornøy	-	-	-	O	-	-	-	O	-	O	-	O
Svalbard	O	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O	-

kanssannsynligheten (p-verdien) for det reelle datasettet sammenlignet med de 10000 tilfeldige (f.eks. hvis den reelle stigningskoeffisienten kommer som nr 250 i det sorterte settet av stigningskoeffisienter, vil p-verdien for den reelle trenden være $250/10000 = 0,025$). Når man bruker Monte Carlo-simuleringer er det viktig å være klar over begrensningene når n (her antall år i tidsrekken) er liten. Hvis det for eksempel bare eksisterer data fra tre år, er antallet mulige utvalg (kombinasjoner) 6, og den lavest oppnåelige p-verdi $1/6 = 0,166$. Med data fra fire år er antallet mulige utvalg (kombinasjoner) 24, og lavest oppnåelige p-verdi $1/24 = 0,042$. På grunn av dette må trender som er basert på data fra færre enn 5 år vurderes med stor varsomhet. Siden det er viktig å oppdage en trend tidlig, har vi valgt å definere signifikansnivå (p) mindre enn 0,1 som signifikant. Dette betyr at tabellene for de respektive signifikansnivåer viser: $p < 0,1 = *$, $p < 0,05 = **$, og $p < 0,01 = ***$.


3 Resultater og diskusjon

3.1 Havhest *Fulmarus glacialis*


Havhest er ikke overvåket i Rogaland de siste årene. I 1998 ble havhest talt på åtte lokaliteter i Rogaland (deriblant de faste overvåkingslokalitetene Kjør, Ferkingstadøyene og Urter). Hekkebestanden i to av koloniene i Rogaland (Ferkingstadøyene og Urter) har vist en gjennomsnittlig årlig økning på 18 % de siste 23 årene (**tabell 2, figur 1**). Havhest etablerte seg på Markøy i Lyngdal kommune i 1995. Hekkebestanden lå på 1-2 par på denne lokaliteten fram til i 1999 da det hekket hele 7 par. I 2001 hekket 12 par på Markøy (R. Jåbekk pers. medd.), og hekkebestanden har vist en signifikant økning (**tabell 2**). I 1997 ble det startet overvåking av havhest på Hernyken, Røst med to prøvefelt. Hekkebestanden lå på 20-54 par i årene 1997-2001. Det antas at tellingene reflekterer store årlige variasjoner i antallet fugl som går til hekking, samt daglige variasjoner i antallet fugl tilstede i koloniene. Det er ikke påvist noen signifikant trend i bestandsutviklingen på Hernyken (**tabell 2**). På Bondøy i Finnmark hekket 27 par i 2001, og det er ikke påvist noen signifikant trend i havhestbestanden på denne lokaliteten. Havhest overvåkes også i Nøisdalen på Svalbard, samt på Bjørnøya. Hekkebestanden varierer mye fra år til år på begge disse lokalitetene, og det kan ikke påvises noen signifikant trend i materialet (**figur 2, tabell 2**). Trendanalyser viser signifikante, positive trender i Vest-Agder og Rogaland, og mer usikker status i Nord-Norge og Finnmark (**tabell 2**).

Tabell 2. Trendanalyse for havhest og havsule i forskjellige kolonier langs norskekysten. I tabellen er gitt tidsperiode for tellingene, antall år med tellinger i perioden, antall kolonier og prøvefelt innenfor regionen/kolonien, bestandsendring pr. år (%), trend (+/0/-) og signifikansnivå for den observerte trenden estimert vha. Monte Carlo-simuleringer. *** = $p < 0,01$, ** = $p < 0,05$, * = $p < 0,1$, n.s. = ikke signifikant. - Results of Monte Carlo simulations for Northern Fulmar and Northern Gannet in colonies along the Norwegian coast. In the table are given time period for the counts, number of year with counts in the time period, number of colonies and study plots within the region or colony, annual population changes (%), trend (+/0/-) and the significance level for the observed trend. *** = $p < 0.01$, ** = $p < 0.05$, * = $p < 0.1$, n.s. = not significant.

Art/ Species	Lokalitet/område/fylke Locality/area/county	Tids- periode Time- period	Antall år med data Number of year with counts	Antall kolonier/ Prøvefelt Number of colonies/ Study plots	Endring pr år (%) Annual change (%)	Trend	Signifikans- nivå Significance level
Havhest	Vest-Agder	1995-2001	7	1/0	60,9	+	*
Northern Fulmar	Rogaland	1973-98	23	2/0	18,0	+	***
	Hernyken, Røst	1997-2001	5	1/2	-12,4	0 (-)	n.s.
	Bondøy, Finnmark	1993-2001	7	1/0	11,3	0 (+)	n.s.
	Nøisdalen, Svalbard	1988-2001	10	1/6	1,5	0 (+)	n.s.
	Bjørnøya	1989-2001	9	1/5	3,1	0 (+)	n.s.
Havsule	Runde	1946-2001	26	1/0	9,8	+	***
Northern Gannet	Hovsflesa	1979-98	8	1/0	3,5	0 (+)	n.s.
	Skarvklakken	1967-99	17	1/0	13,7	+	***
	Syltefjordstauran	1961-99	23	1/0	15,9	+	***
	Gjesvær	1988-99	7	1/0	60,5	+	***



Figur 1. Utviklingen i hekkebestanden (antall reir med egg eller unger) av havhest på Ferkingstadøyene og Urter i Rogaland fra 1973 til 1998. - The population development (number of nests with egg and/or chicks) of Northern Fulmar at Ferkingstadøyene and Urter in Rogaland from 1973 to 1998.



Figur 2. Utviklingen i hekkebestanden (tilsynelatende okkuperte reir) av havhest på Bjørnøya og Nøisdalen, Svalbard vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. Legg merke til at y-aksen er logaritmisk. Gjennomsnitt er satt til 100 og 200 representerer derfor en dobbelt så stor bestand, 300 tre ganger så stor bestand, 50 halvparten av bestanden osv. - The population development in Northern Fulmar colonies at Bjørnøya and Nøisdalen, Svalbard, (apparently occupied nests) shown as percent change in relation to the mean for all years. Note that the y-axis is logarithmic. The mean is defined as 100 and 200 therefore represents a population twice the mean, 300 a population three times the mean, and 50 half of the mean etc.

3.2 Havsule *Morus bassanus*

I 2001 ble bare havsulekolonien på Runde talt og det ble her observert en svak reduksjon i forhold til tallene fra 1999 og 2001. Den norske hekkebestanden talte i 1998/99 ca. 3900 par (og har sannsynligvis passert 4000 par i 2000), en økning fra ca. 3600 par i 1995 (Barrett & Folkestad 1996). De fleste norske havsulekolonier har vist signifikant vekst i overvåkingsperioden, men bestandene på Hovsflesa og Skarvklakken har gått kraftig tilbake siden begynnelsen av 90-tallet (**figur 3, tabell 2**).

3.3 Storskarv *Phalacrocorax carbo*

Storskarv overvåkes årlig innenfor en rekke regioner fra Sula i Sør-Trøndelag til Kongsfjorden i Øst-Finnmark (**figur 4**). Hekke-

bestanden av storskarv karakteriseres av kraftige årlige svingninger i hekkebestanden i de fleste regionene (**figur 5, 6 og 7**), men den langsiktige bestandstrenden har vært signifikant positiv i de fleste regioner med unntak av Froan-området, Sklinna, Vesterålen og Vest-Finnmark (**tabell 3**). Den totale hekkebestanden i området fra Sør-Trøndelag til Helgeland (omtrent fullstendig dekning) var i 2001 ca. 20200 par, en økning på 6700 par (50 %) siden 1996.


I Sør-Trøndelag har hekkebestanden i de fleste regionene økt kraftig fra overvåkingen startet rundt 1980 og fram til 2001. De eneste koloniene som ikke har økt i antall er de som er registrert innenfor verneområdene i Froan (**figur 5**). Disse koloniene viser en svak, men ikke signifikant tilbakegang. Koloniene i Sula, Grogna og på Melstein i Bjugn kommune har økt særlig mye i perioden etter at overvåkingen startet rundt 1980. Langs Helge

Tabell 3. Trendanalyse for storskarv i forskjellige regioner langs norskekysten (se **figur 3**). For tabellforklaring se **tabell 2**. - Results from Monte Carlo simulations for Great Cormorant in regions along the Norwegian coast (see **Figure 3**). Explanations to the table are given in **Table 2**.


Lokalitet/område/fylke	Tidsperiode	Antall år med data	Antall kolonier/ Prøvefelt	Endring pr år (%)	Trend	Signifikansnivå
Locality/area/county	Time-period	Number of year with counts	Number of colonies/ study plots	Annual change (%)	Trend	Significance level
Sula, Frøya	1979-2001	18	4-8/0	10,1	+	***
Grogna	1980-2001	19	9-11/0	4,3	+	**
Froan sør for Finnværet	1974-2001	18	4/0	-1,4	0 (-)	n.s.
Froan nord for Finnværet	1974-2001	20	5/0	-0,7	0 (-)	n.s.
Melstein	1979-2001	19	1/0	5,0	+	***
Vikna	1979-2001	19	7/0	4,3	+	***
Sklinna	1979-2001	19	5/0	0,6	0 (+)	n.s.
Helgeland sør	1980-2001	16	7/0	3,3	+	**
Vega	1982-2001	17	8/0	3,8	+	***
Sør for Træna	1985-2001	16	2/0	6,3	+	***
Træna-Myken	1985-2001	15	5/0	4,7	+	**
Vesterrålen	1983-98	8	1/0	-0,5	0 (-)	n.s.
Vest-Finnmark	1985-2001	16	4/0	4,0	0 (+)	n.s.
Kongsfjord	1987-2001	15	3/0	9,4	+	***

Tabell 4. Trendanalyse for toppskarv i forskjellige regioner og kolonier langs norskekysten. For tabellforklaring se **tabell 2**. - Results from Monte Carlo simulations for Eurasian Shag in regions and colonies along the Norwegian coast. Explanations to the table are given in **Table 2**.


Lokalitet/område/fylke	Tidsperiode	Antall år med data	Antall kolonier/ Prøvefelt	Endring pr år (%)	Trend	Signifikansnivå
Locality/area/county	Time-Period	Number of year with counts	Number of colonies/ study plots	Annual change (%)	Trend	Significance level
Rogaland	1979-2001	18	1/0	18,4	+	***
Runde	1975-2001	14	1/0	-4,4	-	***
Sklinna	1984-2001	17	1/3	6,3	+	***
Ellefsnyken	1985-2001	17	1/0	1,5	0 (+)	n.s.
Troms	1982-93	9	1/0	-5,1	0 (-)	n.s.
Lille Kamøy	1985-2000	15	1/2	-4,0	0 (-)	n.s.
Hornøy	1981-2001	9	1/0	1,6	0 (+)	n.s.




Figur 3. Utviklingen i hekkebestanden (antall tilsynelatende okkuperte reirplasser) av havsule fra koloniene ble etablert. - The population development (number of apparently occupied nests) in the Northern Gannet colonies from the time of their establishment.



Figur 4. Overvåkingslokaliteter og regioninndeling for storskarv. - Great Cormorant colonies monitored and the location of the regions used.



Figur 5. Utviklingen i hekkebestanden (tilsynelatende okkuperte reir) av storskarv i noen kolonier i Sør-Trøndelag vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development in some Great Cormorant colonies (apparently occupied nests) in Sør-Trøndelag shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.



Figur 6. Utviklingen i hekkebestanden (tilsynelatende okkuperte reir) av storskarv i noen kolonier i Helgeland vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development in some Great Cormorant colonies (apparently occupied nests) in Helgeland shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.

landskysten er det registrert store, årlige bestandssvingninger i hele perioden siden overvåkingen startet rundt 1980 (**figur 6**). Det er likevel registrert en signifikant bestandsøkning innenfor alle regionene med unntak av på Sklinna (**tabell 3**). Koloniene i Vesterålen ble ikke talt i 2001, men tellingene i 1998 viste en halvering av hekkebestanden siden 1995. Hva dette skyldes er usikkert. I Vest-Finnmark har hekkebestanden holdt seg relativt stabil siden 1990, mens den har økt i Kongsfjorden i Øst-Finnmark (**figur 7**).

3.4 Toppskarv *Phalacrocorax aristotelis*

Toppskarvkoloniene på Kjør i Rogaland, Runde i Møre og Romsdal, Sklinna i Nord-Trøndelag, Ellefsnyken på Røst i Nordland, samt Hornøy i Finnmark ble talt i 2001. Det er observert en sterk økning i hekkebestanden av toppskarv i Rogaland i perioden 1979-2001 (**tabell 4, figur 8**). På Runde er det registrert en kraftig tilbakegang siden 1975, og hekkebestanden i 2001 var bare en firedel av hva den var midt på 1970-tallet, og litt over halvparten av gjennomsnittet i hele overvåkingsperioden. Resultatene fra overvåkingslokalitetene på kyststrekningen fra Trøndelag til Lofoten tyder på at 2001 var et relativt dårlig år for Sklinna-bestanden (ned 21 % fra 2000), men et godt år for bestanden på Ellefsnyken i Røst (opp 8 % fra 2000, **figur 8, tabell 4**). På Hornøy ble det i 2001 talt rekordmange toppskarvreir i 2001.

3.5 Ærfugl *Somateria mollissima*

Ærfugl ble inkludert i overvåkingsprogrammet fra og med feltseksjonen 2000 i følgende områder: Østfold, Oslofjorden (Oslo og Akershus, samt Buskerud), Telemark, Vest-Agder, Hordaland, Trondheimsfjorden, Vikna, Ranafjorden, Helgelandskysten, Røst, Troms og Varangerfjorden. Fra noen av disse områdene fantes datasett fra tidligere år, slik at man har vært i stand til å få en indikasjon på hvordan hekkebestanden av ærfugl har utviklet seg over tid. Disse trendene må likevel ikke betraktes som absolutte, ettersom de er vurdert ut i fra et meget begrenset datasett (som regel bare data fra to sesonger).


De beste overvåkingsdataene på ærfugl finnes fra Skagerrakkysten, som stort sett er overvåket årlig siden 1988. Resultatene viser gjennomgående en signifikant bestandsøkning i perioden 1988-2001 i alle fylker unntatt Aust-Agder (Aust-Agder hadde en positiv trend i perioden, men den var ikke signifikant) (**figur 9, tabell 5**).

Hordaland ble overvåket for første gang i 2000, og det har ikke vært mulig å finne eldre, sammenlignbare data fra dette kystavsnittet. Byrkjeland (under utarb.) opplyser imidlertid at "det er neppe tvil om at ærfuglbestanden i fylket har økt til dels sterkt siden midten av 1980-tallet". Håland (1985) estimerer en total hekkebestand på 2000-3000 par, mens tellinger i mai 2000 indikerer en beregnet hekkebestand i fylket på 11780 par (Byrkjeland under utarb.). Det ble i 2001 talt 24 % flere ærfugl i overvåkingsområdene i Hordaland enn i 2000, men det er ikke mulig å si om dette skyldes lokale forflytninger eller en reell bestandsøkning.


I Trondheimsfjorden er området fra Stjørdal til Beitstadsundet, samt noen øyer i Beitstadsfjorden inkludert i overvåkingsprogrammet. Det finnes tellinger gjort fra båt i 1982 fra det samme området (Lorentsen & Rofstad 1982). På strekningen Stjørdal-Beitstadsundet ble det i 1982 talt 5283 ærfuglhanner. Det tilsvarende tallet i 2000 var 2401 hanner, en tilbakegang på 55 %. På øyene Rambergholmen, Vaggen og Giplingøya er det derimot observert en økning fra 649 til 820 hanner (26 %) i den samme perioden. Det er vanskelig å tolke tellingene fra 2001 i denne sammenheng fordi det ser ut til at de ble gjennomført for sent i sesongen, og at det kan ha skjedd lokale forflytninger av de voksne hannene før dette. Resultatene fra 2000 indikerer imidlertid (og dette støttes av tellingene fra 2001) at de store koloniene har hatt en positiv bestandsutvikling, mens ærfugl som hekker utenfor disse har gått kraftig tilbake. Et unntak er imidlertid hekkebestanden i den tidligere største ærfuglkolonien i Trondheimsfjorden, Tautra. Den har sunket fra ca. 1700 par på 1960-tallet til ca. 200 i 2000, noe som nok først og fremst skyldes at det i 1976 ble bygget en steinmolo over Tautersvaet, med en omfattende innvandring av predatorer som resultat (Thingstad et al. 1994). Den samlede tilbakegangen i hekkebestanden av ær

Tabell 5. Trendanalyse for ærfugl langs Skagerrakkysten og Holmholmen, en koloni i Ranafjorden. For tabellforklaring se **tabell 2**. - Results from Monte Carlo simulations for Common Eider along the Skagerrak coast and at a colony (Holm-holmen) in the Ranafjord. Explanations to the table are given in **Table 2**.

Lokalitet/område/fylke	Tids-Periode	Antall år med data	Antall kolonier/ Prøvefelt	Endring pr år (%)	Trend	Signifikansnivå
Locality/area/county	Time-Period	Number of year with counts	Number of colonies/ study plots	Annual change (%)	Trend	Significance level
Østfold	1988-2001	14		9,0	+	***
Oslo/Akershus	1990-2001	10		13,8	+	*
Buskerud	1990-2001	10		6,5	+	*
Vestfold	1988-1997	10		6,3	+	**
Telemark	1988-2001	14		4,1	+	**
Aust-Agder	1988-1997	10		2,5	0 (+)	n.s.
Vest-Agder	1988-2001	12		3,2	+	**
Holmholmen	1962-2001	39	1/0	1,0	+	***




Figur 7. Utviklingen i hekkebestanden (tilsynelatende okkuperte reir) av storskarv i noen kolonier i Vesterålen, Finnmark og Kongsfjord vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development in some Great Cormorant colonies (apparently occupied nests) in Vesterålen, Finnmark and Kongsfjord shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.



Figur 8. Utviklingen i hekkebestanden (tilsynelatende okkuperte reir) av toppskarv i utvalgte kolonier vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development in some Eurasian Shag colonies (apparently occupied nests) shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.

fugl i Trondheimsfjorden i perioden 1982-2000 er ca. 45 %, noe som også reflekteres i tilbakegangen i overvintringsbestanden (Husby & Lorentsen 2000, Lorentsen & Nygård 2001).

en relativt stabil bestand, muligens med en viss nedgang i hekkebestanden fra slutten av 1980-tallet til 2000. I de midtre områdene av Helgelandskysten tyder sammenlignbare tellinger fra 1988, 2000 og 2001 på en relativt stabil hekkebestand. I de



Figur 9. Utviklingen i hekkebestanden (antall hanner ved hekkeplass) av ærfugl langs Skagerrakkysten vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development (number of males by breeding sites) of Common Eider along the Skagerrak coast shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.


Det er for tidlig å si noe om utviklingen av ærfuglbestanden i Vikna-området i Nord-Trøndelag.

På Helgelandskysten ble det i 2000 etablert tre overvåkingsområder; indre deler av Ranafjorden, området Aldra-Lovund i Lurøy kommune og nordre deler av Træna, som representerer hhv. Indre, midtre og ytre kystområder. Fra alle disse områdene fantes data fra slutten av 1980-tallet. Holmholmen i indre Ranafjord er en hekkelokalitet som er talt årlig siden 1962 (Hans og Edit Guttormsen, Kjell Arne Meyer pers medd.). Etter en kraftig økning i hekkebestanden fra 1962 til 1980 ble bestanden omtrent halvert i perioden fram til 1986. Etter dette var den relativt stabil fram til midten av 1990-tallet, da den igjen startet å vokse (**figur 10**). Sannsynligvis skyldtes økningen fram til 1980 at ærfugl flyttet fra andre hekkelokaliteter, bl.a. Straumholmen, til Holmholmen som er røktet i hele perioden. Reduksjonen fra 1980 til 1986 er sannsynligvis forårsaket av forurensningssituasjonen i indre deler av fjorden. Denne har bedret seg noe etter midten av 1980-tallet, med en vekst i hekkebestanden av ærfugl som resultat (Bustnes under utarb.). Totalt sett har hekkebestanden på Holmholmen økt signifikant i perioden (**tabell 5**). Tellinger fra hele indre deler av Ranafjorden i perioden etter 1985 tyder på

ytre områdene av Helgelandskysten ble tellingene i 2001 sannsynligvis gjennomført noe for sent i sesongen til at de reflekterer et reelt bilde av hekkebestanden.

På Røst ble det gjennomført tellinger i områder hvor en tilsvarende telling ble foretatt i 1988. I 1988 ble det til sammen talt 2518 ærfuglhanner i disse områdene, mens det tilsvarende tallet for 2000 var 1463, og for 2001 var 1281. Dette tyder på en tilbakegang på ca. 45 % siden 1988 (sammenlignet med gjennomsnittet for 2000 og 2001). Siden dette resultatet er basert på tellinger fra kun tre år er den imidlertid beheftet med en viss usikkerhet.

Det ble i 2000 også etablert overvåkingsområder på Møre, i Troms og Varangerfjorden, men det har ikke vært mulig å hente inn sammenlignbare data fra disse områdene fra tidligere år. Sammenligninger av tellingene fra de to årene viser likt resultat for alle områdene.



Figur 10. Utviklingen i hekkebestanden av ærfugl på Holmholmen i Ranafjorden fra 1962-2001. - Population development in the Common Eider at Holmholmen in the Ranafjord from 1962-2001.

3.6 Storjo *Catharacta skua*

Overvåking av storjo ble i 1997 initiert på Hjelmsøya. I 1997 og 1998 hekket 2 par, mens hekkebestanden i 1999 hadde steget til 3 par. I 2000 og 2001 hekket igjen 2 par på Hjelmsøya. I 1998 ble overvåkingen av storjo på Runde samt tre andre lokaliteter i Møre og Romsdal (Rimøya, Leinøya og Nerlandsøya) inkludert i Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Tellingene på Runde i 2001 viser en hekkebestand på 36 par, en økning fra ca. 25 par i 1998. Bestanden på Røst har vært 1 par årlig siden den ble påvist hekkende der for første gang i 1988 (T. Anker-Nilssen pers medd.).

3.7 Fiskemåke *Larus canus*

Arten ble i 1999 overvåket i Telemark, Vest-Agder og på Sør-Helgeland. I Telemark har fiskemåkebestanden gått kraftig tilbake siden slutten av 1970-tallet (**figur 11, tabell 6**). Telemarksbestanden var i 2001 rekordlav, og er nå bare 15 % av hva den var i siste halvdel av 1970-årene. Hekkebestanden i Vest-Agder er halvert i perioden etter 1989 (**tabell 6**). Tellingene på Sør-Helgeland viser store årlige variasjoner og det er ikke påvist noen signifikant trend. Resultatene fra Sortlandssundet tyder også på at den lokale hekkebestanden varierer svært mye fra år til år, men resultater fra 1998 indikerer at den er i framgang etter at den var på et bunnivå i 1996. Det kan være grunn til å se nærmere på hva årsakene til bestandsnedgangene i Telemark og Vest-Agder kan skyldes.

3.8 Sildemåke *Larus fuscus*

To underarter av sildemåke hekker regulært i Norge; *Larus fuscus intermedius* som hekker langs kysten av Sør- og Vestlandet nord til Sør-Trøndelag, og *Larus fuscus fuscus* som hekker fra Trøndelag og nordover til Vest-Finnmark. Bestandsutviklingen for disse to underartene har vært svært forskjellig. Mens bestanden av *intermedius*, særlig i enkelte områder langs Skagerrak kysten, har hatt en positiv utvikling siden midten av 1970-tallet (**figur 12, tabell 6**), har bestanden av *fuscus* gått dramatisk tilbake i samme periode (**figur 13, tabell 6**) (Røv 1986, Thingstad 1986, Bevanger & Thingstad 1990). Den norske *fuscus*-populasjonen er nesten utryddet. Underartene *L. f. intermedius* og *L. f. graellsii* (en britisk underart) synes å være i frammarsj nordover.

Hekkebestanden av *intermedius* overvåkes i Telemark og Vest-Agder. I Telemark er det gjennomført årlige tellingene siden 1974 (**figur 12**). Resultatene viser betydelige årlige variasjoner, men hekkebestanden i perioden 1980-2001 (individtellingene) er gjennomgående noe større enn den var i perioden 1974-79. Det er en signifikant økning i de koloniene der antallet par estimeres ut i fra antallet fugl i kolonien, mens hekkebestanden i de koloniene der det telles antall reir har vært negativ i perioden (**tabell 6**). I de koloniene der det telles voksne fugler, varierer antallet mer fra år til år enn i de koloniene der det telles reir (**figur 12**). I Vest-Agder har hekkebestanden av sildemåke økt kraftig siden midten av 1970-tallet (**figur 12, tabell 6**).


Tabell 6. Trendanalyse for fiskemåke, sildemåke, gråmåke, svartbak og makrellterne i forskjellige fylker og kolonier langs norskekysten. For tabellforklaring se **tabell 2**. - Results from Monte Carlo simulations for Mew Gull, Lesser Black-backed Gull, Herring Gull, Great Black-backed Gull and Common Tern in counties and colonies along the Norwegian coast. Explanations to the table are given in **Table 2**.

Art	Lokalitet/område/fylke	Tidsperiode	Antall år med data	Antall kolonier/prøvefelt	Endring pr år (%)	Trend	Signifikansnivå
Species	Locality/area/county	Time-period	Number of year with counts	Number of colonies/study plots	Annual change (%)	Trend	Significance-level
Fiskemåke	Østfold	1989-96	7	4/0	-5,7	0 (-)	n.s.
Mew Gull	Telemark	1974-2001	28	24/0	-6,8	-	***
	Telemark ¹	1989-2001	13	8/0	-11,0	-	***
	Vest-Agder	1989-2001	13	2/0	-11,9	-	**
	Mandal kommune	1989-2001	11	Mange/many	-7,7	-	**
	Sør-Helgeland	1996-2001	6	10	44,1	0 (+)	n.s.
	Sortlandssundet	1989-98	10	6/0	-4,2	0 (-)	n.s.
Sildemåke	Østfold	1989-96	7	7/0	-9,7	-	***
L. B-b. Gull	Telemark	1974-2001	28	19/0	1,9	+	**
	Telemark ¹	1989-2001	13	7/0	-4,4	-	*
	Vest-Agder	1988-2001	14	5/0	5,4	+	***
	Rogaland	1988-96	7	1/0	-7,0	0 (-)	n.s.
	Sortna	1986-98	9	1/0	-2,4	0 (+)	n.s.
	Nord-Trøndelag	1980-88	5	2/0	-16,0	-	*
	Sør-Helgeland	1980-2001	13	9/0	-7,0	-	**
Gråmåke	Østfold	1989-96	7	6/0	6,1	0 (+)	n.s.
Herring Gull	Telemark	1974-2001	28	24/0	5,6	+	***
	Telemark ¹	1989-2001	13	8/0	0,7	0 (+)	n.s.
	Vest-Agder	1989-2001	13	2/0	6,2	+	**
	Sør-Helgeland	1996-2001	6	8/0	27,0	+	*
	Sortlandssundet	1989-98	10	7/0	-4,9	0 (-)	n.s.
Svartbak	Østfold	1989-96	7	2/0	0,2	0 (+)	n.s.
G. B-b. Gull	Telemark	1974-2001	28	26/0	5,9	+	***
	Telemark ¹	1989-2001	13	7/0	14,6	+	*
	Vest-Agder	1989-2001	12	2/0	2,1	0 (+)	n.s.
	Sør-Helgeland	1996-2001	6	12/0	30,3	+	*
	Sortlandssundet	1989-98	10	7/0	5,5	+	*
Makrellterne	Østfold	1989-96	7	2/0	4,3	0 (+)	n.s.
C. Tern	Telemark	1974-2001	28	24/0	-5,4	-	***
	Telemark ¹	1989-2001	13	15/0	-13,2	-	**
	Vest-Agder ²	1990-2001	11	Mange/Many	-6,3	-	*


Merknad: 1) Reirtelling, 2) Gjelder Mandal og Farsund kommuner
 Note: 1) Counts of nests, 2) Mandal and Farsund municipalities

Underarten *fuscus* overvåkes på regulær basis i flere kolonier på kysten av Sør-Helgeland. I tillegg ble en koloni på Sortna i Møre og Romsdal overvåket fram til 1994 og i 1998. I perioden fra 1986 til 1989 ble det registrert en økning av hekkebestanden i denne kolonien, mens det i perioden 1989-98 ble registrert en tilbakegang. Koloniene på Sør-Helgeland har gjennomgått en kraftig bestandsreduksjon siden overvåkingen startet i 1980. På 1990-tallet har bestanden fluktuert på et nivå som ligger på bare


10-20 % av hva den var i 1980 (**figur 13**). Situasjonen for denne underarten er derfor meget kritisk. Både i Nord-Trøndelag og Nordland er den observerte nedgangen signifikant (**tabell 6**). Overvåkingsprogrammet bør snarest utvides til å omfatte flere kolonier av denne underarten, spesielt innenfor den sørlige delen av utbredelsesområdet (Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene).




Figur 11. Utviklingen i hekkebestanden av fiskemåke i Telemark, Vest-Agder, Sortlandssundet og Sør-Helgeland vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development of Mew Gull in Telemark, Vest-Agder, Sortlandssundet and Sør-Helgeland shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.



Figur 12. Utviklingen i hekkebestanden av sildemåke i Østfold, Telemark og Vest-Agder vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development (apparently occupied nests) of Lesser Black-backed Gull in Østfold, Telemark and Vest-Agder shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.



Figur 13. Utviklingen i hekkebestanden av sildemåke (totalt antall individer i kolonien) for utvalgte kolonier i Nord-Trøndelag og Sør-Helgeland vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development (total number of individuals in the colonies) of Lesser Black-backed Gull in some selected colonies in Nord-Trøndelag and Sør-Helgeland shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.



Figur 14. Utviklingen i hekkebestanden av gråmåke i Østfold, Telemark, Vest-Agder, Sortlandssundet og Sør-Helgeland vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development (total number of individuals in the colonies) of Herring Gull in Østfold, Telemark, Vest-Agder, Sortlandssundet and Sør-Helgeland shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.

3.9 Gråmåke *Larus argentatus*

Gråmåke overvåkes årlig i Telemark, Vest-Agder og på Sør-Helgeland. Den ble også overvåket i Sortlandssundet fram til 1998 (**figur 14, tabell 6**). I Telemark, hvor det er gjennomført årlige tellinger siden 1974, har bestanden økt kraftig og er nå ca. fire ganger større enn i 1974, selv om det er registrert en viss tilbakegang (ca. 150 par) i hekkebestanden siden 1996. Hekkebestanden i koloniene i Telemark der det telles reir har holdt seg relativt stabilt siden 1989, selv om det er registrert til dels betydelige årlige variasjoner også her. Gråmåkebestanden i utvalgte kolonier i Vest-Agder har også økt kraftig i perioden etter 1989, men det observeres til dels store årlige variasjoner i antallet som hekker. På Sør-Helgeland er det registrert en positiv bestandsutvikling i perioden 1996-2001. I Sortlandssundet økte bestanden kraftig i perioden fra 1989 til 1993 mens den har holdt seg stabil etter dette. Den kraftige økningen i den norske gråmåkebestanden er i samsvar med det mønstret en finner ellers i Europa (e.g. Lloyd et al. 1991). Årsaken til økningen er usikker, men forklaringen kan ligge i artens allsidighet i næringsveien, deriblant dens tilpassing til å utnytte avfall som mennesket etterlater seg.


3.10 Svartbak *Larus marinus*

Svartbak overvåkes årlig i Telemark, Vest-Agder og på Sør-Helgeland. Arten ble også overvåket i Sortlandssundet fram til 1998 (**figur 15, tabell 6**). I Telemark, hvor det er gjennomført årlige tellinger siden 1974, er det registrert en betydelig be-

standsøkning, spesielt i perioden etter 1990. Hekkebestanden av svartbak i Telemark er nå tre ganger større enn da overvåkingen startet i 1974. I motsetning til hva som er registrert for sildemåke, varierer hos svartbak antallet reir mer enn antallet individer talt i koloniene, men resultatene fra begge metodene viser en entydig positiv bestandstrend over tid (**tabell 6**). I Vest-Agder holdt bestanden seg relativt stabil i perioden 1989-2001. På Sør-Helgeland er det registrert en positiv bestandsutvikling. Svartbakbestanden i Sortlandssundet har vist samme utviklingsmønstre som gråmåkebestanden, dvs. en økning i perioden 1989-93 etterfulgt av en generell nedgang fram til 1996/97, samt en svak økning etter dette.

3.11 Krykkje *Rissa tridactyla*

Krykkje overvåkes årlig på Runde, Sklinna, Røst, Hjelmsøya og Hornøy. For alle overvåkingslokalitetene er det registrert en signifikant tilbakegang siden overvåkingen ble startet rundt 1980 (**figur 16, tabell 7**). På Runde var hekkebestanden i 2001 kun en tredel av det den var da overvåkingen startet i 1980. Krykkjekolonien på Sklinna er liten og viser store årlige svingninger i hekkebestanden. Kolonien er likevel redusert med vel 90 % siden 1980, og det er sannsynligvis bare snakk om år før den forsvinner helt. Krykkjebestanden på Vedøy (Røst) har holdt seg relativt stabil siden 1995, men på et nivå ca. 40 % lavere enn da overvåkingen startet i 1980. På Hjelmsøya var bestanden i 2001 under halvparten av det den var da overvåkingen startet i 1984, og det er registrert en betydelig reduksjon siden 1997. På Hornøy er det observert en generell bestandsnedgang i perioden etter



Figur 15. Utviklingen i hekkebestanden av svartbak i Telemark, Vest-Agder, Sortlandssundet og Sør-Helgeland vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development (total number of individuals in the colonies) of Great Black-backed Gull in Telemark, Vest-Agder, Sortlandssundet and Sør-Helgeland shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.


Tabell 7. Trendanalyse for krykkje i forskjellige kolonier langs norskekysten. For tabellforklaring se **tabell 2.** - Results from Monte Carlo simulations for Black-legged Kittiwake in colonies along the Norwegian coast. Explanations to the table are given in **table 2.**

Lokalitet/område/fylke	Tidsperiode	Antall år med data	Antall kolonier/ Prøvefelt	Endring pr år (%)	Trend	Signifikansnivå
Locality/area/county	Time-period	Number of year with counts	Number of colonies/ study plots	Annual change (%)	Trend	Significance level
Runde	1980-2001	18	1/10	-4,6	-	***
Sklinna	1980-2001	20	1/1	-6,9	-	***
Vedøy, Røst	1980-2001	19	1/5	-1,7	-	***
Hjelmsøya	1991-2001	11	1/2	-4,1	-	*
Hornøy	1982-2001	18	1/6	-1,2	-	**
Sofiekammen	1988-2001	8	1/1	-2,7	0 (-)	n.s.
Tschemakfjellet	1988-2001	10	1/1	-0,9	0 (-)	n.s.
Grumant	1988-99	8	1/1	2,82	0 (+)	n.s.
Alkhorvet	1988-99	11	1/3	3,1	+	*
Fuglehuken	1988-2001	9	1/3	-3,2	0 (-)	n.s.
Ossian Sars	1988-2001	13	1/4	0,6	0 (+)	n.s.
Amsterdamøya	1988-2001	8	1/6	-7,0	0 (-)	*

1982. For alle koloniene langs norskekysten var de registrerte hekkebestandene i 2001 rekordlave. Krykkje overvåkes også i flere kolonier på Svalbard, samt på Bjørnøya (**tabell 7**). Hekkebestanden i disse koloniene varierer voldsomt fra år til år (**figur 17**), og med få unntak har det ikke vært mulig å påvise signifikante bestandstrender i perioden etter 1988.

3.12 Makrellterne *Sterna hirundo*

Arten overvåkes årlig på enkeltlokalteter i Telemark, samt innen større områder i Vest-Agder (**figur 18, tabell 6**). I perioden 1989-96 ble den også overvåket i Østfold, men denne delen av programmet falt ut under revideringen vinteren 1996/97. Generelt viser begge terneartene store, årlige fluktasjoner i bestandene. I Telemark har bestanden vært overvåket årlig siden 1974, og det er her registrert en kraftig og signifikant tilbakegang i




Figur 16. Utviklingen i hekkebestanden av krykkje (tilsynelatende okkuperte reir) på Runde, Sklinna, Røst (Vedøy), Hjelmsøya og Hornøy vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2.** - The population development (apparently occupied nests) in some Black-legged Kittiwake colonies shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.

perioden, både for reirtellinger og for individtelling. I koloniene der det telles antall individer var hekkebestanden i 2001 kun 15 % av hva den var i 1974 (80 % lavere enn i 1989), mens i reirtellingsfeltene var bestanden 70 % lavere enn i 1989. I Vest-Agder er det også observert en signifikant negativ trend i perioden 1990-2001. Hekkebestanden var her i 2001 mer enn halvert


siden 1990.

3.13 Rødnebbterne *Sterna paradisaea*

Rødnebbterne er blitt overvåket på enkeltlokaliteter i Østfold, Vest-Agder og Nordland men ble ikke overvåket i 2001. Resulta



Figur 17. Utviklingen i hekkebestanden av krykkje (tilsynelatende okkuperte reir) i noen kolonier på Svalbard vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development (apparently occupied nests) in some Black-legged Kittiwake colonies at Svalbard shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.



Figur 18. Utviklingen i hekkebestanden av makrellterne i Østfold, Telemark og Vest-Agder vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development of Common Tern (total number of individuals in the colonies) in Østfold, Telemark, and Vest-Agder shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.

tene fra tidligere år viser store årlige variasjoner i antallet hekkende par, og det kan ikke trekkes sikre konklusjoner om bestandsutviklingen.

3.14 Alke *Alca torda*


Overvåking av alke ble initiert på Hjelmsøya i 1996, og på Elleføyen og Vedøy (Røst) i 1997. Foreløpige resultater tyder imidlertid på at arten kan være vanskelig å overvåke, i og med at det er store daglige variasjoner i antallet synlige individer i prøvefeltene samtidig som antallet fugler i disse nok er i minste laget. Verken på Vedøy i Røst eller på Hjelmsøya er det påvist signifikante bestandsendringer i overvåkingsperioden (**figur 19, tabell 8**). På Hjelmsøya telles antallet individer og egg parallelt i de samme feltene, og resultatene fra disse tellingene viser meget godt samsvar.

3.15 Lomvi *Uria aalge*


Arten overvåkes årlig på Runde, Vedøy (Røst), Hjelmsøya og Hornøy og regelmessig på Bjørnøya. I de fleste koloniene som overvåkes er det registrert en dramatisk og signifikant tilbakegang i hekkebestanden siden begynnelsen av 1980-tallet (**figur 20, tabell 8**). Størst har nedgangen vært i de nordnorske koloniene. Den mest dramatiske nedgangen har skjedd på Hjelmsøya og Vedøy. På Hjelmsøya er hekkebestanden redusert med over 90 % fra 1984 til 2001, og har ikke vist noen tegn til bedring siden krakket i 1986/87. Den nordnorske lomvibestanden var i 1984 kun 25 % av hva den var i 1964 (Anker-Nilssen & Barrett 1991), noe som ytterligere understreker dramatikken i situasjonen. På Vedøy ble det registrert en halvering av hekkebestanden fra 2000 til 2001. Hekkebestanden i 2001 var bare 10 % av hva den var på begynnelsen av 1980-tallet, da den allerede var redusert med 60 % siden begynnelsen av 1960-årene (Bakken 1989). Lomvibestanden på Hornøy har vist en positiv trend etter krakket i 1987 (Krasnov & Barrett 1996), men den er fremdeles bare halvparten av hva den var da overvåkingen startet i 1980, selv

Tabell 8. Trendanalyse for alke, lomvi, polarlomvi og lunde i forskjellige kolonier langs norskekysten. For tabellforklaring se **tabell 2**. - Results from Monte Carlo simulations for Razorbill, Common Guillemot, Brünnich Guillemot and Atlantic Puffin in colonies along the Norwegian coast. Explanations to the table are given in **table 2**.

Art	Lokalitet/område/fylke	Tids-Periode	Antall år med data	Antall kolonier/ Prøvefelt	Endring pr år (%)	Trend	Signifikansnivå
Species	Locality/area/county	Time-Period	Number of year with counts	Number of colonies/ study plots	Annual change (%)	Trend	Significance level
Alke	Elleføyen, Røst	1997-2001	5	1/3	5,5	0 (+)	n.s.
Razorbill	Hjelmsøy	1996-2001	6	1/5	2,4	0 (+)	n.s.
	Hjelmsøy, eggfelt	1996-2001	6	1/2	0,2	0 (+)	n.s.
Lomvi	Runde	1980-2001	18	1/22	-2,5	-	***
C. Guillemot	Vedøy	1981-2001	17	1/3	-8,4	-	***
	Hjelmsøy	1989-2001	13	1/9	-7,4	-	**
	Hjelmsøy, eggfelt	1992-2001	9	1/5	7,7	0 (+)	n.s.
	Hornøy	1982-2001	18	1/4	-2,3	0 (-)	n.s.
Polarlomvi	Hjelmsøy	1989-2001	13	1/3	-7,4	-	*
B. Guillemot	Sofiekammen, Svalbard	1988-96	5	1/2	2,0	0 (+)	n.s.
	Diabasodden, Svalbard	1988-2001	9	1/11	-0,0	0 (-)	n.s.
	Tschermakfjellet, Svalb.	1988-2001	10	1/0	-0,8	0 (-)	n.s.
	Grumant, Svalbard	1988-98	7	1/7	4,1	0 (+)	n.s.
	Alkhornet, Svalbard	1988-2001	12	1/3	0,5	0 (+)	n.s.
	Fuglehuken, Svalbard	1988-2001	9	1/10	0,1	0 (+)	n.s.
	Ossian Sars, Svalbard	1988-2001	13	1/4	1,6	0 (+)	n.s.
Lunde	Runde	1980-2001	17	1/11	1,2	+	**
Atlantic Puffin	Sklinna	1981-2001	21	1/2	-0,2	0 (-)	n.s.
Puffin	Hernyken	1979-2001	23	1/415	-4,3	-	***
	Anda	1981-88	4	1/8	-1,5	0 (-)	n.s.
	Bleiksøy	1988-93	4	1/46	-1,6	0 (-)	n.s.
	Gjesvær	1997-2001	5	1/150	5,7	0 (+)	n.s.
	Hornøy	1982-93	9	1/6	2,5	+	**
	Hornøy, sirkelplott	1990-2001	12	1/50	0,8	0 (+)	n.s.



Figur 19. Utviklingen i hekkebestanden av alke på Vedøy og Hjelmsøya (antall individer og egg i prøvefelt) vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development of Razorbill at Vedøy and Hjelmsøya (number of individuals and eggs in study plots) shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.



Figur 20. Utviklingen i hekkebestanden av lomvi på Runde, Vedøy (Røst), Hjelmsøya, Hornøy og Syltefjord vist som bestand (antall individer i prøvefelt) i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development (number of individuals in study plots) in some Common Guillemot colonies shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.

om hekkebestanden nå ligger rundt gjennomsnittet for hele overvåkingsperioden. På Runde ble det registrert en rekordlav hekkebestand i 2001, under halvparten av bestanden på begynnelsen av 1980-tallet. I 2001 var antallet lomvier som gikk til hekking gjennomgående rekordlave i alle overvåkingslokalitetene med unntak av Hornøy. Det vil være svært interessant å se i årene som kommer om dette er en enkeltstående episode, eller om det er starten på en ny negativ trend for hekkebestandene av lomvi. Tilstanden for den nordnorske bestanden fremdeles svært alvorlig, og hvis den negative trenden fortsetter er det sannsynligvis bare et tidsspørsmål før arten forsvinner som hekkefugl i mange fuglefjell langs norskekysten. Det bør umiddelbart settes i gang undersøkelser for å finne ut hva som er årsaken til de negative bestandstrendene for arten. Dette gjelder spesielt for koloniene på Vedøy og Hjelmsøya.


3.16 Polarlomvi *Uria lomvia*

Polarlomvi overvåkes årlig på Hjelmsøya og i utvalgte kolonier på Svalbard. Hekkebestanden på Hjelmsøya viser store årlige variasjoner (**figur 21**). Etter en økning i hekkebestanden fra 1995 til 1996, etterfulgt av en tilbakegang til 1997 og en økning til 1999, ble det registrert en kraftig tilbakegang fra 1999 til 2001. Hekkebestanden i 2001 var bare 25 % av hva den var i 1989 (**figur 21, tabell 8**). Det må imidlertid presiseres at prøvefeltene på Hjelmsøya er lagt ut med tanke på overvåking av lomvi, sam-

tidig som hekkeforekomstene på fastlandet er i randsonen for artens utbredelse. Resultatene representerer derfor nødvendigvis ikke bestanden som helhet. Dette kan også være årsaken til de store årlige variasjonene. Resultatene fra overvåkingen på Svalbard viser relativt store årlige variasjoner i hekkebestanden (**figur 21, tabell 8**). Siden mange av lokalitetene her kun blir talt én gang pr. sesong, er dette å forvente. Det er helt nødvendig med flere tellinger spredt over rugeperioden for å få pålitelige overvåkingsdata for arten på Svalbard.


3.17 Lunde *Fratercula arctica*

Lunde blir overvåket årlig på Runde, Sklinna, Herynken (Røst) og Hornøy. Den ble også overvåket på Bleiksøy fram til 1993 (**figur 22, tabell 8**). På Runde ble det registrert en kraftig bestandsøkning fra 1980 til 1982, og den har også vist en svak, signifikant, økning etter dette, selv om det ble registrert en 10 % reduksjon i hekkebestanden fra 2000 til 2001. Den generelle trenden for hekkebestanden på Sklinna antyder en relativt stabil bestand i hele perioden (1981-2001). På Herynken gikk hekkebestanden kraftig tilbake i perioden 1979-88. Det ble observert en positiv bestandsutvikling fram til 1990, men bestanden har etter dette gått ytterligere tilbake. I 2001 ble det laveste antallet okkuperte reir noensinne registrert (den forrige rekorden var fra 2000). Hekkebestanden på Herynken er nå 31 % av hva den var i 1979,



Figur 21. Utviklingen i hekkebestanden av polarlomvi på Hjelmsøya samt utvalgte lokaliteter på Svalbard vist som bestand (antall individer i prøvefelt) i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development (number of individuals in study plots) in some Brünnich Guillemot colonies shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.

og en ytterligere tilbakegang de nærmeste årene er sannsynlig (Anker-Nilssen & Aarvak 2001). På Bleiksøy ble det registrert en nedgang i bestanden på omkring 10 % fra 1988 til 1993. Hekkebestanden i de opprinnelige overvåkingsfeltene på Hornøy viste en signifikant økning fra begynnelsen av 1980-tallet til 1993, mens trenden har vært stabil i de nye overvåkingsfeltene som ble lagt ut i 1990.



Figur 22. Utviklingen i hekkebestanden (antall okkuperte reinganger i prøvefelt) av lunde på Runde, Sklinna, Røst (Herynken), Bleiksøy, Gjesvær og Hornøy vist som bestand i prosent av gjennomsnitt for alle år den er overvåket. For forklaring se **figur 2**. - The population development (apparently occupied burrows) in some Atlantic Puffin colonies shown as percent change in relation to the mean for all years. See **figure 2** for an explanation.

4 Sammendrag

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl ble igangsatt i 1988, og har nå pågått i fjorten felt sesonger. For en rekke arter finnes det imidlertid lengre dataserier, og en har derfor forholdsvis god kontroll på bestandsutviklingen for et utvalg av norske sjøfuglarter. De økonomiske rammene for programmet har alltid vært stramme, og innsatsen er derfor blitt kraftig redusert i forhold til de opprinnelige intensjonene. Overvåkingsprogrammet ble evaluert i perioden 1995-96 (Anker-Nilssen et al. 1996). Med de revisjoner som er satt i verk fra 1997 (Anker-Nilssen & Lorentsen 1997) mener vi at vi har et minimumsopplegg for overvåking av den årlige variasjonen i størrelse av hekkebestandene hos norske sjøfugler. For å forstå hva som regulerer bestandene er det imidlertid påkrevet med en styrking og utvidelse av overvåkingen av voksenoverlevelse, reproduksjon og næring på utvalgte nøkkelokalteter. Det burde også vært lagt inn en større innsats på bl.a. måkefugler fra Rogaland og nordover. Fra og med 2000 ble overvåkingsområder for ærfugl etablert i flere områder langs kysten, fra Østfold i sør

til Varangerfjorden i nord. Alle arter blir talt i henhold til internasjonalt anbefalt metodikk, og programmet vil på denne måten være et viktig grunnlag for norsk og internasjonal sjøfuglforskning og forvaltning. Nivået på overvåking av andre parametre (demografi, reproduksjon og næring) er imidlertid langt fra det som ble anbefalt innenfor det reviderte opplegget og foregår dessuten helt eller delvis i regi av andre prosjekter.

Havhest ble i 2001 overvåket på Markøy i Lyngdal kommune, Vest-Agder, der hekkebestanden siden etableringen i 1995 har steget fra ett til 12 par. På Herynken (Røst), Bondøy i Finnmark og Svalbard er det observert store årlige variasjoner i havhestbestanden, og det er ikke påvist signifikante trender i utviklingen av disse bestandene. For havsule var det bare kolonien på Runde som ble talt i 2001 og det ble her observert en svak nedgang i hekkebestanden fra 2000. For de andre koloniene viste tellinger i 1999 at bestanden på Skarvklakken og Hovsflesa er gått kraftig tilbake siden toppårene på slutten av 1980-tallet, kolonien på Syltefjordstauran har holdt seg relativt stabil gjennom hele 1990-tallet, mens Gjesværkolonien er i kraftig vekst.

Storskarvbestanden er i vekst i de fleste regioner som blir overvåket. Hekkebestanden fra Sør-Trøndelag til Helgeland talte i 2001 ca. 20200 par, en økning på 6700 par (50 %) siden 1996. I Vest-Finnmark har hekkebestanden holdt seg relativt stabil siden 1985, mens i Kongsfjorden er det observert en signifikant økning i hekkebestanden. For toppskarvbestanden i Rogaland, samt på Sklinna i Nord-Trøndelag, er det registrert en klar bestandsøkning siden begynnelsen av 1980-tallet, mens det på Runde er observert en like klar nedgang i samme tidsperiode. På Ellefsnyken (Røst) har toppskarvbestanden vært betydelig redusert, men er nå tilbake på det samme nivået som før 1985. Kolonien på Lille Kamøy i Finnmark ble ikke overvåket i 2001, mens det på Hornøy ble observert en rekordstor hekkebestand i 2001. Det er likevel ikke observert noen signifikant bestandstrend i denne kolonien siden overvåkingen startet i 1981.

I 2000 ble det igangsatt overvåking av ærfugl i en rekke områder langs hele kysten. For en del av disse har det vært mulig å sammenligne med eldre data. De beste overvåkingsdataene finnes fra Skagerrakkysten, som stort sett er overvåket årlig siden 1988. Resultatene viser gjennomgående en signifikant bestandsøkning i perioden 1988-2001 i alle fylker unntatt Aust-Agder. I Hordaland ser det ut til at ærfuglbestanden i fylket har økt betydelig siden midten av 1980-tallet, fra ca. 2000-3000 par i 1985 til ca. 11780 par i 2000. Fra 2000 til 2001 ble det observert en 24 % økning i Hordaland, men det er for tidlig å si hva dette skyldes. I Trondheimsfjorden tyder resultatene på en tilbakegang i hekkebestanden av ærfugl på ca. 55 % for områder uten store øy-kolonier. I områder med store øy-kolonier er det registrert en bestandsøkning på ca. 26 %. Totalt sett ser det ut til at hekkebestanden av ærfugl i Trondheimsfjorden har gått tilbake med ca. 45 % siden 1982, noe som også reflekteres i tilbakegangen i overvintringsbestanden. På Helgelandskysten ble det etablert tre overvåkingsområder som representerer indre, midtre og ytre kystområder. Fra alle disse områdene fantes data fra slutten av 1980-tallet. I indre kystområder har hekkebestanden sannsynligvis holdt seg relativt stabil i perioden etter 1985, da med unntak av noen kolonier som har vokst sterkt (mens andre har forsvunnet). I de midtre områdene av Helgelandskysten tyder sammenlignbare tellinger fra 1988, 2000 og 2001 på en relativt stabil hekkebestand. Tellingene i de ytre områdene av Helgelandskysten i 2001 ble sannsynligvis gjennomført litt for sent i hekkesesongen, men sammenligninger mellom tellingene fra 1988 og 2000 indikerer en nesten dobling av bestanden. På Røst viser sammenlignbare tellinger en halvering av hekkebestanden av ærfugl siden 1988. Ærfugl ble også talt innenfor et stort område på Mørgekysten, i Vikna-Namdalenområdet, i Troms, og i Varangerfjorden, men det har ikke vært mulig å sammenligne disse tallene med tidligere tellinger. Det er derfor for tidlig å si noe om utviklingen av ærfuglbestanden i disse områdene.

Fiskemåkebestanden i Telemark i 2001 var rekordlav, og den er nå bare 15 % av det den var på slutten av 1970-tallet. I Vest-Agder er hekkebestanden halvert siden 1989. Tellingene på Sør-Helgeland viser store årlige variasjoner og det er ikke påvist noen signifikant trend i bestandsutviklingen her. Hekkebestandene av sildemåke-undersarten *intermedius* har økt i Telemark og Vest-Agder siden midten av 1970-tallet. Denne økningen har vært

spesielt kraftig i Vest-Agder. Underarten *fuscus* ble bare talt i Sør-Helgeland i 2001, der den samlede hekkebestanden på overvåkingslokalitetene nå bare er 15 % av hva den var i 1980. Hekkebestandene av gråmåke og svartbak ser ut til å øke i alle overvåkingsområdene.

Hekkebestandene av krykkje har gått signifikant tilbake på alle overvåkingslokalitetene. Siden 1980 er bestanden på Runde, Sklinna og Røst redusert med hhv. 67 %, 90 % og 45 %. Hekkebestanden på Hornøy har vist en svak, men signifikant, negativ trend siden overvåkingen startet i 1982. For alle koloniene langs norskekysten var de registrerte hekkebestandene i 2001 rekordlave. Hekkebestanden av krykkje på Svalbard varierer mye fra år til år og med få unntak har det ikke vært mulig å påvise signifikante bestandstrender i perioden etter 1988.

Det er registrert store årlige variasjoner i hekkebestanden av makrellterne i Telemark og Vest-Agder. I begge fylkene er det registrert en negativ bestandsutvikling siden overvåkingen startet. For rødnebbterne er datagrunnlaget for dårlig til å foreta en vurdering av bestandsutviklingen.

Etter mange år med tilbakegang for lomvi i de nordnorske koloniene er tilstanden for bestanden svært alvorlig. Hvis den negative trenden fortsetter er det sannsynligvis bare et tidsspørsmål før arten forsvinner som hekkefugl i mange fuglefjell langs norskekysten. I alle koloniene der lomvi overvåkes er det registrert betydelige bestandsreduksjoner siden begynnelsen av 1980-tallet. Hekkebestandene på Hjelmsøya og Vedøya var i 2001 bare 10 % av hva de var på begynnelsen av 1980-tallet. Lomvibestanden på Hornøy har vist en positiv trend etter krakket i 1987, men er fremdeles bare halvparten av hva den var på begynnelsen av 1980-tallet. På Runde ble det i 2001 talt et rekordlavt antall av lomvi og hekkebestanden her er under halvparten av hva den var på begynnelsen av 1980-tallet. Polarlomvibestanden på Hjelmsøya er redusert med 75 % siden sist på 1980-tallet. På Svalbard viser bestanden store årlige variasjoner, men dette er trolig primært en effekt av for få tellinger hvert år. Lundebe-standen på Runde har vist en svak, men signifikant økning i perioden 1980-2001. For lundebe-standen på Røst ble det i 2001 registrert det laveste antallet trafikkerte reirganger noensinne, og hekkebestanden her er nå bare 31 % av hva den var i 1979. På Sklinna har lundebe-standen holdt seg relativt stabil siden begynnelsen på 1980-tallet, mens det på Hornøy er registrert en stabil hekkebestand i de nye overvåkingsfeltene som ble lagt ut i 1990.

5 Summary

The national monitoring programme for breeding seabirds was initiated in 1988 and has now lasted for fourteen field seasons. Longer data series exist, however, for a number of species and a relatively good impression of the long-term population development is therefore beginning to appear for the selected species. The programme has always suffered from tight funding and its scope has therefore been greatly reduced compared with the original intention. The monitoring programme was evaluated in 1995-96 (Anker-Nilssen et al. 1996). Following the revisions effectuated from 1997 (Anker-Nilssen & Lorentsen 1997), we believe we have a scheme for monitoring of population numbers of Norwegian seabirds that can be considered an absolute minimum of what is scientifically acceptable. To better understand the factors regulating the populations it is, however, necessary to strengthen and expand the monitoring of adult survival, reproduction and chick diet at a selection of key localities. From the field season of 2000, Common Eider was included in the programme and is now monitored at several locations along the whole coast. For some of these localities older data exist and allows for estimation of population trends. All the species are being counted using internationally recommended methods, and the programme is an important contribution to Norwegian and international seabird management and research.

In 2001, the Northern Fulmar population at the island of Markøy in Lyngdal municipality, Vest-Agder was monitored. This colony was established in 1995 (one pair) and the breeding population has now increased to twelve pairs. At Hernyken (Røst), Bondøy in Finnmark and Svalbard large annual variations are observed and at present significant trends cannot be detected for this species. The Northern Gannet colony at Runde was the only gannetry monitored in 2001. The results indicate a small decline in the breeding numbers from 2000 to 2001. The other Gannet colonies were monitored in 1999. Whereas the populations at Skarvklakken and Hovsflesa are significantly reduced since the end of the 1980s, the colony at Syltefjordstauran has been relatively stable throughout the 1990s. The Gjesvær colony is still in growth.

The population of Great Cormorants increases in nearly all the regions monitored. The breeding population from Sør-Trøndelag to Helgeland counted c. 20200 pairs in 2001, an increase of 6700 pairs since 1996. In Vest-Finnmark, the breeding population has been stable since 1985, whereas the population in Kongsfjord (East-Finnmark) has increased significantly. The Eurasian Shag colonies in Rogaland and at Sklinna, Nord-Trøndelag has increased since the beginning of the 1980s, whereas there has been an equally clear decrease within the same period at Runde. At Ellefsnyken (Røst) the Eurasian Shag population have been considerably reduced but it is presently (2001) at the same level as before the severe decline in 1985. The colony at Lille Kamøy in Finnmark was not monitored in 2001. Although the number of breeding pairs at Hornøy reached an all time high in 2001, there is no significant overall trend for that population since the monitoring started in 1981.

Monitoring of Common Eider was initiated at several locations along the coast in 2000. For some of these localities older data exist, giving some indications of population trends. The best data exist from the Skagerrak coast, where the species has been monitored since 1988. These results show a significant positive trend in all counties except Aust-Agder. In Hordaland county, the Common Eider population has increased from c. 2000-3000 pairs in 1985 to c. 11780 pairs in 2000. From 2000 to 2001 a further 24% increase was recorded. In the Trondheimsfjorden area, the population has decreased by c. 55% for breeding areas outside the largest island colonies, whereas an increase of c. 26% has occurred at some of the large island colonies. In total, the Common Eider population in this area seems to have decreased by c. 45% since 1982, which is comparable with the decrease in the wintering population (Husby & Lorentsen 2000, Lorentsen & Nygård in press). At the Helgeland coast, three monitoring localities were established at the inner, middle and outer coast, respectively. From all of these localities data existed from the 1980s. In the inner areas, the breeding population has been relatively stable, except for some colonies that have increased significantly (while others have disappeared). In the middle areas a 10% decrease was observed, while in the outer areas the breeding population seems to have doubled. At Røst, the population seems to be halved since 1988. Monitoring of Common Eider was also carried out at the coast of Møre, in the Vikna-Namdalen area, in Troms, and in the Varangerfjord but comparable data from earlier years do not exist from these areas.

The Mew Gull population in Telemark in 2001 was record low, and is now only 15% of its size in the late 1970s. In Vest-Agder, the breeding population is halved since 1989. In Sør-Helgeland, the number of breeding Mew Gulls are fluctuating from year to year and no significant trends are observed. The breeding population of the subspecies *intermedius* of the Lesser Black-backed Gull has increased in Telemark and Vest-Agder since the mid-1970s, particularly in Vest-Agder. The subspecies *fuscus* was only monitored in Sør-Helgeland, Nordland county in 2001. The breeding population in this region is now only 15% of its size in 1980. The nesting populations of Herring Gulls and Great Black-backed Gulls are increasing in all the colonies monitored.

The breeding populations of Black-legged Kittiwake in all colonies monitored along the Norwegian mainland have decreased significantly since 1980. The population at Runde, Sklinna and Røst are reduced by 67%, 90% and 45%, respectively, since 1980. At Hornøy the breeding population has decreased since the monitoring started in 1982. For all colonies monitored along the mainland the number of breeding birds in 2001 reached an all time low. The breeding populations of Black-legged Kittiwake at Svalbard fluctuate largely from year to year and, with very few exceptions, significant trends have not been detected.

Substantial annual variation in the nesting population of Common Terns in Telemark and Vest-Agder has been recorded. The decrease in Telemark and Vest-Agder is significant. The data for Arctic Terns are insufficient to support an evaluation of the population development.

After a number of years with decreases in the colonies of Common Guillemot in northern Norway the situation for the population is critical. If the negative trends continue the species will probably disappear from many breeding sites along the Norwegian coast. In all colonies monitored the number of breeding birds have declined significantly since the early 1980s. In 2001, the size of the breeding populations at Hjelmsøya and at Vedøy were only 10% of their levels in the early 1980s. There has been a slight increase in the Common Guillemot population at Hornøy since the crash in 1986/87. However, the population is still only half of its size in the early 1980s. At Runde, the breeding population in 2001 was record low, and the breeding population is below half its size in the early 1980s. The Brünnich Guillemot population at Hjelmsøya has decreased by 75% since the late 1980s. The Svalbard populations of this species show too large annual variation for a significant trend to be detected, but this is primarily caused by too few counts during each breeding season. The population of Atlantic Puffin at Runde has shown a slight, but significant, increase since 1980. In 2001, the number of Puffins breeding at Røst was (again) the lowest ever recorded (the previous all time low was in 2000). The breeding population at this locality is now only 31% of its size in 1979. On Sklinna, the population has been relatively stable since the early 1980s, whereas at Hornøy the population has been relatively stable in the monitoring plots established in 1990.

6 Litteratur

- Anker-Nilssen, T. & Barrett, R. T. 1991. Status of seabirds in northern Norway. - *British Birds* 84: 329-341.
- Anker-Nilssen, T. & Aarvak, T. 2001. Lundens populasjonsøkologi på Røst. Status etter hekkesesongen 2000. - NINA Oppdragsmelding 684: 1-40.
- Anker-Nilssen, T., Erikstad, K.E. & Lorentsen, S.-H. 1996. Aims and effort in seabird monitoring: an assessment based on Norwegian data. - *Wildlife Biology* 2: 17-26.
- Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 1997. Revidert plan for overvåking av hekkende sjøfugler i Norge (ekskl. Svalbard). - Notat, NINA, 6 s.
- Anon. 1988. Overvåking av norske sjøfuglbestander. Forslag fra arbeidsgruppe, 11.02.88. - Upubl. 17 s.
- Bakken, V. 1989. The population development of Common Guillemot *Uria aalge* on Vedøy, Røst. - *Fauna norv. Ser. C, Cinclus* 12: 41-46.
- Barrett, R.T. & Folkestad, A.O. 1996. The status of the North Atlantic Gannet *Morus bassanus* after 50 years in Norway. - *Seabird* 18: 30-37.
- Bevanger, K. & Thingstad, P.G. 1990. Decrease in some Central Norwegian populations of the northern subspecies of the Lesser Black-backed gull (*Larus fuscus fuscus*) and its possible causes. - *Fauna norv. Ser. C, Cinclus* 13: 19-32.
- Byrkjeland, S. Under utarb. Kartlegging av sjøfuglforekomstene på Vestlandskysten 2000-2004. Delrapport 1: Vurdering av ærfuglbestanden *Somateria mollissima* i Hordaland. - Fylkesmannen i Hordaland. MVA-Rapport xx/00.
- Erikstad, K.E., Anker-Nilssen, T., Asheim, M., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Jacobsen, K.-O., Johnsen, I., Sæther, B.-E. & Tveraa, T. 1994. Hekkeinvestering og voksendødelighet hos norske sjøfugler. - NINA Forskningsrapport 49: 1-25.
- Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S. & Byrkjeland, S. (red.) 1994. Norsk fugleatlas. - Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu.
- Husby, M. & Lorentsen, S.-H. 2000. Sjøfugl i fjordbassenget. s. 185-199 I Sakshaug, E. & Sneli, J.A. (red.) Trondheimsfjorden. Tapir forlag, Trondheim.
- Håland, A. 1985. Taksering av mytende ærfugl *Somateria mollissima* i SV-Norge. - *Zool. Museum, Univ. i Bergen, rapp. Ornitologi nr. 22*: 1-25.
- Krasnov, J.V. & Barrett, R.T. 1996. Large-scale interactions among seabirds, their prey and humans in the southern Barents Sea. I Skjoldal, H.R., Hopkins, C., Erikstad, K.E. & Leinaas, H.P. (red.). *Ecology of Fjords and Coastal Waters*. Elsevier Science B.V., Amsterdam.
- Lorentsen, S.-H. 1989. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Takseringsmanual. - NINA Oppdragsmelding 16: 1-27.
- Lorentsen, S.-H. 1990. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1988 og 1989. - NINA Oppdragsmelding 34: 1-72.
- Lorentsen, S.-H. 1991a. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1990. - NINA Oppdragsmelding 66: 1-40.

- Lorentsen, S.-H. 1991b. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1991. - NINA Oppdragsmelding 95: 1-52.
- Lorentsen, S.-H. 1992. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1992. - NINA Oppdragsmelding 166: 1-60.
- Lorentsen, S.-H. 1994. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1994. - NINA Oppdragsmelding 314: 1-67.
- Lorentsen, S.-H. 1995. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1995. - NINA Oppdragsmelding 374: 1-67.
- Lorentsen, S.-H. 1996. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1996. - NINA Oppdragsmelding 450: 1-62.
- Lorentsen, S.-H. 1997. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1997. - NINA Oppdragsmelding 516: 1-63.
- Lorentsen, S.-H. 1998. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1998. - NINA Oppdragsmelding 565: 1-75.
- Lorentsen, S.-H. 1999. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra hekkesesongen 1999. - NINA Oppdragsmelding 626: 1-28.
- Lorentsen, S.-H. 2000. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater til og med hekkesesongen 2000. - NINA Oppdragsmelding 670: 1-30.
- Lorentsen, S.-H. & Nygård, T. 2001. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl. Resultater fra overvåkingen av overvintrende sjøfugl fram til 2000. - NINA Oppdragsmelding 717: 1-62.
- Lorentsen, S.-H. & Rofstad, G. 1982. Registreringer av hekkende ærfugl i Trondheimsfjorden våren 1982. Stensil 38s.
- Lloyd, C., Tasker, M.L. & Partridge, K. 1991. The status of seabirds in Britain and Ireland. T & A D Poyser, London.
- Røv, N., red. 1984. Sjøfuglprosjektet 1979-1984. - Viltrapport 35: 1-109.
- Røv, N. 1986. Bestandsforhold hos sildemåke *Larus fuscus* i Norge med hovedvekt på *L. f. fuscus*. - Vår Fuglefauna 9: 79-84.
- Thingstad, P.G. 1986. Sildemåke - pilotprosjekt på en truet underart. - Økoforsk Utredning 1986,3: 1-50.
- Thingstad, P.G., Hokstad, S., Frengen, O. & Strømgren, T. 1994. Vannfugl og marin bunndyrfauna i Ramarområdet på Tautra, Nord-Trøndelag. Konsekvenser av steinmoloen over Svæet. Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet. Rapport Zoologisk serie 1994-8: 1-41.
- Walsh, P.M., Halley, D.J., Harris, M.P., del Nevo, A., Sim, I.M.W. & Tasker, M.L. 1995. Seabird monitoring handbook for Britain and Ireland. JNCC / RSPB / ITE / Seabird Group, Peterborough.
- Østnes, J. E. 1993. Det nasjonale overvåkingsprogrammet for hekkende sjøfugl. Resultater fra 1993. - NINA Oppdragsmelding 241: 1-60.

Vedlegg 1

Personer og institusjoner ansvarlige for gjennomføringen av overvåkingen på enkeltlokaliteter. - *Persons and institutions responsible for the monitoring programme at the localities.*

Lokalitet Locality	Art Species	Navn og adresse Name and address
Telemark	Alle måker og terner All gulls and terns	NOF avd. Telemark Boks 1076, 3701 Skien Fylkesmannen i Telemark, MVA Boks 287, 3701 Skien
Vest-Agder	Alle måker og terner All gulls and terns	NOF avd. Vest-Agder Boks 475, 4501 Mandal Fylkesmannen i Vest-Agder, MVA Tinghuset, 4600 Kristiansand
Rogaland	Havhest, toppskarv, sildemåke N. Fulmar, E. Shag, Lesser Black-backed Gull	Fylkesmannen i Rogaland Postb. 59, 4001 Stavanger NOF avd. Rogaland Boks 771, 4001 Stavanger
Møre	Sildemåke Lesser Black-backed Gull	Alv Ottar Folkestad Ulsteinvik kommune 6065 Ulsteinvik, Tlf. 7001 20 00
Møre og Runde	Havhest, havsule, toppskarv, krykkje, lomvi, lunde N. Fulmar, N. Gannett, E. Shag, Bl.-I. Kittiwake, C. Guillemot, A. Puffin	Alv Ottar Folkestad Ulsteinvik kommune 6065 Ulsteinvik, Tlf. 70 01 20 00
Skinna	Toppskarv, krykkje, lunde E. Shag, Bl. I. Kittiwake, A. Puffin	Torgeir Nygård, NINA Tungasletta 2, 7485 Trondheim Tlf. 73 80 14 00
Froan - Sør-Helgeland	Storskarv G. Cormorant	Nils Røv, NINA Tungasletta 2, 7485 Trondheim Tlf. 73 80 14 00
Sør-Helgeland	Sildemåke Lesser Black-backed Gull	NOF avd. Rana Postb. 301 8601 Mo i Rana
Røst	Havhest, toppskarv, krykkje, alke, lomvi, lunde N. Fulmar, E. Shag, Bl. I. Kittiwake, Razorbill, C. Guillemot, A. Puffin	Tycho Anker-Nielsen, NINA Tungasletta 2, 7485 Trondheim Tlf. 73 80 14 00
Vesterålen	Havsule, storskarv N. Gannet, G. Cormorant	Rob Barrett Tromsø museum, 9037 Tromsø Tlf. 77 64 50 00
Anda + Bleik	Lunde A. Puffin	Rob Barrett Tromsø museum, 9037 Tromsø Tlf. 77 64 50 00
Vest-Finnmark	Storskarv G. Cormorant	Karl-Birger Strann/Jan Ove Bustnes NINA, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø Tlf. 77 75 04 00
Kamøy/Sørøy	Toppskarv E. Shag	Karl Birger Strann/Jan Ove Bustnes NINA, Polarmiljøsenteret, 9296 Tromsø Tlf. 77 75 04 00

Fortsetter neste side

Fortsettelse fra forrige side

Lokalitet <i>Locality</i>	Art <i>Species</i>	Navn og adresse <i>Name and address</i>
Gjesvær/Hjelmsøy	Storjo, alke, lomvi, polarlomvi, lunde Great Skua, Razorbill, C. Guillemot, B. Guillemot A. Puffin	Karl-Birger Strann/Jan Ove Bustnes NINA, Polarmiljøsentret, 9296 Tromsø Tlf. 77 75 04 00
Syltefjordstauran	Havsule, lomvi, polarlomvi N. Gannet, C. Guillemot, B. Guillemot	Rob Barrett Tromsø museum, 9037 Tromsø Tlf. 77 64 50 00
Hornøy	Toppskarv, krykkje, lomvi, polarlomvi, lunde E. Shag, Bl.-I. Kittiwake, C. Guillemot, B. Guillemot A. Puffin	Rob Barrett Tromsø museum, 9037 Tromsø Tlf. 77 64 50 00
Svalbard	Havhest, krykkje, lomvi og polarlomvi N. Fulmar, Bl.-I. Kittiwake, C. Guillemot, B. Guillemot	Norsk Polarinstitut, Polarmiljøsentret 9296 Tromsø Tlf. 77 75 05 00

Vedlegg 2

Oversikt over lokalitetene som inngår i overvåkingsprogrammet. For lokalitetene på Spitsbergen/Edgeøya og Bjørnøya er koordinater gitt som grader og minutter, på resten av lokalitetene som UTM-angivelse. Koder for arter: HH = havhest, HS = havsule, SS = storskarv, TS = toppskarv, SJ = storjo, FM = fiskemåke, SM = sildemåke, GM = gråmåke, SB = svartbak, KK = krykkje, RT = rødnebbterne, MT = makrellterne, LO = lomvi, PL = polarlomvi, TE = teist, LU = lunde. For storskarvkoloniene er også oppført hvilken region de tilhører. - *List of localities counted in the monitoring programme. Geographical coordinates for the localities are given as UTM-coordinates except for Svalbard where they are given as degrees. Codes for species: HH = Northern Fulmar, HS = Northern Gannet, SS = Great Cormorant, TS = Eurasian Shag, SJ = Great Skua, FM = Mew Gull, SM = Lesser Black-backed Gull, GM = Herring Gull, SB = Greater Black-backed Gull, KK = Black-legged Kittiwake, RT = Arctic Tern, MT = Common Tern, LO = Common Guillemot, PL = Brünnich's Guillemot, TE = Black Guillemot, LU = Atlantic Puffin.*

Lok. nummer	Lokalitetsnavn	Kommune	Fylke	Geografiske koordinater	Arter
Loc. number	Locality name	Municipality	County	Geographical coordinates	Species
01001	Bile	Moss	Østfold	32VNL940980	FM, GM, SB, MT
01002	Eggholmen	Moss	Østfold	32VNL944927	FM, MT
01003	Gullholmen	Moss	Østfold	32VNL898898	FM, SM, GM, MT
01004	Kulpeholmen	Moss	Østfold	32VNL954954	FM, SB, MT, GM
01005	Gåseskjær	Fredrikstad	Østfold	32VPL124548	FM, GM
01006	Namnløs	Fredrikstad	Østfold	32VPL145598	FM
01007	Rognholmen	Fredrikstad	Østfold	32VPL126595	FM
01008	Tuppa	Fredrikstad	Østfold	32VPL126599	FM, GM, MT
01009	Bjørneskjær	Hvaler	Østfold	32VPL218517	FM, SM, GM, SB
01010	Gule Sten	Hvaler	Østfold	32VPL091559	FM, SM, GM
01011	Fredagshullet	Hvaler	Østfold	32VPL062552	MT, RT
01012	Gåseskjær	Hvaler	Østfold	32VPL124548	SM, GM
01013	Heia	Hvaler	Østfold	32VPL076375	SM, GM
01014	Isekskjær	Hvaler	Østfold	32VPL187522	SB
01015	Kaninholmen	Hvaler	Østfold	32VPL223533	FM, MT
01016	Kobbernagelen	Hvaler	Østfold	32VPL097478	FM, MT, RT, SM, GM
01017	Kvernskjær	Hvaler	Østfold	32VPL134454	SM, GM, SB, MT
01018	Langnesholmen	Hvaler	Østfold	32VPL090554	FM, GM, MT
01019	L. Angeret	Hvaler	Østfold	32VPL154416	SM, GM
01020	Holme m/Furu-Siljeh.	Hvaler	Østfold	32VPL105557	FM, GM
01021	Lyngholmen	Hvaler	Østfold	32VPL048538	FM, SM, GM
01022	Møkkalasset	Hvaler	Østfold	32VPL136533	SM, GM
01023	Møren	Hvaler	Østfold	32VPL134402	FM, SM, GM, MT, RT
01024	Måsholmane	Hvaler	Østfold	32VPL087563	FM, SM, GM
01025	N. Seilø	Hvaler	Østfold	32VPL066558	MT, RT
01026	Nordbåane	Hvaler	Østfold	32VPL042530	FM, SM, GM, SB, MT
01027	Nøtskjær	Hvaler	Østfold	32VPL185466	FM, MT
01028	Sandholmen	Hvaler	Østfold	32VPL122501	FM, GM, MT, RT
01029	Sauedauen	Hvaler	Østfold	32VPL116535	FM
01030	Skånholmen	Hvaler	Østfold	32VPL209481	SM, GM
01031	Skjellholmen	Hvaler	Østfold	32VPL080492	FM, SM, GM, SB, MT
01032	Skomakerskjæra	Hvaler	Østfold	32VPL105545	FM, SM, SB, MT, GM
01033	Små Rødskjær	Hvaler	Østfold	32VPL225479	FM, MT
01034	Stamholmene	Hvaler	Østfold	32VPL151533	SM, GM
01035	Styve	Hvaler	Østfold	32VPL134490	FM, MT, RT
01036	Søndre Kuskjær	Hvaler	Østfold	32VPL142493	FM
01037	Søpla	Hvaler	Østfold	32VPL167434	FM, MT
01038	Utengskjæra	Hvaler	Østfold	32VPL156528	SM, GM, SB
01039	Vestre Rødskjær	Hvaler	Østfold	32VPL211488	FM, SM, SB
01040	Østre Rødskjær	Hvaler	Østfold	32VPL224476	SM, GM, SB
01041	Ølbergholmen	Hvaler	Østfold	32VPL127406	SB, MT
01042	Bevøskjærene	Borge	Østfold	32VPL166559	SM, GM, FM
01043	Fugleskjæra	Borge	Østfold	32VPL136547	SM, FM, GM
01044	Hasle	Borge	Østfold	32VPL145573	SM, GM
01045	Møkkalassa	Borge	Østfold	32VPL152572	FM, SM, GM, SB
01046	Terneskjær	Borge	Østfold	32VPL179559	FM, SM, MT, GM
01047	Haslau	Skjeberg	Østfold	32VPL242547	SM, GM, MT
01048	Skjær i Kallsøys.	Skjeberg	Østfold	32VPL223592	FM, MT, RT
01049	Skjær v/n. Kalsø	Skjeberg	Østfold	32VPL232580	FM
01050	Mule	Kråkerøy	Østfold	32VPL083575	FM, SM, GM, MT, RT
01051	Bløte	Onsøy	Østfold	32VPL038611	FM
01052	Flateguri	Onsøy	Østfold	32VNL992652	SB
01053	Garnholmene S.	Onsøy	Østfold	32VPL012624	SM, GM, SB

Fortsetter neste side

Fortsettelse fra forrige side

Lok. nummer	Lokalitetsnavn	Kommune	Fylke	Geografiske koordinater	Arter
Loc. number	Locality name	Municipality	County	Geographical coordinates	Species
01054	Gåseskjæra	Onsøy	Østfold	32VPL004639	FM, SM, MT, RT
01055	Kjelholmen	Onsøy	Østfold	32VPL027626	FM
01056	Langskjær	Onsøy	Østfold	32VPL031622	FM, GM, RT
01057	Lille Marnet	Onsøy	Østfold	32VPL064602	FM, SM, MT
01058	Luseskjær	Onsøy	Østfold	32VPL038605	FM, MT
01059	N. Flatskjær	Onsøy	Østfold	32VPL035600	FM, MT
01060	Nordre Missingen	Onsøy	Østfold	32VNL986620	SM, GM, FM
01061	Ovn skjær (Missingen)	Onsøy	Østfold	32VNL980603	FM, GM, SB, MT
01062	Struten	Onsøy	Østfold	32VNL997547	SM, GM, FM
01063	Søndre Missingen	Onsøy	Østfold	32VNL978608	SM, GM
01064	Labuholmen	Råde	Østfold	32VNL995782	FM, SM, GM, SB, MT
01065	Mellom Sletter	Råde	Østfold	32VNL956737	FM, SM, GM
01066	Store Knappholmen	Råde	Østfold	32VNL987779	FM, SM, GM, SB
01067	Store Sletter	Råde	Østfold	32VNL950750	FM, SM, GM, SB
01068	Store Sletter (Res)	Råde	Østfold	32VNL948744	FM, SM, GM, SB, MT
01069	Søndre Sletter	Råde	Østfold	32VNL957728	FM, SM, GM, SB, MT
01070	Taralden	Råde	Østfold	32VNL970755	FM, SM, GM, SB, MT
01071	Vesle Knappholmen	Råde	Østfold	32VNL987775	FM, GM, SB, MT
01072	Eldøya	Rygge	Østfold	32VNL940775	FM, GM, SB
01073	Eldøya (Reservat)	Rygge	Østfold	32VNL936779	FM, SM, GM, SB, MT
01074	Kollen	Rygge	Østfold	32VNL940786	GM
01075	Lille Revlingen	Rygge	Østfold	32VNL930853	FM, SM, GM, SB, MT
01076	Store Revlingen	Rygge	Østfold	32VNL928858	FM, SM, GM, SB, MT
08001	Furuholmen	Porsgrunn	Telemark	32VNL470442	FM, GM, MT
08002	Vestre skjæret	Porsgrunn	Telemark	32VNL451470	FM, GM, SB, MT
08003	Lagmannskjær	Skien	Telemark	32VNL334533	FM, GM, MT
08004	Omborsnesholmane	Bamble	Telemark	32VNL382460	FM, SM, GM, SB, MT
08005	Krokshavn	Bamble	Telemark	32VNL425400	FM, GM, MT
08006	Lille Såstein	Bamble	Telemark	32VNL409372	FM, SM, GM, SB, MT
08007	Kråka	Bamble	Telemark	32VNL391362	FM, SM, GM, SB, MT
08008	Lindholmane	Bamble	Telemark	32VNL362338	FM, GM, SB, MT
08009	Selskjæra	Bamble	Telemark	32VNL303325	FM, GM, SB, MT
08010	Stråholmsteinen	Kragerø	Telemark	32VNL399318	FM, SM, GM, SB, MT
08011	Rauholmane	Kragerø	Telemark	32VNL383301	FM, SM, GM, SB, MT
08012	Lille Danmark	Kragerø	Telemark	32VNL369312	FM, SM, GM, SB, MT
08013	Torskholmen	Kragerø	Telemark	32VNL342300	FM, SM, GM, SB, MT
08014	Ropen	Kragerø	Telemark	32VNL321287	FM, SM, GM, SB, MT
08015	Stutsholmskjæra	Kragerø	Telemark	32VNL335269	FM, SM, GM, SB, MT
08016	Geitholmsundet	Kragerø	Telemark	32VNL315275	FM, GM, SB, MT
08017	Gjess- og Stangskj.	Kragerø	Telemark	32VNL330250	FM, SM, GM, SB, MT
08018	Hattholmen	Kragerø	Telemark	32VNL321249	FM, SM, GM, SB, MT
08019	Skadden	Kragerø	Telemark	32VNL321222	FM, SM, GM, SB, MT
08020	Østre Raudane	Kragerø	Telemark	32VNL303227	FM, SM, GM, SB, MT
08021	Tviskjær	Kragerø	Telemark	32VNL249197	FM, SM, GM, SB, MT
08022	Rognholmen	Kragerø	Telemark	32VNL260239	FM, GM, SB, MT
08023	Bukkholmskjæra	Kragerø	Telemark	32VNL224288	FM, GM, SB, MT
08024	Teineskjær	Kragerø	Telemark	32VNL202238	FM, SM, GM, SB, MT
08025	Lille Fengsholmen	Kragerø	Telemark	32VNL267203	FM, SM, GM, SB, MT
08026	Kjeholmskjæra	Kragerø	Telemark	32VNL230185	FM, GM, SB, MT
08027	Beverkjæra	Kragerø	Telemark	32VNL342263	FM, GM, SB, SM, MT
08028	Vestre Rauen	Bamble	Telemark	32VNL387344	FM, GM, SB, SM
08029	Båten	Kragerø	Telemark	32VNL214274	MT
08030	L. Bikkjeholmen	Kragerø	Telemark	32VNL232294	MT
08031	Fantholmane	Kragerø	Telemark	32VNL234296	MT
08032	Tornholmen	Kragerø	Telemark	32VNL245288	MT
08033	Soppekilen	Kragerø	Telemark	32VNL267296	MT
08034	Matløs	Kragerø	Telemark	32VNL253294	MT
08035	Hl. ø f Bjørketangen	Kragerø	Telemark	32VNL272286	MT
08036	Askholmane	Kragerø	Telemark	32VNL360315	MT
08037	Dynga	Kragerø	Telemark	32VNL369311	MT
10001	Storskjær	Mandal	Vest-Agder	32VMK194278	SM, SB
10002	Kjellingø	Mandal	Vest-Agder	32VMK188275	SM, GM, SB
10003	Nordreskjær	Mandal	Vest-Agder	32VMK192280	SM, GM, SB
10004	Store Slettingen	Mandal	Vest-Agder	32VMK110258	FM, SM, GM, SB

Fortsetter neste side

Fortsettelse fra forrige side

Lok. nummer	Lokalitetsnavn	Kommune	Fylke	Geografiske koordinater	Arter
Loc. number	Locality name	Municipality	County	Geographical coordinates	Species
10005	Rauna	Farsund	Vest-Agder	32VLK626379	FM, SM, GM, SB, RT
10006	Flatholmen	Farsund	Vest-Agder	32VLK660398	MT
10007	Kamelen	Farsund	Vest-Agder	32VLK666404	MT
10008	Agneskjær	Lindesnes	Vest-Agder	32VLK918320	SM, GM, SB
10009	Brattholmen	Kr.sand	Vest-Agder	32VMK523436	SM, GM
10010	Grønningen fyr	Kr.sand	Vest-Agder	32VMK463382	FM, MT
10011	Jakobsholmen	Lyngdal	Vest-Agder	32VLK794446	MT
10012	Teistholmen	Mandal	Vest-Agder	32VMK019318	FM
10013	Kråga, Lunde vågen	Farsund	Vest-Agder	32VLK695402	MT
10014	Lille Slettingen	Mandal	Vest-Agder	32VMK112257	SM, GM, SB
10015	Markøy	Lyngdal	Vest-Agder	32VLK810308	SM, GM, SB
10016	Merra	Lindenes	Vest-Agder	32VLK999330	SB
10017	Laukholmen	Mandal	Vest-Agder	32VMK166282	FM, SM
10018	Revsund	Kr.sand	Vest-Agder	32VMK506417	MT
10019	Sandøy	Mandal	Vest-Agder	32VMK149264	SM, GM, SB
10020	Skarviksteinen	Farsund	Vest-Agder	32VLK808386	MT
10021	Holmer ved Helle	Farsund	Vest-Agder	32VLK789411	MT
10022	Skjær østre Langøy	Farsund	Vest-Agder	32VLK752380	MT
10023	Skydsjær	Farsund	Vest-Agder	32VLK716407	MT
10024	Store Lyngholmen	Søgne	Vest-Agder	32VMK363357	SM
10025	I. Kopperholmen	Mandal	Vest-Agder	32VMK136287	FM, MT
10026	Holmer ved Tranvåg	Farsund	Vest-Agder	32VLK788373	MT
10027	Ullerøya	Farsund	Vest-Agder	32VLK774358	FM, GM, SB
10028	Åndreholmane	Farsund	Vest-Agder	32VLK799363	MT
10029	Farestadholmen	Mandal	Vest-Agder	32VMK131277	FM
10030	Hovsholmen	Mandal	Vest-Agder	32VMK034327	FM
10031	L. Vigeholmen	Mandal	Vest-Agder	32VLK909336	FM
10032	Olavskjærene	Lindesnes	Vest-Agder	32VLK961328	FM
10033	Valløy	Mandal	Vest-Agder	32VMK198435	SM
10034	L. Vengelsholmen	Mandal	Vest-Agder	32VMK137265	GM
10035	Klovholmene	Mandal	Vest-Agder	32VMK014319	SB, MT
10036	Langholmen	Mandal	Vest-Agder	32VMK170308	MT
10037	Landekilen	Mandal	Vest-Agder	32VMK056322	MT
10038	Langøyskjærene	Mandal	Vest-Agder	32VMK164294	MT
10039	Nebeholmen	Mandal	Vest-Agder	32VMK130275	MT
10040	Stølsholmen	Mandal	Vest-Agder	32VMK133279	MT
10041	Bjørsvikskjærene	Farsund	Vest-Agder	32VLK697427	MT
10042	Termeholmen	Farsund	Vest-Agder	32VLK746394	MT
10043	S. Vigeholmen	Lindesnes	Vest-Agder	32VLK906332	MT
11001	Kjørholmane	Sola	Rogaland	32VKL947330	HH, TS
11002	Jarsteinen	Karmøy	Rogaland	32VKL813633	TS, SM
11003	Ferkingstadøyene	Karmøy	Rogaland	32VKL757728	HH, TS
11004	Spannholmene	Utsira	Rogaland	32VKL660815	TS
11005	Urter	Karmøy	Rogaland	32VKL745880	HH, TS
11006	Storekjør	Sola	Rogaland	32VKL948333	SM, TS
11007	Løten	Bokn	Rogaland	32VKL936645	SM
11008	Ryvingen	Karmøy	Rogaland	32VKL808778	SM
11009	Skardholmen	Karmøy	Rogaland	32VKL746884	SM
11010	Utsira	Utsira	Rogaland	32VKL637792	HH, SM
11011	Hengsøya	Sola	Rogaland	32VKI945323	TS
11013	Nordkjør	Sola	Rogaland	32VKL955337	TS
11014	Lille Foksteinen	Sokndal	Rogaland	32VLK416654	HH
11015	Store Foksteinen	Sokndal	Rogaland	32VLK421654	HH
11016	Midbrødøyni	Eigersund	Rogaland	32VLK172816	SM
11017	Vedafjellet	Eigersund	Rogaland	32VLK193819	SM
11018	Tingelsæte	Eigersund	Rogaland	32VLK248792	SM
11019	Svåholmane	Eigersund	Rogaland	32VLK270745	SM
11020	Bru-Kjæøy	Rennesøy	Rogaland	32VLL090479	SM
11021	Horje	Strand	Rogaland	32VLL183463	SM
11022	Hidle-Kjæøy	Strand	Rogaland	32VLL163492	SM
11023	Rott	Sola	Rogaland	32VKL991356	SM
11024	Skarvholmen	Karmøy	Rogaland	32VKL745876	SM
11025	Skåreholmen	Haugesund	Rogaland	32VKL847944	SM
11026	Terneeskjær	Bokn	Rogaland	32VKL951632	SM
11027	Ognøykalven	Bokn	Rogaland	32VKL995755	SM
11028	Kråke	Bokn	Rogaland	32VKL955625	SM

Fortsetter neste side

Fortsettelse fra forrige side

Lok. nummer	Lokalitetsnavn	Kommune	Fylke	Geografiske koordinater	Arter
Loc. number	Locality name	Municipality	County	Geographical coordinates	Species
11029	Nautøya	Bokn	Rogaland	32VLL033715	SM
11030	Aksdalsneset	Bokn	Rogaland	32VKL994692	SM
11031	Dyngjo	Sokndal	Rogaland	32VLK423662	HH
11032	Beiningen	Utsira	Rogaland	32VKL665802	HH
12001	Sotrabraua-Knappen	Fjell	Hordaland	32VKN885005	Æ
12002	Hjartøy-Bleikenøvlingen	Øygarden	Hordaland	32VKN840010	
12003	Ågotnes-Ulvsundet	Øygarden	Hordaland	32VKN780090	
12004	Krabbesjoneset-Forhjelmo	Øygarden	Hordaland	32VKN730270	
12005	Svinetangen-Vikso	Sund	Hordaland	32VKN850770	
12006	Tekslo-Risøyna	Sund	Hordaland	32VKN780780	
12007	Færøy-Sængen	Sund	Hordaland	32VKN770850	
12008	Hjelteskjæret-Ramsøy	Askøy	Hordaland	32VKN870060	
12009	Hanøyklubben-Herdlabrua	Askøy	Hordaland	32VKN810150	
12010	Herdlabrua-Heggerneset	Askøy	Hordaland	32VKN830170	
12011	Heggerneset-Hjelteskjæret	Askøy	Hordaland	32VKN930100	
14001	Veststeinen	Bremanger	Sogn og Fjordane	32VKN827705	LU
14002	Prestøy	Askvoll	Sogn og Fjordane	32VKN893067	SM
14003	Barekstadlandet	Flora	Sogn og Fjordane	32VKN827450	SM
14004	Utvær	Solund	Sogn og Fjordane	32VKN579755	TS, LU
14005	Nord Hovden	Flora	Sogn og Fjordane	32VKN824489	GM
15001	Runde	Herøy	Møre og Romsdal	32VLQ255235	HS, TS, KK, LO, LU
15002	Sortna	Smøla	Møre og Romsdal	32VMR352236	SM
15003	Erkna	Giske	Møre og Romsdal	32VLQ428395	HH
15004	Rimøya	Herøy	Møre og Romsdal	32VLQ260200	SJ
15005	Leinøya	Herøy	Møre og Romsdal	32VLQ300170	SJ
15006	Nerlandsøya	Herøy	Møre og Romsdal	32VLQ220180	SJ
16001	Melstein	Bjugn	S-Trøndelag (Melstein)	32VNR290940	SS
16002	Baaskjæret	Frøya	S-Tr.lag (Froan Nord)	32WNS064069	SS
16003	Kristianskjæret	Frøya	S-Tr.lag (Froan Nord)	32WNS149074	SS
16004	Tvillingan	Frøya	S-Tr.lag (Froan Nord)	32WNS138099	SS
16005	Helvete	Frøya	S-Tr.lag (Froan Nord)	32WNS145141	SS
16006	Brattflesa	Frøya	S-Tr.lag (Froan Nord)	32WNS149133	SS
16007	Ø for Andstein	Frøya	S-Tr.lag (Froan Sør)	32VMR998936	SS
16008	Svartskjæret	Frøya	S-Tr.lag (Froan Sør)	32VNR009954	SS
16009	Skaaskjæra	Frøya	S-Tr.lag (Froan Sør)	32VNR022993	SS
16010	Oterholmen-Beinholm.	Frøya	S-Tr.lag (Grogna) ^a	32VMR910910	SS
16011	Hågjælan	Frøya	S-Tr.lag (Sula)	32VMR685757	SS
16012	Hilbåskjæret	Frøya	S-Tr.lag (Sula)	32VMR691684	SS
16013	Vasskjæret	Frøya	S-Tr.lag (Sula)	32VMR688695	SS
16014	Hannaskjæret	Frøya	S-Tr.lag (Sula)	32VMR696728	SS
16015	Trettskjæra	Frøya	S-Tr.lag (Froan Sør)	32VMR999906	SS
16016	Anstein	Bjugn	S-Tr.lag (Melstein)	32VNR271917	SS
16017	Somstadflesa	Roan	S-Tr.lag (Roan)	32WNS570280	SS
17001	Rundskjær-Sølbuflesa	Leka	N-Tr.lag (Helgeland-S)	32WPT107366	SS
17002	Langdraget	Leka	Nord-Trøndelag	32WPT169346	SM
17003	Dreplan	Leka	Nord-Trøndelag	32WPT144327	SM
17004	Steinsflesan	Leka	Nord-Trøndelag	32WPT177265	SM
17005	Strålø, Sklinna	Leka	N-Tr.lag (Sklinna)	32WNT915343	SS
17006	Rundflesa, Sklinna	Leka	N-Tr.lag (Sklinna)	32WNT925240	SS
17007	Flatflesa, Sklinna	Leka	N-Tr.lag (Sklinna)	32WNT922240	SS
17008	Maaø, Sklinna	Leka	N-Tr.lag (Sklinna)	32WNT918342	SS, TS
17009	Lyngbraken	Vikna	Nord-Trøndelag (Vikna)	32WNS776779	SS
17010	Burflesa	Vikna	Nord-Trøndelag (Vikna)	32WNS720855	SS
17011	Nordøybura	Vikna	Nord-Trøndelag (Vikna)	32WNS724861	SS
17012	Ytre Brosmeflesa	Vikna	Nord-Trøndelag (Vikna)	32WNS735898	SS
17013	Skarvskjær	Vikna	Nord-Trøndelag (Vikna)	32WNT804016	SS
17014	Heimøya, Sklinna	Leka	Nord-Trøndelag	32WNT933325	TS, KK, LU
17015	Hansholmen, Sklinna	Leka	Nord-Trøndelag	32WNT934330	TS
17016	Skarholmen, Sklinna	Leka	Nord-Trøndelag	32WNT921327	TS
17017	Lyngholmen, Sklinna	Leka	Nord-Trøndelag	32WNT962336	TS
17018	Korsholmen	Vikna	Nord-Trøndelag (Vikna)	32WNT763832	SS
17019	Sklinnaflesene	Vikna	N-Tr.lag (Sklinna)	32WNT930240	SS
17020	Sørøybuna	Vikna	N-Tr.lag (Vikna)	32WNT746819	SS
17021	Ertnbraken	Vikna	N-Tr.lag (Vikna)	32WNS884853	SS
17022	Fruflesa	Vikna	N-Tr.lag (Vikna)	32WNS731983	SS
18001	Anda	Øksnes	Nordland	33WWS070620	LU

Fortsetter neste side

Fortsettelse fra forrige side

Lok. nummer	Lokalitetsnavn	Kommune	Fylke	Geografiske koordinater	Arter
Loc. number	Locality name	Municipality	County	Geographical coordinates	Species
18002	Hovsflesa	Vågan	Nordland	33WVR593848	HS, SS
18003	Lille Ulvøyholmen	Bø	Nordland	33WVS802004	SS
18004	Fyllingen	Bø	Nordland	33WVS702132	SS
18005	Uflesøyen	Bø	Nordland	33WVS694159	SS
18006	Skarvklakken	Andøy	Nordland	33WWS268724	HS, SS
18007	Kårøy	Røst	Nordland	33WUQ755905	KK
18008	Gjelfruvær	Røst	Nordland	32WPV245816	KK
18009	Ellefsnyken	Røst	Nordland	32WPV247843	TS
18010	Vedøy	Røst	Nordland	33WUQ725880	KK, LO
18011	Røstholmen	Røst	Nordland	33WUQ725871	KK
18012	Hernyken	Røst	Nordland	32WPV234820	LU
18013	Aasbraken	Lurøy	Nordland (Træna-Myken)	33WUP892780	SS
18014	Seiholmen	Lurøy	Nordland (Træna-Myken)	33WUP901893	SS
18015	Havsula	Træna	Nordland (Træna-Myken)	33WUP740928	SS
18016	Skarvholmen	Rødøy	Nordland (Træna-Myken)	33WVQ013137	SS
18017	Indmyken	Rødøy	Nordland (Træna-Myken)	33WUQ890023	SS
18018	Vestre Skarvholmen	Herøy	Nordland (Helgeland-N)	32WPU258282	SS
18019	Knarholmen	Herøy	Nordland (Helgeland-N)	32WPU357300	SS
18020	Vest for Sakrisøy	Herøy	Nordland (Helgeland-N)	32WPU664368	SS
18021	Bleiksøy	Andøy	Nordland	33WWS345854	LU
18022	Floholmen	Herøy	Nordland (Helgeland-N)	32WPU212417	SS
18023	Holme sør for Brakva	Dønna	Nordland (Helgeland-N)	33WUP698480	SS
18024	Gåsflesan	Vega	Nordland (Vega)	32WPT210700	SS
18025	Ivarsbraken	Vega	Nordland (Vega)	32WPT171864	SS
18026	Sjøla	Vega	Nordland (Vega)	32WPT062833	SS
18027	Havnøya	Vega	Nordland (Vega)	32WPT060762	SS
18028	Nordvær	Vega	Nordland (Vega)	32WPU193003	SS
18029	Flesknakskjær	Vega	Nordland (Vega)	32WPU296157	SS
18030	Store Skarvflesa	Vega	Nordland (Vega)	32WPU283166	SS
18031	Sjølholman	Vega	Nordland (Vega)	32WPT045770	SS
18032	Mudvær S	Vega	Nordland	32WPT245745	SM
18033	Skarvøya	Brønnøy	Nordland	32WPT328586	SM
18034	Kvalflesa	Brønnøy	Nordland	32WPT319498	SM
18035	Kiskjæret	Brønnøy	Nordland	32WPT255508	SM
18036	Buholmen	Sømna	Nordland	32WPT227456	SM
18037	Buøya	Sømna	Nordland	32WPT227468	SM
18038	Kiskjæret	Sømna	Nordland	32WPT222468	SM
18039	Maritholmen	Sømna	Nordland	32WPT223478	SM
18040	Jøvan	Sømna	Nordland	32WPT232435	SM
18041	Terjan	Sømna	Nordland	32WPT222420	SM
18042	Raubræken	Bindal	Nordland	32WPT247395	SM
18043	Gåsflesan	Bindal	Nordland	32WPT211380	SM
18044	Svartskjæret	Sømna	Nordland (Helgeland-S)	32WPT200420	SS
18045	Kalvan	Sømna	Nordland (Helgeland-S)	32WPT282410	SS
18046	Skarvflesa	Sømna	Nordland (Helgeland-S)	32WPT205477	SS
18047	Tappen	Sømna	Nordland (Helgeland-S)	32WPT293472	SS
18048	Mebrekkskjæra	Brønnøy	Nordland (Helgeland-S)	32WPT210540	SS
18049	Balen	Brønnøy	Nordland (Helgeland-S)	32WPT172564	SS
18050	Lille Skarvholmen	Træna	Nordland (Træna)	32WVP791952	SS
18051	Maaøy	Træna	Nordland (Træna)	32WVP763927	SS
18052	Ljøsbraken	Sømna	Nordland (Helgeland-S)	32WPT187411	SS
18053	Bremnesøya	Sortland	Nordland	33WWS368162	FM, GM, SB
18054	Sandøya	Sortland	Nordland	33WWS290138	GM, SB, RT
18055	Vikøya	Sortland	Nordland	33WWS280136	FM, GM, SB
18056	Reinsnesøya	Sortland	Nordland	33WWS184312	FM, GM, SB, RT
18057	Fiskholman	Sortland	Nordland	33WWS177258	FM, SB, RT
18058	Kringelskjæret	Sortland	Nordland	33WWS184248	FM, SB, RT
18059	Værholmen	Sortland	Nordland	33WWS154263	FM, GM, SB
18060	Kjerringnesøya	Sortland	Nordland	33WWS155190	FM, GM, SB
18061	Bjørnskjæret	Sortland	Nordland	33WWS151203	RT
18062	Ytrøya	Brønnøy	Nordland	32WPT319584	SM
18063	Skomvær	Røst	Nordland	32WPV232801	KK
18064	Medfjordholmen	Lurøy	Nordland	32WUP985826	FM, SM, GM, SB
18065	Lyngværøya	Rødøy	Nordland	33WUP923965	FM, SM, GM, SB
18066	Vardeskjæret	Brønnøy	Nordland	32WPT260500	FM, SM, GM, SB
18067	Blomsterholmen	Bindal	Nordland	32WPT228413	FM, SM, GM, SB

Fortsetter neste side

Fortsettelse fra forrige side

Lok. nummer	Lokalitetsnavn	Kommune	Fylke	Geografiske koordinater	Arter
Loc. number	Locality name	Municipality	County	Geographical coordinates	Species
18068	Laukholmen	Bindal	Nordland	32WPT227417	FM, SM, GM, SB
18069	St. og L. Andholmen	Sømna	Nordland	32WPT218472	FM, SM, GM, SB
18070	Stokkskjæret	Brønnøy	Nordland	32WPT277586	FM, SM, GM, SB
18071	Galtbolet	Brønnøy	Nordland	32WPT264582	FM, SM, GM, SB
18072	Lyngholmen	Sømna	Nordland	32WPT227452	FM, SM, GM, SB
18073	Storbrakan	Sømna	Nordland	32WPT253511	FM, SM, GM, SB
18074	Sandværholmen	Rødøy	Nordland	33WUP925955	FM, SM, GM, SB
18075	St. Ulvøyholmen	Bø	Nordland	33WVR790990	HS, SS
18076	Kvalnesflesa	Vestvågøy	Nordland	33WVR575837	SS
18077	Swindraget	Bindal	Nordland	32WPT257393	SM, SB
18078	Vestgrønningen	Herøy	Nordland	33WUP663235	FM, SM, GM, SB, RT
18079	Austgrønningen	Herøy	Nordland	33WUP671239	FM, SM, GM, SB
18080	Saudrægene	Herøy	Nordland	33WUP675238	FM, SM, GM, SB, RT
18081	Kvalen	Brønnøy	Nordland	32WPT265612	FM, SM, GM, SB
18082	Gjæsnakken	Dønna	Nordland	32WUP709471	SS
18083	Holm-holmen	Rana	Nordland	33WVP466471	Æ
19001	Ertnøy	Berg	Troms	33WWT830057	TS
19002	Edøy	Tromsø	Troms	33WXT134255	TS
19003	Hillesøy	Tromsø	Troms	34WCC845290	TS
19004	Hersøy	Tromsø	Troms	34WCC883424	TS
19005	Bjørnøy	Tromsø	Troms	34WCC897425	TS
20001	Hornøy	Vardø	Finnmark	36WVD308104	KK, LO, PL, LU
20002	Syltefjordstauran	Båtsfjord	Finnmark	36WVD002335	HS, LO, PL
20003	Rundholmen	Berlevåg	Finnmark	35WNU869498	SS
20004	Helløya	Berlevåg	Finnmark	35WNU905488	SS
20005	Kongsøya	Berlevåg	Finnmark	35WNU907478	SS
20006	Hjelmsøya	Måsøy	Finnmark	35WMU180910	KK, LO, PL
20007	Gjesvær	Nordkapp	Finnmark	35WMU422893	HS, LO, PL
20008	Gjesværstappan	Måsøy	Finnmark	35WMU405940	SS
20009	Tufjord	Måsøy	Finnmark	34WFD064814	SS
20010	Reinøykalven	Måsøy	Finnmark	35WLU993670	SS, TS
20011	Tarhalsen	Sørøysund	Finnmark	34WED847645	SS
20012	Stauran	Sørøysund	Finnmark	34WED895607	SS
20013	Russevika	Sørøysund	Finnmark	34WED906574	SS
20014	Store Kamøy	Sørøysund	Finnmark	34WED745610	SS
20015	Lille Kamøy	Sørøysund	Finnmark	34WED755625	SS, TS
20016	Bondøy	Sørøysund	Finnmark	34WED695643	SS, HH
20017	St. Skarvbaren	Ingøy	Finnmark	35WLU941904	SS
20018	Tinden	Berlevåg	Finnmark	35WNU982492	SS
20019	Geitingsodden, Hjelmsøy	Måsøy	Finnmark	35WMU135864	SS
20020	Akkarfjord, Hjelmsøy	Måsøy	Finnmark	35WMU161891	SS
20021	Svartviknæringen, Hjelmsøy	Måsøy	Finnmark	35WMU220905	SS
20022	Revsholmen	Hammerfest	Finnmark	35WED993662	TS
20023	Skarholmen	Berlevåg	Finnmark	35WNU928477	SS
20024	Måsøykalven	Måsøy	Finnmark	35WMU256850	SS
20025	Kirkstappen	Måsøy	Finnmark	35WMU408937	SS
20026	Storstappen	Måsøy	Finnmark	35WMU405938	SS
20027	Finnfjordnæringen	Hammerfest	Finnmark	34WED799599	SS
20028	Vassviknæringen	Hammerfest	Finnmark	34WED840600	KK
20029	Sjåvikneset	Måsøy	Finnmark	35WMU289816	SS
20030	Buvikneset-Flåneset	Måsøy	Finnmark	35WLU919841	SS
21001	Sofiekammen		Svalbard	77°01'N 15°53'E	KK, PL
21002	Ingeborgfjellet		Svalbard	77°46'N 14°23'E	KK, PL
21003	Diabasodden		Svalbard	78°22'N 16°12'E	KK, PL
21004	Tschemmakfjellet		Svalbard	78°32'N 15°18'E	KK, PL
21005	Grumant		Svalbard	78°12'N 15°15'E	KK, PL
21006	Alkhornet		Svalbard	78°12'N 13°50'E	KK, PL
21007	Fuglehuken		Svalbard	78°53'N 10°32'E	KK, PL
21008	Ossian Sars		Svalbard	78°56'N 12°29'E	KK, PL
21009	Amsterdamøya NV		Svalbard	79°47'N 10°47'E	KK, PL
21010	Blanknuten		Svalbard	77°49'N 21°22'E	KK
21012	Bjørnøya		Svalbard	74°25'N 19°00'E	HH, KK, LO, PL
21011	Nøisdalen		Svalbard	78°21'N 17°05'E	HH

a. 9-11 subkolonier optalt i dette området. - 9-11 subcolonies counted in this area.

NINA Oppdragsmelding 726

ISSN 0802-4103
ISBN 82-426-1264-1

NINA Hovedkontor
Tungasletta 2
7485 Trondheim
Telefon: 73 80 14 00
Telefaks: 73 80 14 01