

DCCCXXIV [824]. *Schoenus albus* [*Rhynchospora alba*, hvitmyrak], med nærmest trekantete, bebladete strå og blomster i knipper; bladene er bustaktige.

På norsk *Qviitaam*, *Qviit-ak*, *Myr-ak*, *Qviitskjæne*.

Vokser vanlig på torvmyrer.

DCCCV [feilnummerert 805, skal være 825]. *Ranunculus repens* [*Ranunculus repens*, krypsoleie], med sprikende beger, furete blomsterskaft, krypende utløpere og sammensatte blad.

På norsk *Revjegras*, *Løen soløj*, *Krypsoløj*.

Vokser i åkre og hager.

DCCCXXVI [826]. *Ranunculus (Ammanni)* [*Ranunculus hyperboreus*, setersoleie], krypende med blomster på enkle stengler, bladene er variabelt inndelt.

På norsk *Krypende Fjell-soløj*.

Vokser på Island ifølge Koenig hos Oeder; på Grønland ifølge Rottbøll; likeledes i Varanger i Øst-Finnmark ifølge Weldingh. Av mange ført til *Ranunculus lapponicus*, til hvilken den lærde og vennlige Oeder ønsker å plassere den, mens Linné i fl. sv. s. 195 noterer den som den ammanske ranunculus. Skiller seg neppe fra *R. lapponicus*, selv når denne er krypende.

Note: Gunnerus lager igjen et overflødig navn siden han viser til *Flora Danica* plansje 331 og Rottbølls avhandling fra 1770.

DCCCXXVII [827]. *Orchis (Koenigii)* [*Platanthera hyperborea*, islandsnattfiol, se note under 828], med trevlete knoller; beger kortere enn fruktknuten; leppe tredelt med jevnstore hele fliker.

På norsk *Islands Huvendel*.

Vokser på Island ifølge Koenig hos Oeder. Føres til følgende [art] hos Linné i mant. pl. II s. 518 [og med rette].

DCCCXXVIII [828]. *Orchis hyperborea* [*Platanthera hyperborea*, islandsnattfiol], med knoller i knipper; med nektarspore av fruktknutens lengde; hele, linjeformete lober som er tverre.

På norsk *Nor-huvendel*.

Vokser på Island ifølge Koenig hos Linné.

Note: Under nr. 827 og 828 er én og samme art ført opp to ganger, begge med Koenig som kilde, men Linné anfører den under navnet *Orchis hyperborea* i *Systema naturae* (12. utg.) og *Mantissa plantarum* (Jarvis 2007). Arten finnes ikke i Norge.

---