

DCCCLII [852]. *Fucus fungiformis* [*Ralfsia fungiformis*], ligner på sopp.
[På norsk] *Sopptang*.
Vokser på Island ifølge Koenig.

Note: Gunnerus behandler her en ny algeart basert på Oeders plansje 420 i *Flora Danica*. Den oppfattes i dag som en egen art, *Ralfsia fungiformis* (Gunnerus) Setchell & N.L.Gardner (Jørgensen 2012a).

DCCCLIII [853]. *Conferva rupestris* [*Cladophora rupestris*, vanlig grønndusk, men se note], med knebøyde, meget forgrenete grønne tråder.
På norsk *Skar-slinka*. I Strinda *Nøkke-skjeg*, *Perl-skjeg*.
Vokser på klipper i havet, likeledes på steiner, vanlig, for eksempel i store mengder ved den meinckske gård Ølsvigen [Ilsvika, i familien Meinckes eie] i Nidaros [Trondheim].

Note: Merkelig nok er det bevarte eksemplaret i herbariet vanlig rekeklo *Ceramium rubrum*, en art som ikke er grønn, så her er det nok skjedd en eller annen etikettombytting. Se del 2, plansje III, fig. 3.

DCCCLIV [854]. *Conferva vagabunda* [*Cladophora vagabunda*, men se note], med knebøyde, buktende tråder; grenene med mange korte smågrener.
På norsk *Flot-slinka*, *Løs-slinka*.
Vokser her og der i det nordlige hav.

Note: Belegg finnes ikke i herbariet. Det er ikke sannsynlig at det var *C. vagabunda* Gunnerus hadde. Dette er en sørlig art som ikke er kjent så langt mot nord.

DCCCLV [855]. *Jungermannia ciliaris* [*Ptilidium ciliare*, bakkefrynse], med krypende skudd, bladene brettet dobbelt og nederst øreformete, med cilier.
På norsk *Ör-krætle*.
Vokser på klipper i Holtålen og Romsdal.

DCCCLVI [856]. *Jungermannia furcata* [*Metzgeria furcata*, gulband], ustilkete thalli, linjeformete, forgrenete, ytterst gaffeldelt og noe avrundet.
På norsk *Klof-kretle*.
Vokser på gammel ved, likeledes her og der på berg.

DCCCLVII [857]. *Jungermannia tamariscifolia* [*Frullania tamarisci*, matteblæremose], med taklagte blad i to rekker, de øvre er nærmest runde og konvekse, fire ganger større [enn de undre].
På norsk *Svart Kretle*.
Vokser her og der på berg.