



Ophrys x breuerorum

P. DELFORGE

[*Ophrys cilentana* J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS × *Ophrys pollinensis*
E. NELSON ex J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS]

Descriptio holotypi: Herba 22 cm alta (apud holotypum in florescentiae initio). Flores 9, aperti 4, alabastra 5, mensuris inter eas parentium mediis. Sepala viridi-albida, ovata. Petala olivacea purpureo marginata, dense villosa ciliataque, ovata-lanceolata. Labellum integrum, convexum, late obovatum, fuscum, molle, cum gibberis minutis rotundisque ad basin, sine margine glabra, pilosis longis, ferrugineis quasi omnino late cinctum. Macula basalis, satis simpliciter H-formis, indigotica, argenteo cincta, aream basilem delineans ad cavitatem stigmaticam affixaque. Appendix satis evoluta, obscure tridentata, chlorina, subhorizontalis. Labelli area basalis ferruginea; cavitatis stigmaticae fusca, cum projectura, cinereo maculata in centro; pseudo-oculi duabus cristis divergentis fulgentis atrisque formati. Puncti staminodiales praesentes. Tempus floritionis inter ea parentum medium.

Holotypus: Italia, Campania, provincia Salernum, Cilento, circa Pisciotta (UTM: 33TWE2041), alt. s.m. 280 m, 1.IV.2002. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 10203.

Étymologie: notho-espèce très cordialement dédiée à Jeanine BREUER-CONET, membre de la Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges, et à Bruno BREUER (Eupen, Belgique). Membre honoraire du Comité de la Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges.

Description: Haute de 22 cm. 9 fleurs, 4 ouvertes, 5 en boutons, de taille intermédiaire entre celles des parents. Sépales vert blanchâtre, ovales. Pétales vert ocré au centre, les bords pourprés, densément velus et ciliés, lancéolés-arrondis. Labelle entier, convexe, largement obovale, brun, velouté, muni de petites gibbosités atténuées, sans marge glabre; pilosité marginale dense, brun rougeâtre, à peine moins dense dans la moitié distale. Macule basale, assez simple, en forme de H, bleu noirâtre brillant, finement bordée de blanchâtre brillant, délimitant un champ basal et atteignant les parois de la cavité stigmatique. Appendice assez important, obscurément tridenté, jaune verdâtre, dirigé obliquement vers le bas. Champ basal brun clair; cavité stigmatique brun foncé, munie d'une saillie délimitant le champ basal et d'une trace de plage maculaire, grisâtre pâle; pseudo-yeux formés de deux crêtes divergentes, noirâtres, brillantes. Points staminodiaux présents. Temps de floraison intermédiaire entre ceux des parent.

Référence: DELFORGE, P. 2002.- *Ophrys x breuerorum* hybr. nat. nov. *Natural. belges* 83 (Orchid. 15): 41-43.

HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys x breuerorum
P. DELFORGE 2002

[*Ophrys cilentana* J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS × *Ophrys pollinensis*
E. NELSON ex J. DEVILLERS-TERSCHUREN & P. DEVILLERS]

Date: 1.IV.2002 N° 10203

Pays: Italie Région: Campanie

Province: Salerne Localité: Pisciotta

Altitude: 280 m UTM_{WGS84}: 33TWE2041

Habitat: en lisière de maquis à *Arbutus unedo*, *Erica arborea*, *Quercus pubescens*, talus herbeux à *Brachypodium ramosum* avec *Dactylorhiza romana*, *Ophrys cilentana*, *O. pollinensis*.

Publication: DELFORGE, P. 2002.- *Ophrys x breuerorum* hybr. nat. nov. *Natural. belges* 83 (Orchid. 15): 41.

leg. & det. Pierre DELFORGE 2002

H O L O T Y P E