



Fig. 5. *Ophrys x delvauxiorum* (*O. cephalonica* x *O. helenae*). Grèce, Épire, Thesprotia, 24.IV.1991. (dia P. DELFORGE)

HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys x delvauxiorum

P. DELFORGE 1992

[*O. cephalonica* (B. BAUMANN & H. BAUMANN) J. DEVILLERS-TERSCHUREN
& P. DEVILLERS x *Ophrys helenae* RENZ]

Date: 24.IV.1991 N° 09119

Pays: Grèce Région: Épire

Province: Thesprothia Localité: Margariti

Altitude: 70 m UTM_{wgs84}: 34SDJ5154

Habitat: broussailles pâturées avec *Asphodelus aestivus* et *Asphodeline lutea* ainsi qu'*Anteriorchis fragrans*, *Herorchis picta* var. *skorpilii*, *Himantoglossum robertianum*, *Ophrys attica*, *O. cephalonica*, *O. ferrum-equinum*, *O. helenae*, *O. hellenica*, *O. leucadica*, *O. mammosa*, *O. sicula* var. *transadriatica*, *O. sphegodes*, *Paludorchis laxiflora*, *Serapias bergonii*, *S. lingua*, *Vermeuleniana papilionacea*.

Publication: DELFORGE, P. 1992.- Contribution à l'étude de trois espèces d'*Ophrys* récemment décrites: *Ophrys cephalonica*, *Ophrys herae* et *Ophrys minoa*. *Natural. belges* 73 (Orchid. 5): 99.

leg. & det. Pierre DELFORGE 1991

H O L O T Y P E

Ophrys x delvauxiorum

P. DELFORGE

[*Ophrys cephalonica* (B. BAUMANN & H. BAUMANN) J. DEVILLERS-TERSCHUREN
& P. DEVILLERS x *O. helenae* RENZ]

Diagnosis: Ab *Ophrys helenae* differt tempore floritionis maturio, petalis subglabris marginibus undulatis-contractis, labello colore intentiore cum pilis marginalis distinctis, macula duabus fulgentis parallelis lineis formata, appendiceque triangulata in parva lacinia inserta.

Holotypus: Graecia, Epiros, provincia Thesprotia, apud Margariti (UTM: 34SDJ5154), alt. s.m. 70 m, 24.IV.1991. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 09119.

Étymologie: notho-espèce amicalement dédiée à Madame Marie-Christine et Monsieur Michel DELVAUX DE FENFFE (Louvain-la-Neuve, Belgique), membres de la Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges.

Diagnose: Diffère d'*Ophrys helenae* par le temps de floraison plus précoce, les pétales subglabres à bords ondulés-crispés, le labelle plus foncé, muni d'une pilosité marginale distincte, d'une macule formée de 2 lignes parallèles brillantes et d'un appendice triangulaire inséré dans une échancrure.

Référence: DELFORGE, P. 1992.- Contribution à l'étude de trois espèces d'*Ophrys* récemment décrites: *Ophrys cephalonica*, *Ophrys herae* et *Ophrys minoa*. *Natural. belges* 73 (Orchid. 5): 99.