


FIG. 4. — *Ophrys* × *toussaintiana*.
I. Siracusa. 7.4.87.



HERBARIUM Pierre DELFORGE
Orchidaceae

Ophrys × *toussaintiana*

P. DELFORGE 1988

[*Ophrys biancae* (TODARO) MACCHIATI × *O. lunulata* PARLATORE]

Date: 7.IV.1987 **N°** 08705

Pays: Italie **Région:** Sicile

Province: Syracuse **Localité:** Ferla

Altitude: 540 m **UTM**_{WGS84}:

Habitat: pâture calcicole avec *Herorchis longicornu*, *Neotinea commutata*, *N. lactea*, *Ophrys biancae*, *O. incubacea*, *O. lacaitae*, *O. lunulata*, *O. lutea*, *O. oxyrrhynchos*, *O. sicula*, *O. speculum*, *Orchis italica*, *Serapias* sp., *Vermeulenia papilionacea* var. *vexillifera*.

Publication: DELFORGE, P. 1988.- Réflexions sur quelques *Ophrys* d'Italie et description de quatre de leurs hybrides. *Natural. belges* **69** (Orchid. 2): 41.

leg. & det. Pierre DELFORGE 1987

H O L O T Y P E

Ophrys × *toussaintiana*

P. DELFORGE

[*Ophrys biancae* (TODARO) MACCHIATI × *O. lunulata* PARLATORE]

Descriptio holotypi: Herba ad 16 cm alta. Flores medii, 5. Sepala circinata colore pallide roseo. Petala intermedia, oblonga, 1/2 breviora quam sepalum medianum. Labellum convexum, quadrangulum, integrum, leviter elongatum, castaneum cum angusto limbo luteo, leviter mammosum cum pilis albidis. Macula ad basim labeli sita, H-formis, caerulea cinereo cincta. Appendix intermedia, satis magna, leviter tridentata.

Holotypus: Italia, Sicilia, provincia Siracusa, Necropoli di Pantalìa, 7.IV.1987. Leg. P. DELFORGE. In Herb. Pierre Delforge sub n° 08705.

Étymologie: notho-espèce très cordialement dédiée au Docteur Philippe TOUSSAINT (1928-1996; Bruxelles), Membre fondateur de la Section Orchidées d'Europe des Naturalistes belges.

Description: Plante assez petite, haute de 16 cm. Fleurs moyennes, au nombre de 5. Sépales arrondis, de couleur rose pâle. Pétales intermédiaires, oblongs, de moitié plus courts que le sépale médian. Labelle convexe, quadrangulaire, entier, un peu allongé, brun marron avec une marge jaune étroite, muni de légères gibbosités avec une pilosité blanche. Macule située à la base du labelle, en forme de H, bleue ceinturée de gris. Appendix intermédiaire, assez grand, légèrement tridenté.

Commentaire: *Ophrys* × *toussaintiana* doit à *O. biancae* la pâleur des sépales, le vert des pétales assez courts, la pilosité claire des légères gibbosités du labelle, la macule en H ceinturée de blanc, l'appendice tridenté. Sur l'exemplaire d'herbier, après dessiccation, une importante marge jaune est apparue sur le labelle, ce qui renvoie également à *O. biancae*. Les autres caractères proviennent évidemment d'*O. lunulata*, les plus visibles étant, notamment, l'allongement des pétales et du labelle ainsi que la forte pilosité et la couleur marron de ce dernier.

Cet hybride a été trouvé en un seul exemplaire au milieu d'une touffe de 5 *O. lunulata* entourés de dizaines d'*O. biancae* bien fleuris sur une magnifique pelouse calcaire surplombant la Nécropole de Pantalique (Syracuse). *O. oxyrrhynchos* était présent à une centaine de mètres, mais en peu d'exemplaires et encore en boutons. La situation de l'hybride, son état de floraison assez avancé, la petite taille de ses fleurs, la forme de son labelle, la couleur blanchâtre des sépales, la taille et la forme de l'appendice montrent bien qu'il ne s'agit pas d'*O. oxyrrhynchos* × *O. lunulata* (*O. xsicana*)

Référence: DELFORGE, P. 1988.- Réflexions sur quelques *Ophrys* d'Italie et description de quatre de leurs hybrides. *Natural. belges* **69** (Orchid. 2): 41-42.