

# Preen<sup>®</sup>

## LAWN

### WEED CONTROL



**KILLS 200+ WEEDS\***  
*\* See Use Directions for complete list of treated weeds.*

**KILLS THE ROOT!**

**Apply when weeds\* are growing**



**COVERS 15,000 SQ. FT.**  
**CUBRE 1393.5 m<sup>2</sup> (15.000 pies<sup>2</sup>)**

**Net Wt. 30 lbs.**  
**(13.6 kg)**

ACTIVE INGREDIENTS:  
 2,4-dichlorophenoxyacetic acid ..... 1.37%  
 (+)-(R)-2-(2-methyl-4-chlorophenoxy) propionic acid... 0.31%  
 Dicamba: 3,6-dichloro-o-anisic acid ..... 0.13%  
 OTHER INGREDIENTS ..... 98.19%  
 TOTAL ..... 100.00%

THIS PRODUCT CONTAINS:  
 27.4 lbs. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per ton.  
 6.2 lb. (+)-(R)-2-(2-methyl-4-chlorophenoxy) propionic acid  
 equivalent per ton.  
 2.6 lb. 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per ton.  
 Isomer Specific by AOAC Methods.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**CAUTION**

See back panel for First Aid and additional Precautionary Statements.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**PRECAUCIÓN** Consulte el panel posterior para obtener información sobre primeros auxilios y otras declaraciones de precaución adicionales.

**STOP! READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.**

#### PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

## CAUTION

Harmful if absorbed through skin. Harmful if inhaled. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Avoid breathing dust. Causes moderate eye irritation. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Wear long-sleeved shirt and long pants, socks, shoes, and gloves. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

<b>First Aid</b>	
<b>IF ON SKIN OR CLOTHING:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Take off contaminated clothing.</li> <li>Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.</li> <li>Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li></ul>
<b>IF INHALED:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible.</li> <li>Call a poison control center or doctor for further treatment advice.</li></ul>
<b>IF IN EYES:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.</li> <li>Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.</li> <li>Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li></ul>
<b>IF SWALLOWED:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.</li> <li>Have person sip a glass of water if able to swallow.</li> <li><b>DO NOT</b> induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.</li> <li><b>DO NOT</b> give anything by mouth to an unconscious person.</li></ul>

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For additional information in case of emergency, call toll free 1-(888) 208-1368.

#### Environmental Hazards

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. To protect the environment, **DO NOT** allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, ditches or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

#### DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

**DO NOT** apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. **DO NOT** allow people or pets to enter the treated area until dusts have settled.

• This product is intended for residential use.

This product controls a wide range of listed lawn weeds which includes dandelion, chickweed, knotweed, plantain, henbit, spurge and many others commonly found in home lawns. Retreatment may be necessary if (a) lawn is heavily overrun by weeds, or, (b) if adverse low moisture conditions prevail and weeds are in a state of poor growth. If necessary make a second application after 30 days.

**For use on established warm season turfgrasses** - includes bermudagrass, centipedegrass, and zoysiagrass.

**For use on established cool season turfgrasses** - includes Kentucky bluegrass, perennial ryegrass, tall fescue, and turf-type tall fescues.

#### Use Restrictions

**DO NOT** apply this product on carpetgrass, dichondra, St. Augustinegrass, or established turf containing desirable clovers.

**DO NOT** apply this product to newly seeded grasses until well-established or after the second or third mowing.

Reseeding or overseeding areas may occur three (3) weeks after the application of this product.

**DO NOT** use this product on or in close proximity to desirable plants and do not spread granules onto exposed root systems or adventitious shoots (rhizomes) within the drip line of the roots of desirable trees and shrubs, since injury may result.

**DO NOT** use this product on flowers, vegetables, groundcovers, gardens or landscape plantings which includes shrubs and trees. Do not exceed specified dosage for any area and do not apply this product within the dripline of or over surface roots of trees, shrubs, and other ornamentals.

**DO NOT** apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers, or drainage ditches. Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays, and oceans.

**DO NOT** apply when windy. Apply this product directly to your lawn, and sweep any product landing on the driveway, sidewalk, gutter, or street back onto the treated area. To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) to the point of runoff or apply when raining or when rain is expected that day.

#### How Much To Apply

The maximum broadcast application rate is 2.0 pounds of product per 1,000 sq.ft. per application. The maximum number of broadcast applications is limited to 2 per year with a minimum of 30 days between applications. The maximum seasonal rate is 4.0 pounds of product per 1,000 sq.ft.

#### When To Apply

Apply when listed broadleaf weeds are actively growing in spring or early fall.

Apply when the air is calm to ensure uniform coverage and do not spread granules onto flowers, vegetables, and ornamental shrubbery.

#### Preen Weed Control Kills 200 Listed Weeds!

Annual yellow sweetclover	Bullnettle	Daisy fleabane	Jimsonweed	Poison ivy	Sowthistle	Wild buckwheat
Aster	Burclover	Daisy, oxeye	Knawel	Poison oak	Spanishneedles	Wild carrot
Austrian fieldcress	Burdock	Dandelion	Knotted	Pokeweed	Speedwell	Wild four-o'clock
Bedstraw	Burning nettle	Dichondra	Kochia	Poorjoe	Spiny amaranth	Wild garlic
Beggarticks	Burweed	Dogbane	Lambsquarters	Prairie sunflower	Spiny cocklebur	Wild geranium
Betony, Florida	Buttercup	Doglennel	Lespedeza	Prickly lettuce	Spiny sowthistle	Wild lettuce
Bindweed, field	Buttonweed	Dollarweed	Matchweed	Spurred spurge	Spotted catsear	Wild marigold
Bird vetch	Canada thistle	False dandelion	Mexicanweed	Spurred spurge	Spurred spurge	Wild mustard
Bitter wintercress	Carolina geranium	False sunflower	Milk vetch	Stinging nettle	Stinging nettle	Wild onion
Bittercress, hairy	Carpetweed	Fiddleneck	Mouseear hawkweed	Prostrate spurge	Strawberry, India mock	Wild pansip
Bitterweed	Catchweed bedstraw	Florida pusley	Frenchweed	Prostrate vervain	Tall nettle	Wild radish
Black-eyed Susan	Catnip	Morningglory	Catsear	Puncturevine	Tall vervain	Wild rape
Black medic	Catsear	Mouseear hawkweed	Chickweed, common	Purslane, common	Tansy ragwort	Wild strawberry
Black mustard	Chickweed, common	Chickweed, mouseear	Galinsoga	Musk thistle	Ragweed	Wild sweet potato
Blackseed plantain	Chicory	Gumweed	Goldenrod	Redroot pigweed	Red sorrel	Wild vetch
Blessed thistle	Cinquefoil	Gumweed	Ground ivy	Narrowleaf plantain	Thistle	Woodsorrel
Bloodflower milkweed	Clover, crimson	Hairy fleabane	Narrowleaf vetch	Nettle	Trailing crownvetch	Woolly croton
Blue lettuce	Clover, hop	Hawweed	Nettle	Rough cinquefoil	Hawweed	Woolly morninglory
Blue vervain	Clover, red	Heartleaf drymary	Oxalis	Rough fleabane	Russian pigweed	Woolly plantain
Bracted plantain	Clover, strawberry	Healall	Oxalis	Russian thistle	Russian thistle	Wormseed
Brassbuttons	Clover, sweet	Heartleaf drymary	Parsley-piert	Scotch thistle	Venice mallow	Yarrow
Bristly oxtonge	Clover, white	Hedge bindweed	Sheep sorrel	Scotch thistle	Virginia buttonweed	Yellow rocket
Broadleaf dock	Cockle	Hedge mustard	Shepherd's purse	Slender plantain	Virginia creeper	Yellow flower pepperweed
Broadleaf plantain	Cocklebur	Hemp	Slender plantain	Smallflower galinsoga	Western clematis	
Broomweed	Common mullein	Henbit	Smooth dock	Smooth dock	Western salsify	and other broadleaf weeds
Buckhorn	Creeping Jenny	Pigweed	White mustard	White mustard	Wild aster	
Buckhorn plantain	Cudweed	Hoary cress	Hoary plantain	Hoary plantain		
Bulbous buttercup	Curly dock	Hoary plantain	Plains coreopsis	Plains coreopsis		
Bull thistle	Daisy, English	Horsenettle	Plantain	Plantain		

#### Application Instructions

- Mow lawn to normal height 1 to 2 days before application.
- Water lawn thoroughly at least 1 day before application to sustain moisture until the next watering (see step 5).
- Apply when listed weeds are young and actively growing, preferably in the morning when dew is on the grass. If grass is not moist at time of application, sprinkle lightly with water to allow the granules to adhere and to remain on the leaf surface of the weeds.
- Do not apply when temperatures are consistently above 90 F.
- Do not wash this product from weed leaves for 1 to 2 days after application. After 1 to 2 days, thoroughly water the lawn.

#### Spreader Settings | Graduaciones del esparcidor

Broadcast Spreaders	Setting	Broadcast Spreaders	Setting
Esparcidor por dispersión	Graduación	Esparcidor por dispersión	Graduación
Agri-Fab® Rotary	3	Scotts® EdgeGuard®	4 1/2
Earthway® Rotary	16	Scotts® EasyGreen®	26
Republic Rotary	5	Sta-Green	3

The above spreader settings are approximate. To check your spreader - 1.0 lb. of material covers approximately 500 sq.ft. (2.0 lbs. of material per 1,000 sq. ft.). **Note:** if spreader model does not appear above please call 800-233-1067, 8 am – 5 pm EST.Monday – Friday. Las graduaciones del esparcidor son aproximadas. Para controlar su esparcidor, 0,45 kg de material cubre aproximadamente 46,45 m<sup>2</sup>. (0,91 kg de material por cada 92,90 m<sup>2</sup>). Nota: Si su modelo de esparcidor no se mencionó anteriormente, llame al 800-233-1067, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora estándar del Este.

#### Spreader Directions

**Determining Your Lawn's Square Footage:** To determine how much of this product to apply, you must determine the square footage of your lawn. An easy way to do this is to walk the length of your lawn, figuring that one pace equals approximately 3 feet. Do the same with the width of the lawn. Then multiply the length by the width to arrive at the total. Make sure you subtract the square footage of your home and driveway when calculating the total square footage of your lawn. If your lawn has an irregular shape, try dividing it up into a number of square areas. Calculate the square footage for each area, then add the figures together to reach your total lawn size.

**Spreader Tips:** The two main types of spreaders are the Drop Spreader, which drops the material straight down the width of the spreader as you push, and the Broadcast Spreader (also known as a rotary), which throws the material from the spreader.

**Drop Spreader:** (See Fig. A) First make two passes along the top of the area you'll be covering. Then make two passes along the bottom area. Then move back and forth along the long part of the lawn. On each pass, as you reach the strips at the top and bottom of the area to be covered, shut off the spreader. It's also important to shut off the spreader when you are stopped.

**Broadcast Spreader:** (See Fig. B) Apply in a single pass by starting on the outside border and apply in a circular path working toward the center.

### STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal.

**Pesticide Storage:** Store this product only in its original container in a cool, dry, locked place out of the reach of children and animals. **Pesticide Disposal and Container Handling:** Nonrefillible container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

#### Warranty

**Important: Read Before Use**

Read the entire Directions for Use, Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability before using this product. If terms are not acceptable, return the unopened product container at once.

By using this product, user or buyer accepts the following Conditions, Disclaimer of Warranties and Limitations of Liability.

**CONDITIONS:** The directions for use of this product are believed to be adequate and must be followed carefully. However, it is impossible to eliminate all risks associated with the use of this product. Crop injury, ineffectiveness or other unintended consequences may result because of such factors as weather conditions, presence of other materials, or the manner of use or application, all of which are beyond the control of Lebanon Seaboard Corporation. All such risks shall be assumed by the user or buyer.

**DISCLAIMER OF WARRANTIES:** To the extent consistent with applicable law, LEBANON SEABOARD CORPORATION MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, OF MERCHANTABILITY OR OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR OTHERWISE, THAT EXCEED BEYOND THE STATEMENTS MADE ON THIS LABEL. No agent of Lebanon Seaboard Corporation is authorized to make any warranties beyond those contained herein or to modify the warranties contained herein. To the extent consistent with applicable law, Lebanon Seaboard Corporation DISCLAIMS ANY LIABILITY WHATSOEVER FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT.

**LIMITATIONS OF LIABILITY:** To the extent consistent with applicable law, THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE USER OR BUYER FOR ANY AND ALL LOSSES, INJURIES OR DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT, WHETHER IN CONTRACT, WARRANTY, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID, OR AT LEBANON SEABOARD CORPORATION'S ELECTION, THE REPLACEMENT OF PRODUCT.



1-800-233-1067

www.preen.com

Preen® is a registered trademark of Lebanon Seaboard Corporation (L) (D) EPA Reg. No. 961-418 | EPA Est. No. 961-PA-01-961-IL-01 Superscript used is first letter of lot number.

Manufactured By | Fabricado por: Lebanon Seaboard Corporation 1600 East Cumberland Street Lebanon, PA 17042



E/23

**¡DETÉNGASE! LEA LA ETIQUETA COMPLETA PRIMERO. CUMPLA CON TODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DETALLADAMENTE.**

#### DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

Riesgos para seres humanos y animales domésticos

## PRECAUCIÓN:

Es dañino si se absorbe a través de la piel. Nocivo si se inhala. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Evite respirar el polvo. Causa una irritación ocular moderada. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, fumar o usar el inodoro. Use camisa de mangas largas y pantalones largos, medias, zapatos y guantes. Quiteuse y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.usarla.

<b>Primeros auxilios</b>	
<b>SI ESTÁ EN LA PIEL O EN LA ROPA:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Quiteuse la ropa contaminada.</li> <li>Enjuague la piel inmediatamente con bastante agua durante 15 a 20 minutos.</li> <li>Lláme a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.</li></ul>
<b>SI SE ASPIRA:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lleve a la persona a un lugar con aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible.</li> <li>Lláme a un centro de control de envenenamientos para obtener asesoramiento adicional sobre el tratamiento.</li></ul>
<b>SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos.</li> <li>Retire los lentes de contacto, si los tiene puestos, después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos</li> <li>Lláme a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.</li></ul>
<b>SI SE INGIERE:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lláme inmediatamente a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener asesoramiento sobre el tratamiento.</li> <li>Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua.</li> <li>No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos.</li> <li>Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.</li></ul>

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener información adicional en caso de emergencia, llame gratis al 1-(888)-208-1368.

#### Riesgos ambientales

Este pesticida es tóxico para los peces e invertebrados acuáticos y puede tener efectos adversos en plantas que no eran el objetivo del tratamiento. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escorra hacia desagües pluviales, zanjas de desagüe, alcantarillas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo, cuando no haya pronóstico de lluvia durante las siguientes 24 horas, ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre una entrada de garaje, acera o calle llevándolo de vuelta al área tratada del césped para evitar que se escurra hacia masas de agua o sistemas de desagüe.

Este producto químico tiene propiedades y características asociadas con agentes químicos detectados en agua del subsuelo. El uso de este producto químico en áreas donde el suelo es permeable, especialmente donde las napas de agua son de poca profundidad, puede ocasionar contaminación del agua del subsuelo. La aplicación alrededor de una cisterna o pozo puede ocasionar contaminación del agua potable o agua del subsuelo.

#### INSTRUCCIONES DE USO

Constituye una violación a la ley federal utilizar este producto de manera contraria a lo indicado en la etiqueta.

• No aplique el producto de ninguna manera en que pueda entrar en contacto con personas o mascotas, ya sea directa o indirectamente. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación. No permita que las personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el polvo se haya asentado.

• Este producto es para uso residencial.

Este producto controla una gran variedad de malezas de césped, que incluye dientes de león, pámplina, sanguinaria, llantén, origa muerta, hierba de golondrina y muchas otras que a menudo se encuentran en los céspedes domésticos. Podría ser necesario un nuevo tratamiento si (a) el césped está excesivamente invadido por malezas; o (b) si prevalecen condiciones adversas de humedad baja y las malezas están en un período de poco crecimiento. Si es necesario, se puede realizar una segunda aplicación después de 30 días.

**Para uso en céspedes establecidos de estación cálida** - incluyen césped Bermud, césped ciempiés y césped zoysia.

**Para uso en céspedes establecidos de estación fría** - incluyen césped azul de Kentucky, rye grass perenne, festuca alta y festucas altas tipo tepe.

#### Restricciones de uso

No aplique este producto sobre césped alfombra, oreja de ratón, césped San Agustín o tepes establecidos con tréboles que sean de su agrado.

No aplique este producto sobre céspedes recién sembrados hasta que estén bien establecidos o después de una segunda o tercera poda.

Se puede volver a sembrar o sembrar varias veces después de tres (3) semanas desde la aplicación de este producto.

No use este producto en o cerca de plantas atractivas, y no esparza granules en sistemas de raíces expuestos o brotes espontáneos (rizomas) dentro de la línea de goteo de las raíces de los árboles y arbustos atractivos, ya que podría provocar daños.

No use este producto sobre flores, hortalizas, cubiertas vegetales, jardines o plantaciones, incluso arbustos y árboles. No exceda la dosis indicada para cada área y no aplique este producto dentro de la línea de goteo o sobre la superficie de las raíces de árboles, arbustos y otras plantas ornamentales.

No lo aplique directamente en el agua, desagües de aguas pluviales, canales, cloacas ni cerca de estos. No lo aplique a menos de 7.62 metros de ríos, estanques de peces, lagos, arroyos, embalses, pantanos, estuarios y océanos. No lo aplique bajo condiciones de viento. Aplique este producto directamente en el césped y barra el producto que caiga sobre la entrada de garaje, la acera o la calle llevándolo de vuelta al césped. Para evitar que el producto escurra, no riegue en exceso las áreas tratadas ni aplique cuando esté lloviendo o cuando se esperen lluvias dentro del día.

#### Cuánto aplicar

La dosis máxima de aplicación es de 0,91 kg de producto por cada 92,90 m<sup>2</sup> por aplicación. La cantidad máxima de aplicaciones por dispersión se limita a 2 por año, con un mínimo de 30 días entre aplicaciones. La dosis máxima por temporada es de 1,81 kg de producto por cada 92,90 m<sup>2</sup>

#### Cuándo aplicar

Aplique cuando las malezas de hoja ancha estén en pleno crecimiento en primavera o a principios del otoño.

Aplique cuando no haya brisa para asegurar una cobertura uniforme y no esparza los granúlos sobre flores, hortalizas y arbustos ornamentales.

### ¡El controlador de malezas Preen mata 200 tipos de malezas enumeradas!

Trébol de olor amarillo anual	Solano de Carolina	Erigeron annuus	Escleranto (Flor de Banch)	Hiedra venenosa	Acedera	Áster silvestre
Aster	Trébol de carretilla	Margarita mayor	Lengua de pájaro	Árbol de las pulgas	Cerraja	Enredadera anual
Radicula austriaca	Barbana	Diente de león	Pinillo	Hierba camín	Biente	Zanahoria silvestre
Galio	Ortiga brava	Oreja de ratón	Canazo	Diodia teres Walter	Verónica	Dondegó silvestre
Amor seco	Mallajo	Falso diente de león	Flamenquilla	Girasol silvestre	Bledo espinoso	Ajo del oso
Estáquida de Florida	Botón de oro	Manzanilla loca	Treból de los prados	Escarola	Cepa caballo	Geranio manchado
Corehuela	Hierba de botón	Acaricoba	Melva	Atáta hembra	Corraja espinosa	Lechuga silvestre
Veza de pájaro	Cardo negro	Falso diente de león	Lippia	Sanguinaria postrada	Hierba del chancho	Chinchilla
Hierba de Santa Bárbara	Geranio silvestre de Carolina	Alegria falsa	Caperonia	Bledo rastreo	Hierba de las golondrinas	Mostaza silvestre
Mastuerzo amargo peludo	Culantrillo	Girasol falso	Astrágalo	Hierba de golondrina postrada	Ortiga de pollo	Cebolla silvestre
Amor de hortelano	Amor de hortelano	Ortiga	Dondegó de día	Verbena bracteata	Ortiga mayor	Chirivía silvestre
Hierba gatera	Hierba gatera	Artemisa pegajosa	Velosilla oreja de ratón	Verbena bracteata	Fresa de la India	Rabazón
Albahaca silvestre	Hierba del halcón	Cardo pendiente	Artemisa pegajosa	Verbena illa	Ortiga verde	Vicia silvestre
Lupulina	Pámplina común	Mostaza	Cardo pendiente	Hierba de Santiago	Verdolaga común	Camote silvestre
Mostaza negra	Alfiste oreja de ratón	Velosilla oreja de hoja estrecha	Mostaza	Escoba de amargosa	Ambrosia	Wicia
Achicoria	Cardo benedito	Achicoria	Velosilla oreja de hoja estrecha	Poligono anfibio	Escoba de amargosa	Pamila
Cincoenrama	Flor de sangre	Rama negra	Vellosilla	Cardo	Poligono anfibio	Poligono anfibio
Treból encamado	Lechuga azul	Vellosilla	Ortiga	Potentilla norvegica	Algarroba	Alfilerillo
Treból campestro	Verbena azul	Hierba del carpintero	Vellosilla anaranjada	Erigeron strigosus	Ortiga	Potentilla norvegica
Verbena azul	Treból rojo	Golondrina	Velosilla anaranjada	Amaranto	Yuyo colorado	Erigeron strigosus
Llantén patagónico	Aster común	Aster común	Guisaso de caballo	Cardo ruso	Amaranto	Yuyo colorado
Botón de olor	Corehuela mayor	Corehuela mayor	Jocoyote	Cardo ruso	Cardo ruso	Pimpinela escarlata
Raspasayos	Caña	Caña	Alquimila arvense	Cardo borriquero	Cardo borriquero	Cardo borriquero
Lengua de vaca	Cardo ajonjono	Cardo ajonjono	Chirivía	Acedera	Acedera	Acedera
Llantén de hoja ancha	Escobilla	Verbasco	Clavelito antártico	Mostacilla	Bolsa de pastor	Virginia
Escobilla	Ochla espinosa	Hierba de la moneda	Mostacilla	Lepidio	Erigeron strigosus	Enredadera de Virginia
Llantén peludo	Sempreviva	Romaza	Bledo	Verbasco	Erigeron strigosus	Lentijilla
Hierba velluda	Romaza	Solano americano	Gallo del bosque	Solano americano	Verbena stricta	Albahaca silvestre de flores pequeñas
Cardo común	Margarita inglesa	Higuera loca	Llantén	Bella Diana	Romaza suave	Romaza suave
					Cenizo suave	Cenizo suave

#### Instrucciones para la aplicación:

- Corte el césped a altura normal 1 a 2 días antes de la aplicación.
- Riegue bien el césped al menos 1 día antes de la aplicación para mantener la humedad hasta el siguiente riego (consulte el paso 5).
- Aplique cuando las malezas estén jóvenes y creciendo activamente, preferentemente por la mañana cuando haya rocío sobre el césped. Si el césped no está húmedo al momento de la aplicación, rocíe levemente con agua para permitir que los granúlos se adhieran y permanezcan en las superficies de las hojas de las malezas.
- No aplique el producto cuando las temperaturas sean constantes sobre los 32.2 °C.
- No quite este producto de las hojas de las malezas por 1 o 2 días después de la aplicación. Riegue bien el césped 1 o 2 días después de la aplicación.

#### Instrucciones del esparcidor

**Cálculo de la cantidad de metros cuadrados de césped:** Para determinar cuánto producto necesita