

イワウチワ

Shortia uniflora (Maxim.) Maxim.

イワウメ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 本州 [日本固有種]

生 育 地 山地の林中のやや暗いところにあり、岩場に生えることが多い。県北山地に生育する。

選 定 理 由 園芸採取

そ の 他



北茨城市 (内山)

ホツツジ

Elliottia paniculata (Siebold et Zucc.) Hook.f.

ツツジ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道 (南部)・本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地林下の尾根筋などに生える。県北、県央地域、石岡市、筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市 (内山)

レンゲツツジ

Rhododendron molle (Blume) G.Don subsp. *japonicum* (A.Gray) K.Kron

ツツジ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地の林縁や草地に生える。県北、県央、県西地域、つくば市に生育する。生育地や個体数も減少している。

選 定 理 由 園芸採取、森林の伐採

そ の 他



水戸市 (内山)

イズセンリョウ

Maesa japonica (Thunb.) Moritzi ex Zoll.

ヤブコウジ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東南部以西）・四国・九州・琉球／中国・インドシナ

生 育 地 山地林内に生える。県内では仏頂山、加波山、吾国山、難台山などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



笠間市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

アイナエ

Mitrasacme pygmaea R.Br.

マチン科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球／アジア東部～南部・豪州

生 育 地 日当たりのよい暖地の低湿地に生える。県内各地の低湿地に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



筑西市（内山）

コイケマ

Cynanchum wilfordii (Maxim.) Hook.f.

ガガイモ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997


環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 山の林縁や草地に生える。常陸太田市，城里町に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



水戸市（内山）

キジョラン

Marsdenia tomentosa C.Morren et Decne.

ガガイモ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東以西）・四国・九州・琉球／朝鮮

生 育 地 照葉樹林内に生える。県北，県央，鹿行地域や筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

クルマムグラ

Galium japonicum Makino

アカネ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 深山の林の中に生える。県北山地や加波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

オオハシカグサ

Neanotis hirsuta (L.f.) W.H.Lewis var. *glabra* (Honda) H.Hara

アカネ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997


環境省2012

分 布 本州（中部地方日本海側～東北）〔日本固有種〕

生 育 地 山野や道ばたのやや日陰に生える。県内では城里町に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他 ハシカグサの日本海側タイプ



小美玉市（丸山）

カリガネソウ

Caryopteris divaricata Maxim.

クマツヅラ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国

生 育 地 低山の林縁に生える。県北山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



城里町（内山）

ヒキオコシ

Isodon japonicus (Burm.f.) H.Hara

シソ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道（西南部）・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 やや乾いた丘陵地にまばらに生える。県北地域、水戸市、加波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



（県博収蔵標本：石岡市産）

タカクマヒキオコシ

Isodon shikokianus (Makino) H.Hara var. *intermedius* (Kudo) Murata

シソ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東以西の太平洋側）・四国・九州
[日本固有種]

生 育 地 山地の湿った木陰に生える。県北、県央地域に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



大子町（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ミゾコウジュ

Salvia plebeia R.Br.

シソ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州・四国・九州・琉球／アジア東部～南部・豪州

生 育 地 湿った草地や畦に生える。県南，県西地域，城里町，水戸市に生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



菅生沼 (内山)

ヒメナミキ

Scutellaria dependens Maxim.

シソ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・九州／アジア東部

生 育 地 湿地の草むらに生える。県内では高萩市，笠間市，水戸市，神栖市，竜ヶ崎市，筑西市に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸太田市 (内山)

ミヤマナミキ

Scutellaria shikokiana Makino

シソ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州 (関東以西)・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 山地の木陰に生える。県北地域に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



筑波山 (内山)

イブキジャコウソウ

Thymus quinquecostatus Celak.

シソ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・九州／朝鮮・中国・ヒマラヤ

生 育 地 日当たりのよい岩地に生える。県北の久慈山地の岩上に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

オオマルバノホロシ

Solanum megacarpum Koidz.

ナス科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州（中北部）／樺太

生 育 地 低地や山地の湿原に生える。竜ヶ崎市などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



茨城町（丸山）

ミヤマママコナ

Melampyrum laxum Miq. var. *nikkoense* Beauverd

ゴマノハグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道（西南部）・本州（中部地方北部・中国地方西部）〔日本固有種〕

生 育 地 深山の林縁や草地に生える。県北では久慈山地などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

カワヂシャ

Veronica undulata Wall.

ゴマノハグサ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州（関東以西）・四国・九州・琉球／アジア東部～南部

生 育 地 川岸，溝のふちや田に生える。鹿行，県西地域の河川敷や湖畔に生育する。

選 定 理 由 河川の改修，外来種との競合

そ の 他



稲敷市（内山）

オオナンバンギセル

Aeginetia sinensis G.Beck

ハマウツボ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／中国

生 育 地 深山の草地に生える。大子町などに生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



常陸太田市（内山）

コウゲイスカグラ

Lonicera ramosissima Franch. et Sav. ex Maxim. var. *ramosissima*

スイカズラ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（新潟・宮城以南）・四国

生 育 地 標高600～1400mの山地に生える，石灰岩地にも見られる。県北の久慈山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（内山）

ゴマギ

Viburnum sieboldii Miq.

スイカズラ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（関東以西太平洋側）・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 低地や丘陵地の落葉樹林に生える。県西、県南地域の河川敷に生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



常総市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

フクシマシャジン

Adenophora divaricata Franch. et Sav. var. *manshurica* Kitag.

キキョウ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（中北部）／朝鮮・中国

生 育 地 山地のやや乾いた斜面に生える。県北山地に生育する。個体数は少ない。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



（県博収蔵標本：城里町産）

シデシャジン

Asyneuma japonicum (Miq.) Briq.

キキョウ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・九州／アジア北東部

生 育 地 山地に生える。県北、県央地域に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



御前山（内山）

サワシロギク

Aster rugulosus Maxim.

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 日当たりのよい酸性の湿地に生える。県北、
県央、鹿行地域や筑波山に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



ひたちなか市 (内山)

オオガンクビソウ

Carpesium macrocephalum Franch. et Sav.

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州 (中北部) / 朝鮮・中国 (東北)

生 育 地 温帯林下の湿ったところに生える。県北地域
の湿った山地林下に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町 (内山)

キクタニギク

Dendranthema boreale (Makino) Kitam. (101)

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 準絶滅危惧 (NT)

分 布 本州 (岩手以南の太平洋側・関東・長野・近畿)・
九州北部

生 育 地 山地の谷間のやや乾いた崖に生える。主に県
北山地に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



日立市 (安嶋)

ノニガナ

Ixeris polycephala Cass.

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／アジア大陸暖帯～熱帯

生 育 地 たんぼ道などに生える。県南地域や茨城町、境町、坂東市に生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



牛久市 (内山)

オオモミジガサ

Miricacalia makinoana (Yatabe) Kitam.

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州 (福島以南)・四国・九州 [日本固有種]

生 育 地 深山の適湿の林下に生える。県北山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



筑波山 (内山)

オオカニコウモリ

Parasenecio nikomontanus (Matsum.) H.Koyama

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州 (東北～近畿北部の主に日本海側) [日本固有種]

生 育 地 適湿の落葉樹林に生える。県北山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市 (大津)

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ヤマタイミンガサ

Parasenecio yatabei (Matsum. et Koidz.) H.Koyama

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（宮城以南～中部地方）・四国 [日本固有種]

生 育 地 深山のやや湿った落葉樹林下に生える。県北山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

オヤリハグマ

Pertya triloba (Makino) Makino

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（東北～関東北部） [日本固有種]

生 育 地 山地の乾いた木陰に生える。県北山地の林下に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸大宮市（藤田）

オオニガナ

Prenanthes tanakae (Franch. et Sav. ex Y.Tanaka et Ono) Koidz.

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（近畿以北）

生 育 地 山中の湿地にまれに生える。県北、県央地域や石岡市に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発、遷移の進行

そ の 他



城里町（内山）

アサマヒゴタイ

Saussurea nipponica Miq. subsp. *savatieri* (Franch.) Kitam.

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州（関東・中部地方東部）〔日本固有種〕

生 育 地 山中の木陰に生える。筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



(県博収蔵標本：筑波山産)

ハンゴンソウ

Senecio cannabifolius Less.

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州（中北部）／アジア東北部

生 育 地 山地の湿草原や林の縁に生える。県北地域に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



常陸太田市（内山）

タムラソウ

Serratula coronata L. subsp. *insularis* (Iljin) Kitam.

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 山地草原に生える。県内各地に生育する。生育地は限られる。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



城里町（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

ウスギタンポポ

Taraxacum shinanense H.Koidz.

キク科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（長野・茨城および奥羽地方）

生 育 地 日当たりのよい草地に生える。県北山地に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



大子町（内山）

サジオモダカ

Alisma plantago-aquatica L. var. *orientale* Sam.

オモダカ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州（北部）／アジア北東部

生 育 地 水田や浅い池に生える。県北，県央，県南地域の泥湿地に生育する。

選 定 理 由 湖岸の埋立

そ の 他



土浦市（福田）

ヤナギスブタ

Blyxa japonica (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gurke

トチカガミ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球／東アジア

生 育 地 水田や溝に生える。県北，県央地域，筑西市，行方市に生育する。

選 定 理 由 農地の改修

そ の 他



大子町（内山）

ミズオオバコ

Ottelia alismoides (L.) Pers.

トチカガミ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012 絶滅危惧Ⅱ類 (VU)

分 布 本州・四国・九州

生 育 地 水田や溝に生える。県北，県央，県西地域，
鉾田市に生育する。

選 定 理 由 農地の改修

そ の 他



水戸市 (内山)

ヤナギモ

Potamogeton oxyphyllus Miq.

ヒルムシロ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／東アジア

生 育 地 池や流水中に生える。北茨城市，常陸太田市，
常陸大宮市に生育する。

選 定 理 由 河川の改修，水質の汚濁

そ の 他



常陸太田市 (内山)

ヤマラッキョウ

Allium thunbergii G.Don

ユリ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州 (福島以南)・四国・九州・琉球／朝鮮・
中国

生 育 地 山地の草原に生える。県北，県央，鹿行地域，
つくば市，加波山に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



高萩市 (内山)

絶
滅

絶
滅
危
惧
Ⅰ
A
類

絶
滅
危
惧
Ⅰ
B
類

絶
滅
危
惧
Ⅱ
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①注
目
種

情
報
不
足
②現
状
不
明
種

ゼンテイカ

Hemerocallis dumortieri C.Morren var. *esculenta* (Koidz.) Kitam. ex M.Matsuoka et M.Hotta

ユリ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州（中北部）／樺太

生 育 地 山地または亜高山の草原，時に海岸の斜面に群生する。県北，県央地域に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



筑波山（内山）

コオニユリ

Lilium leichtlinii Hook.f. f. *pseudotigrinum* (Carriere) H.Hara et Kitam.

ユリ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／東アジア

生 育 地 山地の草地に生える。県北，県央地域や筑波山，桜川市，神栖市に生育する。

選 定 理 由 草地の開発，遷移の進行

そ の 他



大子町（内山）

マイヅルソウ

Maianthemum dilatatum (A.W.Wood) A.Nelson et J.F.Macbr.

ユリ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 危急種

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／アジア北東部～北米

生 育 地 山地や亜高山の針葉樹林下に生える。県北地域，筑波山に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市（内山）

シロバナエンレイソウ(ミヤマエンレイソウ)

Trillium tschonokii Maxim.

ユリ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／東アジア

生 育 地 山地の林下に生える。県北山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市 (内山)

ニガカシュウ

Dioscorea bulbifera L.

ヤマノイモ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州 (関東以西)・四国・九州／アジア東部
～南部

生 育 地 山野に生える。石岡市, 取手市, 常総市など
に生育する。

選 定 理 由 河川の改修

そ の 他



常総市 (成島)

ウチワドコロ

Dioscorea nipponica Makino

ヤマノイモ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州 (中北部)／東アジア

生 育 地 山地に生える。県北山地に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



北茨城市 (内山)

絶
滅

絶
滅
危
惧
I
A
類

絶
滅
危
惧
I
B
類

絶
滅
危
惧
II
類

準
絶
滅
危
惧

情
報
不
足
①
注
目
種

情
報
不
足
②
現
状
不
明
種

ミズアオイ

Monochoria korsakowii Regel et Maack

ミズアオイ科

茨城県2012	準絶滅危惧
茨城県1997	危急種
環境省2012	準絶滅危惧 (NT)

分 布	本州・四国・九州／東アジア
生 育 地	沼や水田などに生える。県南地域，茨城町，神栖市に生育する。
選 定 理 由	農地の改修，農薬の使用
そ の 他	



土浦市 (内山)

ノハナショウブ

Iris ensata Thunb. var. *spontanea* (Makino) Nakai ex Makino et Nemoto

アヤメ科

茨城県2012	準絶滅危惧
茨城県1997	
環境省2012	

分 布	北海道・本州・四国・九州／アジア北東部
生 育 地	山野の草原や湿原に生える。県北，県央地域や筑波山，竜ヶ崎市に生育する。
選 定 理 由	湿地の開発，遷移の進行
そ の 他	



水戸市 (内山)

ヒロハノイヌノヒゲ

Eriocaulon alpestre Hook.f. et Thomson ex Koern.

ホシクサ科

茨城県2012	準絶滅危惧
茨城県1997	
環境省2012	

分 布	北海道・本州・四国・九州／朝鮮・中国 (東北)
生 育 地	湿地や水田などに生える。県内各地に点々と生育する。
選 定 理 由	湿地の開発，遷移の進行
そ の 他	



ひたちなか市 (内山)

ニッポンイヌノヒゲ

Eriocaulon taquetii Lecomte

ホシクサ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／朝鮮

生 育 地 湿地や休耕田などに生える。県内各地に点々と生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



ひたちなか市（内山）

ヒメコヌカグサ

Agrostis valvata Steud.

イネ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 絶滅危惧種


環境省2012 準絶滅危惧（NT）

分 布 本州（関東以西）・四国・九州

生 育 地 半日陰の湿地に生える。県央地域，つくば市に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



（県博収蔵標本：笠間市産）

ムツオレグサ

Glyceria acutiflora Torr. subsp. *japonica* T.Koyama et Kawano

イネ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 北海道・本州・四国・九州／東アジア・北米

生 育 地 水田，池畔に生える。北茨城市，常陸太田市，水戸市，茨城町，神栖市などに生育する。

選 定 理 由 農地の改修

そ の 他



（県博収蔵標本：つくば市産）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種

カモノハシ

Ischaemum aristatum L. subsp. *glaucum* (Honda) T.Koyama

イネ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州・四国・九州

生 育 地 湿地などに生える。県内各地の湿地や砂浜に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



笠間市（内山）

セイタカヨシ

Phragmites vallatoria (L.) Veldkamp

イネ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州・琉球／東アジア・インド・太平洋諸島・豪州

生 育 地 水湿地や湖岸に群生する。土浦市，神栖市に生育する。

選 定 理 由 湖岸の埋立

そ の 他



行方市（内山）

イヌアワ

Setaria chondrachne (Steud.) Honda

イネ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997

環境省2012

分 布 本州（山形県・関東以西）・四国・九州／東アジア

生 育 地 藪などに生える。県北地域や取手市，古河市などに生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



大子町（中崎）

ヒゲシバ

Sporobolus japonicus (Steud.) Maxim. ex Rendle

イネ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 本州・四国・九州／中国

生 育 地 湿地に生える。県北，県央地域，五霞村に生育する。

選 定 理 由 湿地の開発，遷移の進行

そ の 他



(県博収蔵標本：つくば市産)

ザゼンソウ

Symplocarpus foetidus Salisb. ex W.P.C.Barton var. *latissimus* H.Hara

サトイモ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州／東アジア北部

生 育 地 水湿地に生える。県北，県央地域に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



那珂市（内山）

ヒメザゼンソウ

Symplocarpus nipponicus Makino

サトイモ科

茨城県2012 準絶滅危惧

茨城県1997 希少種

環境省2012

分 布 北海道・本州／朝鮮

生 育 地 林縁や道ばたの湿地に生える。大子町，城里町，ひたちなか市，水戸市に生育する。

選 定 理 由 森林の伐採

そ の 他



水戸市（内山）

絶滅

絶滅危惧ⅠA類

絶滅危惧ⅠB類

絶滅危惧Ⅱ類

準絶滅危惧

情報不足
①注目種

情報不足
②現状不明種