

エゾツリスゲ

Carex papulosa Boott

カヤツリグサ科
Cyperaceae

カテゴリー

大分県 II
環境庁 掲載なし

- 選定理由** | 本県，熊本県が分布の南限域となっている。生育地は散在しているが，個体数は多くない。過湿環境を生育地としており，湿原の開発や生育環境の悪化で生育地の衰退や減少が懸念される。
- 県内分布** | 耶馬溪地区，日田低地・丘陵地，津江山地，玖珠丘陵地・山地，九重火山群，由布・鶴見火山群
- 分布域** | 北海道 本州(東北地方 栃木 福島 長野) 九州(熊本・大分) 朝鮮半島，ウスリー
- 生育環境** | 丘陵地から山地の湿地。
- 現 状** | 安定した湿地に群生しているが，いずれも生育する範囲は狭い。乾燥化して生育の衰退した所がある。
- 備 考** | 北方寒冷地要素の植物。九州は，分布の南限域にあたる。

タカネマスクサ

Carex planata
Franch. et Savat.

カヤツリグサ科
Cyperaceae

カテゴリー

大分県 IB
環境庁 掲載なし

- 選定理由** | 県内の生育地，個体数とも極めて少なく，生育地は市街地であって，多くの環境変化の要因を伴い，絶滅の危険性が高い。
- 県内分布** | (英彦山・犬ヶ岳山地)，大野川上流域
- 分布域** | 北海道(石狩) 本州 四国 九州(福岡・大分)
- 生育環境** | 低地の池畔。
- 現 状** | 池の石垣に生育する。個体数は極めて少なく，池の改修や除草などで衰退している。「英彦山・犬ヶ岳山地」の標本はあるが，その生育地は把握されていない。
- 備 考** | 九州は，分布の南限域にあたる。

クジュウスゲ

Carex sachalinensis Fr. Schmidt
var. *elongatula* (Ohwi) Ohwi

カヤツリグサ科
Cyperaceae

カテゴリー

大分県 準
環境庁 掲載なし

- 選定理由** | 県内での分布域は狭い。県内で確認された生育地，個体数はともに僅少。森林伐採や植生遷移による環境変化が懸念される。
- 県内分布** | 玖珠丘陵地・山地，九重火山群
- 分布域** | 四国 九州(大分)
- 生育環境** | 低山地や火山山頂帯の林縁，林内。
- 現 状** | 精査すれば，他の生育地が把握できるものと思われる。
- 備 考** | 基準標本産地 [久住山米山]。国立公園指定植物 [阿蘇くじゅう]。オオイトスゲ (var. *alterniflora*) に似ているが，果の嘴が長い。