



Revista Peruana de Biología

ISSN: 1561-0837

Iromeroc@unmsm.edu.pe

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Perú

León, Blanca
Malpighiaceae endémicas del Perú
Revista Peruana de Biología, vol. 13, núm. 2, diciembre, 2006, pp. 409s-412s
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Lima, Perú

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=195018608072>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

Malvaceae endémicas del Perú

Magda Chanco ¹, Blanca León ^{1,2} e Isidoro Sánchez ³

¹ Museo de Historia Natural,
Av. Arenales 1256, Apto.
14-0434, Lima 14, Perú.

mchancoe@unmsm.edu.pe

² Plant Resources Center,
University of Texas at
Austin, Austin TX 78712
EE.UU.

blanca.leon@mail.utexas.edu

³ Herbario, Universidad Na-
cional de Cajamarca,
Apto. 55, Cajamarca, Perú.
svisidoro@yahoo.com

Resumen

La familia Malvaceae es reconocida en el Perú con 38 géneros y 264 especies (Brako & Zarucchi 1993, Ulloa et al. 2004), mayormente arbustos y hierbas. En este trabajo reconocemos 87 especies endémicas en 16 géneros. El género más rico en especies endémicas es *Nototriche*. Las especies endémicas se encuentran en varias regiones ecológicas, entre ellas Altoandina, Mesoandina y Puna Húmeda y Seca, por encima de los 2500 m, hasta alcanzar los límites de la vegetación a 5100 m de altitud. Se aplicaron las categorías y criterios de la UICN a 84 especies. Once especies endémicas se encuentran presentes en el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado.

Palabras claves: Malvaceae, *Nototriche*, Perú, endemismo, plantas endémicas.

Abstract

The Malvaceae are represented in Peru by 38 genera and 264 species (Brako & Zarucchi, 1993; Ulloa Ulloa et al., 2004), mostly shrubs and herbs. Here we recognize 87 endemic species in 16 genera. *Nototriche* is the genus with the largest number of endemic species. Endemic Malvaceae species are found in many ecological regions, including High-Andean, Mesoandean, and Humid and Dry Puna, between 2500 m and 5100 m elevation. We applied IUCN categories and criteria to 84 species. Eleven endemic species have been recorded from Peru's protected areas system.

Keywords: Malvaceae, *Nototriche*, Peru, endemism, endemic plants.

1. *Abutilon arequipense* Ulbr.

EN, B1a

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 54 (Beibl. 117): 49. 1916.

Colección tipo: A. Weberbauer 6863

Herbarios: GH, US; MOL.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AR.

Regiones Ecológicas: MA; 2800—2900 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: CUZ (1), MOL (isotipo), USM (1).

Observaciones: Arbusto conocido de laderas xéricas, en el Cañón del Cotahuasi. El ejemplar tipo fue recolectado en 1914; otras colecciones adicionales provienen de los años de los 1980 y 1990. Ha sido reconocida por el INRENA con la misma categoría que aquí se trata.

2. *Abutilon longipes* Ulbr., nom. illeg., no Mattei 1909

NE

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 54(Beibl. 117): 52. 1916.

Colección tipo: A. Weberbauer 5599

Herbarios: US.

Nombre común: Jarul jarul, phancho.

Registro departamental: AY, CU.

Regiones Ecológicas: BMHM; 2400—2500 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Arbusto conocido aparentemente sólo del sur del país, de las cuencas del Apurímac, Marcapata y Urubamba. Los ejemplares conocidos provienen de recolectas realizadas en los años de los 1910 y 1920. Podría ser coespecífico con *Abutilon arboreum* del Perú y Bolivia. Si *Abutilon longipes* se continúa aceptando como una entidad biológica, entonces requiere evaluarse su nomenclatura.

3. *Abutilon pedunculare* Kunth

LC

Publicación: Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 5: 273. [1822]. 1821.

Colección tipo: A. Humboldt & A. Bonpland s.n.

Herbarios: P, B.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AM, CA, TU.

Regiones Ecológicas: BS; 600—1820 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: CPUN (1), HAO (1), HUT (2), USM (8).

Observaciones: Arbusto conocido del bosque seco del Chamaya y Marañón y de una población disyunta en Tumbes. Esta especie es afín a *Abutilon reflexum* de Ecuador y Perú.

4. *Abutilon piurense* Ulbr.

EN, B1a

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 54(Beibl. 117): 55. 1916.

Colección tipo: A. Weberbauer 6010

Herbarios: B.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AM, LA, PI.

Regiones Ecológicas: DCT, MDE, BS; 700—1000 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: HAO (1), HUT (1).

Observaciones: Arbusto conocido de unas pocas localidades en el norte del país. Ocurre en matorrales xéricos y laderas expuestas, tanto en valles interandinos del Huancabamba y Marañón, como en la vertiente occidental del Santa Ana, un tributario del Chicama. Ha sido considerada por el INRENA como una especie En Peligro Crítico.

5. *Acaulimalva acaulis* (Dombey ex Cav.) Krapov.

EN, B1a

Publicación: Darwiniana 19(1): 15. 1974.

Colección tipo: J. Dombey 677

Herbarios: P.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AN, LI.

Regiones Ecológicas: PSH; 3700—4100 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: USM (2).

Observaciones: Hierba acaule conocida, al parecer, de unas pocas localidades en la parte altoandina del centro del país. Ha sido recolectada de la cuenca del Chillón y de la parte alta de un tributario del Mantaro. Poco se sabe de las condiciones actuales de sus poblaciones.

6. *Acaulimalva alismatifolia* (K. Schum. & Hieron.)

Krapov.

CR, B1ab(i, iii)

Publicación: Darwiniana 19(1): 16. 1974.

Colección tipo: A. Stübel 39

Herbarios: B.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: CA.

Regiones Ecológicas: MA, PAR; 2700—3700 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: CPUN (3), HUT (2).

Observaciones: Planta acaule, conocida solamente de una localidad del norte del país. Ha sido recolectada por cerca de tres décadas a diferentes altitudes, pero de poblaciones vecinas o tal vez una misma población. La localidad original, llamada Jalca de Kumulka, está siendo fragmentada y severamente modificada por la agricultura intensiva, incendios intencionales y establecimiento de morada de pastores. Probablemente sea coespecífica con *Acaulimalva perassiaefolia*. Ha sido reconocida por el INRENA como una especie En Peligro.

7. *Acaulimalva betonicifolia* (A.W. Hill) Krapov.

VU, B1a

Publicación: Darwiniana 19(1): 16. Como «betonicaefolia». 1974.

Colección tipo: R.W. Pearce s.n.

Herbarios: K.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AY, HV, JU.

Regiones Ecológicas: PSH; 3700—4260 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: USM (2).

Observaciones: Hierba acaule, conocida de varias localidades en el centro del país. Esta especie ha sido recolectada de las cuencas altas del Mantaro y Apurímac. Ocupa ambientes expuestos de la puna. Un ejemplar procedente de Colombia ha sido reconocido como esta especie, pero no pudo ser verificado, por lo que aquí se sigue aceptando como endémica.

8. *Acaulimalva crenata* (A.W. Hill) Krapov.

VU, B1a

Publicación: Darwiniana 19(1): 18. 1974.

Colección tipo: A. Weberbauer 360

Herbarios: B.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AN, CA, HV, JU, LL, PA.

Regiones Ecológicas: PSH, PAR; 3690—4600 m.

SINANPE: PNH

Herbarios peruanos: CPUN (4), HUT (4), USM (5).

Observaciones: Hierba altoandina ampliamente distribuida en el país. Esta especie es conocida de varios ejemplares depositados en los herbarios peruanos. Fue descrita de una planta recolectada en una subcuenca alta del Mantaro, en 1902. Al parecer, un ejemplar procedente de Bolivia, se atribuye a esta especie, pero no pudo ser verificado.

9. *Acaulimalva hillii* Krapov.

DD

Publicación: Darwiniana 19(1): 21. 1974.

Colección tipo: R. Ferreyra 3818

Herbarios: CTES; USM!

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: JU.

Regiones Ecológicas: MA, PSH; 3300—4500 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: USM (isotipo+3).

Observaciones: Hierba acaulescente, conocida de unas cinco localidades en el centro del país, casi todas en una zona entre La Oroya y Tarma. Esta zona incluye áreas afectadas por la contaminación minera, como por el sobrepastoreo, pero se desconoce los efectos sobre las poblaciones de esta especie.

10. *Acaulimalva rhizantha* (A. Gray) Krapov.

VU, B1a

Publicación: Darwiniana 19(1): 31. 1974.

Colección tipo: C. Wilkes, Exped. Expl. US. s.n.

Herbarios: US.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AN, AR, CU, HV, LI, PA.

Regiones Ecológicas: MA, PSH; 3000—4200 m.

SINANPE: SHMP

Herbarios peruanos: HUT (3), USM (10).

Observaciones: Hierba acaulescente, conocida de ambientes andinos del centro y sur del país. El ejemplar tipo fue recolectado en 1839, en la cuenca del Chillón. Esta especie habita herbazales dominados por gramíneas. Una población está en el Santuario Histórico Machu Picchu.

11. *Acaulimalva richii* (A. Gray) Krapov.**VU, B1a**

Publicación: Darwiniana 19(1): 32. 1974.
Colección tipo: C. Wilkes, Exped. Expl. US. s.n.
Herbarios: US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, AY, HV, JU, LI, PA.
Regiones Ecológicas: PSH, AA; 3800—4400 m.
SINANPE: PNH
Herbarios peruanos: USM (4).

Observaciones: Hierba acaulescente que vive en ambientes de puna, del centro del país. Ha sido recolectada de varias localidades, incluyendo una en el Parque Nacional Huascarán. Esta especie proviene de la misma zona que *Acaulimalva rhizantha*, otra endémica. Fue recolectada también en 1839.

12. *Acaulimalva stuebelii* (Hieron.) Krapov.**EN, B1a**

Publicación: Darwiniana 19(1): 34. 1974.
Colección tipo: A. Stübel 38
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA.
Regiones Ecológicas: PAR; 3050—3600 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (4), HUT (3), USM (3).

Observaciones: Planta acaulescente conocida de ambientes paramunos en el norte del país. Esta especie es abundante localmente, aunque sus poblaciones se hallan naturalmente fragmentadas; una de éstas se halla en la Jalca de Kumulca, la que está afectada por modificación severa de sus condiciones naturales.

13. *Acaulimalva sulphurea* Krapov.**EN, B1a**

Publicación: Darwiniana 19(1): 34. 1974.
Colección tipo: A. Sagástegui A. et al. 4537
Herbarios: CTES; HUT.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, CA, LL.
Regiones Ecológicas: PSH, PAR; 2800—4020 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (3), HAO (1), HUT (isotipo), USM (2).

Observaciones: Planta acaule, conocida de varias localidades en las regiones andinas de La Libertad y Cajamarca. Esta especie es localmente frecuente, aunque se requiere de recolecciones adicionales y observaciones de sus poblaciones para aclarar su rango de distribución.

14. *Acaulimalva weberbaueri* (Ulbr.) Krapov.**EN, B1a**

Publicación: Darwiniana 19(1): 35. 1974.
Colección tipo: A. Weberbauer 2760
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN.
Regiones Ecológicas: PSH; 3500—4300 m.
SINANPE: PNH

Observaciones: Hierba acaulescente, conocida de numerosas colecciones realizadas en las cuencas altas del Santa y del Pativilca. Esta especie ocupa herbazales dominados por gramíneas y bordes de lagunas altoandinas.

15. *Andeimalva machupichensis* (Krapov.) J.A. Tate**EN, B1a**

Publicación: Lundellia 6: 15. 2003.
Colección tipo: C. Vargas C. 791
Herbarios: CAS, F, GH, LIL.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU.
Regiones Ecológicas: BMHM; 2100—3399 m.
SINANPE: SHMP
Herbarios peruanos: CUZ (3), USM (1).

Observaciones: Arbusto conocido de unas cinco localidades, en la cuenca del Urubamba. Fue descrito de una planta recolectada en el Santuario Histórico Machu Picchu, en 1938.

16. *Andeimalva spiciformis* (Krapov.) J.A. Tate**EN, B1a**

Publicación: Lundellia 6: 14. 2003.
Colección tipo: G. Kunkel 495
Herbarios: LIL.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AY, HV, LL.
Regiones Ecológicas: MA; 2400—3200 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1), USM (1).

Observaciones: Arbusto conocido de escasos ejemplares y localidades aisladas en el norte y centro del país; fue descrita de una planta recolectada en la cuenca del Mantaro, en 1960. Brako & Zarucchi (1993) la incluyeron bajo *Tarasa*, pero posteriores estudios moleculares permitieron segregar esta especie en *Andeimalva* (Tate, 2003), criterio que aquí se acepta.

17. *Cristaria multifida* Cav.**VU, B1ab(iii)**

Publicación: Icon. 5: 11, obs. 1799.
Colección tipo: J. Dombey s.n.
Herbarios: MA.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, LL, LI, MO.
Regiones Ecológicas: DST, MDE; 150—2100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (7), USM (6).

Observaciones: Hierba terrestre de hojas suculentas conocida de poblaciones naturalmente fragmentadas desde La Libertad hasta Moquegua. No fue incluida como endémica por Brako & Zarucchi (1993); sin embargo Muñoz (1995) la cita como un endemismo peruano, criterio que aquí se acepta.

18. *Fuertesimalva corniculata* (Krapov.) Fryxell**DD**

Publicación: Sida 17(1): 72. 1996.
Colección tipo: M. Chanco 25
Herbarios: CTES; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, LI.
Regiones Ecológicas: DST, MDE; 1000 m.
SINANPE: Sin registro

Observaciones: Hierba conocida aparentemente sólo de dos poblaciones fragmentadas en el centro y sur del país, las que ocupan la franja desértica y la vertiente occidental.

19. *Fuertesimalva leptocalyx* (Krapov.) Fryxell

EN, B1a

Publicación: Sida 17(1): 73. 1996.
Colección tipo: A. Alza 11
Herbarios: LIL.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, CA, LL.
Regiones Ecológicas: MDE, MA; 1700—2100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1), USM (1).

Observaciones: Esta especie herbácea o subarborescente se conoce de tres localidades ubicadas en las laderas de la vertiente del Pacífico. El área de presencia de esta especie no supera los 800 km²; donde ocupa ambientes semixéricos.

20. *Fuertesimalva pennellii* (Ulbr.) Fryxell

DD

Publicación: Sida 17(1): 74. 1996.
Colección tipo: F.W. Pennell 13206
Herbarios: F.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, LI.
Regiones Ecológicas: MA; 2500—2900 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (3).

Observaciones: Planta anual conocida del centro del país, de las vertientes occidentales. Esta especie fue descrita de una planta recolectada en 1925 de los alrededores de Arequipa. También se la conoce del centro del país, de las vertientes occidentales. Se desconoce las condiciones de sus poblaciones.

21. *Fuertesimalva stipulata* (Fryxell) Fryxell

DD

Publicación: Sida 17(1): 75. 1996.
Colección tipo: C.L. Burandt et al. 2333
Herbarios: F, NY; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA.
Regiones Ecológicas: MDE; 1400 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo).

Observaciones: Hierba conocida sólo de una localidad en la vertiente del Pacífico. Fue recolectada de un tributario de la cuenca del Chicama, en 1987, de ambientes mésicos a lo largo de un camino.

22. *Gaya atiquipana* Krapov.

CR, B1ab(iii)

Publicación: Bonplandia 9(1—2): 72. 1996.
Colección tipo: R. Ferreyra 18676
Herbarios: CTES; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR.
Regiones Ecológicas: DST; 350—430 m.
SINANPE: Sin registro.

Observaciones: Hierba sufruticosa conocida de la costa desértica, de una sola población, en el sur del país. Ha sido recolectada durante la época invernal que corresponde a la formación de la vegetación de lomas.

23. *Gaya calytrata* (Cav.) Kunth

LC

Publicación: Nov. Gen. Sp. 5: 268. in observ. 1821.
Colección tipo: J. Dombey s.n.
Herbarios: MA.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA, CU, LL, LI.
Regiones Ecológicas: DST, NDE, MA; 500—3280 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (3), USM (1).

Observaciones: Esta especie herbácea, de amplia distribución en el país, fue redefinida como endémica por Krapovickas (1996). Fue descrita de una planta recolectada, probablemente cerca a Lima, en el siglo XVIII. Otras poblaciones ocupan un amplio rango ecológico y altitudinal.

24. *Gaya mollendoensis* Krapov.

DD

Publicación: Bonplandia 9(1—2): 77. 1996.
Colección tipo: M.O. Dillon et al. 4829
Herbarios: CTES, F; HUT.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR.
Regiones Ecológicas: DST; 510—580 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (isotipo).

Observaciones: Subarborescente conocido de la costa desértica del sur del país, solamente de una localidad. Esta especie fue recolectada durante el evento «El Niño» de 1986.

25. *Gaya nutans* (L'Her.) Sweet

DD

Publicación: Hortus Brit. (ed. 2) 64. 1830.
Colección tipo: H. Ruiz & J. Pavón s.n.
Herbarios: G-DC.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HU.
Regiones Ecológicas: BS; 2065—2200 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1).

Observaciones: Arbusto conocido de una población del departamento de Huánuco, en valles semixéricos del Marañón. Los reportes en TROPICOS de esta especie para Amazonas y Cajamarca son dudosos, por lo que se los excluye.

26. *Gaya peruviana* Ulbr.

LC

Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 540. 1932.
Colección tipo: A. Weberbauer 6363
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CA, LL, PI.
Regiones Ecológicas: MDE, MA, PAR; 1500—3650 m.
SINANPE: Sin registro.

Observaciones: Subarbusto conocido de laderas pedregosas y xéricas del norte del país, en un amplio rango altitudinal y ecológico.

27. *Gaya triflora* Hochr.

DD

Publicación: Annuaire Conserv. Jard. Bot. Geneve 20: 141. 1917.

Colección tipo: A. Mathews 3236

Herbarios: G.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AM.

Regiones Ecológicas: Sin datos; altitud desconocida.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba o subarbusto conocido, al parecer, sólo de colecciones realizadas en el siglo XIX en el norte del país, de procedencia exacta desconocida.

28. *Gaya weberbaueri* Ulbr.

Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 541. 1932.

Colección tipo: A. Weberbauer 7118

Herbarios: B, F.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: CA, HU, JU.

Regiones Ecológicas: MDE, BS; 550—1100 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: HUT (1).

Observaciones: Arbusto conocido de varias localidades dispersas. En el norte, en valles con laderas secas de las cuencas de los ríos Huancabamba y Chotano. No ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

29. *Gossypium raimondii* Ulbr.

EN, B1ab(iii)

Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 548. 1932.

Colección tipo: A. Raimondi 8218

Herbarios: B.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AM, CA, LA, LL.

Regiones Ecológicas: DST, MDE; 300—1000 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: CPUN (1), HAO (2), HUT (6).

Observaciones: Arbusto de ambientes semixéricos, descrito de plantas recolectadas en el siglo XIX, en la cuenca del río Chicama. Otras poblaciones aisladas son conocidas principalmente del norte de la vertiente del Pacífico. Varias recolectas desde mediados de 1950 han sido realizadas en los alrededores de la localidad tipo. Esta especie se emplea desde épocas prehispánicas como fibra. Fue reconocida por el INRENA como una especie en estado «Crítico».

30. *Hibiscus chancoae* Krapov. & Fryxell

NE

Publicación: Bonplandia 13(1—4): 58, f. 9. 2004.

Colección tipo: M. Chanco 564

Herbarios: CTES; USM.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: SM.

Regiones Ecológicas: BHA; 430 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: USM (isotipo+2).

Observaciones: Esta especie arbustiva se conoce solamente de la cuenca del río Huallaga, de ambientes ribereños. Aparentemente no ha vuelto a ser recolectada desde 1981, probablemente debido a lo poco que se herboriza en este tipo de ambientes.

31. *Malvastrum scoparioides* Ulbr.

Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 525. 1932.

Colección tipo: A. Weberbauer 3196

Herbarios: B.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AN, CA, HU, LI, LL.

Regiones Ecológicas: MDE, MA; 1300—2400 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: HUT (3).

Observaciones: Subarbusto conocido de varias localidades tanto en la vertiente occidental como en valles interandinos. En el suroeste de Cajamarca ha sido recolectada en matorrales intervenidos.

32. *Nototriche antoniana* M. Chanco

DD

Publicación: Novon 2(1): 12—13, f. 1—3. 1992.

Colección tipo: A. Cardich s.n.

Herbarios: ; USM.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: HU.

Regiones Ecológicas: AA; 4200—4780 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: USM (holotipo+4).

Observaciones: Hierba perenne, conocida aparentemente de unas pocas localidades en una subcuenca del Marañón. Poco se sabe de las condiciones de sus poblaciones.

33. *Nototriche aretioides* (A. Gray) A.W. Hill

EN, B1ab(iii)

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 580. 1906.

Colección tipo: C. Wilkes, Exped. Expl. US. s.n.

Herbarios: US.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: HU, HV, JU, LI, PA.

Regiones Ecológicas: PSH, AA; 4000—5100 m.

SINANPE: Sin registro.

Observaciones: Esta especie herbácea fue probablemente recolectada por primera vez en Junín y no en Lima, como aseveró Hill (1906). Se conoce de varias localidades en el centro del Perú. Algunas de sus poblaciones podrían estar afectadas por la actividad minera.

34. *Nototriche argylloides* A.W. Hill

NE

Publicación: Trans. Linn. Soc. London, Bot. ser. 2, 12: 245. 1909.

Colección tipo: A.W. Hill 80

Herbarios: K.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AR, MO.

Regiones Ecológicas: PSH; 4000 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba perenne probablemente conocida del sur del país. Esta especie es afín a *Nototriche rugosa* y probablemente coespecífica; se hace necesario un análisis más amplio del material. Foster (1958) la listó para Bolivia, pero no ha sido posible verificar esta observación.

35. *Nototriche armerifolia* A.W. Hill

DD

Publicación: Kew Bull. 160. 1935.

Colección tipo: D. Stafford 362

Herbarios: K.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: PU.

Regiones Ecológicas: PSH; 4000—4500 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba o subarbusto conocido aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en la Cordillera de Vilcanota, al suroeste del glaciar Quelccaya, entre los límites departamentales de Cusco y Puno. Al parecer, no ha vuelto a ser recolectada desde 1937.

36. *Nototriche artemisioides* A.W. Hill

NE

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 580. 1906.

Colección tipo: A. Weberbauer 4068

Herbarios: G.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: CA.

Regiones Ecológicas: PSH, PAR; 3900—4000 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Planta cespitosa, conocida de la localidad tipo. Esta especie es afín a *Nototriche obtusa* y probablemente coespecífica, por lo que se hace necesario un estudio más detallado de sus relaciones. Fue considerada por el INRENA como una especie «En Peligro Crítico».

37. *Nototriche borussica* (Meyen) A.W. Hill

DD

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 579. 1906.

Colección tipo: F. Meyen s.n.

Herbarios: B, W.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AR, HV, TA.

Regiones Ecológicas: PSH; 3800 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Subarbusto cespitoso, conocido, al parecer, de dos localidades en el sur del país. Podría estar representada en la flora de Chile.

38. *Nototriche castelnaeana* (Wedd.) A.W. Hill

DD

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 579. 1906.

Colección tipo: F. de Castelnau s.n.

Herbarios: P.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: CU.

Regiones Ecológicas: PSH, AA; 3600—4500 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba perenne conocida de ambientes de puna en el sur del país, con poblaciones naturalmente fragmentadas; poco se sabe de las condiciones de sus poblaciones.

39. *Nototriche coccinea* A.W. Hill

VU, B1a

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 583. 1906.

Colección tipo: A. Weberbauer 3276

Herbarios: B, K; USM.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AN, PA.

Regiones Ecológicas: AA; 4450—5100 m.

SINANPE: PNH

Herbarios peruanos: CPUN (2), HUT (1), USM (isotipo+6).

Observaciones: Subarbusto perenne, conocido de varias localidades en las partes altoandinas del centro del país. Fue descrita de una planta recolectada en Yungay, hoy en el Parque Nacional Huascarán. Esta área protegida cuenta al parecer con varias poblaciones.

40. *Nototriche cupuliforme* Krapov.

DD

Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 71. 1953.

Colección tipo: C. Vargas C. 7119

Herbarios: LIL; CUZ, USM!

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: PU.

Regiones Ecológicas: AA; 4360 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: CUZ (isotipo), USM

Observaciones: Hierba perenne conocida aparentemente sólo de la colección tipo. Se hace necesario revisar colecciones botánicas depositadas en los herbarios peruanos del sur, así como realizar estudios de campo.

41. *Nototriche digitulifolia* A.W. Hill

DD

Publicación: Kew Bull. 127, f. II. 1948.
Colección tipo: D. Stafford 765
Herbarios: F, K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, PU.
Regiones Ecológicas: PSH; 4500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba perenne, conocida de la puna del sur del país. Esta especie está representada por escasos ejemplares de herbario. Se hace necesario realizar trabajo de campo con observaciones de la situación de sus poblaciones. Podría estar representada en la flora boliviana o chilena.

42. *Nototriche dissecta* A.W. Hill

DD

Publicación: Trans. Linn. Soc. London, Bot. 7: 238. 1909.
Colección tipo: R.W. Pearce s.n.
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AP, CU, PU.
Regiones Ecológicas: PSH, AA; 3900—4950 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CUZ (4).

Observaciones: Esta hierba perenne es conocida del sur del país. Podría estar representada en la flora boliviana. Esta especie también podría confundirse con *Nototriche orbignyana*, una especie peruano-boliviana.

43. *Nototriche ellipticifolia* Hochr.

DD

Publicación: Candollea 16: 83—84. 1957.
Colección tipo: W. Rauh & G. Hirsch P-1694
Herbarios: G.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AP.
Regiones Ecológicas: PSH; 4100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba perenne, conocida solamente del tipo, una planta recolectada en 1954, de la puna entre las cuencas del Pampas y el Chalhuanca. Esta parte del país ha sido escasamente herborizada.

44. *Nototriche epileuca* A.W. Hill

DD

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 585. 1906.
Colección tipo: A. Weberbauer 2801
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN.
Regiones Ecológicas: AA; 4000—4400 m.
SINANPE: Sin registro.

Observaciones: Hierba cespitosa conocida aparentemente de dos colecciones, ambas provenientes de la cuenca alta del río Pativilca. El ejemplar tipo fue recolectado en 1903, el material adicional en 1956. Es necesario un estudio de campo asociado a revisión de colecciones de herbario. Se desconoce el tamaño de sus poblaciones.

45. *Nototriche erinacea* A.W. Hill

DD

Publicación: Kew Bull. 127—128, f. III. 1948.
Colección tipo: D. Stafford 758
Herbarios: F, K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: PU.
Regiones Ecológicas: AA; 4800 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba perenne, arrosada, conocida aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1937 en el sur del país. Foster (1958) la citó para la flora boliviana, sin embargo, no se ha confirmado esta observación.

46. *Nototriche foetida* Ulbr.

EN, B1a

Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 11: 530. 1932.
Colección tipo: A. Weberbauer 7361
Herbarios: B, F, US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: MO, TA.
Regiones Ecológicas: AA; 4500—4750 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1).

Observaciones: Hierba perenne que forma almohadillados en la parte altoandina del suroccidente del país. Esta especie fue descrita de un ejemplar recolectado en 1925 y está representada por muy pocas colecciones de herbario, tal vez por lo poco que se herboriza los ambientes en donde crece. La zona geográfica en que se conoce fue considerada, justificadamente, como carente en información botánica (Cano et al. 1996).

47. *Nototriche glacialis* Ulbr.

DD, B1a

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 54(Beibl. 117): 62. 1916.
Colección tipo: A. Weberbauer 6523
Herbarios: B, F; USM!
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: JU.
Regiones Ecológicas: AA; 4900—5000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo).

Observaciones: Hierba terrestre y pulvinada, conocida solamente de la colección tipo, una planta recolectada en 1913, al pie de un glaciar, hoy desaparecido. Se hace necesario estudiar esta especie y aclarar las afinidades con *Nototriche coxinea*, otra endémica peruana.

48. *Nototriche gracilens* Killip & J.F. Macbr.

CR, B1a

Publicación: Field Mus. Nat. Hist., Bot. Ser. 13(3A/2): 548. 1956.
Colección tipo: J. Soukup 3604
Herbarios: US.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: HU.
Regiones Ecológicas: AA; 5000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba conocida solamente de la colección tipo, una planta recolectada en 1948, de los alrededores de la Laguna Huacrascocha. Esta laguna está severamente afectada por contaminación minera, además se halla en los planes de trasvase de sus aguas para la ciudad de Lima (Guerrero Gárate, 2005). *Nototriche gracilens* es afín a *N. armeriifolia*, otra especie endémica, por ello se hace necesario realizar mayores observaciones y colecciones de campo.

49. *Nototriche longituba* B.L. Burt & A.W. Hill

DD

Publicación: Kew Bull. 130, f. VI. 1948.
Colección tipo: A.H. Williams s.n.
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: PU.
Regiones Ecológicas: AA; 4450 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba arrossetada con dimorfismo foliar, conocida aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en 1938 del sur del país. Probablemente en la flora boliviana. Se requiere mayores estudio y colecciones de campo.

50. *Nototriche lopezii* Krapov.

EN, B1ab(iii)

Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 6(3—4): 233—235, f. 1. 1957.
Colección tipo: A. López M. 1020
Herbarios: LIL; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: LL.
Regiones Ecológicas: PAR; 3800—4100 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (5), USM (holotipo).

Observaciones: Hierba conocida de los ambientes paramunos en la cuenca alta del Tablachaca, un afluente del Santa. Esta especie ha sido recolectada de zonas intervenidas. Poco se sabe del tamaño de sus poblaciones. Las localidades conocidas están afectadas por la actividad minera y el pastoreo intensivo.

51. *Nototriche macleanii* (A. Gray) A.W. Hill

DD

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 579. 1906.
Colección tipo: J. Maclean s.n.
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: JU.
Regiones Ecológicas: AA; 4300—4600 m.
SINANPE: Sin registro.

Observaciones: Hierba perenne conocida de unas pocas colecciones del centro del país. Podría ser confundida con *Nototriche aretioides*. Se desconoce las condiciones actuales de sus poblaciones.

52. *Nototriche nigrescens* A.W. Hill

DD

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 580. 1906.
Colección tipo: A. Weberbauer 381
Herbarios: B (d).
Nombre común: Huikkuna-thurpa.
Registro departamental: CU, JU.
Regiones Ecológicas: AA; 4400—4800 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba perenne, conocida solamente de colecciones realizadas a inicios del siglo XX. La colección tipo, una planta recolectada en el centro del país, proviene de la parte alta de la cuenca del Mantaro, en la cual no ha vuelto a ser hallada. Los ejemplares procedentes de Cusco no han sido verificados.

53. *Nototriche obtusa* A.W. Hill

NE

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 583. 1906.
Colección tipo: A. Weberbauer 2897
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN.
Regiones Ecológicas: AA; 4020—4870 m.
SINANPE: PNH
Herbarios peruanos: HUT (2), USM (2).

Observaciones: Hierba perenne, cespitosa o pulvinada, conocida solamente de localidades aisladas en la parte altoandina del centro del país.

54. *Nototriche ovalifolia* Hochr.

DD

Publicación: Candollea 15: 179. 1956.
Colección tipo: W. Rauh & G. Hirsch P1782a
Herbarios: G.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: JU.
Regiones Ecológicas: PSH; 4200 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba perenne conocida solamente de la colección tipo, una planta recolectada en 1954, del nevado Huaytapallana. Se requiere verificar si aún existen poblaciones en la localidad original.

55. *Nototriche pellicea* A.W. Hill

DD

Publicación: Kew Bull. 133, f. VIII. 1948.
Colección tipo: J.E. Sharpe 168
Herbarios: K.
Nombre común: Turpa.
Registro departamental: PU.
Regiones Ecológicas: AA; 4000—4750 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (1)

Observaciones: Hierba perenne, probablemente podría ser un indicador edáfico, pues habita suelos anegados con contenido de cobre. La descripción original menciona este carácter y el análisis de la planta con cenizas conteniendo 0,77% de cobre. Al parecer, no ha vuelto a ser recolectada desde 1964.

56. *Nototriche peruviana* M. Chanco

EN, B1a

Publicación: Novon 2(1): 14—15, f. 4—6. 1992.

Colección tipo: M. Chanco 368

Herbarios: CTES; USM!

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: PA.

Regiones Ecológicas: AA; 4700—5000 m.

SINANPE: SNH

Herbarios peruanos: USM (holotipo+1).

Observaciones: Hierba perenne conocida aparentemente de una localidad. La colección tipo fue recolectada en 1976, de un pajonal en una localidad que hoy está en el Santuario Nacional de Huayllay. La localidad tipo ha sido escasamente herborizada.

57. *Nototriche pseudopichinchensis* Hochr.

DD

Publicación: Candollea 16: 81. 1957.

Colección tipo: W. Rauh & G. Hirsch P-1197

Herbarios: G; USM.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: CU.

Regiones Ecológicas: Sin datos; altitud desconocida.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: USM (isotipo).

Observaciones: Hierba perenne, conocida aparentemente sólo de la colección tipo, una planta recolectada en la década de 1950.

58. *Nototriche salina* B. L. Burt & A.W. Hill

DD

Publicación: Kew Bull. 135—136, f. X. 1948.

Colección tipo: D. Stafford 1325

Herbarios: K.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: AR.

Regiones Ecológicas: AA; 4450 m.

SINANPE: RNS

Herbarios peruanos: Ninguno.

Observaciones: Hierba arrosada conocida aparentemente de una localidad en el suroccidente del país. Esta especie fue recolectada en 1938, de las márgenes de la Laguna Salinas con contenido de bórax.

59. *Nototriche staffordiae* Burt & A.W. Hill

DD

Publicación: Kew Bull. 136, f. XI. 1948.

Colección tipo: D. Stafford 1263

Herbarios: K.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: PU.

Regiones Ecológicas: AA; 4570 m.

SINANPE: Sin registro.

Observaciones: Hierba arrosada conocida, al parecer, sólo de la colección original, una planta recolectada en 1938, en el sur del país. Se hace necesario realizar colecciones de campo para saber el estado de sus poblaciones.

60. *Nototriche stenopetala* (A. Gray) A.W. Hill

NE

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 579. 1906.

Colección tipo: C. Pickering s.n.

Herbarios: US.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: HV, JU, LI, PA.

Regiones Ecológicas: AA; 4200—4500 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: USM (2).

Observaciones: Hierba perenne conocida del centro del país. Esta especie está escasamente registrada en los herbarios. Habita pajonales de puna.

61. *Nototriche sulcata* Krapov.

DD

Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 6(3—4): 236—238, f. 3. 1957.

Colección tipo: O. Tovar 1184

Herbarios: LIL; MOL!, USM!

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: HV.

Regiones Ecológicas: AA; 4400 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: MOL (isotipo), USM (isotipo+1).

Observaciones: Hierba perenne conocida, al parecer, sólo de una localidad, en la cuenca del Mantaro, donde no ha vuelto a ser registrada desde 1952.

62. *Nototriche tovari* Krapov.

EN, B1a

Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 6(3—4): 235—236, f. 2. 1957.

Colección tipo: O. Tovar 882

Herbarios: ; USM.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: HV, JU.

Regiones Ecológicas: PSH, AA; 4100—4600 m.

SINANPE: Sin registro.

Herbarios peruanos: USM (holotipo+1), SMF (1).

Observaciones: Hierba perenne conocida de los ambientes altoandinos de dos localidades aisladas en el centro del país. Un ejemplar de Ancash, citado en TROPICOS, no corresponde a esta especie.

63. *Nototriche ulophylla* (A. Gray) A.W. Hill

EN, B1a

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 37: 579. 1906.

Colección tipo: C. Pickering s.n.

Herbarios: US.

Nombre común: Desconocido.

Registro departamental: HV, JU.

Regiones Ecológicas: AA; 4800 m.

SINANPE: Sin registro.

Observaciones: Planta perenne conocida del centro del país. El ejemplar tipo fue recolectado en 1839, al borde de un glaciar, en el lado oriental de la Cordillera La Viuda. Esta localidad fue citada en Brako & Zarucchi (1993) como del Departamento de Lima.

64. *Nototriche vargasii* Krapov.

DD

Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 5: 73. 1953.
Colección tipo: C. Vargas C. 10582
Herbarios: LIL; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU, PU.
Regiones Ecológicas: PSH, AA; 4500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo+1).

Observaciones: Hierba perenne conocida aparentemente de unas pocas localidades en el sur del país. La localidad tipo en el suroeste del Departamento de Cusco ha sido escasamente recolectada.

65. *Palaua camanensis* Ferreyra & M. Chanco

EN, B1ab(iii)

Publicación: Bol. Soc. Peruana Bot. 8(1—2): 97. 1980.
Colección tipo: R. Ferreyra 8842
Herbarios: CTES; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR.
Regiones Ecológicas: DST; 500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1), USM (holotipo+2).

Observaciones: Hierba perenne, terrestre, conocida de unas pocas colecciones de herbarios recolectadas en el sur del país. Esta especie se halla aparentemente restringida a las lomas de las Provincias de Camaná e Islay, en el Departamento de Arequipa.

66. *Palaua guentheri* F. Bruns

DD

Publicación: Mitt. Inst. Allg. Bot. Hamburg 8: 56, t. 8. 1929.
Colección tipo: E. Günther & O. Buchtien 191
Herbarios: B.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, MO.
Regiones Ecológicas: DST; 25—200 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1).

Observaciones: Esta hierba anual es conocida aparentemente de pocas colecciones de localidades dispersas y aisladas en la vegetación de lomas de Arequipa y Moquegua. Al parecer, no ha vuelto a ser recolectada desde 1935.

67. *Palaua malvifolia* Cav.

VU, B1ab(iii)

Publicación: Diss. 1: 40, t. 11. 1785.
Colección tipo: J. Dombey s.n.
Herbarios: P.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: LL, LI.
Regiones Ecológicas: DST; 300—550 m.
SINANPE: RNL

Observaciones: Hierba anual conocida solamente en las lomas de la costa central, de poblaciones naturalmente fragmentadas. El ejemplar tipo fue recolectado en el siglo XVIII, las semillas fueron llevadas por Dombey a España y cultivadas en el Jardín del Rey; desde entonces varias recolectas documentan la presencia de este taxón. No fue reconocida como un endemismo en Brako & Zarucchi (1993). Amenazas a sus poblaciones podrían estar asociadas a la expansión urbana, principalmente en el Departamento de Lima, donde por lo menos una población se sabe extinta, del distrito de Barranco.

68. *Palaua rhombifolia* R. Graham

LC

Publicación: Edinburgh New Philos. J. 369. 1830.
Colección tipo: A. Cruickshanks s.n.
Herbarios: K.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, LL, LI.
Regiones Ecológicas: DST; 30—500 m.
SINANPE: RNL
Herbarios peruanos: HUT (6), HPRG (1), USM (50).

Observaciones: Hierba anual, común en las formaciones de lomas del centro y norte del país. Esta especie no fue reconocida como un endemismo por Brako & Zarucchi (1993), pero aquí se la acepta como un endemismo de la costa peruana. Por sus hojas indivisas y flores grandes se la ha confundido con *Palaua tomentosa* y *P. moschata*.

69. *Palaua tomentosa* Hochr.

NE

Publicación: Annuaire Conserv. Jard. Bot. Geneve 5: 171. 1901.
Colección tipo: H. Ruiz & J. Pavón s.n.
Herbarios: G.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, IC, MO.
Regiones Ecológicas: DST; 100—200 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (3).

Observaciones: Hierba conocida de localidades naturalmente fragmentadas en la costa del sur del país. Esta especie ha sido recolectada en las lomas de Atiquipa, una de las lomas costeras más diversas, pero sin protección alguna.

70. *Palaua trisejala* Hochr.

EN, B1a

Publicación: Candollea 3: 176, f. 5. 1956.
Colección tipo: W. Rauh & G. Hirsch P474
Herbarios: HEID?
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AR, IC.
Regiones Ecológicas: DST; 280—1000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CPUN (1), HUT (2), USM (3).

Observaciones: Hierba perenne, terrestre, conocida aparentemente de unas cuatro localidades en el sur del país, con poblaciones asociadas a la vegetación estacional de lomas. Estas poblaciones se hallan naturalmente fragmentadas.

71. *Palaua velutina* Ulbr. & A.W. Hill

NE

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 42: 108. 1908.**Colección tipo:** Woitschach s.n.**Herbarios:** B.**Nombre común:** Desconocido.**Registro departamental:** AR, IC, TA.**Regiones Ecológicas:** DST, MDE; 20—1500 m.**SINANPE:** Sin registro.**Herbarios peruanos:** HUT (2), USM (2).

Observaciones: Hierba decumbente, conocida aparentemente de unas localidades aisladas en ambientes desérticos del sur del país. El género se encuentra bajo revisión (M. Huertas, com.pers.).

72. *Pavonia insperabilis* Fryxell

CR, B1a

Publicación: Contr. Univ. Michigan Herb. 17: 168. 1990.**Colección tipo:** S. Knapp & J. Mallet 7018**Herbarios:** CTES, F, MO, NY, TEX.**Nombre común:** Desconocido.**Registro departamental:** SM.**Regiones Ecológicas:** BHA; 300 m.**SINANPE:** Sin registro.**Herbarios peruanos:** HUT (1).

Observaciones: Ambientes ribereños en el extremo occidental de la Amazonía peruana parecen albergar una flora poco conocida, como esta especie de *Pavonia*. Solamente ha sido recolectada en una localidad en 1986. Estos ambientes de por sí están sujetos naturalmente a cambios, dado su cercanía a ríos reciben también el efecto de la expansión agrícola.

73. *Pavonia longitudinalis* Fryxell

EN, B1a

Publicación: Fl. Neotrop. Monogr. 76: 196—198. 1999.**Colección tipo:** F. Encarnación 1290**Herbarios:** CTES.**Nombre común:** Desconocido.**Registro departamental:** LO.**Regiones Ecológicas:** BHA; 180 m.**SINANPE:** Sin registro.**Herbarios peruanos:** Ninguno.

Observaciones: Esta especie subarbutiva es aparentemente conocida sólo de la localidad tipo, en la cuenca del Ucayali. Crece en ambientes periódicamente inundados, los que han sido escasamente herborizados en el país.

74. *Pavonia parva* Ulbr.

EN, B1a

Publicación: Notizbl. Bot. Gart. Berlin 6: 327. 1915.**Colección tipo:** E.H.G. Ule 6861**Herbarios:** B, CORD, CTES, MG.**Nombre común:** Desconocido.**Registro departamental:** CA, LO, SM.**Regiones Ecológicas:** BMHP, BHA; 280—1000 m.**SINANPE:** Sin registro.

Observaciones: Esta especie es conocida del nor-oriental del país. El ejemplar tipo fue recolectado en 1903 de la cuenca del Mayo. Colectas recientes amplían su distribución a las cuencas del Marañón y del Chinchipe. Brako & Zarucchi (1993) la listaron como sinónimo de *Pavonia castaneifolia*, pero Fryxell (1999) la acepta como distinta, criterio que se acepta en este libro.

75. *Pavonia rudis* Fryxell

EN, B1a

Publicación: Fl. Neotrop. Monogr. 76: 218—221, f. 83. 1999.**Colección tipo:** A.H. Gentry et al. 39916**Herbarios:** MO, NY.**Nombre común:** Desconocido.**Registro departamental:** JU, PA.**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1800—1850 m.**SINANPE:** Sin registro.**Herbarios peruanos:** Ninguno.

Observaciones: Subarbutista conocida del centro del país, de las cuencas del Pichis y del Pozuzo. Fue descrito de una planta recolectada al suroeste del Parque Nacional Yanachaga-Chemillén. Habita herbazales en laderas.

76. *Pseudabutilon cowanii* Fryxell

DD

Publicación: Contr. Univ. Michigan Herb. 21: 180—181. 1997.**Colección tipo:** R. Cowan et al. 4290**Herbarios:** TEX; USM!**Nombre común:** Desconocido.**Registro departamental:** AM.**Regiones Ecológicas:** BMHM; 1830 m.**SINANPE:** Sin registro.**Herbarios peruanos:** USM (isotipo).

Observaciones: Arbusto conocido, al parecer, sólo de la localidad tipo, en la cuenca del Marañón. Se desconoce la situación de sus poblaciones.

77. *Pseudabutilon nigripunctulatum* (Ulbr.) R.E. Fr.

NE

Publicación: Kongl. Svenska Vetenskapsakad. Handl., ser. 3, 24(2): 11. 1947.**Colección tipo:** A. Weberbauer 5301**Herbarios:** B, F, GH, US.**Nombre común:** Desconocido.**Registro departamental:** AP, CA, LI, LL.**Regiones Ecológicas:** MA, BS; 1400—2500 m.**SINANPE:** Sin registro.**Herbarios peruanos:** CPUN (2), HAO (3), HUT (2), USM (2).

Observaciones: Arbusto conocido de varias localidades, en la vertiente del Pacífico del norte y centro del país. Esta especie es frecuente localmente, en ambientes semixericos en laderas rocosas. Fue listada erróneamente como *Pseudabutilon nigropunctulatum* (Brako & Zarucchi, 1993).

78. *Tarasa cerratei* Krapov.

DD

Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 5(3): 125—127, f. 5. 1954.
Colección tipo: E. Cerrate 1932
Herbarios: SI; USM.
Nombre común: Malva, putpush.
Registro departamental: AN, LI.
Regiones Ecológicas: PSH; 3900 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: USM (isotipo).

Observaciones: Planta tetraploide anual, obligadamente autógena. En Brako & Zarucchi (1993) citan los Departamentos de Cusco y Puno, pero los ejemplares procedentes de allí no han sido verificados.

79. *Tarasa corrugata* Krapov.

DD

Publicación: Bonplandia (Corrientes) 3(6): 65. 1970.
Colección tipo: C. Vargas C. 4246
Herbarios: CTES; CUZ.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU.
Regiones Ecológicas: MA; 2900—3860 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CUZ (isotipo+1).

Observaciones: Planta anual conocida solamente de ambientes intervenidos en el sur del país. Esta especie está escasamente representada en los herbarios peruanos. Se necesita estudio de campo para conocer sus poblaciones.

80. *Tarasa marinii* Krapov.

DD

Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 5(3): 140. 1954.
Colección tipo: F. Marín 351
Herbarios: LIL.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU.
Regiones Ecológicas: MA; 3400 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CUZ (1), USM (1).

Observaciones: Hierba anual, conocida de laderas expuestas en el sur del país. Esta es una especie poco representada en los herbarios del país. Ha sido recolectada en la cuenca del Urubamba.

81. *Tarasa rhombifolia* Krapov.

DD

Publicación: Bonplandia (Corrientes) 3(6): 63. 1970.
Colección tipo: C. Vargas C. 9290
Herbarios: CTES.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: CU.
Regiones Ecológicas: MA; 2820—2860 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: CUZ (3).

Observaciones: Hierba perenne conocida solamente de una localidad. El ejemplar tipo fue recolectado en 1950 de la cuenca del

82. *Tarasa thyrsoides* Krapov.

VU, B1a

Publicación: Bol. Soc. Argent. Bot. 5(3): 135—137, f. 10. 1954.
Colección tipo: R. Ferreyra 8801
Herbarios: F, LIL; USM!
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AN, AR, LI.
Regiones Ecológicas: DST, MDE; 300—2500 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (1), USM (isotipo).

Observaciones: Hierba diploide, perenne, fue descrita de una planta recolectada en la costa del sur del país. Otras poblaciones han sido registradas de unas pocas localidades dispersas en la vertiente del Pacífico de Ancash y Lima.

83. *Tetrasida chachapoyensis* (Baker f.) Fryxell & Fuertes

DD

Publicación: Brittonia 44(4): 444. 1992.
Colección tipo: Matthews 3049
Herbarios: K, OXF.
Nombre común: Algodoncillo.
Registro departamental: AM, CA.
Regiones Ecológicas: BMHM, BMHP; 550—2000 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (7), USM (3).

Observaciones: Arbusto conocido de unas pocas localidades en las cuencas del Chinchipe y Maraón. Fue descrita de una planta recolectada en el siglo XIX. Se desconoce el estado de sus poblaciones. El género era considerado un endemismo, pero ha sido registrado para la flora de Bolivia, considerándose el ejemplar afín a la especie aquí tratada.

84. *Tetrasida serrulata* Fryxell & Fuertes

DD

Publicación: Brittonia 44(4): 444—447, f. 5. 1992.
Colección tipo: D.N. Smith 6165
Herbarios: MO; USM.
Nombre común: Desconocido.
Registro departamental: AM, CA, LL, SM.
Regiones Ecológicas: BS; 360—1160 m.
SINANPE: Sin registro.
Herbarios peruanos: HUT (2), USM (isotipo+1).

Observaciones: Arbusto conocido de varias localidades en laderas xéricas de la cuenca del Maraón, con una población conocida de San Martín, en la cuenca del Huallaga. Se desconoce el estado de sus poblaciones. El género era considerado un endemismo, pero ha sido registrado para la flora de Bolivia.

85. *Tetrasida weberbaueri* (Ulbr.) Fryxell & Fuertes

NT

Publicación: Contr. Univ. Mich. Herb. 21: 193. 1997.**Colección tipo:** A. Weberbauer 6169**Herbarios:** B.**Nombre común:** Desconocido.**Registro departamental:** AM, CA.**Regiones Ecológicas:** BS; 350—1600 m.**SINANPE:** Sin registro.**Herbarios peruanos:** Ninguno.

Observaciones: Subarbusto conocido de varias localidades en ambientes semixéricos, en el norte del país, de las cuencas del Maraón y del Chamaya. Tiene un rango altitudinal amplio y habita ambientes modificados.

86. *Wissadula fuscrosea* Ulbr.

DD

Publicación: Bot. Jahrb. Syst. 54(Beibl.) 117: 59. 1916.**Colección tipo:** A. Weberbauer 6556**Herbarios:** B, F; MOL.**Nombre común:** Desconocido.**Registro departamental:** HV.**Regiones Ecológicas:** MDE; 1600—1700 m.**SINANPE:** Sin registro.**Herbarios peruanos:** MOL (isotipo).

Observaciones: Arbusto conocido, al parecer, sólo de la cuenca de un tributario del Mantaro. Weberbauer (1945) señaló el carácter xérico de la flora de esa parte de la cuenca, la cual alberga otros endemismos; sin embargo, es un área con vacíos de información botánica. Fue descrita de una planta recolectada en 1913.

87. *Wissadula pavonii* Hochr.**Publicación:** Annuaire Conserv. Jard. Bot. Geneve 20: 113. 1917.**Colección tipo:** H. Ruiz & J. Pavón s.n.**Herbarios:** G.**Nombre común:** Desconocido.**Registro departamental:** LI.**Regiones Ecológicas:** Sin datos; altitud desconocida.**SINANPE:** Sin registro.**Herbarios peruanos:** Ninguno.

Observaciones: Este taxón fue considerado por Brako & Zarucchi (1993) como un endemismo; sin embargo, no ha sido posible evaluarlo, ni asignarle una categoría.

Mapa del Perú indicando las abreviatura de los departamentos



Abreviaturas	Departamentos
AM	Amazonas
AN	Áncash
AP	Apurímac
AR	Arequipa
AY	Ayacucho
CA	Cajamarca
CU	Cusco
HV	Huancavelica
HU	Huánuco
IC	Ica
JU	Junín
LL	La Libertad
LA	Lambayeque
LI	Lima
LO	Loreto
MD	Madre de Dios
MO	Moquegua
PA	Pasco
PI	Piura
PU	Puno
SM	San Martín
TA	Tacna
TU	Tumbes
UC	Ucayali