



Revista de Biología Tropical

ISSN: 0034-7744

rbt@cariari.ucr.ac.cr

Universidad de Costa Rica  
Costa Rica

Familia Triglidae - cabros  
Revista de Biología Tropical, vol. 53, núm. 2, junio, 2005  
Universidad de Costa Rica  
San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44921032037>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica  
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal  
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

## Familia Triglidae - cabros

***Bellator loxias***, cabrilla angelita – Una sóla espina preopercular ; hocico no alargado. Una mancha pequeña en la primera aleta dorsal y 2 barras en la aleta caudal.(UCR 1964-12, 7 cm **CC, IC**).

***Bellator n. sp.***, cabrilla del Coco –Una espina preopercular; morro no prolongado. Una mancha negra pequeña en la primera aleta dorsal y 2 barras negras en la aleta caudal y numerosas manchitas en los la parte superior de los costados. (UCR 721-7, 10 cm **EIC**).

***Peristedion crustosum***, cabro armado – Dos barbillas largas, más o menos de la misma longitud de la cabeza, con numerosas ramificaciones laterales; proyecciones rostrales largas. Primera aleta dorsal larga, con borde negro. (UCR 501-1, 13 cm **CC, IC**).

***Peristedion n. sp.***, cabro del Coco –Dos barbillas cortas, alrededor de la mitad de la longitud de la cabeza, con numerosas ramificaciones laterales; proyecciones rostrales cortas. Primera aleta dorsal corta, sin manchas o con el borde cenizo. (UCR 722-5, 12 cm **EIC**).

---

***Bellator loxias***, - barred searobin – A single preopercular spine; snout not prolonged. A small black spot on the first dorsal fin and 2 black bars on the caudal fin and numerous other dark markings on upper flanks.


***Bellator n. sp.***, Cocos searobin – A single preopercular spine; snout not prolonged. No markings on on head and body, upper pectoral-fin rays black, a narrow black subterminal bar of caudal fin of some specimens.

***Peristedion crustosum***, forked searobin – Two long barbels, about head length, with numerous side branches; rostral protuberances long. First dorsal fin long, with black border.


***Peristedion n. sp.***, Cocos searobin – Two short barbels, about one/half head length, with numerous side branches; rostral protuberances short. First dorsal fin short, immaculate or with pale dusky border.

**Apuntes/Notes:**


**TRIGLIDAE**




*Bellator loxias*



*Bellator sp.*



*Peristedion crustosum*



*Peristedion sp.*